



بالقزحية والبطيخية والقرصية والندولية
والبريطانية والاندلسية والبريانية
المؤاد والمارد

إدوار غَالِبُ الموسُوعَةِ


٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مائة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملونة

في علوم الطَّبِيعَةِ

تبحث في الزراعة والنبات والحَيوان والجيولوجيا



دارالمشرق بيروت



مخطوطات ،
دار المخطوطات ش.م.م
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

الطبعة :
المكتبة الشرقية - ساحة البوابة
ص.ب. ٦٩٨٦ - بيروت ، لبنان

الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غلطوس

جان قرطباوي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثاني : ISBN 2-7214-2550-6

يحتوي هذا المجلد من

القصص والروايات

١٠٢٠٨ مؤاد

٢٢٧٧ رسا

٨ لوحات ملونة

الأستاذ غالي

مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
والبحر والشجر والأرض والحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطب والحقائق
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثاني

من الرأ إلى الفاء



السرعويات . مستطيلة الجثة ، قصيرة القوائم ، غبراء الصلحة العليا من قفن الرأس الى الذنب ، سوداء الصلحة السفلى من الرأس الى الذنب . اذنانها صغيرة مستديرة . حلبيها كثيف وليليط . اطرافها طويلة حادة || مسرحها من الغروب الى الفجر . قوتها البسل والفسار والجردان والحيات والمصاير والدويبات والثآليل وجملود بعض الاشجار . له نوعان ، يليان .

١١١٥٣ - وراكه
قال ابو حنيفة : « شجرة ترتفع على ساق ثم تنفرع لها ورق ملود احمرى » . وقال غيره : « شجرة جبلية كانها غطلة ولها زهرة بيضاء لينة كانها ثقل » . ج راد .

١١١٥٤ - رايض
الرايض نيم لير من كوكبة التنين مركزة على اللسان .

١١١٥٥ - رايض حرارة
Thermostat (F). Thermostat (E).

جهاز آلي يستخدم في تكييف الحرارة المطلوبة وتثبيت استمرارها على درجة معينة .

١١١٥٦ - رايضة
Lieuse (F). Bruden (E).

أداة آلية تجمع قيرط للزراع وترطبها .

١١١٥٧ - رايضة ، عخاضة
Phytophage (F). Plant-eating (E).

هي كل حشرة قوتها النبات .

١١١٥٨ - رايضة
Colline (F). Hill (E).

ما ارتفع من الأرض وكان دون الجبل .

١١١٥٩ - رايض زراعي
Rente convenancière (F). Fitty rent (E).

هو الذي ينشأ على أرض زراعية ولا يجوز مستغمة ان يسترده ولكنه يجوز للمدين بعد التحرر منه بالتخلي عن الارض .

١١١٦٠ - رايض ، اكل العسل
Mellivora, Ratel (S). Ratel (F).

جنس حيوانات راسية بطيئة الحركة ، كسولة من فصيلة



رائل ابو كعب



رائل ابو كعب

١١١٦١ - رايض ابو كعب
Mellivora leuconota, Ratelus capensis (S). Ratel du Cap (F). Ratel of Cap (E).

نوع من الرائل موطنه افريقية الشرقية والجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ذنبه ٢٨ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم . يألف الجبال والاحراج والبراري على السواء ويسلك الانهار بنفسة .

١١١٦٢ - رايض ابو كعب ، ششمر ، صلوص
Mellivora indica, Ratelus indicus (S). Ratel de l'Inde (F). Indian ratel (E).

نوع من الرائل موطنه الهند وبلاد فارس وبنارها . طوله نحو ٨٠ سم . ذنبه ١٢ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٤ سم . يألف الجبال والاحراج ، يرغب في المناطق الكثيرة الغصان والوشاد .

١١١٦٣ - رايض
Pléiotrope (F). Pleiotropic (E).

صفة الجين الوراثي الذي يحقق جمع السمات المتباينة .

١١١٦٤ - رايض
Résine (F). Resin (E).

وبهم من قال رايض . مواد ثلاثية صلبة لزجة تنفصها بعض النباتات الى سبب الصنوبريات والبطيانيات .

١١١٧٦ - رائج الصنوبر - واكع ، كاشيف

Ractif (F).

Reactif, Reagent (E).

كل مادة كبروية يساعد اندمجا على الكشف عن حقيقة

الجسم لللوب معرفته .



راتون غاسل

١١١٧٧ - رادون

Safran (F). Saffron (E).

هو الزعفران ، اطمله .

١١١٧٨ - راديوم

عنصر معدني نادر الرصد اكتشف عام ١٨٩٩ بمقر

عام ١٩٠٤ على يد العلماء بيار وباري كوري وبيرون .

لونه ابيض فضي يضيء في الظلام . اشتد فسقورية بريقها

فستني . يتفكك بسرعة اذا تعرض للهواء || يوزن ٩٦٠ (يو- Ra)

وزنه الانوي ٢٢٦,٠٥ وقه ٨٨ يتصهر في ٩٦٠° سم .

يصين بلسانه الاشعاعي الضخم ويحاط به في اباداة الانسجة

الحية التي يستعملها الطب في معالجة الاجزاء المعطوبة

من الجسم || يوجد في بعض انواع الفلزات المستخرجة من

متاجر بوهيمية وفي الكونوق والولايات المتحدة وكندا .

١١١٧٩ - زكار الجذع * ، صمكة زجاء

Xanthochrous hispida, Polyporus hispida (S).

Polypore hispida (F). Hardwood (E).

فطر من السميات يركب بعض الاشجار الخشبية والزراعية

اغصانها الدلب والصرة والشت والتوت والوجز والتخلع .

اروسه مستديرة قطرها سم ١٠ . وهي مقنطة الجاهب

للقام على الجذع . لونها اصفر يتقلق ثم حنلي وينتهي

بالسرة . لهاها امفني التركيب ، غزير العصاره ،

اصفر اللون في اول عهد ثم حنلي عند ادراكه وخلو من

العصاره || يوفاته صفر ، يضيء الشكل ، قياسها

x ٧ ميكرون || مشيجه يدخل من الاجزاء القياسية

فيتمركز بين القشرة والخشب اليابس ثم ينش في الشكير

والخشب ويمتد حتى القلب || يكافئ بتفتيل وتطهير

الجروح القياسية ويطل جروح الجلود والاضغاب بأحد

المجاين الخاصة او السليخ .



زار الجذع

١١١٨٠ - زكار الصنوبر * ، صمكة الصنوبر

Xanthochrous pini, Polyporus pini (S). Pourriture

rouge du pin, Polypore des pins (F).

فطر من السميات يركب الصنوبر العسر الذي صار

حزق لانتحاب الرائحة || مشيجه يدخل وأل إلى قلب

الجذع حيث يتمركز ثم ينتشر من الداخل إلى الخارج

وين مركز انتلاعه إلى اعل ويسهل بذات المساحة التي

تراوح من المتر إلى المترين فيطلب الخشب كما يبدو في

الرم بعد ان ينفذ عروقه || اما الفطر فاروسه قنفسية

الشكل ، جانية الانكاز عديده الاغادي المستديرة .

قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الصفرة الشبه . لهاها فليبي

ناشف التسج حنلي اللون الزاقي || يوفاته شفاقة

تبينة الموج يضيء الشكل قياسها x ٦ ميكرون || يكافئ

بتطهير جروح الحز عند نهاية الانتحاب وبانتزاع الفطر

قبل ادراكها .



زار الصنوبر

١١١٨١ - زكار الكشمش * ، صمكة الكشمش

Xanthochrous ribis (S). Polypore du groseillier (F).

فطر من السميات يركب سوق الكشمش عند سطح التربة

فيطلب اللها والتشكير دين ان يتدهما إلى الخشب .

اروسه قمية الشكل فائرة الحافة المنخفضة لتضدية ، لونها

اصهب حنلي ثم يميل إلى الحزوة . لهاها اصفر نحاسي



زار الكشمش

١١١٨٥ - رائج الصنوبر

Barra

عصاره صمكة رائجية تسيل من حز سوق الصنوبر

البيري .

١١١٨٦ - رائج الصنوبر

Réineux (F). Résineux (E).

اسم شامل يطلق على كل شجرة رائجية العصاره اغصانها

الاجار القصلية الصنوبرية .

١١١٨٧ - راتون ، واكئون

Procyon (S).

Raton (F). Racocon (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الراتونيات . موطنها البلاد

الامريكية . تشبه الدب والفردر . اصوالها لبدة قصيرة .

اناثها تقسم نحو اربعة جراء تربها نحو الحول || له نصان

الراتون الفاسل والراتون المنبي .

١١١٨٨ - راتون غاسل *

Procyon lotor (S).

Raton laveur (F). Maspach (E).

نوع من الراتون . عروقه اربعة مستمرة من المخيخ إلى

السكا . طوله من ٨٠ إلى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٣٢

إلى ٣٦ سم . ثوبه المتقلب إلى الفلحة للبراء يطولها موج

اصفر || يالفت خطوط السموات والانهار يعيش في البر

والله وعلى الاشجار . لا يأكل شيئا إلا بعد شدة الجلاء .

قوته الثار والمحبوب والجذور والبير والاسماك .

١١١٨٩ - راتون منعي *

Procyon cancrivorus (S).

Raton crabier (F). Agouara, Crab-eater (E).

نوع من الراتون . موطنه امريكا الجنوبية . طوله نحو

٧٥ سم . ارتفاعه ٢٢ . ثوبه الى السرة يطو جسمه

خطوط بيض حازنة . لا ينسل اكله . قوته الثار والجذور

لكنه يرض في بعض انواع السرطان اغصان المنع .

١١١٩٠ - راتونيات

Procyonidae (S).

Procyonidae, Ratons (F). Procyoni, Racoons (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات للارام القرازم . تأتي بين

التسوريات والدييات . اجناسها خمسة : البساري والبيدا

والراتون والكواكي والكنكاجو ، جميعا امريكية الموطن .

١١١٩١ - راجعية

Proboscidea (F).

Probabilism (E).

الراجعية مذهب فلسفي اجتاهي يقول بأهمية السلوك وفقاً

لرأي الراجح .

١١١٩٢ - راج ، واك ، وحيق

Vin (F). Wine (E).

هي الخمر ، شراب كحول يمتل من اختيار صدير

المنب .

١١١٩٣ - راحة الأسمد

هو صليغ الازد ، اطله .

١١١٩٤ - راجيق

Melliphage (F).

Melliphagous (E).

نمت تعريفه يطلق على الطيور والاشجار التي ترتشف

رحيق الازهار . ج رواجق .

١١١٩٥ - راجيم

Couvée (femelle) (F).

Brooding-hen (E).

اثنى الطير في زين حفسها البيض . ويقال ارضع الطائر

وارضعت اللجاجة على يعضها فهي مرغم .

١١١٩١ - رأس الثعبان Rastaban (F).
Dragon's Head (E).
رأس الثعبان ويسمى أيضاً رأس الثعبان نجم ثير من الموائد وهي اربعة انجم مركزها على رأس الثعبان .

١١١٩٢ - رأس الجاني Ras Algehi
رأس الجاني ويسمى أيضاً كلب الرامي ، نجم ثير من كوكبة الجاني مركزه على الرأس .

١١١٩٣ - رأس الحشيش رأس الحشيش هو الكرشون ، اطلبه .

١١١٩٤ - رأس الدفوري رأس الدفوري هو القطريون الاسمر ، اطلبه .

١١١٩٥ - رأس الشيخ رأس الشيخ هو الاقسون ، اطلبه .

١١١٩٦ - رأس الصنوبر *
Clinopodium vulgare, Melissa clinopodium (S).
Clinopode, Grand basilic sauvage (F). Wild basil,
Horse-thyme (E). Gemeiner wirseldost (D).
Basilico salvatico, Clinopodio (I).

نبات عشبي بري طعم مر من فصيلة الشفويات ينبت في ضباب ورماد مناطق حوض البحر المتوسط . ساقه فروع متفرعة كثيفة الزغب . اوراقه لائحة متقابلة صغيرة . تلتصقها كثير المروق والشرابين ، مزغب الصلصة ، شخن اللبس . ازهاره ابطية الاركاناز ، غمية التجميع ، موهبة الكأس والتصل وهي بيضاء اللون ليلكية المواج . يقال ان اوراقه وازهاره طيبة تفيد المعدة .

١١١٩٧ - رأس الفول Algol
رأس الفول نجم ثير من كوكبة سيابس .

١١١٩٨ - رأس النضل Chaintre, Fourrière,
Tournière (F). Balk, Headland (E).
المكان في ابل الحقل وآخره حيث تنقل سكة الحراثت وتور العواب .

١١١٩٩ - رأس الهر رأس الهر هو الجليج ، اطلبه .

١١٢٠٠ - رأس مال ، وسمكال Capital
هو مجموع الثروة المخصصة .

١١٢٠١ - رأس مال الشركة ، وسمكال الشركة
Capital social (F). Registered capital (E).
هو مجموع المبالغ المدفوعة او الاموال المقدمة الى الشركة .

١١٢٠٢ - راسب Précipité (F). Precipitate (E).
عكر او دودي يحصل في بعض السوائل ويذهب سفلاً من جواره استعمال بعض المواد الكيماوية .

١١٢٠٣ - راسبية Diluvium
غرين جيولوجي قديم تجمع في الحقبة الرابعة او قبلها بتأثير مياه الانهر والبحار والثلج .

١١٢٠٤ - رأسمالية Capitalat, Capitalisme (F).
Capitalism (E).
هي سيادة الراسماليين والرأسماليين وهي من النظم الاقتصادية السائرة الى الاستغلال وذلك لان معظم العالم يدين بالتروسيه ويستسلم الى سلطان الدولة .

مكون من طبقتين تفصلهما اقلية خشنة ليفية صلبة سدواء اللون . اللبقة العليا استنجية التركيب خشة والسفل فليزية جامدة || يوفداته سطحية مستديرة قطرها من ٢ الى ٥ ميكرون || يكافئ بانتازع الفطور قبل ادراكها ويتطهر اللسان والشكر بعد تظفحه . ومن الضروري اجتناب زراة الكشش في الازربة القوية الانتماج .

١١١٨٢ - رازيانج هو الشيار ، اطلبه .

١١١٨٣ - رازيانج كبير ، برهيلية
Hippomarstrum (S). Hippomaratre (F). Rosemary
frankincense (E). Languedockische nussdold (D).
Ipomaratro (I).

جنس نباتات عشبية برية ممرنة من فصيلة الحلييات . انواعه عديدة منبها الاراضي الملساة . اوراقها خرقية غززية . ازهارها صفراء . عرفها مستحب الرائحة تفوح من اللبس .

١١١٨٤ - رازيانج * ، متفغيل ، إينانة
Enanthe (S). Enanthe (F). Water drapwort (E).
Pferdesaat (D). Enanto (I).
جنس نباتات عشبية برية ممرنة من فصيلة الحلييات . انواعه نحو ٣٠ جميعها متفغية او مائية . اوراقها مشرعة التصل . ازهارها مزواجية بيضاء اللون || يستخرج من جذور بعض انواعها عصارة صفراء اللون سامة بيمتة . اشهر انواعه الرازيانة المائية .

١١١٨٥ - رازيانج مائية * ، متفغيل مائي ، إينانة متفغية
Enanthe phellandrium (S). Phellandre, Fenouil
d'eau, Cigué aquatique (F). Water hemlock, Filip-
bane (E). Echce pferdesaat (D). Fellandrio, Filpen-
dula, Clcuta acquatica (I).

نوع من الرازيانة يعيش في المناطق وعلى ضفاف الانهار . يملو نحو المتر . سمه ذائق ميث . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١١١٨٦ - رأس Tête (F). Head (E).
عصر من اعضاء الجسم الحيواني يتكون من طبقة عظمية لا تقياسية الشكل تدعى الجسدية تحوى المخ والخيخ والانتخاع للمستطيل . خلافا لشجة عظمية يملعها الجلد الذي يكوو الشعر . ويمرر الرأس على فتحتين القم والالاف وما طريقا التنفس والاكل وعلى اعضاء الحس وهي العينان والاذنان والالاف واللسان .

١١١٨٧ - رأس الأسد Razalas
رأس الاسد نجم ثير من كوكبة الاسد الاصفر .

١١١٨٨ - رأس الأفعى رأس الأفعى هو الاحيون ، اطلبه .

١١١٨٩ - رأس الثعبان رأس الثعبان هو البيقران ، اطلبه .

١١١٩٠ - رأس القوم المومع Pollux
نجم ثير من برج الثوابين ، يبعد عن الارض نحو ٣٢ سنة ضوئية .



رازيانج كبير



رازيانة



رازيانة مائية



رأس الصنوبر



رأسن حمامي



رأسن طبي



رأسن من السج



رأسن كبير الزهر



رأسن



رأسية الحدائق

جميعها صغيرة اللثة المثلجاء ترواح من ١٧ إلى ٢٠ سم. أجسامها أحليجية الشكل. رؤوسها خفيفة، قصيرة المثلجاء. زعانفها الظهرية مستطيلة، تسامية المناس. أثوابها تراوح بين العظمى والحفرة. سهلها أزرق الخمار ٥ خويها مستطيلة الصف مأكولة.

١١٢١٤ - رأسية * Capitula (F). Capitula (E). شكل من الزباني قوله فواصل اسطوانية متتامة تملظ تدريجياً عند الفواصل الثلاث الأخيرة.

١١٢١٥ - رأسيات Céphalés (F). Céphalates (E). قسم من الرؤيات يشمل رؤيات الأبريل ومعديات الأبريل ومجتمعات الأبريل.

١١٢١٦ - رأسيات الأرجل Céphalopodes (F). صف حيوانات من الرؤيات. Cephapods (E).

١١٢١٧ - رأسية، فيفالكثف Cephalanthus (S). Céphalantho (F).

جنس نباتات برية وريسية من فصيلة الفويات. دعت رأسية لأن تنوعها النباتي ويستدير كالرأس. أنوعها عديدة جميعها شجيرات تمل من مترين إلى ثلاثة أمتار. تكثر في المواقع الرطبة وعلى ضفاف الجبسات والمناس. فروعها طويلة متعاقبة. أوراقها مستطيلة معتقة. أزهارها نورية التجميع، كبيرة الحجم، يضاء اللون ٥ أشهر أنوعها رأسية الحدائق.

١١٢١٨ - رأسية الحدائق، فيفالكثف غربي Cephalanthus occidentalis (S). Céphalantho occidentalis, Bois à boutons (F). Button-bush, Globe flower bush (E). Amerikische kopfbäume (D). Cefalanto, Legno da bottono (I).

هو النوع الزراعي النضوي، يمل نحو ٣ أمتار. أوراقه بيضية، مستطيلة، ذلقة الزام الأخير. أزهاره حطرة نوية إلى الأبيض يملع موج أصفر ٥ أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١١٢١٩ - ركشة Rachis الفزاة هي محور البنية والحفرة والمفتود والأوراق المركبة وغيرها. وين اسمها الزند والقت.

١١٢٢٠ - ركش Filtro (F). Fiter (E). أداة تصفى بها السوائل من ماء وغيره.

١١٢٢١ - ركشبة الندي في لغة التنبيل، أطبها.

١١٢٢٢ - ركشن Cohnmentال تمت تمرير يطلق على كل حشرة تلازم غيرها وتعيش على حسابها.

١١٢٢٣ - ركسيدكا، حجللا، مقرباب Téléscope (F). Telescope (E). جهاز خاص برصد الأجرام البعيدة.

١١٢٢٤ - راج Berger (F). Shephard (E). هو من ولي أمر التنبيل.

١١٢٢٥ - راجي Erral الفراجي نجم من كوكبية يقاس مركزه على الرجل اليسرى.

١١٢٠٥ - رأسن Inula (S). Aunbe, Inula (F). Inula (E). Alant (D). Enula (I). جنس نباتات حشوية معمرة من فصيلة المركبات الابوية الزهر. أنوعها عديدة مظهرها بري ويصفها ربي. أوراقها متتامة لا قياسية الانتساب. الأوراق علقية رؤوسية صفراء، اقراص ٥ احرف أنوعها يظهروها قيق.

١١٢٠٦ - رأسن البترافيت Inula ensifolia (S). أطلبه. هو البرنوب، أطلبه.

١١٢٠٧ - رأسن حشامي * Inula ensifolia (S). Aunbe ensiforme (F). حشبة معمرة تمل من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها غليظة زياء اللحاء، متتامة الأوراق السنانية الضيقة، فصلها خلي البشرة خاسي المرواح المتزاوية. رؤوسها الزهرية متتامة اللثة، قطرها يراوح من ٦ إلى ٦ سم. قنابها المخاربية مستطيلة حشامية الشكل ٥ أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١١٢٠٨ - رأسن ديق هو الحليون، أطلبه.

١١٢٠٩ - رأسن طبي، جناح رؤسي، ركشجيل شامي، ركش شامي

Inula helenium, I. campana, Corvartia helenium (S). Aunbe grande, Elecampane, Gell de cheval (F). Common inula, Horsecamp, Horse-selder (E). Echter alant, Alantator (D). Enula elenio, Enula campana, Occhio di cavallo (I).

حشبة طبية برية معمرة تمل من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها حاشنة كبيرة اللثة، السفلية منها تمل نحو ٨٠ سم. والمطوية طول من ١٥ إلى ٢٥. فصلها أنزب المسفة السفل الطولاء اللون. حلقها حديد القروح، رؤوسها الزهرية كبيرة اللثة، قطرها نحو ٧ سم. أزهاره يستمر من أيار إلى أيلول.

١١٢١٠ - رأسن عتي المسح * Inula oculatus-christi (S). Aunbe cell du Chris (F). حشبة سرولية معمرة تمل من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها معتقة، سنانية. فصلها خلي البشرة باهت الخضار الاطل. حلق أزهارها كبير اللثة، رؤوسها معتقة قطرها يراوح من ٣ إلى ٥ سم. ٥ أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١١٢١١ - رأسن حشدي Inula glandulosa (S). Aunbe glandulosa (F).

حشبة معمرة تمل من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها زغبية اللحاء تنتمي بزرة رؤوسية واحدة، قنابها مغزوية الشكل. أوراقها صغرية اللثة، لسة، خيفة. فصلها خلي البشرة على صفحتي. حلقه ميمر اللثة الدنية الطاهرة. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١١٢١٢ - رأسن كبير الزهر * Inula grandiflora (S). Aunbe à grande fleur (F). حشبة سرولية معمرة تمل من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها لاطقة تمل نحو ١٠ سم. رؤوسها الزهرية كبيرة اللثة، قطرها يراوح من ٦ إلى ١٠ سم. لسينها بقراقية اللون. أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٢١٣ - رأسون * قارة البحر Novacula (S). Rason, Rasoir, Rat de mer (F). Razor-fish (E). جنس اسماك بحرية من شائكات الزانف وفصيلة الكوسيات. أنوعها المعروفة قليلة العدد. أسطها بجار البلاد الحارة.

١١٢٣٩ - راقود *
Platycephalus (S).
Platycephale (F). Flathead (E).
جنس اسماك بحرية من شراكات الزعانف وفسيلة الطرقيليات
انواعه المعروفة ٣٠ اسماها بحار البلاد الحارة . جميعها
متريلة الشكل، مفلطحة الرأس، مستطيلة الزعانف الظهرية
وبطنية، صغيرة الفصوص الخشنة . منشفة الانثوب .
تسرح في السمق، تألف المناطق الرملية حيث يطيب لها
الاستقرار والاعتدال بانتظار الافتراس .

١١٢٤٠ - راقوش * وراقولويه *
Ramularia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرامليات يركب النصل
على صفحته فيوشه يقع مختلفة الالوان يذبل فيها الابيض
والاصفر والاسمر || منشفة شديدة الرقة والمليونة ، داخلي
وتحتوي الانتشاب . جريه الكنيدي قصيرة ، شفافة ،
غنية بالتجميع ، كنانته مستطيلة ، قليلة التشعب ،
اسطوانية ، مؤنثة . يورفاته مختلفة الالوان والاشكال تنظ
فيها الاسطالة || انواعه كثيرة البد اعرفها ما يتبع .

١١٢٤١ - راقوش الإجماسي *
Ramularia magnusana (S).
فطر مجهرى يركب ثمار الاجناس والتفاح المغفولة .
مظهره الخارجي يقع قطرها براوح من ١ الى ٦ م . تملو
بشرة الشرة تستطعها بيشاء مشبي التركيب ، خلي الشكل
يبدو ابيض اللون ثم يتحول الى الوردي وينتهي بالاسمر .
اشراره لا تسمى البشرة . يذرك بالتوبة وباجتناب الحرارة
والمرطوبه .

١١٢٤٢ - راقوش البنفسج *
Ramularia lactea (S).
فطر مجهرى يركب اوراق البنفسج . مظهره الخارجي
يقع شبه مستوية قطرها نحو ٥ م . تملو نصل الازواك
وقد تصيب الحاليق والازهار . تبدو صفراء اللون ثم تتحول
الى الابيض تحرقها حالات تلية || يجب قياس التسج
وتسج الازواك يذبل الازهار || يكافح منه ظهوره
بالتصاع الازواك المؤنثة وينضج الثبات باسند الفوطير
المركزة على التماس .

١١٢٤٣ - راقوش الدويكييات *
Ramularia primulae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الدويكييات واعصها زهرة الربيع .
مظهره الخارجي يقع مستوية او مقرنة الزوايا تبدو النصل
على صفحته يتحول على العليا صفراء اللون ثم تتحول الى
الجلوة وتكون على السطح خلية بيضاء || يكافح منه
ظهوره باستهلاك مركبات التماس .

١١٢٤٤ - راقوش الشوندر *
Ramularia beticola (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الشوندر في اواخر الصيف .
مظهره الخارجي يقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها من ٢ الى
٣ م . توشم النصل على صفحته . تبدو مستطيلة اللون
حراء الاغلاز ثم خلية بيضاء || اشراره زجيدة لا تستجيب
للكاسية .

١١٢٤٥ - راقوش الحشيش *
Ramularia cynarae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الحشيش والاراضي شوكي والقرطم
والكرزنت || مظهره الخارجي يقع قسيحة مقرنة الزوايا
تملو النصل على صفحته فتبدو على العليا صفراء اللون وعلى
السطح ريادية خلية كثيفة الزغب || اشراره زجيدة
لا تستجيب للمكاسية .

١١٢٤٦ - راكمي ، ليرويس ، عسور
Eros, Amor (F). *Eros* (E).
الراعي كوكب سيار يتبع النظام الشمسي . مركزه بين
الارض والرميح . دورته حول الشمس تستمر نحو ٩٤٢
يوماً .

١١٢٤٧ - راكمي الجوزاء
راعي الجوزاء كوكب .

١١٢٤٨ - راكمي الحنود
راعي الحنود نجم ثير من كوكبة حور وسية مركزه على
رأس الحنود .

١١٢٤٩ - راكمي الشفاه
la Bourvier (F).
راعي الشفاه كوكبة نجم شالية المقيع تسمى هراء، اطلها .

١١٢٥٠ - راكمي النعام
راعي النعام كوكب .

١١٢٥١ - راكميكة
Phagocyte (F). *Phagocyte* (E).
في اللقطة، اطلها . والراعي ج . دواع من وضع اليانبي .

١١٢٥٢ - راكمين *
Prémonitoire (F).
Premonitory (E).
نعت تعريفي يطلق على الامراض او الاعراض التي تستبق
نغوب المرض . او على الملاحظات التي تنذر بقررب وقوع
الحوادث .

١١٢٥٣ - راكميد هو الجندل ، ج روافه .

١١٢٥٤ - راكمية ، عكلية ، ميخل
Lavie (F).
Lever (E).
فصيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز
يستعمل لرغ الانتقال والمحنور وما شبه || والرافعة
انواع منها التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمقاومة .
وبها التي تقع فيها المقاربة بين القوة ومحور الارتكاز .
وبها التي تقع فيها القوة بين المقاربة ومحور الارتكاز .

١١٢٥٥ - راكميا
Raphia (F). *Raffia* (E).
جنس نخيل غليظ الجذع ، مستطيل المسط ، كبير الشبة
الشدلية ، حشني الثآبر . انواعه صلبة ، موطنها افريقية
وامريكا الجنوبية ويندغسر || اعرف انواعها واشهرها يتبع .

١١٢٥٦ - راكميا المختصر *
Raphia vinifera (S).
نوع من الرافيا الصنعية . ثمارها مسكرة المادة سريعة
الاختصار يصطنع منها شراب كحولي يدعى نبيذ التخل .

١١٢٥٧ - راكميا الرباط
Raphia ruffia (S).
نوع من الرافيا الزراعية الصنعية . سفنها يطول نحو
٢٠ م . الياف سفها خفيفة ميتة ناعمة عيكة تستعمل
في عدة صناعات . وهي أيضاً شائعة الاستعمال كرباط
زراعي تشبه به اللطام وغيرها .

١١٢٥٨ - راكمي
Hercule (F). *Mercurius* (E).
هو الجانيء ، كوكبة نجم شالية المقيع .



رافيا الحنود



راقود



راقوش الاجاس



راقوش البنفسج



راقوش الدويكييات



راقوش الشوندر



راقوش الحشيش



رام



راستني



راستني اسود



رامي



رائن

٨ الى ١٥ سم. ازهارها قليلة العدد، كبيرة الحجم،
بنفسجية اللون، صفر المآبر لا تتورمها صيفي.

Podontus ster (S). * **راؤوس اسود** *
Podonts noir (F). Podontus ster (E).

نوع من الراؤوس. حشرة من مفصليات الاجنحة عتقلات
الاجزاء وظيفية الحسوليوات. موطنها بين من الشرق الاذن
الى اوروبا. الحشرة الجملانة تعيش على الازهار. البرقة
دائمة قوتها المواد الخشبية المنحلة، ويكثر سويها في جلود
واضغان الانجار النخرة جسمه اعطليجي الشكل،
محبب الصفعة العليا، يطول من ١١ الى ١٢ سم. عيانه
بارزتان. زبانه غيظيان. غذاء لافحات. ثوبه الى
السواد الاسفع المالح.

١١٢٥٨ - **راكمي** *، **قشب سيام**

Besmeria nivea, Urtica nivea, U. utilis, U. tenacissima (S). Rame argentée, Ortie argentée, O. de China, Chanvre de Saigon (F). Ramee grass, China grass (E). Rame, Chinasessel (D). Ortica di lino, Canapa di Siam (I).

نبات حشبي لني صناعي ممر من فصيلة القراسيات.
يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوريته ضخمة، كثيرة
الفرع الكثيفة الانتشاج. اوراته معتقة بضيصة
اعطيجية، تصلها نفي الصفعة السفلى، يطول نحو
١٥ سم. عتقه احمر اللون خلي البشرة في انفراس عتقودي
اسطواني. الياله عتية شاملة الاستعمال في صناعة الادواق
التندية.

١١٢٥٩ - **راكسيات** *
Myoporaceae (S). Myoporaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وانواعها نحو
٥٠ اسماؤها تمتد من الشرق الاوسط الى اليابان. جميع
نباتاتها ثمرات وجينات. اوراتها متعلقة في معظم الانواع
ومتعاقبة في بعضها. تصلها شقيقة، مستطيلة، لزجة.
ازهارها ابطة الانتشاج وطرية، شمية التجميع او فردية.
ثمارها عتية رباعية البزور. نصال اوراتها وطلا سويها
وافنداعا ملينة بالجايوب الراتنجية الفتنة بالادعاند الطريرة
الحصية المعروف. اشهر اجناسها القرام.

١١٢٦٠ - **راكيج** هو التارجيل المعروف، اعطيه.

١١٢٦١ - **راكين** *
Ranina (S). Ranina (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات وظيفية القرازيات.
انواعه المرفوعة قليلة العدد اسماؤها البحر الاخر والحيث
العتي. اجناسها مبطلة معتدة الحجم، تطول من ٥
الى ٧ سم. وتفرس من ٤ الى ٥ سم. دويوها قليلة
الاحديداب. قوتها عتيرة، غليظة، مخرجة الاطراف.
ملاطها عتية، كلابية الشكل. اشهر انواعه الرانين
المستن.

١١٢٦٢ - **راكين مسنن** *
Ranina dentata (S). Ranine dentée (F).

نوع من الرانين يكثر وجوده في المحيط المتدي. يعيش
قرب الشط. دويته جويي اللون، اسفع المالح، مسن
الحافة الامامية.

١١٢٦٣ - **راكُون** هو الراتين، اعطيه.

١١٢٦٧ - **راكل**
Astruchon (F). Young ostrich (E).
هو المقل اي ذلك النمام المحوي عني راة، ج راكل
ورثالة.

١١٢٦٨ - **رام** *
Mydoporum (S). Myopora (F).
جنس نباتات عتية ممر من فصيلة الراميات انواعه
نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها تربي. اوراته متعلقة
مستطيلة التصل الضيق. ازهاره نوري التجميع ابلي
الارتكاز. ازهاره بيض او حر. ثماره عتية رباعية
البزور.

١١٢٦٩ - **راكمه** القامة: مستقيم مجتمع فيه الماء.

١١٢٧٠ - **راكمج**
Laurie (F). Trap (E).
قرايح: ملوحي تصاد به الجوارح كالسقاقر ونحوها.

١١٢٧١ - **راكميس**، **دجوي**
Nocturne (F). Nocturnal (E).

كل دابة مسرحها الليل هي راس. وقد كثر استناد
الرواس الى طير الليل.

١١٢٧٢ - **راكمي**
Appelant (F). Decoy-bird (E).
الراقم: الطائر الذي ينصبه الصياد ليش عليه البازي
فصيده.

١١٢٧٣ - **راكميل**
Silicicole (F). Silicic (E).
لعت تعمرلي يملئ على النباتات التي تعيش وتجد في القرو.

١١٢٧٤ - **راكمندي** *
Ramondia (S). Ramondia (F). Ramondia (E).

جنس نباتات عتية برية وتربيتية ممر من فصيلة
الجسبريات. مقلقة التمرير على اسم العلامة راستني
(١٨٢٧-١٧٥٣) انواعه المرفوعة اربعة، اسماؤها
الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والفرية.
جميعها سريرية، فريقة، عادمة الساق قروية الادواق
الخشنة المزينة النصال. ازهارها قليلة العدد ترتكز على
شراخ دقيق يطول من ٥ الى ١٥ سم.

١١٢٧٥ - **راكمندي اسفع**، **راكمندي صربي** *

Ramondia serbica, Jankaea ferruginea (S).
Ramondie de Serbie, Jankaea ferrugineuse (F).

نوع من الرامندي، عتية سريرية، فريقة، ممر.
منبتها العلوي بعض مناطق البلاد المعتلة الحرارة اخصها
سربيا. اوراتها مشيرة تطول نحو ٣ سم. نصال خلية
الصفعة العليا البحرية اللون، صفاء الصفعة السفلى.
شراخها الزهري يطول من ٧ الى ٢٢ سم. ازهارها قليلة
العدد متوسطة الحجم، صفراء اللون، زرق المآبر
تتورمها صيفي.

١١٢٧٦ - **راكمندي ميكوني** *
Ramondia Myconi (S). Ramondie de Myconi (F).

نوع من الرامندي. عتية فريقة ممر. منبتها المناطق
المعتلة الحرارة من ارتفاع ٦٠٠ الى ١٦٠٠ م. من سطح
البحر. اوراتها تطول نحو ٧ سم. تصلها عتق للمسن
مسن الحافة، زرق اخير اللون على الصفعة العليا،
اصعبه على الصفعة السفلى. شراخها الزهري يطول من

١١٢٦٢ - **رَالِيئِيَّاتٌ •** Raninidae (S).
Raninidae (F). Raninidae (E).
فضيلة دوبيات بحرية من التشرينات عشاريات الاربل المتلوثات . اجناسها وانواعها المرموقة قليلة العدد اعطائها بحد البلاد الحارة والاسوائية || اعرف اجنتها وشعرها افرانين الذي يمتد قيس الفضيلة .
١١٢٦٤ - **رَاهِيَّةٌ** هي البنية ، اطليا .



راهوب الثغول راهوب اسود

١١٢٧٢ - **رَاهُوبُ الدَّبَّحِ •** Ustilago scorzonerae (S). Charbon du scorzonère (F).
فطر مجهري طويل العمر يعيش في الابعوة واخليا ، يصيب الدبب في المواقع الرطبة حيث يطب روشتات الازهار || مظهره الخارجي يتور بوبية لونها الى السمره تملو الروشتات ثم تنقلن عن غيرات هبابية شديدة السواد . يكافح باحتجاب زرع الدبب في الامكان الرطبة .



راهوب الحفظة (١) (٢)

١١٢٧٣ - **رَاهُوبُ الدَّبَّحِ •** Ustilago crameri (S). Charbon du millet (F).
فطر مجهري طويل العمر يعيش في الابعوة واخليا ، يصيب الزهرة فيبسط انتفاخه واحول مادته ثم تحوّلها الى كتلة بوبية قطرها نحو ٤ م . لونها الى السمره || اخراره تختلط باختلاف العوامل الجوية لذلك تراوح من ١٠ الى ٧٥ ٪ || يكافح اما بتطليس البذار مدة خمس دقائق في ملوب الفرويل المحلول ٠,٢ ٪ حيث يمكن رفع الحبوب المطوية لانها لا تنقص في الماء او باستعمال املاح اللثيق او املاح النعاس واخصها كربونيد النعاس .

١١٢٧٤ - **رَاهُوبُ الذَّرَّةِ الصَّغَرَاءِ •** Ustilago maydis, U. mayz-zeae, U. zeae (S). Charbon du maïs (F). Common smut of corn (E). Maisbrand (D).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الذرة الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اصنافها الترابية والحولية من الجذور الى الازهار فيؤذيها ويشوهها او يملأها ويقتع عمدا . مظهره الخارجي كتل سود مميّنة تركب جميع اقسية الزهر حتى القراشات التي لا تقريبا . بوبيات طيلاله خفيفة التكاثر الرباعي العرسي || اخراره زغبية ، يكافح بظهور البذار وباحتجاب الزرع في المواقع الرطبة .

١١٢٧٥ - **رَاهُوبُ الذَّرَّةِ الصَّغَرَاءِ •** Ustilago maydis, U. mayz-zeae, U. zeae (S). Charbon du maïs (F). Common smut of corn (E). Maisbrand (D).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الذرة الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اصنافها الترابية والحولية من الجذور الى الازهار فيؤذيها ويشوهها او يملأها ويقتع عمدا . مظهره الخارجي كتل سود مختلفة الاشكال والاحجام ، تركب الاضواء بعد ان تحلّل لونها الى غيرات بوبية مشربة السواد يراوح قطرها من ٧ الى ١٠ ميكرون . يكافح باستعمال اللدورة الزراعية الثلاثية وذلك لان استعمال الفولتير يظهر البذار ولكنه لا يظهر التربة التي ياربى اليها والتي تحضنه من عام الى عامين .

١١٢٧٦ - **رَاهُوبُ الزَّرِّيْقِ •** Ustilago violanti (S). Charbon des lis (F).

فطر مجهري يصيب بعض الزئقيات اصحابها الاشب والخليل . يعيش داخل نسج الاسطاط ويتكاثر في اشب الازهار مختلفة على جذرات البوع ثم يحلّل التكاثر في اشب بوبية تنقلن عن غيرات هبابية لونها الى السمره الحظية . يكافح بتقلع وتلف الجصل البواب .

١١٢٧٧ - **رَاهُوبُ الشَّعِيرِ •** Ustilago nuda, U. segetum (S). Charbon nu de l'orge (F). Loose smut of barley (E). Gerstenflugbrand (D).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الشعير في اختلاف انواعه وضروبه . تركب السبال عند ازهارها فيملأ الزهر وكه بقضي على كامل البلة تبو بمجموعة متتامة منتصبة من الكتل البود . واذا تركب تبو الشراش سبب اصفراره وذوله بعد تحطيطه وترقيعه || يكافح بجمه

١١٢٦٥ - **رَاهِيَّةٌ** Veine de l'intérieur du fémur (F). Vein of the inner femur (E).
الراش والراشة : عرق باطن ذراع الدابة . وما راهاش . ج رواش .

١١٢٦٦ - **رَاهِمَةٌ** الصفرة الثابتة . وأرواحس هي الصغور المتراصة الثابتة .

١١٢٦٧ - **رَاهِمٌ** Durable
نمت وصفي للاحتجاب التي لا تبلى .

١١٢٦٨ - **رَاهُوبٌ •** Ustilago (S). Charbon (F). Smut (E).

جنس فطور مجهرية طفيلية من الراهوريات . تتميز بطيلالها الفردية وبزكاتها السريعة الانطلاق التي تنشأ وتكاثّر على الاضواء الثانية في النبات النضار || انواعه عديدة . اخرها ما يلي .

١١٢٦٩ - **رَاهُوبُ اسْوَدَ •** Ustilago nigra (S). Charbon nu noir de l'orge (F).

فطر مجهري يصيب سبائل الشعير ليطيلها . مظهره الخارجي كتل سود مميّنة تركب جميع اقسية الزهر حتى القراشات التي لا تقريبا . بوبيات طيلاله خفيفة التكاثر الرباعي العرسي || اخراره زغبية ، يكافح بظهور البذار وباحتجاب الزرع في المواقع الرطبة .

١١٢٧٠ - **رَاهُوبُ الثُّغُولِ •** Ustilago bromivora (S). Charbon des bromes (F).

فطر مجهري يصيب مختلف انواع الثغول في ازهارها ليطيلها . تركب الزهرة يقضي على المبيض والاشعية بعد ان يحلّلها الى بؤرة من البذار والبوغ كلوية الشكل سواد اللون تبو جامدة لزجة ثم تملّ تدريجياً وتطالير تملّ سها كالذاب || يكافح مكافئة راهوب الدبب اذا كانت زراعتة تدخل في نطاق النباتات المليفنة .

١١٢٧١ - **رَاهُوبُ الحَفْظَةِ •** Ustilago tritici (S). Charbon du blé (F). Loose smut of wheat (E). Welzenflugbrand (D).

فطر مجهري طفيل واسع الانتشار يصيب الحفظة وقد شجود عليها في جميع اقطار العالم ما عدا امريكا الجنوبية التي لا تزال حطبها سليمة || تركب سبائل الحفظة فيملأ بقى سها او شوبها ريشها . وقد تركب عقد السلاميات وانماذ المصفت || مظهره الخارجي يتور بوبية كثيفة التجميع خفافة البشرة الناعمة السريعة المطب . التي تنقلن عن غيرات كروية سود قطرها نحو ٥ ميكرون . يكافح باستعمال الفطائق المختلفة التالية :

١ - في الاساليب الزراعية القائمة على اجتناب للمواقع الميودة او على تغيير البذار او على جمع وسرق جميع السبائل المصابة .



راهوب الذرة الصفراء (١) (٢)



راهوب الذرة الصفراء (٣) (٤)



راهوب الشعير

رُاهُوبُ الشَّعِيرِ المُتَغَلَّف - رَاوَنْد

ريسي



راهوب الشعير المغلف (١)

الشيخ الشفاف. فيها عيوب الازمية والقبح وقد يصيب الحلايا || تتميز بصفتها البعاطي. دملاتها جلوية غير انقباضية. يوقتها لا تلياسة وكثرة البند || ظورها تسبب عدة وسموم، أشهرها البوروم القديمة والبرومية. أشهر اجناسها التكتفور والراوب والسجاد والشيزونه والعلطل والقمحية والغرزبة .

Abelle (F). Bee (E).

١١٧٨٤ - رَاهُوبِيَّة

في النحلة سميت بالرأبية لسكونها في طراها .

١١٧٨٥ - رَاوَنْد * وَوَكْنَد

Rheum (S). Rhubarbe (F). Rhubarb (E).

جنس نباتات طبية عشبية جلجورية ممرمة من فصيلة البطيانيات. أنواعه عديدة جميعها غنية الارواء الكبيرة القند، نصلها شارب الصفحة المشعجة. انزاعها متشكلي يرتكز على شارب قروية الانقباض. انزاعها متشوية. ثمارها عنية || افرق انواعها وافرها ما يج .

١١٧٨٦ - رَاوَلَّةُ الْجَنْتُوبِ

Rheum australe (S). Rhubarbe australe (F).

نوع من الراوند الشرقي يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه صتيرة القند قليلة الشكل تطلو من ١٠ الى ١٤ سم. انزاعه حر || جذوره طيبة شاملة الاستعمال .

١١٧٨٧ - رَاوَكْنَدُ حَمَلَايَا

Rheum emodi (S). Rhubarbe de l'Himalaya (F).

نوع من الراوند موطنه سفوح جبال حلايا . يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القند تطلو نحو ٦٠ سم. نصلها اشعر اللون ناعم البشرة . انزاعه وثماره حر .

١١٧٨٨ - رَاوَكْنَدُ ذَكَرٍ ، اُطْرُوَكْنَدِي

Rheum raphaniticum (S). Rhubarbe raphanitic, R. anglic, R. des moines (F). Raphanitic, Garden rhubarb, Pie rhubarb (E). Pontischer rhubarber, Garten rhubarber (D). Barbato raphanitic, Rapontico (I).

نوع من الراوند التريبي يعلو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه قليلة الشكل تطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وثمراتها كذلك . نصلها رغو النسيج متنازع التصنيع حايل المغار. غلظها مأكولة || انزاعه كثيرة البند لونها الى الياض الاسفر .

١١٧٨٩ - رَاوَكْنَدُ رَيْسِيَّيْ ، رَيْسِيَّاس ، رَيْسِيَّاس

Rheum ribes (S).

يَعْمِيصَا

Rhubarbe-groseille (F). Currant fruited rhubarb, Gooseberry currant (E). Persischer rhubarber (D). Rabarbaro acido, R. polposo (I).

نوع من الراوند ومونيات زراعي ممر موطن الشرق الاوسط يعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة الشكل تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٤٠ نصلها جلدي النسيج، لونه الى المفسرة الزرقاء، نصلها مأكولة وترب . ثماره مأكولة لكنها حارة الحامض ويستعمل منها وين نصل الارواق حامض اللون . كما يصنع من عصير ثماره بعض المربوبات الصحية المشهورة ويستخرج من ايضا بدلتشوير نبيذ كحولي يعرف بخر الريساس || غزوره عديدة تختلف باختلاف لون الثمار بين الاسود والاحمر والياض

ورقه فور ظهوره كما يحسن اجتناب الزرع في المواتع الربية .

١١٧٧٧ - رَاهُوبُ الشَّعِيرِ المُتَغَلَّف *

Ustilago hordei, U. jenseni (S). Charbon couvert de l'orge (F). Covered smut of barley (E). Gestenhardtbrand (D).

فطر مجهري مركب سنايل الشعير فيسبب مواد الحب الى كل من الراوب الاسود الفضي وذلك بعد ان يعلب الراشة ويحب الاشعة || يكاثف كثيرا من الراوب.

١١٧٧٨ - رَاهُوبُ الشُّوْقَانِ *

Ustilago avenae, Uredo segetum avenae, U. avenae foliicola (S). Charbon nu de l'avoine (F). Loose smut of oats (E). Haferflugbrand (D).

فطر مجهري مركب الشوقان فيسبب الحب وقد يقضي على كامل التشكيل || يهدو بنور كروية تتكون داخل الزهرة على الحب ثم تنم الزهرة مع اشدتها وتظهر شويوب سود موهوبة بدلا من شويوب الشوقان || يكاثف بتطویر البذار اما متفيرا بكميات النسل او نمتا محبوس القربى او باستحار غيرها من الفطائر الفعالة الحديثة .

١١٧٧٩ - رَاهُوبُ الشُّوْقَانِ المُتَغَلَّف *

Ustilago levis, U. avenae levis, U. kolleri (S). Charbon couvert de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوقان بعد تأثير زهره ليركب المبيض وينشأ عليه ثم يم كامل اخفية الزهرة || مظهره الخارجي كمثل من البثور البولية الزائفة المتكئة القليلة التصنيع والاختلال || يكاثف باجتناب زراعه في المواتع الربية ويتطویر البذار .

١١٧٨٠ - رَاهُوبُ الرِّفْقِيَّاتِ * ، رَاهُوبُ بَنَفْسِيَّيْ

Ustilago violacea (S). Charbon violacé (F).

فطر مجهري يصيب نحو ١٠٠ نوع من الرقنليات. مركب مآبر الزهر فيمنع تكوين جذبات الولع بعد ان يحول المآبر الى بنور بولية لونها الى البشبي الباق . اضراره زهيدة لا تنوب المتكاسة اما يحسن قطع وسرق الانزاع المصابة اجتنابا لتفشي الوسم .

١١٧٨١ - رَاهُوبُ المَصَانِ *

Ustilago sacchari, U. scitamina (S). Charbon des cannes à sucre (F).

فطر مجهري مركب نواحي المصان على اختلاف انواعه من التريبي الى قصب السكر || مظهره الخارجي تأثير الى النور يقيه شويوب عام فذليل القلب الثاني مع اوراقه الحامية ثم ظهور خثائل سود تملو الاثرار وتصل على وسمه || يكاثف بتلاوع وسرق اللقنات المصابة .

١١٧٨٢ - رَاهُوبُ التَّجِيرِ * ، رَاهُوبُ حَبِيطِيَّيْ

Ustilago striformis, U. linearis, Tillandsia striformis (S). Charbon linéaire (F).

فطر مجهري طويل الحاية يمشي نحو خمس سنوات في التربة وعلى النبات المتشار . مركب التجير على اختلاف انواعه . مظهره الخارجي خثائل غليظة فضية اللون تركب نصل الارواق بمزائة البروق تخفي على اللسع دون الكثرة وتركب سيقان المشاكل الزهرية فتصلها .

١١٧٨٣ - رَاهُوبِيَّات *

Ustilaginaceae (S). Ustilaginacées (F). Ustilaginaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية طفيلية من رتبة البعاطيات غزيرة



راهوب الشوقان



راهوب الشوقان المغلف



راهوب الرقنليات



راهوب المصان



راهوب التجير



راوند

Genetta (S). Genetta (F).
Genet, Genett (E).

جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزباديات . انولاه ستة موطنها افريقية واروپية والشرق الاوسط . اجسامها مستطيلة وذانها ابيضاً . قوائمها قصيرة خامية الاصابع ، طويلة الاظافر المنقطة . اذنانها متوسطة القد . اذنيها مشدرة ، تخرج ظهورها عابق اللون وسيد الخط || تألف الجبال والبراري . تسرح في الليل . ترتاد اجوف الاشجار وشفاها . قوتها القوارض والحشرات والطيور والحشرات . الاثني تنصع جرواً واحداً في الحول ترصده نحو ثلاثة اشهر || اما انولاه الستة فهي ما يتبع .

Genetta pralina (S). رُبّاح اُرُقَط
Genetta pralina (F).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى الترسغال ، طولهُ نحو ٨٥ سم . صفة قصير الحلب . ثوبه عابق اللون ككتيف التنصير ، خطوط ذنبه غامقة مستمرة .

Genetta rubiginosa (S). رُبّاح اُمْدَا
Genetta rubiginosa (F).

نوع من الرباح ، موطنه المخرية الجنوبية . طولهُ نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة الشهباء ، تنميره امبر . خطوط ذنبه متفرقة .

Genetta senegalensis (S). رُبّاح السنغال ، جَرَنْطِط
Genetta du Sénégal (F).
Pale genet (E).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى القطب . طولهُ نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة الباهتة ، تنميره لا يقاسي الشكل ، ريشته ريشة اللد لا غلاسية .

Genetta felina (S). رُبّاح الفايون ، زُوَيْكَا
Genetta felina (F).

نوع من الرباح ، موطنه الفايون والكنغو وشفاها النيل الازرق . وهو قريب اليه من الزباد ، طولهُ نحو ٨٧ سم . ثوبه الى الصبغة الرملية . تنميره يبعي الشكل .

Genetta tigrina (S). رُبّاح دَنْكَلَة * ، كَدَيْس الزباد
Genetta tigrina, Genetta de Dongola (F).

نوع من الرباح ، موطنه افريقية الشرقية اعصمها دَنْكَلَة والذوبة . طولهُ نحو ٩٥ سم . ثوبه الى الصبغة الخفيفة . تنميره جروي اللون . خطوط ذنبه مستمرة .

Genetta vulgaris (S). رُبّاح شاك *
Genetta commune (F). Common genet (E).

نوع من الرباح ، موطنه الشرق الاوسط واروپية . طولهُ نحو ٩٥ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٤٥ اما ارتفاعه فهو ١٥ سم . ثوبه الى الصبغة الغبراء ، تنميره الى اجنوة السرد . خطوط ذنبه متوسطة العرض || يعيش في الجبال في الية وقرب الماء . يسرح في الليل يتسلق الاشجار ويمر في الماء ويسبح . يسكن ويقيم العلم ، يصطاد الجرازين والفئار .

١١٣٠٧ - رُبّاح هو القردوح السي ، اطلبه .

١١٣٠٨ - رُبّاح اَبُو الهول هو القردوح الشحوت ، اطلبه .

١١٣٠٩ - رُبّاح زَيْتُونِي هو قردوح الحيفة ، اطلبه .

والاسمر والمليح . || والرياس يطلى الحيات ويقوي الاعضاء والخصم ويزيل شعث الرقبة الجفنة والفتقان والبلبيسر .

Rheum compactum (S). رَاوَلْد كَتِيْف
Rhubarbe compacte (F).

نوع من الراوند . هذه الصين . يطول نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد مفرصة . نصلها متجعج الصفحة ، جامد النسيج السيك ، مسن الحافة ، جميل الخضار الزاهي . اثماره يبيض || جلوده طيبة لكنّها اقل جودة ونحوها من جلود الراوند الجنوبي .

Rheum palmatum (S). رَاوَلْد كَتِي
Rhubarbe palmée (F).

نوع من الراوند الشرقي . يطول من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد مسطيلة المتق ، كثيفة التنصل للمصص المباني الخضار . ثمراته الزهرية وضلوح اوراقه ومروقيها الى الجفوة || اثماره الى البياض الاخضر .

Rheum officinale (S). رَاوَلْد مَعْرُونِي ، رَاوَلْد صَبِي
Rhubarb (E). Echter risbarbar (D). Rabarbar, Rubarbar (I).

نوع من الراوند وهو نبات طبي وزراعي زَيْتُونِي . يطول من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد خمسية التضاميص نصلها جميل الخضار الباهت مسن الحافة . اثماره كثيفة التجميع خضراء اللون || جلوده طيبة عديدة المنافع . تدخل في عدة مستحضرات وتساعد الهضم وتدر الصفراء . وهو مقو للمعدة ، منه الهضم ، يقضي على البوليسر والاسك . ويستعمل في حوضه المعدة واضطرابات الهضم لا سيما عند الاطفال .

Débourau (F). Clansser (E). رَاوَرُو
آلة تستعمل في ترويق الحمور البيضاء وفي تنظيف المساقل من الزبل والمادن من القواب .

١١٢٩٤ - رَاَلِي ، حَكَاوِي ، مَعْرُو ، جَمَكِي
Caillé, Coagulé (F).

لبن راب لمشر ولا يزال ذلك اسمه حتى يتزع منه زبد .

Eteandard (F). رَاَكِيَة
Flag (E). بنة في الازمة شلت من ريفاتها لمعت واصبحت كالراية .

Compote, Jus (F). رُوْبِي
Sewwed fruit, Juices (E). صارة الفار المغلية المكثفة .

Patron رَاَبِي الْعَمَل ١١٢٩٧

Usure (F). رَاَبِي ١١٢٩٨
الربا الاقراض بفائدة يتجاوز عيقها مرق الفائدة الفائضة او عيق الفائدة الحاصل به عادة بين المتقارفين .

Stratocumulus, Cumulostratus (S). رَاَبِي ١١٢٩٩

ضرب من النجوم وهو محاب متواصل الطبقات والارصفة ايضاً اللون او اريد .



رباح دَنْكَلَة



رباح شائع



رُباعِيَّة

11324 - رُباعِيَّة الأَزْهَارِ Quadriflora (F).

11325 - رُباعِيَّة الأَسَدِيَّة Tétrandrous (F).

11326 - رُباعِيَّة الأَضْلاع Quadrilobé (F).

11327 - رُباعِيَّة الأَوْدَاق Quadrifoliol (F).

11328 - رُباعِيَّة الأَيْدِي Quadrumanous (F).

11329 - رُباعِيَّة البُزُور Tétrasperme (F).

11330 - رُباعِيَّة البَعِثَرَة Tétraploid (F).

11331 - رُباعِيَّة الفُصُوص Quadrilobata (E).

11332 - رُباعِيَّة الفُصُوص Quadrilobata (E).

11333 - رُباعِيَّة القَوَاسِم Quadrupède (F).

11334 - رُباعِيَّة المَرَاثِف Tétrastome (F).

11335 - رُباعِيَّة المُكَكَلِّي Tétravalent (F).

11336 - رُباعِيَّة الرُزْقات Quadrifoliol (F).

11337 - رُباعِيَّاتُ الحَيَاثِيم Tétrabranchiaux (F).

11338 - رُباعِيَّة الأَجْزَاح Quadrifide (F).

11339 - رُباعِيَّة الأَجْشَحَة Tétrapère (F).

11340 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11341 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11342 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11343 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11344 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11345 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11346 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11347 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11348 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11349 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11350 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11351 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11352 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11353 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11354 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11355 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).

11356 - رُباعِيَّة الأَوْرَجَل Tétrapode (F).



رَبَاعِيَّة

الظهر، جالس البطن. يطول من ٣٥ إلى ٥٠ سم. ثوبها جميل الألوان. ظهورها الى الزرقاء السمجنونية. جانبهاها ويطبقها الى الصفرة الغنية. رأسها وأعناقها مرقوشة باللحمي. فنتها يتجق بالاسود. وأنها مستدل الجرم. قصير الخطم يملو حول ذبهي اللون فوق كل عين. شقلها مستدل الانفرج. فكها متعادلان. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الأعل، ورباعيتها في الفك الأسفل. صيهاا كيرتات مستديرات، جاسطن. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة الشكل. زعنفتها الأليية حلالية التقدير || لحها فاخر الصنف، مغروب فيه.

١١٣٤٦ - رُبَان ٥
Naucratas (S).
Pilot (F). Pilot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكانات الزعانف وفضيلة الاستديرات. أنواعها المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة. أجسامها اطيلاجية الشكل. سفها صغير لقة. زعانفها الظهرية مستطيلة تتقدمها أربعة مناسخ متعقبة لحة. زعانفها الشرجية فارقة || أشهر أنواعها الربان للبلد.

١١٣٤٧ - رُبَان مَبْدُول ٥
Naucratas ductor (S). Pilota commun, Fanfre (F). Common Pilot-fish (E).

سمكة من الربان. أصلهاا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تتميز بمواكبها البياض والسفن في رحلاتها عبر البحر ذهابا وأيابا من بلاد الى بلاد || جسمها اطيلاجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم. رأسها مستدل الجسم، شبه غريبي الشكل. قصير الخطم. مستدير الظهر || ثوبها الى السمرة الفضية واللحية المخرج يبق عند الخطم وبيغ عند البطن ويمتدقه ثلاثة احزمة متفارقة المرض شديدة السرة || لحهاا كامن الصنف، مأكول قل من يرغب فيه.

١١٣٤٨ - رُبَالِد ٥
Archives (F).
Archives, Record office (E).

هي المخطوطات الكتابية من وثائق وغيرها، وأحدثها ربيدة.

١١٣٤٩ - رُبَيْد ٥
Caroubier (F). Carob-tree (E).

هي شجرة الخروب الجوي أو شجرة الخروب المأكولة الثار.

١١٣٥٠ - رُبَيْح ٥
Profit (F).

هو ما تحقق من مكسب. والربح يقسم الى قسمين :

ربح اجالي أو قائم وربح صاف .
١١٣٥٢ - رُبَيْح فَالْت ٥
Lucrum cessans (F).

هو الربح المتوقف حصوله فيا أو نفذ التصالح الترامه لان

التفاحة في تقرير التوضيخ من القصر في حساب الحسنة

القضية التي وقت الربح العمل الذي فات من عدم تنفيذ

الالتزام .

١١٣٥٣ - رُبَيْد ٥
Buphthalmum (S).

Buphthalmum, Œil de boeuf (F).

الاسم العلمي من اليونانية بمعنى عين الثور || جنس

نباتات عشبية مسمرة من فصيلة المركبات . أنواعها عديدة

بعضها زراعي تربى، اوراته متعاقبة. اثمارا وريسية

ملقحة البيلات، حشرقية الغلاف القرصي . يزوره متوتة

بأكلي مذهب || أشهر أنواعها ما يقع .

رباعيات الخياشيم والكل والاخينات، كثيرة الوبس
الفكية التي تحيط بالثم || اصداهاا شبه قرصية الشكل
مجموعة عديدة الجيوب أو الحبر || أشهر مرتباتها أو فصائلها
المستويات والنويات والمقرنات .

١١٣٣٨ - رُبَاعِيَّة ٥
Mitoyenne (F). Midway (E).

من الانسان القاطنة الاسلمية وهي السن التي بين الثانية

والثاب .

١١٣٣٩ - رُبَاعِيَّة الأجزاء ٥
Tétramères (F).

رُبَيْة حشرات من نمديات الاجنحة .

١١٣٤٠ - رُبَاعِيَّة القُرُوع ٥
Tétractinellidés (F).

رُبَيْة من الاسفنج السواني .

١١٣٤١ - رُبَاعِيَّة ٥، كُرُوب علكي ٥
Brassica oleracea napus (S). Rutabaga, Navet de

Suède, Turnep (F). Swedish turnip (E).

نبات عشبي زراعي علفي محول من فصيلة الصليبيات . جته

بيضي الشكل كبير الحجم اسمر القشار اصفر القباب

الجلد || يزرع كالقث يحول في جميع الاثربة لكنه يرغب

في الملقح التي تكثر فيها الرطوبة الجزية ويقل فيها الاشعاع

الشمسي || يستعمل كمكف البقر والحيل والخنازير والتمس .

١١٣٤٢ - رُبَالِي ٥
Plotax (F).

هو الربي من الاسماك البحرية الصغيرة القدة .

١١٣٤٣ - رُبَالَك ٥
Chrysophrys (S).

Daurado, Daurat (F). Gilt-head (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات . الوانه عديدة

منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . اجسامها اطيلاجية

الشكل ، طولها من ٤٠ الى ٥٠ سم . طولها صغيرة ،

زعانفها الظهرية مستطيلة شالكة . اثارهاا مطبوعة اللون

تنبه الغريزي. لحها لذيذة اللحم .

١١٣٤٤ - رُبَالَك بَرْدَك ٥، بَرْدَك ٥، أبو بصل ٥
Chrysophrys berda (S).

Daurado rose (F). Pink dorado (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات ورُبَيْة شالكانات

الزعانف. أصلهاا بعض اقالي البحر الابيض المتوسط والحيث

الاطلسي . تتميز من اسماك المباح والمثاقف . مسرحها

الافراط القرية الثور || جسمها اطيلاجي الشكل ، طولا

يصلح من ٤٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الوردي اللحي

المالح يملو شمشة زرقاء في الظهر وقبة فضية المالح في

البطن . زعانفها حنطية اللون باستثناء الصدريه لانها شفافة .

رأسها مستدل الجرم، قصير الخطم . شقلها مستدل

الانفرج . اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الأعل،

ورباعيتها في الفك الأسفل . صيهاا كيرتات ، مستديرات ،

جاسطن . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها

الأليية فارقة || لحها ابيض اللون ، فاخر الصنف .

١١٣٤٥ - رُبَالَك مَبْدُول ٥
Chrysophrys surata (S). Daurado vulgaire,

D. biluneé (F). Common Dorado, Gilt-poll,

Gilt-head, Chad (E).

نوع من الربال . أصلهاا منظم اقالي البحر الابيض

المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتميز من اسماك

المباح والمثاقف || جسمها شبه اطيلاجي الشكل ، مقوس



رَبَالَك



رَبَالَك بَرْدَك



رَبَالَك مَبْدُول



رَبَالَك مَبْدُول

الْفُتَّاحُ



رَبْدٌ صَفْصَالِي الْوَرَقِ

الصفة المفضة. ازهارها بنفسجية. ثمارها صغيرة كروية سوداء، غالباً لا تتوكل || رغب في الازفة المنبقة الانسلاج والطرطوبه. مطوم اليانحين على الربرق ينشر طولاً لينة. ثمارها لليلة المطم.

١١٣٦١ - رُبْدِيَّاتٌ ٥

Hypodermataceae
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الزبقيات. تتميز ببنيتها وبنيتها الفائرة في النسيج النباتي المنساعة. نكتاتها شفعية، رباعية أو خماسية. نكتاتها عديدة، عجيبة أو صفيحة، فراء الرووس || انبساطها عديدة منها واحد يوم الاقتصاد الزراعي ينحى للرب.

١١٣٦٢ - رَبْعِيٌّ

ربض الكيش عن القتم: ترك غرابها عن حياء.

١١٣٦٣ - رَبْعِيٌّ

Intestine (F). Bowels (E).

الربض هي الامعاء.

١١٣٦٤ - رَبْعِيٌّ

Fondation (F).

Foundation, Ground-work (E).

الربض: أساس البناء وما على الأرض من التربة.

١١٣٦٥ - رَبْعِيٌّ

Attelage (F). Harnessing (E).

قرون أو شد الحواب بالمجرور.

١١٣٦٦ - رَبْعِيٌّ

Ligature (F).

هو تكتيت أعضاء النبات أو بعضها برباط.

١١٣٦٧ - رَبْعِيٌّ الْكُرْمَةِ

Accolage ou acollement de la vigne (F). Nailing up or joining of vine (E).

هو رفع وربط مروع الكرمة بالمساكن.

١١٣٦٨ - رَبْعِيٌّ الشَّرَاحِ

Liaison de contentieux

١١٣٦٩ - رَبْعِيٌّ

الربيع نجم غير صغير من كوكبة الثنتين مركزه في وسط المواءمة.

١١٣٧٠ - رَبْعِيٌّ

Eumétrique (F). Eumetrical (E).

نمت تعريض يطلق في تسميت الفواجن على كل حيوان مربوع الجذع متوسط القف والوزن.

١١٣٧١ - رَبْعِيٌّ

Irrigation (F).

الربيع والري والاسقاء واحد.

١١٣٧٢ - رَبْعِيٌّ ٥، قَسْمِيْلِيَّةٌ ٥

Phacidiella

جنس فطور مجهرية من الرغيات. يتميز ببنيتها المنبقة المستندرة، ببنية البيض الشكل الحويدي الخلية وبنكاته البنفسجية الزرقاء الاصل || اشهر انواعه ربيع الفتاح.

١١٣٧٣ - رَبْعِيٌّ الْفُتَّاحُ ٥، قَسْمِيْلِيَّةٌ ديسكولور ٥

Phacidiella discolor, Phacidium discolor, Phacidopycnis furfuracea, P. nolorum, Discula pyri, Fackelia conspicua (S).

فطر مجهرى يركب الفتاح والاباص والسفرييل في انبساطها وثمارها نيجوما || يصيب انبساط واثان الاجبار الضعيفة فيقرح ثقلوها ويصلها. مظهرها الخارجى يقع فضية، منخفضة الوصل الاصل، مرتفعة الحافة الحطية المتعددة. وهو على الكبار عند تمام ادراكها وفي انهاء حزنها ينسج



ربيع الفتاح

١١٣٥٤ - رَبْعِيٌّ صَفْصَالِي الْوَرَقِ ٥

Bupthalamum salicifolium (S). Bupthalamie à feuilles de saule, Cèl de bœuf à feuilles de saule (F).

نوع من الربد يملو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. ساقه نحيلة اوراقه سنانية طولها نحو ١٠ سم. عرضها ٢، نصلها جلد النسيج الرقيق، ازغب البشرة على صفحية. ازهاره كبيرة القذرية الارثكاز.

١١٣٥٥ - رَبْعِيٌّ ظَرْفِيٌّ ٥

Bupthalamum speciosum, Tékéla speciosa (S). Bupthalamie élégant, Cèl de bœuf élégant, Tékéla élégant (F).

نوع من الربد يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، اوراقه قلبية الشكل منبقة، نصلها حالى بشرة الصفة العليا، ازغب السفلى. ازهاره كبيرة القذ قملها نحو ٨ سم.

١١٣٥٦ - رَبْعِيٌّ ظَرْفِيٌّ ٥

Bupthalamum speciosissimum, Tékéla speciosissima (S). Bupthalamie superbe, Cèl de bœuf superbe, Tékéla superbe (F).

نوع من الربد، يملو نحو ٥٠ سم. ساقه غليظة قوية. اوراقه حاشية كبيرة القذ مميكة النصل الجلدي الازغب. ازهاره كبيرة، قملها نحو ٦ سم.

١١٣٥٧ - رَبْعِيٌّ ثَقِيٌّ ٥، وَرْدُ الْحِمَارِ

Bupthalamum graveolens (S). Bupthalamie fétide, Cèl de bœuf fétide (F). Oxyeye (E). Rindsuge (D). Bufalmo, Occhio di bus (I).

نوع من الربد، يملو نحو ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة المنح مميكة النصل الباهت الخضار. ازهاره شاذفة البتلات، لونها الى الصفرة الباقية. يكثر في الاراضي البور للتصحة الانساج.

١١٣٥٨ - رَبْعِيٌّ دُورٌ ٥

Rhipidura (S).

Rhipidura (F).

طائر من الجواثم سليات المتأخره وفصيلة المهابيات. موطنه ماليزيه والجزر المجاورة. يالفت النباتات وصفات مجاري الماء. قوته الاذباب والحوام || جسمه صغير القذ، مستطيل الذنب المروحي الشكل. ثوبه الى الصفحة الطحلاء. عجماره وزوره وانيقه الى القنبرة، ويملو في بحيره من قاعده الشفق الى النطق، جده حايقة السيرة كما في الرأس الى يدين عنه في الاشجار الزرقية. عنه كالنكوب جيد الحيك بالخشيش الناعم. الاتى تحضن بتناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحمل. القرغيم ينسج نحو ١٢ بيضا.

١١٣٥٩ - رَبْعِيٌّ

Troupeau de ruminants sauvages (F). Drove of savage ruminants (E).

سجامة البقر الوحشي وسائر الحيوانات الحائرة.

١١٣٦٠ - رَبْعِيٌّ، أَفْأَبِيَّةٌ ٥، مَعْدَةُ أَسْوَدٌ ٥، حَسْبُ اللَّذْبِ

Solanum nigrum (S).
Melongène noire, Morelle noire, Amourette, Tue-chien (F). Black nightshade, Hound's-berry (E). Schwarzer nachtschatten (D). Morella, Solano nero, Solatro ortense (I).

جنية رية مدمرة من الفصيلة الباذنجانية. يالها غليظة، فراءها، شاككة. اوراقها كبيرة القذ منبقة، نصلها مكيح



رل



رية النخيل



رية خيبة



رية منقطة



رييدان مرعوي

مستديرة خفية خلية حنطة اللون تركب البشرة المغطاة والمطوية فتجبر في اغلال أخلايا والساد || يكلف بقلع ورق الاضمان والانتاد المصابة ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٣٧٤ - **زيتونات** *Phacidiaea*
عزاة طلور مجهرية من فصيلة الحشريات زيتونية الزيتيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقصصها اللاتناسي الذي يتفصل من النخبة او يلتصم بها . مدينتها مستديرة منبسطة . يوفها يضي الشكل خفاف وسيد الخلية . نكتاتها بنفسجية الزام الاصل || لشجر اجناسها التي تمرى الثبات ثلاثة : الربيع والخريف والشتاء .

١١٣٧٥ - **زيتونة** *Empria (F), Expropration (E)*

١١٣٧٦ - **زيتوني ، زيتاني** *Plotax*
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات صغيرة القد مغطاة مستديرة زاهية الالوان البديدة ، تكثر في البحار الحسنة .

١١٣٧٧ - **زيتون** *Randia (S), قرعسي العنكب*
Randia (F), Ink plant, Ink-berry (E), Randia (D), Randia (I)

جس بنات وهجرات برية وزيتونية من فصيلة الغويات . انواعها عديدة جميعها فراء السوك ، بعضها شاك . اوراقها متقابلة او رمية ثلاثية ، احليجية الشكل ، مآوية التصل ، مسقة . ازهارها فردية التجميع ابوية الاوتكار . ثمارها منية منية ثنائية التعلق . ترب في الاراضي الرطبة . تكثر في المنافع ويعل صفات الاجر . يستخرج من ثمارها صباغ ازرق قاصر الصنف .

١١٣٧٨ - **زيتون** *الشجرة العظيمة الواسعة*

١١٣٧٩ - **زيتوني**
الشاة التي وضعت سخيًا . وتيل الرب من المزر والرفوت من الفسك وجسمها رباب .

١١٣٨٠ - **زيتونة النخيل** *Phyllognatus stenus (S)*
غضاض من فصيلة الجليات ، طولها نحو ٢٠ م . ومرضها ١٢ ، رأسها مريض مملع بقرن مدب . لونها كستنائي موالج له السرة . غمدًا مستدير الطول . تعيش بين النخيل وترب في المناطق الرملية . ريقها تركب جلور لككية ويطلعها حتى مسك التربة .

١١٣٨١ - **زيتونة خبيثة** *Pentodon idiota (S)*

Pentodon nigaud (F), Pentodon idiota (E)
حشرة غاشلة مدمت من فصيلة الجليات وريقة ممدعات الاجنحة . موطنها الشرق الاوسط . تألف المزارع والبساتين والكروم والرواقين . خنافسها تعيش عل اوراق النبات . يرقاتها تركب الجلور التاركبة والشمرة || جسمها يضي الشكل ، متوسط القد ، يطول من ١٨ الى ٢٠ م .

ويمرض من ١٢ الى ١٣ م . ثوبا الى السواد اللامع يعلو ظل دقيق . رأسها مستدك الجسم ، قصير الخط ، ضلع الكنكيز اللربين . زبابها صميران ، صمغيا الاطراف . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهورها مستدك الاحدياب مشطوم الطرف لا يلمس كامل البطن . غمدًا متناحبا الحشيز الخفيف . اصنافها خاسية المنقل || جلها ثلاث اطول . تخرج الحشرة الجملانة من مكنتها في نيسان وتبقى

حتى اواخر ايلول . تسرح من الشروق الى نحو الساعة العاشرة ومن العصر الى الدخلة . تساد بد ظهورها بثلاثة اشهر . تمتع المكن في التربة عل نحو ٦ سم . || البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري الذي يحصل بعد التقف ينمو ٢٦ شهرًا تطول نحو ٣٠ م . ثوبا الى البياض الابهر . جسمها مستطال الجسم ، مقوس الشكل ، مستضخم الرأس الاسود ، ضلع التفاسير ، سداسي الرواجب المسر || طور الاكمال الذي يستمر نحو حشرة اسابيع يقضي في التربة عل نحو ٢٠ سم . داخل جراب غش من القراب والغاب .

١١٣٨٢ - **زيتونة منقطة** *Pentodon punctatus (S), Pentodon punctatus (F)*

غضاض من فصيلة الجليات . جسمها يطول نحو ٢٢ م . ويمرض نحو ١٤ م . رأسها مستطال الشكل . ظهورها محبوس . ثوبا الى السرة اسود الموالج . غمدًا مجذعان يحميط دقيقة تليو كالنقط المتناحبة || ريقها كبيرة القد ، مقوسة الشكل ، غبراء اللون ، تعيش نحو ثلاث سنوات ، تركب جلور النبات من اي جنس ونوع .

١١٣٨٣ - **زيتونة** *Dividenda (F), Dividend (E)*
هي الحصة من الربح الصحيح وله تكون حقيقية او صورية .

١١٣٨٤ - **زيتونة** *الريد ، تمر لصد ثم نضج بالماء*

١١٣٨٥ - **زيتون ، زيتون الطير ، رجل الطير ، رجل العصفور** *Ornithopus (S), Ornithopus, Pied d'oiseau (F), Bird's-foot (E), Vogelfuss (D), Ornithopa (I)*
جنس نباتات عشبية برية وطلنية من فصيلة القنطاريات القراشية . انواعها ستة ترب في الازرة الرملية والقليلة الانساج . اوراقها متناحبة مركبة وريقة ، وريقها احليجية صغيرة . ازهارها محورية ، زمامية ، صوبانية التجميع . يضاء اللون او وردية . ثمارها قرون دقيقة اسطوانية الشكل متناوطة الطول حوية المقعدة تشبه رجل الطير . يزودها صغيرة شبه كروية . اشهر انواعها ما يلي .

١١٣٨٦ - **زيتون القرم** *Ornithopus perpusillus (S), Ornithopus nain (F)*

نوع من الرييدان البري التجمي الصغري القد . ازهاره بيض . يقال انه من النباتات الطبية يدر البول .

١١٣٨٧ - **زيتون مرعوي**

Ornithopus sativus (S), Ornithopus cultivé, Seradella, Serradelle (F), Seradilla, Common bird's-foot (E), Seradella, Kleimer vogelfuss (D), Ornithopa sativa, Seradilla (I)

نوع من الرييدان الكلائي ، زهر وودي اللون ، يزرع في الحقول والمراعي . حلقه جيد الصنف رغب فيه الماشية .

١١٣٨٨ - **زيتون** *Printemps (F), Spring (E)*

فصل من فصل السنة بين الشتاء والصيف . مدته ثلاثة اشهر من ٢١ آذار الى ٢٠ حزيران . يمتدنى زهر نزل الشمس من برج الحمل . وفيه يستوي الليل والنهار ويتبدل الزمان ويطلب الهواء ويب القمم وتكون الشروق وتسل الاودية وتلق العين ويورق الشجر ويتلاذ الزهر في الربو والحقل || يخدم ان لا تبلغ الشمس آخر الاجزاء حيث يقلل الصيف .

١١٣٨٩ - رَيْكِي (E). Vernal, Spring-like (F). Vernal (F).
نمت ترميزي يطلق حل ما يخص بالربيع .

١١٣٩٠ - رَيْكِي (S). Primulaceae (S).
Primulacées (F). Primulacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القلمة ، تشل
عدة أجناس وأنواع ، أشهرها زهرة الربيع وبخود مريم
وسحيفة الخلة .

١١٣٩١ - رَيْكِي (E). Autosome (F). Autosome (E).
اسم يطلق حل مجموعة الشعب المجاورة في كل حيوية
حيوانية .

١١٣٩٢ - رَيْكِي (E). Sanglier (F). Wild boar (E).
الرت هو الخنزير الوحشي . الذكور ينحى الشعر والاني
الورث . أنواعه عديدة موطنها العالم القديم ، أمورها وأشهرها
الاربية التالية :

١١٣٩٣ - رَيْكِي (S). * Sus cristatus (S).
Sanglier à crinière (F).
نوع من الخنزير الوحشي يتميز بطوله الطويلة الحلب
الاسود الممتدة من اللذن الى الكفل . ذنبه قليل الحلب .
أذنه مرطاب الصفعة الاخضراء ، عليه النخالية . جثته
متوسطة القد طولا نحو ١٥٠ سم . طولها ٩٠ || موطنه
الهند حتى ارتفاع ٤٥٠٠ م . ويرتبط وبشر الجوز
الاجري || اناته تقص من ٤ الى ٦ خناثيس مرتين
في العام .

١١٣٩٤ - رَيْكِي (S). * Sus salvanius (S).
Sanglier nain (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، موطنه مغرب جبالا . جثته
صغيرة القد طولا نحو ٦٠ سم . طولها ٣٠ بذيله ٣ سم .
يشي طعاما صغيرة براوح حلدها من ٥ الى ٢٠ . يألف
الاجراج والادغال والمراعي الطبيعية الرطبة الاضباب .
اناته تقص مرة واحدة في العام من ٦ الى ٨ خناثيس .

١١٣٩٥ - رَيْكِي (S). * Sus scrofa (S).
Sanglier commun (F). Common wild boar (E).
نوع من الخنزير الوحشي ، شروبه عديدة موطنها آسيا
والشرق الاوسط واروبة وجزر المتوسط وافريقية الشمالية
حتى مصر واليونان || جسمه غليظ الجف ، طوله نحو
٢٠٠ سم . طول ١٠٠ ذنبه ٢٥ . اما وزنه فيراوح بين
١٥٠ و ٢٠٠ كيلو . قوامه قصيرة قوية ، رأسه شامخ
فنتليته مسطولة . اذنه منتصبة ، عليه كثيف التجميع
يفلظ ويطلق عند شبح الظهور || يشي جهامات غطفة
المدد . يألف النباتات والحقول المزروعة . يسرح في الليل .
اناته تقص من ٦ الى ١٠ خناثيس مرتين في السنة .

١١٣٩٦ - رَيْكِي (S). * Sus vittatus (S).
Sanglier rayé (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، شروبه عديدة ، موطنها جبال
وسوريا وبورنيو والهند الصينية . يتميز بخبره المنح
وبذفرته السوداء التي تمتد من الفلقتين الى اوائل الظهر .
جثته متوسطة القد طولها نحو ١٢٠ سم . وطولها ٦٠ || يألف
الاجراج والمناقع والاضباب الكثيفة للفضة . اناته تقص
من ٦ الى ٨ خناثيس .

١١٣٩٧ - رَيْكِي (F). Phytoclasie (F).
الرتابة مبحث من مجموعة مباحث علم النبات يخص
بال تصنيف والتسمية .

١١٣٩٨ - رَيْكِي (F). Lithologie (F).
العالم يتكون الجحارة .

١١٣٩٩ - رَيْكِي (E). Lithologie (F). Lithologie (E).
علم الجحارة وتركيبها .

١١٤٠٠ - رَيْكِي (E). * Ratanhia (F).
Ratanhia, Krameria (S). Ratanhia, Krameria (F).
جلس نباتات جنسية طيبة معمرة من المستنقعات وخصبة
النباتات . انواعها المعروفة ٢٠ أصلها البلاد الامريكية
تكثر في بوليفيا والبيرو . سيقانها فروع . اوراقها سنائية
متعاقبة ، تصالفا صغيرة القد جلابة . ازهارها فردية التجميع
محورية الاركانز . يتكرر فيها اللون الاحمر . ثمارها كروية
ناشفة تلتف بعض البسات المستدرة || جلجورها لينة
التركيب لينة الانتشابة والامتداد ، تنجها جلجوري اللون
في بعض المواد المقوية لشفة الجزلة التبع || الشهر
أنواعها ما يتبع .

١١٤٠١ - رَيْكِي (F). Ratanhia indica (S).
Kramérie rouge, K. de Savatille (F).

١١٤٠٢ - رَيْكِي (F). Ratanhia secundiflora (S).
Kramérie grise, K. du Mexique (F).

١١٤٠٣ - رَيْكِي (F). Ratanhia officinal (S).
Kramérie officinale, K. triandra (F).

١١٤٠٤ - رَيْكِي (F). * Ordre (F).
هي في تصنيف الاحياء جبال الفصائل لمتشابهة .

١١٤٠٥ - رَيْكِي (E). Marche de l'escalier (F).
الرتبة : الواحدة من درجات الدراج .

١١٤٠٦ - رَيْكِي (F). * Rotama (S). Rétama (F).
جلس نباتات معمرة برية وزينية من فصيلة القزليات .
انواعه قليلة منها الشرق الاوسط . جميعها نباتات تملو
من الممرين الى القلعة لشار . سيقانها فروع اسلية الشكل .
فروعها المزروعة مرابطة اما الفلقة فلذات اوراق صغيرة بسيطة
مسطولة التصل الحسوي او غشية . ازهارها متعدي
التجميع ، محوري الاركانز . ازهارها صغيرة القد ، كثيرة
العدد ، يضاء اللون || تنورها يستمر من شباط الى
اواخر نيسان .

١١٤٠٧ - رَيْكِي (E). * Gommage (F). Tapping (E).
استئصال او امتصاص راتنج الحسوريات وذلك بحر
سوق هذه الاجزاء والقطاط ما يحل منها من الراتنج .

١١٤٠٨ - رَيْكِي (F). * Cul-de-sac (F).
Blind alley (E).
كل منجم لا يخرج فيه وكل طريق غير ناظ .

١١٤٠٩ - رَيْكِي (E). * Sous-ordre (F).
Sub-ordre (E).
الرتبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الرتبة وقبل الفصيلة .



رت اعفر



رت مبلول



رت

المعدية الى التي الاسمر . وراجها البنية طول دقيقة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوما يتقشر ضمن
صلبة متينة الحيك تنسجها الشرة على سطح النمل بعد
ان تطويه وتبكيه بخيط حريرية متصالية .

١١٤١٧ - رتيكة Ranger (F). To range (E).

رثت اللباجة فيها : حته . ورتك البيض في الحانسة :
رتبه .

١١٤١٨ - رتيكة الرجمة : يراض في طرف انت الفرس.

Rhytisma

١١٤١٩ - رتيكة

جنس فطور مجهرية من الرينيات وفصيلة الفشاريات
يتميز بوزيمة تنشأ وتنمو في نصل الورقة المنحار تحت
الباسة الادمية . تحضن في داخلها الاصلان التي تضم البرغ.
فيها كيت لينة ، بسيط التركيب ، غيظي الشكل ،
شثان || انواحه قليلة اشهرها رتمة القيقب ورتمة
المنصفان .

١١٤٢٠ - رتيكة المنصفان

Rhytisma salicinum, Melasma salicina (S). Maladie
des croutes noires du saule (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق المنصفان فيشوهها || مظهره
الخارجي يقع بجبهة نائقة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها
ال اسمر ، تركب نصل الازراق على صفاته العليا
تستند النصل وتحميه وتشوهه || اغزاره طفيفة لا
تستويب للمكانفة .

١١٤٢١ - رتيكة القيقب

Rhytisma acerinum, Melasma acerina (S). Maladie
des croutes noires de l'érable (F). lar spot of maple
(E). Pechfleckkrankheit des ahorns (D).

فطر مجهرى يصيب القيقب في اوراقه فيضها . مظهره
الخارجي يقع لا قياسية للشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة .
قطرها يراوح من ٧ الى ١٨ سم . تركب نصل الازراق
على صفاتها العليا تمتد تحوز قبيل صفراء اللون ثم سمراء
يعطيها اطار مذهب || اغزاره محدودة الاثنى لا تستلزم
المكانفة . حل ان استمال سائل بورود مرة واحدة عند
الانواع يفيد . ومنهم من استعمل الاسمدة الازوتية لانها
تقوي مناعة الازراق وتضع الرتمة .

١١٤٢٢ - رتيكة Archrite (F). Arthritis (E).

هي التهاب المفصل . اطبه .

Trechidas (S).

١١٤٢٣ - رتيكيات

Tréhidés (F). Trechidas (E).

فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غدييات الاجنسة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الانعام
المارة والمتعددة الحرارة || جميعها صغيرة القدر قلي تتجاوز
طول الواحدة منها ١٠ سم . رؤوسها كروية الشكل ،
صغيرة العين النائرة ، مستطيلة الزباني المشعرات النصل .
كرواسها قليلة الشكل . امامها لاسقة ثنائية الاعاديد
المقاطبة المتوازية . اطواها مخيطة الالوان || تسرح في
النهار وتبيت في الليل . تسمى بسرعة ورشاة وتعتبر مخنة ||
قوتها ما تهرس لها من الحشرات الدنيا واليدان || اشهر
اجناسها الرتيكة والسيرة والبنوس .

١١٤٢٤ - رتيكة ، صغو سيلندريوم

Septocylindrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرططيات . مشجبه داخلي

Tarentula (S).

١١٤١٠ - رتيكاد

Tarentule (F). Tarantula (E).

جنس حشرات من المناكب ينتمي الى فصيلة الحنكريات .
انواحه قليلة جميعها متوسطة القد ، قانصة ، مقفرة وبامة .

١١٤١١ - رتيكاد الأنيبة

Araignée des caves (F).

دورية من المناكب تدعى شبيعة ، اطبا .

١١٤١٢ - رتيكيات Araneida (S). Aranéides (F).

Arañeids, Spiders (E). Spinnen (D).

هي المناكب رتبة من الحنكريات مدينة الفسائل والانجاس
والانواع .

Lygodium (S).

١١٤١٣ - رتيكة

Lygodier, Lygodion (F). Climbing fern, Snake's
tongue fern (E). Schlingfarn, Kletterfarn (D).
Ligodia (I).

جنس نباتات مرصعية من فصيلة الرتيكيات . انواحه
المعروفة ١٥ جميعها نباتات حارشة ملتفة ممرمة . يقال
لها لا تغل من القنولة الخلية وقد تنقع الصدر والامعاء .

Schizaeaca (S).

١١٤١٤ - رتيكيات

Schizaeacés (F). Schizaeacae (E).

فصيلة من الرعس اجناسها نحو ١٦ . انواحه كثيرة
العدد جميعها رية ، منبتها المناطق الحارة الرطبة . اشهر
اجناسها الرتيكة .

Lais (F). Wild sow (E).

١١٤١٥ - رت

انثى الرت اي الخنزير البري .

١١٤١٦ - رتاعة ملوثة ، لايكة اوزك

الاشجار الثميرة

Lyonetia clerckella (S).

Minuse des feuilles des arbres fruitiers (F).
Apple leaf miner (E). Obstbaum-Miniermotte,
Schlangenniniermotte (D).

حشرة من فصيلة القويديات ورتبة سرشقيات الاجنسة .
اصطلاحا تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا واثريقية الشالية .
تألف الممرات التي يكثر فيها التفاح والكرز والخوخ .
فراشتها جارية قوتها حريق الانظار . سرشتها لامة قوتها
غللا نصل الازراق || جسمها نحيل قثيف ، يطول
نحو ٤ سم . سبطها من ٨ الى ١٠ سم . رأسها معتدل الحجم ،
شبه مكور الشكل . عيناه صغيرتان ، بارزتان . زباناها
عيطان . ملساها قصيرة ، مرشها معتدل الطول . جوشها
الذهب اللون كالطين . رواشتها صغيرة ، الاسمانيا الى
الغليظ الى الذهبية المخطة . اما الاحداث فالل الشبهة
الزاهرة || لها ثلاثة اصيل في الحول . تسرح في النهار
وتسكن في الليل . تبارش الاثنى متج المكن بعد الكوم
يبروين وتقسر عليه نحو خمسة ايام وقرن مباحدا في
الصفحات السفلى من نصل الازراق . يتغف المكن بعد
صحه بنحو ٨ ايام من اسارع دقيقة تلم النصل في تسجيده
الهادي تحت البشرة وتغدد فيه انفاقا مستطيلة ، متعرجة
تتم فيها حتى نهاية الطور الاسروي اي نحو ٢٥ يوما ||
الشرة عند بلوغها الاذراك تمام تطول نحو ١٠ سم . جسمها
وشهي الشكل ، تنبي اللون ، اسمر الرأس . منها ورواجها



رتيكة



رتيكة



رت



رتاعة ملوثة



رتة المنصفان



رتة القيقب



رَيْشَةُ الْجُدُور



رَيْشَةُ الْقَلَنْ



رجانة



رجرج

١١٤٣٥ - رُجُوجُ *
Gnetum (S). Gnetum (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الغليقيات. منها
البلاد الحارة. أنوعها نحو ١٥ منها الجنباث للمادة المارضة
ومنها الشجيرات القزواء البقاء. أورتها مسقة، متعالة،
يضيء للتصلب المسح. ازهرارها سنبل التجميع ابطي الارتكاز
اشهر أنوعه ثلاثة التالية.

١١٤٣٦ - رُجُوجُ جَمَاوُ
Gnetum gnetum (S).
Gnète de Java (F).
نوع من الرجرج الزراعي. أورتها النامية مأكولة وبلورة
كله.

١١٤٣٧ - رُجُوجُ طَبِي
Gnetum urens (S).
Gnète rafraichissante (F).
نوع من الرجرج الزراعي. بلورة مأكولة. يستخرج
من سقته عصارة لزجة مرطبة عديدة المنافع الطبية.

١١٤٣٨ - رُجُوجُ لَسِيْمِي
Gnetum fusciculare (S).
Gnète textile (F).
نوع من الرجرج الزراعي الصناعي. يستخلص من ثمره
اللياف صناعية نسيجية.

١١٤٣٩ - رُجْمَكَة
Réclapés, Reçu (F).
Receipt, Received (E).
عمر أو وصل تدون فيه بالتفصيل وأيسر البضائع التي
صار استلامها.

١١٤٤٠ - رُجْمِي
Rétroactif (F). Retroactive (E).
جار معلوله على الماضي.

١١٤٤١ - رُجْمِيَة
Rétroactivité (F).
Retroactivity (E).
هي رجسية الار اي نقل اثر القانون أو الحكم أو اي
عمل قانوني الى الماضي.

١١٤٤٢ - رُجْمِيَة الْقَرْط
Rétroactivité de la condition (F). Retroactivity of
condition (E).
هي نقل اثر الشرط الى يوم البقاء القانوني فلذا حل الشرط
المؤقت حدث أثره منذ يوم تحرير العقد وإذا كان الشرط
فائضا اعتبر العقد كأن لم يكن قط.

١١٤٤٣ - رُجْمَل
Pied (F). Foot (E).
هي لقائمة وتسمى الحافر في الخيل والخف في الايل والظلف
في البقر والفسان.

١١٤٤٤ - رُجْمَل *
Multitude, Troupe (F).
Multitude, Troop (E).
سرب أو جماعة الجراد وما اشبه ج أربال.

١١٤٤٥ - رُجْمَل الْأَرْتَب
هو نقل البر، اطلبه.

١١٤٤٦ - رُجْمَل الْأَسَد
هو اللذان الحلي، اطلبه.

١١٤٤٧ - رُجْمَل الْإَوْدَة
راج أئنة.

١١٤٤٨ - رُجْمَل الْجَبَابُر الْيُسْرِي
Rigel Elgebar (F). Rigel (E).
نجم نير من كوكبة الجبار اي الجزء. مركزه على القدم
اليسرى. ويسمى أيضاً ريش الجوزاء اليسرى. يحد من
الارض نحو ٦١٠ سنة ضوئية.

الانتشاب، جربه الكندية مهمة الفوض، شديدة
الانصر. كائناته قلادية، مؤثرة، ضمية التجميع. أنوعه
نحو ٢٥ جميعها ملا ملاذية اعرضها ريشة الجذور وريشة
القطن.

١١٤٤٩ - رُيْشَةُ الْجُدُور *
Septocylindrium radicolium (S).

نار مجهرى يركب جلود الاجنار المظلمة القلوية منها
الفتح والكرز والبيون نيفنها ويسرع في ينسها.

١١٤٥٠ - رُيْشَةُ الْقَطْن *
Septocylindrium areol (S).

نار مجهرى يركب اوراق القطن دون أن يؤذيها || مظهره
الخارجي بلطح مستطيلة طويلا نحو ١٠ م. لعنر التصل
على صفحت العليا. تبهر فضاء اللين ثم تتحول الى السمرة
ويبقى حل حالها ولونها حتى آخر جهدها.

١١٤٥١ - رُيْشَانِيَّة *
Séismologie, Sismologie (F). Seismology (E).

الرجاجة أو السيسمولوجية علم يبحث في الزلازل والاضرابات
الارضية.

١١٤٥٢ - رُيْجَاع
Retour (F). Return (E).
وقت الرجوع أو زين الرجاء هو زين رجوع العبد بعد
نظامها.

١١٤٥٣ - رُيْجَالَة
Stabulation (F). Sealing (E).
الرجانة والرفين هي تربية الدواجن في المرائب والاصطبلات
والرجح لا في المراعي.

١١٤٥٤ - رُيْجَان *
Madrépore (F). Madrepore (E).
نوع من الرجانة، مهد عمار البلاد الحارة والاسوائية
ركبته مسقة نسيجية التركيب كثيرة الفروع والشعاب
والانفاق.

١١٤٥٥ - رُيْجَانِيَّة *
Madréporaires (F).
نوع من المرجانيات البحرية وهي حيوانات بحرية من صف
المجموعات تتميز بالفراناثا المصية المتراكمة وبعناقتها
الكبيرة المشعبة التي تصنع كالحشاف.

١١٤٥٦ - رُيْجَانِي *
Madréporique (F).
Madreporic (E).

لعت تمريلي يطلق على الحشاف والفسفور البحرية
النشرة والمشعبة كدائع الرجان.

١١٤٥٧ - رُيْجَانِيَّة *
Rajania (F).

جنس نباتات جنبية عارفة من فصيلة البهتودويات.
انواعها المعروفة ستة اصلاها امريكية الوسطى والانتليل.
جلورها عسقلية. سوقها لينة ملتفة. اوراقها مسقة
متعالة قليلة التصل. ازهارها ثنائية المسكن. ازهارها
سنبل التجميع، ابطي الارتكاز. ثمارها تغلف بعض
الزور اللينة القلوية الجناح. عسقلها ديماسية لايبة
مأكولة تستعمل استعمال الانعام اي البطاطا الصيفية.

١١٤٥٨ - رُيْجَسَة
رجب النخلة: بين نحتها دكاناً تمتد عليه لصفها. ووضع
الشوك حوطا لئلا يصل اليها احد.

١١٤٦٠ - رجل القط المزمري

Antennaria plantaginifolia (S). Pied-de-chat à feuilles de plantain (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ٤٠ سم. وراكبها قليلة، مستطيلة، كسبة التواقي. أوراقها غنية، نصلها لساني الشكل خلي البشرة ثلاث الفلوع. رؤسها الزهرية بيض وغضر || أزهارها يستمر من نيسان إلى تموز.

١١٤٦١ - رجل البقرة اطبل كالية المروج.

١١٤٦٢ - رجل المعزى * حشيشة المعزى

Aegopodium podagraria (S). Aegopode podagraria, Egopode aux gousseux, Herbe aux gousseux, H. de St Gérard, Pied de chèvre (F). Goose-weed, Bishop's weed (E). Gemeiner giersch, Podagrakaut (D). Egopodo podagraria (I).

نبات حشبي يري طبي معمر من فصيلة الخيميات ينبت في الأماكن الظليلة، مثانفه الطيبة حديدية ومهبة || ساقه غليظة جوفاء تنمو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. أوراقها كبيرة، مركبة، سداسية، وسيقته ثلاثية التجميع، يهسية الشكل، مسنة النصل الباهت الخضار.

١١٤٦٣ - رجل قنطورس

نجم نير من كوكبة قنطورس.

١١٤٦٤ - رجلته هي البقلة الحسقاء، اطبلها.

١١٤٦٥ - رجلكتات

Portulacaceae (S).

Portulacacées (F). *Portulacaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القنات، اجناسها وانواعها عديدة. اشهر نباتاتها الرجلية.

١١٤٦٦ - رجمن

Stabular (F). To stall (E).

رجل ورجن الداية : حبسها في رابضها على اللطف.

١١٤٦٧ - رجمن هي الرجلية، راجسها.

١١٤٦٨ - رججوع هو الايلولة، اطبلها.

١١٤٦٩ - رججولة

Coralliophila (S).

Coralliophila (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الرخويات. انواعها المعروفة قليلة البدن نحو سم. اعطتها بحار البلاد الحارة اغصنها البحر الاخر. تميش لاصقة بدائع المرجان والبرجان || اصداها صغيرة حوشة شبه يضيئة الشكل مقطوعة القاعدة تبدو كالجلب الومعة. اعقابها عازنة ومثللة.

١١٤٧٠ - رججوليات *

Coralliophilidae (S). *Coralliophilidae* (F).

فصيلة من الرخويات مديات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها يعيش على بدائع البرجان والمرجان في بحار المناطق الحارة || اصداها خشن، حوشة، متباينة الاشكال للاخفاسية، قليلة الغلبة، قصيرة الحرازة الصغيرة || اعرف اجناسها واشهرها الرجولة والسحيفة.

١١٤٤٩ - رجل الجبار البني

نجم نير من كوكبة الجبار مركزه على القدم البني. ويصير ايضاً رجل الجوزاء البني.

١١٤٥٠ - رجل الحشام هو لكجان الصلبي، اطبله.

١١٤٥١ - رجل النبة

Arctopus (S). *Oursin*, Pied d'ours (F). Bears paw (E). Bérn-fuss (D). Piè d'orso (I).

نبات حشبي يري من الخيميات. ساقه متضبة تنتهي بضمه من الاوراق الكبيرة اللد يطلوا الازهار الصيواني التجميع. أوراقه متفكة كبيرة، نصلها طلي المسام، غاوش الضمفة للهارية المنددة. ازهاره بيض.

١١٤٥٢ - رجل الذئب هي الخفرة، اطبلها.

١١٤٥٣ - رجل الصنقاء راجع غريق نجس.

١١٤٥٤ - رجل القرب المداد

هو الحضان المداد، اطبله.

١١٤٥٥ - رجل القبرة اطبل مائق الحدائق.

١١٤٥٦ - رجل القط، رجل المرأة أشتيكورية

Antennaria (S). Antennaire, Pied-de-chat, Haplidule (F). Cat's-foot, Cat's-ear (E). Echterkatzentpötchen, Chatza-dépli (D). Piede di gatto, Zamba di gatto (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الابنوبية الزهر. انواعها مدينة معظمها يري ويهضها زراعي كزينة. سيقها زبداء، أوراقها متعاقبة، نصلها خلي الضمفة السفلى. ازهارها ابنوبية لا لسين ط. قوحياتها صفراء. رؤسها بلون القناب || اعرف انواعها واشهرها الاربية الثانية.

١١٤٥٧ - رجل القط الأمريكي

Antennaria microphylla (S). Pied-de-chat microphyll (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ٢٠ سم. وراكبها قصيرة كاسية التواقي، ساقها كثيفة الزغب اللبد، أوراقها السفلى غنية التجميع خلية النصل. رؤسها الزهرية كثيرة العدد، نوربة التجميع، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران إلى آب.

١١٤٥٨ - رجل القط الجبتي

Antennaria alpina (S). Pied-de-chat alpestre (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ١٠ سم. وراكبها دقيقة كاسية. أوراقها السفلى اعليجية سلمية تنطو نحو ٣ سم. نصلها خلي البشرة. رؤسها الزهرية الى الخضار الاصح. قناباتها مدينة الحافة المسنة || ازهارها يستمر من نيسان إلى آب.

١١٤٥٩ - رجل القط الشائع *

Antennaria dioica (S). Pied-de-chat commun (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو من ١٠ إلى ٤٠ سم. صفروها مدينة. ساقها متضبة كثيفة الزغب اللثني. وراكبها مستطيلة كاسية. أوراقها صغيرة تنطو نحو ٢ سم. نصلها خلي البشرة. رؤسها الزهرية يضاء اللون. او ددية او قلبية || ازهارها يستمر من نيسان إلى حزيران.



رجل القط الشائع



رجل المعزى

١١٤٧٦ - رُحَاقِي، مَعْتَرِي

Mellifera, Nectarifera (F). Melliferous (E).
هو كل نبات من أي فصيلة كان سوت أزهاره رحيقاً
تجبره النحل || ونباتات الرحاقة عديدة الخلقيا في
(نبات رحيق).

١١٤٧٧ - مَترِيسَة

Métrite (F). Matricis (E).

التهاب الرحم عقب الولادة .

١١٤٧٨ - سَاحِلَة

Séchoir à fruits (F).

Drying-room (E).

هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار ، راجع سبرين .

١١٤٧٩ - رَحِيكَة

الارض الواسعة السريعة النبات . ج رحاب .



رجوم ثنائي الشريط

١١٤٨٠ - رَحَة

Elope (S). Elope (F).

جنس سيات بحفية سامة من فصيلة الرحيات . أنواعها
المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الاستوائية
والحارة من افريقية الى الهند وأمريكا وأستراليا || أجسامها
شبه اسطوانية الشكل ، مسطولة ، قليلة الفصانة ، لطيفة
من ١٠٠ الى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة ، بيضبة الشوكة .
الأوليا ملوكة ، مظلمة مطوق . أطوارها سوداء اللون تحويها
خطوط بيضاء || ادرت أنواعها الرسة المرجانية Elope
corallinus (S). ثوبها الى الحرة المرجانية السهام
المواج يعلوها أطواق سود .

١١٤٨١ - رَحَل

Scoléne (F).

لعت تعريفي يطلق على الجهات غير المستقرة في مكان
مين واحد .

١١٤٨٢ - رَحَل ، قَتَب

Bât (F). Pack-saddle (E).

مركب الدواب يختص عادة باليابل والبنال والحير .

١١٤٨٤ - رَحِم

Matrice, Uterus (F).

Womb, Uterus (E).

جزء من أعضاء التناسل في الحيوانات العليا يمتد عضو
الحمل يحصل بالهليل والفرج بواسطة قناة الرحم . وهو
مضلي التركيب مبطن بشفا . غاملي وقليلة الاحتياط
بالرياضة المنصبة التي تتحول الى جنين .

١١٤٨٥ - رَحْمِيَّات

Hystericaceae (S).

Hystericacées (F). Hystericaceae (E).

فصيلة البطور الرحية . أجسامها وأوتانها كثيرة العدد
مظلمة من البطور المهيمة .

١١٤٨٦ - رَحَاشَة

Protopterus (S).

Protoptera (F). Protopterus (E).

سكة نهوية وحيدة الجنس والنوع من رنودجات التنفس
وفصيلة رحناشيات . موطنها مستنقعات افريقية الاستوائية ||
جسمها مستطيل الخيطيط يطول نحو ٧٥ سم . رأسها شبه
خروطي الشكل . حيناها صيرتات ماصتان . زعنفتها
الظفرية مستطيلة ، قاطبة ، تتصل بالشرعية عند طرف
الذيل . زعانفها الصدرية والحشوية عسبة ، مسطيلة ،
عذبة الشكل . ثوبها الى الشبهة السراء يطولها توشم

١١٤٧١ - رُحَيَّيَّات

Argiopidae (S). Argiopidae (F). Argiopidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . أجسامها وأوتانها
كبيرة البدن الذي يجاوز الألف || أطوارها البلاد الحارة
والمعتدة الحرارة من المالن القديم والجديد || أجسامها
متباينة القده منها الصغيرة والوسلى والكبيرة جميعها ثنائية
الروايا سداسية للشان بمجزة الشياش بقفات حادة
محبة نحو الداخل || أولياها مختلفة الألوان والزراركن .
جميعها ناصبة كبيرة الشح . مكادها كروية كثار الرمان ،
علوية القوة ، تحبها بين الحجارة وعلى النباتات العذلة
اغصانها الشائكة .

١١٤٧٢ - رُحَيَّج ، خَلْف

Regain (F).

Second crop, New lease (E).

هو الكلاء الناتج من الحقة الثانية . وهو الأوراق الناتجة
عن القروع كما في التبغ .

١١٤٧٣ - رُحَيَّكَة ، رُكْبَد ، حُشِيْق

Pédicelle (F). Pedicel (E).

هو الزئاد الصغير حامل الثمرة . وهو أيضاً الملاقق القرمي
المركب كما في التبغ .

١١٤٧٤ - رُحَيَّوْم

Rhagium (S).

Rhagie (F). Rhagium (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنحة وفصيلة القرنيات .
أنواعها المعروفة حة || أجسامها مسطولة القده ، أطوارها
تواضع من ٦٦ الى ٦٦ سم . أولياها مختلفة الألوان يسلطها
خل دقيق نصير تكثر فيه الشبهة || تسرح في التبار .
تظهر في أوائل الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . مرتها
الانذار الخرجية || يرقاتها صغيرة ، غليظة ، سمراء اللون ،
تدبش على الجلود اليابسة ان قائمة أو مضطوية وانصها
جلود التنوب والشرين والسرور والسنديان ولكتستان .

١١٤٧٥ - رُحَيَّوْم تَتَلَّى التَّجْدِيع

Rhagium bifasciatum (S). Rhagie bifascié (F).

Rhagium bifasciatum (E).

حشرة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات الاجنحة .
تأكل الاجراع والنباتات . غناصها تقتل من جميع اجزاء
النبات . يرقاتها غاشية تركب جلود الانجار اليابسة
ويجودها واضعها || جسمها مستطيل القده يطول من ١٧
الى ٢١ سم . ثوبها الى السمرة الخطيئة تشبه سمرة في الرأس
والكوكيل وأعلى الظهران . غناصها مجتاحت بطن من البتج
الحير . رأسها شبه مربع الجرم . حيناها كبريتان .
زبانها كبريان ، مسطوقان الى الرواء . ظهرها مستطير
المؤخر اللانف . غناصها كفيقتا الحمل القصير . اصانها
رباعية البعل الظاهرة || جبلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة
المجاعة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف .
تسرح في التبار . تساد يمد ظهورها بثلاثة اصابع . تمتع
المكن في صدوع الجلود وشقوقها || البقرة عنه بلوطها
الادراك تمام تطول نحو ٢٢ سم . جسمها حدي التركيب ،
مستطيل الجرم ، مدام الروايوب ، حشلي اللون ، اشقر
المواج ، اسمر الرأس ، يمتد الحبل الدقيق || طور
الاكامل الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما يتغذى في طور
الترية ضمن صلبة من المواد النباتية والمضوية المعجنة
بالريال .



رشة



رحاشة

Rhinanthus major (S). * - رَحْمَاءٌ كَبِيرٌ
Rhinante à grandes fleurs (F). Rattle (E). Grasse klapper (D). Corona di re (I).

نوع من الرخاخ السريع النمو يكثر بين الزروع فيضحيها وبقياسها اللذء. أزهار كبيرة القند صفراء اللون || أبادته واجبة ثم يستعمل أحد العوالب الحمرية .

Hippoglossus (S). * - رَحْمَاشٌ
Flétan (F). Halibut (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من المسالوات وقصيلة المفلطحات. أنواعه المعروفة عديدة أصنافها بحار البلاد الباردة والمتتلة الحرارة || جميعها كبيرة القند ، أحليجية الشكل ، دقيقة الصف الصغير . زعانفها الظهرية والبطنية قاسية تمتد من المتي إلى الذنب . زعانفها الشرجية مقطوعة الأطراف || أكرف أنواعه وأشهرها الرخاشة الميولولة .

* - رَحْمَاشَةٌ مَبْدُولَةٌ
Hippoglossus vulgaris (S). Flétan commun, Flétan halibut (F). Common Halibut (E).

سمكة من الرخاش . طولها نحو ٢٠٠ سم. نوبها إلى السمرة الحنفية يميلها موج أصفر تشوبه بعض الخضرة || أصنافها بحار البلاد الباردة والمتسرفة نحو المعتدلة . وجودها في البحر المتوسط محصور ببعض المناطق أخصها الممتدة من جبل طارق إلى بحار اليونان والبحر الأسود || لحمها لذيق الطعم مرغوب فيه .

١١٥٠٠ - رَحْمَاءٌ وَ حَرْمَرٌ (F). Marbré (F). Marbré (E).
جسم حجري صلب تعريفه الكيماوي مركب كربونات الكالسيوم المتبلور. الزائنه عديدة يكثر فيها الأبيض الحليبي. وهو من الأحجار التي استخدمها الإنسان في البناء والتمتعت منذ أقدم العصور .

١١٥٠١ - رَحْمَاشِي
الرخاشي والرخاشة ضرب من الخلفة غبراء الخضرة لها زهرة بيضاء نفية ولها عرق أبيض تحفره الحمر بوجواهر والويش كله يأكل ذلك العرق خللاته وطيبه (أبو حنيفة) || وقيل لبث تجمده السامة ، وهي بقلة غبراء تصرب إلى البيضاء وهي حلوقة لها أصل أبيض كأنه المنقر ، إذا انتزع صلب لبناً (السان) .

١١٥٠٢ - رَحْمَاشَةٌ وَ حَرْمَاشَةٌ (F). Marbré (F). Marbré (E).

١١٥٠٣ - رَحْمَاشَةٌ نَقْلِيَّةٌ (F). Passavant (F). Perme (E).
جواز ينقل الكحول أو بعض المستحضرات والفلات .

١١٥٠٤ - رَحْمَاشِي
Mou (F). Soft (E).
نمت وصفي . الفلين خشب ريش لين .

١١٥٠٥ - رَحْمَاشِي وَ رَحْمَاشِي (F). Mou (F). Soft (E).

١١٥٠٦ - رَحْمَاشِي وَ رَحْمَاشِي (F). Agnelle (F). Ewe lamb (E).
الأنثى من ولد الفان . ج. رخاش .

١١٥٠٧ - رَحْمَاشِي وَ رَحْمَاشِي (F). Agnelle (F). Ewe lamb (E).
Haliaetus leucocephalus (S). Pygargus leucocephalus (E). Alge à tête blanche (F). White headed eagle (E).
مطائر من الشياطين ينتمي إلى عمارة العنكبان وقصيلة الصقريات.

اسد || تعيش في الاممال حتى الفصل ثم تنقش في السلي وتنحكن إلى أن تمتد المياه فحضر المستنقح || لحمها متوسط الصف ، مأكول .

١١٤٨٧ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Protopteridae, Lapidotrenidae (S). Lapidotrenidae (F). Protopteridae, Lapidotrenidae (E).

نصيلة اسماك نهرية من مزدوجيات التنفس . أجنتها وأزواجها المعروفة قليلة العدد . جميعها من اسماك منقح المناطق الاستوائية والحارة || أكرف أجنتها وأشهرها الرخاشة والذفاعة .

١١٤٨٨ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Cebestan (F). Capetan (E).
آلة لرفع الاثقال العظيمة .

١١٤٨٩ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Meule (F). Millstone (E).
حجر الطمن . ج. أرءاء ورشي وأرءاءة . وهي من الوسائل البدائية للمستخدمة لطحن الحبوب أو جرشها . تتركب الحجر من صخرين مستديرين يرفقان بشيء الرشي ينبت في وسط الحجر الأسفل منها وقد يطور حول الحجر المألوي .

١١٤٩١ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Elapidae (S). Elapidae (F). Elapidae (E).

نصيلة حيات عجيبة من امبيات الاغناد . أنواعها المعروفة نحو ٧٠ تنضم إلى بضعة أجناس . أصنافها البلاد الاستوائية والحارة . أجنتها سعليلة قريبة الشبه بالاحتاش . رؤوسها صغيرة شبه بيضة العوزن . الزوايا ملوقة يكثر فيها التطويق وبعضها يحمل من خيلين إلى خمسة خطوط قاسية || جميع أنواعها سامة وبعضها شديد الأذى || أشهر أجناسها وأسمها الرسة والبناندا .

١١٤٩٢ - رَحْمَاشِيَّاتٌ وَ رَحْمَاشِيَّاتٌ
Nectar
غصارة سكرية لزنية مختلفة التركيب تفرزها غدد خاصة في الزهر ليحبسها النحل .

١١٤٩٣ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Aepyornis (S). Rock (F).
مطائر صيبي عظم القند كان في جزائر الهند وانقرض وقد مر على بعض رؤته في منفسكر . يقال أن طول الرفة يراوح من ٣٠ إلى ٤٢ سم .

١١٤٩٤ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Vent faible (F). Weak wind (E).
الريح اللينة التي تتفادح الصاليج .

١١٤٩٥ - رَحْمَاشِيَّاتٌ
Rhinanthus (S). Rhinanthus (F).
جنس نباتات شبيهة برية هشة من نصيلة الخنازيريات . أنواعه قليلة . سوقها منتصبية لينة . أزوارها كمللة حاشنة متعاقلة . نصلها سناني القصعة ، سنن الحافة . أزهارها فردية ، أبيلية الاكروكاز ، صفراء اللون غالباً .

١١٤٩٦ - رَحْمَاشِيَّاتٌ وَ رَحْمَاشِيَّاتٌ
Rhinanthus crista-galli (S). Rhinante crête-de-coq, Cocrête, Croquette (F). Cock's-comb, Rattle grass, Yellow rattle (E). Klapper, Gelberkräuterkraut (D). Cauterelle, Pidocchio dei prati (I).

نوع من الرخاخ الوردي يكثر بين الزروع فيضحي من النباتات الضارة لانه يسبق الزروع في ازدهار الناصر اللذائفة . يقضى عليه باستعمال اسد الموشايث .



رشي



رخاخ عرف الديك



رخاخ كبير



رخاشة مبدولة



رخاء

موطنه العالم بحرب جميع القارات، يكثر في أمريكا. طوله نحو ٨٠ سم. والآنق ٩٠ سم. ثوبه إلى البصرة للسفاد. بطنه مشط بالابيض. رأسه وعنقه وذنبه بيض. منقاره وخطابه صفر. قوته الاسماك والطيور والقرواح والامام كالفم والماعز وما اشبه.

١١٥٠٨ - رَحْمَة * شَوْحَة
Pernopterus (S). Alimoche, Vautour d'Egypte, Poule des Pharaons (F). Egyptian vulture, Pharaoh's hen (E). طائر من الكرواس ووحيد الجنبس والنوع ينتمي إلى فصيلة السرايات وهو اسفر النور جنة واربعها انتشاراً. طوله نحو ٦٠ سم. وبسطه ١٦٠. ثوبه غير البلق. رأسه ازغب الريش الاصفر يبدو كالاسلم. عنقه اخضر اصفر. منشره اسمر. ريشه وردي اللون تلوها ماجة وبدا. قوادب سفلة سود، مناكبه وصامية، اناجره طعل. عينه قزوينية. موطنه بلاد حوض البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج الفارسي. نظامه الحياتي جماعي. اسرابه كثيرة العدد تعيش قرب المدن والساكن وتراقب القوئل قوته الحيف والقبالة. يصيد القرواح والصنابير عندما يسهه الجرح. ينش منه في صعدو الصخور الثابتة. اناده ينفث ٣ نفاث تحضنها نحو ٣٠ بيضاً. اما كنية الفرخة فأم جمران رداء واما عصبية واما قيس واما كير.

١١٥٠٩ - رَحْوَنَات، لَيْسَات

Malacostracae, Mollusques (F). Malacoza (E). شعبة حيوانات تشمل ذوات الصلغتين والملميات والراسيات.

١١٥١٠ - رَحْمِيلَان * Phalaris cristatella (S). Sturkey huppé (F). Parakeet auklet (E).

طائر ووحيد الجنبس والنوع من جماعة البهائم فضيلة الطيريات. اصطناعه المناطق القطبية الاسيوية والامريكية. ينزح في الشتاء نحو الصين وكوريا وكندا. ملحمه الحياتي جماعي. جماعته اسراب لا يوصى لها عدد. قوته الحشرات والحمام والفاصيص والاسماك الصغيرة والقشريات. جسمه صغير القد يطول نحو ٢٥ سم. منقاره صغير الحجم، احمر اللون، شبه غرغولي الشكل. حلقه عينه عسلية اللون. جناحه قصيران، ذلقتان، لاسفان. ذنبه غرغولي الشكل، شديد القصير. ريشه ديقان. ثوبه العلوي إلى البصرة المرحقة بالارادون تلوها زركسة يضاء. ثوبه السفلي إلى الريدة الزرقاء المالح. ذوده ابيض. رأسه متعرج بقترعة صغيرة من الريش اللينق الناعم. كسلة عينه يضاء اللون تمتد حتى العنق. ريشه إلى البصرة الزرقاء. الآنق ابيض قدماً من الذكر وتحتل بنفس القوط. موطنه كل نقرة على حضور المهادج او فيها. الآنق تحضن بتناوبة الذكر بيضة واحدة اصفر من بيضة المهادج. القرحم يمتد نحو اربعة اسابيع. الصنير يمدوم على سطح الميم به التفت باسبور.

١١٥١١ - رَحْمِيم * Ptilonorynchus violaceus (S). Ptilonorynchus satiné (F). Ptilonorynchus violaceus (E).

طائر من فصيلة الرخميمات. موطنه استراليا. يألف الادغال والارواح الكثيفة الانجبار. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٣٠ سم. ثوب الذكر إلى الزرقاء السوداء المسطاه المالح. جناحه وذنبه إلى السواد القمعي. حلقه عينه زرقاء اما اطرافها فاحمر. منقاره ازرق اللون، اصفر الملقط. رجلاه إلى الحمرة. ظهر الاثنى اخضر اللون.

جناحاه وذنباه إلى البصرة العافية. يعلو إلى الخضار الاصفر يعلو توشم حلالي الشكل عند اطراف الريش. قوته الكبار لا يتركها أبداً كانت. واعصها اللين والدرق والمشمش والوز والبرقال ثم البزور وبيض الحشرات. يذنب منه في الانجبار الداسية ويقت بالقرب منه، على يده بيضة اثمار، مسرماً يزيته بمختلف الاشياء اللينة تنوسطه مدة من القصبان المحبوبة تملأها الاثنى كلما دعت الحاجة الطبيعية إلى الكرم. اما الاشياء اللينة التي يزغرف بها المسرح فهي الريش الجميلة والاصناف اللينة وبيض الحصى وكسر الزجاج ... الآنق تحضن من مرن إلى ثلاث مرات في الحبل وتضع في كل مرة من بيشتين إلى ثلاث بيضات ترعها بتناوبة الذكر نحو ١٥ بيضاً.

١١٥١٢ - رَحْمِيمَة * Ptilonorynchidae (S). Ptilonorynchidae (E).

فصيلة طير من الجولام. اجتماعها والاعمال المعروفة قليلة العدد. اصطناعها بعض مناطق استراليا وفيهذه الجبهة اجسامها متوسطة القد، جملة الالوان المتطاحلة. تتميز بالمسارح المزينة والمزخرفة التي تعيها بالقرب من عشائها. اهرق انواعها واشهرها الرخم.

١١٥١٤ - رَدَة * Remendant (F). Produce (E).

الرذ هو الانتاج أو الرعي. يقال شجرة كثيرة الرذ.

١١٥١٥ - رَدَة * Récusation (F). Challenge (E).

حق ينص عنه القانون وبين اسبابه يمنع احد المتخاصمين اللجوء إلى طلب رد القاضي ورد الحكم ورد الخير ورد الشهود.

١١٥١٦ - رَدَة * Resttution

احادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب البصرة.

١١٥١٧ - رَدَة المَسِيح * Rédhibition (F).

هو نسخ البيع الذي يميزه القانون في حالات خاصة عددة قولها حين غني يجعل المبيع غير قابل للاستعمال أو يحد من استعماله.

١١٥١٨ - رَدَاك * الكيش الرداع: القسم الالاية. ر ج ع.

١١٥١٩ - رَدَاكَة *
Cynonycteris (S).

جنس حيوانات من فصيلة البطاطيات. انواعها ٩ ثلاثة منها اسبورية وستة افريقية. جميعها ثائرة، متوسطة القد قصرة الذنب، سوية اللون، تعيش جماعات صغيرة متفرقة وراوح عددها من ١٠ إلى ٦٠. مسرحتها بيده المرن قابله يخلو نحو ٥٠ كم. اقلبيها فحج الارباد ينشد من اسية إلى افريقية. اشهر انواعها ما يتبع.

١١٥٢٠ - رَدَاكَة حَنْطَلَة * Cynonycteris straminea (S). Cynonycteris pallid (F).

رداة صغيرة القد، طوله نحو ١٥ سم. وبسطه ٤٥. ثوبها حنكي اللون، بطنها زاهر الليل، رأسها وعنقها وظهورها إلى البصرة. منقارها ينشد من صغار إلى الحيلة والفايون. تألف الانجبار الحربية. قوتها الكبار.



رَحْمَة



رَحْمِيلَان



رَحْمِيم

الثمالة . اجتماعها وأنواعها المعروفة قليلة البلد أعطائها بحار البلاد المظلة الحرارة . جميع أنواعها تسهر في المياه العذبة حيث تمكث نحو ١٥ أسبوعاً ثم تموت إلى البحر إلى البحر أنوعها الرذانة .

١١٥٢٧ - رَدَج (E). To grind (F). Roder (F).
الردج الصيرير بالاحتكاك المتبادل بين قطعتين .

١١٥٢٨ - رَدَج (E).
الردج : ما يخرج من بطن المهر أو السحلة قبل الأكل .
مثل التي من الصبي .

١١٥٢٩ - رَدَجِي (E).
Marchand ambulant de légumes
هو البقال المتنقل .

١١٥٣٠ - رَدْع (E). Bourbe (F).
رسل اللاتع والأهوار .

١١٥٣١ - رَدْف (E). Tribu (F).
الردف في تصنيف الحيوان يأتي تحت الفصيلة وفوق الهامة والجلس .

١١٥٣٢ - رَدْف، كَمَل، قَطَن (F). Croupe (F).
حيز القاذية وغيرها .

١١٥٣٣ - رَدْف، ذَكَب (E). Daneb
الردف أو الذنب نجم نير من كوكبة الدجاجة . مركزه حل الذنب . يبعد عن الأرض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

١١٥٣٤ - رَدْفِيل أَزْرَق النَّحْس (E). Rhodophyllus lividus (S).
Rhodophyllus livide (F).
نظر جحلي شديد الازرق وقد يمتد من فصيلة الدفانيويات . يوجد في المراعي الجبلية . يعيش على التلال . ساقه ضخمة مستعدة الارتفاع ، غبراء اللون . لكته كبيرة القد . للنبوة الشكل ، حليقة ، لونها ال الزرق الفاتحة إلى السواد . قطرها نحو ١٢ سم . أطرافها ليكنية اللون .

١١٥٣٥ - رَدَم (E). Terrassement (F).
Earth work, Embankement (E).
ما يوضع في المنخفض من تراب وصخور لرفع مستواه .

١١٥٣٦ - رَدْمِي (E). Rudéral (F).
نمت تمرغفي يطلق على كل نبات يعيش بين الاتعاش والردم .

١١٥٣٧ - رَدْن ، رَدِين (E). Rayonne (F).
Rayon, Artificial silk (E).
سند نسجي يشق من البوليوز ، يستعمل استعمال الحرير ويصنع الحرير التباقي .

١١٥٣٨ - رَدْن، حَكْل (E). Dévidage (F).
Winding, Reeling off (E).
هو استخلاص خيوط الشرائق أو المرادن وما أشبه .

١١٥٣٩ - رَدْن (E). Ridé (F).
نمت وصي يطلق على كل ما هو مضفر وتعد من الجلود والشعر والجلود وما شاكلها .

١١٥٢١ - رَدَاسَة صَحْرَاء (S). Cynonycteris amplexicauda (S).
Cynonycteris fauve (F).
رداسة صخرية القند ، طولها نحو ٢٠ سم . قوتها إلى السادسة . موطنها يمتد من الخليج الفارسي إلى الهند والهند الصينية والفلبين || تألف الكهوف القريبة من الشلال . مسرعها من الفسق إلى القنبر . قوتها البار والرخويات البحرية .

١١٥٢٢ - رَدَاسَة مَصْرِيَّة (E). Cynonycteris egyptiacus (S).
Cynonycteris d'Egypte (F).
رداسة صخرية القند ، مسطيلة البنية . طولها نحو ١٦ سم وبسطها ١٠٠ سم . قوتها إلى الرتبة الثيرة ، ظهرها اغم من بطنها . جوانبها صفراء اللون || موطنها مصر وجولها من الحبشة إلى سورية . تألف الأشجار والكهوف والبيوت الخربة || قوتها البار .

١١٥٢٣ - رَدَاغ (E). Terrain bourbeux (F).
Muddy ground (E).
تربة كثرت فيها نسبة الروغ .

١١٥٢٤ - رَدَالَة السِّنْدِيَان (E). Mythina acetosellae (S).
Mythina acetosellae (F).
حشرة من فصيلة الشقيبات ورثة حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رقيق الأجزاء . مرتبها غاشلة قوتها أوراق السنديان || جسمها معتدل القد بطول نحو ١٨ م . بطنها نحو ٤٢ م . رأسها صغير الحجم . صينها كيرقان . زباناها خيطيان . مرتبها مسطيل . قوتها اصفر اللون صتاي اللون || يطلى إلى الصخرة الخشنة المواجه || وثنائها الألمانية إلى الصخرة الخشنة بطولها ثلاث بقع متعابية لامتدوية الحجم . وثنائها الخليليان إلى الخشنة الأكعب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بستة أسابيع وتمتد المكان على الصفحات السفلى من اتصال الأوراق || السرعة تطول نحو ٤٥ م . جسمها اسطواني الشكل . مشدود القشار . ثوبا إلى السحلة الرداء يطولها رفقة يضاء وسط ثوبي اسود وعتان جانبيتان اسفرا . ملاتي سكرها إلى السواد النحسي . رأسها ورواجها سود . منها إلى السحلة الغبراء || طور الكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع يتغذى في التربة ضمن جلاب من العين .

١١٥٢٥ - رَدَالَة (E). Osmorus operarius (S).
Eperian (F). Smelt, Sparling (E).

سمكة بحرية نهريّة من فصيلة الردانيات . أعطائها معطر بحار المناطق المعتدلة الحرارة . تقترب من الشطوط في فصل الربيع وتقتل الأجزاء والأجزاء حيث تسهر ثم تموت إلى البحر || جسمها شبه اعطليبي الشكل بطول من ٢٥ إلى ٣٠ م . رأسها مخروطي الشكل . لها ولس تشق الذي يتنحى خلف مؤخرة العين . زعنفتها الذيلية ناقصة . ظهرها إلى الخلفار الألسن البحري الموج أيللاها وبطنها إلى الرتبة الفسقية || لحمها مأكول ، متوسط الصفت .

١١٥٢٦ - رَدَالِيَّات (E). Osméridae (S).
Osméridae (F). Osméridae (E).

فصيلة اسماك بحرية نهريّة من كائلات النظام مفتوحات



ردالة السنديان



ردالة



ردفيل أزرق نحس

١١٥٤٠ - رَدُفَةُ ٥

Rhodanthe (S).
Rhodanthe (F).

فروعها منتصبية فناء ، أوراقها سنانية ، طولها نحو ٧ سم . وتعرض ٤ ، نصلها جلدي الصلصة ، ثلاثي البروق ، ذات الزايم الأخير . أزهارها غبراء اللون . ثمارها الى السواد اللامع ٥ أزهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١١٥٤٥ - رَدُفُ الْفَيْصِ ٥
Cortaria terminalis (S).
Redoul à fleurs terminales (F).

جنية سمرة ، رفة ، صغيرة القد ، طولها نحو ٧ سم . ساقها فروع فناء . فروعها وأغصانها زبداء اللحاء . أوراقها بيضبة الشكل ، نصلها خالي البروق ، جامد السطح ، ذرب الزايم الأخير ، مدبب المنقصة ، خلى الصلصة السفلى . أزهارها تاجية صفراء اللون . ثمارها الى الصفرة الزاهية . أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١١٥٤٦ - رَدُفُ الْهَيْشَةِ ٥
Cortaria nepalensis (S).
Redoul du Népal (F).

جنية سبروتية سمرة ، طولها نحو ثلاثة أمتار . ساقها فروع فناء . أوراقها بيضبة الشكل . نصلها جامد الصلصة . خالي البروق ، مدبب المنقصة ٥ أزهارها وثمارها حنطية اللون . أزهارها يستمر طوال شهر ايار .

١١٥٤٧ - رَدُفُ الْيَابَانِ ٥
Cortaria japonica (S).
Redoul du Japon (F).

جنية سبروتية سمرة طولها نحو ١٠٠ سم . ساقها فروع أوراقها حلطبية مستطيلة ذرية . أزهارها وريدية اللون . ثمارها تمر بمختلف مشي الاخر الى ان تنتهي ، منه الادراك ، بالحسرة السوداء اللامعة ٥ أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١١٥٤٨ - رَدُفُوت ٥
Cortaricaceae (S).
Cortaricacées (F). *Cortaricaceae* (E).

فصلية نباتية من ذوات الفلقتين تقلل جساً واحداً جميع بعض الانواع البرية والبريتية .

١١٥٤٩ - رَدُفُ ٥
Reptis

حالة كل نبات بعد غرسه اي رده الى التربة لطابة دورته الحياتية .

١١٥٥٠ - رَدُفَةُ ٥ ، اَلْثَرْتَرَكِيَّةُ ٥
Alternaria

جس تطور مجهرية من مارة زراعاتها بفضلة النباتات . كائناته جلمودية الشكل ، حلية او خمينة الطرف ، مكوفة من حدة بويوات مستديرة او مرقرة الجوانب ، غليظة الوسط ، مستطقة القطب ٥ أثمانه المثلثية عديدة امرها ما يتبع .

١١٥٥١ - رَدُفَةُ الْبَاذِجَانِيَّاتِ ٥ ، رَدُفَةُ الْبَطَاطَا ٥

Alternaria solani, AL. deud, *Macrosporium solani* (S). *Alternaria des solanées*, Taches noires des feuilles de pomme de terre (F). Early blight of potato (E). *Dörrfleckenkrankheit der Kartoffeln* (D).

فطر مجهرى يظفل حل اوراق بعض النباتات الباذجاناية اغصانها البطاطا والبنشون ٥ مظهره الحامض ، حل البطاطا ، يقع كثيرة سمراء اللون ، تركب نصل الاوراق . تبو سمرة الحميم ثم تتسع فيبلغ قطرها نحو ١٠ سم . نسب الشكل والحميم ، سمراء اللون ، ربادية البقع ٥ عديدة المالات المتتالية الفقراء الخثار . قطرها براوح من ١٠ الى ١٠ سم . تركب النصل فتقويه وقد تصيب الثمار عند



ردف



ردول آي الورق



ردول اليابان



ردف

حشة حولية برية وزراعية تربيتية من فصيلة المركبات . ساقها فروعاً تعلو نحو ٣٠ سم . فروعها دقيقة . أوراقها ساجنة ، سنانية النصل ، مستديرة الاذنات . أزهارها وريدية قطرها نحو ٤ سم . فروعها اصفر اللون ، ثنائياتها وريدية او حمر ٥ تنويرها يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

١١٥٤١ - رَدُفَةُ مَسْكُونَةٍ ٥

Reduvius personatus (S). *Réduve masqué* (F). حشرة قاذصة من فصيلة الردفيات . جسمها متوسط القد ، مثير الحلب ، يطول نحو ١٧ م . رأسها شبه بلوطي الشكل ، متكايف الحلب . عظمها شديد النشط . حينها صغرتان زبالها مستطيلتان ، مهدبان . حنقها انبوي . كيطها مدبب القسم الامامي ، مقعر الخلفي . سطحها مزوايلة صغيرة . علوانها لاسف . قوائمها مجنبة الاعتقاد ، كثيفة الحلب ٥ ثوبا الى البني يطو ملج براوح من الحنطي الى الاصفر ٥ ممرهاا دجوي . تمحص دم الحشرات والذباب والحمام . رفاها قاذصة ، فربها قوت الحشرة الجملانة .

١١٥٤٢ - رَدُفُوت ٥

Reduviidae (S). *Reduviidae* (F). *Reduviidae*, *Assassin bugs* (E). *Rauwanzen* (D).

فصلية حشرات نالمة من رتبة عثفلات الاجنحة وطبقة نصليات الجناح . اسماها وابناها وانواعها كثيرة العدد ، تتجاوز الانث ، منتشرة في معظم اقطار العالم اغصا الاقاليم المتصورة نحو الحارة ٥ اجسامها صغيرة او مخططة . رؤوسها صغيرة . اعينها واسعة . انطامها نقيطة مجوزة بحجة ذرية تفرق منها بعض السموم المفردة . حينها جالية ، صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشارية مستطيلة ، ثلاثية الفصل . قوائمها نقيطة ، والزوج الامامي حدة بعض الاجناس مجهر ، كا في البرصية ، للاعتصاف ٥ جميعا قاذصة تقضي على الحشرات الفسادة وينها البرص والسكيت والذباب والبق ٥ ممرهاا دجوي ينه من غريب الشمس الى الفجر .

١١٥٤٣ - رَدُفُ ٥ ، عَشِيَّةُ الدَّيَّانِيْنِ ٥
Cortaria (S). *Redoul* (F).

جس نباتات حمرة من فصيلة الردفريات . اغصانها ١٠ سوطها فروعاً فناء . أوراقها منقطة ، متعاقبة ، سنانية الشكل نصلها جلدي الصلصة ، ثلاثي الى خالي البروق ٥ أزهارها عتدي التجميع . أزهارها صغيرة القد عادمة التبرج ، غشائية الفصل والاسدية ، غشائية البات والاكرايل المنبسة النجسية الشكل ٥ جميع اغصانها النباتية من فروع دقيقة وانفان وغلا واوراق وأزهار تحوي مادة قلوية جميلة تسمى كورارين (*Cortarine*) . تستعمل في دبح الحلود الفاغرة الثنية ٥ اعرف انوعها واشهرها ما يلي .

١١٥٤٤ - رَدُفُ آسِي الْوَرَقِ ٥ ، عَشِيَّةُ الدَّيَّانِيْنِ الْاَسِيَّةِ الْوَرَقِ ٥
Cortaria myricifolia (S).

Redoul à feuilles de myrte Corroyère, Herbe aux cancéurs (F). *Myrtle leaved cancer's tree*, *Myrtle leaved sumach* (E). *Myrtenblättriger gerbertrauch* (D). *Cortaria a foglie di mirto* (I). جنية سبروتية مبنولة سمرة غزيرة المواد الباذجاناية تعلو من ٣٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها فروعاً رباعية التصلع ،

أدراكها فضرح البشرة وتغور في اللب الذي ينسل ويغفر .
يكافح عنه ظهوره أما يتغص ثباتا بوسايل بودو الحليل
فوق الصفر .

١١٥٥٧ - رَدِيَّةُ Cladode

ورقة كاذبة أو شبه ورقة تكون في سوق بعض النباتات
كما في الصنوبر . ج رقائق .

١١٥٥٨ - رَدِيَّةُ Radiola (S).
Radiole (F). Radiola (E).

جنس نباتات عشبية حولية بريمة من فصيلة الكتانيات .
أنواعها المبرقة قليلة السند منها جبل حوض البحر
الابيض المتوسط || سوطها قراء متشعبة . أوراقها متعاقبة ،
شبه بيضية النصال . أزهارها علوي التجميع . أزهارها
صغيرة يضاء اللون || أشهر أنواعها الرديولة الكتانية
(R. linoides) . منها الطوي بين جبلي صين وكينجس .
تؤمرا صيني .

١١٥٥٩ - رَدَاذُ Pluie fine (F). Thin rain (E).
هو المطر الضئيل . قال الاصمعي اعف المطر واضفه
الثلج ثم الرذاذ .

١١٥٦٠ - رَدَاكَةُ Hygrométrie (F). Hygrometry (E).
علم يبحث في قياس الرطوبة الجوية .

١١٥٦١ - رَدَان Balancier (F).
Balancer, Poisers (E).

الوزان ويعدى رقاص التوازن ، عضو دقيق صغير ، شبه
دبوس الشكل ، ينشب في البرساذ أي في الحلقة الصدرية
الثالثة ، عنه الحشرات من ذوات الجناحين . رها وزانان
أين وأيسر تصليها الحشرة في توصيه طياتها وتسدده .

١١٥٦٢ - رَدَاكَةُ Hypsométrie (F). Hypsometry (E).
علم تحديد الارتفاعات .

١١٥٦٣ - رَدَاكِيَّات Atelopodidae (S).
Atelopodidae (F). Atelopodidae (E).

فصيلة حيوانات دواء قاذبة من لمة الخديعيات وبرتية
السوطيات وبرتية البتراوات أي دمجات اللب || أجناسها
وأنواعها عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية . جسمها
صغيرة القفد تشبه بمساواة سطح ضلعي قوسها الجسدي
في مركز ثلاثها || أشهر أجناسها الرزان والرندودة
والهندوديات والكلوكا ...

١١٥٦٤ - رَدَح ، رَدَح ، رَدَح Echelasse, Pissalage (F). Fropping (E).
غرز المرازح والسمايك بجانب النباتات لعدم سقمها أو
نومها .

١١٥٦٥ - رَدَق Rangée d'arbres (F).
Tidy of trees (E). الصف أو السطر من الأشجار المثمرة .

١١٥٦٦ - رَدَكَة Plantation en lignes (F).
Planting in ranges (F).

هي الزراعة بالسطر ترتكز على الإبعاد المتساوية والخطوط
المتوازية .

أدراكها فضرح البشرة وتغور في اللب الذي ينسل ويغفر .
يكافح عنه ظهوره أما يتغص ثباتا بوسايل بودو الحليل
فوق الصفر .

١١٥٥٢ - رَدِيَّةُ الْبُرْتَقَالِ Alternaria citri (S). Black rot des oranges (F).

فطر مجهري يصيب البرتقال في مجامع المدركة يفتقر المروق
والفرايين الداخلية التي تسبب إخراج الكثرة ثم إمرارها
وتصلبها إلى أن يقضي عليها الففن من الداخل فتتشقق
أو تحط وتيس || أغصانها زهيدة لا تستوجب العناية
لأنها لا تتجاوز ٣ أو ٥ ٪ .

١١٥٥٣ - رَدِيَّةُ التَبَعِ Alternaria tenuis, Al. longipes (S). Maladie du plant
de tabac (F).

فطر مجهري يتطفل على عدة نباتات أعصها التبغ عندما
يكون في المثلث || مظهره الخارجي ذيول يحل بالاوراق
والسوق ينغم ظهور أوجه خلية سماء اللون تركب السوق
والأوراق قطعها وتعطفها بمادة حطية لزجة تغشي عليها
ومنها || يكافح أولا بتطهير البذار قبل استعماله في
مواقع كانت موبوءة . وتطهير يكون أما بتعقيم الجذور
مدة ١٥ دقيقة في نترات النحاس الحليل ١ ٪ أو بتعقيمها
بالملاح الزئبق . منهم من استعمل بيكرينات النحاس
بمعدل غرام واحد لكل كيلو زر || ثانياً بالتخلع وحرق
الشقق الموصية وتغير أو نفض الشتل الباقية بأحد
الطرائق الموكزة من التخلص أو على بعض المواد الكيماوية
الثابتة الاستعمال حالياً .

١١٥٥٤ - رَدِيَّةُ الشَّامِ Alternaria nigrescens (S).

فطر مجهري يتطفل على أوراق الشام يقضي عليها .
مظهره الخارجي يقع فسيحة إلى قياسية الشكل تركب الأوراق
فتلويها وتغطي على نحو البتة . وقد يصيب الثمار فيشتمل
يقع خلية رطابية اللون يطغى سواج زلفي تقرح التشور
وتصلبها || ينشط كثيراً في المواقع الرطبة الحارة || يكافح
عنه ظهوره باستعمال المركب التالي :

سلفات النحاس ١٠٠٠ غرام
كلس ١٥٠٠ غرام
كلورور الامونيوم ٣٥٠ غرام
ماء ١٠٠٠ ليتر

١١٥٥٥ - رَدِيَّةُ الْقُرْنَلِ Alternaria dianthi (S).

فطر مجهري يتطفل على القرنفل قرب زين أزهاره فيؤذي .
مظهره الخارجي يقع زيتية مستديرة أو بيضية الشكل تركب
الأوراق والسوق ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ م وطولها
نحو ١٥ م . تسبب بياس وأصدام البشرة وانفلاق الطبقة
الاحدية التي ينشأها القطر || يكافح عنه ظهور الموسم
بسايل أكسيكلورير النحاس الحليل ١ ٪ .

١١٥٥٦ - رَدِيَّةُ الْمَلْفُونِ Alternaria oleracea, Al. brassicae (S).

فطر مجهري يتطفل على أوراق الملفوف وغيره من النباتات
الزراعية والبرية كالفصل والشتور والخرقة والقريل ...
مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون ، حطية
الحالة ، صفراء أشكل تركب الأوراق الباقية الخارجية
تصلبها ويستمر إذاها على الملفوف المغطى || يكافح
بأستعمال سايل بودو الحليل ١ ٪ كما يحسن حفظ الملفوف



رَدِيَّةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدِيَّةُ التَبَعِ



رَدِيَّةُ الشَّامِ



رَدِيَّةُ الْقُرْنَلِ (١)



رَدِيَّةُ الْقُرْنَلِ (٢)



رَدِيَّةُ الْمَلْفُونِ

١١٥٦٧ - زُرْع

Hygrometricité, Hygroscopicité (F). Hygrometry, Hygroscopicity (E).

قابلية الجسم الطبيعية لامتصاص الرطوبة وهي أيضاً نسبة الرطوبة للغرور استيعابها.

١١٥٦٨ - وَزْم، حَزْم

Botzage, Emballage (F). Tying up in bundles, Packing (E).

هو شد الشيء بعد جمعه وضمه. وهو تغليف الشيء بعد صفه بترتيب.

١١٥٦٩ - وَزْمَة، حُمْمَة، وَزِم

Botte (F).

Bunch, Bundles (E).

ما حزم من البقل.

١١٥٧٠ - وَزْنَامَة زُرَاعِيَّة

هي التقويم الزراعي، اطله.

١١٥٧١ - وَزْنَة

Mare (F). Pool (E).

هي المستنقع الصغير مفيض الماء رقيقه. ج. زئان.

١١٥٧٢ - زُرْوَان

Chloridium (S).

جنس طيور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللخيات. مشبه غرير المادة. جبره الكبدية مشعبة. كئالده مستطيلة أو كروية. له أنزعة عديدة معظمها ربيبة تعيش على الاخشاب اليابسة ومنها طفيلية تركب الاوراق. أمورها زروان الخرز.

١١٥٧٣ - زُرْوَان المَوْر

Chloridium musca (S). ظفر مجهرى يركب اوراق اللوز فيوش التسلل في بلاد الشام يفسد البقل الصغيرة المستديرة السراة التي ثم يتكاثر وتنتشر الفس كمثل التسلل الذي يابل ويبيض. يتكاثر عند ظهوره بامتثال سائل يورجو الحلق في ٨٠٪ الى ١٠٠٪.

١١٥٧٤ - زُرْوَد

Rhynchos (S).

Rhynchos (F). Rhynchos (E).

جنس حشرات من مفدمات الاجنحة وفصيلة الرزوديات. أنزله المعروف نحو ٣٠ مشثرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من المائلين القديم والجديد. تعيش في الغابات وفي البراري الخلقة. جميعها مفترسة. أجسامها مستطيلة اشكل. عذبة الصلصات العليا، طولها من ٨ الى ١٢ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها ثائرة، قرنها الاستشعارية قنادلية مركبة من ١١ فصلة. قوائمها قصيرة. الحامدا لاسفة، ضعدة، مقطوعة الاطراف. اولوها ضبابية الالوان تكثر فيها السمرة الكستنية والسمرة الجلاوية والسمرة الزرقونية.

١١٥٧٥ - زُرْوَدِيَّات

Rhynchosidae (S).

Rhynchosidae (F). Rhynchosidae (E).

فصيلة حشرات من مفدمات الاجنحة. أجسامها وانزوعها المعروفة قليلة العدد اصالتها معظم مناطق البلاد الحارة من المائلين القديم والجديد. جميع أجناسها مفترسة، صغيرة القد، ضلعية التأثير، قائمة الاطواب. أشهر أجناسها الرزود.

١١٥٧٦ - زُرْزِير

Rhexia (S).

Rhexia, Quadretta (F). Rhexia, Meadow beauty (E).

Rhexia, Ankerblume (D). Rhexia (I).

جنس نباتات عشبية ربيعية من فصيلة الميكانيات. أنزله

عديدة بعضها ترابي والآخر بري وسيلاني. سوقها متعصبة مريكة الفلوع. اورثها متعاقبة قصيرة العنق، نصلها اطليسي الشكل، بارز العروق، خلى البشرة. أنزاعها متكوني أو نووي التجميع، هامى الارتكاز. أنزاعها خالية البتلات، ألوانها من الاحمر الى الاحمر.

١١٥٧٧ - زُرْزِير

Hydrophile (S). Hydrophil (E). الزرير والرف لله واحد. تمت ترعني يطلق على النباتات الثمرة الى الماء وحل الاشياء التي تنصص للماء.

١١٥٧٨ - زُرْزِيرَال

Rafial عاشوب، يرتكز على كلورات الصيدا، ينقص على جميع النباتات الضارة بما فيها التنبليات. يستعمل محلولاً ٢٪ بمعدل لتر ونصف اللتر المتر المربع الواحد.

١١٥٧٩ - زُرْزِير

Digitaria sanguinalis (S).

Digitaria sanguinalis (F).

نبات عشبي جليوي بري معمر من أجناس التنبليات. يتكاثر في الارربة الرطبة والخروية. وهو مبلو في جميع البلاد الحارة والمعتدلة. يعتبر من النباتات الضارة الكثيرة الاذى.

١١٥٨٠ - زُرْزِير

Besa ج. روس.

١١٥٨١ - زُرْزِير

Mineral (F). Ore (E).

الزرس هو المعدن. ج. زرس.

١١٥٨٢ - زُرْزِيرَة نَسَكِيَّة البَقْع

Rhizopagus bipustulatus (S).

Rhizopagus bipustulatus, R. bipustulatus (F).

Rhizopagus bipustulatus (E).

حشرة وائمة وقائصة من فصيلة الرسايحات وائمة مفدمات الاجنحة. تألف الاجراج. غشائتها تموش على رصق الانزاع وظلمها. يرقاتها تموش في سراديب الحشرات الخاشية ساحة وادها لاقراسها. جسمها صغير القد بطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السواد الفضي يعلو في مؤخر كل عذبة بقية صغيرة حمراء. وأنها مستطيلة الجسم. هيئتها صغيرتان. زوانها صغيرتان. صفها الاطراف. ظفرها مقطوع الطرف الاثلاث. اوساها خماسية الشكل. متد الاثلاث ربايتها في الزوج الخلفي عند الذكور. لها جيل واحد في الجيل. تظهر الحشرة الجلاية في ايلول الربيع وتموش حتى اوائل الصيف. تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها بأسبوعين. تنجح المكن تحت الفشور وبها في البرقة بعد بلوغها الاذراك تمام طول نحو ٦ م. جسمها شبه مدني الشكل، سدسي الرواجب، امير اللون، جسم الفواصل والرأس وطرف الشعر على طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتهي في آخر نفق ويته البرقة بمن صلبة خائفة الفشور المركب النفايا الخشبية والقضوية المسجورة بالريال.

١١٥٨٣ - زُرْزِيرَات

Rhizopagidae (S).

Rhizopagidae (F). Rhizopagidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائصة من غشيات الاجنحة. أجناسها وانزوعها المعروفة قليلة العدد مشثرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تعيش على الانزاع وتحت ماء الانجار. يرقاتها قانصة تسمى واد البطرشيات.



زور



زور



زور



رسكة ثنائية البقع

القوم. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة. سرسها اساطم الاغواط والمجاذب و اجسامها شبه اهليلجية الشكل ، مبططة الجرم ، تطول من ٤٠ الى ٧٠ سم. زعانفها الظهرية والبطنية منفصلة لا تتصل بالذيلية. اثنائها تختلط مع الانواع لكنها لا تظهر من الرقعة || لحومها جيدة الصنف ، مستحبة العلم || اشهر انواعها وأعزها الثلاثة التالية :

١١٥٨٩ - رُسَامَة مَسْكَايَة *

Platessa cynoglossus (S). *Pile cynoglossae* (F).
Cynoglossum plaice (E).

مسكة من الرغاف. اسطاتها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. سرسها اساطم الاغواط || جسمها مثالي الشكل ، قريب الشبه بلسان الكلب ، يطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الزبداء الحطية تعلوها رقعة مفسوخة التوزيع تتخللها بقع قاتمة || لحمها فاخر الصنف.

١١٥٩٠ - رُسَامَة شَالِيَة *

Platessa vulgaris, *Pleuronectes platessa* (S).
Pile franche, *Carrelet* (F). *Common plaice* (E).

مسكة من الرغاف. اسطاتها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال. سرسها اساطم الاغواط ولتقاف || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٧٠ سم. حياتها على الصلصة البني. ثوبها في الصلصة البني الى الخضار الحطلي المواج يعلوه بتجميع اسمر وتبيج يرتقالي. صفحاتها اليسرى الى السفل تراوح من الزبداء الغبراء الى الحطلي الاخر المواج. وتتميز بصف من النمل الصغيرة يمتد من العينين الى الزعنفة الصدرية || لحمها جيد الصنف ، مغروب فيه .

١١٥٩١ - رُسَامَة صَغِيرَة الرَأْس *

Platessa microcephala (S). *Pile microcephale* (F).
Microcephalus plaice (E).

مسكة من الرغاف. اسطاتها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. سرسها اساطم الاغواط والمجاذب و اجسامها شبه اهليلجي الشوزن ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٤٠ سم. تتميز بصغر الرأس. ثوبها الى الخضار الحطلي الاسمر المواج تعلوه رقعة يبراه لانسوخة التوزيع || لحمها جيد الصنف ، مغروب فيه .

١١٥٩٢ - رُسَامَات *

Attacidae, *Saturnidae* (S). *Attacidae*, *Saturnidae* (E).
نفسية حشرات من سرشيات الاجنسة. اجناسها المعروفة نحو ١٠٠ وانواعها نحو ١٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها كبيرة القند او متوسطه. اثنائها متباينة الالوان الجسدية. قرونها الاستعمارية مبططة مزبوجة عند الذكور ، مسنة عند الاناث. ملامسها الفكية قصيرة وبراشفها كذلك. عينها بسيطة. قوائمها الالامية عادمة الغالب. ارباع ذكروها وسيدة المغلة || يرقاتها خاضعة، جرداء القشار ، زياه الحسام المستطيلة الملب. دباط خادراتها شرجي السلك تتدل به .

١١٥٩٣ - رُسَامَة الْإِحْصَاء *

Grand paon de nuit (F). رابع ابر الوشي الليلي .

١١٥٩٤ - رُسَامَة *

Croquis (F). First sketch (E). هي الرسم الاعادي .

اجسامها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة القروين. قرونها الاستعمارية صغية مركبة من ١١ فصلة. كليلها واغدادها مستطيلة. جرانها نشطة. ارباتها خلية المغل عند الاناث ، رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور || اشهر اجناسها الرسامة .

١١٥٨٨ - رُسَامَس *

Rhizostoma (S).
Rhizostoma (F). *Rhizostoma* (E).
جنس حيوانات بحرية من قراصات البحر المحوصيات وفيه الراسيات. انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها كبيرة القند ، فكية التركيب ، قلنسوة المغلة الشفوية ، عادة الالياف الخشارية . ملاحظها الفكية رباعية الازواج ، وقنية الشكل ، محجمة الاطراف || تتوهم على سطح الماء. اثنائها تترالج بين الابيض والاسمي والازرق. اعداب شفطها شاذكة تلهم الجله ان لاسه. بينها انواع تغلف برشاش ناضط يلدح كثرار النار .

اشهر انواعه :

Rhizostoma cuvieri (S) رُسَامَة الْاَطْلَس
Rhizostoma pulmo (S) رُسَامَة الْمَوْط

Rhizostomidae (S). ١١٥٨٥ - رُسَامَسِيَّات *

Rhizostomidae (F). *Rhizostomidae* (E).
فصيلة مدوس من قراصات البحر. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها الراس .

١١٥٨٦ - رُسَام *

Heptanchus (S).
Heptanchus (F). *Heptanchus* (E).
جنس اسماك بحرية سرلوة مفترسة من فصيلة الجلوليات وثية الاثاق || انواعه المعروفة ثلاثة اسطاتها بحار البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها كبيرة القند. قريه الفكية بقرقوش. اجسامها وشية. رؤوسها شبه مخروطية الشكل. افواهها سفلية الارتكاز ، متاخرة من المقاطع. اسكاتها الخيشوية فلدج سباحة الازواج || اشهر انواعه الرسامة السراء .

١١٥٨٧ - رُسَامَة سَمَرَة *

Heptanchus cinereus (S).
Heptanche cendré, *H. gris*, *Cendré*, *Mouge gris*, *Parion* (F). *Gray Heptanchus* (E).

مسكة بحرية سرلوة مفترسة من الرساج. اسطاتها معظم اقطاع البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تتميز من الالبية البنية. سرسها الاغواط والمجاذب. اغدادها شرة لكنها تبسط عن الانسان || جسمها رشي الشكل يطول من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم. مسكها متوسط الخشونة ، قليل التصلب الممتعة. ثوبها الى الزبداء تعلوه مابة زرقاء مع اقترابه من ثوب الظهور ويغير ويغير عند الجبل. رأسها مخروطي الشكل. لها سفلى الارتكاز. شفطها معتدل الانفراج. اسطاتها كبيرة ، ذرية. عيناها مستديرتان. نافذتان. فوطها الجفني يحتل مركز الزعنفة الخشوية || تصاد من ابل مسكها وزيتها واسطاتها. لحمها كامن الصنف .

١١٥٨٨ - رُسَام *

Platessa (S).
Pile (F). *Plaice* (E).
جنس اسماك بحرية يبرضة من الملساوات وفصيلة جانبيات



رُسَام



رُسَامَة مَرَاه



رُسَامَة ثَامَة

وفصلة الرسات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلحنا معتم
بجاء العالم. معتم انواعها يدين على الصنيع ولقسم الآخر
على اثنتي الاخر || اصطلحنا صغيرة لاجلها الشكل
الذي يختلف مع النوع. معتمها بعين القواعد ، خاصي
الدورة الخلزونية اوسباحتها .

١١٦٠١ - رستمكة الغلب

Proctemma guttata (S). *Proctemma des bois* (F).
حشرة خاضعة من فصيلة البيدييات ودية مخلفات الاجنحة.
جسمها شبه المثلثي الشكل يطول نحو ١٢ سم. || رأسها
صغير ، ازرق اللون. عظمها معتدل القد ، طليق. ميتاها
صغريتان ، تالفتان. زباناها دقيقان ، مستطيلان .
كوسلها ازرق اللون ، على الجانب الدقيق . حشيتاها صغيرة ،
سوداء . حشيتاها صغريتان ، ظهورها لينة ، احر
اللون تملو رقعة بيضاء ومبرء . يبطها الى اسف السرة
المواج . قوامها حر ، كثيفة الجلب || تألف الثافات .
مرتمها الاشباب البيرة .



رسان برق

١١٦٠٢ - رستيل

Aristella (S). *Aristella* (F).
نبات عشبي يري رموي حولي من التجليات يكثر بين
الزروع وفي الارض المساحة .



رست

١١٦٠٣ - رشم

Paturon (F). *Pastern* (E).
جزء قائمة الفرس بين الحطب والافرة .

١١٦٠٤ - رشم

Turax (F). *Turus* (E).
جزء من ريشل الخاتر والحشرة يقع بين اساق والغالب .

١١٦٠٥ - رستكس

Rascasse blanche (F).
سمكة بحرية قدي كروب احسن ، اطبا .

١١٦٠٦ - رستكس احمر

Rascasse rouge (F).
سمكة بحرية تسمى جلاع ربي ، اطبا .

١١٦٠٧ - رستكس اسمر

Rascasse brune (F).
سمكة بحرية تسمى جلاع مبري ، اطبا .

١١٦٠٨ - رشم وشم

Hormones
مواد عضوية قشرها يفسد اعضاء الجسم الحيواني فكثر
في سائر الاضداد التي تتحلل اليها بواسطة الدم || وهي
في النبات مواد عضوية قشر في قشر الخولي والشمري .
والرسل هو الجلب ، اطبا .

١١٦٠٩ - رشم

Lever d'un plan (F).
To make a plan (E).
وضع عظم الشيء .

١١٦١٠ - رشم

Droit (F). *Right* (E).
لقطة تجديدية تطلق بالحق الخالي حل المناراة غير المناراة
أو غير اللقوة . وهي تستعمل في صيغ عديدة لاحصاء :

- Droit de licence* رسم الاجازة
- Droit de coponacemation* رسم الاستاذة
- Droit de posta* رسم البريد
- Droit de transmission* رسم التحويل
- Droit de transcription* رسم التسجيل
- Droit d'enregistrement* رسم التسجيل
- Droit de douane* رسم الجمر

١١٥٩٥ - ريسان ، انطشور

Ophisurus (S). *Ophisurus* (F). *Ophisurus* (E).

جنس اسماك بحرية يوزع من مفتحات المثانة وفصلة
المراتبات. انواعها المعروفة خمسة ، اصطلحنا بجاء البلاد
الحارة والمعتدلة الحارة منها معتم القالب البحر الابيض
المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي ||
جميعها انقلبية الشكل ، مستطيلة الجسم المحيط . جلودها
عادية السطح . رؤوسها اسطوانية . اعظامها ذقة .
اعداها كبيرة . اسنانها كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ،
ذرية || احرف انولها واشهرها ريسان البرق .

١١٥٩٦ - ريسان البرق ، بيركيل البحر

Ophisurus serpens (S). *Ophisurus serpens* (F). *Ophisurus serpens* (E).

سمكة بحرية يوزع من الرسان . اصطلحنا البحر الابيض
المتوسط . تكثر من اسماك الجاحد والثقات الجيدة القود ||
جسمها ضيق مستطيل يبدو كانه انبوي الشكل . طولها
يراوح من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . جلدها ملس البشرة ،
حادم السطح . قويا ثنائي اللون ، ظهرها وبيضاها الى
الصفرة المظلمة يطولها مواج شعلي ، يبطها الى البياض
الفضي التني المواج . رأسها اميق غضابا من ظهرها وتتقل
بالاسود وهو اسفني الشكل ، ذلق اسفل المقرن الحاد .
زعنتها الصدرية صغيرة ، شائعة ، مقدافية الشكل ، وها
زعنتان بني وشمري . الزعنفة الظهرية خط شديد السرة ،
قليل العرض الذي لا يتجاوز ٥ سم . يمتد من اوائل الظهر
الى طرف الذنب . يخاله خط مائل طوي وعرضا وغضابا ،
يضي الزعنفة الشرجية ، يمتد من قاعدة المق الى طرف
الذنب . اما الزعانف الحوضية والذيلية فلا وجود لها ||
جلدها كامن الصفت قل من يرغب فيه .

١١٥٩٧ - ريسانيات

Ophisuridae (S). *Ophisuridae* (F). *Ophisuridae* (E).

فصلة اسماك بحرية يوزع من القطبوات مفتحات المثانة .
انواعها المعروفة عشرة تجتمع الى جنسين الرسان والشليل ||
اصطلحنا بجاء البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . معتمها من
اسماك الجلاح . سرسها الثقات الجيدة القود || اجسامها
مستطيلة مضغوطة . جلودها مائلة ، عادية السطح .
رؤوسها اسطوانية . اعظامها ذقة مستطيلة . زعانفها
الظهرية والشرجية قليلة العرض تمتد حتى اطراف الذنب .
زعانفها الحوضية والذيلية متصلة || لحومها غسولة الصفت
أو كاسنة قل من يرغب فيها .

١١٥٩٨ - راسب

Sédiment (F). *Sediment, Deposit* (E).

الرسب هكر السوائل واغلاما عندما تستقر في القاع .

١١٥٩٩ - رسة

Arum arizarum, *Arizarum vulgare* (S). *Gouté à capuchon* (F). *Friar's cow* (E). *Kappenzahnrwur*, *Kohzahrwur* (D). *Arizzo*, *Gilico* (I).

نبات عشبي ثنائي مسمر من سبط الرسيات وفصلة
القلاليات . يسلته صغرية بيضه الشكل . اوراقه
سنالية ، شرمانه اوسوي الخوف يطول من ٢٠ الى ٥٠ سم .

١١٦٠٠ - رسة

Rissois (S). *Rissois* (F). *Rissois* (E).

جلس سوزانات بحرية من الرضويات معلمات الاربل



رسة

Rissolidae (S). **رُسيَّات** ١١٦١٩
Rissolidés (F). **Rissolidae (E).**
 فصيلة ديديات بحرية من الرنغويات مديات الرجل
 أماميات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد
 مبرزة في منظر بحار العالم || أصدافها صغيرة اللد ، بطيئة ،
 تمش على النبتات البحرية أحصاهم الخفيات || اعرف
 اجناسها وأشهرها الرسة .

Epigone (F). **Epigone (E).** **رُسيَّكة** ١١٦٢٠
 الرسيكة مذكرة الاجينة عند الطلاب والكديات .

Sipunculus (S). **Siponice (F).** **رُسيَّع** ١١٦٢١
 جنس ديدان بحرية من فصيلة الرسييات . انواعها المعروفة
 عديدة منتشرة في منظر بحار العالم . اجسامها شبه اسطوانية
 الشكل تطول من ٨ الى ٢٥ سم . وهي سرعة عادمة السمك
 والمناخس . افواهها مستطيلة ، مخروطية ، جمجمة ||
 اعرف انواعها وأشهرها الرسيع الامشط .

Sipunculus nudus (S). **Siponice nu (F).** **رُسيَّع أمشط** ١١٦٢٢
 نوع من الرسيع . يعيش في جميع بحار البلاد المتحدة الحرارة .
 يتكرر وجوده في البسار الأبيض المختص . طوله نحو ١٦ سم .
 ثوبه الى الشقشة السمراء الموج .

Sipunculidae (S). **رُسيَّعيات** ١١٦٢٣
Sipunculidés (F). **Sipunculidae (E).**
 فصيلة ديدان بحرية من الجفريات . اجناسها وأنواعها
 عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اشهر اجناسها الرسيع .

Métacarse (F). **Metatarsus (E).** **رُسيَّع** ١١٦٢٤
 هو في الحشرات فصلة الرسيع الاول .

Equisse (F). **رُسيَّمة** ١١٦٢٥
Sketch, Rough (E).
 الرسمة الرسم الاعدادي او التخطيط الاعدادي او المسودة .

Bassinage (F). **Sprinkling (E).** **رُسيَّع** ١١٦٢٦
 هو الاسقاء بالرفاذ كما بالرشة .

Faon (F). **Fawn (E).** **رُشَاء ، رَشَاء** ١١٦٢٧
 ولد الطيئة الذي قد تحرك ويشي . ج أرشاء .

Tige rampante des cucurbitacées (F). **Creeping stem of cucurbitaceous (E).** **رُشَاء** ١١٦٢٨
 حبل اي ساق نباتات الفصيلة القرعية . ج أرشية . يقال
 أرشية البطيخ والتملين والحنتل .

رُشَاء ١١٦٢٩
 الرشاء مجموعة كواكب كثيرة صغار من برج الحوت .
 وهي على صورة السمكة يقال لها بطن الحوت . وفي سرها
 كوكب نير يدعى عقد الحليتين ينزل القمر آخر ليلة
 من الشهر .

Droit de tonnage رسم الحمولة
Droit de sortie رسم الخروج
Droit d'entrée رسم الدخول
Droit d'octroi رسم الدخولة
Droit de timbre رسم التبعة
Droit de quai رسم الرصيف
Droit de garantie رسم الضمان
Droit de navigation رسم الملاحة
Droit ad valorem رسم بحسب السعر
Droit gradué رسم تدريجي
Droit progressif رسم تصاعدي
Droit fixe رسم ثابت
Droit de passeport رسم جواز السفر
Droit au comptant رسم فوري
Droit constaté رسم محقق
Droit proportionnel رسم نسبي
Droit de croisement رسم نقل البضائع
Droit de mutation رسم نقل الملكية

Eristomura (S). **رَسْمُور** ١١٦١١
Eristomura (F). **Eristomura (E).**
 جنس طير من كليات القدم وفصيلة البليات . انواعه
 المعروفة ستة . جميعها مستطيلة الجسم ، مخروطية الذنب
 المتحد الحيز ، قصبة السبق والمتقاد المستدير الطرف .
 شكلها بين الناق والفاص . اثوابها متباينة الالوان المزينة
 والبيجة || اعرف انواعه وأشهرها الرسمور التبرجي .

رَسْمُور كُدُرَجِي ١١٦١٢
Eristomura leucocephala (S).
Eristomura leucocephala, Canard faucon,
C. culvri (F). **Pintail duck (E).**

نوع من الرسمور . اطناؤه تمتد من اواسط القارة الاسيوية
 الى اطراف اوروبية الجنوبية والشرقية يحوي بجزائرها وانهارها
 كل سنة في شعابه وايابه المصيف والمشتي || جسمه كبير
 اللد . ثوبه الى الصبغة الصفراء المجلدة بالاسود والاشقر
 والافير . رأسه متدلل الجرم ، ابيض اللون تملو بقعة
 سوداء . متقاد حنطي اللون ، اسود القاطعة . ورجلاه الى
 الصفار الزيتي || الانثى تبيض من ٨ الى ١٥ بيضات
 تحضنها نحو اربعة اسابيع بينا الذكر يؤمن لها اللداه .

رَسْمُوكَة ١١٦١٣ هي التائيل ، راجه .

رَسُو ١١٦١٤ هو الأوطى ، راجه .

رُسُوِي ١١٦١٥

Sédimentaire (F). **Sedimentary (E).**
 تمت تعريفه يطلق على ما هو مركب من رسوب .

رُسُوِيَّة ١١٦١٦ **Stoicism (F).** **Stoicism (E).**
 الرسويية او فلسفة زينون ، ملهب فلسفي يقول بنبات
 الجنان وببشة الخلق والعدم .

رَسُوْلُ الْفَيْث ١١٦١٧ هو الزرقاق ، اطليه .
رُسَيَات ١١٦١٨
 سبط من فصيلة التفاسيات ، اشهر اجناسه الرسة .
Arées (F).



رسمور تدريجي



رسيع امشط

شماره - ۱۱۶۳۰

قبل فيها : شجرة تسمى فوق القمامة ودعها كورق الخروع
ولا تمر لها ولا يأكلها شيء . وثيل أيضاً : عشب تشبه
الزفرات وهي مثل الجملة ولها قضبان كثيرة المقعد وهي مرة
جداً شديدة الحُمْضَة لزجة تثبت بالقيمان مسطحة على الأرض
ورودها لطيفة حمراء والناس يطبخونها وهي غير بقالة
تثبت بندق . ج رشأ ورشأ .

١١٦٣١ - رَشَام ٥

Hydragogue (F).
Hydragogue (E).
مادة فعالة توجد في بعض النباتات الطبية ، استعمالها يسبب بعض الافرازات المائية من معرقة او معرة البول او مسهلة .

١١٦٣٢ - كَشَاد* ، حُرُف

١٦٣٢ - رشاد* ، حرف
 Lepidium sativum, Nasturtium (5). Cresson alen-
 ois, Passerage cultivé, Nasitor, Cressonnette (F).
 Garden cress, Tongue-cress (E). Gartenkresse,
 Kresse (D). Caroncallo, Crescione, Agresto (I).
 بقلة حوية من فصيلة الصليبات. او رطلها حريفه مأكولة
 لا تخلو من الفوائد الصحية * رطب في الاثرية القليلة
 والمتوسطة الالدماج الممكن صفتها كما دلت الحاجة.

١١٦٣٣- رَشَادُ الْبَحْرِ هو النسخة ، اطلما .

۱۱۶۳۴- رَشَادِ بَرِّي، لُغَاءُ هُورَفِ الْمَاءِ، اَطْلُفِ.

١١٦٣٠ - رَشَّاشٌ ، مِطْفِئَةٌ
 Jet d'eau (F).
 Wasserspout (E).

لَقَبْ أَوْ جِهَازْ يَطْفُرْ مَعَ الْمَاءِ .

*0 257, - 11636

Aspergillum (S). * رشاشه ١١٦٦٦
Aspergillum, Arrosor (F). Aspergillum (E).
جلس سحرًا بخرية من الرغويات صفيحات التلويش
ورفعيلة الصفيحات * أنوماها الغالبة المحجرة تقييد
يومان اللطيفة التالية ، أما الانواع المعاصرة فأعطتها بحار
البلاد الحارة . تمهين في رمال الشواطئ المنصورة بماء وتقوم
فيهم صحرًا فمن انبوب الكسبي المادة رشي بشاه مستدير
الشكل ، حذب الثوب اللطيفة كتفوت رشي

* OLCJ-11737

١١٣٧ - رسالة *

Hydrocyon (S).

سمكة بحرية وسمكة الجلس والنوع من مفتوحات المثانة
رفصيلة الخراشيات. موطنها الأنهار الأفريقية انحصارها
النيل والتنجيز. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم.
ظهورها انفسر اللون. بطنا وجوانها فضية. لحشا قليل
العلم. لكنها كثرة الحسك.

۱۹۳۸-۱۹۳۹

Coque de la noix de coco (F). ١١٦٣٨ - رُشْبَكَة
Shell of cocoe-nut (E).
قشرة النارجيل افرتت من لها ويغترف بها .

١١٦٩- رَشَح، مَصُول، نَتُوع، نَفَر، نَفَح،
وَشَا. Suintement (F). Owing.

١٩٦٠ - رُشْدُهُ هـ القلائق ، ابله .

1961-62

١١٦٤١ - رُشْك
Bélsar (F).
الرُشْك دوية من المقارب تدوم عشرين ايام

١١٦٤٢ - رقم اول ما يظهر من التبت .

• ౧౬౬౬ - ౧౧౬౬౪

Commensalism (F). ١١٦٤٢ - رُسُونَةُ
Commensalism (E).
حالة المخلوقات الحية التي تعيش وتتغذى من غيرها.

١١٦٤٤ - وشيم *

Actinolema (S).
Actinolema (F).
جنس اعشاب حولية بيرة من فصيلة الخيميات . انواعه المشهورة قليلة العدد منها بعض اصناف الشرق الاذن ||
سوقها فراء تملو من ٤٥ الى ٧٥ ص . اوراقها متعاقبة ،
السفل ستانية اتصال عارضة للتسعين . العليا رجيعة الشكل ،
للأغاية الانياض . عارضة صولاني التسجيع ، تاجي
الريكان . اوراقها صغرة القند لينا الى الصغرة البات .

١١٦٤٥ - رَقِيبَةُ هـ. الأروثي، إيطاليا.

١١٦٤٦- وقیم هو الجرثیة ، اطلها .

Damage (F). Running (E). ١١٦٤٧ - رَمَى، مَبًى

هو رص القتراب أو طيه وقد يتم بواسطة الملاسة أو المسحاة
المطوية

Arrimage(F), Stowage(E), رَمِّى النَّفَاعَة - ١١٦٤٨

يداع البضائع وستعطا في حذر السفينة .

*0540 - 11749

١١٦٦٩ - رصادة

Tityra (S).
Tityra bicardis (F). Tityra (E).

جنس طير من الجائون وطيعة الناقور والطيعة. أنواعه الموصوفة نحو ٣ منتشرة في مختلف مناطق أمريكا الجنوبية. تتألف الطيائير وجميع على على الانجرار ترصد لاشترار لانقارها في اجسامها ريمة قطون من ٢ الى ٣ سم. اطيائها غطيلة الانقار تكثر على اللقطة والطيعة والسواد والياض. تتميز بمتنقها الضليمة وبذنانها المقمرة. قوتها اشترار على اختلاف انواعها وبعض الطيور العنيدة اشد.

١١٦٥٠ - وَمَا كَانَ

١١٦٥- رخصه، فلبم (F). Lead (E).
تأسس مستشفى العين، فلبم الرن، شيد البنية، سرج
الكافد من الملة الرطب. ريزو (P) ثقه النتي
١١٦٥، ريزو الاخي ٢٠١٩١ (يهره) ٣٣٤
س.ع. ويغل يمد الاحرار بين ١٦٥٠
١٨٠٠ س.ع. ورو لا يمد رن قنا في القلية بالاندا.
س.ع. الحلية مدينة الاشكال والاركيب تعرف بالاندا.
الى الدام الخسبة لغنامة الوربات ثقه والمكسيك
اسراله وكنا - رن كير الاسفال الصنعي اما
١١٦٥ - رخصه

١١٦٥١ - رَحَابِيَّات

Plombaginaceae (S). رصاصيات - ١١٦٥
Plombaginaceae (F). Plombaginaceae (E).
وصيلة نباتية من ذوات الفلتين وسيدات القمالة . أنوارها
لملونة زهره ٢٠٠ منبتها هام وظهور بمجر المناطق الحارة
المتنقلة . مظهرها عشبي وبضها ليني . أوراقها متعاقبة .
زهراها مثل النجم ، هام الإبتكاز .



رشاد



وَمِنْ أَشْأَاءِ



شالة



مَصَادِرُ

1١٦٦٢ - رُصَامَة، وَصْفٌ، وَحَاف Banc (F).

ج ارضة ووصف. Bench, Layer bed (E).

1١٦٦٣ - رُصَامَة

هو الحبار من القرد المقدسة ، اطلبه .

1١٦٦٤ - رُصَامَات Semnophthecidae (S).

Semnophthecidae (F). Semnophthecidae (E).

هي الحباريات فصيلة قرد من سفليات التخرن تشمل اربعة اجناس: الحبار والحور والزيك والقطرب .

1١٦٦٥ - رُصَامَة، كَدَه Talure (F). Graze (E).

حارض آلية تكل بالاجار في هياكلها الخشبية تقسب حسب اللحاء وتصينه .

1١٦٦٦ - رُصَامَة Consentement (F). Consent (E).

هو احزاب المرء من قبوله الارتباط مع غيره بقصد قانوني طوعاً واختياراً || وهو ايضاً احزاب المرء من الموافقة على حل الغير سواء كانت هذه الموافقة منطقياً بما ام مسكوتاً عنها .

1١٦٦٧ - رُصَامَة قطع الثلج والبرد .

1١٦٦٨ - رُصَامَة، اِرْصَاع Allaitement (F).

Nursing, Suckling (E).
التغذية بالحليب من الولادة الى النظام .

1١٦٦٩ - رُصَامَة Biberon (F). Bottle (E).

قنينة أو جهاز غاص صديد الثلمات وضع لارضاع ارباد الحيوانات عند تلمد الرضاع الطبيعي .

1١٦٧٠ - رُصَامَة البُكَر هي أم الحيات ، اطلبها .

1١٦٧١ - رُصَامَة، مَنَارَة، عَمَارَة، فُتَاح، زُرْبَعَة Emblavement, Emblavure (F). Wheat-sowing (E).

هو الحقل الذي كُرب وسمد وبلر وأثير أي دفن بذر .

1١٦٧٢ - رُصَامَة Acronychia (S).

Acronychie (F).

جنس شجيرات ونباتات برية وصربية من فصيلة السذابيات. انواعها المعروفة قليلة العدد ، منظرها لطبي . مهدا يتد من الهند الى ماليزية واستراليا || سقها فراه . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، شبه بيضبة الشكل ، جلدية النصال . ازهارها خضراء ، قصيرة التيجات ، رباعية التركيب . مبيضها رباعي الفصوص . ثمارها صغيرة ، جلدية السقذ ، لا تكفل .

أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

1١٦٧٣ - رُصَامَة رَائِصِيَّة Acronychia resinosa (S).

Acronychie résineuse (F).
مهدا الهند حيث يستعملون جنورها دلماً في معالجة داء المفاصل .

1١٦٧٤ - رُصَامَة عَطْرَة Acronychia odorata (S).

Acronychie odorante (F).
مهدا الكوششن حيث يستعملون براعمها كإدام .

1١٦٥٢ - رُصَامِيَّة، حَبَشِيَّة الأَسْطَن Plumbago (S).

Plombagine, Dentaire (F). Leadwort (E).

جنس نباتات عشبية ليلية برية طيبة من فصيلة الرصاصيات. انواعها عديدة تألفت البشوط البحرية . سقها فراه . اوراقها متعاقبة لمطوية صغيرة القد . ازهارها رصاصية اللون . تربتها وسيد التلال وأقل الخبي . يتلها خماسية الفلق . اشدتها ومالها وبسابع كمارها خماسية للتركيب . اشهر انواعها واعرفها ما يلي .

1١٦٥٣ - رُصَامِيَّة أُرُوبِيَّة Plumbago europaea (S).

Dentaire d'Europe, Malherbe (F). Toothwort, European leadwort (E). Europäische bleiwort (D). Dentalaria, Lappoline (I).
بجلة معمرة ، تلمد من ٣ الى ١٢٠ سم . فروصها مضطربة ، اوراقها معتقة ، اذنية . نصلها جامد النسيج ، مسن الحافة ، عايق الخضار . ازهارها مستقيمة لونها الى اليتلسمي . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

1١٦٥٤ - رُصَامِيَّة الرُوس Plumbago capensis (S).

Dentaire du Cap (F).
بجلة معمرة تلمد من المتر الى المترين . سقها ليلية سرعية سرعية اللحاء . فروصها متضبة . اوراقها لمطوية ، نصلها سرقني الصفة السلول . ازهارها صغيرة لند لونها الى الزرق الباهت || ازهارها يستمر في الصيف والخريف .

1١٦٥٥ - رُصَامِيَّة زُرْكَاه Plumbago corulea (S).

Dentaire bleue (F). Blue leadwort (E).
بجلة معمرة ، تلمد نحو المتر ، فروصها معتقة . اوراقها ضيقة ، ذائقة . ازهارها خضراء ، لنية ، كلفة التجميع ، زرقاء اللون || ازهارها صيني .

1١٦٥٦ - رُصَامِيَّة صَغِيرَة الزُّهْر Plumbago micrantha (S).

Dentaire à petites fleurs (F).
عشبة سولية تلمد نحو ٦٠ سم . مهدا سيري . تزدح لزين . ازهارها اربمانية صغيرة القد || ازهارها صيني .

1١٦٥٧ - رُصَامَة جَوِّي Observations météorologiques (F).

Meteorological observations (E).
الرصد الجوي هو ضبط العوامل الجوية المختلفة أهمها الحرارة ، والضغط ، وسية الرطوبة وكتبتا ، وقياس المطر ، واتجاه الرياح وسرعتها ، وسدة الاضام والسدم الخ .

1١٦٥٨ - رُصَامَة Larves des abeilles (F).

Larva of bees (E).
هو النحل في طوره البرقي الذي يتد من لفق المي الى نهاية الترق .

1١٦٥٩ - رُصَامَة

الرصع هو سداد الطائر (من كراع) ويقال راصع الطائر لئله . سادها (التاج) || والرصع هو البق ، اطلبه .

1١٦٦٠ - رُصَامَة نبات طبي يدعى الخضرية ، راجعها .

1١٦٦١ - رُصَامَة Solde (F).

Balance (between debit and credit) (E).
هو ما بقي من دين بعد حسم المبالغ المفقودة .



رصاصية أروبية



رُصَامَة

مسئلة الاطراف. انزهارها حشوي التجميع هجين القروع.
انزهارها حدية ، بيضاء اللون ، قرمزية الاطراف ||
تنويرها خريفي .

١١٦٨٢ - رُضَمٌ

رضع القنوة : كمرها . والررضع هو القنرى المروض .

١١٦٨٣ - رُضَمٌ

الرضع شجر قمرها الايل . الواحدة رضة (السان) .

١١٦٨٤ - رُضَمَةٌ * ، دَاحِشَةٌ
Rotula (F).
Patella (E).
النظم للمدور المتحرك في رأس الركبة . ج. رصف ورضفات.

١١٦٨٥ - رُضَمٌ ، كَرَبٌ ، زَرْعٌ
Emblaver (F).
To sow with wheat etc. (E).
حرث التربة وبعدها وبذرها .

١١٦٨٦ - رُضَمَةٌ
Pierre non taillée (F).
Unpered stone (E).
هي الحجر المستخرج من القلعب قبل تقميمه . وهي التذبة
للمسألة لبناء . ج. رضم ورضم .

١١٦٨٧ - رُطْبَاسٌ *
Aramus (S).
Courlan, Courliri (F). Courlan (E).

جنس طير من طول الساق وعضلة انفعلقات . انواعه
المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها
متوسطة القند ريشة القوائم ضاربة للفضاء الجالسة المستطيلة .
الوانها متراكبة الالوان التي تتراوح من الاصهب الصباني
الى الخفي الاصفر يعلوها تشيع زيتوني واورق . ومنها
حور الاحقاد . متاقبها الى الصغار الاخضر المواج .
اراسها جؤوية || قتها الحشرات والقصاصير الصغيرة
ويصيدها ويوزر النباتات النجيلية .

١١٦٨٨ - رُطْمٌ
Constipation
هو الاسساك عارض سببه اختلال في الجهاز الهضمي .

١١٦٨٩ - رُطَامَةٌ * ، لُكَّةٌ سَوْدَاةٌ *
Centrolophus niger (S). Centrolophus nègre (F).
Centrolophus niger (E).

سمكة بحرية يعيش من الاسقمريات شائكات الزعانف .
اصطادها معظم العالم البحر الايطالي المحيط وبعض مناطق
البحر الاطلسي || جسمها وشي الشكل يبلغ من ٣٠ الى ٦٠ سم.
حراشها صغيرة معينة . قمرها الى الصغار
الالاس الزيتي المواج ، يمتد فتحت سمته في الظهر وتقل
في البطن . راسها مستد الجرم ، مستفقس الارتكاز ،
قصير الخطم المستدير . عينها كبرتان جاسفتان . زعنفتها
الظهورية مستطيلة قاطبة عمدة . زعنفتها الثورية مستطيلة
قليلة العرض . زعنفتها الذيلية ذائقة || لحمها مأكول يراوح
بين الجيد والوسط .

١١٦٩٠ - رُطْبٌ
Dattes mûres (F).
Mature dates (E).

نضج البسر قبل ان يضر . الواحدة رطبة . ج. اوطاب
ورطاب .

١١٦٩١ - رُطْبَةٌ

هي القصة وهي نقل الروج . اطلبها .

١١٦٩٥ - رُضَمَةٌ غَارِيَّةُ الْوَرَقِ *

Acronychia laurifolia (S).
Acronychia à feuilles de laurier (F).

مهدا جايا . لحاء جلوعها مرة المذاق ، حارة ، تستعمل
في معالجة الاسهال والجذام .

١١٦٩٦ - رُضَمَةٌ *
Echeveria (S).
Echéverie (F). Echeveria (E).

جنس نبات عشبية معمرة من فصيلة الخلدات .
اوراقها ضيقة التجميع تنوعها الشاربغ الزهرية . انزهارها
خاسية البيلات النافذة الاكثار || قروع القرنين ضمن
البوت وفي الحدائق .
انواعها المعروفة متوسطة البدن ، انزهارها التالية :

١١٦٩٧ - رُضَمَةٌ بَهِيمَةٌ *
Echeveria fulgens (S).
Echéverie écaitante (F).

نوع من الرضبة . مهدا بعض انحاء امريكا الوسطى
والمكسيك . شراخها يرتفع من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها
ضيقة التجميع تطلق نحو ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم .
نصلها بحرية الخضار ، متواجبة الحمار . انزهارها حشوي
التجميع . انزهارها صفر القواعد وازرار الاول ، مرجانية
لامعة في الباقى || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى
نيسان .

١١٦٩٨ - رُضَمَةٌ جَبَّارَةٌ *
Echeveria gigantea (S). Echéverie géante (F).

نوع من الرضبة . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع نحو
٢٠٠ سم . اوراقها سانية الشكل تطلق من ٢٠ الى ٢٥ سم .
وتعرض من ١٢ الى ١٥ سم . نصلها بحرية الخضار ،
خلية البشرة . انزهارها عقودي التجميع . انزهارها عاجية
اللون مرققة بالاصفر || تنويرها خريفي .

١١٦٩٩ - رُضَمَةٌ حَاكِدَةٌ *
Echeveria secunda (S). Echéverie unilatérale (F).

نوع من الرضبة . مهدا امريكا الجنوبية . شراخها يرتفع
نحو ٣٠ سم . اوراقها اسطوانية الشكل تطلق نحو ٤ سم .
وتعرض نحو ٢ سم . انزهارها عقودي التجميع ، حادة
الارتكاز ، مقوس الشكل . انزهارها مستدة الحجم ، لونها
الصفرة الحمر المواج || تنويرها يستمر من نيسان
الى ايار .

١١٦٩٠ - رُضَمَةٌ قِرْمِزِيَّةٌ *
Echeveria coccinea (S). Echéverie écarlate (F).

نوع من الرضبة . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع من
٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مسطوية الشكل ، خلية النصل ،
ضيقة التجميع ، تطلق نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٣ سم .
انزهارها عقودي . بيلات انزهارها قرمزية اللون من الخراج ،
صغراء اللون من الداخل ، قمرها نحو ٢ سم . || تنويرها
صيفي .

١١٦٩١ - رُضَمَةٌ مُعَدَّبَةٌ الْأَزْهَارُ *
Echeveria gibbiflora (S).
Echéverie à fleurs gibbeuses (F).

نوع من الرضبة . مهدا بعض مناطق المكسيك . شراخها
يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها تطلق من ١٥ الى
٢٥ سم . وتعرض من ٧ الى ١٥ سم . نصلها بحرية الخضار ،



رضبة



رضفة



رُطْبَسٌ



رُطَامَةٌ

الزواحي. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٢٠ سم. ازهارها قرمزية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢٠ إلى ٢٥ سم. || تنويرها شوي.

١١٧٠٢ - رَطْبِيَّةٌ مُبْجَعَةٌ

Gasteria maculata (S). *Gastérie tachetée* (F).
نوع من الرطبة. ساقها قصيرة ترتفع من ١٢ إلى ١٧ سم. اوراقها لحمية، مشققة، متصببة، تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. نصلها غويوب الصفرة العليا، بتفصيلي اللون يملو تبيج ابيض. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها مرجانية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢ إلى ٣ سم. || تنويرها شوي.

١١٧٠٣ - رَطْبِيَّةٌ مُثَلَّثَةٌ

Gasteria verrucosa (S). *Gastérie verruqueuse* (F).
نوع من الرطبة. ساقها مقرة. اوراقها لحمية ثنائية الصف. تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٥ سم. نصلها مثالي البشرة على الصفيحتين العليا والسفلى. لون الاوراق الى الخضار اللتائم والتأليل الى البياض الداخري. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارها بياض الالتشاب والزام الاكل والثاني، وردية الزم الثالث، خضر الزام الرابع. قطر الزهرة يراوح من ٢ إلى ٣ سم. || تنويرها شوي.

١١٧٠٤ - رَعَادَة هَر الحبارى الاروية، اطلها.

١١٧٠٥ - رَعَادَات
Tropedidae (S). *Torpédidés, Torpédinidés* (F). *Torpédidae* (E).
فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق، اجناسها واوراقها عديدة اشهرها الرعادة.

١١٧٠٦ - رَعَادَة
Torpedo (S). *Torpille* (F). *Torpedo* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعادات، اوراقها عديدة تكثر في بحار البلاد الحارة جميعها مكهنة. اذا مسها الانسان خدرت يده وعنده حتى يرتد ما دام السلك حيا.

١١٧٠٧ - رَعَادَة الثيل هي فترة الليل، اطلها.

١١٧٠٨ - رَعَادَة مَبْدُولَة
Torpedo marmorata (S). *Torpille commune, T. marbrée* (F). *Cramp-fish, Numb-fish* (E).
سكة بحرية سرلو مفترسة من فصيلة الرعادات ورتبة الاشلاق. اصلاها البحر الابيض المتوسط وبعض اقلام المحيط الاطلسي وبحر الشمال. تعتبر من اسماك البجاج. مسرعا اسماك الثنائ. تتميز بجهاز طفلي خاص يتألف من الرأس من الجانبين واوراء مركب من مئات الموارير المسلة الزوايا والاضلاع تحمل كنوايح كهربائية يحيط تقريباها بياض للقر وقرواتها نحو المئة في الثانية. اذا مسها الانسان تخدر ويرتد || جسمها قريب الشبه بالشيفين، يطول نحو ١٠٠ سم. مسكها مائل القشار. ثوبها الملوي الى الخشن الاسمر يملو موج وردي عند الذكر وخشعة بتج مستديرة زرقاء اللون، يبيضه الطوق. بتج الاثني بحرية اللون، غراء الطوق، فها سفلى الاركان. شفاها متدل الانفراج. استاتها متتابعة الصفوف البدة. نياما تفران جانبيا. عيناها صغيرتان، سطحيان. زماقتها الظهوية اثنتان

١١٦٩٢ - رَطْل
Soupeur (F).
رفع الشيء يده تقديرا لوزنه. *To weigh in one's hand* (E).

١١٦٩٣ - رَطْل
وسدة من الموارير القديمة قدرها اثنتا عشرة اوقية. وهو بالنسبة الى الموارير المشرية، المتصلة حاليا في معظم البلاد العربية، يسوي ٢٥٠٠ غ.

١١٦٩٤ - رُطُوبَة
Humidité (F). *Humidity* (E).
حالة كل جسم او شيء رطب يحوي بعض الماء.

١١٦٩٥ - رُطُوبَة لَيْسِيَّة
Humidité relative (F). *Relative humidity* (E).

١١٦٩٦ - رُطُوبَة نَوْعِيَّة
Humidité spécifique (F). *Specific humidity* (E).

١١٦٩٧ - رَطْبِيَّة
Gasteria (S). *Gastérie* (F). *Gasteria* (E).

جنس نباتات لحمية مسرة صغيرة القد من فصيلة الزنبقيات. منتجا بعض مناطق افريقية الجنوبية. ساقها صلبة او جعدة او متصلة. اوراقها لحمية، قرصية مشققة. ازهارها متباينة الالوان || تزود لقرنين ضمن البيوت وفي الحدائق التي لا تحصى البرد. تزده في الارربة المتوسطة الانساج الوافرة الغطالية من عضوية ومعدنية. ازهارها كثيرة البند اشهرها ثنائية :

١١٦٩٨ - رَطْبِيَّةٌ أَيْبَقَةٌ
Gasteria pulchra (S). *Gastérie gracieuse* (F).

نوع من الرطبة. ساقها موزلة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. اوراقها لحمية، ماسية، مطلة الزوايا، تطول من ٢٠ إلى ٢٥ سم. لونها الى الخضار اللتائم يملو تبيج ابيض واجر. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها شوي.

١١٦٩٩ - رَطْبِيَّةٌ سَوْدَاة
Gasteria nigricans (S). *Gastérie noiretre* (F).

نوع من الرطبة. ساقها جعدة. اوراقها لحمية مشققة، شكلها شكل السان تطول من ١٠ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ إلى ٤ سم. لونها الى الخضار اللتائم السابق تلوو رقة بياض. ازهرها عقودي التجميع. زنادها يطول من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ازهارها الى الحمرة الزنجيرية السياه الموج || تنويرها شوي.

١١٧٠٠ - رَطْبِيَّةٌ كَطْرَة

Gasteria carinata (S). *Gastérie carinée* (F).
نوع من الرطبة. ساقها مقرة. اوراقها مشققة لبدة. نصلها لحمية، محرمة الشكل، مطلة الاصل الكثرة، تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. وتعلوها بعض التمثل الدقيقة. لونها الى الخضار اللتائم الخشن بالابيض. ازهرها عقودي متحلل الانشباب، زناده يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حراء اللون خرية الموج || تنويرها شوي.

١١٧٠١ - رَطْبِيَّةٌ لَامِيَّة
Gasteria luisante (F).

نوع من الرطبة. ساقها مقرة. ساقها مشققة تطول من ٢٠ إلى ٢٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ سم. صفحاتها العليا مقعرة ماسية. صفحاتها السفلى مخددة. لونها الى الخضار



١١٧١٣ - وَحَاشَتَاتٌ

Odonata (S). Odonates (F). **وَحَاشَتَاتٌ**
Odonata (E). Wasserjungfern (D).

رَبَّةٌ حشرات من الرِّبَسِيَّاتِ . اجسامها مستطيلة . رؤوسها كبيرة . عينها مركبة بارزة . قرونها الاستفشارية قصيرة ودقيقة . اجنحتها غشائية شبكية ، جرابها دقيقة . فصائلها وابنائها وانواعها عديدة تقسم الى مرتبتين : الرماشات الكبيرة والرمشات الصغيرة .

١١٧١٤ - وَحَاشَتَاتٌ صَغِيرَةٌ

Zygoptera (S). **وَحَاشَتَاتٌ صَغِيرَةٌ**
Zygoptères, Damselflies (F). Zygoptera, Damselflies (E). Gleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرماشات تتميز بأجسامها نحيلة مستطيلة . حورياتها تكتسب بنجاح دقيقة مركزها في مؤخر البطن . أشهر فصائلها الكتيبات .

١١٧١٥ - وَحَاشَتَاتٌ كَبِيرَةٌ

Anisoptera (S). **وَحَاشَتَاتٌ كَبِيرَةٌ**
Anisoptères, Libellules (F). Anisoptera, Dragonflies (E). Ungleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرماشات تتميز بأجسامها المستطيلة ورؤوسها الكبيرة المستعرجة . تكتسب بنجاح دقيقة مركزها جدار المستقيم الداخل . أشهر فصائلها البسويات والسرديات .

١١٧١٦ - وَحَاشَةُ الْفِيلِ

١١٧١٦ - وَحَاشَةُ الْفِيلِ هي قِطْرَةٌ قَلِيلَةٌ . انظروا .

١١٧١٧ - وَحَاشَةٌ Epistaxis, Saignement du nez (F). **وَحَاشَةٌ**
Epistaxis, Bleeding at the nose (E).

هو الأنف الذي يخرج الدم من الأنف . أسبابه عديدة انحصرت للنسب للنفث والقيء .

١١٧١٨ - زُحَامٌ ، سَكَاوَةٌ ، وَحَالٌ

Morve (F). **زُحَامٌ ، سَكَاوَةٌ ، وَحَالٌ**
Snot, Glanders (E).

مرض معد يسبب ذوات الحمار وقد ينتقل الى الانسان فيكون قاتلاً له .

١١٧١٩ - زُحَامَةٌ ، وَحَاشِيٌّ ، شَجَرَةُ الْمَسَافِرِ

Ravenala (S). Ravenala, Ravenala, Urnula, Arbre du voyageur (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة اللوزيات . ثغفه للوز ولانتل مما . مهبط مدسفر وما حولها من جزر المحيط الهادي . جلجها متعصب . اوراقها حلابة ، مروحية الاذنكاز ، قطون من ٣ الى ٤ امتار وتوفر نحو المتر . ازهارها عتقويدي التجميع . ازهارها يفس . ثمرها كابر صميكة القشور تغلف حدة بزور فضي الشكل فيه بالود القشورية المأكولة بعد طهيها ويطبخها . تقدرها صناعية يستخرج منها دهن نباتي لا يفس به . اما ميب تسبها بشجرة المسافر فيوجد الى اذنتها اوراقها الخاصة التي تغطف للماء زلالاً بارداً يروي حثث الكائنات .

١١٧٢٠ - وَحَيْلٌ

Anémomètre (F). **وَحَيْلٌ**
Anémomètre (E).

جهاز قياس سرعة الريح وحظها .

١١٧٢١ - وَحَيْلٌ

١١٧٢١ - وَحَيْلٌ هو الزعفران ، انظره .

١١٧٢٢ - وَحَيْكَةٌ

١١٧٢٢ - وَحَيْكَةٌ الرجلة : ويح لا تكدي معها لعم استقرارها .

١١٧٢٣ - وَحْشٌ

Balaustas **وَحْشٌ**
Balaustas (E).

زهر الزمان البري . واحدة ردة .

زعتلها الدالية مجذافية الشكل . شوارها الجني يتدكر بين الزعتلتين الحوشتين . مسكها جيد الصنف ، شائع الاستعمال الصناعي . لحمها بين المتوسط والكامن ، قل من يربط فيه .

١١٧٢٤ - وَحَاشٌ

Stomias (S). **وَحَاشٌ**
Stomias (F). Stomias (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرماشات . انواعه المعروفة من الآن خمسة ، اربعة منها مسرحة المحيط الاطلسي والمهادي ونوع واحد يقطن في البحر الابيض المتوسط . تتميز من املاك التناف والباحاج التي لا تقترب من سطح الماء ابدأ . اجسامها مستطيلة الشكل مضغوطة كالانقليس . رؤوسها عظيمة . عظامها طرية . اشداقها كبيرة قافرة . اسنانها متبادلة ، مستطيلة ، حجة ، حادة . تحمل في فكوكها السفل علبه او علبات متغايرة الاشكال . زعانفها الظهرية والشرجية طرية الاذنكاز متعاقبة . زعانفها الاخرى متبادلة الاذنكاز والاحجام . حورلغها سداسية او خماسية الاضلاع . الوطيا قائم يكثر فيها الكسني الجلوي للمواج والرماسي الارزقة المواج والاحضر الامس الاسود المواج . تتميز بما تحمله من عمول مضببة مبرمة على كامل سطح الجسم في أماكن معينة انحصرت الصفحة السفلى من الفك والظفر والذنب . اعرف انواعه واشهرها الرماطة الاصلية .

١١٧٢٥ - وَحَاشَةٌ أَصْلَبِيَّةٌ

Stomias boa (S). **وَحَاشَةٌ أَصْلَبِيَّةٌ**
Stomias boa (F). Stomias boa (E).

نوع من الرماس . سمكة بحرية بيوض . اصلها معظم العالم البحر الابيض المتوسط . تتميز من الاسماك الجبية . مسرحة الغاف التي يراوح فيها بين ٢٥ و ١٠٠ م . . اجسامها قريبة الشبه بالانقليس ، بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . توجها الى الرماسي الارزقة المواج تبق زرقته عند تيج الظفر وتقتف وتتصل الى شوية في البطن . رأسها قلاب ، مستطيل الشكل . الفس الخلف . فيها واسع الشفة الكبير . اسنانها متبادلة ، حجة ، ذرية . فكها السفلي يحمل علبه سوطية الشكل . عينها كيرتان ، حلوتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، بعيدة عن الرأس ، قريبة من الذنب . زعنفتها الدالية مزوانية الشكل . اجهزها السوي يتألف من بفس العمول المبرمة على سطح الجسم ومن صف من الاذنكاز الصغيرة المتشابهة الامداد بطرفه السطح السفلي من الجسم بحافة لذلك . لحمها متوسط الصنف ، كبير اللادة الزرقية .

١١٧٢٦ - وَحَاشِيَّاتٌ

Stomistidae (S). **وَحَاشِيَّاتٌ**
Stomistidae (F). Stomistidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مقوصات الخانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من املاك الاغواط والباحاج . اصلها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدة الحارة . اجسامها قريبة الشبه باجسام الانقليس . رؤوسها قلابية ، عظيمة ، متبادلة ، مقوسة ، حادة الاطراف . الوطيا تراوح من الزبداء الرمامية المواج الى الربداء الكسنية تتصلها اجزاء مضببة مبرمة على كامل سطح الجسم .

١١٧٢٧ - وَحَاشٌ

Tremblade, Tremblante (F). **وَحَاشٌ**
Quivering, Trembling (E).

مرض عصبي او ميكروبي يسبب التشنج .



ركة أصليّة



رعاة

أرجوانية يقطبها خط أبيض . كانوا وما زالوا يستعملون جذليهما في بعض المستحضرات الطبية .

١١٧٣٨ - وَحْيُوس * Nosodendron (S).

Nosodendron (F). Nosodendron (E).

جنس حشرات من فصيلة العرنويات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٤ الى ٧ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور ، مستطيلة الاضلاع . عيونها صغيرة . تأثيرها وعلامتها نظامية . قرونها الاستشعارية دبسية الاطراف . كواسلها صغيرة وعريضة . اغمارها لاحقة تملؤها حزم من الحلب الفلق الاصفر نظامي الخطوط الناعمة . قوائمها نشيطة . اثارها وسيدة اللون القاتم يكثر فيها الاسود والاكستني || تألفت الحراجل الكثيفة الشجيرات . تعيش على العصارة الصديقية التي تروشح من جروح السوق والاغصان . يرقاتها دلمة .

١١٧٣٩ - وَحْيُوسِيَّات * Nosodendrines (S).

Nosodendrines (F). Nosodendrines (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٨ م . رؤوسها مستعرضة القعن ، قليلة البروز . عيونها صغيرة . تأثيرها وعلامتها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبسية الاطراف ، خماسية الفصل . كواسلها قصيرة وعريضة . اغمارها لاحقة تملؤها حزم من الحلب ، نظامية الصفوف ، صفراء اللون . قوائمها نشيطة . ارسلها خماسية الشكل . تعيش على العصارة النباتية التي تروشح من جروح الاغصان والسوق . وحل المواد المنطحة يرقاتها دلمة || اشهر اجناسها العرنوس .

١١٧٤٠ - وَحْيُوب Plutes fines (F). Drizzle (E).

الاضطار الخفاف .

١١٧٤١ - وَحْيُ ، سَم ، سَوَم ، سَرَج Paltre (F).

To graza, To feed, To tend (E).

البرجح الماشية وسرورها لتأكل .

١١٧٤٢ - وَحْيُ الْإِبِل * Echinops sphaerocephalus (S).

Echinops commune (S). Echinops commune, Boulette commune (F). Globe thistle (E). Rlesenkugeldistel, Kugeldistel (D). Echinopo comune, Cardo pallirola (I).

وين اسماله مرغوليا شائعة ، شبه الجبال الشام ، ستاني . نبات عشبي بري من فصيلة المركبات الابيوية الزهر . يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفرويه وارواقه خضراء لينة . اوراقه عريضة الشكل قليلة الشوك . وريساته الزهرية سكورة ، قطرها من ٤ الى ٨ سم ، لونها الى الزرقاء الباهتة .

١١٧٤٣ - وَحْيُ الْحَمَام Varbens (S).

Verveine (F). Vervain (E).

جنس نباتات برية وريزية من فصيلة الساجيات . انواعه كثيرة العدد . سيقانها مفلعة ، عشبية او خشبية . اوراقها متعاقبة ، كاملة او مفروقة ، لائقة ، حاشية او معتقة واذينية . اغمارها سنبل او لوريه التجميع ، اغمارها صغيرة القعد ، عديدة الالوان ، عطرية البرف || احرف واشهر انواعه للتربية ما يتبع .

١١٧٤٤ - زَعْفَرَانِيَّة Caronule (F). Caruncle (E).

زائدة لحمية تكون على رأس أو عتق أو مقار بعض الطيور كما في الفيلك الحلي . ج . رعاش .

١١٧٤٥ - زَعْفَرَانِيَّة Barbillon (F).

Little barbel, Wattle (E).

زائدة لحمية مسطحة تشبه الزنقة تكون تحت فلق الفيلك ، وما يشبهه .

١١٧٤٦ - زَعْفَرَانِيَّة Pulicaria (S). Pulicaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه المروفة نحو ٢٠ جميعها نباتات عشبية حولية وعملية ، اوراقها لينة ، حاشية ، متعاقبة . اغمارها رويضة صفراء اللون . اشهرها زمرع ايوب .

١١٧٤٧ - زَعْفَرَانِيَّة * Pulicaria dysenterica (S).

Pulicaria dysenterica (S). Pulicaria dysenterica, Herbe de St Roch, Inule des prés (F). Common fleabane (E). Grosses flehkraut (D). Pulicaria svedese, Inula pratensis (I).

نوع من الزمرع البري مشهور بمقاومة الحلي . يسلح نساد اللدة ويقضي على الزحار .

١١٧٤٨ - زَعْفَرَانِيَّة * Secouer (F). To shake (E).

رض الريح الشجرة : سركها .

١١٧٤٩ - زَعْفَرَانِيَّة * Abeille mille (F).

Masculine bee, Drone (E).

هو ذكر النحل ، ويلى اليمسور .

١١٧٥٠ - زَعْفَرَانِيَّة * Troupeau de solipèdes (F).

Soliped drove (E).

الرجل ج ارمال هو القطيع من الخيل والحمر الوحشية .

١١٧٥١ - زَعْفَرَانِيَّة * Bourgeonner, Débourner (F).

To bud (E).

رمل الشجر والكرم : خرجت رمله اي برامه وزماته .

١١٧٥٢ - زَعْفَرَانِيَّة * Brouille (F).

Sprigs, Small-wood (E).

الطرف الغض لتاني من الكبرية . ج . رطل . والزينة هي نخلة .

١١٧٥٣ - زَعْفَرَانِيَّة * Graisse (F). Grease (E).

الزوم هو الشمع .

١١٧٥٤ - زَعْفَرَانِيَّة * Insolation (F).

Insolation, Sun-stroke (E).

عارض يصيب الحيوان وهو ضرب من الاحتقان الشمسي سببه تأثير الشمس في جبهة الحيوان .

١١٧٥٥ - زَعْفَرَانِيَّة * Danaë laurum, D. racemosa (S).

Danaë laurum, D. racemosa (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minstertraubchen (D). Pugnico a grappolo (I).

جنية برية وريزية تمل من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . روائها مستطيلة . اغمارها عذوقية التجميع غضراء اللون . غمارها

١١٧٥٦ - زَعْفَرَانِيَّة * Danaë laurum, D. racemosa (S).

Danaë laurum, D. racemosa (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minstertraubchen (D). Pugnico a grappolo (I).

جنية برية وريزية تمل من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . روائها مستطيلة . اغمارها عذوقية التجميع غضراء اللون . غمارها

١١٧٥٧ - زَعْفَرَانِيَّة * Danaë laurum, D. racemosa (S).

Danaë laurum, D. racemosa (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minstertraubchen (D). Pugnico a grappolo (I).

جنية برية وريزية تمل من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . روائها مستطيلة . اغمارها عذوقية التجميع غضراء اللون . غمارها

١١٧٥٨ - زَعْفَرَانِيَّة * Danaë laurum, D. racemosa (S).

Danaë laurum, D. racemosa (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minstertraubchen (D). Pugnico a grappolo (I).



زمرع ايوب



زحنا



زعرين



دعي الابل

١١٧٤٤- رعي الحَمَام الأُرْسِي

Verbena arnoides (S). *Verveine-arnois* (F).
حشبة حولية ، تملو نحو ١٥ سم . ساقها فروع . فروعها
انفية الانتساب نحيلة . اوراقها ثلاثية التفريش ، نصلها
خلي البشرة على مسطحه . ازهارها صغيرة اللد لا حار
منها لها الى الزرة الزاهية || ازهارها يستمر
من تموز الى آب .

١١٧٤٥- رعي الحَمَام الأَمْرِي

Verbena bonariensis (S). *Verveine de Buenos-Aires* (F).
حشبة معمرة ، تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبه
زخية . اوراقها لائقة . نصلها حشن للملس على مسطحه .
ازهارها مستطيلة زياه التويج ، لها الى الزرة الباحة .
ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٦- رعي الحَمَام الطُوقِيُونِي

Verbena teuroides (S). *Verveine germandrée* (F).
حشبة معمرة ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . فروعها
منزوية الانتساب ، انفية . اوراقها قصيرة المدق انفية .
نصلها مستطيل الشكل ، ذق البقعة ، منن الحافة ،
حشن اللروق ، خلي الصفحة السفل . ازهارها يرض
ثم لتصرف الى البردي . عرفها ليلي || ازهارها سني .

١١٧٤٧- رعي الحَمَام الكَبِيرِي

Verbena sulfurea (S). *Verveine jaune-soufre* (F).
حشبة حولية ، تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . فروعها
ضيقة الانتساب . اوراقها قدية التفريش خلية البصل ،
ملطه الاطراف . ازهارها خلية التويج ، كبريتية اللون .
ازهارها سني .

١١٧٤٨- رعي الحَمَام الكَنَدِي

Verbena canadensis (S). *Verveine du Canada* (F).
حشبة حولية ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . اوراقها
مستعرضة برفشة تطلو من ٣ الى ٥ سم . ازهارها قصيرة
مستعرضة ، قليلة البرق البلي ، لها يختلف مع فروعها
فيها الازرق والبنسجي والاريجوني || ازهارها يستمر
من تموز الى آب .

١١٧٤٩- رعي الحَمَام الحَنَزِي، بِمَاسْكُورِيُون، حَشْبَةُ الأَنْجَام

Verbena officinalis (S). *Verveine officinale*, *Herbe sacrée* (F). *Vervain*, *Holy-herb*, *Pigeon's-grass* (E).
Echtes eisenkraut (D). *Verbena officinale*, *Colombaria* (I).

حشبة معمرة ، تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . ساقها فروع .
فروعها منتصبه . اوراقها اهلجية مفرشة . نصلها أثقب
الصفحة السفل . ازهارها صغيرة اللد ودية اللون يوشوا
مولج اخضر || وهي من الاعشاب الكثرية للنانع الحشمة .
يستخرج منها بالتطهير طهور فائضة الصفه طرية
الاستعمال || كانت ولا تزال تستعمل لد البرق ولزيادة
القوة الجدية || ازهارها سني .

١١٧٥٠- رعي الحَمَام الحُطَطِي

Verbena venosa (S). *Verveine veinée* (F).
حشبة معمرة ، تملو نحو ٥٠ سم . ساقها منتصبه زياه
اللون . اوراقها لائقة نصف حاشية . نصلها حشن
الصفحة العليا ، الملس السفل خلي الباحة . ازهارها
فولحة العرف لونها الى البلي الازرق || ازهارها يستمر
من حزيران الى آب .

١١٧٥١- رعي الحَمَام

Endophyllum
جنس طهور مجهرية من فصيلة الرعيثيات . انواعه قليلة
تنتقل على بعض النباتات كتحذيا || اشهر انواعه الثلاثة
التالية .

١١٧٥٢- رعي الحَمَام الهَرَبِيُونِي

Endophyllum euphorbiae-silvaticae (S).
نوع من الرعيث يركب التولي حيث تستقل مشايه وتمنع
النبات حسن الازهار . يتم من مبيدو رائحة سطرية ذكية
وتقلص في غشار الورق . اما ذماتها فتركب الوراق
على مسطحها السفل || يكلف بمركبات النسل منه
ظهور عوارض اللوم .

١١٧٥٣- رعي الحَمَام التُكُونِي

Endophyllum valerianae (S).
نوع قليل الانتشار يتقل على السرق والاوراق ليؤذيها
ويمنع الازهار || يكلف باستعمال احد مركبات النسل
نفسها على الوراق عند ظهور عوارض اللوم .

١١٧٥٤- رعي الحَمَام حَي الحَمَام

Endophyllum sempervivi (S).
نوع من الرعيث يركب لاه الجلمن فينقلها بنبوه
الكروية الصغيرة البرتقالية اللون ثم يقرسها ويصلها
وقد يصب يلسها وينوا || يكلف بقتلح النباتات
المصابة ويتطهر البرية .

١١٧٥٥- رعي الحَمَام حَي الحَمَام

Endophylacae (S). *Endophylacae* (E).
فصيلة طهور مجهرية من رعية الحاميات تدعى بمشايها
للتضارة المتتابة فمن صفات بعضها السقلان . لاس
بوياتها دعائي الشكل التيي الانفصال || اجسامها
الاقتصادية قليلة . اعرفها الرعيث .

١١٧٥٦- رعي الحَمَام حَي الحَمَام

Odonoptera (S). *Odonoptera* (E).
طليقة سشرات قارضة مجنسة مستطيلة الاجسام . رؤوسها
كبيرة اللد ، حوتها بارزة . فروعها الاستعمارية شديدة
القص . رؤوسها مستطيلة ، غشائية ، كثيرة العروق
الاشكية . اقليها عديدة الااليان || نصلهاها واجسامها
واولهاها كثيرة اللد تضم الى رعيين : الطراوات والجليلات
ومن نصلهاها المشورة : النتيات واليسوسيات .

١١٧٥٧- رعي الحَمَام حَي الحَمَام

Bélemet (F). *Bélemet* (E).
صوت ذوات الخف .

١١٧٥٨- رعي الحَمَام حَي الحَمَام

Procellaria (S). *Pétrel* (F). *Pétrel* (E).
جنس طيور مائية من كليات طيور فصيلة البراقليات .
انواعه المروفة حمة جميعها متوسطة اللد فشطلة ترائق
البراقليات في سفرا حمة ايام الانتفاق بقايا اللطخ || اجسامها
تطلو من ٥٠ الى ٥٠ سم . اجسامها مستطيلة ذلقة
الاطراف . اذنتها قصيرة . منقايها ضيقة ، متوسطة
اللد ، لمطولية الصفحة العليا ، ضدة السفل ، مجنسة
النسار القدية . غنايتها واسعة اللدية . ارضائها كاتمة .
شثرة اصابعها كاملة تمتد حتى الخالب || قتها القشرية
ويشث الحيتان والاسماك . سرسها بجار البلاد الحارة ولزيادة
توم على الماء وتجوم فوقه ولا تقرب البر الا في زمن العفاد



رعي الحَمَام الطُوقِيُونِي



رعي الحَمَام الكَنَدِي



رعي الحَمَام الحَنَزِي



رعي الحَمَام حَي الحَمَام

١١٧٦٦ - رَعَاةُ جُرْمِيَا * Epinephle

Jurtina, Maniols Jurtina (S). Epinéphèle
Jurtina, Myrcil (F). Epinephle Jurtina (E).

حشرة من فصيلة المهابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأدنى الى اوروبا . فراشها جارية قوتها مفر الاضرار . سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ١٧ م . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م . رأسها صغير الحجم . صيهاا كيرتانا زياناها صوبانيان . جوشها كسني اللون صناعي الموج عند الاثن ، اسمره عند الذكر . بطنها ليد الحمل القصير يصل بحروب الجوشن عند الشقين . ورأسها كسنية ، سمرا الموج عند الذكر ، حطيت عند الاثن ، الزوج الامامي عند الذكر خصب بتقطة بيضاء المركز حطية الجولاب || لها جيل واحد في الحمل . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في التبار تماثل بعد ظهورها بشرة اسابع وتمتع الممكن لطعام السفل من نصال الاوراق || السرة تطل نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار . ثوبا الى الرعدة الصفراء الموج يملوها ثلاثة خطوط منها خط ذهبي وسطان جانبيان جميعها الى الخضار الداقي . رأسها اسود . شريحها مجهز بزاكدة مفلقة . مدنها ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة بين الجحالة وتمتها .

Terre sablonneuse (F).

Sandy soil (E).

Trachée-artere (F).

Windpipe (E).

Prémontion (F).

Pramontion (E).

لرقانة احساس يستقبل العمل ويشير به .

١١٧٧٠ - رَعَايَب Desiderata

١١٧٧١ - رَعَايَات Procellariidae (S).

Procellariidae (F). Procellariidae (E).

فصيلة طيور مائية من كليات القدم مسطليات الاجنح . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، اسطها منظر بحار العالم الى اوروبا . فراشها جارية قوتها مفر الاضرار . سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٤٥ م . رأسها صغير الحجم . صيهاا كيرتانا زياناها صوبانيان مسطليان . مرشفا حقيق الجسم . جوشها كسني اللون عند الذكر ، حطية عند الاثن . بطنها ليد الحمل يصل بحروب الجوشن عند الشقين . ورأسها ، عند الشقين ، الى الشقرة يملوها تبقي حطلي وتتقيد اسود وتبيض اسمر وتمتع الحبل || لها جيل واحد في الحمل . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في التبار . تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتمتع الممكن لطعام السفل من نصال البصيف || السرة عند بلوغها الكيال الجسموري تطل نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني ، ماس القشار . ثوبا الى الكهبة الخضراء يملوها خمسة خطوط عتائية منها خط ذهبي . رأسها جلوي اللون . شريحها مجهز بزاكدة مفلقة الى ثلثين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة تحت الجحالة ضمن غلاف ضوي المادة .

١١٧٧٢ - رَعَاة Artère mammaire (F).

Mammary artery (E).

حرق غليظ ينهي في الفسح يدر اللبن .

١١٧٧٣ - رَعْل

هو زمن لحام السنايل في الزرع . او عندما يحاوئ سنيل لزراع الاغلام .

١١٧٧٤ - رَعْل Ansrine (F). Goose-foot (E).

الزهر هو الاكينة ، نبات بري طبي . ج اذغال .

والخصن . انثاها تحضن بيضة واحدة نحو خمسة اسابيع . للذكور توين الغذاء .

اعرف انواعه :

١١٧٥٩ - رَعَاةُ الْبِكَلِيد ، فُلْئار Procellaria glacialis (S). Pétrol glaciel, Fulmar (F).

١١٧٦٠ - رَعَاةُ الْعُطْب Pétrol capensis (S). Pétrol du Cap (F).

١١٧٦١ - رَعَاةُ الْهَيْد ، حَالِيَة Procellaria hirsuta (S). Pétrol haise (F).

١١٧٦٢ - رَعَايَب ، رَعَايَب Permablis (F).

Permablis (E).

اوس رغب تأخذ الماء الكثير ولا تسيل الا من مطر كثير .

١١٧٦٣ - رَعَايَب ، رَعْب Permablis (F).

Permablis (E).

صفة الارض الرغب يبي قابلية نفوذ السوائل والغازات في التربة وفي غيرها من الاجسام .

١١٧٦٤ - رَعَايَب Ereos (S).

Ereos (F). Ereos (E).

جنس حشرات مائية قاصصة من غديات الاجنح وفصيلة التكروليات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الاصاوغ الباردة . تعيش في البحيرات والمنطق والاهوار ويباري الماء القليلة الانسياب . قوتها كل ما تيسر لها من مواد عضوية سبة كانت او ميتة || اجسامها متوسطة القد ، احليجية الشكل ، مستدلة الانحداب ، مجاذبة الجرايز الخلفية ، محيطة الامامية عند الذكور || رقاتها مائية قاصصة مؤذية -لا تفسد من سره السمك .

١١٧٦٥ - رَعَاةُ يَتُون * Epinephle

Epinephle uthonus, Maniols uthonus (S).

Epinéphèle uthon, Tithon (F). Epinephle uthonus (E).

حشرة من فصيلة المهابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد جميع المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية قوتها مفر الاضرار . سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٤٥ م . رأسها صغير الحجم . صيهاا كيرتانا زياناها صوبانيان مسطليان . مرشفا حقيق الجسم . جوشها كسني اللون عند الذكر ، حطية عند الاثن . بطنها ليد الحمل يصل بحروب الجوشن عند الشقين . ورأسها ، عند الشقين ، الى الشقرة يملوها تبقي حطلي وتتقيد اسود وتبيض اسمر وتمتع الحبل || لها جيل واحد في الحمل . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في التبار . تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتمتع الممكن لطعام السفل من نصال البصيف || السرة عند بلوغها الكيال الجسموري تطل نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني ، ماس القشار . ثوبا الى الكهبة الخضراء يملوها خمسة خطوط عتائية منها خط ذهبي . رأسها جلوي اللون . شريحها مجهز بزاكدة مفلقة الى ثلثين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة تحت الجحالة ضمن غلاف ضوي المادة .



رَعَاةُ بَيْرِن



رَعَاةُ جُرْمِيَا

١١٧٨١ - رُغِيَّة ٥

Rhyssa (S).

Rhyssa (F). Rhyssa (E).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة الاشرافيات الحافرات وصليبة التنسيبات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها دقيقة مستطيلة. اطولها الكاملة، من الرأس الى طرف المرنز، تراوح من ٨ الى ١٦ سم. انوثها مثابثة الاناثن لكثير فيها الشبهة الخفية بالاصغر || تتميز بصقلات الاجسام والرقائق والقوقام والمرازات. مرازاتها جميع تحترق الفكر والخشب تحترق من الحشرات الملقية لانها تنبت الككن في بطون يرقات الحشرات الملقية لتضيي عليها.



رغل

١١٧٨٢ - رُغِيَّة ٤، ميروم مَسَدَرْم ٥

Mésoderme (F).

Mesoderm (E).

الرغيلة في علم النبات الغلاف النشائي الذي يلفح الجباب وتلفحه القشرة || وفي في علم الحيوان (لرولوجية) انشاء الاصطاء بين البشريين الخارجية والداخلية.

١١٧٨٣ - رُغِيَّة ٣، سَمَر ٥

Apotomus latigens (S). Apotome brun (F).

Apotomus latigens (E).

حشرة قانصة من فصيلة الرغيات ورتبة غشائيات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم الممتدة الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف الموطن الريانية التي لا تخلو من العشب. غشائيات تعيش على الحوام والحشرات الدنيا والديان القليلة. يرقاتها تعيش في اولى مدها على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتباس من الحشرات والحوام || جسمها صغير القند يطول من ٥ الى ٦ سم. فوها الى السرة البنية السفاه. رأسها صغير الجرم، مستطيل الخيط، زباناها دوقان، مستطيلان. عيناه صغيرتان. ظهورها ثنائي التتخيد القندي القاطب. ارسافها خاسية القل || الاثن اصغر قفًا من الذكر واجبت ثوبًا من وقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع ويعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البقرة عند ادراكها انتم تطول نحو ١٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، تني اللون، اسمر الخيد، اغبر اللهب، اسود الرأس والشرح || طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يومًا وينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط سوزران.



رغيف أشعث



رغية

١١٧٨٤ - رُغِيَّات ٥

Apotomidae (S).

Apotomidae (F). Apotomidae (E).

فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة || جميعها صغيرة القند قلًا يتجاوز طول الواحدة منها ١٠ سم. رؤوسها اسطوانية الجرم، مستطيلة الزوايا المغارية الفصل. كواسها كاسية الشكل. اجسامها خلية القشار. الحامداها ثمانية الاغابيد القاطبة الخشوية || تسرح في النهار وتبيت في الليل. تسي بسرعة وشرقة وطير بشفة. قوتها ما تيسر لها من الحوام والحشرات الدنيا والديان || اشهر اجناسها الرغاية.



رُغِيَّة مَعْرَد

١١٧٨٥ - رُغِيَّة ٥، الرِفَادَة هي غشب السقف.

١١٧٨٦ - رُغِيَّة ٥، مَسَدَرْم ٥

Comprese (F). Comprese (E).

في الصبغة الملوحة البعيدة الطول التي تقسم بها الجرج.

١١٧٧٧ - رُغُل ٥، قَرْنِيَّة ٥

Vernonia (S).

Vernonie (F). Vernonia (E).

جنس نباتات عشبية جلمورية طيبة معمرة من فصيلة المركبات معقودة التبريف على اسم اليوناني فرزون || انواعها المعروفة عديدة. اصطناعها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدة الحارة || سيقانها خالية المصارة ترتكز على جذابير غليظة. اوراقها متعاقبة صلبة ضيقة متصل الجالده. ازهارها فردية، طريقة الازنكار، ويلبب نيسا اللون الازرقاني. بزورها خفيفة، مزوانية الشكل، خفدة، معمره || جلمودها دافئة الحسى، خفيفة ومباردة لقميد. اوراقها وازهارها تتصلل استمال الناي.

١١٧٧٦ - رُغُل ٥

Agneau, Chevreau (F).

Lamb, Small goat (E).

صغير النجمة او المعز لا يزال يرغل امه.

١١٧٧٧ - رُغُل ٥

Erg (F). Erg (E).

الرغنة اسم يطلق على كل منطقة صحراوية تشاه الكتيان المتحركة. اما المناطق الصحراوية المرتفعة التباد تسمى حادة.

١١٧٧٨ - رُغِيَّات ٥، قَسَمَاحَة ٥

Rhagonycha (S). Rhagonyche (F).

جنس حشرات من فصيلة الدواحيات ورتبة غشائيات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصطناعها الشرق الاوسط واروبة. جميعها مستطيلة الشكل، صغيرة القند. اطولها تراوح من ٧ الى ١٨ سم. انوثها غشيلة الاناثن اكثر فيها الاصغر والالتهيب الخراج بالاضل او الازرق او الالاصد || تسرح في النهار. التطير في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. مرازها الازهار || يرقاتها تبارية مفرسة تقضي على معظم الاساريع وتعطيا بنشاط.

١١٧٧٩ - رُغِيَّات ٥، أشعث ٥

Rhagonycha fulva (S). Rhagonyche roux,

Rhagonycha roux (F). Rhagonycha fulva (E).

حشرة واشعة غاشلة من فصيلة الدواحيات ورتبة غشائيات الاجنحة. تألف الموطن التي تكثر فيها الازهار واخصها الازهار الربية. غشائيات تعيش على بتلات الازهار ورسيقها. يرقاتها تعيش على المواد المضوية وعلى ما تقتريه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القند يطول من ٧ الى ١٠ سم. ثوبا الى الشبهة الصفراء يقيم على اطراف الظهران. رأسها صغير الجرم. زباناها عيطيان. عيناه صغيرتان. ظهورها لا يلفح كامل البطن. بطنها اسفر اللون، معظمه اللطوف. ارسافها خاسية القل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواسط تموز. تسرح في النهار. تساقط بعد ظهورها بثلثة اسابيع. تنبت الككن تحت التلع والحجارة والجلافة || البقرة عند بلوغها الازدراك انتم تطول نحو ١٨ سم. جسمها مبطل الجرم، اسمر اللون، حشلي الخراج، سداسي الزوايا السمر، مستطيل الرأس الجلوي، ضليح التأثير، مدبب اللطوف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يومًا ينتهي في القرية.

١١٧٨٠ - رُغُوَّة السَّحَر ٥

Magnésie(F). Magnésit (E).

في سيليكات المغنيزيم الطبيعي يستعمل في عدة صناعات دقيقة.

١١٧٩٨ - رَقْلَانِيَّات * Melanconiales

مرتبة تطور مجهرية من رتبة الزويعات تتميز بكتلتها الكثيفة في السرفولة. فيها عضون الجوانب يكتشف جمل دقيق قصير. اجناسها عديدة تجمعها فصيلة واحدة تدعى الرقليات.

١١٧٩٩ - رَقْلَة * Melanconis

جنس تطور مجهرية من الرقليات يتميز ببطء الشفاف لثنائي الخلية. له نوع واحد يحم الاقتصاد الزراعي ينسب رقة الكسنة.

١١٨٠٠ - رَقْلَة الكَسَنَة * Melanconis

Melanconis modonis, M. perniciosum, Fusilcoccum perniciosum, Coryneum modonum, C. perniciosum, C. kunzei castaneae (S).

فطر مجهرى يصيب احضان الكسنة فيؤذيها ويصيب يابسها. مظهره الخارجي يقع منخفضه مسطحة مدببة افراس والحطب بارزة الحافة تركيب لحاء الاضنان فضيت اخلايا وتقل الاوعية وتغرل سير اللسغ وتبادل. وقد تقضي عليه عندما تطرق النمن فتقبل الاوراق وتبنيها الاثنان والاثناد والنمن. يكافح بقطع وسرق احضان المبروة ثم تطهير الجروح بحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس.

١١٨٠١ - رَقْلِيَّات * Melanconidaceae (S).

Melanconidaceae, Melanconidaceae (F). Melanconidaceae, Melanconidaceae (E).

فصيلة تطور مجهرية من الرقليات ورتبة الزويعات تتميز بوسيلة جنية جلدية تقوم على جعلها احضان غليظة طليقة. بعضها غروطي او اسطواني او غيبي الشكل ثنائي الخلية، شعبي الوشرة المتفرعة. اجناسها المؤلفة ١٦ البسلاوزيه، البوليسوريه، الرقة، السيلفولوم، البسليوكسة، السجبة، السيليسوريه، السيلندروسوريوم، القنيسمة، الكريبتوسوريوم، الكورينديوم (الرقة)، اللصوص، الليبريللا، المرسيونه، الميكسوديوم والتيموسوريه.

١١٨٠٢ - رَقْل * Mammite (F).

Mammitis, Mastitis (E). نوع من الالتهاب وهو مرض يصيب الفرج فيؤذي.

١١٨٠٣ - رَقْلَة Consorts

الشركاء في المصير، اصحاب المصلحة الواحدة.

١١٨٠٤ - رَقْل * Penna (F).

Feather of the tail or wing (E). كل ريشة غليظة طويلة من ريش ذنب الطائر ورجسها. ج. رَقَال.

١١٨٠٥ - رَقْلِيَّات Rafflesiaceae (S).

Rafflesiaceae (F). Rafflesiaceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، عديمات الضامات، مستغضفات المبيض. اجناسها وانواعها قليلة جميعها اصحاب استوائية اللينث طليقية تركترك وتقوم على مشرة ليفية تلتبب في لحاء حوائلها.

١١٨٠٦ - رَقْلِيَّة Rafflesia (F).

Rafflesia (E). جنس نباتات مشبية طفيلية من فصيلة الرقليات. انواعها ثلاثة، بعضها قصيرة مدادة. اوراقها حشوية. ازهارها لحمية كبيرة اللند. قطرها نحو المتر. وزنها ٧ كيلو. بتلاتها رباعية يضاء اللون، قرمها اخر قرميدي تفوح منها رائحة كريهة لا يقربها شيء.

١١٧٩٧ - رَقَال * Emasculation des fleurs (F).

Emasculation of flowers (E). اقتطاع تلك الزهر منأ تاييره منها.

١١٧٩٨ - رَقَال، صَيَّاد السمك Ceryle (F).

Ceryle, Kingfisher (E).

جنس طير من القرقليات، انواعه ١٤، موطنها الماء. يتكر ويصيدها في المناطق الخالية والممتلئة. يتميز بمناظريها القوية المسطحة، وابجنتها المتوصلة اللند، باذانها المرصفة المستديرة وباصفاها القصيرة. الواجهات متعددة الاالوان لكنها بين القردل ورقفا وزمعا. انها تدر في صعوخ السمور. تبيض ٧ ببيض تحضنها وحدها من ال ١٤ الى ١٦ يوما. احرف واشهر انواعها ما يلي.

١١٧٩٩ - رَقَال السَّيْل Ceryle alcyon (S).

Céryle-alcyon (F).

طائر من القرقليات، طوله يراوح من ٢٩ الى ٣٠ سم. لونه رمادي اللون ازرق المواج. صدره مشع بالازرق. يلمه اميض حلي. جنتاه مرتفذان بالابيض. ذنبه غيق الرقة الماجية. قوته الاسماك والقشريات والصفادخ والورق والجنادب والجراد.

١١٧٩٠ - رَقَال شامخ Ceryle rudis (S).

Céryle-rudis (F). Pied Kingfisher (E).

طائر من القرقليات، طوله نحو ٢٧ سم. رأسه قنري الريش المسطح. لونه ابيض الظاهر، اميض البواطن والصدر والبلن. صدره مطقان بقلادتين نصفيين لونه الى السرة الفصحية. موطنه آسيا الغربية وافريقية الشرقية والبالية. يالاف القشوط البحرية ويرب الانهر ويجاري الماء. قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والصفادخ والحشرات اعصها الجنادب والجراد.

١١٧٩١ - رَقَش Pelle (F).

Shovel (E). اداة يستعمل لجرف التراب ونحو.

١١٧٩٢ - رَقْع، لَزَاكَة Matolevée (F).

Replevin, With drawal (E). هو رفع سجن او ابطال فمليه رهن مقاري او مقايمة سجن في قضية.

١١٧٩٣ - رَقْع، تَحْل Dérangement (F).

Dialtering (E). اخرج الشيء من التربة كاهراث في آخر التلم واربوية الشجرة والجذور المقطوعة الخ.

١١٧٩٤ - رَقْع الاعتِاق Levée de scellés (F).

Take of seals (E). عمل يقوم به القاضي المختص فيترع الاعتام التي اصفاها بعد ان يتحقق من صلاحتها.

١١٧٩٥ - رَقْع الفِركَيب Dégrièvement (F).

Reduction, Allowance (E). هو ان ترغع الضريبة او تخفف من المكلف.

١١٧٩٦ - رَقْع اليَد، كَفَّ اليَد Démiselement (F).

Parting with (E). هو الاستئاع او المنع من ادارة مال او عين.

١١٧٩٧ - رَقْع هو تبين القرة.



رقال شامخ



رقة الكسنة

Non rustique (F). No rustic (E). **١١٨١٥ - رَفْثَة**
تمت ترجمتي يطلع على النباتات المطلوبة التي تستعمل
التخصص في التربة والغنية والمليح.

١١٨١٦ - رَفْثُوج هو اصل كبري للتلح.

١١٨١٧ - رَفْثِيل * Parodia, Stilet (F).

طار من الجوانب نباتات المناظر ونباتات الفروسيات. موطنه
جنوب الهندية. يألف النباتات قوية الحشرات والاساريع
والقديدان والآفات العنيدة واليزور البرية || جسم صغير
القد يطلع من ١٨ الى ٢٠ سم. ثوب الذكر الى السواد
الحلي الاحمر اللامع. زوره وصدور وقدم الاسفل من
عصريه الى الصغار النحاسي الاسمر. رأسه متوج بست
رفال دقيقة مستديرة تكسيه بست سطحات صغيرة نحاسية
اللون. الاثني حادة الزرقاء وثوبها البولي الى الشحنة
السراة. زودها وصدورها وبقايا الى الشحنة الصهباء.

١١٨١٨ - رَفْثِيح Turgide (F).
Turgid, Swollen (E).

تمت ترجمتي يطلع على اعضاء الحيوان واثبات التي تتورم
تلقائياً لو عرضاً تشبه ركانتها رافعة.

١١٨١٩ - رَفْثِيل هو نظرية القرويات، المطالب.

١١٨٢٠ - رَفْثِيذَة Fleure (F). Fleure (E).

الرغبة وتسمى الرباط الجنبي، غشاء يصنع بين الترجمة
والقوية اي الزوفين عند الحشرات.

١١٨٢١ - رَفْثِيذَات * Raphididae (S).
Raphididae (F). Raphididae (E).

نصيلة حشرات مفترسة من رتبة شبكات الجناح. اجسامها
المعروفة قليلة المد، اما الانواع انصر ٨٥ منتشرة في
معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة
القد، شبه اطيالية الشكل، تطلع من ١٠ الى ٢٠ سم.
بسطة اجسامها تتراوح من ١٢ الى ٣٠ سم. رؤوسها ناعمة.
جهازها القوي نظامي. اذناها مستعرض. جفاتها مستطلة.
تاكثيرها قليلة للثوب، مجهزة بلسان قوي. ملاسها مركبة،
الفكية رابطة الاجزاء، المشغولة لثامتها. قرونها
الاستشعارية قصيرة ونحيلة. عيونها جانبية. زانها صغيرة،
ثلاثية. كواسلها مستديرة. اجسامها شبه مثاقلة. يطلعها
مخادبة السم. مرازات اثنائها مستديرة، مبطنة || تألف
الحراج والنباتات. جميعها رافعة، لامة في دورها البري
والحشري || اشهر اجسامها الرفيدة والبنقة والاثولة والاسنة.

١١٨٢٢ - رَفْثِيذَة * Brenthos (S).

Brenthos, Brenthe (F).
جنس حشرات سوسية غاشية من عفايات الاجنحة ونبات
البرقيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق
الحارة من الماين القديم والحديث || اجسامها غرضية
الشكل، مستديرة. رؤوسها دقيقة، عظمها غائرة
اللون، متنفقة القدم. قرونها الاستشعارية غليظة،
محسنة، تنقب عنه طرف الخيط، قبل انتقاله الى قوتها
المواد الحشوية. تألف النباتات وتعيش تحت لحاء الانجار
القابلة والميتة.

Ceufs des rapaces (F). **١١٨٠٧ - رَفْثَن**
Eggs of rapacious birds (E).

الرفن : بيض كواسر الطير اعصاها المتعبان. الواحدة رَفْثَن.

١١٨٠٨ - رَفْثَنَاء، اِرِيْتَنُوس Erianthus (S).
Erianthe (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة النجيليات.
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها واحد زراعي رئيسي.

١١٨٠٩ - رَفْثَنَاء الحَدَاكِي * Erianthus ravennae (S). Erianthe de Ravenna, Canne

de Ravenna (F). Plum-grass, Ravenna-grass (E). Woll-
zucker, Ravenna seidengrass (D). Erba ravenna (I).
نوع من الرفثاء وهي عشبة ثريبتية معمرة، تطلع من المتر
الى المترين. ساقها ليفية. اوراقها جامدة، صلبة،
ذائقة، بتفسيخه اللين. ازهارها حذوكي التجميع عري
الشكل يطلع نحو ٦٠ سم. ازهارها ثوبها بنفسجية ثم
تتحرف الى الالبيض || ترغب في التربة الكلسية القليلة
الرطوبة.

١١٨١٠ - رَفْثِي Ové (F). Oves (E).

تمت رمي يطلع على كل شيء شكله شكل الرنة اي
البيضة.

١١٨١١ - رَفْثِيَة Rafnia (S). Rafnia (F).

جنس نباتات معقوفة التعريف على اسم العلامة اليوناني
الدائري « رَفْثِي ». انواعها ٢٢ جميعها معمرة، معظمها
بري وبعضها رئيسي. موطنها افريقية الجنوبية، منها
الجبنة والجبلة. وهي تنتمي الى فصيلة القرويات الفرغاشية.
اوراقها بسطة كاملة. نصلها وسيد العرق. ازهارها
لا قياسية التجميع والارتكاز. كواسيها خاشية للتخصص
للانتمالي. قرونها فراشية الشكل، راياتها مستديرة،
يطلع فيها اللون الاصفر. ثوبها سطحي جالس. زورها
مستطلة مغلطمة || تتكاثر بالزهر والمقل. ترغب في
التربة الدنيابة القليلة الانساج، الزائرة النمر الضوي
المتمثل || اشهر انواعها الرَفْثِيَة الثلاثة التالية.

١١٨١٢ - رَفْثِيَة [هَلِيلِيَجِيَة] Rafnia elliptica (S).

نوع من الرَفْثِيَة وهي جبنة صغيرة تطلع من ٤٠ الى ١٠٠
سم. قرونها مزاكية شمشية. اوراقها اطيالية الشكل
تطلع من ٥ الى ٨ سم. نصلها بحري اللون ذي الزام
الاجنبي. ازهارها محورية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع
صفرها اللين || ازهارها يستمر من اواخر ايار الى
اوائل تموز.

١١٨١٣ - رَفْثِيَة ثَلَاثِيَة الاَزْهَار Rafnia triflora (S).

نوع من الرَفْثِيَة وهي جبنة ثلثانية الشكل تطلع من ٦٠
الى ١٢٠ سم. قرونها ممشية فارفة. اوراقها بيضيه
الشكل مستديرة القاعدية، صلبة الحرف. نصلها بحري
اللون، عاكب المراج غليظ من ٥ الى ٨ سم. ازهارها صفراء
اللون محورية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع || ازهارها
يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز.

١١٨١٤ - رَفْثِيَة مَقْرَنْكَة Rafnia angulata (S).

نوع من الرَفْثِيَة وهي بجلة معمرة تطلع من ٣٠ الى ٦٠ سم.
قرونها مقترنة الزوايا، غائرة، ممشية. اوراقها غرضوية
الشكل تطلع من ٢ الى ٤ سم. نصلها بحري اللون صديج
المقمنة. ازهارها الى الصفراء الكبريتي || ازهارها يستمر
طوال شهر ايار.



رفثاء الحدائق



رفثيل



رفثية

١١٨٣١ - رقائق متفعل Haut-fond (F).
Shoal, Shallow (E).
سهل قليل النور.

١١٨٣٢ - رقائقه Funaria (S).
Funaire (F). Funaria (E).

جنس طحالب من فصيلة المصريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منها البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. جميعها من الطحالب الشطئية الحولية التي تعيش في التربة. بعضها دقيقة صغرة تنتمي بأكياس البوغ الحولية الشكل. سراسنها متراكبة تملأ أسافل السوق. يكثر وجودها قرب مشاعر القمم.

١١٨٣٣ - رقائقه Cartographie (F).
Chartography, Mapping (E).

الرقطة فن رسم الخرائط الجغرافية.

١١٨٣٤ - رقائقه حصيلية Cartographie pédologique (F).
Soll Mapping (E).

فرع من الرقطة يختص بوضع الخرائط الحصلية.

١١٨٣٥ - رقائقه Cartographique (F).
Chartographical (E).

نمت تعريفية يطلق كل ما له علاقة بالرقطة.

١١٨٣٦ - رقائق Trichilla (S).
Trichille (F). Mafurabum (D). Trichilla (I).

جنس الحجار ومجترات برية وزراعية من فصيلة الازديشيات. أنواعه المعروفة زهاء ١١٢، أصنافها البلاد الحارة والاستوائية سيقانها جالسة. أصنافها مغترسة الانتشار. أوراتها مركبة وتزيه يكثر فيها التثليث. أزهارها عكوكلي التجميع محوري وطرفي الارتكاز. أزهارها كبيرة القدد عطفلة الاوان لا تقاسم الانتظام البلي || أشهر أنواعها ما يتبع.

١١٨٣٧ - رقائق زغب Trichilla hirsuta (S).
Trichille bois de fer (F). Bestard Iron wood (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٤ أمتار، أوراتها مركبة خاسية، وريقاتها لا قياسية الشكل، نصلها أزغب الصفحة السفلى. أزهاره عكوكلية التجميع، خلية البشرة، هاجية اللون. غشيه شديد الصلابة، اسمر اللون، قلمع الصفص || أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٨٣٨ - رقائق امردة Trichilla glabra (S).

نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٦ أمتار. أوراتها مركبة ثلاثية. وريقاتها لائفة يضيئة الشكل مقطوعة القاعدة مدببة الطرف. نصلها جامد الصفص: جميل الخضار اللامع. أزهاره عكوكلية التجميع مظللة الشكل، لونها الالباض العاجي. أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٨٣٩ - رقائق امريكي Trichilla spondiodes (S).
Trichille tendre (F). White butter wood (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٦ أمتار، غشها اخضر اللون، قليل الصلابة، سهل الانطاف. أوراتها مركبة لا قياسية التجميع، وريقاتها تعد ٧ أو ٩ أو ١١ وهي اعطليدية الشكل مدببة الطرف. نصلها جامد الصفص الملساء، جميل الخضار الزمعي || أزهاره صفراء اللون، تبنيه اللولج، كثيفة التجميع، محورية وطرفية الارتكاز. أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٨٣٣ - رقائقات Branchidae (S).
Branchidae (F). Branchidae (E).

فصيلة حشرات سوسية الشكل من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها غشيب وبعضها يعيش برقة النمل في جلوج الاشجار القديمة النشرة || اصنافها البلاد الحارة والاستوائية || أشهر اجناسها الرقطة.

١١٨٣٤ - رقائقشور، رقائقشور، رقائقشور Raffinose, Mélitose (F).
Raffinose, Melitose (E).

ضرب من السكر، يوجد خاصة في ثفل الشندر وفي الجزر وقد يستخلص من بعض انواع الاروكاليبتوس. بلوراته ابرية الشكل لا قياسية الرسم.

١١٨٣٥ - رقائق Chelys (S).
Chélyde (F). Chelys (E).

جنس سلاح من فصيلة الرقيات. أنواعها عديدة، جميعها مقترنة، كبيرة القدد، طولها يراوح من المتر الى المترين. رؤوسها مفلطحة، اصنافها مستطيلة سفينة الجمل. ذيلها قليل الاحدياب، قرة عربي الشكل بين التنديد || قوتها الاسماك والقرشيات والقشادع والقرير والوزغ والحيات وهي من السلاحف البدوية التي تسرح في الليل. تعيش في المياه العذبة وعلى غشاق الانهر.

١١٨٣٦ - رقائقه Contrôle (F).
Control (E).

١١٨٣٧ - رقائقه Crithagra (S).
Crithagre (F).

جنس طير من الجوامع غروبويات التأثير وفضيلة الششروبويات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اصنافها معظم المناطق الحارة من البلاد الافريقية. ملجئها الحياتي جامي. اسرارها مغلفة الجلد. تألف الثنايات والبراري والمخلول المزدببة. قوتها الحبوب والبروز والخرشات الصغيرة حل اغطالها || اجسامها صغرة القدد قلبية الشبه بالعمودي، تعلو من ١٣ الى ١٦ سم. ألوانها مزودة ونيقة يكثر فيها الاصفر والابيض والاشهب. مناقبها خروطية، قوية. اجنحتها كبيرة. اذنانها مقعرة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها رقائق الحبيشة.

١١٨٣٨ - رقائق الحبيشة Crithagra abyssinica (S).
Crithagre d'Abyssinie (F).

طائر من الرقاق. موطنه بعض مناطق الحبيشة. يألف الثنايات والبراري. ملجئها الحياتي جامي. سره يبد اكثر من ١٠٠ زوج. قوته الحشرات والحبوب والبروز || جسمه صغير القدد تعلو نحو ١٥ سم. رأسه الالفسار الالفس. دفاؤه وذيبه الالفسية السمره. صفراء وزودو الالفسه. جناحها الالفسية يملوا تدبج اخضر. بطنه الالفسية المصانة اللولج. ذنبه مقعر الطرف || الاثنى اصفر قدد من الذكر واقل تزويجه منه || يذئن في الاشجار ويركره منه عند تصالب الاناث. الاثنى تحضن بتناوبة الذكر من ٣ الى ٥ ويضات حل ثلاث او اربع مرات في الحبل.

١١٨٣٩ - رقائقه Commerce des cortéales (F).
Corn-trade (E).

هي التجارة بالمحاصل الزراعية.

١١٨٣٠ - رقائق الشبكه Hibernation
فتور الحية وانتكاشها بعض اليت في الثنايات وفي بعض الحيوانات والورديات || وهناك ايضاً الرقاق الصغي المعروف بالشمود الصغي، اطلبه.



رق



رقاق الحبيشة



رقاقه

صغيرة غروطية. اضطهادها ذلقة، مستلة انفراج الشفق. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة تمتد حتى الذيل. الصدرة مستعرضة. الحوضية محرمة. الذيلية ثاقبة، حلالية الشكل. لحوبها مأكولة متوسطة الصف.



رياح قائل

١١٨٤٦ - **رياحيات** *
Malacanthidae (S). *Malacanthidae* (F). *Malacanthidae* (E).

صلة اسماك بحرية بيضة من شاكيات الزعانف. اجسامها وانواعها الممرقة قليلة المد اعطائها بجار البلاد الحارة || اجسامها مبطلة، مستطيلة، شبيهة، تطول من ١٨ الى ٢٦ سم. تتميز بهيكلها الشديد الصغر المهدب، وبروسها الصغيرة الغروطية الشكل. الذيلية الى النملة السمره الفضية الملوحة || اشهر اجناسها الرقاقة.



رقاقة

١١٨٤٧ - **رياحان** *
القن: الحناء والقرصان.

١١٨٤٨ - **ريكة** *
Fascia (F). *Faggot* (E).
الريكة والصناعة والكيش: اغشاب باضمان واشباب توضع في مجاري الماء لاضراس الحبل الطبعي والتحويل بعض الماء الى مجرى آخر.

١١٨٤٩ - **ريكة** *
Malilure (F). *Speckles* (E).
ريكة مستديرة تتألف اللؤلؤ السادة تكون على اجنحة البعير.



ريكة الاجاس

١١٨٥٠ - **ريكة** *
كورنيوم، كورنيوم، كورنيوم.

Coryneum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقائيات. انوله حادقة منها مؤذية وبضها شديد الاتي || ويسته كتيبة محصورة للشا، مجنة او عسلة الشكل، ككائده كروية او شبيهة مستطيلة، غشبية الانقسام، مقفورة. لونها الى الصبغة الخفيفة || احرف ولشور انوله ما يلي.

١١٨٥١ - **ريكة الاجاص** *
Coryneum folitolum (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الاجاص واقتطع وقد يصيب الجار والانادان || مظهره الخارجى يقع لا قياسية الشكل فهو سمره اللون ثم لونية تلوخ باللون المتناحرة التي تبس وتتيزق || وهو على الجار يثور مبشرة ترسة السطح تركب البشرة وتكون في لب قنصته || يكالغ كثير من الفطور المؤذية.



ريكة الوزيات (١)

١١٨٥٢ - **ريكة الوزيات** *
Coryneum baijeri (S). *Criblure des amygdalides* (F). *Blight of stone fruits* (E). *Dörrfleckenkrankheit des steinobstes* (D).

فطر مجهرى يصيب اكثر الوزيات منها اللوز والكرز والقدراون والمشمش والوخوخ || مظهره الخارجى يقع صغيرة لونها الى الحمر، اطرافه اسمر التهدب، قنصته يراوخ الى ٢ الى ٥ سم. تركب فصل الادراق خذبل السطح المتناحرة وتسبب يأسها واختها ونحجا || وهو على الانادان والانادان يثور لملوية قروية، تركب السطح قنصلها وتقرقل مير السطح في الامية || وهو على الجار يثور صغيرة مستديرة مقفورة السطح، كتيبة التجميع، لونها الى الملوحة ثم يتحول الى الاسمر. تركب البشرة قنصته وتصلب سطح اللب || افزاره لا قياسية القنص والتناحج لانها مخرقة ببولام شى تنود الى البرية والمخج والمناخ والاقليم || يكالغ باستمال سائل يورود او غيره من الفطور الحديثة.



ريكة الوزيات (٢)

١١٨٤٠ - **رياح عطر** *
Trichilia odorata (S).
نوع من الرياح، شجيرة تملو من ٥ الى ٨ امتار. اوراقها مركبة خماسية. ورقياتها اوليجية الشكل، تصالها جيل الخشار يطول من ٦ الى ١٥ سم. ازهارها طرفية الارتكاز، مستطيلة الذليبات، صفراء اللون، حطرية العرف المنسحب. ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز.

١١٨٤١ - **رياح موهج** *
Trichilia ametica (S). *Trichilia musquée* (F). *Rosa tree of Arabia* (E).

نوع من الرياح، منته الجزيرة العربية، شجيرة تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها ليلية اللون كتيبة التجميع، طرفية ومجورية الارتكاز. غشبه شديد الصلابة فانشر الصف حطر الزائفة يلى غشبه المسك || ازهارها وثمارها طيبة مقية.

١١٨٤٢ - **رياح آخر الرأس** *
Melanerpes erythrocephalus (S). *Melanerpe à tête rouge* (F).

طائر من فصيلة الثقاريات. موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية. جسمه يطول نحو ٢٥ سم. يسلط نحو ٣٨ سم. لونه يقع الاوان. رأسه معتقه الى الحمره الشفقة. ظهره وجناحه وذنبه الى السواد العايق. اياهه وبلطه وزنكاه الى البياض الاخير. حقله عينه كسنتية اللون. منقاده وساقاه الى الزرقاة اسمره || اخلاطه رضية لكه كثير الحذر. قوته الحشرات واسارها ولا يلف من الجار البرية والثرامية كالكامل والمصر والكرز والظفار والين ... يدين منه في تجاريف الاشجار المنفرة. الاثنى تيبس من ٧ الى ١٢ بيضات قنصلها وسجدا دون الذكر الذي يدين لما اللداء.

١١٨٤٣ - **رياح نامل** *
Melanerpes formicivorus (S). *Melanerpe fourmilier* (F).

نوع آخر من الرياح. موطنه بعض المناطق الامريكية اغصنها المكسك وكرونية || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. يسلط نحو ٢٧ سم. لونه الى السواد اللامع يطو تقيز ابيض في الجناحين والصدر والاطلين. رأسه الى الحمره الشفلة. منته سطوة بقلادة كبريتية الصفار. حقله عينه صفراء. منقاده وساقاه الى السواد الاسمر || اخلاطه رضية، قليل الحذر، لا يثنى الاقتراب من الانسان. قوته الحشرات على اخلاطها واغصنها النمل. يتيزق يتنزل البلوط في تجاريف الاشجار فيؤن بذلك خذيرة فصل الشتاء والطلع || يدين منه في نيسان في تجاريف الاشجار وبن اوراق البوكا. الاثنى تيبس من ٥ الى ٦ بيضات قنصلها وسجدا دون الذكر الذي يدين لما اللداء.

١١٨٤٤ - **ريكة** *
Uranometria (F). *Uranometry* (E).

الرقاعة تبيان نجم الرقيق كليا او جزئيا مع تحديد محورها الصادية.

١١٨٤٥ - **ريكة** *
Malacanthus (S). *Malacanth* (F).

جنس اسماك بحرية من شاكيات الزعانف وصغيرة الرقائيات. انولها الممرقة ثلاثة سولها بجار البلاد الحارة || اجسامها شبه ريشية الشكل تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. رؤوسها

بيضة الشوذن ، قاعدتها أي ورباطها العنقي أضيق من
سنتها أي طرفها .

١١٨٦٧- رَكِيه هو البطيخ ، اطلبه .

١١٨٦٨- رَكِيَات Chelydae (S).
Chelydae (E). Chelydae (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاسل ، اجناسها
وانواعها عديدة ، جميعها قازية مقترمة دجاجة المسرح .
تألف ليلها الطلية الرأكة . دقائقها ملحوبة القذبل والزغب .
ذيلها يضيء الشكل نائي القتر الارسوبي القالب || اشهر
اجناسها الفرق .

١١٨٦٩- رَكِيَب

هو الناهر من الحيات الخفية . ج رقب و رقبات .

١١٨٧٠- رَكِيَب الشَّمْس راجع هليوتوب .

١١٨٧١- رَكِيَب خَدَاع

Tarbophis trompeur (F).
سنة من البوغاتيات تدعى ناظر مأكو ، اطلبه .

١١٨٧٢- رَكِيَذَك Marcotte (F). Laver (E).

النصن الذي يمسك ويرقد .

١١٨٧٣- رَكِيَش ، رَكِيَشَة Diagramas (S).
Diagramme (F).

جنس اسماء بحرية من كائنات العظام شالكات الزمانف
وفصيلة القرشيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماء
بحار البلاد الخالية || اجناسها اعاليجية الشكل ، متصلة
التعليط ، تطليق من ١٨ سم . اولها تروج من
البيرة الى الرينة والطحلة جميعها فضية الموانج مرقوشة بالاسمر
من الرأس الى الذيل . كثافة ريشها تفيض مع الانواع .
تتميز بصبغيتها الكبيرة الجاسطة ، بظهورها المخسورة المنحصر
وزمانفها الظهريه المستطيلة الشاككة القسم الاسامي ||
لحيوها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١١٨٧٤- رَكِيَشَات الصَدَف

Leptostracae, Phyllocaridae (F).
رتبة من القشريات العليا ، فصائلها و اجناسها وانواعها
قليلة العدد . جميعها صلبة القدر قريبة الشبه بالاربيان
الصغير . حوضها مزينة ، ارجلها الصدرية متساوية ثنائية
المخادف || اشهر اجناسها التبلانة .

١١٨٧٥- رَكِيَشَات المتأثير Tenulirostra (S).

Tenulirostra (F). Tenulirostra (E).
مرتبة من الطيور الجوارح عديدة الفصائل والاجناس والانواع .
اشهر فصائلها المدهديات والتمنقات .

١١٨٧٦- رَكَا هي الجربجر ، اطلبه .

١١٨٧٧- رَكَاة مُحَرَّزَة

Colydium crenatum (S). Colydia crénelée (F).
Colydium crenatum (E).

حشرة دامة قرصاية من فصيلة الركايات ورتبة مفصلات
الاجنسة . تألف الارواح والحدائق والجائان . شتاتها
وبريقاتها تميز تحت لاه الانهار في سرايب الحشرات

١١٨٥٣- رَكَاة الورديات * كورنيوم الورديات
Coryneum microstictum (S).

فطر مجهرى واسع الانتشار ركب بعض نباتات الفصيلة
الوردية اعصها لورد والعليق والزعزور والقتب || مظهره
الخارجي لطح مسطلة بنفسجية او سمراء اللون ركب
السوق القنية والقصبان النامية تسحب جفاف وتنضج
الطرية والصلابة التي لا تلبث ان تلوى || يكافح باقتطاع
وحرق الاعضاء الموصولة وينضج النبات ، يمد تطهير
جرحه ، يسهل الفطريات الفسالة القريبة المتناثر .

١١٨٥٤- رَكَاة Panachure (F). Sreak (E).

بقع يبيض في خضرة النبات .

١١٨٥٥- رَقع سمكة بحرية ونبوية من اللاتس .

١١٨٥٦- رَقَاة Fougerale (F).

Fern-patch, Fernary (E).
مكان يكثر فيه الفخار والبرنس والقيشار وما اشبه .

١١٨٥٧- رَقَاة حَمْرَاء Pie-rouge (F).

نمت وصني يبرر من شكل غاص من الثوب البقر .
فاخرة الرقاه الحمراء هي ذات الثوب الاحمر عليه بقع
يبيض .

١١٨٥٨- رَقَاة سَدَقَاء Pie-noire

البقرة الرقاه السوداء هي ذات الثوب الاسود عليه بقع
يبيض .

١١٨٥٩- رَقَاة Grain, Texture

رقعة الشيء اصله الحكمي للموس . وتتمثل عادة في
التصوير من صفت الخشب . فتقيل من غيب الجوز صلب
الرقعة الناعمة وعن الازديت اصلها الرقعة .

١١٨٦٠- رَقَاة

الرقعة : حجرة عظيمة ، ساقها كالدبل ورقها كورق
القرع ونمرا كالتيين . ج رَقع (السان) .

١١٨٦١- رَقَاة Palmer élevé (F).

Raised palm-tree (E).
الرقعة : النخلة الطويلة التي تقوى اليه . ج رَقل و رقاب .

١١٨٦٢- رَقَاة

قال ابو حنيفة : الرقعة من اسرار البقول . وقيل : انها من
العشب العظام تنبت مسطحة غضة كباراً وهي من اول
العشب عربياً ، تنبت في السهل (السان) وما كان
الجبانى .

١١٨٦٣- رَقَاة Parterre (F). Flower-bed (E).

جزء من حديقة خصص لزراعة الزهور .

١١٨٦٤- رَقَن Hachurer

خطط الرسم ونحوه بخطوط متوازية الامداد فارقة .

١١٨٦٥- رَقَن Œufs des vautours (F).

Eggs of vultures (E).
هو يبيض النسور حل اختلاف اجناسها وانواعها .

١١٨٦٦- رَقَنِي Obovale, Obov.

Obovoide (F). Ob-ovoide (E).
نمت تعريفى يطلق ، في علم النبات ، على كل ورقة



رقعة الورديات .



رقيش



ركاشة عُرْزَة

١١٨٨٤ - رَكَكَة * Fixisme (F), Fixisme (E).
الرَكَكَة نظرية بيولوجية تقول باستقرار الانواع الحيوانية ونباتية الحياة على حالتها .

١١٨٨٥ - رُكَبَ الْجَمَلُ هي الاثنية البيضاء، اطلها .

١١٨٨٦ - رُكَبَان رُكَبَان النمل : سوابقه التي تخرج من القنص في أوله .

١١٨٨٧ - رُكَبَة Genou (F), Knee (E).
عضو الربل الامامية بين الساق والوثيب .

١١٨٨٨ - رُكَبَة ذَات الْكَرْصِي Rochbah
رُكَبَة ذَات الْكَرْصِي نيم نير من كُوكَبَة ذَات الْكَرْصِي .

١١٨٨٩ - رُكُح Flanc du montagn (F), Flank of mountain (E).
ناسية الجبل . ج . كُوح وكُوح .

١١٨٩٠ - رُكُحَة Cour de ferme (F), Farm-yard (E).
مساحة دار المزرعة . ج . كُح .

١١٨٩١ - رُكُور Doser (F).
To put the right quantity (E).
حدد نسبة المادة المضافة الى سائر اجزاء المركب . او
حدد كمية المادة المضافة الجائر لتقريبها واستعمالها في متة
او ألف جزء من الملاء .

١١٨٩٢ - رُكُورَة Rejet, Rejeton (F), Shoot, Sprout (E).
الفصيلة النابتة على ابروة الشجرة او على جذعها .

١١٨٩٣ - رُكُوسَة * Rhexin (S), Rhexide (F).
جنس نباتات حولية وسمرة ، بيرة وتربينية من فصيلة
المستويات . انما هو المرفوعة حديثة بمضها عيشي حولي
والآخر جنبي معمر || سيقها تنصب مربعة الزوايا .
اوراقها متقابلة لائفة . ناصها اهللية الشكل ، نافرة
البرق والاصباغ ، خلية البشرة ، حيلة انفسار الالسن .
ازهارها حكرولي التجميع ، طرفي الارتفاع . ازهارها
خامسة البتلات ، كثيرة الالوان المنقطة .
الوانها تتراوح من الاصفر الى الاحمر الابيضاني || تزود
في الحقائق . ترطب في الاقربة المعتدلة الانتاج .

١١٨٩٤ - رُكُش، رُكُش Binage (F), Ploughing (E).
كري التربة لتفكيك تماسكها حول النبات . ولان تغيير
وطوبها وتلطيف انفعالات الحمار وعمل الميكروبات
الحوائية .

١١٨٩٥ - رُكُل هو الكركل المعروف ، اطله .

١١٨٩٦ - رُكُلَة Botte de légumes (F), Bundie of greens (E).
الحزمة من البقل .

١١٨٩٧ - رُكُلَة Artefact (F), Artifact (E).
الرَكَكَة البقل الصناعي الذي يذو في الحديقة الحوائية او
الحلية النباتية بعد ساجتها بالثابت التي تقف على الحاية
وقد تشبه بعض الشيء الماعالم الاسيائية .

الغاشية قوتها طراس الحشرات والمواد النباتية الخسلة ||
جسمها صغير اقله يطول من ٤ الى ٥ م . ثوبا الى السواد
الضحي باستثناء الغديين فانها الى الجؤرة تفرسها عند
متصفها جلدة سوداء . رأسها كبير الجرم . عيناها بارزتان .
زبانها غطبان ، صفيا الاطراف . فكها ضليخان .
ظهورها قليل الاحديداد مستدير المؤخر للاص . غمدنا
متناظرة التحزير القاطب . ارساها رباعية البقل || لها
جبل واحد في الجول . تظهر الحشرة الجبلية في اوائل
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتستنك
في النهار || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٦
الى ٧ م . جسمها سحكي التركيب ، محدوب الظهر ،
مبطط اللب ، سداسي الرواج ، حطلي اللون ، اسمر
الفاصل والرأس ، مهذب السكم من الجانبين || طور
الاكمل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في آخر
نلق وبله البرقة ضمن سلسلة غاوية الفشاء .

١١٨٩٨ - رُكُاحِيَّات * Colydiidae (S), Colydiidae (F), Colydiidae (E).

فصيلة حشرات دامتة قرضاية من وثية لمديات الاجنسة .
اجناسها وانواعها المرفوعة حديثة متشرة في معظم اقطار
العالم . تعيش تحت حلاء الاجار في سرايب الحشرات
الخافية . قوتها طراس الحشرات وبرازها والواد النباتية
المتسلة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،
ستمررة التروس ، متباينة الزوايا المشاوية الفصل .
كواسها واخمادها تلتك الانظار لما تتصل به من نقوش .
جرامها مستعدة . ارساها رباعية البقل || اشهر اجناسها
الركاسة والديتية .

١١٨٩٩ - رُكَال ، وَعَنَة Lazérite (F), Lazérite (E).

نوع من التراب الصلصالي الاحمر اللون يكثر بربوده في
الناطق الاستوائية الرطبة . يتميز بوفرة ما يحويه من
الاولوين وكاسيد الحديد . وهو عند جفافه ، او في المراتع
المادة الرطوبة ، شديدة الالتصاق قليل الخير والانتارة .

١١٨٨٠ - رُكَلِي ، وَهْنِي * Lazériteque (F), Laterite (E).

صفة الرُكَال اي التراب الصلصالي الاحمر اللون الشديد
الالتصاق .

١١٨٨١ - رُكَام ، رُكُمِي ، مَكُفَر * Cumulo-nimbus

ضيم تندر بالمافسة او بالمر القريب مظهرها كحل
ملبدة متراكبة سماء اللون منخفضة الارتفاع تصل الى
امطار غزيرة .

١١٨٨٢ - رُكَام، رُمَل مَكُورِي Falun, Trex (F), Shell-marl (E).

رواسب بحرية للملش صدفية المتصر الرئيسي نحوي نحو
٦٠ ٪ من كربونات الكلس و ٢٠ ٪ من الرمل تتصل
كصدمات كلسية تقيه التربة والزراعة .

١١٨٨٣ - رُكَامَة Agglomérat (F), Agglomerate (E).

الرُكَامَة الاعتلاط الطبيعي للغزوات شق .



رَكَكَة



رَكَكَة

11910 - ركيمة • Sympodite (F).

الركيمة القسم القاعدي من زوائد الفشريات يتكون من فصليتين تتهيأ بمقدولين بمقدولين منفصلين .

11911 - ركيمة • Sympodite (F).

نمت تعريفي يطلق على كل عضو شكله الخارجي يماثل الركيمة .

11912 - ركيمة • Nesocia (S).

Nesocia, Nesokia (F), Nesokia (E).
جنس جرذان كبيرة القد أنثيا وحادية عابقة . أخطامها قصيرة مقطوعة . أذنانها مستديرة . أذنانها مستطيلة حراشفها الجلد . أرجلها مستعرضة . أطرافها قوية . مخففتها تشبه قبايع الخيزير . أركارها انفاق مستطيلة يتخللها دهاليز وصحير جانبية || أنثاه سبعة موطنها الشرق . أعرفها ركين سرنيد وركين البنغال .

11913 - ركيمة البنغال • Nesocia bangalensis (S).

Nesocie du Bengale, Nesokia, Rat du Bengale, Kok (F), Indian nesokia, Kok (E).
نوع من الركين موطنه البنغال وبورما ، طوله نحو ٥٠ سم . يعيش قرب الماء يحزن نحو ٢٠ كيلو من غلظ الحبوب . يدغوا إلى الشتاء || أنثاه تضع من ٨ إلى ١٤ دوسة .

11914 - ركيمة سرنيد • Nesocia bandicota (S).

Nesocia bandicota, Rat bandicota, Rat perchal (F).
Nesokia bandicoot (E).
نوع من الركين موطنه سرنيد وبنغال وجنوب الهند . طوله يراوح من ٧٠ إلى ٧٥ سم . ظهره أبيض اللون . يشبه الأشول ، فوائده سيد ، أطرافه طويلة || أنثاه تضع من ٨ إلى ١٢ دوسة .

11915 - ركيمة • Fibriste (F).

نمت تعريفي يطلق على من يقر نظرية الركانة .

11916 - ركيمة • Rollulus (S), Rouloul (F).

جنس طير من عارة الحجلويات وفصيلة الطيوريات قريب الشبه من الجبل لكنه أشفق جسمًا وأطول ساقًا . قويه إلى الصبغة الكرياء يملو تأذير وريش || أنثاه أربعة موطنها الهند وبورما حتى ملقة .

11917 - ركيمة • Brouter (F), To browse (E).

رم الحيوان الثبات : تناولوه بفمه فأكله . وفي الحديث : « للبقير رَم من كل شجر » .

11918 - ركيمة • Brachynidae (S).

Brachynidae (F), Brachynidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة عديدات الأرجحة . اجنتها وأنواعها كثيرة العدد تعيش تحت الحجارة وفي انفاق تحفرها في التربة الحسنة لأنها تفضلها على غيرها . تحمل في مؤخر بطنها جرابين كبيرين ينفتحان على الترح . تقتل منها بسائل ينغمر في الهواء لونه إلى الطلعة البفراء يضيء في الظلام لأنه لا يتخلل من التفسفر .

11919 - ركيمة • Brachynus (S).

Brachyne, Bombardier (F), Brachynous, Bomber (E).
جنس عنافس وأجنحة ناهمة من فصيلة الرنانات . أنثاه

11898 - مكتوبة • Reclusia (S).

Reclusia (F), Reclusia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات سديجات الارجل وبصلة الجنسيتات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها عينة مقترنة . ملجئها الحياتي جاعي . أسرابها وافرقة العدد || أصدافها رقيقة و صغيرة القد ، بليطة ، حلزونة الإصقاب ، بحرية اللون أو زرقاء .

11899 - ركيمة • Reclusia (S).

هو السيس ، نبات حسي طيب ، الحلبه .

11900 - ركيمة • Agrégat (F), Aggregata (E).

مجموعة مواد مختلفة سبائك

11901 - ركيمة • Empoter (F), To pot (E).

فرس في مركب أو في أصيص .

11902 - ركيمة • Stolon

رشد هوائي ينبت من الأرض ويتبرز له جذور عند المفصل تقنيه من أمه فإذا فصل أصبح نباتًا مستقلًا .

11903 - ركيمة • Stolonifère (F), Stoloniferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات له ركب أو يتكاثر بركبه .

11904 - ركيمة • Rhacodulum

جنس طيور مجهرية من الشبيات . أنثاه قليلة جميعها ربة فائقة لتلتصق الحفصيص والاشخاب في المواقف الظلمية الرطبة || مظهرها الخارجي نواص خلي ، متكوني الشكل ، كثيف التجميع ، أسمر اللون ينشج جوانب قمر الدنان وبالإبراميل والمواقع الرطبة من الآلية .

11905 - ركيمة • Racumin 57

مسروق سام يرتكز على مادة الكوبرين يستعمل القضاء على الجرذان والفئران . واستعماله قد يكون إما ذرًا في المواقف المطروقة من هذه البورويات أو طمسًا يشاف على بعض المواد التي ترض لها هذه البورويات اغصها الخيزر المنقوع والبطاطا المسلوقة وبنايا السمك واللحم .

11906 - ركيمة • Andropogon annulatus (S).

Andropogon annulatus (F), Blue grass (E), Bargrass, Blutgrass (O), Barbons (I).

نبات حشبي بري حولي معروف ويطي من فصيلة النجيليات . أروته قرصية مرساة الاشطاء . أوارته عصفية التصل متصبة . سنايله كثيفة الزغب والحمل . يحسن اقتطاعه للعلف قبل الإصبال .

11907 - ركيمة • Puits (F), Well (E).

هي البئر ذات الماء .

11908 - ركيمة • Pileis (F), Piles (E).

مجموعة أوتاد تترز في قمر الماء لتدعم أسس بناء .

11909 - ركيمة • Sympode (F).

Sympode, Sympodium (E).

نمت تعريفي يطلق على كل جلع أو جمود متراكب السكم المتلاصقة المتزايدة ستة بعد ستة .



ركوب



ركيب



ركيزة



ركين البنغال



رول



رَمَّاتَة حَمْرَاءُ الرُّسْ

والزريق والسليتيوم || اما نسب هذه الناصر فلا قياسية لانها تختلف من نبات الى آخر وبين سائر اعضاء النبات الواسط || اما من الناحية الزراعية الاقتصادية ويوجه عام فتوصف ما يحوي الرماد من مختلف الناصر الغذائية الرئيسية يمكن تلخيصه كما يلي :

نوع الرماد	قشوري	يوتاس	كلس
اخشاب المحالوات	٣٥ %	١٠ %	٣٠ %
اخشاب الصنوبريات	٣٥ %	٦ %	٤٥ %
سوق التبنوخ	٣ %	١٥-٢٠ %	٥٠-٢٠ %

١١٩٢٦ - رَمَّادَة في فريون القنجر - اطبا .



رَنَاح

Rhinocryptus (S).
Rhinocrypta (F).

١١٩٢٧ - رَمَّال *
طائر وسيد الجنس والنوع من الجواثم فضيلة الطرايات . موطنه جزر الزايخ . تألف النباتات وضفاف مجاري الماء . ملجئه الخافي جامي . جماعته قليلة العدد . قوته الخول والحشرات والبهان والثمار الننية والبروز || جسمه صغير القند يطل نحو ١٨ سم . رأسه متوج بفتحة لينة مرتدة الى الوراء . جناحه مثلاً الطويل . ذنبه مقعوم الطرف . رأسه الى الشبهة القروية الخولج مثقبة بالايض . رذاه وجناحه وذنبه الى الخصار الاسف . زوره وسعد الى الشبهة . يطن الى الفتحة || يطن حث في الاجبار الرقة . الاثي تحسن بتناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بضعات .

١١٩٢٨ - رَمَّاس *
Emballonura (S).
Emballonure (F).

جلس خلفهم من حمارة الرامسات . انواعه اربعة جميعها صغيرة القند مستطيلة الرأس القرطسية ، مجمة الفتحة . موطنها الملايو . تسرح من القس الى القبر . قوتها الحشرات . تعيش بجاهات قليلة العدد . تألف الاجبار الحرجية والناور .

١١٩٢٩ - رَمَّاسَة *
Emballonuridae (F).

Emballonurina (F).
Emballonurina (F).
حمارة من فصيلة الرامسات . اجناسها سبعة تتميز باذنانها المنفصلة عن الفناء الجدي || اما اجناسها فهي : الشمس والشمس والرماس والفتقدان والشمس والتضوف والتكليل .

١١٩٣٠ - رَمَّاسِيَّات *
Emballonuridae (S).

Emballonuridae (F).
Emballonuridae (F).
فصيلة من الخفاش . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، تبطنها حمارة الرامسات والمجيرات .

١١٩٣١ - رَمَّالَة *
Arène (F). Arène (F).

الرمالة ميدان في وسط ملعب او نحو كان يصعد . عند الاقربين من يوتان ورويان وفيرم . كمترك المبارزة والمجاجة والمصارعة .

١١٩٣٢ - رَمَّال *
Arénicole (F).

Arénicolous (E).
نعت ترمي يطلق على كل حشرة تعيش في الرمال كالديدان وغيرها .

نحو ١٦٠ مثطرة في جميع المالم . تعيش تحت الانقاض والحجارة تقترس الحشرات الضارة وتقاوم عن نفسها فسادها فسقوري تغلقه من غثي شرجها فينجر من رائحة كريمة منتنة .

١١٩٢٠ - رَمَّالَة حَمْرَاءُ الرُّسْ * ، قَدَّالَة حَمْرَاءُ

الرُّسْ *
Brachynus creptans (S).
Brachyne creptant (F).
Crackling brachynous (E).
حشرة نافعة من الرامسات . تألف الاراضي الجصية الجبلية . طولها نحو ٩ م . رأسها يقدّم جيشها الى الحرة . تحمداها ويطنها زرق . مولج ثوبا الى الحشرة المابقة . قوتها الاروق وبعض حشرات الاجنحة .

١١٩٢١ - رَمَّاح *
Péridophora (S).

Péridophore (F).
جنس طير من الجواثم نباتات المتأثير فضيلة القرويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اجناسها وارضها رباح ايرتي (P. Alberti) . قدره قدر السمعة ثوبه الى الصبهة يسر . ويزرق في الرأس والظهر والجناح والذنب ويتر ويتر والصدر والبطن والاذنيك . يمشي برشتين لونها الى الزرقعة الجصيلة المشعاع المولج تنشيان عند مدني الرأس طول الواحد منها نصف طول الجسم .

١١٩٢٢ - رَمَّاح الحَيَر *
Poison-pique (F).

سمكة بحرية تسمى عداة ، اطبا .

١١٩٢٣ - رَمَّاحَة *
Polyodon (S).

Spatulaire (F). Polyodon (E).
جنس اسماك نهرية من الاسماك فضيلة الرامسات . انواعها المعروفة قليلة العدد اجناسها انهر ومجيرات المناطق الشمالية || اجناسها كثيرة ، مستطيلة ، شبه وشية الشكل ، طولها من ٣ الى ٦ امار . مسوكها مرفوعة بشمل حطية التركيب ، نجمة الشكل . رؤوسها حلقة مجهزة بزوائد خضروفية تمتد كالزرق فوق القف . اجناسها كثيرة ، مستعرضة الاشكال || تصاد من اجل صيدها ابله الصنف اما لحوبا فيقله قل من يرغب فيها .

١١٩٢٤ - رَمَّاحِيَّات *
Polyodontidae (S).

Spatulariidae (S). Polyodontidae (S).
Polyodontidae (F).
فصيلة اسماك نهرية من اللامسات الجنايات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اجناسها انهر ومجيرات المناطق الشمالية || اجناسها مستطيلة شبه وشية الشكل . مسوكها مشعلة . رؤوسها مجهزة بزوائد خضروفية تمتد كالزرق فوق القف . اشهر اجناسها الرامحة .

١١٩٢٥ - رَمَّاد لَبَّائِي *
Cendre végétale (F).

Vegetable ashes (E).
هو ما يبقى بعد حرق المواد النباتية . تركيبة المتصري . يقسم الى فئتين : فئة الناصر الرئيسية التي تشمل الليتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمغنيزيوم والحديد والفسفور والكلريت والسليسيوم والكلور . فئة الناصر الثانوية التي تشمل البروز والمغنيز والشماس والفنك والكلوكيت والتيتال والباريوم والسترونيوم والزينك والاليمنيوم واليتان والشماس والسليسيوم والزاديوم والكلور والفلاناديوم والباريليوم والفلاديم والفضة والليسيوم والبيد والبروم



رَمَّال

١١٩٢٢ - رَمَالَةُ الْمُتَوَسِّط *

Ammodytes cicarellus (S).

Ammodyte cicarellae, Cicarella, Equille de la Méditerranée (F). Sand-cal, Sand-lance (E).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات . اصطناعها منظم شطوط البحر الأبيض المتوسط . تعيش متنمة في الرمال والأوساخ || جسمها شبه بيضي الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر . طولها يراوح من ١٥ إلى ١٨ سم . رأسها صغير الحجم . خطمها غزير ملي الشوذن . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامتناهية العرض ، تقطب الظهر واقسم . الأكبر من الذنب || توربا الى الزقفة الخضراء بعلها في جانبها جفة مستطيلة للألوان البنية وعلو الشرج بقعة نحاسية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

Ammodytidae (S).

Ammodytidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السمكيات شاككات الزعانف . اجناسها وانواعها المحروقة قليلة العدد . اصطناعها منظم شطوط بحر العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم . اعطلمها ذقنة تتميز باستطالة الفك السفلي وزعانف الظهرية والشرجية وعلوها من الزعانف الخوضية . حراشفها شديدة الصغر تكن في المسك || تعيش منظم حياتها متنمة في الرمال والأوساخ ولا تقترب من الشطوط الا في فصل الصيف وأغريف اي في زين التسرقة حيث تلتقي ببرمها في الرمال فيلتصق ببعضها || أشهر اجناسها البراعة والشمون .

١١٩٢٣ - رَمَامُ الرمام : البقل حين يثقل .

١١٩٢٤ - رَمَامُ *

Punica granatum (S).

Grenadier cultivé (F). Pomegranate-tree Carthaginian apple (E). Echter granatbaum (D). Granato, Melagrano, Pomo punico (I)

شجرة مثمرة من الرمانيات . غروبها عديدة معظمها مأكول الثمار وبعضها سائل اللحم شديد الحامضية يستعمل استعمال الحامض . يقال ان مهدها كان بلاد فارس وقد عمت زراعتها حوض البحر المتوسط وهي منتشرة في امريكا من البرينتين الى التشلي والمكسيك وأريزوله وكليفورنيا . وقد عرفها قدماء المصريين في عهد الفرعون رمسيس وارهاني ومن اشق الاسم القبطي « بن » والاسم العربي « روم » ثم الاسم العربي « رمان » . تطول من ٣ الى ٥ امتار . ساقها مساه . اوراقها بيضاوية الفسائل . فرونها منتصبة . خضيا اسفر اللون لب الزقفة صلب المود . اوراقها متقابلة عابدة ، فصلها رعيي الشكل مالى البشرة . ازهارها غشوية ، كلها صلب القلفة خامي التخصيص . ثوبها خاسي البتلات الارباعية . اسديها عديدة . بعضها متعدد البريقات . ثمارها كروية خضرة مكللة باسنان الكاس ، تقودها صلبة متينة تبدو خضراء اللون ثم تتحول الى الحمرة مع اقترابها من الاذراع ، تطف زرد صغيرة تسمى الفرند يحيط بها لب مائل شفاف تلحم غشوة رقيقة ملونة . ينمو الرمان في منظم العالم حوض البحر المتوسط . يرغب في الاراضي المتوسطة الانتاج السميكة الثنود المسكن رجا عند الانتقاء لانه يفضل الرطوبة على الجفاف || يتكاثر بالبذر والتغصن والقرية والتطعيم || ازهار جميلة الشكل ولون تتركب باسم جلتار ، وهي طيبة ، قابضة ، طاردة للديدان انحصا البودو الوحيدة || ثماره للأكله لليلة

رمالة المتوسط



رمان



رمان بري



رمالة



رنبوسة

العلم ويستخلص من ثماره الحامضة عصر بعض شراب الرمان || ثمرات ازهار صياغية خضيا اخر . تقود ثماره ولها مائة وقرن جلوده قابضة وتستعمل في البذابة .

Androsæma (F).

Androsænum (E).

نبات زهره مراكب الصفرة والحرة . حبه يشبه حبه الباق يتدلى به يتنع داء المفاسل ، اطلب هيفاريقون .

١١٩٢٨ - رَمَامُ السعال

هو الخشخاش الابيض ، اطلبه .

Balaustion (S).

Balaustion (E).

شجرة برية مثمرة من فصيلة الرمانيات ، ساقها شاككة . اوراقها كثيرة الفسائل ، فرونها منتصبة ، لينة ، شاككة . اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية الفص ، عابدة . ازهارها مزدوجة التركيب مفرجة لدى الرث . ثمارها كروية صغيرة طعرا نحو ٤ سم . زودها حازرة مرة لا تكلل || ازهارها وثمارها صناعية تستعمل في الصباغة واللبانة .

Grenada (F). Pomegranate (E).

ثمرة الرمان تختلط باختلاف الظروف . منها غزيرة الصارة ، طرية الفرك ومنها صلبة الفرك ، متوصلة او قليلة الصارة . وبعضها لللب الطعم والذكية او ساهض او حازر او مز || عصارة الرمان تروي غليل النمل وتفيد الناقين ، تحليلها الكباري

% ١٦,١٤	مؤاد سكرية
% ١٧,٥٢	مؤاد استخلاصية
% ٠,٣	مؤاد دهنية
% ٠,٥٢	بروتين
% ٠,١٧	حواض
% ٠,٧٣	وساد

وقد جاء من الامام علي قوله : « اذا اكثرت الرماله ذكراها بشحمها فانه دباغ للحملة وما من حبة منها تقوم في جوف رجل الا انارت قلبه واخرست شيطان الروسية » .

Punicaceae (S).

Punicaceae (E).

فصيلة نباتية قليلة الاجناس والانواع كانوا يعتبرونها في الماضي سبطا من الديات || أشهر اجناسها الرمان .

Rhombus maximus, ١١٩٢٢ - رَمْبُوسَة *

Scophthalmus maximus (S). Turbot (F). Brest (E).

نوع من سمك الترس . سمكة يبيض من فصيلة الغروسيات وربية المسافات . اصطناعها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعيش من اسماك اساطير التناف || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبط الجرم ، يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ويعرض من ٦٠ الى ٩٠ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن بما يحمل منها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تستل منها اسماك فصيلة المغلطح . جلدها غش القشار مبهر النطق . صفحتها البني ينشأ اللون تملاها رقة سمراء . صفحتها اليسرى الى الصهبة يطوها توشح اسود وريقة سمراء . وصفها الى الصهبة رقة سمراء . مبط الجرم ، واسع الشق . فكها الاسفل يتقدم الاعل

Ophtalmie (F). Ophthalmia (E). رَمَحَة ١١٩٥٢
الهاب في عين الإنسان تسبب عوارض مختلفة يمد تشخيصها
وتقرر معالجتها إلى الطبيب البيطري .

١١٩٥٣ - رَمَدُ الْكَرْمِ هو ابتداء الكرمة ، اطله .

١١٩٥٤ - رَمَدُ مُعْكُود
Fluxion périodique, Ophthalmie périodique (F).
Periodic fluxion, Periodical ophthalmia (E).
عوارض ملابح يصيب الخيل في حينها فيضيتها . يبالغ
بالاستراحة ويستهال بعض الأدوية الخاصة التي يقررها
الطبيب البيطري .



رعيه

١١٩٥٥ - رَمَرَامٌ * ، وَهَرَم
Chenopodium murale (S). Asdirine des murs, Pette
d'ole vraie (F). Wall goose-foot, Nettle leaved
goose-foot (E). Gänsefüßel, Mauergänsefuß
(D). Chenopodio dei muri, Zampa d'oca (I).

نوع من الأئنيه وهو نبات عشبي بري طهي مسمر من
فصيلة السرمقيات. اللهه واجوده غواصاً ما نبت في الاربة
الكسبية . وهو مضاد للتشنج . يدر البلغم ويشفق الكحة
ويذهب بالديدان الموية .

١١٩٥٦ - رَمَرُ
Symbole (F). Symbol (E).
رَنْز ج رموز. الرموز هي العلامات المختصرة المألوفة على اعمام
العناصر والمركبات الكيميائية || ورمز يدل على اسم العنصر
وعلى وزن القلعة الواحدة منه أي الأتوم || وقد ذكرنا
في الجداول التالية رموز أشهر العناصر مع أوزانها الأتومية .
اسم العنصر رمزه الأتومي

Elément (F). Element (E).
أزوت (نيتروجين) ن ١٤,٠١ N
Nitrogène (E).
أوكسجين ا ١٦,٠٠ O

Oxygène (F). Oxygen (E).
ألومنيوم لو ٢٦,٩٧ Al
أنتيمون، إند كت ١٢١,٧٦ Sb

Antimoine (F). Antimony (E).
هيدروجين هـ ١,٠٠٨ H
Hydrogène (F). Hydrogen (E).
باريوم يا ١٣٧,٢٦ Ba

Baryum (F). Baryum (E).
بروم بر ٧٩,٩٢ Br
Brome (F). Bromine (E).
برومت بت ٢٠٩,٠٠ Bl

Bismuth ٢٠٩,٠٠ Bl
بلاتين بلا ١٩٥,٢٢ Pt
Platine (F). ١٩٥,٢٢ Pt
Platinum (E).

Potassium ٣٩,١٠ K
بور ب ١٠,٨٢ B
Bore (F). ١٠,٨٢ B
Boron (E).

حديد ح ٥٥,٨٤ Fe
Iron (F). ٥٥,٨٤ Fe
Iron (E).
خ ز ٦٥,٢٨ Zn
Zinc

ذهب ذ ١٩٧,٢٠ Au
Or (F). ١٩٧,٢٠ Au
Gold (E).
راديوم ر ٢٦٦,٠٥ Ra
Radium

رصاص ر ٢٠٧,٢١ Pb
Plomb (F). ٢٠٧,٢١ Pb
Lead (E).
ز ٧٤,٩١ As
Arsenic
هـ ٢٠٠,٦١ Hg
Mercur (F). Mercury (E).

اسنانها صغيرة ، ذرية ، وراعية الصفوف . صناعها
مخبرتان ، نازحتان . زعنفتها الظهرية تمتد من قاعدة
البطن . زعنفتها البالية مستديرة الشكل || لها فاجر
الصنف ، مرفوف فيه .

١١٩٤٣ - رَمَبُوطَان
نبات يعرف باسم ليتشي اصفر ، اطله .

١١٩٤٤ - رَمَه
Fourmi ailée (F). Winged ant (E).
البره : لفنة ذات الجناحين .

١١٩٤٥ - رَمَتْ
Floitage du bois (F).
Floating of wood (E).

البرث : خشب يضم بطيه إلى بعض ويركب في البحر
وهو الطوف . وفي احد الطرق المتصلة لنقل الاخشاب
في الانهار .

١١٩٤٦ - رَمَتْ
Caroxylon articulatum (S).
Caroxyle, Caroxylon (F). Saltwort (E). Salz-
kraut (D). Carosion, Cali (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات . ساقه وفرويه عقدية
مدادة . اوراقه زياه المتصل كانوا يستخرجون منه الصيدا .

١١٩٤٧ - رَمَتْ نَتْن
Caroxylon fastidum, Salsola fastida (S). Caroxyle
fétide, Salsola fétide (F). Stinking saltwort (E). Stin-
kende salzkraut (D). Erba kali pudente (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات . ساقه وفرويه مدادة ،
اوراقه لملمة المتصل الاطر النتن الرائحة . كانوا يستخرجون
منه الصيدا .

١١٩٤٨ - رَمَحِي
Hasté (F). Hastate (E).
نمت وصي يطلق على اتصال الاوراق الشبيه بالرحم .

١١٩٤٩ - رَمَحِيَّة
Doryanthes (S).
Doryanthe (F). Queensland spear lily (E). Spear-
blume (D). Dorianto (I).

جلى نبات ترابي من فصيلة السوسنيات . اوراقه قرصية
الجميع يوكية الشكل تعد نحو المئة . شراخه الزهري
غليظ القاعدة ينتصب يعلو من متر إلى ستة أمتار . ازهاره
كبيرة الله تشبه الزئبق وتمادل جرمه || له نومان الرعيه
السامية ورعيه بلرس .

١١٩٥٠ - رَمَحِيَّة بَلْمِير
Doryanthes palmeri (S).
Doryanthe de Palmer (F).

نوع من الرعيه . اوراقها تطول من ١٧٥ إلى ٢٥٠ سم .
وتعرض نحو ١٥ سم . تصلها جيل الخصار يقوي ينهي
بمقتضى ذلقة حادة أسطوانية الحجم السوداء . طليها نحو
١٥ سم . || شراخه الزهري يعلو من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ سم .
انزهارها متفردي هري ناجي . انزهارها قمية الشكل
مستطيلة لونها إلى الحمرة .

١١٩٥١ - رَمَحِيَّة سَكَمِيَّة
Doryanthes excelsa (S).
Doryanthe élevée (F).

نوع من الرعيه اوراقها تطول من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم .
وتعرض نحو ١٠ سم . تصلها جيل الخصار يقوي ينهي
سواء طليها من ٥ إلى ٨ سم . || شراخه الزهري يعلو
من ٦ إلى ٦ أمتار ينهي بقصة كثيفة من الازهار الزرقية
الشكل الازجوانية اللون .



درام

11962 - رَمَكَة Jument poulinière (F).
Brood-mare (E).
هي الفرس تتخذ للسل وليست من عتاق الحمل كالخمار.

11963 - رَمَلٌ الرمل: التليل من المطر. والرمل: خطوط في قوائم البقرة الرشيطة مخالفة لسائر ألوانها.

11964 - رَمَلٌ Sable (F). Sand (E).
مادة صخرية دقيقة الجرم تتجعد من تفتت الصخور الكلسية والصوانية ويصوت بنفس المرو || والرمل أنواع، أشهرها رمل البحر والرمل والرمل ثم التليق والشن والصواني والآخر ثم الرمل التسفلي.

11965 - رَمَلٌ المَقَالَة، حَصَى المَقَالَة Gravelle, Cystite calculosa (F). Gravel, Calculous cystitis (E).
شائبة صدرها تكون بلورات من بلوة الصفا في المثانة. تصيب خاصة الفواجر للمريضة السنية.

11966 - رَمَلٌ المتالع هو العذاب، اطلبه.

11967 - رَمَلٌ تحلوي هو الركام، اطلبه.

11968 - رَمَلَاءُ الرمال من التناج السوداء القوام رشاها أبيض. وأما التناج البيضاء فهي الرمال.

11969 - رَمَلِيٌّ Sablonneux (F). Sandy (E).
كثير الرمل.

11970 - رَمَلِيَّةٌ هي الانباريا، اطلبها.

11971 - رَمَلِيَّةٌ ° Ramalina (S).
Ramalina (F). Ramalina (E).

جنس حزاز ينتمي الى فصيلة الرماليات. انواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم اصقاع العالم. مشاهير غمرقية، متشعبة، مشرشرة. كونها الى الحفار البحري الباهت. اما الانواع الثلاثة فهي:

11972 - رَمَلِيَّةٌ الأَشْنَة °

Ramalina orseille (F).
ينمو ويتكاثر على الصخور في المواقع الظليلة. ويستخدم كاد صبغية حمراء.

11973 - رَمَلِيَّةٌ الصُّغُر °

Ramalina des rochers (F).
ينمو ويتكاثر على صخور التيم والحضاب البحرية المرص.

11974 - رَمَلِيَّةٌ المُرَّان ° Rameline du frêne (F).
ينمو ويتكاثر على لحاء المران وسطم الاشجار الحرجية والتزيينية والزراعية.

11975 - رَمَلِيَّاتٌ ° Ramalinaceae (S).
Ramalinaceae (F). Ramalinaceae (E).

فصيلة من الحزاز الذي ينمو ويتكاثر على لحاء الاشجار او على الصخور وليس في التربة. مشاهير غمرقية، شبه جلدية، لينة، متدلة الناعكة || اجناسها المعروفة قليلة القند أشهرها الرملين الذي يعتبر قيس الفصيلة.

Silicium	٢٨,٠٦	Si	س	سيليسيوم
Sodium	٢٣,٠٠	Na	ص	صوديوم
	٣١,٠٢	P	فر	فسفور
Phosphore (F). Phosphorus (E).				
Argent (F)	١٠٧,٨٨	Ag	ف	فضة
Silver (E).				
Fluor	١٩,٠٠	F	فل	فلور
Quartz (F).	١١٨,٧٠	Si	ق	قصدير
Tin (E).				
Soufre (F).	٣٢,٠٦	S	ك	كبريت
Sulphur (E).				
Cadmium	١١٢,٤١	Cd	ك	كاديوم
	١٢,٠١	Ci	ك	كروميوم
Carbone (F). Carbon (E).				
Chrome (F).	٥٢,٠١	Cr	ك	كروم
Chromium (E).				
Calcium	٤٠,٠٨	Ca	كا	كلسيوم
Chlore (F).	٣٥,٤٦	Cl	كل	كلور
Chlorine (E).				
Cobalt	٥٨,٩٤	Co	كا	كوبلت
Magnesium	٢٤,٣٢	Mg	م	منغنيزيوم
	٥٤,٩٣	Mn	م	منغنيز
Manganèse (F). Manganese (E).				
Cuivre (F).	٦٣,٥٧	Cu	نح	نحاس
Copper (E).				
Nickel	٥٨,٩٩	Ni	ني	نيكل
Iode (F).	١٢٦,٩٢	I	ي	يود
Iodine (E).				
Bouquet de fleurs (F).				
Bunch of flowers (E).				
Mise bas des carnassiers (F).				
Cub (E).				

11957 - رَشَشٌ Bouquet de fleurs (F).
Bunch of flowers (E).
للانثاء، أي الباقة من الزهر.

11958 - رَمَصٌ Mise bas des carnassiers (F).
Cub (E).
وضع السباح.

11959 - رَمَصِيَّةٌ الرصية: آخر المير وذلك حين تحترق الأرض لان اول المير الرصية ثم الصفيقة ثم القدنية ثم الرصية (السان).

11960 - رَمَصِيَّةٌ °، ° رَمَصِيَّةٌ °

Rhamphocle, Tife (F).
جنس طير من فصيلة التنتريات. انواعه المعروفة ستة. موطنها المناطق الحارة من البرازيل والبلاد المجاورة. تألفت الادغال والحراج المبشرة الاشجار. نظامها العالي جامع. اسرارها متوافقة المجد تكثر فيها القطة || اجناسها صغيرة القد. مثالبها غمرقية الشكل صغيرة. اجنسها متدلة الحجر. اذنانها متوسطة القد، مقطوعة الاطراف. اصباغها دقيقة. ألوانها جميلة الاوان يكثر فيها الاحمر القرمزي || جميع انواعها تعيش على البنود وبفس اللآلئ السنية || تدان اشغالها في الادغال على ارتفاع ٤ او ٥ اقدام من سطح التربة. اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمنوبة للذكور نحو ١٤ يوما.

11961 - رَمَكَة

الرَمَكَة، هي لون الرماد في الجبال. يقال في لونه رَمَكَة. والارمك من الجبال ما كان لونه رَمَكَة، قال أبو حنيفة هو الذي اشتهت كتبه حتى دخلها سواد والاني رَمَكَة. ج رَمَك.



رمفول



رملين

خلى القشار يطول من ٤ الى ٨ سم. قريبا متضارب الاذن، اسن الرأس والكوسل، اصفر الطوران، اسمر السكة الشريية والجرايز. رأسها مستدل الجرم، غروطي الخطم. فكها قويان. حينها مشتركة. زباناها عيطان مخيسان. ظهرها سنان الشكل لا يلبس كامل البطن || لها جبل واحد في الحبل. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتمش حتى آب. تسرح في التبار. تسعد في تموز. تمتع الكمن لطناً مربية الشكل تحت حله الاشجار اليابسة وبعت الجلالة || البرقة عت بلونها لكال الجسودي طولها نحو ٨ سم. جسمها شبه مدني الشكل، مبط الجرم مداسي الرواجب، حطلي اللون، اسمر الحاج، يمتد في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طلياً من كل فلاف تحت الهواء او تحت الجلالة.



رموس ثاني اللون

١١٩٨٢ - رموسية
جنس نباتات عشية برية حولية من فصيلة المشغاشيات مشهورة باسم سلبج، اطباها.

١١٩٨٣ - رموسية
جنس طير من فصيلة القرقنيات. انواعه المروفة ستة اطباها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. منقلاها غززية الشكل. اجنتها قصيرة، مستطلة الانفرج. اذنانها متضاربة طوية. ارفها قوية حسية || قريبا الحشرات ويرقاتها ومكها وما اصطاعت اليه ميلاً من البزور البرية خاصة في فصل الشتاء || اعرف انواعها وظهرها الريز الكمل.



رربة مصفدة

١١٩٨٤ - رموسية مكسلة
Agithalus pendulinus (S). Réniz penduline (F). طائر من الريز. صغير القد، طولها نحو ١٣ سم. رأسه وصفته وصوله الى الصبهة الرادية. بطنه ابيض، الى انباض الاخير. ظهره الى الصبهة الزبداء. قولده وياهره سيد الصفة، ييش الحاشية الصبائية الحاج. كسطة حيه سيواه تمتد من قاعدة المتقاد الى الاذن || اطناها تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية. يآلف المتاع وضفاف مجاري الماء || قوته الحشرات والديدان ويزور النباتات البرية || ييش عشه في الانفاق والمائل والمغاص. الاثتق نحو ٦ بيضات متحفها بمناوة القد نحو ١٣ يوما.



وزير مكسل

١١٩٨٦ - رموسية
Prionurus (S). Prionurus (F). جنس اسماك بحرية عاتية من شاكات الزعانف. انواعها المروفة قليلة العدد. اطباها تمتد من بحار اليابان الى امريكا الجنوبية || اجسامها الطليجية الشكل، مبطلة، طولها من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستطلة القد، مخسورة الانضمام الصغيرة للتشرة. حينها صغيرة ريمة الاكثران. زباناها الظهريه مستطيلة، قليلة العرض. زباناها الموضية تتألف من مخس حصاد رضة شمع. الشريية تقابل الظهريه والذيلية مقرة. القليها تزوج من السمرة الحطية الى السمرة السيواه يطويها في جوانبها لطع قاطبة صفراء اللون او شقراء او سمراء || قوتها الاغصاب البحرية. لحوها متوسطة الصف، مأكولة.



رربة

١١٩٨٧ - رموسية
Macroscopic (F). Macroscopic (E). هو ما يرى بالعين المجردة.

Rhamnusium (S). Rhamnusium (F). Rhamnusium (E). جنس حشرات من حمديات الاجنحة وصيلة القرقنيات. انواعها المروفة قليلة العدد. اطباها تمتد من اليابان الى اوروبية || اجسامها متوسطة القد، طولها من ١٥ الى ٢٢ سم. اقلها ثنائية اللون. تسرح في التبار. تظهر في ابرار ويطي حتى اواسط ايلول || عرضها الاثرار الحربية. يرقاتها غاشية تركب الحور والودار والريزون والقنقل. .. فتشتر الهواء وتسررب الشكير.

١١٩٨٧ - رموسية ثنائي اللون
Rhamnusium bicolor (S). Rhamnusium bicolor (F). Rhamnusium bicolor (E).

حشرة خاضعة عاتية من فصيلة القرقنيات ودية صفات الاجنحة. تألف الحادق والناظن والسبايات الحية وضفاف مجاري الماء. غناصها غاشية تغطي من جمع اجزاء النبات. يرقاتها غاشية تركب الجلوع والافصان تغلفها حتى الشكير وقد تغفل الحور والصفصان والذب على غيرها || جسمها متوسط القد اعيف الشكل يطول من ١٦ الى ٢٢ سم. ثورها ثنائي اللون، رأسها وكوسلها وبطنها ويرايزها الى الاحمر القرميدي، ظهرها الى الزرة يعلوا موج ينحسي عند الذكر. رأسها مستدل الجرم. حينها كيرتان جاسطنان. زباناها كيرتان مقوسان. فكها ضليمان. ظهرها مستطير الحورف الاثتق، متتابع التميزر القمدي القاطب. ارسافها رباعية القمل القاطرة || الاثتق اكبر قدماً من الذكر واقصر زبانا منه واثتق ثوبا || جيلها ثلاثي الحبل. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتمش حتى آب. تسرح في التبار. تسعد بعد ظهورها باسبين. ترو الكمن تحت قشور الجلوع والافصان || البرقة عت الادراك التام طولها نحو ٢٢ سم. جسمها اسطواني الشكل، عادم الرواجب، اسمر اللون، اسن الرأس، ميشر الحلب الدقيق || طور الاكمال الذي يستمر من ٥ الى ٥٥ يوما ينقضي في آخر نفق استخرته البرقة ضمن صليبة خاوية من المواد النباتية المحسنة بالريال.

١١٩٨٨ - رموسية، هين القطة
Bonduc (Frute) هو ثمج البندق الحدي، حيه حيم البندق المروف اما يقل عه استدارة. يتغلق من لباب جامد حاجي اللون يحمي بيضه الادنات الثالثة. وهو يتغير من المقويات ويستعمل في المنة كدليل الحسيات وقد تيش الانامي.

١١٩٨٩ - رموسية
Saprophyte جهاز نباتي اولي نظري او جزئي ييش حل الفضويات البالية.

١١٩٨٩ - رموسية
Saprophytisme (F). Saprophytisme (E): حالة الاجسام الضاحية التي تعيش حل المواد الضوية المتحللة.

١١٩٨١ - رموسية مصفدة
Stenalia costacea (S). Stenalia costacé (F). Stenalia costacea (E).

حشرة واثمة غاشية دامت من فصيلة الرديليات ودية صفات الاجنحة. تألف البراري والاحراج الخلقة. غناصها تعيش حل اثار وارواق الصيوليات. يرقاتها تعيش حل المواد النباتية المتحللة || جسمها صغير القد،

١١٩٨٨ - وِكَلَو * Oryzovore (F).

اجناسها وانواعها الممارسة المروقة قليلة البد. جميعها من علم بحار امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها متدلة اللد. اصداها لامة متدلة السباكة يكثر فيها الشكل الاحليلجي || تموش لاصقة بالصخور المنصورة. لفيها قليل الغزاة || اعرف اجناسها واشهرها الرنجة .

نمت ترميفي يطلق على كل حيوان او طير قوته الارز .

١١٩٨٩ - وِكَنان Araponga à trois cornes (F).

طائر يدعى اربننا ثلاثي النحاس ، اطلب .

١١٩٩٠ - وِكَنَة Rangifer (S).

Renne (F). Reindeer (E).

جلس حيوانات لينة بجرة من فصيلة الايليات. اصطانها البلاد الباردة . قتها الاعشاب والاوراق وزينات الاشجار ذواها والصلاب والفقوس || تموش جماعات، اجلها يمد من ٢٠ الى ٥٠٠ نغر. تجوب معظم الاسقاع الثلالية في طلب اللوت || اناها تنفع من يطور الى يطورين . لها نهمان: القرنة الثامنة والرنة الاسريكية .

١١٩٩١ - وِكَنَة لَمِريكية Rangifer tarandus caribou (S).

Renne américain, Caribou (F). American reindeer, Caribou (E).

نوع من الرنة ، موطنها امريكة الثلالية ، ضروها ارمية اجسامها كبيرة اللد تملو من ١٢٥ الى ١٤٠ سم . وزنها يراوح بين ١٧٥ و ٢٠٠ كيلو. اثوابها الى السرة يملوا مزيج اصهب || تسجن بصسوة . لا يمكن استعمالها كالبزة الثامنة .

١١٩٩٢ - وِكَنَة شامكة * Rangifer tarandus (S).

Renne commun (F). Common reindeer (E).

نوع من الرنة ، موطنها البلاد الباردة المنفذة من الترويج الى اقاصي سيبيريا . جسمها كبير اللد يملو نحو ١٢٠ سم . راسها غليظ مسطيل . قربها كيرة متشعبة تطول نحو ١١٥ سم . عنقها قصير . اذناها مستديتان . حياتها بقرتان . ثوابها قوية . انظافها صلبة فائرة تحكمنها من السير على الثلج . ذلها قصير طوله نحو ١٤ سم . ثوابها الى السرة يملو مع اقترابه من ثيج الظهر ، يملو ويبيض مع البلى ومنذ داخل القتران || تسجن بسهولة وتستعمل استعمال البقر والاعمل .

١١٩٩٣ - وِكَنَجَة Rangia (S).

Rangie (F). Rangia (E).

جلس حيوانات بجمرة من الرضويات صفحيات الخياشم وصليقة الرغيات . انواعها المروقة قليلة اللد اصطانها اعول ومصبات اهر امريكة الوسطى والجنوبية || اصداها شبه يبيضة اللون ، متصلة اللد والاحادياب متساوية الصاويص ، لامشوية الافضل . ثوابها من الخارج الى البياض المنشد والصلط بالكسني والجلوي ، ثوابها من الداخل الى البياض القلوي اللامع || ثوابها مأكولة جيدة الصفت .

١١٩٩٤ - وِكَنَجُوسِيَّات * Protorthoptères (F).

Protorthoptera (E).

رنبة حشرات منقرضة من طبقة مستقيبات الجناح . اساقفها تعود الى الحقتين . الكروبية والبردية من الاباج الارل || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف مستقيبات الجناح . ترتيبها الرضوي البسيط يدل على ذلك .

١١٩٩٥ - وِكَنَجِيَّات * Rangtidae (S).

Rangtidae (F). Rangtidae (E).

فصيلة حيوانات بجمرة من الرضويات صفحيات الخياشم



رنة شامكة



رنجة الكشش



رنجة الورود

١١٩٩٦ - وِئِشُوص Rhynchosia (S).

Rhynchosia (F).

جلس نباتات عشبية معمرة بيرة من فصيلة القرنيات القرانية . انواعها المروقة نحو ٧٠ . جميعها من ثوب المناطق الحارة والاسوائية || سيقانها ماذدة او عارضة كثيرة الخوالق . اوراقها رفيقة متعاقبة . انزعافها عشوي التسجيع ، ابطي وطرفي الارتكاز . انزعافها صفراء اللون او حمراء .

١١٩٩٧ - وِئِشِيَّة Botryosphaeria

جلس فطور مجهرية من الرضويات يتميز بوليمته الغائرة تحت البشرة في نسج اللحاء . اصنافها غليظة مختلفة الاكثار . يوله بسيط التركيب والتسجيع ، يضي او احليلجي الشكل . اظهر انواعها الخلية رنجة الكشش ورنجة الورود .

١١٩٩٨ - وِئِشِيَّة الكِشِشِيَّات * Botryosphaeria ribis,

الكشش Macrophoma, Dothiorella mali (S). Black-rot du groseillier (F).

فطر مجهر يسيب الكشش ويضف الثنابات الاخرى كالوز والطاح والاجاص والكمرة والجزر والبرتقال والحامض واليوسى || مظهره الغائرة في الكشش يقع في صفة مبرنة تسب جفاف القشرة وذبول يمل بالذوي صم عند زوالا الى اللند فافسح فافسح || وهو في الحشيات وصم يسيب صرير الفروع والساق يمد ان يسلب الثمار يبقعه الرنجة التي تئود مهام اللين ثم سمره . وهو على الفلاح يقع رنجة ثوابها الى السرة تركب ارياسه والانان فتصلب اقسام اللحاء المصابة وتسب ارياسه يكاثف يقطع وسرق الاعضاء المصابة فور ظهور الرصم او القبول ثم تطهير الجروح بمذيب سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٩٩٩ - وِئِشِيَّة الورود * Botryosphaeria dothidea (S).

فطر مجهر يسيب الورود في فروعه فيلوجا || مظهره الخاربي قروح بجمرة جامدة بارزة مبرقة تملو سطح القشرة تنقشه وتغور في الثناخل فتصلب الفكر والالاف الحشية || يكاثف بالقطع والحرق ثم التطهير بمذيب سلفات الحديد .

١٢٠٠٠ - وِكَد هو الجار ، واسدته رندة .

١٢٠٠١ - وِئِشِيَّو Renne (F).

Reindeer (E).

حيوان لين يجتر من فصيلة الايليات يدعى رنة ، اطلب .

١٢٠٠٢ - وِئِشِيَّو Rendzine

اربة تميزت ببيود بعض البقايا الجصية المحسرة في مقاطها المحسرة . لشكلها والوانها عديدة يكثر ثوابها الاخر والاصفر والاحمر والافير والاصود .

١٢٠٠٣ - وِئِشِيَّو Calla (S), Choucalie, Calle (F).

Calla, Trumpet lily (E). Schweinewurz (D). Calla (I).

نبات عشبي بري بجمودي معمر من سبط الرنيات



رئس النّاتع



رئشيت لارزق



رئشيت الكركة



رئشيت خري



رئشيت مذهب



رئف للملك



رئشيت

صنّاعا كيرتان ناشرتان . زبانا دقيقان ، صقيان .
ظهورها مثل الاحديان مطوّر الطرف المنقش نحو
الاسفل . خداهما منتهات تنحيز ، كئيفات الجمل ||
لها جيل واحد في الحقل . تظهر الحشرة الجملّة في اوائل
الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تتألف بعد ظهورها
باسيومين ونسج ولكن مباحداً في سوق الجار القليلة في
قريب تخليجها تنمكو || البقرة عند الادراك تلتام طول
نحو ١٢ سم . جسمها دقيق الجرم مقوس الشكل ، تني
اللون ، وردي المويج ، اسود الرأس والرجل ، حاد
الرواجب ، تلبو ثلاثة خطوط من القشور السود || طور
الاكامل الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتغني ضمن
جراب من التراب والمواد الغضرية المحيية بالرياح .

١٢٠١١ - رنّوف

Poinciana (S).
Poinciana, Poincilliana, Poinciana, Poinciana (F).
Poinciana (E). Poinciana (D). Poinciana (I).

جلس شجيرات يرة ورنّوفين من فصيلة الرنّوفيات ، انواعه
قليلة بعضها شاكك . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها
معتدلة التجميع جميلة للشكل كالأقلام اللون موزعة بالاحمر .
اشهر انواعه الرنّوفية الرنّوف الجليل ورئف الملك .

١٢٠١٢ - رنّوف الملك ، ورنّوف الجملّة

Poinciana regia, Delonix regia (S). Poinciana superba, Flamboyant, Fleur de paon (F). Royal poinciana, Peacock flower (E). Poinciana (D). Poinciana regia (I).

شجيرة رنّوفية من الرنّوف تملو من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .
ساقها ورفوها شاككة . اوراقها عابدة ، ازهارها هري
الشكل . ازهارها كبيرة القند ، صيرها فلاح مستحب ،
لونها احمر برقالي . اسديتها نارية اللون تلبو نحو ٢ سم .

١٢٠١٣ - رنّوف جصيل

Poinciana elaea (S). Poinciana elaea (F). Poinciana elaea (E).

شجيرة رنّوفية من الرنّوف تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .
ازهارها جميلة للشكل كبيرة القند نارية اللون موزعة بالاحمر
ترقب في الاربة المخلطة والتمسكة الانساج . نخل الرطوبة
المستحكة .

١٢٠١٤ - رنّوف

Poule couvaux (F). Brooding-hen (E).

هي الدجاجة الحاضنة للرطوبة عند العلة بالقرقة .

١٢٠١٥ - رنّوف

Rhynchote (S). Rhynchote, Timmon (F).

طائر من فصيلة الرنّوفيات طوله نحو ٤٢ سم . رأسه
صغير القند . منقاره مستطيل . منقعه دقيق وطويل . ريش
ظهوره وجانبه الى الصبغة تلوها خطوط سود معتدلة .
انفكته متوسط القند يتلبس الارض . يلبه اشهل الريش .
يلبو بصرة نائلة . يألف الاصراج والنباتات والمروج .
قوته الجار والحبوب والحشرات والامشبات || الانثى تبني
من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها وسحها نحو ٤ اسابيع . يقال
انها تحفن ثلاث مرات في السنة .

١٢٠١٦ - رنّوفيات

Crypturidae, Timamidae (S). Crypturidae, Timamidae (F). Crypturidae, Timamidae (E).

فصيلة طير من الرنّوفات ، اجناسه وانواعه عديدة .
مهدا امريكة الجنوبية ، جسمها صغيرة القند مستطيلة
قصيرة القوائم || قوتها الحبوب والباز والامشبات والحشرات .

ونصيلة الفلغاسيات . انولاه قليلة . اوراقه قرصية الانتشاح
زنايدة متصبة . رجعته الزهري خمراني الناحية . جناح
عينية الشكل متراكبة لينة .

١٢٠١٧ - رنّوف النّاتع

Calla palustris (S).
Calle des marais, Choualtes des marais (F). Bog-
arum, Water dragons (E). Aronstab, Echte schwe-
weinewurz (D). Dragonet, Pleda di vitallo
palustre (I).

لوع من الرنّوف يعيش في النّاتع وعلى ضفاف السيورات .
جلموره مداد . اوراقه قليلة الشكل طويلة الزناد المنصب .
شراعه يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . شراعه ابيض الزهر
يطول نحو ٧ سم . ثماره عينية متراكبة متراصة مرجانية
اللون .

١٢٠١٨ - رنّوفيات

Callies (F). Calla (E).
سبط من فصيلة الفلغاسيات .

١٢٠١٩ - رنّوفيت

Rhynchites (S). Rhynchite (F).
جلس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة تعيش
على الاشجار المثمرة والحرجية . اولياها زاهية الالوان .
اجسامها صغيرة القند ، ريقها غارة تلبم الارواح وتمتص
الصارة . اشهرها ما يتبع .

١٢٠٢٠ - رنّوفيت لارزق

Rhynchites caruleus (S). Rhynchite bleu, R. coupe-
bourgeois (F). Apple twig beetle (E). Zweig-
techer (D).

حشرة صغيرة القند من السويات ، طولها نحو ٣ سم . لونها
ازرق لامع . مسطها ورفاتها سود . تركب الاشجار المثمرة
اغصانها والاحاص والفتح . تقتصم مع ريقها الجرام
الزهرية تنفسي عليها .

١٢٠٢١ - رنّوفيت الكركة

Byctiscus betulae (S). Rhynchite de la vigne, Cig-
rier, Urber (F). Pear leaf roller (E). Rabensteher,
Zigarrenmacher, Zigarrenwickler (D).

حشرة من السويات صغيرة القند طولها من ٦ الى ٨ سم .
لونها اسفج يملو مويج زرجدي . تنجح الانثى مكها على
ورق الكركة فيفتن من ريقات صغيرة دقيقة مستطيلة
تقلل الارواح وتعيش في داخلها .

١٢٠٢٢ - رنّوفيت خخري

Rhynchites bacchus (S). Rhynchite bacchus (F).
Rhynchites bacchus (E). Purpurroter Apfelfrucht-
stecher (D).

حشرة من السويات طولها يراوح من ٥ الى ٦ سم . قوتها
قربزي الون يملو مويج بنفسجي . تركب جميع الاشجار
المثمرة . تلبم الجرام الزهرية لاصاص صارتها ثم تنجح
مكها الذي يتغني من ريقات تملل الجار وتصلها .

١٢٠٢٣ - رنّوفيت مذهب

Rhynchites suratus (S). Rhynchite doré (F).
Rhynchites suratus (E).

حشرة خاضلة ثائرة من فصيلة السويات ورنّوفية مسلمات
الاجنحة . تألف الجلمان . غناضها تلبم جرام الخوخ
والفلفل ويتلاد الزناد والوراثي القليلة . ريقها تنيش
في الثمار وداخل حباتها || جسمها صغير القند يملو من
٧ الى ٩ سم . قوتها ال اغصان النامي يملو مويج ابرواني
ورئف اشقر . رأسها كئيف الحمل ينهي بترك مستطيل .

Melanospora (S). ١٢٠٧٥ - زهكاه
جنس فطور مجهرية من السناحيات وفصيلة السناحيات .
أصابتها زئيفة ، بديئة ، بسيطة ، منفردة ، مستديرة ،
عابقة اللون || تكاثرتا ديبوية الشكل لا تكاذا لها ،
سرية الانصلاص || يربطها ويسجد الخلية اسمر اللون .
أنواعها الملوقة ثلاثة وهي ما يبع .

Melanospora stysanophora, Stysanus stomontis, Dematophora glomerata (S). ١٢٠٧٦ - زهكاه الزئوف
فطر مجهرى تركيب جلور الكثرة والباطما ويبرها من
النباتات الثانوية || يعيش ويتكاثر في بيئة مشبعة
الرطوبة || مظهره الحاربي يبع سطحية خلية مهددة لزجة
الملمس تركيب الجلولر فتصلها || يكافح بتحفيض الرتبة .

Melanospora damnosus, Sphaeroderma damnosus (S). ١٢٠٧٧ - زهكاه الزئوف
فطر مجهرى يصيب القمح والشعير والشتوان || تركيب
سلاسل القصب وأحمد الصف زئيفها يبع فصية
خلية سطحية تيق التمو وكذا الاسبال || أضراره زئيدة
عمودة ألا اذا وأفتها العوامل الطبيعية وأصاحبا بنجاف
الترية والجر .

Melanospora asparagi (S). ١٢٠٧٨ - زهكاه المليون
فطر مجهرى يصيب المليون فؤوده وقد يصيب يباسه .
تركيب السوي في أي وقت كان فيضل إصاحها الحورية
ويصيب أنفقات رؤوسها وأضرارها نحو الأرض ثم جفافها
قبل اكمال دورتها الحياتية || يكالشم منه بدء ظهوره
بأصباح اسد الفواطير الفعالة غير المركزة على التماس .

١٢٠٧٩ - زهكاه هو قودج شوت ، اطليه .
١٢٠٨٠ - زهكاه ما لا يصيد من الطير .

Impondérable (F). ١٢٠٨١ - زهكاه
Imponderable (E). الزهبل ما كان غير قابل الوزن .

Impondérabilité (F). ١٢٠٨٢ - زهكاه
Imponderability (E). الزهبل عدم قابلية الوزن .

Tilletia ١٢٠٨٣ - زهكاه
هو أنخريه جنس فطور مجهرية .

Tilletiaceos (F). ١٢٠٨٤ - زهكاه
Tilletiaceas (E). هي الفخريات فصيلة فطور مجهرية .

Seratus ١٢٠٨٥ - زهكاه
هو السديم نوع من الفيرم ، اطليه .

Rohdea (S). ١٢٠٨٦ - زهكاه
Rohdea (F). Rohdea (E).
تبات حشبي ، جلومري ، سروي ، عمر ، وحيد
الجنس والنوع من فصيلة الزئيفيات . مهدد بنش مناطق
اليابان || أوزانها جلورية الانتشاب ، اعليجية الأشكال ،
تعطون من ٧ الى ٩ سم . تعالما عادمة الزغب ، مستعلة
الفرق . أضرارها سنبل التجميع ، يبرقع نحو ٣ سم .

تند في أنفوس تحضره بين الإدغال الكثيفة الشائكة .
أنهر أجنتها الرزفوت .

Rhynchichthys (S). ١٢٠١٧ - زئيفيق
Rhynchichthys (F).
سمكة بحرية يربض من شائكات الزعانف وفصيلة المتفديات .
أصابتها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها متوسط
القد ، بطول نحو ٢٤ سم . رأسها كبير الجرم . خطها
مدب الطرف . فكها الأمل يتقدم الأسفل . شفتها رصب
الانقرع . ميناها كيرتان ، جاسطان . زعنفتها الألفية
فارقة . أسفانها سفنة اخضر شائكة . ثوبها الى الرمكة
القضية للمواج يمين في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير
في البطن || لحمها جيد المصنف ، مرغوب فيه .

Clupea (S). ١٢٠١٨ - زئكة
Hareng (F). Herring (E).
جنس اسمك بحرية من فصيلة السابوحيات وأنواعه نحو
٩٠ ، موطنها بحار المال أخصها بحار المناطق الحارة .
نظامها الحياتي جاسي . سرها يد نحو مليون سمكة . تجرب
البحار في المياه الألفية حيث تكثر القشريات التي تركز
عليها قشرا . وقد تدخل مصبات الأنهر || أضراره
زئكة الشائكة وزئكة البحر الاسود .

١٢٠١٩ - زئكة البحر الأسود
Clupea pontica (S). Hareng de la mer Noire (F).
Pontica herring (E).
نوع من الزئكة ، موطنها البحر الاسود ، ظهرها الى
الزئكة الرسامية . جانبها الى الزئكة البحرية القضية
المواج تعلوها خطوط دقيقة مستطيلة عابقة . بطنا فهي
اللون والمواج . سرها نحو نصف مليون . تصاد وتؤكل .

Clupea harengus (S). ١٢٠٢٠ - زئكة شائكة
Hareng commun (F). Common herring (E).
نوع من الزئكة ، ظهرها الى الزئكة ، جانبها وبطنها
فضية المواج . تكثر في المحيط الاطلسي . نادرة في المتوسط .
سرها من المليون الى المليونين . تصاد وتؤكل .
١٢٠٢١ - زئكة نبات دقيق (اللسان) .

Renanthra (S). ١٢٠٢٢ - زئكشيرة
Renanthra (F).
جنس نباتات أسية من فصيلة السطليات . أنواعها
الحمرقة حنة . أصابتها تمتد من الهند الى ماليزية . يكثر
ويجها في الغابات والأحراج الظليلة الرطبة وقد أنتشرت
زراعتها القريبية المركبة منه معظم الشعوب التي تمتد
بالانتماد || أوزانها مزدوجة التصفيف ، جلدية التماس
المستطيلة الضيقة . أضرارها كبيرة ، خاصة البتلات
المستطيلة ، شفلية التجميد الذي يبرو كالنشر . ألوانها
الى الحمرية منها القرمزي والاربعوني والاحمر الزاهي والاديس
والوردي .

Echoudage (F). ١٢٠٢٣ - زؤوح
لفح الحر يصيب لزوع من حنطة وشعير بدء أضراره
فيضر حيه .
Altitude ١٢٠٢٤ - زهكاه
رداء كل شيء : ارتفاعه عن سطح البحر وسيله . ومنها
خطوط الرداء (Courbes de niveau) .



زئيف



زئكة



زئكشيرة



رداء الزلاب



رداء الزرع



رداء المليون



رداء

Rhyacophila (S).

الرَّهَكُولِيَا

Glossosoma (S).

الْفَلُوسُومَة

Agapezus (S).

الْأَغِيُوسُ

ويقوم على شراخ غليظ يرتفع نحو ٤ سم. أزعاجها صغيرة ،
لبدة ، حمراء اللون || تنوعها يستمر من أيار إلى حزيران.
تزدج الترتين ضمن البيوت وفي المصاري وفي الحدائق
الداخلية .

Brouillard épale (F). Dasse fog (E). رُهنَل

١٢٠٤٥ -

محباب رقيق جراد رذاذ كائى ينشئ المناطق الجبلية .

Rhodens amarus (S). رُهنْدُسي ٥٠

Bouvière (F).

سمكة نهريّة من فصيلة الحماة وفصيلة الشبليات .
أصلها بعض أنهر الشرق الأدنى وأوروبا || جسمها صغير
القد يصل من ١٢ إلى ١٥ سم. رأسها صغير الحجم ،
قصير الخطم . لكنها الأمل يتقدم الأسفل . زعنفتها الظهرية
صغيرة شبه هرمية الشكل . زعنفتها الذيلية عريضة ، مقعرة .
ثوبها إلى الشهية السمراء اللقضية المولج ، تميل في الظهر
ويبيض في البطن || لحمها متوسط الصلابة ، مأكول .

Rehmannia (S). Rehmannia (F). رُهنَالِيَة

١٢٠٤٦ -

جنس نبات عشقي الثمرى عرف على اسم العلامة الروسية جوزيف
رهمان (١٧٧٩-١٨٤١) . أنواعه عديدة وهي: عشية
معمرة من فصيلة الحناكر نبات . سيقانها خضراء زاهية .
أوراقها مثاقية ، نصلها أطول من العرض ، مسنن الحافة .
أزهارها كبيرة اللقد ، فردية التجميع ، أبطية الأبتكار .
أشهر أنواعها الزينية ما يليج .



رهنس

Rehmannia alata (S). رُهنَالِيَة سَكَمِيَة

١٢٠٤٧ -

عشبة معمرة منها الثمرى الأصفر تلون من ١٠٠ إلى
١٥٠ سم. أوراقها أطول من العرض ، مسنن الحافة .
شعبي التكتين ، أسنانه مدنية حادة . أزهارها كبيرة اللقد
تطول نحو ٨ سم. وردية اللون يصلها مزاج أرجواني
يميل مع اقترابه من قاعدة الزهرة || أنموذجها صيني .

Macronyx (S). رُهنْدُك

جنس طير من فصيلة القربيات . أنواعه قليلة أصلها
البلاد الإفريقية . تتميز باستطالة ذواربها ، أجسامها
صغيرة اللقد ، ألوانها إلى الوردية ، ظهورها مائلة ، ريشها
أبيض الأفرات . يطير إلى الصبية . أزوارها مطوية بالأسفل
حواجب بعضها برفالية اللون || أنماها تنشئ في الأغالل
تبيض من ٣ إلى ٤ بيضات ، لونها إلى الزرقه يطولها يتبعج
جلوي || قوتها الحشرات والبرور البرية .

Rehmannia glutinosa (S). Rehmannia visqueosa (F).

١٢٠٤٨ - رُهنَالِيَة لَزَجَة

عشبة معمرة منها الصين وآلبان تلون من ٣٠ إلى ٦٠ سم.
ساقها غنية لزجة . أوراقها خلية النصل ، جزوية الصلابة
السفل ، غضراء البلى . أزهارها صفراء اللون موشمة بالآخر ،
أطرافها وردية ، حادها أبيض || أنموذجها يستمر من
نهان إلى حزيران .

Pyrrhuloxia (S). رُهنْدُك ٥٠

Pyrrhuloxia (F).

جنس طير يهدن في مشقة من فصيلة القربيات . ألوانه
قليلة تبيض معظم حياتها على الأرض . أصلها البلاد
الإفريقية . جسمها صغيرة اللقد . أجسامها تطول من ١٤
إلى ١٥ سم. منقوشها غروبية قصيرة . ورومها سود ،
عاسرها أبيض ، ظهورها إلى السمرة القرمزية ، بطونها سود ،
غواظها إلى البنية ، أجسامها إلى السمرة الزبداء . أنماها
مبلقة || أنماها تحضن من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة .
تلش في الفترة بين الأغالل . حشنتها ثلاث بيضات ، لونها
إلى الخضراء ، طولها رقيقة سمراء . ج رهاذن .

Rehmannia arguta (S). Rehmannia arguta (F).

١٢٠٤٩ - رُهنَالِيَة مُنْطَلَعَة الْبُرُور

عشبة معمرة منها الصين . طول من ٦٠ إلى ٩٠ سم .
أوراقها السفل متقاربة . نصلها لا يقاسي التقليل ، حلي
البشرة . أزهارها تطول من ٦ إلى ٧ سم . لونها إلى الحمرة ،
قاعها بتسجية ، أطرافها أرجوانية موشمة بالأبيض .
برورها حادة الأزوايا مشدلة .

١٢٠٤٩ - رُهنْدُك ٥٠

في للشفتين التشر ، أطليه .

Hypothèque (F). Mortgage (E). رُهن

١٢٠٥٠ -

حق عيني على عقار تأسيباً للدين .

Assise (F). Foundation, Basis (E). رُهنَس

١٢٠٥١ -

المرق الأسفل من الحائط .

Hypothèque conventionnelle (F). Conventional mortgage (E). رُهنَ إِنْكَافِي

١٢٠٥١ -

هو الرهن العقاري الذي ينطق بتراضي الدائن والدائن .

Pressurage (F). Pressing (E). رُهنَس

١٢٠٥٢ -

شدّة الصبر لاستئصال المسطاع من المادة المقصودة .

Nantissement (F). رُهنَ الْحَيَاةَة

١٢٠٥٣ -

هو عقد ضمان عيني يلغى بمقتضاء الدين أو غيره مع أنه
الدائن ضماناً لدية سيارة مال ثابت أو متحول ويحول حقاً
عيني على هذا المال .

١٢٠٥٣ - رُهنَطِي

طائر يقال له غير السركة .

Antichrès (F). رُهنَ حِيَاةَة الْفَكَار

١٢٠٥٤ -

مقد يبيع وضع اليد على عقار المدين استيفاء لقوائد والمال
المطروح .

Rhyacophilidae (S). رُهنَكُولِيَا ت ٥٠

Rhyacophilidae (F). Rhyacophilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . أجسامها
والأزوايا المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد
المتحدة الحرارة || أجسامها متوسطة اللقد سمراء اللون .
أجنحتها الأمامية مقبضة أو موزعة . أما الخلفية لشفاة
مهدبة المختار الخلفي . قوتها الأمامية مجوذة بمنحس
ظنبري الأبتكار || أسرارها تبيض في المياه الزاكية أما
طليقة أو ملسقة بجلايب شبه البوية الشكل .
أشهر أجناسها :



رهن

١٢٠٦٦ - رُوكَايْنِي مِي الْوَايْنِي .

١٢٠٦٧ - رُودَاد * ، رَهْوُ الْجَنْتَةِ

Tetractaryx paradisae (S).
Tétractéryx, Grue de paradis (F).

طائر من طول الساق ونصيلة الكركيات . اطائه تشمل البلاد الافريقية وبعض المناطق الاسيوية يحويها في طلب المرقع والصيف والشتى . يذبح حقه ويضرب بيشه في افريقية الجنوبية || جسمه كبير القند اجف القوائم مسطحة الذنب غرزي المنقاد . ثوبه الى الوردية الصنائية المواج باستثناء خط ابيض يمتد من قاعدة الفك الاسفل عبر الزور والمنتق ، الى اعالي الجرشن || وبشه مهذل مرغوب فيه .

١٢٠٦٨ - رُوكَايْنِي
Pis de la brabie (F).
Dug of swa (E).
في ثمل الشاة خاصة .

١٢٠٦٩ - رُوكَايْنِي
Coureurs, Ratites (F).
Ratites (E).

احد قسم الطير يشمل اربع فصائل التاميات والشيبيات والرفقيات والكويويات . اما القسم الثاني فيشمل الجويشيات .

١٢٠٧١ - رُوكَال
Beve des bestiaux (F).
Slaver of cattle (E).
لذاب اللواب ، ويقل لذاب الخيل خاصة .

١٢٠٧٢ - رُوكَال *
Blennius pholis (S).
Pholis lisse (F). Shanny (E).

سمكة بحرية من فصيلة الجيريتات . اطائها بعض بحر البلاد الحارة والمتحدة الحرارة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٧ سم . رأسها مستطير المكشك ، قصير الخطم ، صغير الشفت . عينها صغيرتان مساحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة تمتد من الرأس الى القليل . الشرجية ضيقة مستطيلة . الصدريتان مرويتان . الحوضيتان صغيرتان دقيقتان . الذيلية مقنطرة || ثوبها العلوي الى البهلا السراء يعلوها مواج يراوح من الاخضر الى الفضي . يعلها الى البياض الاخير || لحمها مأكلي ، جيد الصنف .

١٢٠٧٣ - رُوكَايْنِي
Oiseaux nocturnes (F).
Nightly birds (E).

١٢٠٧٤ - رُوكَايْنِي
Argentine vulgaire (F).
سمكة بحرية تقطع فبس فضي ، اطها .

١٢٠٧٥ - رُوكَال *
Caillé (F).
Curd (E).

خيرة تلقى في الحليب ليروب .

١٢٠٧٦ - رُوكَال *
١٢٠٧٧ - رُوكَايْنِي
Ruppie (S).
Ruppie, Rupelle (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انوعها المعروفة قليلة العدد بعضها الاياج في مناطق البلاد الحارة والمتحدة الحرارة . اوراقها غنية الرباط كأوراق النجيليات .

١٢٠٥٤ - رَهْنُ قَصَّافِي (F).
Hypothèque judiciaire (F).
Judiciary mortgage (E).

هو الرهن القائم على حكم المحكمة أو المحكمين عمليا بالصيغة القضائية .

١٢٠٥٥ - رَهْوُ
هو الكرسي ، اطها .

١٢٠٥٦ - رَهْوُ
Grue (F). the Crane, Grus (E).
المرح كوكبة نجوم جنوبية الميخ . نجوما متصلة العدد ، كاملة المدة .

١٢٠٥٧ - رَهْوُ الْجَنْتَةِ
Grue de paradis (F).
طائر من طول الساق يمشي روكاد ، اطها .

١٢٠٥٨ - رَهْوَكِيَات *
Phacocaea (S).
Phacocées (F). Phacocaea (E).
فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبختيات .

١٢٠٥٩ - رَهْوَمُ
Mouton maigre (F). Lean sheep (E).
تعريف صني يطلق على اللحم الملهوالة .

١٢٠٦٠ - رَهْوَكَة
Ambie
في المصلحة ، ضرب من سير اللواب .

١٢٠٦١ - رَهْيَد *
Alutacé (F).
هو التحييب اذيق الحيك في كويل الحشرة ونمدها .

١٢٠٦٢ - رَهْيَدَة *
Merendère (S).
Mérèndère (F).

لغات طي دويص من فصيلة السورتيانيات ، جبل الحتام قريب الشبه السورتياني . فروعها شبه غروبية الشكل . اوراقها من ٥ الى ٥ ، ناصها ثنائية تقطع من ١٠ الى ١٥ سم . تكون مستقيمة في اول مهدا ثم تلف القرية . زهرها كبيرة وحيدة بتقسيم اللون مدامية اليتلات تقوم على شراخ متصب يرتفع من ٧ الى ١٢ سم . تنويرها يمتد نحو ثلاثة اسابيع ابتداء من اواخر آب || خواصها الطبية ونافعها لا تختلف من خواص السورتياني ونافعها .

١٢٠٧٣ - رَهْيَدَة * ، دَهْيَرَا ، رَهْوُ
Labao robita (S). Robita (F). Robita (E).

دبرا وروبو من اسمائها الحديثة . نوع من اللبس سمكة نورية يمرض تنتمي الى فصيلة الشبوطيات . اطائها اكثر انهر المحدث انحصا انهار السنو وهرمانية || جسمها كبير القند يطول من ٦٥ الى ١٠٠ سم . رأسها مستطيل الجرم ، مقطوم الخطم . فكها الاعل يتقدم الاسفل . عينها كبريتان ، مستديرتان ، نازلتان . زعنفتها الظهرية واحدة شراعية الشكل . الصدريه سفلية الارتفاع . الذيلية نازقة . ثوبها الى الخضار الاسمر تنشد سميرته مع الاقتراب من ثيخ الظهر وتنفذ عنه البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكلي .

١٢٠٦٤ - رَهْيَشِيَّات *
Callicocées (F).
Callicocaea (E).

عمارة طور بحيرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزيتيات . اجنتها وانواعها قليلة تنضلل على الطحالب والحزاز . ومنها جنس واحد ينضلل على النباتات العليا يدعى قضاة .

١٢٠٦٥ - رَهْيَقُ
هو الفرج .



رَهْيَدَة



رَهْيَدَة



رُودَاد



رُوكَال

نماها حول مسطبة متتابعة تتركز على اصلاح دجمة .
تتمثل في المسالك والاحواض كوتج للاهلاك انماية .



روثية مستطبة

١٧٠٨٦ - روث الخريق °، كونيوليوم الخريق °

Coniothyrium heliolebori

ظفر مجهري يصيب اوراق الخريق فيقيها . يظهر الخارجي بقع مستديرة او بيضية تركب ساقلة الفص ، تبو حشيتة تم تنحرف الى السرة تسحب يراس واتحات النجس المنارة || يكلف عند ظهوره ، باستمال اسد السوائل النسائية الخففة .



روث ابيض

١٧٠٨٧ - روث الزنبق °، كونيوليوم الزنبق °

Coniothyrium wernsdorffiae

ظفر مجهري يصيب بعض الزنبق انصها الجريس فايوكا والياهرة || يظهر الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحمي تركب نصل الارواق الجالنة . تبو طملا اللين جزوية الخمار ان لا تقف على النجس المنارة تسحب يباسها وانفصلها || يكلف عند ظهوره باستمال السوائل النسائية الخففة .



روث الخريق

١٧٠٨٨ - روث الوردة °، كونيوليوم الوردة °

Coniothyrium wernsdorffiae

ظفر مجهري يسي فروح وفتاد الوردة فيسحب . يظهر الخارجي بقع قريسة مستطبة تبو حشيتة اللين ، مربعة الخمار الاجر ثم ترغ وتصلب كاللاكة || يركب الانواع الحساسة التي لا تتمحل في البرد || يكلف بتقاصح الاضفاء الموصية ويظهر الجروح .



روث الزنبق

١٧٠٨٩ - روثون °، روثون °

مادة فائلة تستخرج من بطور بعض النباتات البترية انصها اللويس والجراد والبرية || وهي مادة شديدة القساية يذابتها يقضي على جميع الحشرات وكل منظم الامساك الصغيرة . اما لا يؤثر في الانساق والحيوان الناجس . مما جعل استعمالها في مكافحة الحشرات ينتشر بسرعة ممتدة .

١٧٠٩٠ - روث °، روث °

Crotzin (F). Dung of horses, mules, etc. (E).

سرجين الخيل وكل ذي سافر . امامة تسبه وفكة ° وهو من الاسامة المضوية الثالثة الاستعمال . فيه بنوع خاص الاتربة المشبعة لانه يخفف من تملك ذراتها ويمنعها بالحارة الثابتة من تخمير وبالنسار انذائية التي يحولها || راجع حبوب ما يحول الفروث من عناصر في مادة ساد .



روث الوردة

١٧٠٩١ - روثة °، روثة °

Bac des rapaces (F). Bill of rapacious birds (E).

الروث : منقار كواير الطير . روثة الخقاب : منقارها .

١٧٠٩٢ - روثة °، روثة °

Casio (F). Casio (E).

جلس اسماك بحرية من شائكات الزمانف وفضلة الفرغيات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اصحابها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة لثة ، اطيانية الشكل ، متحدة التبط ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . زانفتها الظهيرة مستطبة ريشة المقدم ، شائكة القسم الامامي . زانفتها الاذيلية فاكة . الزوايا تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الزفة وشفتاها والركبة النفسية والقطعة الرصاصية || جميعها جيدة الصنف ، مأكولة .



روث

١٧٠٩٩ - روثية °، روثية °

Robinia (S). Robinier (F).

جنس اشجار وجيوات حربية وزينية من فصيلة القرنيات الفرائية . انواعه عديدة سيقانها متضبة شائكة ، اوراقها مركبة ريشية وريّة التيجع . انزهارها عقودية الشكل ، ابطي الاكناز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١٧٠٨٠ - روثية مستطبة °، شجرة الجبراد °

Robinia pseudoacacia (S).

Robiner faux-acacia, Faux-acacia (F). False acacia, Locust tree, Locust acacia (E). Gaminele schelinskazie, Gewöhnlichekaskie (D). Robinia, Falsa acacia, Falsa gaggie (I).

اعرف وأشهر انواع الروثية . غروبها عديدة متباعدة الحجم والشكل وازمان الازهار . اشجارها تطو من ١٥ الى ٢٥ م . وريقات اوراقها لا تقل عن ٧ ولا تتفرق ١٩ . انزهارها عناقيد كبيرة تطول نحو ٢٠ سم . انزهارها عريفة الزائفة عديدة الازمان يكثر فيها الياض .

١٧٠٨١ - روثية لرجة °، روثية لرجة °

Robinia vitacea (S). Robinier vitaeux (F).

شجرة من الروثية تطو من ١٥ الى ١٥ م . ساقها وطريها قليلة الشوك . نوايسها غنية اللحاء الزائفة اعدادها حر . اوراقها كبيرة لثة . وريقاتها من ١٣ الى ٢١ سم . نوايسها ابيض الصلعة السفلى . عقودها الزهري متبسط الشكل يعمل من ١٥ الى ١٥ زهرة ودية اللين يطوها موانع ينشسي .

١٧٠٨٢ - روثية مهدبة °، روثية مهدبة °

Robinia kotschy (S). Robinier de Kotschy (F).

شجرة من الروثية تطو من اللتين الى الثلاثة امتار . ساقها وطريها سرسة . نوايسها مهدبة اللحاء اللينة الزائفة . اوراقها مركبة من ٩ او ١١ ودية مستطبة النصل المائل البصرة . عقودها الزهري يعمل من ٥ الى ٨ انزهار ، لونها الالوي المشج بالاحمر . قرونها مبطلة مهدبة الشفور .

١٧٠٨٣ - روثية وردية °، روثية وردية °

Robinia hispida (S). Robinier rose, Acacia rose (F).

شجرة تطو من اللتين الى الثلاثة امتار . ساقها قليلة الشوك . فروصها كثيفة الغلب المشوك الاحمر اللين . وريقات اوراقها نمد . من ٧ الى ١١ ، نصلها مائل البصرة . انزهارها ودية اللين . عقودها الزهري يعمل من ٩ انزهار عريفة الزائفة .

١٧٠٨٤ - روث °، روث °، كونيوليوم °

جلس فطور مجهريه من فصيلة الفصليات . بتكديتها كروية او مفلطحة ، محشوة للثأ ، سطحية الانتشار . جوطا لحمي او متصلب الانسجة . شفيراته متشاككة . بوفانته يفضية او اطيانية ، صغيرة ، وحيدة الخلية ، سمراء اللين || انواعه عديدة منها حيودة لا تكفي ومنها ضارة تركب الاضفاء والارواق || اعرف انواعه المؤذية ما يتبع .

١٧٠٨٥ - روث ابيض °، كونيوليوم الكرم °

Coniothyrium dipodella (S). Coltre, Maledie de la grêle (F). White rot, Livid rot (E).

ظفر مجهري يركب حبوب العنب التي اصحابها البرد .



رَوْتَل أَحْمَرُ أَصْفَرُ

١٢٠٩٣ - رَوْتَل (S). Russule (F).

جنس تطور كاملة التركيب من فصيلة الفانيريديات .
أنواعه المعروفة كثيرة العدد أصنافها معظم أقاليم المناطق
المعتدلة الحرارة . يعيش حسل المواد النباتية النضجة
في الغابات والحراج . أطعمه قرحة ، متسوية ، بيضاء
اللون أو صفراء . يوشه أبيض اللون أو أصفر . بعض
أنواعه لذيذ الطعم مأكول والبعض الآخر كامن الصف
غير مرقوب فيه .

١٢٠٩٤ - رَوْتَل أَحْمَرُ أَصْفَرُ *

Russula cyanocantha (S).
Russula verna et jaune (F).

نوع من الروتل المأكول ، يكثر وجوده في الحراج الكثيفة
الأشجار . أروسه شبه مقعرة الشكل ، ردية الأطراف ،
لونها إلى الخضار الأصفر البهيجي المالح .



رَوْتَل شَدِيدُ السَّمَرَةِ

١٢٠٩٥ - رَوْتَل أَحْمَرُ *

Russula foetida (S).
Russula foetida (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات . ساقه
خليفة ، معتدلة الانقطاع . أروسه شبه قلنسوة الشكل ،
مضلعة الحافة ، لزجة للمس ، كريمة الرائحة ، لونها
إلى السرة الصفراء المالح ، قطرها نحو ١٥ سم .



رَوْتَل مَأْكُول

١٢٠٩٦ - رَوْتَل أَحْمَرُ فَاتِحُ *

Russula claroflava (S). Russula jaune clair (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يكثر في المواتع الرطبة
قرب صفات بجاري الماء . أروسه لزجة للمس ، صفراء
اللون ، قطرها نحو ٨ سم . ساقه بيضاء . طعمه مالح
البيدق .

١٢٠٩٧ - رَوْتَلِ المَنَاقِعِ *

Russula paludosa (S). Russula des marais (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يكثر في المنافع . أروسه
لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ١٣ سم . لونها إلى الليرة
البهيجية المالح .



رَوْتَل مُنْجَب

١٢٠٩٨ - رَوْتَل زَاهِدُ *

Russula conobrynia (S). Russula sobre (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .
أروسه لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ٨ سم . لونها إلى
الرمادي الاسمر . رائحتها كريمة . طعمها حامض .



رَوْتَل سَمَرُوحِي

١٢٠٩٩ - رَوْتَل سَمَرُوحِي *

Russula azurea (S). Russula azurea (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات .
أروسه مقعرة الوسط ، قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى الزرق
السمجينة . أطعمها بيضاء اللون ، ساقه إلى الطحلة
البحرية .



رَوَحَا

١٢١٠٠ - رَوْتَل شَدِيدُ السَّمَرَةِ *

Russula nigricans (S). Russula noirissante (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في المواتع الحرجية
الظليلة . أروسه كبيرة فارشة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها
إلى السرة اللثامة . ساقه مقعرة .

١٢١٠١ - رَوْتَل عَكِيْقِي *

Russula eardonia (S). Russule eardoine (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .
ساقه معتدلة الانقطاع . أروسه كبيرة ، قطرها نحو ١٠ سم .
لونها يتغير مع العمر ، يبدو أصفر ثم ينحرف إلى الرمادي
ويتهيأ بالبنفسجي المتين المالح .

١٢١٠٢ - رَوْتَل مَأْكُول *

Russula vesca (S).

Russule comestible (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في الغابات الظليلة .
ساقه قصيرة . أروسه قلنسوة الشكل ، قطرها نحو ٨ سم .
لونها إلى الحمرة المتينة المالح .

١٢١٠٣ - رَوْتَل مَدْمُوعِي *

Russula sanguinea (S). Russule sanguine (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .
ساقه معتدلة الانقطاع ، ردية اللون . أروسه إلى الحمرة
الشموية ، قطرها نحو ٧ سم .

١٢١٠٤ - رَوْتَل مَذْهَبُ *

Russula aurata (S). Russule dorée (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في حراج السديان
والملول . ساقه معتدلة الانقطاع . أروسه فارشة ، مقعرة
الوسط ، صفراء اللون ، ذخية المالح .

١٢١٠٥ - رَوْتَل مُقَتِّي *

Russula emetica (S). Russule émétique (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات .
ساقه بيضاء اللون . أروسه فارشة ، برتقالية اللون ،
قطرها نحو ٨ سم . طعمه حريف المذاق مقتي .

١٢١٠٦ - رَوْتَل مَكْلُوحُ *

Russula adusta (S).

Russule brulée (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في حراج السديان .
ساقه قصيرة . أروسه فارشة مقعرة الوسط ، صفراء اللون
كلها مغفرة ، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم .

١٢١٠٧ - رَوْتَل لَوْرِي *

Russula integra (S).

Russule intégrè (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج
الصنوبريات . ساقه قصيرة ، بيضاء اللون . أروسه
مقعرة الوسط قطرها من ٥ إلى ٧ سم . لونها إلى الكسفي
الاصفر المالح .

١٢١٠٨ - رَوْتَل هَشُّ *

Russula fragilis (S).

Russule fragile (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات .
أروسه مقعرة ، هشة ، سريمة الطعم ، قطرها من ٣
إلى ٤ سم . لونها إلى الوردي الأجبر المالح . طعمها حامض
المذاق .

١٢١٠٩ - رَوَحَا ، رِيَّة ، تَنْدُو ، تَعَاكَة آمْرِيكِيَّة

Rhon (S). Nandou (F). Nanou (L).

جنس طير من فصيلة التماميات . أنواعه ثلاثة ، موطنها
أمريكا الجنوبية . تتميز بدم قدمها حل الطيران . يبلغ
متوسط ارتفاعها نحو ١٦٥ سم . الذكر أصغر وأرفع من
الأنثى || ريشها مودل نام . عنقها مستطيل القذ شال

١٧١١٨ - رُوزِيَّةِيَّةُ السُّفَّاحِ* ، سَخ السُّفَّاحِ*
Rosellinia radiparda (S). Pourridié du pommier (F).
 فطر مجهرى يصيب جلود التفاح فيضيا . ظهوره الخارجي
 عفن أبيض ثم اسفر ركب جلود التفاح فيسلب جرادتها
 ويسبب انحلالها || اما اوراق التفاح المصابة فيبدو
 متكتفة ، متصل ، قائمة اللون ، قليلة الحوية || يكالغ
 باستعمال التفتيش والتطهير .



رود

١٧١١٩ - رُوزِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ* ، سَخ الثُّوتِ*
Rosellinia aquila, R. byssoides, Sphaeria aquila,
Trichosporium fuscum, *Sporozichium fuscum* (S).
 Pourridié du mûrier (F).
 فطر مجهرى شديد الاذى يصيب جلود التوت فيسلبها
 وقد يركب جلوح بعض الاجنار الحرجية اليابسة اعصابها
 السديان واليترو والصنصناف واليزورود || ظهوره الخارجي
 عفن ابيض يشاهد وطش اسمر ، ركب جلود التوت
 فيفقد حل جرادتها ويسبب انحلالها ويوت الشجرة . ينشأ
 في الاثرية للمنحجة الرطبة ويفسب في ذين الاوراق .
 يكالغ بتفتيش القرية واستئصال الاجنار الحية وتطهير
 مولاتها بالكلس الحراق وسلفات الحيد .



رُوزِيَّةِيَّةُ الْبِن



رُوزِيَّةِيَّةُ السُّفَّاحِ



رُوزِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ



رُوزِيَّةِيَّةُ السُّدِيَّانِ



رُوزِيَّةِيَّةُ الْكَكَاوِ



رُوزِيَّةِيَّةُ الْكَرْمَةِ



رُوزِيَّةُ مُجَمَّدة

١٧١٢٠ - رُوزِيَّةِيَّةُ السُّدِيَّانِ* ، سَخ
 السُّدِيَّانِ*
Rosellinia quercus (S).
 Pourridié du chêne (F).
 فطر مجهرى يحمى الانتشار يصيب جلود السديان
 ويقره من الاجنار الحرجية كالقايوب والاسعدان والزنان
 والصنوبر والتوت || ظهوره الخارجي عفن شفاف ثم
 اسحل قاسر يقتسم مشائل الاجنار الحرجية المذكورة اعلاه
 يركب جلودها ويسبب ويضع ما ياذ الاذى . اما
 السديان فانه يذبه حتى حر عشر سنوات .

١٧١٢١ - رُوزِيَّةِيَّةُ الْكَكَاوِ* ، سَخ الْكَكَاوِ*
Rosellinia pepo, *Dematophora* (S). Pourridié du
 cacaoyer (F).
 فطر مجهرى يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة يصيب
 الككاو ويركب جلود الحفصيات اصفرار
 الاوراق وسقوطها ويؤخر نمو الثمار ويضعها || ظهوره
 الخارجي كتلة من العفن الاسود المذهب بالاصهب والاسفر
 يركب الجلود فيسلبها || يكالغ بالاستئصال والتفتيش
 وتطهير .

١٧١٢٢ - رُوزِيَّةِيَّةُ الْكَرْمَةِ* ، سَخ الْكَرْمَةِ*
 رُوزِيَّةِيَّةُ الشَّجَرِ الْمُصْرَةِ* ، سَخ
 الشَّجَرِ الْمُصْرَةِ*
Rosellinia necatrix, *Graphium necatrix*, *Dematophora*
necatrix (S). Pourridié de la vigne, P. des
 arbres fruitiers, Blauques (F).
 فطر مجهرى يركب بعض التباينات الزراعية فيضيا ،
 منها الكرمة والاسباس والموخ والبنان والوزر والحفصيات
 واشندرد والبطاطا والبقول والورد والارض شوكي || ظهوره
 الخارجي طفوة يشاهد تفرى الجلود تسلب جرادتها وتسبب
 انحلالها وموتها || ينشأ في الاثرية الطرية || يكالغ
 بتفتيش القرية نصرف المياه الزائدة ويثر الكلس وطهر
 في المياقل والقرامات المرمية . ويصالح مفلور الكرم
 سحقا في القرية بمعدل ٢٥٠ غ السر المربع الواحد .

١٧١٢٣ - رُوزِيَّةُ مُجَمَّدة*
Rozites caperata (S). *Rozites ridé* (F).
 فطر مأكول من فصيلة الفارغيتيات . يوجد في غابات

من الریش . رأسها صغير مبسط ، متقاربا مغلطع . تألف
 البراري الشاسعة الاطراف والحضاب القليلة الاجنار .
 قوتا الاغصان والحشرات . تعيش جهامات قليلة العدد ،
 تتألف من ٦ او ٧ ذات بقودها ذكر واحد || الاثني
 تعيش نحو ٢٠ يضة . النسوما صاحي الشكل تنلفه
 بالحشيش الناعم . الاثنا رصده بعض البيض من الثروب
 الى الثروب .

Spiritualismo (S).

Spiritualism (E).

الروحانية مذهب القائلين بان النفس غير حوية .

١٧١١١ - رُوزِيَّةِيَّةُ*
Melogrammatodes (F).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات وربية اقيات
 تتميز بويضة مصادية تبدو غائرة في الكسج ثم بارزة .
 اصحابا سطحية . يعلها مختلف التبعج || لها جنسان
 مؤنثان هما الانثوسية والزئقية .

١٧١١٢ - رُوزِيَّةِيَّةُ*
Rodge (F). *Grinding* (E).

الرودية القيام بعملية الردج .

١٧١١٣ - رُوزِيَّةِيَّةُ*
Ontogénese, *Ontogénie* (F).

Ontogenesis, *Ontogeny* (E).

الرودية علم نشو الافراد وتطويع .

١٧١١٤ - رُوزِيَّةِيَّةُ*
Fusus (S).

Fusum, *Fusus* (F). *Fusus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منليات الابليل
 وفصيلة البصليات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٦٠
 منتشرة في جميع بجان البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما
 انواعها المنقرضة ومدها نحو ٥٠٠ فطها من مصبرات
 الحفصية الجيرية || اصداها شبه يشمية الشكل ، بحلة
 الاالوان والزئقية ، حلزونة ، مسطلة القوية التي تبدو
 كالزباب . اطولها ذراع من ٥ الى ١٦ سم . || جميعها
 منقرضة وقد كتبت اصداها غيرها من الرخويات .

١٧١١٥ - رُوزِيَّةُ*
 هو السديان المزله ، اطلبه .

١٧١١٦ - رُوزِيَّةِيَّةُ* ، سَخ
Rosellinia

جنس فطور مجهرية من البصليات وفصيلة البصليات
 تتميز باصاها القسمة السود التي تنشأ في وسط ليفة
 الفطر . ويوها سيد الخلية اسر اللون تحبث كاتمسطيلة
 تصطب النكات الدقيقة . معها يرتكز في اهل التعليل
 الحرفي الشكل || اشهر انواعه ستة تلي .

١٧١١٧ - رُوزِيَّةِيَّةُ الْبِن* ، سَخ الْبِن*
Rosellinia bunodes (S). Pourridié du caeleur (F).

فطر مجهرى يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة . يصيب
 البن والاشجار والكاكافور والحفصيات || ظهوره الخارجي
 كتلة من العفن الاسود المذهب بالاحمر . وهو يركب الجلود
 المنقرضة في الثارب فيسلب اللحاء والفكره وقد يدخل
 حتى التلب فيضيبه بلون زئبي يحل الى السود . اما في
 الجلود فانه مبسط الجردة ويضع عليها || يكالغ
 باستئصال الاجنار المربوة وتطهير القرية بالكلس
 الحراق وسلفات الحيد .

الادراك التام طويل من ١٨ الى ٢٢ سم. فوجها الى البياض الاخير تملو ماجة طحلاء. رأسها الى الزبدية السوداء. فكاها ذريان غليمان، رواجها قصيرة سمراء اللون. شربها ثنائي السرك.

١٢١٣٠ - رُوشَن *
Aile d'Insecta (F).

Wing of Insect (E).
هو جنح الحشرة وقد استند بالتصميم الى حشرات رتيبة حشرنيات الانجسة. اشكاله مدنية تختلط باختلاف الفصائل والانجاس والانواع.

١٢١٣١ - رُوشَن غُشْدِي *
Elytre (F).
Elytron, Wing-shard (E).
هو الظهران الثلاث الغندي الذي يلفف الجناح في بعض الحشرات.

١٢١٣٢ - رُوشَنَة ، هُكَن *
Parastigma (F).
Parastigma (E).
سالة الكائن الحي الذي يعيش طفيلياً على غيره من الكائنات الحية.

١٢١٣٣ - رُوشَنَة
Parc (F). Park (E).
حديقة واسعة فيها الشب والام. فلذا كانت في احوالي البراق والغلاف فهي سلق وان كانت في الرطالات فهي روضة وروية. ج. روض.

١٢١٣٤ - رُوشَب *
Anciltharia (S).
Ancilthaire (F).
الواحدة رويبة. جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الاربل وفصيلة الطسربيات. انواعه المعروفة قليلة الممد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش على رمال الشطوط العميقة || اصداؤها ماسية ، تعيش على اعطيجية ، ذلقة الاعتقاب الملهمة. فصداها قليلة التميز الطولي التميل الخطوط. الوانها زاهية. احاطها انبوية دقيقة مستطيلة.

١٢١٣٥ - رُوشِي
Corne (F). Horn (E).
الروح : القرن. « كالقور يحمي انفه برقه ». « رالاروق ذو الروح اي القرن.

١٢١٣٦ - رُوشَن * ، عُشْشُور مَاسِي *
Pardalotes punctatus (S).
Pardalote punctué, Oiseau-diamant (F).
طائر من الجوليم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الصردييات. موطنه بعض مناطق استرالية. يألف الغابات واحراج الاراكاليثوس. ملجته الحياتي جماعي. جماعته متوسطة العدد. قوته الحشرات والبيزور || جسمه صغير القد، مكردم الشكل، يطلي نحو ٩ سم. قصير المقاد والجناح والذنب. ثوبه الملوي الى الخضار الالامس تملو رقة يضاء فضية المواجه تتلاو كانها قطع من القلس. ساجية وزودو وصودو ويطلع الى البياض الجمالي. متقادة شديد السمرة. وصفاه واصاميه الى السمرة الحظية || يذن القوسه في الجانف الشديدة الاتحاد. اقوسه نفق يطلي نحو ٦ سم. ينتهي بمجرة قطرها نحو ١٥ سم. يبطها باليات الاراكاليثوس وبعض احشائش الناعمة. الانثى تحفن بمنابرة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات. الترخيم يستمر نحو اسبوعين.

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنطحة. ساقه مستدلة كشخانة والارتفاع ، غيرا اللون يملو مواج تبي ، طلقها جميد التوقف. نكته صيرانية الشكل ، صفراء اللون ، ذعية المواج ، حيدة الحافة ، قطرها نحو ١٥ سم. احراسها الى الصفار الباهت || لحية جيدة الصنف ، مأكولة.

١٢١٣٤ - رُوشَم
Cachet (F). Seal (E).

١٢١٣٥ - رُوشَنَة
Rochas (S).
Rochas (F). Rochas (E).
جنس نباتات بحلية مصمرة من فصيلة الخلدات. معقودة التعريف على اسم اليوناني « لاروش » || انواعها المعروفة خمسة مهدا افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم البلاد المعتدلة الحرارة || سقاها منصبة تنتهي بنسة من الازهار المستطيلة الخماسية البتلات. اوراقها متطابقة لحية النصال الخروطية الشكل. ثمارها جرابية ، خلية الفلق ، عديدة البزور || أشهر انواعها التريينية القروية والباسيمية.

١٢١٣٦ - رُوشَن قُورِيَّة *
Rochas coccinea (S). Rochas écarlate (F).

نوع من الروشة التريينية الشائعة الزراعة. يملها تملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم. فصتها ازهرية كبيرة القد ، متكوية التجميع. انهارها قروية اللون ، فواصة العرف الطري المنصب || تنويرها يستمر من اواسط حزيران الى اواخر تموز.

١٢١٣٧ - رُوشَن ياسمينيَّة *
Rochas
Jasmines (S). Rochas à fleurs de jasmin (F).

نوع من الروشة التريينية الملهولة عند معظم الزراوين. يملها تملو من ٣٥ الى ٦٠ سم. فصتها ازهرية متكوية التجميع ، متصلة الجهم. انهارها الى الصفار الاخضر المروج ، شكلها قروي شبه بالياسمين. عرفها طري مستحب || تنويرها يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار.

١٢١٣٨ - رُوشَم
Levee des semis (F).
Sprouted sowing (E).
اول ما يظهر من الزرع.

١٢١٣٩ - رُوشَك اُزْب *
Cylindronotus lanipes (S). Cylindronota
laineux (F). Cylindronotus lanipes (E).

حشرة خاضعة دامت من فصيلة النيشيات ورتبة منمدات الانجسة. تألف المواق المشجرة. خنافسها تمش على اوراق النبات وعلى المواد النباتية المنطحة. رقاتها غاشية تمش تحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. فوجها الى الصفار الالامس الاسف المواج. رأسها محتل الجهم. اصفا صغيران بارتتان. زباناها مستطيلان دقيقتان. ظهرها ذات الفلق ، بالغ التحزير الغندي. ارسافها خاسية القفل في الترويين الانامي والوسطي ، ربايتها في الزوج الخلفي. وهي مهدبة ، مستطيلة الجلب في الزوج الانامي ما دما الى تسيتها بالروشك الازغب || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتمش حتى اواسط ايار. تسرح في التبار. تلتشد في حزيران وتترك المسكن تحت لحاء الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها



روشة قروية



روشك أزغب



روشن



روشن غندي



روشب



روشن

والزئان لا تشبهان تشابهاً كاملاً لأن الزئان البني صغيرة ورميصة تتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون البني من فصين أو أكثر. وهي ملونة بالبشم والبشيم والاشرايين والأوردية والأوردية السفاوية والأصابع.



زئانة

١٧١٤٦ - زئانة البحر* Charrybdaea (F.) Jelly fish (E).
نوع من اللجون ينمو في البحر الأحمر والخليج، يألف جرف السفاوي. قال في وصفه المشي: «سكة مسورة القلنسوة شفاقة كشوف الزجاج شبيهة بالبيضة يمني الحذوة وما أربعة اجرام في وسطها ترى في الليل ضيئة كالقمر اذا حجبها السحاب الرقيق. وما ضوء يشرق على ما حوطا في البحر ولونها أزرق سموي. وإذا احست بالانسان يوم سوطا او أراد سكتها خرج لها رشاش لاذع يهرق الجسد مثل شرار النار من سميت. وهو يلقبها البحر بساحله كثيراً».



زئانة

١٧١٤٧ - زئانة هو الركوب والمكيس، اطلبها.

١٧١٤٨ - زئانة* Guzalia marica (F.).
Guzalia blanche (F.). White gazelle (E).
ظبي ابيض الكوب اغبر للمواج عابق الظاهر في حجم الظبي المرفوف. وهو جميل الشكل، ابيض اللد، ورقيق الاقدام، غليظ الحركة، مدهش السرعة في عديمه. اصابته فسيحة الارباء تشمل جزيرة العرب وسورية واغريقية الشمالية حتى ليبيا. الاثني زئانة.



زئانة

١٧١٤٩ - زئوانات* Pulmonaria (F.).
Pulmonaria, Pulmonaria (E).
طائفة من الزئوانات مدهيات الارباب يمشقود افرادها استنطاق الهواء الطلق ذلك لانها مجهزة بمجاز تنفس حرالي قوامه شبكة وتالية نافذة الى الخارج || فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة المد، جميعها غشيرة الثقل تحمل الاضواء الكريهة والاشتية في آن واحد || لذلك تارة ذكراً وتقلضه في كوم الاثني وتارة انثى وتقلضه لفلها تفيض || تقسم هذه الطائفة الى زئنتين، زئنة الزئوانات البرية وزئنة الزئوانات البحرية. القاري المميز بين الزئنتين هو ان حيوانات الزئنة البرية مجهزة بآلة لؤس جامة في حين ان حيوانات الزئنة البحرية مجهزة بلاسطن نطق ولؤسها جامدة لا تفيض || جميع افراد هذه الطائفة تعيش على الافراد النباتية ومنها الاعشاب البرية والبحرية.



زئانة

١٧١٥٠ - زئوانات بحرية، زئوانات مائية

Basommatophores, Pulmonaria aquatiques (F).
زئانة من طائفة الزئوانات. افرادها ثنائية اللؤس الجامدة للاستنطق. حينما ترتكز على قواعد اللؤس || اصنافها متباينة الحجم والشكل وبعضها عرياء خال من اللصد || جميع افرادها تقترب من سطح الماء وتعلمو التنفس || اشهر اجناسها القصة واللوب والزئج وكلام والانصبل.



زئانة

١٧١٥١ - زئوانات برية* Stylomastophores (F).
زئانة من طائفة الزئوانات. افرادها رباعية اللؤس المتعطف الجامة || اصنافها متباينة الحجم والشكل وبعضها كامل الهيكل السفندي كالخيلون والبيض الآخر يملو درع صغير يلف مقدم الظاهر كالبرق || اشهر اجناسها الخيلون والبزاق والصرب والمريون.

Laitance, Lait (F). ١٧١٣٧ - زؤك*

Milt, Soft roe (E).

هي المادة الحويوية التي تفرزها الاضواء التناسلية الذكرية في السمك فتلقى بها الذكور على سره الاناث لانحمايه.

١٧١٣٨ - زؤوكه* Noelle (F).

جنس نباتات جنينية معمرة برية وتروفيئة من فصيلة الجريسيات. انواعها المعروفة ١١ مدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعة بعض انواعها في البلاد الحارة وفي الماركن والاماري || سوطها فراء. اوراقها عطيفة للنصال، متعاطلة، متناوبة. ازهارها كبيرة الجرم، خالصة البتلات. جملة الالوان الزاهية المختلفة مع الانواع.

١٧١٣٩ - زؤوم* Lobe de l'oreille (F). Lobe of ear (E).

هي شمسة الاذن.

١٧١٤٠ - زؤوم Rhum (F). Rum (E).

شراب كحول يمتزج من حصاره قصب السكر بعد تقطيرها وتقطيرها وتقطيرها.

١٧١٤١ - زؤوميه دكسة* Rumia maculata, Opisthographis maculata (S).

Rumia maculée (F). Rumia maculata (E).

حشرة من فصيلة الاثبات ورتبة حشرقيات الاجنسة. حوطها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. قراحتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها غشافة قوتها اوراق الزهور والبرقوق والذرياء والسبتان || جسمها صلب القند بطول نحو ١٢ م. بطولها نحو ٣٤ م. رأسها مستقيم الجرم. ميناها كبريتان. زباناتها مشطيان عند الذكر، غشيان عند الانثى. جوشها وبلتها كثيفة الخمل التام || روافها، عند الفلقين، الى الصفار الكبريتي يملو دس اشعث وذركفة حشنة || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفرافلة في حزيران وتبقى حتى آب. ترحل في الليل. تماثل بند ظهورها بقعة اساييم وتحت المكن على الصفحات السفلى من نعال الاوراق || السرعة تطول من ٢٥ الى ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالى الفشار تعلو ثلاثة ارجاع من التليل الصغيرة. ثوبا الى الطيلة السراء تعلو اسطوط متقطعة كسكتية. رأسها واسطوط سوي || طول الامكال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقص ضمن صلابة تحيكها السرعة بين الاوراق التي تجسها وتجرها بخيط حريرية.

١٧١٤٢ - زؤوكه هو الزؤاند، اطلبها.

١٧١٤٣ - زؤوهو* Rabita (F).

هي الرميطة، سكة نهرية، اطلبها. والروبو من اسمائها المحتية الثالثة.

١٧١٤٤ - زؤويس* Capitule (F). Capitulum (E).

شكل من نظام التزوير الخليلي المستجيب يند فيه رأس الحور الاصلي سحلاً زيجرات لاسنة.

١٧١٤٥ - زؤكة* Pouton (F). Lung (E).

المضو الرئسي في جهاز التنفس. وما زؤان موزونان في تجويف الصدر يفصل بينهما القلب. وراثة غرونية الشكل قاضتها مقعرة ترتكز على طبقة الحجاب الحاجز.

١٧١٦١ - رِبَائِيَّات

هو الرابدة الرياسي نبات طبي مشهور ، اطبله .

١٧١٦٢ - رِبَائِيَّة * ، شَجَر الصَّابُون (S). Sapindus Savonnier, Arbre à savon, Riba (F). Soap-nut tree, Soap-berry tree (E). Seifenbaum, Seifenbeere (D). Saponaria, Sapotiglia, Noce saponaria (I).

جنس شجر من فصيلة الصابونيات . أنواعه المروية ١١ منها البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، مائلة . ازهارها عتقدي . أزهارها رباعية او خماسية البتلات ، ثمانية الاسبعة ، ثمارها غنية ثلاثية التخصيص مأكولة في بعض الأنواع || اوراقها وبانها وثمارها غنية بمادة الصابونين (Saponine) التي ترغو في الماء وتظلف كالصابون .

Vent (F). Wind (E).

١٧١٦٣ - رِبَائِيَّات

الريح نسيم الهواء . ج. رياح وارياح . وقد أطلق عليها اسماء مختلفة تعود الى مصدر مهبها . لذلك فالرياح اربع منها الجنوب وهي القبيلة . والشمال وهي الشمالية والحدواء . والساوي والشرقية . والجنوب وهي الغربية . وبين الرياح الاربعة اربع اخرى وهي الأريز بين السبا والجنوب والساوية بين الجنوب والحدواء ، والجريز بين الحدواء والحدواء بين الشمال والساوية . وأزادوا ثامنة يقال لها الكنداء وهي التي تدمر بالكانن فلا يتبين لها مهب . اطبله شصق الرياح || وتقسم الرياح بالنسبة الى سرعتها وضغطها وتاثيرها الى تسع كما هو موضح في الجدول المقابل .

١٧١٦٤ - رِبَائِيَّات هو الأس المسكي ، اطبله .

١٧١٦٥ - رِبَائِيَّات أبيص هو ذقن الشيخ ، راجمه .

١٧١٦٦ - رِبَائِيَّات الأرض

هو التقيصوم وهو بقلة الغزال أيضاً ، اطبلها .

١٧١٦٧ - رِبَائِيَّات الكافور * Camphorosma (S). Camphorosme, Camphrée (F). Stinking ground-pine (E). Kamferkraut (D). Canforata (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة السريقيات مهددة الشرق الاوسط واروبة الجنوبية . خواصه وبنائه الطبية عديدة . رائحته تشبه الكافور . يستخرج منه مادة زيتية فعالة مقوية لتصلب الباه وقد تستعمل كمقوة وسطية ومدرية البول .

١٧١٦٨ - رِبَائِيَّات بري * ، رِبَائِيَّات قرنقشك ، قرنقشكك ، أصابع القديس

Calamintha acinos (S). Calament acinos, Aclinos, Basilic sauvage (F). Acinos, Basil thyme, Wild basil (E). Feldwürze, Wilde basilic (D). Timo campestre, T. salvatica (I).

نبات عشبي بري طبي ممر من فصيلة الشفويات . يطو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ساقه قصيرة فراء . ثمره خشوية متفلة . اوراقه متعاقبة معقطة بيضية الشكل . نصلها ازغب البشرة في صفتين . أزهاره بيض يملوها مواج وردية . اوراقه وأزهاره عطرية العرف المسحب || يدخل في تركيب بعض العقاقير الصحية وهو مضاد للتشنج .

١٧١٦٩ - رِبَائِيَّات دكورة هو المردقش ، اطبله .

١٧١٧٠ - رِبَائِيَّات سكتيان هو سيق الربان ، راجمه

١٧١٧١ - رِبَائِيَّات * Phragmosporas (F).

Phragmosporas (E). عماره فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات ، تتميز ببوغاتها

١٧١٥٢ - رِبَائِيَّات ، مَقْدَمَات Primates

رَبَّة من الثدييات تشمل ثلاث مراتب : البشرىات والقرديات والليموريات .

١٧١٥٣ - رِبَائِيَّات Irrigation

الري من الجربة العلمية هو السيلسة المائية التي تهدف الى الانتفاع من المياه على اكل وبه يمكن . وهو من توجهة العلمية وضع ودوس الاصول والوسائل اللازمة لتسقية الاراضى وأحياء بورها .

اسم الريح	يقابلها بالفرنسي	تاثيرها	سرعتها في الثانية	ضغطها بالكيلو
نسيم ، ريدة	Vent très faible	تيز الريح	٢	٠,٥٠٠
رياح	Vent frais	تثني الصالح	٤	١,٩٦٠
زفافة	Vent vif	تثني القوي	٦	٤,٤٠٠
سامكة	Vent fort	تحرك الشجر	٨	٧,٨٤٠
موجم	Très fort	تسقط الريح	١٣	٢٠,٧٠٠
عاصفة	Tempête	تضيق الانصاف والرياح	٢١	٥٤,٠٠٠
زعر	Fort tempête	تكسر او تنقل الشجر	٢٨	١٠٣,٠٠٠
زوبعة	Ouagan	تهدم بعض الابنية	٣٤	١٤١,٠٠٠
إحصار	Cyclone	تخرّب كل شيء	٤٠	١٩٦,٠٠٠

١٧١٥٤ - رِبَائِيَّات Ecluse (F). Lock, Sluice (E).

جسوس حكم البناء يفترض مجرى المياه للانسيابة السطح ، له قداسان مدققي ومسيحي . يقع القداس المدققي يسحب يدخل المركب الى الخوض ويرفع المسيحي يسمح بخروجه من الخوض .

١٧١٥٥ - رِبَائِيَّات Plantes aromatiques (F).

Aromatic plants (E). النباتات العطرية الفواحة العرف . الرائحة ريحانة .

١٧١٥٦ - رِبَائِيَّات Mathématiques (F).

Mathematics (E). اصطلاح يطلق على مجموعة من العلوم الحسابية والهندسية تشمل فنة الرياضة البحتة التي تنس بالحساب والجبر والهندسة وحساب التكامل والتفاضل ... وفنة الرياضة التطبيقية التي تنس بالآليات وعلوم الفلك والبصريات الخ ...

١٧١٥٧ - رِبَائِيَّات Abondance de récoltes (F).

Abundance of harvest (E). هو حسب المحاصيل الزراعية .

١٧١٥٨ - رِبَائِيَّات Salive des insectes (F).

Saliva of insects (E). الريال والريالة هو لعاب الحشرات .

١٧١٥٩ - رِبَائِيَّات Euchlaena mexicana (S).

Reana, Téosinte (F). Teosinte (E). Teosinte (I).

نبات عشبي كلائي من فصيلة النجيليات مهددة المكسيك وقد تمت زراعته جميع مرابي البلاد المطلة المزاراة .

١٧١٦٠ - رِبَائِيَّات Protobe (F). Protobe (E).

الريب اسم يطلق على كل كائن حي متناهي الصغر والذقة لا يشاهد تحت حسة المجهر المادي .



١٢١٩٢ - رِيَهْدَرْمَة

Rhinoderma (S).

Rhinoderma (F). Rhinoderma (E).

جنس ضفادع من فصيلة الرنانيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددة أمريكة الاستوائية والوسطى || أجسامها صغيرة القد، طول من ٤ الى ٥ سم. عند الذكور، ومن ٥ الى ٧ سم. عند الاناث. رؤوسها محرمة تنتهي بقذبة لحمية في مقدم الخلف. فكوكها السفلى عادية الاستان. اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بمخاطب ضعيف لا يتجاوز الزام الاول. جلودها ماعة مبعثرة الكثيف. انثواها الى الخفسار الاسمر يملو موج اصفر ورقشة جزوية لانفاية الشكل والقد || ذكورها مجهزة بجيوب قية تحمل مركز البلفة الصربية وتمتد حتى مستوى البطن، تؤدي مهمة التقيق وحسن الدليل الذي لا يتجاوز مدده ١٥ دةلة يأخذها الذكر بطرف لسانه عند التسررة ويدخلها في الجيب فتبقى الى ما بعد النفق حتى يتم التطوير البلطي، تخرج السفار من افواه ابائها كاملة المدة تسرح حيث تلاء || تدب من ١٥ الى ١٢ سنة. تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها الحشرات والديدان.

١٢١٩٣ - رِيَه

هي الروعاء، طائر من النعاميات، اطلقها.

١٢١٩٤ - رِيَهَان

هو الزعفران المزروع، اطلبه.

Gazelle blanche (F).

White gazelle (E).

رابع ريم. ج. آرام. قال الاسمي: الأرام الظباء الأبيض الخالصة الأبيض وهي تسكن الزبل. وهذا النوع من الظباء يقال انه ضالها لانه اكثر شمسا وحشا || اما السيري فيقول: الرم ولد الظبي والجميع آرام ويستشهد بقول الشاعر بها البير والأرام يحين خلفه واطلاؤها ينهض من كل مجثم والريم ايضا هو الجبل الصغير.

١٢١٩٥ - رِيَنَكْسُورِيُوم

جنس فطور مجهرية من فصيلة الريحليات. مشبه آدمي الانتشار. وليته سطحية فارشة، كنانته صغيرة مركبة، لا قياسية الشكل والحجم || انواعه قليلة، اعرسها رينكسوريوم الشيلم.

١٢١٩٦ - رِيَنَكْسُورِيُوم الشيلم

Rhynchosporium secalis
فطر مجهري يصيب عصف بعض النجيليات انحصها الشيلم || مظهره الفاربي يقع مستطيلة ميمرة او كثيفة التجميع، ليد صغيرة ثم تنتشر فيبلغ طولها نحو ٢٥ م. تركب نصال وانحد العصف، لوها آل الزرة يملوها موج اقير ثم ينحرف الى الاخير الرصاصي وينتهي بالنتي تحقه حالات واعطارات شاحبة وضعية || يصيب يباس العصف وضعف الاسبال وتحمل الحب.



رينكسوريوم الشيلم (١)



رينكسوريوم الشيلم (٢)



١٢١٩٥ - زاج

Affermer (F). To farm (E).

زارع للزنا : عامله على الارض يعض انتاجها . اطلب مزارعة .

١٢٢٠٥ - زكروك ، زرواك ، هزكروك .
Agriculturist (E).

هو الذي يستغل ارضه مستخدماً عمالا او تلاحين .
تحديد الامير مصطفى الشهابي .

Sulfate, Vitriol (F).

Sulphate, Vitriol (E).

اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض الاملاح اخصها سلفات الحديد والنحاس والرصاص الخ ...

Vitriol blanc (F).

White vitriol (E).

هو سلفات الزنك من الاملاح المزدوجة التابعة الى سلسلة الاملاح المنفردة .

Vitriol vert (F).

Green vitriol (E).

هو سلفات الحديد من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنفردة او سلسلة الاملاح الشبيهة .

Vitriol bleu (F).

Blue vitriol (E).

هو سلفات النحاس من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنفردة .

Austricherie (F).

Ostrich-farm (E).

الكان الخصاص لتربية الترج اي النعام .

Procombant (F). Procombent (E).

نمت ثمرتي يطلع على النبات الذي يزحف على الارض .

Gaster (F). Gizzard (E).

هي الحوصلة وقد صار تخصيصها بغير الماء والمانع .

Hippobosque (F). Hippobosca (E).

هي الشوا ذباب يقع على الابل والدواب والكلاب .

Corvus corone (S).

Corneille, Corbeau-corneille (F). Carrion crow (E).
Rabenkrähe (D).

طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السواد الاسفع البنفسجي المالح . موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية . يعتبر من الطيور الفسارة لانه كثير الاذى . قوته الديدان والحشرات والحرب واليدار الناقص والناار الخ . || ينش في الانجار الريفية . الانثى تحضن صغارها من ٤ الى ٦ بيضات لزنها الى الزرقاء المحمرة يملونها تورهم اسمر .

١٢٢٠٧ - زكاف

يقال زاف عليها فزافت له اي مكته من سفادها وهذا في الطيور الجوارح (الجالسط) || وزاف الذئب : نشر جناحيه وذنبه وجها على الارض .

١٢٢٠٨ - زليقي

هو ذكر الصبي ومنهم من قال الذئب : ج زواقي . قال ثوبه بن الحبيب صاحب ليل الاغنية :

« ولو ان ليل الاغنية سلت

على يدوتي مبتك وصفايح

لست تسلم الايشلة او زفا

لها صدى من جانب القبر صائح



زاج

من ٣٠ الى ٤٠ م. اوراقها عابطة تطول من ٨ الى ٢٠ سم. طرفها غلظية او خاسية الا زوايا. اغلفة زائفتها مستطيلة لاحقة || ترطب في جبال البلاد المعتدلة الحرارة. تكثر في المناطق الواقعة بين ارتفاع ١٢٠٠ و ١٨٠٠ م.

١٢٢١٧ - **زان ياباني** *Fagus japonica* (S).
Hêtre japonais (F). Japanese beech (E).

نوع من الزان يعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ م. نصلها عند القصعة، مسن الحافة، كثير المروق التي يراوح عدد ازواجها من ١١ الى ١٤ || اغلفة زائاته قصيرة القذ سنائية الشكل، حشوية التركيب || يرغب في المواقع الجبلية الرطبة.

١٢٢١٨ - **زانة *** *Faine, Fêne* (F).
Beechnut, Beechmast (E). ثمرة الزان ج زانات.

١٢٢١٩ - **زانتويل** ، **زانتويل** *Xanthophyll* (F).
Xanthophyll, Xanthophyll (E). شجاع اصفر يرسد في اوراق التبان.

١٢٢٢٠ - **زاوية** *Angle*
هي الانفرج الحاصل من تلاقي خطين مستقيمين يبرزان بفسلي الزاوية. اما نقطة التلاقي تدعى رأس الزاوية. وتقسّم الزوايا الى ثلاثة انواع. كل زاوية قائمة يبلغ مقدارها ٩٠ تدعى حادة وكل زاوية اصغر من الحادة تدعى حادة وكل زاوية اكبر من الحادة تدعى منفرجة.

١٢٢٢١ - **زاوية الاحتكاك**
Angle de frottement, A. de friction (F). Rubbing angle, Friction angle (E).

١٢٢٢٢ - **زاوية الإثشاب** *Angle d'insertion* (F).
Insertion angle (E).

١٢٢٢٣ - **زاوية الإنحراف** *Angle d'inclinaison* (F).
Inclination or slope or dip angle (E).

١٢٢٢٤ - **زاوية الانخفاض**
Angle de dépression (F). Depression angle (E).

١٢٢٢٥ - **زاوية الإنكسار** ، **زاوية السقوط**
Angle d'incidence (F). Incidence angle (E).

١٢٢٢٦ - **زاوية القذف** *Angle de projection* (F).
Projection angle (E).

١٢٢٢٧ - **زاوية جالسعة** ، **زاوية قائمة**
Angle droit (F). Right angle (E).

١٢٢٢٨ - **زاوية حادة**
Angle aigu (F).
Acute angle (E).

١٢٢٢٩ - **زاوية حرجة**
Angle limite (F).
Limit angle (E).

١٢٢٣٠ - **زاوية زوئية**
Angle dièdre (F).
Dihedral angle (E).

١٢٢٣١ - **زاوية قهوه**
Angle apical (F).
Apical angle (E).

١٢٢٠٩ - **زالسكة** هي الاطوم، اطليه.

١٢٢١٠ - **زاقم** *Quart* (F). Quarter (E).
الزاقم : الزوايا من كل شيء.

١٢٢١١ - **زاسع *** *Schizophyllum commune*
فطر من الفاريفوريات مركب احصان ويطلع بعض النباتات الحرجية والمثيرة منها الكركز والشمش والخروف وقد شوهد على سوق الثوت وعلى ثمار الفطخ الناضجة الساقطة. مركب القشور الخشبية او المسطوية من لينة الشمس فيتركز عليها ويرتد بمشبه حتى التشكير فيفسد التبادل النسفي بعد ان يفتي حل الاوعية || منظره الخاربي، ما يميز في هذا الرسم، وهو كثيف التجميع، تحيل البكتة الدقيقة السريعة القلب || يكالغ باستصاكه ويتغير المرح وظليه بالاستسك.

١٢٢١٢ - **زاقور** *Naucrotus ductor* (S).
Naucrote (F). Pilot fish (E). سمكة بحرية من السميات طويلا نحو ٦٥ سم. ثوبا الى الزرقه انفساء يعلو موج نقي ومث غطوط سود قاطبة مستعرة.

١٢٢١٣ - **زامية *** *Zamia* (S).
Zamia, Zamier (F). Jamaica sago tree (E). *Zapfenpalmaria* (D). *Zamia* (I). جنس نباتات غلظية الجذع والاوراق من فصيلة السيكاسيات يعلو البلاد الامريكية الاستوائية || انواعها المعروفة ٣٠. جلودها غلظية وقصيرة. سطها كثيف التجميع، مسطيل الجريد، صحن الزمان الاخير || بعضها رشي وبها زوايا يتخرج من ثماره مادة نشوية مأكولة تفر بالسافر (Sagou).

١٢٢١٤ - **زان** *Fagus* (S). *Hêtre* (F). *Beech tree* (E).
Buche, Buchbaum (D). *Faggio* (I). جنس اشجار وجميعات برية حرجية من فصيلة القدييات انواعه نحو ١٥ سطها متصبية جالسة. اوراقها معتقة متعاقبة. نصلها يضي الشكل، مذهب القصعة، بارز المروق، عند القصعة، مسن الحافة. ازماره الذكورية درلوية التجميع. ثماره زور هريبة الشكل حادة الزوايا تدعى زانة. اغشاها صلبة قوية مرنة صناعية شائعة الاستعمال. لاه اشجارها دابة || بزور غلظية. اغلفة بزور تحوي بعض المواد الجمالية الفسارة كقوى الحيل والحبر وتسن الفم والمخار والخنزير.

١٢٢١٥ - **زان امريكي** *Fagus ferruginea* (S).
Hêtre américain (F). American beech (E). نوع من الزان يعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها تطول من ٦ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. نصلها عند القصعة، مشاري الحافة، كثير المروق التي يراوح عدد ازواجها من ١١ الى ١٧ || وهو من الاشجار السريعة النمو النسفي. يرغب في المواقع المعتدلة الرطاب.

١٢٢١٦ - **زان معزوف** ، **زان شاكس**
Fagus sylvatica (S). *Hêtre commun, Fau, Fauco, Fayed, Foyard, Fouteau* (F). European beech, Common beech (E). *Echte buche, Buche boom, Rœbuche* (D). *Faggio comune* (I). اشر انواع الزان واعما انتشارا. فروه عذبة منها الابواني والكثير اللورق والمناج والمسنبي والسنباني العربي... جميعها من الاشجار الكبيرة الحجم تطو



زاسع



زامية



زان معزوف



زانة



زائفة الجلود



زائفة اللثة



زائفة حنطية



زائفة حدادة



زب البحر



زبابة شائعة



زبابة قزرة



زبابة مقدمة

١٢٢٤٨ - زَاوِيَةٌ هَدَامَةٌ *

Pseudomonas destructans (S).

طول البكتيرية نحو ٨ مي. تركب بعض النباتات أخضها
القت قنصب أصفرار الأوراق ويذبلها. يعيقها ارتقاء
الجلود ثم اسمرها وكروية زائفها.

١٢٢٤٩ - زَاوِيَةٌ هُو السوي، اطليه.

Penla

١٢٢٥٠ - زَبٌّ، عَوَفٌ، قَفِيبٌ

ذكر الحيوان.

١٢٢٥١ - زَبُّ الْأَرْضِ هُو الطرثوث، اطليه.

Aktinos (S).

Actinia, Anémone de mer, Ortie de mer (F).
Actinia, Sea-anemone (E).

جنس حيوانات حليا من البنيات السيات السرية.
انواعه عديدة غطلة الاشكال والاجسام يذبل فيها الساق
الانوية والفرق الكلف للذباب اشرار. جميعها
لحسية نايضة سريعة الانقياض والانتشار، مشرقة
لللمس، وأخية الاثوان اللامعة من الوردي الى القرمزي
والاصفر والازرق البشجي. يوجد منها في المياه
الآبنائية. تعيش حل المسنور للفقرة بلذلة. قوتها ما وصل
اليها من هيام وحشرات مائية. وهي مأكولة يقال انها
مستحبة الطعم.

١٢٢٥٣ - زَبُّ الْكُرْمِ هُو الفلوس، اطليه.

Sorex, Crocidura (S).

Musaraigne (F). Shrew (E). Woldepitmaus (D).

جمع زباب. جنس حيوانات صغيرة القند من الزبابيات
أشجارات. أنوعها نحو ٤٠ صولها العالم. أجسامها
رقيقة مستطيلة خلية الور. وروثها واسطها لذقة.
أذانها مستدرة. قوائمها قصيرة. أطرافها حادة. أذنانها
حقيقية، مستطيلة، حلية الشعر || من ميزاتها انها تحصل
في عوصها بمسوى قوائمها الخلفية غدد مسكية فواسة
القوائم || انثاتها تضع من ٤ الى ٦ ادواس رضعها
من شهرين الى ٣ اشهر || اشهر انواعها ما يلي.

١٢٢٥٥ - زَبَابَةٌ شَائِعَةٌ *

Sorex araneus, S. vulgaris (S). Musaraigne commune, Musette (F). Common shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى الرمادي الاشبل يقيم على
القراري من ثوب الظهور ويبيض عند البطن. طولها الكليل
من ١٢ الى ١٣ سم. علوها نحو ٢ سم. تألف الجبال
والسهول والادوية والحقول. قوتها الحشرات والديدان
والبراكن والحلزون وفار الفروع.

١٢٢٥٦ - زَبَابَةٌ قَزْرَةٌ *

Sorex pygmaeus, S. minutus (S). Musaraigne pygmée, M. nana (F). Pygmy shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى السرة الصهباء. بطنها أغير
البن. طولها من ٨ الى ٩ سم. || تألف الاصحاح
والنبات الكثيفة. قوتها الوزغ والحشرات على اختلافها.

١٢٢٥٧ - زَبَابَةٌ مُقَدَّمَةٌ *

Sorex religiosus, Crocidura religiosa, Suncus sacer (S). Musaraigne sacrée (F). Sacred shrew (E).

نوع من الزباب ء ثوبها الى السرة الصبانية يقيم على
الظهور ويشر عند البطن. طولها يراوح من ١٥ الى

Equerre (F).

Square, Knee-piece (E).

١٢٢٢٢ - زَاوِيَةٌ مُثَلَّثَةٌ

الزاوية المثلثة وشكل المساح واحد.

Angle plan (F).

Plane angle (E).

١٢٢٢٣ - زَاوِيَةٌ مُسْتَوِيَةٌ

١٢٢٢٤ - زَاوِيَةٌ مُنْحَنِيَّةٌ انْخَطِئٌ

Angle curviline (F). Curvilinear angle (E).

Angle obtus (F).

Obtuse angle (E).

١٢٢٢٥ - زَاوِيَةٌ مُنْفَرِجَةٌ

Radian

١٢٢٢٦ - زَاوِيَةٌ نُصْفُ الْدَائِرَةِ

١٢٢٢٧ - زَاوِيَتَانِ مُتَبَدِّلَتَانِ

Angles alternes (F). Correspondent angles (E).

Alternate angles (E).

١٢٢٢٨ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَامَتَانِ

Angles complémentaires (F). Complementary angles (E).

Angles opposés (F). Opposite angles (E).

Opposite angles (E).

١٢٢٢٩ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ

Angles correspondants (F). Correspondent angles (E).

Angles adjacentes (F). Adjacent angles (E).

Adjacent angles (E).

١٢٢٢٩ - زَاوِيَةٌ مُتَقَابِلَةٌ

Excédant (F).

Exceeding (E).

١٢٢٢٣ - زَاوِيَةٌ مُتَقَابِلَةٌ

Appendice (F). Appendix (E).

كل عضو زائد في الجسم الحيواني والنباتي.

Pseudomonas (S).

زائفة ج زائفة. جنس بكتيريا من فصيلة القضيبيات.
انواعه عديدة تتميز بآركاتها الاسطوانية، بقطبيها للمهدين
وباعداها المتحركة || انواعها اللزجة قليلة تخص منها.

١٢٢٢٥ - زَاوِيَةٌ الْجَذَرُ *

Pseudomonas radicola (S).

طول البكتيرية نحو ٤ مي. اذانها حلقية سوية.
تركب جلود النباتات قسطها. مظهرها الخارجي
درينبات صغيرة سمرار اللون مبشرة على الجلود والقرقرى
تكالص يظهر البذار والترية.

١٢٢٢٦ - زَاوِيَةُ الدَّائِرَةِ *

Pseudomonas stewarti (S).

طول البكتيرية ٢ مي. اذانها خيطة. تصيب القدر في
زين ازهاره تركب الأوراق ويذبلها وتقضي على النبات.
تكالص يظهر البذار والترية.

١٢٢٢٧ - زَاوِيَةٌ حَقِيقَةٌ *

Pseudomonas campestris (S).

طول البكتيرية نحو ٥ مي. تصيب للفلوف والقت
والخردل وفيها من السليبيات. تركب. احصاب
الأوراق تسبب اسمرارها ثم اسودادها وتسبب الجلود
تفقس مكاكها ثم تمثها || يحسن اجتناب تفقيش
النبات لانه السبب الوحيد في انتفاخ وبطشه. يكالص
يظهر الترية.

١٢٢٦٤ - **زَيْدَاةٌ سَوْدَاةٌ** *
Arctelis (S).
Arctélide, Binturong (F). Arctelis, Binturong (E).
جنس حيوانات لبونة من الزبديات. موطنها الهند
اجسامها مستطيلة. قوائمها قصيرة. ورووسها مستعرضة
أولها سوية اللون الاسود. يراوح طول اجسامها من
٧٠ الى ٨٥ سم. وذيلها من ٩٥ الى ١٧٠ سم. || تألف
الاجراج الكثيفة. تتسلق الاشجار. تسرح في الليل.
قوتها الحيوان والطيور والسلم والحشرات والثمار.

١٢٢٦٥ - **زَيْدَاةٌ مَلَكَّةٌ** * ، **وَسْ**
Viverricula malaccensis (S). Civette de Malacca.
Petite civette de l'Inde, Rasse (F). Rasse civet cat (E).
نوع من الزبادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٩٠ سم. وذنبها
٤٠. ثوبها الى الصبغة الورداء يملو تخطيط متعرض
اسود. فيج ظهرها اسود يكتنفه غطاء عاجيان. رأسها
اسمر. صغرها مطوق بالابيض || موطنها يمتد من
ملقه الى الهند. تألف الاجراج والادغال وتتسلق
الاشجار بسرعة || قوتها الحيوان والطيور والثمار وبعض
الجلود. تأكل الموز بشهية.

١٢٢٦٦ - **زَيْدَاتِيَّات**
Viverridae (S).
Viverridés (F). Viverridae (E).
فصيلة حيوانات لاجمة مفترسة اجنتها ١٦ اشهورا
الزبادة والرياح والتنس. اما انواعها فكثيرة العدد.
موطنها المناطق الحارة من العالم القديم. اجسامها مستطيلة
دقيقة، قوائمها قصيرة، اذنانها طويلة، جلدها، والذلة.
امتلائها غليظة، ورووسها زائفة، اعظامها ذائقة، ميوتها
صغيرة، اذنانها مضمطة الحجب || تتميز بفندھا ميتھة
التي تفرز دهن الزباد المسكي اللزج في اجرة خاصة
مركزها بين السرم وملقن الفلنجن || مسرحتها في
الليل. قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطيور
والانعام والورع والاسماك.

١٢٢٦٧ - **زَيْدَاةٌ، فَكَلَّةٌ**
Cotyledon (F).
Cotyledon (E).
هي الخوصة حين تخرج من النواة.

١٢٢٦٨ - **زَيْدَاةٌ**
Taille de la vigne (F).
Pruning of vine (E).
هي تسريع الكمية اي تسهيلها. يقال زبر او يبرز
الكومة.

١٢٢٦٩ - **زَيْدَاةٌ**
Cane (F). Female duck (E).
هي البطية وتسمى زبالة لانها تكثر الزبط اي الصياح.

١٢٢٧٠ - **زَيْبَالٌ**
ما تحمله البنته عليها.

١٢٢٧١ - **زَيْبَانِيٌّ** * ، **زَيْبَانِيٌّ**
Antenne (F).
Antenna (E).
ما تزين به الحشرة وما زيبانيان. اطلب قرن استعماري.
اشكاله كثيرة البند اعماها ما جاد به الرسم.

١٢٢٧٢ - **زَيْبَاةٌ، زَيْبَانِيَّةٌ الْعُسْرَبُ**
الزبانا او زيبانيا المقرب منزل من منازل القمر البانئة.
وما كوكبان نيران مقترقان في قرني " برج العنقرب،
معرضان بين الشمال والجنوب بينهما قيد روح ينزلما القمر
في الجلة السابعة عشرة || يقبب الزبانا يدعى البيلون.

١٦ سم. موطنها البلاد الحارة. تألف السهول والحقول
المزدرة قوتها النوبيات والحشرات.

١٢٢٥٨ - **زَيْبَاتِيَّات**
Soricidae (S). Soricidés (F).
Soricidae, Shrews (E).
فصيلة حيوانية من رتبة الحشرات. انواعها نحو ١٧٠
موطنها العالم القديم. اجسامها صغيرة القند تشبه القار
والجرذان. اذنانها رمادية. اعظامها ذائقة. اذنانها
مستديرة. قوائمها قصيرة. انظرها حادة. اذنانها دقيقة.
تألف الجبال والمساب والسهول والقياني. قوتها الحشرات
على اعلاها والمصاير والاسماك.

١٢٢٥٩ - **زَيْبَادٌ، زَيْبَادِيٌّ، مَسْحَاةٌ**
Pallenis spinosa (S). Pallénis, Petit mugue (F). Star-
wort (E). Dorniges goldauge (D). Pallenis (I).
لبات حوض بري طي شاك من فصيلة الكركبات.
منته حوض البحر المتوسط. ازهارها حلوية اللون مدرية
يحمرها النحل. فولاده الغليظة مبهمة يقال انه يشع الصدر
ويقوى للعدة.

١٢٢٦٠ - **زَيْدَاةٌ، صَيْوَرُ الزَيْبَادِ**
Viverra (S).
Civetta (F). Civet cat (E).
جنس حيوانات من فصيلة الزبديات. انواعها خمسة
تتميز باجسامها المستطيلة. اولها مختلفة اللون
يكثر لها التميز والتخطيط || اذنانها تقع من ثلاثة الى
اربعة جوار ترصها نحو ٨ اسابيع.

١٢٢٦١ - **زَيْبَادٌ اَفْرِيقِيٌّ** *
Viverra civetta (S).
Civetta d'Afrique (F). African civet cat (E).
نوع من الزبادة تملو نحو ٣٠ سم. طولها ٧٥ سم.
وذنبها ٤٠. رأسها مكور الشكل، ذلقوها مدب.
اذنانها قصيرتان قوائمها متوسطة القند قوية. ثوبها الى
الصبغة الاسراء يملوها تخطيط وتبيج اسود وشك نصبي
يقتبب النجج من القطن الى طرف الذنب || موطنها افريقية
الشرقية والشالية. تألف الجبال والادغال والقياني.
تسرح في الليل. قوتها ما استطاعت اقتناصه من الحيوان والطيور.

١٢٢٦٢ - **زَيْدَاةُ النَحْلِ** *
Paradoxurus (S).
Paradoxure, Musang, Harle des palmiers (F).
Palm civet cat (E).

جنس حيوانات لبونة من الزبديات. موطنها البنغال
وسريليب والهند الصينية. انواعها عديدة. اجسامها
مستطيلة. طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٥ سم. اذنانها
من ٤٠ الى ٥٥ سم. وطولها من ٢٥ الى ٣٥ سم. اذنانها
مرفقة || تألف الاجراج وتتسلق الاشجار. قوتها الحيوان
والطيور والثمار على اختلاف اجنتها وانواعها || اذنانها
تضع اربعة جوار ترصها نحو ٨ اسابيع || زبادهما
مبهجين الزائفة الكريمة.

١٢٢٦٣ - **زَيْدَاةُ الْهِنْدِ** *
Viverra zibetha (S).
Civette de l'Inde, Zibeth (F). Indian civet cat,
Zibeth (E).

نوع من الزبادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٨٠ وذنبها
٤٥ سم. موطنها الهند والصين وبنورما. ثوبها الى
الصبغة الصفراء يملو تميز بقوي. فيج ظهرها اسود
اللون. سواد يمتد من القطن الى طرف الذنب || تألف
الاجراج والادغال والسهول والحقول. تسرح في الليل.
قوتها الحيوان والطيور والانعام والقضاد والحشرات والبيض
والثمار.



زبادة افريقية



زبادة النحل



زبادة الهند



زبادة سوداء



زبادة ملقة



زبان

Colombophille (F).
Pigeon-faucyng (E).

١٣٣٠٩ - زَحَافَات

الزحافة من تربية الحمام الزائيل وترويضه على العمل المنوط به .

١٣٣١٠ - زَجَر * ، زَجَر (F). Latius (S). Latie (F).
جنس اسماك بحرية من شقائق المنارة وفضيلة البهاريات . انواعه المعروفة خمسة : اسطفاها بحار المناطق الحارة من العالم القديم جميعها كبيرة القد طويلا براوح من ٧٠ الى ١٢٠ سم . وروصها غليظة مقلمية الخشن . هيونا كبيرة مستديرة جاحظة . زانفها الظهرية مسطيلة . حراشها صغيرة . اثوابها بخلفة الابلوان غشية المراج .
ج زجور .

١٣٣١١ - زَجَل Retournement des œufs (F).
Returnement of eggs (E).

هو تقليب البيض . زاجلت الدجاجة : قلبت البيض في ايام الحضان لانها ان لم تجال مدر البيض . وهو ما يجب الالتباه له في الحاضنات الآلية ليسلم البيض من اللسر .

١٣٣١٢ - زُجَم ، صُوْنُو لُمَاء (S). Hydrochelidon (S).
Mirodelle d'eau, Guifette (F). Sea-swallow (E).
جنس طير من كليات القدم . انواعه قليلة ثقبه الخشن الا انها اطول جناحا ورصا . تألف هجرات ومنافع المناطق المعتدلة . تكثر في شواطئ البحر المتوسط . قوتها الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة . تدثر في الانجار والنباتات المائية . اناثها تبنيش وعضن ثلاث بيضات نحو اسبوعين || اشهر انواعه الزجم الاسود .

١٣٣١٣ - زُجَم اسود * (S). Hydrochelidon nigra (S).
Guifette noire (F). Black sea-swallow, Black tern (E).
نوع من الزجم . رأسه وصقعه وصوله الى السوداء الغامس . ظهره احمر الكحل . جناحه وذنبه الى الريد الزرقاء المراج . بطنه وباطن جناحيه واظفكه الى البياض الناصع . منقاره وساقاه حر .

١٣٣١٤ - زُجَحَار Enterotoxemies
مرض معد خفيف يصيب الحيوان في امعائه فيؤذي به .

١٣٣١٥ - زَحَافَات Reptiles (F). Reptilia (E).
الزحافات توكلف السلف الثالث من قسم الغفاريات . مركزها المرتبي يأتي بين الطير والصفدييات . علمها يدعى زحفنة . اجسامها مسطحة اما بهفت متباينة الاشكال والياكة والمادة ، واما صفاتها قرنية ، مغشاة الشفافة شديدة الصلابة . تنفسها رئوي . اجهزتها التنورية والمصبية والمغصية والتناسلية كاملة . فحفها يتصل بالعمود الفقري بواسطة لقمة قذالية ، اوسطة ، بسيطة . بعضها مجهز بأربع قوائم يستعين بها للالتفاف وبعضها مرقال مدح القوائم . كانت فصائلها واجناسها في الازمنة النافرة كثيرة العدد وقد بلغت اربعها في الاباج الثاني حيث وصل عدد رتبها الى ١٩ . اما الآن ، فالانواع الممارسة تقدر بنحو ٩٧٥ تنقسم في اربع رتب فقط . وهي مخطويات الرؤوس والسلاحف والسحاسيات والشفديات .

١٥ مخطويات الرؤوس Rhynchocéphales (F).
رتبة من الزحافات يمد ظهرها الى الاباج الثاني . وقد

١٣٣١٦ - زَبِيلين * ، سَمُور سَمِيرِيَّة Mustela zibellina (S). Zibelline, Marte zibelline (F).
Sable (E).

حيوان مفترس من السموريات . موطنه الاساقع الباردة بكثري في سبيرة . طوله نحو ٤٥ سم . وذنبه ٢٢ ثوبه جل الور الثام الطويل . ظهره الى السرة السوداء منقعه وبطلاده الى الصببة الصناوية . غذاه الى الرتبة . غطه اسود . انذاه الى السرة ، حشاها اريد . زوره وصدره وبطنه الى الصببة الصفراء المراج . قوته فاعرة . يأنث الاخراج الكثيفة وجاري الماء . يسرح في الليل . قوته الحيلان والطيور والسلك والبار .

١٣٣١٧ - زَبِيد * ، مَرِيُون Zapus, Meriones (S). Zapode, Méron (F).

جنس حيوانات ليونة قاضمة من فصيلة البيربوسيات . انواعه عديدة . جميعها شيرة القصد طولن من ٧ الى ١٠ سم . واذاها من ١٢ الى ١٥ سم . جرازها الخلفية مسطيلة تمكها من التفر الطويل . اثوابها الى الصببة السوداء . اذاها اسود . اياظها اصفر . يملوها توشج اسود . بطونها ليس || تألف الاذفكال واظراف الغابات والنباتي والجلجل والادوية والحقول والراعي . تسرح في الليل . اجسامها انفاق دهايز تنفرا على عن ٥٠ سم . ثرتها المولد النباتية حل اختلافا من الجدار الى الحب ومن الارواق والبرام الى القار ومن الشب والجلور الى حلا الاشجار .

١٣٣١٨ - زَبِيد ، هَمَجَمَة Raisin sec (F). Raisin (E).
هو السب الزئب له طريقة تجفيف خاصة تمكنه من الاحتفاظ ببعض اللدانة .

١٣٣١٩ - زَبِيد بَرِّي هو المائق الجيلي ، اطلبه .

١٣٣٢٠ - زَبِيدَة Fourmillère (F).
Ant-hill, Ant's nest (E).

هي المنسة اى قرية التل || هي الزابية لا يملوها ماء .

١٣٣٢١ - زَبِيدَك هي الاذريين وهي القوشحان المزني ، اطلبها .

١٣٣٢٢ - زَبِيدَكَة هي السمر الارط ، اطلبه .

١٣٣٢٣ - زَبِيل Cueltloir (F). Fruit-basket (E).
قوة اى وءام ما توضع فيه الثار عند قطفها .

١٣٣٢٤ - زُجْ Ausruhe (F). Ostrich (E).
الزج هو النعام . الواحدة زجاء وأزج للذكر .

١٣٣٢٥ - زُجَاج Verre (F). Glass (E).
مادة صلبة شفافة سهلة الانكسار تصنع من الرمل والقل .

١٣٣٢٦ - زُجَاج هو حب القرزفل .

١٣٣٢٧ - زُجَاجِي ، شَفَاف Hystolde (F).
Hystold (E).
صفة ما هو شفاف كالزجاج .

١٣٣٢٨ - زُجَاف Colombophile.
Périscronique (F). Pigeon faucyng (E).

الزجاف من تعامل تربية الحمام الزائيل وترويضه .



زبيلين



زيبو



زجر



زجم اسود

Solénoglyphes	أَبُوِيَّاتُ الْإِخَادِيدِ	انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمخيرية أو السغنون الذي يعتبر أقدم الزحافات الماصرة لأنه مثال الخنثى الأول.	
Opisthoglyphes	خَلْفِيَّاتُ الْإِخَادِيدِ		
Aglyphes	عَدِمَاتُ الْإِخَادِيدِ		
Opotérodontes	سَرَاوِلَاتُ الْإِنْسَانِ	٢٥ السَّلَاحِفُ	
		Chéloniens	
	أما فصائلها فهي :	تجمع من الزحافات . أنواعها الماصرة المعروفة ٢٣٥ تجمع إلى ١٢ فصيلة . أجسامها مبطنه مسطحة . رؤوسها مكرونة صغيرة . أعناقها موصطة الطول . فكوكها عادية الإنسان لكنها مجهزة بنصال قرنية حادة الأطراف . قوتها غليظة . ظهرها ممرق بذيال . بطونها قرنية الكتف المروف بالزيف . ورعها هذا سداسي الفقر يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الأربع أما فصائلها فهي ، بالنسبة إلى التصنيف الحديث ، ما يلي :	
Typhlopides	تفلوسيات	Trionychiides	ترسيات
Leptotyphlopides	دسميات	Kinosternnides	جنائيات
	بؤاكيات	Dermatemnydiides	حسانيات
Ilysiides	حسبيات	Reumocheliides	حفاصيات
Uroplatides	خفرييات	Emydiides	حسبيات
Xenopelides	خدائيات	Platysternnides	عنتاقيات
Colubridés	حنشيات	Chelydrides	دلهانيات
Amblycephalides	مسلاحات	Caretacocheliides	دوريات
Viperides	أفيات	Cheliides	رقيات
		Tesudiniides	سالمقيات
		Dermocheliides	قبصيات
		Chéloniides	بلجيات
		Crocodyliens	٢٥ الجصاصيات
			ربة من الزحافات تشمل فصيلة واحدة قسم ٢١ نوعاً تجمع إلى ٦ اجناس . اكثريتها الباسقة من المناطق الاستوائية والحارة . مسطحها يمشي في مياه الازهر والبحيرات وبضها يغرس مياه البحر كالتمساح البحري والتمساح اللؤلؤ الخطم . تتميز التاميع بأجسامها المستطيلة الخفيفة ، جلدها الغنية الصلبة القشبية ، بقوة ذكورها الكبيرة المجهزة بإسنان ذرية ، يصغر عيونها الجاسسة ، بإتفاق مناصرها الطرفية الإنكاز ، وبأذنانها الضخمة المسطحة .
Iguanides	عيسونيات		أما اجناسها الستة فهي :
Agamides	حردونيات	Crocodyle du Nil	تمساح النيل
Chamaeleontides	حراميات	Crocodyle marin	تمساح بحري
Gekkonides	زفريات	Crocodyla à museau effilé	تمساح ذلق الخطم
Pygopodides	سلييات	Gavial	تمساح الهند ، أدرم
Xantusides	خنطونيات	Alligator	تمساح امريكي ، ألباتاوار
Lacertides	مسلاحات ، حسانيات	Caiman	تمساح كيان ، كيان
Tetides	تيديات	Squammes	٥ السهلقات
Scincides	مستقوريات		ربة من الزحافات وقد قسموها إلى مرتبتين أو ثلاثين : مرتبة الحيات ومرتبة السطاليات .
Angulides	حنجيات		أ - مرتبة الحيات - الحيات حيوانات زسلفة مرقالة متفاوتة الاعلاق والجسام والاثواب . أنواعها المعروفة نحو ٢٧٠٠ تنتمي إلى ٢٥٠ جنساً تجمعها تسع فصائل تقسم إلى خمس فئات .
Annelides	فناصيات		الفئات الخمس هي :
Hétérodermatides	فاغرات		أمانيات الإخاديد
Varanides	وريات		
Amphibénides	تهقرانيات		
Gerrhosaurides	جسوريات		
Lépides	عوديات		
Zonurides	خنزاريات		
Xenosaurides	دولسات		
Andrytropides	عكاكيات		
Dibamides	نقصيات		
Chilopodes	١٣٣١٦ - زحالف		
	ربة دوريات تعرف بمقوية الاربل .		
Diczyoporeas (F).	١٣٣١٧ - زحاصيات ٥		
Diczyoposporas (E).			
	عارة تطور بجمهرة من فصيلة الطحيات . تتميز ببوليتها القرصادية الشكل . اجناسها خمسة : البارعية ، الردية ، الزبيرة ، الكونونيوم والمكروسوديوم .		
		Protoglyphes	

خليلة ، محبة الأطراف || لها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

1٢٣٢٦ - زُخْمُوك *
Loranthé sauvage (F).
Wild loranthé (E).

نوع من الحشال واصله الثمين . وهو نبات طفيف يركب اغصان الاشجار الحرجية فينبغ فيها ويقنات من عصارتها . ج زحاميكا .

1٢٣٢٧ - زُخْمِيَنَة *

Zoonomie (F). Zoonomy (E).
مجموعه من الشرائع الطبيعية التي ترمي حياة الحيوان .

1٢٣٢٨ - زُخْمِيَنِي *

Zoonomique (F). Zoonomic (E).
نعت ترميضي يطلق على كل شريعة طبيعية تتحكم بحياة الحيوان .

1٢٣٢٩ - زُخْمُغ *
Agneau (F). Lamb (E).
الزينة : اولاد الذئب لانها ترعى اي تلاق وتضع من رائها .

1٢٣٣٠ - زُخْمِرُط *
Glaire (F). Glair (E).
الغاط السائل عند الدواجن من الايل والحيول والشاة والبط .

1٢٣٣١ - زُخْمِرُط * ، زُخْمِيَنَان *
Gagea (S).
Gagée (F). Gagea (E). Goldstern (D). Gagea (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة ٢٠ مظهرها بري وبهضو زراعي ترابي ، لورائها خضيه مستطيلة . ازهارها صفراء اللون طويلة المتق متعددة يجسمها شراخ اجوف مستطيل .

1٢٣٣٢ - زُخْمِرُف *
رجاء ابنة يوم .

1٢٣٣٣ - زُخْمِرُفِيَات *
Ephemeridae (S).
Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة المرحجيات وطبقة البويات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها تحلج الاجسام المستطيلة ، دقيقة الاطراف والرجلي .

1٢٣٣٤ - زُخْمُوبُ النَمُص *

Incurvaria musculetta (S). Mineuse des feuilles du chêne (F). Incurvaria musculetta (E).
حشرة من فصيلة الزغوليات حوشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاذن الى بعض مناطق اوروبية واfrريقية الشمالية . فرائشها خفيفة تموش على غزونها الاسمانى . رجليها لائحة ثم خاضعة ، تلم اوراق الفص والسديان ثم تنهيرا الى الاغصان البنية || جسمها صغير قصيف بطول من ٤ الى ٥ م . بطيها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . رأسها مستطيل الجرم حطلي اللون . حينها كيرتان . زياناها غطيان . ملاسها صفيرة . مرشها جده . جريتها الى الحطلي ويطيها كلك || وراشها كبيرة . ورشها الاماميان الى اثني المايق تملو بقجتان ثلثيا اللون . ورشها الخلفيان الى الحطلي القاتم . ابدالها الى الحطلي الاصفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في القسم الثاني من الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || السرعة تثقب بشرة النصل وتلفه وتموش على خلايا الزون

1٢٣٣٨ - زُخْف *
Reptation (F). Creeping (E).
الزحف الانتقال على الارض ديبيا كما تقبل الزحافات من ثابين وطاء وغيرها .

1٢٣٣٩ - زُخْفَن *
Erpétologiste (F).
Herpetologist (E).
الزفنف موليدي اختصاصه درس الزواحف .

1٢٣٤٠ - زُخْفَنَة *
Erpétologie.
Herpétologie (F). Herpetology (E).
الزفنة او علم الزواحف جزء من علم التاريخ الطبيعي .

1٢٣٤١ - زُخْفَنِي *
Erpétologique (F).
Herpetologic (E).
نعت ترميضي يطلق على كل ما له صلة بالزفنة .

1٢٣٤٢ - زُخْمَل *
Saturne (F). Saturn (E).
كوكب من مجموعة النظام الشمسي ، وهو من الجنس . سرعه دوره الانتاقية في الفضاء نحو ٣٤٧٠٤ كيلومتر بالساعة . دوره المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٩ سنة و١٦٧ يوما || ولانجسن يدعونه شيخ النجوم ويسمونه النسر الاكبر لانه في النصوص فوق المريع واصافوا اليه الخراب والحلاك والم والم .

1٢٣٤٣ - زُخْمَلَة *
الزحلة : دابة تدخل في حبرها من قبل اسبا (السان) .

1٢٣٤٤ - زُخْمَلِيَة مَبْكَمَة *
Tomoxia biguttata (S). Tomoxie à 2 taches (F).
Tomoxia biguttata (E).
حشرة وائمة خاضعة دامت من فصيلة المردليات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة السبيلية . غناصها تموش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تموش على المواد النباتية الصائرة نحو الاخلال || جسمها صغير القه بطول من ٥ الى ٧ م .

توينا الى الكسفي التاتم تملو في اواسط الظهور بقجة بيضاء وزرقاء . رأسها مستعرض الجرم . زياناها غطيان . حينها صغيرتان ماضتان . ظهرها غيب الخضر لا يلحف كامل البطن . يطها بردي الشكل ينقي بسم ذلق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تساق في تموز . تمنح للمكن تحت غاء الاشجار الباسية والاعشاب المقلوبة || البقرة منه يولها الإدراك التام بطول نحو ١٢ م . جسمها شبه رشي الشكل ، سداسي القرواجب ، مستطيل الرأس ، ضلع التثدير ، احمل اللون ، اسمر الموج يسود ويمر في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقي طليقا في التربة .

1٢٣٤٥ - زُخْمُوق *

Rhypticus (S). Savonnier (F).
زحلوكة وزحلوكة جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصلها من بلاد الحارة والاسراقية || اجسامها الحليجية الشكل . مسكها داعم السهف ، تام للشمس . حينها كبيرة ، نائمة ، جاسقة ، ربيعة الاركان . زعانفها الظهرية مستطيلة ، شائكة المناسخ الامامية . زعانفها الذيلية



زحلوكة مبقجة



زحلوكة



زحلوكة



زحلوكة



زحلوكة النمس

1٣٣٤٢ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ Mécépimère (F).

Metepimerium (E). هو في الحشرات البضو التحيل البقيق الذي يوصل البرجد بالبرجد.

1٣٣٤٣ - زُرْعَةُ الْبُحُوسِ Epimère (F), Epimerium (E).

هو في الحشرات عضو صغير يمدل كسلة وصل بين غشيش الميوشن وسائر اقسامه.

1٣٣٤٤ - زُرْعَةُ الْوَرْدِ هو الحقيق ، راجحه .

1٣٣٤٥ - زُرْعَةُ حَيْثِيَّيْنِ هو الخطة ، اطبا .

1٣٣٤٦ - زُرْعَةُ دَهْيِيَّيْنِ هو الميوزان الحريف ، راجحه .

1٣٣٤٧ - زُرْعَةُ الْبُرْجَادِ Etanions (F), Ebanus (E).

جنس طير من عمارة الحدأة فضيلة الصقريات ، أنواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة . منسارها غليظة شديدة الانحناف . سواقها طرية . اذنانها قصيرة . غالبها قوية . اظفارها حادة . اريولها رقة متندبة الافران ينط في ظهورها الزرق الاسمر وفي بطنها الازرق في الاخير . جميعها يابسة المزاج ، شديدة الجناح ، سريعة الطيران لا تهاب شيئاً . انهزها الزرق والكنخي .

1٣٣٤٨ - زُرْعَةُ الْفَانْشُورِ Phaneur (F), Planter (E).

هو الذي يمارس زرع الارض .

1٣٣٤٩ - زُرْعَةُ الْاُكْثَارِ Agriculture

هي فن زراعة الارض وبترفيها الشامل هي فن استنباط النباتات الزراعية والحيوانات والجماعة على اكل وبه الاقتصادي .

1٣٣٥٠ - زُرْعَةُ الْوَرْدِ Culture (F).

Culture, Cultivation, Husbandry, Tillage (E).

هي السبل الزراعي المخصص .

1٣٣٥١ - زُرْعَةُ الْاَفْجَتَارِ الْمُشْمَرَةِ Fruiteculture (F), Orchardng, Fruit-growing (E).

هي التي تسمى بانتاج ثمار الفواكه .

1٣٣٥٢ - زُرْعَةُ الْبُرْجَادِ زُرْعَةُ يَدْرِوِيَّةِ

Culture de porte-graines (F).

وسمى من قلة زراعة البقاري والحيوانات والبزرات . وبهم من كل زراعة تهتف الى انتاج البذار راجح حمزة .

1٣٣٥٣ - زُرْعَةُ الْيَسَاعِيْنِ ، يَسَعَتِيَّةِ Horticulture

تخصيص زراعي غاية استنباط النباتات البستانية دون سواها .

1٣٣٥٤ - زُرْعَةُ التَّرَاوِيْقِ ، سَرَقِيَّةِ Mosiculture

تخصيص زراعي يركز على ترويب الحدائق وفقاً لاشكال هضمية يلعب فيها لين النبات الدور الرئيسي .

1٣٣٥٥ - زُرْعَةُ الْحَرَاكِ ، حَرَاكَِّةِ Sylviculture (F), Forestry (E).

هي علم التصريج يبحث في استنباط وقرس واستنباط الاشجار الحرجية .

1٣٣٥٦ - زُرْعَةُ الْخَضَارِ ، زُرْعَةُ الْبُقُولِ Culture maraichère, C. potagère (F), Pot-herbe cultivation (E).

تخصيص زراعي غاية انتاج البقول .

نحو ثلاثة اسابيع ثم تخرج من التلق وتعدل بخيط حريري المائدة حتى سلط التربة حيث تنمو نحو الاضباب البرية . والسرقة عند بلوغها الادراك تمام تعلق نحو ٨ م . جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجرم ، اسمر اللون ، ميمش الحلب ، اسيد الرأس والفرج . طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينتهي طلياً ضمن جراب السرعة في الجلالة او بين الارواق التي تلتاس التربة .

1٣٣٥٥ - زُرْعَةُ الْبُرْجَادِ Incurvarilidae (S).

Incurvarilidae (F), Incurvarilidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشنيات الاجنحة . انواعها المرفقة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تسرح في التباد وتبيت في الليل . طياتها متدل البرقصة والحرم . اجسامها صغيرة ، مغزلية الشكل . رؤوسها مسطعطة . عيونها كبيرة ، ناعرة . قرونها الاستشعارية غليظة . شديدة الطول . ملابسها صغيرة ، قصيرة ، جالسة . مراقفها جناح . طياتها كيفية التمدل القصير . حذاتها لا يوجد لها . روارثها ذلقة الاطراف الخارجية . فلتايب قوائمها الخلفية رباعية المتناسخ . اساريها مبططة ، زباء الفشار . لاهة في اول عهدتها ثم خاضعة تيش داخل جراب مبطط تأوى اليه ويغيره عند الاطلاق . خادوتها طليقة تصغر ، في طور الاكمال ، ضمن جراب السرعة . أشهر اجناسها الزعلوب والاديلة والمنفوده .

1٣٣٦٦ - زُرْعَةُ الْاُكْثَارِ Turnera (S), Turnère (F).

جنس نباتات طليعية عشبية من فصيلة الزوايات . انواعه نحو ٦٠ متبها المناطق الحارة والامتوائية . جميعها سرية التنو . اوراقها متعاقبة ، متعقة ، اعليجية ، ذلقة . ازهارها ابيلة الارتكاز فروية التصبج . اوراقها طليعية تنفذ القلب وتنشط الباه . أشهر انواعه الزاداع السابق .

1٣٣٦٧ - زُرْعَةُ شَابِيْقٍ ، دَمِيَاةِ Turnera aphrodisiaca (S), Turnère aphrodisiaque, Daminara (F).

جنية زراعية طليعية مهددا البلاد الحارة . ساقها فرفة زغبية اللمح ميمزة للمسام اللدية الشكل النعنية للمادة . اوراقها متعقة ، متعاقبة ، اعليجية الشكل . نصلها جامد اللون . كثير التمروق ؟ صفحه العليا كيفية المسام اللدية . يستخرج من اوراقه زيرويه زيوت طليعية ويولد دمية وراثتية صاعرجا الفعالة شديدة البقع على الاضضاء التناسلية . تليها شايق منظر . كثيرها مؤذ .

1٣٣٦٨ - زُرْعَةُ الْاُكْثَارِ Turnercaceae (S).

Turnéraceae (F), Turnéraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها مهددة جميعها عشبية او شجيرة . ازهارها شتوية خاسية التركيب . ثمارها حقبة ثلاثية المصارع . بذورها دقيقة سمراد اللون . اعرف اقلها واثمها الزاداع .

1٣٣٦٩ - زُرْعَةُ الْاُكْثَارِ Pars, Portion

هو التصيب والحصة . ج اذداب .

1٣٣٦١ - زُرْعَةُ الْاُكْثَارِ هو الجدار القيد . اطله .

1٣٣٦١ - زُرْعَةُ الْاُكْثَارِ Bouton floral (F), Floral bud (E).

هو كرم الزهرة قبل انبلاجه .



زادع شايق

وتوب الفهد || موطنها فياني افريقية وإدغالها. قربها الشب وورق بعض أنواع الميموزا والسنت والاكوية . تعيش جماعات صغيرة العدد أجملها يتألف من ثقل وثلاث أو أربع أنثى وثلاثة أو أربعة مدبار .

١٣٣٠ - زَرَاقَة (F). Camélopard, Girafe Camelopardus (E).

الزراعة كوكبة نجوم شمالية المقيع مركزها بين كوكبة هلك الاعنة وكوكبة الدب الاصفر || عدد نجومها ١٩ جميعها من المرتبة الخامسة .

١٣٣١ - زَرَاقِيَّات (S). Giraffidae, Camelopardalidae Giraffidae, Camelopardalidae (F). Giraffae, Camelopardalidae (E).

فصيلة حيوانات بحيرة من ذوات الظلف تشغل في الزمن الحاضر جنس الزرافة الوحيد النوع .

١٣٣٢ - زَرَاقَة * (S). Fistularia Fistularia (F). Fistularia (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الزرقانيات. أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها ببحار البلاد الحارة من البحر الأحمر الى بحر الصين || أجسامها غليظة ، مستطيلة ، لزجة ، صاعدة الحراشف . رؤوسها صغيرة ، أنبوبة الاغصان الطويلة . زعانفها الذيلية غارقة تلتصق في وسط كل منها عذبة مستطيلة دقيقة تشبه سوط الخويدي || لحومها كاعنة الصنف وبهشها جعالي المادة مؤخر .

١٣٣٣ - زَرَاقِيَّات * (S). Fistulariidae Fistulariidae, Fistulariidae (F). Fistulariidae (E).

فصيلة اسماك بحرية يربطها من شاكلات الزعانف ، أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم ببحار البلاد الحارة || تتميز بأجسامها الضيقة المستطيلة وبأغصانها الأنبوبية . عينها صغيرة ناشزة . زعانفها الظهرية غليظة الزنكار قريبة من الذيل || أعرف أجناسها وأشهرها الزرافة والصييلة .

١٣٣٤ - زَرَاقُود * ، أُرِسْتُولُوحِيَّة ، مَهْمُتُون ، هَاكَة (S). Aristolochia Aristolochie (F). Worm-killer, Birthwort (E). Osterluzei, Hohlwurz (D). Aristolochia (I).

جنس نباتات عشبية ليلية عارضة معمرة من فصيلة الزراندنيات . أنبساط عديدة منها البرية والبرية والعلوية . أوراتها متشعبة قليلة الشكل ومنها ثنائية أو ثلاثية التخصيص أنبساطها كبيرة القد ، غريبة الشكل ، مختلفة الألوان . جذور الأنواع الطبية كافورية الرائحة تشتمل كمرة وفي مدرة الفلث ، تسهل الولادة ، تفيد من الربو ، تنفي القروح وتجلو الأسنان . ويستخرج منها جوهر جعالي قدام يسمى زرافتين قليلة مقو جزيل النفع ، كثير سم زعاف .

١٣٣٥ - زَرَاقُود أرغَب ، مَهْمُتُون ، مَهْمُتُون (S). Aristolochia tomentosa Aristolochie tomentosa (F).

نوع من الزراندنيات ساقه مادة عارضة زبدية تطول من ٥ الى ١٠ امتار أوراتها قليلة ذلقة الزمان الأخضر . نعلها خلي البثرة . أنبساطها كبيرة القد ، قليلة التحسين . صفحتها الخارجية صفراء اللون أما الداخلية فبنفسجية .

١٣٣٦ - زَرَاقَة الزُّهُور Floriculture

تخصيص يتناول زراعة وتعد النباتات الزهرية والزهرية .

١٣٣٧ - زَرَاقَة الشَّجَر Arboriculture

تخصيص في الزراعة يتناول استئثار الأشجار دون سواها .

١٣٣٨ - زَرَاقَة الكَرْم Viticulture (F).

تخصيص في الزراعة يتناول الكرم .

١٣٣٩ - زَرَاقَة الكَم Trufficulture (F).

تخصيص في الزراعة يبحث في استنبات واستئثار الكم .

١٣٤٠ - زَرَاقَة المُسَدَّدَات Culture en espalier (F). Espalier-culture (E).

تخصيص في الأساليب الزراعية التشكيلية المتبعة في قيادة وتمعد الانجرار للثمة المرتكزة على المستلآت .

١٣٤١ - زَرَاقَة بَا كُورِيَّة Culture forcée (F).

كل زراعة تستعمل أوانها المألوف أن باليسية أو باليريقية .

١٣٤٢ - زَرَاقَة بَعْلِيَّة ، زَرَاقَة عَدِيَّة Dry farming

كل زراعة لا يتبعها راي بل تقوم على اسقاء المطر .

١٣٤٣ - زَرَاقَة حَدِيَّة Néo-culture (F).

كل زراعة ترتكز على الأساليب التقنية الحديثة .

١٣٤٤ - زَرَاقَة كَهْرَبِيَّة Electroculture

هي الزراعة القائمة على الاستدانة من الكهرباء في سبل الإنتاج الباكر وربما تحمين الإنتاج .

١٣٤٥ - زَرَاقَة لَاحِيَّة Culture intensive (F). Intensive cultivation (E).

زراعة تلتزم تهدف الى الحصول على أكبر إنتاج ممكن في بقعة معينة من الأرض .

١٣٤٦ - زَرَاقَة مِيكَانِيكِيَّة Culture mécanique (F). Mechanical cultivation (E).

هي الزراعة القائمة على استعمال الآليات .

١٣٤٧ - زَرَاقِيَّة Agricole, Agronomique (F).

صفة كل ما يتنسب الى الزراعة أو يتصل بها .

١٣٤٨ - زَرَاقَة * Girafa camelopardalis (S).

الزرافة حيوان لبون يجتر من ذوات الظلف وفصيلة الزرافيات الخالية من الجهاز القسوي || والزرافة سيدة الجنس والنوع جسمها حليم البير ، ارتفاعها الكامل من ظلفها حتى نقرة رأسها يقو ستة امتار وارتفاعها المألوف من الظلف الى الحمارك لا يقل عن ٢٢٥ سم . وهي قصيرة الرجلين طويلة الذين والعتق منحدرة الظهر ، لها قرنان عظميان منفلتان صغيران يتوسطهما تنوء بارز . فوجها الى الصفرة يطولها تقيع قوي متتابع التبيين لا تقياس الشكل والحجم . وقد قبل في وصفها لها رأس القرس وجسمه ، وعنق الجمل وراسلته ، أذنان الثور ، ذنب الحمار ، قوائم الهامة



زرافة



زَرَاقَة



زَرَاقُود

leuse, Noctuelle colorée (F). *Brotilomia metacilliosa* (E).

حشرة بجلة الألوان المتداخلة من فصيلة النسيات رتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الساحلية المتاخمة. فرشتها واضحة قوتها رقيق الاذياع. سرقتها غاشلة تركب الكثير من النباتات البرية والزراعية اغصانها الوردة والبنفسج || جسمها مستطيل الجرم بطول من ١٢ الى ١٥ سم. يسلطها قزاح من ٢٨ الى ٤٢ سم. رأسها مستطيل الخصر، كبير الخطر، حطلي اللون، اسمر الموضع. عينها كبيرتان، نافذتان. زباناها غطيان، مستطيلان. ملامسها صغيرة. مرشها مستطيل. بيضها حطلي اللون وعلتها ابيض || رواشها مزودة بويجعة وبغرضه الخنجر الحاربي || الاثني اكبر قدام من الاكبر واغلق بطناً منه || لها ثلاثة ابيال في الجمل. تظهر فراشة الجمل الاول في اذار وفراشة الجمل الثاني في حزيران وفراشة الجمل الثالث في الجمل. تسر من القزوح الى فحة الليل بين الفجر التام الى الشروق || تباشر الاثني مع الحنك بعد الكرم يبيون وتلقو لها سطيلة الشكل تعلقها مادة غروية لاصقة تنبت على الصفحات السفلى من نصال الارواق || السرعة عند بلوغها الاذراك بطول نحو ٤٠ سم. ثوبها يتأرجح بين الاخضر والاسمر يملو خط ثوبي زاهر متوسطه ليل سود وبيضا ابيض سلطان جانبيان قاطبان. رأسها الى الحطلي يملو مويج اخضر. منها ورواشها الى الحطلي الاسمر || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في القربة ضمن جراب من العطن.



زُرُونْد دَقِيقَة

١٧٣٨٦ - زُرُونْدِيَّج * ، شاي المكسيك

Chenopodium ambrosioides (S). *Chénopode fausse-ambrosie*, Ambrosia, Thé du Mexique, Thé de Sibitsa, Thé des feuilles (F). Mexican tea, Wormseed, Mexican goose-foot (E). Mexikanisches tee-kraut, Teagesselfuss (D). Ambrosia, Thé del Mexico (I).

نوع من الاثنية وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة السرمقيات. يطلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل، نصلها ازغب البشرة تنسج الصفحة المنددة. ازغاره صغيرة اللد تاجية الاذيتار || اوراقه عطرية صمية تستعمل لاصحاب الشاي.

١٧٣٨٧ - زُرُونْدِيَّج * *Sarment* (F). Vine-shoot (E). في السرح، قصب الكرم.

١٧٣٨٨ - زُرُونْد * هو حار الزرد، اطبخ.

١٧٣٨٩ - زُرُونْدَان *Vestibule* الجزء الداخلي من الفرج يمتدئ به حاجز الكبة ويتنهي عند عتق الرحم.

١٧٣٩٠ - زُرُونْدَا * هي فلك زده، اطبخ.

١٧٣٩١ - زُرُونْدِيَّج * *Zébré* (F). *Striped* (E). صُجْرَجْ نمت وسمي يبر عن الخطوط المعترسة الانشائية الطول والقرص التي تملو اوتاب الحيوان كما هو الحال في حمار الزرد.

١٧٣٩٢ - زُرُونْدُوْر ، زُرُونْدُوْر ، بلسان *Sturnus* (S). *Etourneau* (F). *Starling* (E).

جنس طير من فصيلة الزروريات. انواعه ستة منها

١٧٣٩٦ - زُرُونْدَانْدِيَّج مُتَبَانِي ، اُوسْتُولُوْجِيَّة مُتَبَانِيَّة ، لُوف عَطْرِي

Aristolochia serpentaria (S). *Aristolochie serpentinaire* (F). *Virginia snake-root* (E).

نوع من الزراند الطبي. ساقه متعصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة القاعدة، احليلجية اقزام الثاني والثالث، ستانية الاخير، ثنائية التقويس، صغيرة اللد. جلوده طيبة عطرية غنية بالزراندلين.

١٧٣٩٧ - زُرُونْدَانْدِيَّج اَلْمُخْضَرَّة ، سُرُونْدَان *Aristolochia sempervirens* (S). *Aristolochie toujours verte* (F).

نوع من الزراند ساقه مدادة قليلة التحريش تطلو نحو ١٥٠ سم. اوراقه عروية قليلة الشكل مستطيلة مدبة اقزام الاخير. نصلها مائل للبشرة، لامع الغضار الزاهي. ازغاره الى الصفرة المصقلة بالاحمر.

١٧٣٩٨ - زُرُونْدَانْدِيَّج سِيْفُو ، مَسْهُوْرَة

Aristolochia macrophylla (S). *Aristolochia siphon* (F). نوع من الزراند ساقه مدادة عارضة تطلو من ٥ الى ١٠ امتار. اوراقه قليلة الشكل يملوها بعض الازغب. ازغاره كبيرة مقوسة لونها الى الصفار الحطلي يملو تحطيط ابيض.

١٧٣٩٩ - زُرُونْدَانْدِيَّج صِيْنِي

Aristolochia moupinensis (S). *Aristolochie de Moupin*, A. de Chine (F).

نوع من الزراند هذه الصين. ساقه مدادة عارضة تطلو من ٥ الى ٨ امتار. اوراقه متعصبة النصل اعناقها مدبة الازغب. ازغاره صفر يملوها من الداخل تقيج احمر.

١٧٣٩٠ - زُرُونْدَانْدِيَّج مُهْدَب

Aristolochia fimbriata (S). *Aristolochie frangée* (F). نوع من الزراند ساقه متعصبة تملو نحو مترين. اوراقه مستديرة شبه مقطوعة. ازغاره مهدبة الخنجر صفحتها الخارجية قشعية اللون اما الداخلية لمخططة.

١٧٣٩١ - زُرُونْدَانْدِيَّج اَبِيْشِي

هو المبنابة الثنائية النصل. اطبخ.

١٧٣٩٢ - زُرُونْدَانْدِيَّج بَات *Aristolochiaceae* (S). *Aristolochiacées* (F).

فصيلة نباتات مدادة عارضة او متعصبة. اجنتها وانواعها كثيرة اللد مهدبة البلاد الحارة. اوراقها متعاقبة مستقيمة. ازغارها ابيلة الاذيتار، فردية التجميع، كبيرة اللد. ثمارها كابر سداسية اللدق. منها انواع طيبة حميدة النتج.

١٧٣٩٣ - زُرُونْدَانْدِيَّج اُوسْتُولُوْجِيْن

Aristolochine (F). *Aristolochin* (E). جهور جمالي فساد مر الطم يستخرج من جلود بعض انواع الزراند اغصانها:

Aristolochia serpentaria

Aristolochia clematidis

١٧٣٩٤ - زُرُونْدِيَّج * *Parage* (F). *Folding* (E). زُرُونْدِيَّج * قليلة اللد والملمز.

١٧٣٩٥ - زُرُونْدَانْدِيَّج دَقِيقَة * ، عَسْمِيَّة مُلُونَة

Brotilomia reticulosa (S). *Brotilomie réticu-*



زُرُونْدِيَّج

Bernage (F). ١٧٤٠٢ - زُرْزُكَة الرَّعَايَة
هو الزرور المكنن من خليط من البذار يستعمل كمكاف
اخضر .

Drogall ١٧٤٠٣ - زُرْزُكَة الْعَصْفَر
هو زرع الحبوب قبل المطر . والعصر أول سقاية يسقاها
الزرور من المطر .

Semences (F). Seeds (E). ١٧٤٠٤ - زُرْزُكَة
هو الحب للمد الزرع . راجع بذار . يقال اعطي زرة
ازرع بها ارضي || والزرة : فرخ القيقبة .

Glabé, Sol (F). ١٧٤٠٥ - زُرْزُكَة ، مَسَاوَكَة
Glebe, Sol (E). الارض التي تزرع .

Sole (F). Break, Field (E). ١٧٤٠٦ - زُرْزُكَة ، عَمْرَكَة
كل زراعة من الزراعات التي تتعاقب في ذات المكان .

Céréaline (F). Cerealin (E). ١٧٤٠٧ - زُرْزُكَة
هو عنصر الخبز الموجد في الخلقة ويقال له سبورين .

Fritolée, Bouques (F). ١٧٤٠٨ - زُرْزُكَة *
Leaf drop streak (E). ممان المهندس عادل ابو النصر ومرض يجهد اوراق البطاطاء

وبنهم من قال « مرض يجهد اوراق البطاطاء » || وهو
ضرب من سرج البطاطاء يولد الى يوروس لا يصيب القرنة
فيحور شكلها الطبيعي من الاستدارة الى الاستطالة
وين البقيع الى المردني بعد ان يزيد حتى غور المونيات .
اما النباتات المصابة فيجدو تحيلة الفروع المزدعة ،
صفرة الاوراق المنكشة المنحنية بالاخضر المانيق والبهات
والاصفر ثم يتجدد نصلها وتلتوي اطرافه وصله نحو
الارض || اضراره متفاوتة التندير لانها تعيد الى طاعة
اليوروس وعلى انتشاره || يكالغ بالانتخاب البذار
السليم وباختيار الاربة الفقيرة لان فقر التربة مع شدة
الحرارة تشتتاه كثيرا .

Scorita ١٧٤٠٩ - زُرْزُكَة *
حلقة من حلقات بطن الحشرة الذي يتركب من عدة
زرايين .

١٧٤١٠ - زُرْزُكَة * ، زُرْزُكَة الشَّرَق
Elanus melanopterus (S). Elanion mélanoptère (F).
Black-winged kite (E).

طائر من الزوايد ينتمي الى عمارة الحدا وفصيلة
الصقريات . موطن الشرق الاوسط وافريقية ، يكثر في
مصر وسورية . رأسه وسنقه سود . ظهره وذنبه الى
الرمادي الازرق . بطنه ابيض . منوره اسود . عيانه
قزوينان . غذائه الى الصغار اليرقاني || يلدن عشه
في الاجار الرقيقة . قوته القواصم والجراد ويخلف
الحشرات .

Colombine (F). ١٧٤١١ - زُرْزُكَة الْحَمَام
Columbine (E).

سماد عشوي في بالازوت ويسائر العناصر الغذائية .
يعتبر من الاسمدة الجارية .

١٧٤١٢ - زُرْزُكَة الطَّيْرِ هو البيتية ، الحلبا .

١٧٤١٣ - زُرْزُكَة هي الزبور الصغير ، الحلبا .

القوقاع والارابه . تعيش جماعات . قوتها الحشرات
ويبيض البذار . تتميز بريشها الاسود اللامع المرط ،
بامتلاحة اجنتها ويقصر اخذائها || عثن في الاجمار .
انثاها تحضن بعدها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في
السنة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٧٣٩٣ - زُرْزُور أَرْجَوَانِي
Sturnus purpurascens (S). Ectourneau pourpre (F).
طائر من الزرور موطن ايران والافغان ، ريشه ارجواني
متنشر بالابيض . طوله نحو ٢٠ سم . سره قليل العدد .
يألف الخنازير والقماس ويجاري الماء .

١٧٣٩٤ - زُرْزُور أَسْوَد
Sturnus unicolor (S). Ectourneau unicolore (F). Spotted starling (E).
طائر من الزرور طوله نحو ٢٠ سم . قويه سوي اللون
الاسود اللامع . يعيش اسراب كبيرة العدد يجوب البلاد
من الهند الى جنوب اروبه .

١٧٣٩٥ - زُرْزُور الْبَادِيَة ، سَوَادِيَّة
Onychognatus (S). Onychognata, Ectourneau noir (F). Grackle (E).

طائر من الزرايزر يألف البادية يكثر في شبه جزيرة
سينا فوه الى السواد اللامع يملو مراح لوزق . قوامه
حر منقاره اسود . يألف الادغال واجمار البست .

١٧٣٩٦ - زُرْزُور الْهَشْد *
Sturnus splendens (S). Ectourneau splendide (F). Splendiferous starling (E).
طائر من الزرور قويه متراكب الالوان الزاهية الجميلة
المرطبة فيها الاسود والاخر والجزوي والاصفر والابيض
والخضلي . طوله نحو ٢٢ سم . يألف المراهي ويجاري الماء .

١٧٣٩٧ - زُرْزُور مَالُوف *
Sturnus vulgaris (S). Ectourneau vulgaire, E. commun, Saisonnet (F). Common starling (E). Star (D).

طائر من الزرايزر القوقاع يجوب الشرق الاوسط واروبه
وافريقية الشمالية . طوله نحو ٢٢ سم . قويه الى السواد
اللامع يملو مراح ازرق واخضر ورقشة يبيضه يخلت
سجم فشتها بين الظهر والصدر والبطن . منقاره سختي .
عيانه كستينان || قوته الحشرات والديدان والحلزونات
والحرب والآخر العنينة .

١٧٣٩٨ - زُرْزُورِيَّات
Sturnidae (S). Sturnidae (F). Sturnidae (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم اجنتهاها وانواعها عديدة .
اجنتهاها ريشة متوسطة القد . اجنتهاها مستطيلة .
اخذائها قصيرة . اسرارها قوية . منقارها مخروطية الشكل
مدقة الطرف . اقواها عديدة الالوان المختلفة || اشهر
اجنتها الزرور والسمسر واللينات والبنفاف .

١٧٣٩٩ - زُرْزُكَة هو البرابرس ، الحلبا .

١٧٤٠٠ - زُرْزُكَة
Emblaver (F). To sow with wheat etc. (E).
حرث الارض وسدعا ويغروا .

١٧٤٠١ - زُرْزُكَة ، زُرْزُكَة
Céréales (F). Cereal, Corn crops, Grain (E).

كلمة شاملة تطلق على النباتات الزراعية الموسمية من
فصيلة التجيليات التي تزرع لاستخراج حبوبها الغذائية
الغذائية .



زرزور الهند



زرزور مالوف



زرن



زور

١٢٤١٤ - زُرْف *
Pariseus (S).

Mésangeal (F). Siberian Jay (E).

جنس طير من فصيلة الزرقائيات ورقية الجوانم سنيات الخاتير. له نوعان واحد أسودى والآخر كندي. يألف الاقلام الباردة والقيات وأسراج الصنوبر انحصار صنوبر سمير || جسمه معتدل القد طوله نحو ٣٠ سم. قوته الى القفص الصنوبرية بامتلاكه الرأس قذبة اسود. عقاده غروفي الشكل ، شديد الصلابة ، جناحه معتدل الطول. ذئبه وتاجي الرقاع مستدير الطوف. حلقة حية ذئبية اللون. رسفاه الى السمة المظلمة || قوته الحشرات والبذر ويعجن بلور صنوبر سمير في تجاويف الاشجار لتفتر كزخمية لفصل الشتاء || يائن حشه في الاشجار القريبة من سطح التربة. الاثني تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها وسطها نحو ١٧ بيضا بينا الذكر يئين لما للفناء.

السف. رؤوسها غروفيّة ، كبيرة الاشداق ، كثيرة الاسنان للفكية والحنكية .

١٢٤١٨ - زُرْفُون

Zircon حجر بلوري مركب من سيليكات الزرقيوم. ثقته النقي براوح من ٥٠ الى ١٧٠ صلايته نحو ٧,٥ لونه حاد المستقر براوح من الاصفر البرتقالي الى الاحمر، لمعاته بلوري المراج. هو شائع الاستعمال في الصياغة يستعمل من الاحجار الكريمة البالية الى المرية الزاينة او الخاسة .

١٢٤١٩ - زُرْفُونِيوم

Zirconium معدن دياي الاثوم مركزة بين الااليوم والسيلايوم. رمزه (Zr) وزنه الاثمي ٨٩,٦٠ .

١٢٤٢٠ - زُرْفِيَاكِيَّة

Murina (F). Moray (E). هي الشقي ، من الاسماك البحرية المفترسة ، اطبا .

١٢٤٢١ - زُرْفَب

هو القلقوس ، اطبا .

١٢٤٢٢ - زُرْفَكَة

Penil (F). Penile, Penial (E). الجزء الخلارجي العلوي من القفرج .

١٢٤٢٣ - زُرْفَكَاة ، زُرْفَكَة

Zingiber zerumbet, Anomum zerumbet (S). Zerumbet, Anomum sauge (F). Wild ginger, Broad leaved ginger (E). Zerumbet, Wilder ingwer (D). Zenzaro blanco, Z. salvatico (I).

نبات بري جلموري طيب من فصيلة الزنجبيلات منته البلاد الحارة. مسفه يطر الهم وزيل روائح الخمر والصلب وماشيه. وهو منه معوي يغلى الرياح ويقيرو القلب. سافه منتصبه حولية تملر من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، تفصلها سناني الشكل جامد الصفعة . ازهارها هامة كبيرة القند ، كبريتية اللون .

١٢٤٢٤ - زُرْفَكُولَة ، زَهَر التلج

Chionanthus (S). Chionanthe, Arbre de neige, A. à franges (F). Fringe tree, Snow-drop (E). Schneeflockenbaum (D). Chionanto, Fior di neve (I).

جنس اشجار وشجيرات ونباتات برية وزينة من فصيلة البزيتونيات . جلدوها اسطوانية غروفيها ولتفادع وسطية . اوراقها عابلة متعاقبة بسيطة للتصل الجلد . ازهارها متكونية التنجبع ، ثلاثية التركيب ، بيضاء اللون || اشهر انواعها الزينية مايل .

١٢٤٢٥ - زُرْفَكُولَة الشَّرْقِيَّة ، زُرْفَكُولَة صِينِيَّة

Chionanthus retusa (S). Chionanthe de Chine (F). شجرة سبروتية تملر من ٥ الى ٨ اثمار . اوراقها املجية مضطحة القاعسة ، مدببة القصة. تفصلها بطول من ٤ الى ٧ سم. ويبرس من ٣ الى ٤ . عروقه باردة خالية البشرة . شكلها الزمري منتصب الاوتكاز ، ازهارها عطرية العرف صبرية القند تطل نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٤٢٦ - زُرْفَكُولَة فِيرْجِينِيَّة

Chionanthus virginica (S). Chionanthe de Virginie (F). شجرة سبروتية تملر من ٣ الى ١٠ اثمار . اوراقها سنانية للتصل الجملة تطل من ٨ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. || شكلها الزمري مثالي الاوتكاز .



زُرْف



زُرْفَة مِبلَوَة



زُرْبَاد



زُرْبُوك الشَّرْق

١٢٤١٥ - زُرْفُوم ، جَرَبُوتُ البَحْرِ

Conger (S). Congra (F). Conger (E).

جنس اسماك بحرية يبرضة من مفتوحات المئات عامات الاصيل وفصيلة الزرقونيات . انواعها المعروفة اربعة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها مسطيلة ، حرياطة ، عادمة السنف . طول من متوين الى اربعة امتار . اقلها تختلف مع الانواع ، رؤوسها شبه غروفيّة . اوقها كبيرة الاشداق . شاربقة القفص العليا . اسنانها فكية وحكنية ، جميعها ذرية . مناسها انابيب صغرية تحمل مقدم الحظ . حينها كبيرة مستديرة معتدلة التفوز . زمامها الظهري فردية مسطلة ، قليلة الرمس تمتد من اواخر الزام الاصل الى طرف اللؤل . تقاطعها الترجية التي تمتد ايضا من اواخر الزام الثاني الى طرف اللؤل . زمامها الخوضية والذيلية منعدلة || اشهر انواعها الزرقونية المبلولة .

١٢٤١٦ - زُرْفُومَة مَبْدُولَة ، جَرَبُوتُ البَحْرِ المَبْدُول ، ثُون بَحْرِي ، حَرْمُوط

Conger conger, Conger vulgaris (S). Congra commun, Anguille de mer (F). Conger-eel (E).

نوع من الزرقوم . سمكة بحرية مفترسة يبرض . اجسامها فسيحة تقبل سطح اضلاع شماد المناطق الحارة والمعتدلة الحارة . لتفصل مربع المسفود حيث تكثر الاسماك الصغيرة ولا تمتد من ابلج ابنا كانت إن حل الشطوط المرية أو بين المسفود || جسمها مستطيل الشكل ، بطول من ٣ الى ٤ اثمار . تقارها عادم السنف ، غروي السطح المائس || فوجها الى الزبدة الزرقا يبق منه الظفر ويظهر من البطن || تحلبها الجسدوية لا تختلف من تحلبة الجلس اي الزرقوم || تسرح غالبا في الليل . صيدها يستلزم عدة خاصة اسحبها شص مثلت الحراب وضبط متين لا يفل في الاحتكاك بالصفور || لها متوسف الصفنت ماكوك .

١٢٤١٧ - زُرْفُومَات

Congridae (S). Congridés (F). Congridae (E).

فصيلة اسماك بحرية مفترسة يبرضة من مفتوحات المئات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من احافير الخلقية الباسيدية من الاباح الثاني . اما الماصر منها فتقليل البعد يمتد الى جنس واحد يعني زرقوم || اسماها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اجسامها مسطيلة ، عادمة

١٧٤٣٦ - زُوَيْجَة * ، اُرُوَا كَوَكِي

Agrostis verticillata (S). *Agrostide verticillée* (F). Switch grass (E). *Haargras* (D). *Pennacchlin* (I).

نبات حشوي بري سولي من النجيليات يطول من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه سائبة ضيقة التجميع. يكثر في الأريّة المتوسطة الاندماج والرطوبة ، ترعاء الماشية ورستجه .

١٧٤٣٧ - زُوَيْجَة * ، زَعْفَرَان الجَيْلَس ، زَهْرَان

Bulbocodium vernum (S). **المرج**
Bulbocode printanier, *Campanetta* (F). *Meadow saffron* (E). *Lichtblume* (D). *Colchico di Spagna*, *Croco rosso* (I).

نبات يصل بري من فصيلة السورتيانيات يكثر في البلاد الجبلية والبرج الرطبة. شكله بين السورتيان والزعفران. يصله سمراء اللون. أوراقه ثلاثية العدد ضيقة التصل المستطيل المحين. شراخه قرمي الانتشاب يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. زهرته وردية أو بنفسجية اللون، كمية التفتل من أزهاره من نسيان الى حزينان يقال ان أزهاره صباغتها وصيقتها الجبال لا تخلو من الفوائد الطبية غير المقررة .

١٧٤٣٨ - زُوَيْجَة

Emblavure (F). **Land sown with wheat etc.** (E).

هو الحقل وكل مزروع سمه وكرب وبلر وأثير .

١٧٤٣٩ - زُوَيْجَة

هي رباح الفايين ، اطلبه .

١٧٤٤٠ - زُوَيْجَة

هي الدخلة السوفلية طائر من الدسل .

١٧٤٤١ - زُوَيْجَة ، شَلْبَة هَرِيَّيَة ، أم ذَنْقِس

Eutropius niloticus (S).

سمكة نهرية مأكولة من فصيلة السلوبيات يكثر وجودها في النيل والنجرب .

١٧٤٤٢ - زُوَيْجَة * ، زُوَيْجَة

Zosterops (S). **Zosterops** (F). *Zosterops* (E).

طائر من فصيلة الزطروبيات . موطنه بعض الاقاليم الحارة من الشرق الاوسط وأفريقية الشرقية والشمالية || جسمه صغير القد اعين القوام بطول نحو ١٢ سم. لونه الى الخضار الزيتي . رأسه وبنجاحه وذنبه الى الخضار اللامع . عيناه مبطنتان بالابيض . شفة عينه الى الخضار الزيتي . ذقنه بريق ونحيل . ريشه ابيضان اسمران || قوته الحشرات الصغيرة والفرش والذباب والحمام || يذئن في الاجمار الزميمة . الاث تنع من ٢ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

١٧٤٤٣ - زُوَيْجَة

Zosteropidae (S). **Zosteropidae** (F). *Zosteropidae* (E).

فصيلة طير من الجوارم ريقات المتناير . اجناسها وأزواجها المعروفة نحو ٨٠ موطنها معظم المناطق الحارة من العالم القديم . تألف الثنايات والاسراج والحدائق وتقترب من المساكن الريفية || اجسامها صغيرة القد ، ريشة القوام . أثوابها متباينة التفتيش يكثر فيها الاخضر || قوتها الحشرات الصغيرة والفرش والذباب والحمام وبعض البذور البرية .

١٧٤٤٤ - زُوَيْجَة ، زُوَيْجَة

Alto-estracus **هو للقيم الابيض الرقيق الحليف البعيد .**

أزهاره عطرية البرق تملح من ٢ الى ٣ سم. || ازهارها يستمر من حزين الى حوز .

١٧٤٣٧ - زُرُوف

Ruisseau (F). *Rivuleux* (E).

هو الجبل الثاني الذي يسبب في الجهر . ج زرايف .

١٧٤٣٨ - زُرُوف

Arsonic

عنصر شبه معدني متجانس اللون عديم الرائحة والطعم يوجد في الطبيعة متزجاً بغيره من العناصر بكميات غشيلة متفرقة القدر كما انه يوجد في ماء البحر وفي جسم الانسان || وزنه (As) وزنه الذري ٧٤.٩١ . ثقله النوعي اذا كان متلوها ٧.٥ وان كان لا متلوها ٧.٥ || يستمد باستخلاصه من مركباته الطبيعية وهو مع مركباته الصناعية من العناصر السامة الفتالة . مركباته الصناعية عديدة تستخدم في شتى الحقل اخصها مخاربة وبادة الحشرات الزراعية كما انها تستعمل في الطب لتقوية البلية وفي علاج بعض الامراض الجلدية .

١٧٤٣٩ - زُرُوف

Réalgar (F). *Realgar* (E).

هو كبريتور الزرنيخ الطبيعي .

١٧٤٣٠ - زُرُوف

Arsoniates (F). *Arsoniates* (E).

مركبات صناعية ترتكز على الزرنيخ تستعمل في مكافحة الحشرات النباتية . اهمها استمالا :

Arsoniate de plomb (F). **Lead arsoniate** (E).

Arsoniate de cuivre (F). **Copper arsoniate** (E).

Arsoniate de soude (F). **Salt-wort arsoniate** (E).

١٧٤٣١ - زُرُوف ، زَهْر العَرِيْر

Crossandra (S). *Crossandre* (F). *Crossander tree* (E). *Franzenbeutel* (D). *Crossandra* (I).

جس جنات زربينة مسرة من فصيلة الاثنيات . انواعه خمسة منها الهند وأفريقية الشرقية . أوراقها اهليجية متعاقبة . ازهارها نوري التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها عطرية مستندة لثباتات القفاصة الجبلية الشكل . ألوانها تختلف مع انواعها منها الابيض والاسفر والاحمر والمخض .

١٧٤٣٢ - زُرُوف

Garrulus (S). *Geal* (F). *Jay* (E).

جس طير من فصيلة الغرايات وربة الجوارم . انواعه ١٢ جميعها بقدر الهامة . رؤوسها كبيرة ، متنايرها جالسة قوية . أثوابها ملونة جميلة الزاويق || وهو يقبض الاصوات كالبيده . قوته جميع انواع الحشرات الكبيرة والقار والظاء والصابير الصغيرة والبلوط والحبوب والفاير || اشهر انواعه ابو ذريق والقيق .

١٧٤٣٣ - زُرُوف

Enclos (F). *Enclosure*, *Paddock* (E).

هي الحظيرة من خشب تحجز فيها المواشي .

١٧٤٣٤ - زُرُوف

Porcherie (F). **في الخزانة ملوى الخنازير .**

١٧٤٣٥ - زُرُوف

هي الحريفة ، اطلها .



زُرُوف



زُرُوف



زُرُوف



زُرُوف



زُرُوف

اوراقه مدينة القاذبة ، تصلها عادم التخصيص أو قليله
اخضر اللون على صفحته ، أنزب الصفحة السفلى .
نورته الزهرية كثيفة تعد من ١٥ الى ٢٠ زهرة ، زياه
الجسم ، عشريئة الاسدية . ثماره حواء اللون ، صغيرة
لقد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م .

١٧٤٥٤ - زُحُرور أَزْبَعِي

Crataegus tomentosa (S). *Aubépine tomenteuse*, *Epine tomentosa* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٥ الى ٦ أمتار . شوكة
معتدل اللد قليل الكثافة شديد الصلابة . اوراقه بيضية
معيقة الشكل ، زياه انصل على صفحته . نورته تعد من
٢ الى ٧ اثمار . زهرته عشريئة الاسدية الحراء اللون .
ثماره بيضية أو اجاسية الشكل ، برقالية اللون .

١٧٤٥٥ - زُحُرور أُسُود ، بُونْت

Crataegus nigra (S). *Aubépine noire*, *Epine noire* (F).

نوع من الزحورور يملو نحو ٣ أمتار . اوراقه مديقة
التخصيص . تصلها خلي البشرة على صفحته . نورته
متوسطة اللد تعد من ٥ الى ١٢ زهرة . زهرته مدينة
الاسدية ، خاسية الملقات والبريقات . ثماره كروية
الشكل ، لونها ال اسود ، قطرها نحو ٢ م .



زجيرة

١٧٤٥٦ - زُحُرور أَصْفَر

Crataegus flava (S). *Aubépine jaune*, *Epine jaune* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٢ الى ٧ أمتار . اوراقه
مدينة القاذبة ، تصلها عادم التخصيص أو قليله ،
لونه ال الحصار البحري تملو لحد مستقلة حراء اللون ،
نورته تعد من ٢ الى ٥ اثمار . زهرته كبيرة اللد عشريئة
الاسدية الورديئة اللون . ثماره صفراء اللون ، برقالية المراج ،
قطرها يراوح بين ١٢ و ٢٠ م .

١٧٤٥٧ - زُحُرور الْأُودِيَّة ، زُحُرور أَحَادِي

Crataegus monogyna (S). *Aubépine monogyna*, *Noble épine* (F). *Hawthorn* (E). *Spitsdorn* (D). *Bianco spino* (I).

نوع من الزحورور ، هري الشكل ، رطب في الاديبة .
يملو من ٤ الى ٥ أمتار . اوراقه بالقة التخصيص .
تصلها مسن الحافة أنزب الفلج والبرق على الصفحة
السفلى . نورته تعد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته احادية
الملقة والبريقية . ثماره فردية العجبة ، مخططة الاوران ،
قيا ال اسفر والبرق والاحمر جميعها صغيرة اللد قطرها
نحو ٥ م .

١٧٤٥٨ - زُحُرور أَفْرِيكِيَّة

هو الاعراس الافريقي ، املبه .

١٧٤٥٩ - زُحُرور جِرْمَانِي

هو الملسة ، املبه .

١٧٤٦٠ - زُحُرور عَوْصِي الْوَرَق

Crataegus prunifolia (S). *Aubépine à feuilles de prunier*, *Epine à feuilles de prunier* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٣ الى حرة اثمار شوكة
قصير اللد . اوراقه غنيئة الشكل تصلها خلي السلع
والبرق على صفحته السفلى . نورته تعد نحو ١٢ زهرة .
زهرته خلية الجسم ، عشريئة الاسدية . ثماره صفية اللد
بيضية الشكل حراء اللون ناشفة البيق .

١٧٤٦١ - زُحُرور سِيْنَا ، زُحُرور مَوْسِي

منهم من قال حليق ميس . يعرف بشوك النار ، املبه .



زحورور الاديبة

١٧٤٤٥ - زُحُبَل *Cotonier* (F). *Cotton-tree* (E).
هو جنة القطن في زن حلها .

١٧٤٤٦ - زُحُبَلَة *Seau* (F). *Pail*, *Bucket* (E).
دلو يمتلئ بها .

١٧٤٤٧ - زُحُبُوب *Microrrhiza* (F).
نمت ترعيفي ، يملك على كل نبات صغير الجذور دقيقها .

١٧٤٤٨ - زُحُبُوبَة * *Nepticula* (S). *Nepticula* (F). *Nepticula* (E).

حشرة من فصيلة الزيرليات ودية حرشيات الاجنحة .
اصطفاها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراج
التي تكثر فيها السويلات || جسمها صغير اللد ، كيف
الخمل . بطنها نحو ٧ م . رأسها معتدل الحجم . خطها
صغير . ملساها قصيران . عيناها صيرتان ، بارزتان .
زبانها عيطيان . جناحهاا الخلفيان مستعرضا الاهداب .
ظنايب قانجهاا الخلفيين رباعية المناس الحادة . ثوبا
الى البني . اجنحتهاا جملة بالافير || الاثنى امين قدام من
الذكر واجت ثوباا منه || السرعة لاهة ، تمسح على وزن
التصال . تركيب جميع نباتات الفصيلة السولية .

١٧٤٤٩ - زُحُبُوبِيَّات * *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (S). *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (F). *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المحررة نحو ٢٢٠ منشرة في جميع اقطار العالم ||
اجناسها صغيرة ، كيفية الخمل . رؤوسها معتدلة الحجم .
اعطاشها وملابسها قصيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرنيها
الاستشعارية عيطية ، مسطيلة . اجنحتهاا عبيقة ،
مسطيلة . اهداب اجنحتهاا الخلفية ودية . ظنايب قوائمها
الخلفية رباعية المناس . بطنها مستعص . الواجاا جنيبة
الالوان || اساريها لاهة . اكمال عاداتهاا يتم على
نصال الاوراق الملتوية ضمن فهاج متحدة الخمل ||
اشهر اجناسها الزيربية .

١٧٤٥٠ - زُحُفَر هو ستر البر ، املبه .

١٧٤٥١ - زُحُرور *Crataegus* (S). *Aubépine*, *Epine* (F). *Hawthorn*, *White thorn*, *May* (E).

جنس الشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الوردييات
انواعه مدينة بطنها كثير اللونين في جبال حريش البسر
المختص . تتميز بشوكها وصلابة اعشاشها . اوراقها
جمادة التصل . انزاعها نورية التجميع صغيرة اللد .
ثمارها عنية الشكل مخففة الاوران قل منها المأكول .
اعرف وأشهر انواعها ما يتبع .

١٧٤٥٢ - زُحُرور أَحْمَر *Crataegus sanguinea* (S). *Aubépine rouge sang*, *Epine rouge sang* (F).

نوع من الزحورور يربق في الاقاليم الباردة يملو من
٣ الى ٧ أمتار . الشواكة قليلة . فروعها حراء اللد .
اوراقه بيضية مقعصة . نورته قليلة الزهر . زهرته
عشارية الاسدية . ثماره صغيرة اللد قطرها نحو ١١ م .
لونها الى الحرة النورية .

١٧٤٥٣ - زُحُرور أَخْضَر *Crataegus viridis* (S). *Aubépine verte*, *Epine verte* (F).

نوع من الزحورور يملو من مترين الى حرة اثمار .

١٢٤٦٨ - زُغُرُور شَالِك * شَوْكَة حَادَة

Plastron

الحاف الجزء الامامي من كؤل الحشرة وحاف الجزء السفلي من السلخانة .

١٢٤٦٩ - زُغُرُور شَالِك ، جَدَاي ، جَسَاد ،

جِيَهْمَان ، دَكْهَمَان ، رَادَن ،

رَبَهَمَان ، صَفَرَان ، كُوكِيَا ، زَبِيل

Crocus (S). Safran, Crocus (F). Saffron, Crocus (E).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . انواعه وضروبه واهاله عديدة منها البرية والزراعية معظمها صباغي وبعضها طبي || شجارتها قصيرة القد . ازهارها مستطيلة انابيبا دقيقة الجسم بقية الطرف . اوراقها ضيقة النصل الخدد || اعرف انواعه واشهرها ما يليق .

١٢٤٧٠ - زُغُرُورَان اَبْيَض

Crocus candidus (S). Safran blanc, Crocus blanc (F). White saffron (E).

نوع من الزعفران شراعه يملو من ٨ الى ١٠ سم . زهرته يضاء البتلات ، صفراء المتق الدامل . ساحتها كاملة مهدبة ، شرعافها عادي || اوراقها غبيطة مستطيلة ، ماسة النصل . ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٢٤٧١ - زُغُرُورَان الجَمَل ، زُغُرُورَان المَرْج

هو الزريرة نبات يصل من السورجانيات . اطبله .

١٢٤٧٢ - زُغُرُورَان الرَبِيع

Crocus vernus (S). Safran printanier, Crocus printanier (F).

نوع من الزعفران ، ضروبه كثيرة المدد . شراعه يملو من ٦ الى ٢٠ سم . زهرته بنفسجية اللون خلية المتق صفراء الانبوب . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي || اوراقها مستعرجة ، عرض نصلها يراوح بين ٥ و ٨ سم . ازهاره يستمر من شباط الى اذار .

١٢٤٧٣ - زُغُرُورَان ثَلَاثِي الزَهَر

Crocus biflorus (S). Safran biflore, Crocus biflore (F).

نوع من الزعفران ضروبه كثيرة القدد والالوان . شراعه يملو من ٨ الى ١٦ سم . زهرته صفراء الصلحة الخارجية يضاء او زرقاء الداخلة . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي || اوراقها ضيقة النصل المتق المائل البتلة || ازهاره يستمر من كانون الى شباط .

١٢٤٧٤ - زُغُرُورَان دَهَبِي

Crocus chrysanthus (S). Safran jaune d'or, Crocus jaune d'or (F).

نوع من الزعفران مهدب الشرق الاوسط والبلقان ، شراعه يملو من ٥ الى ٨ سم . زهرته ذهبية اللون ، بتلاته المتق ، صفراء الانبوب . ساحتها جزئية مهدبة . شرعافها عادي . اوراقها غبيطة ، مستطيلة النصل ، غشنة المتق || ازهاره يستمر طوال شهر اذار .

١٢٤٧٥ - زُغُرُورَان سُورِي

Crocus syriacus (S). Safran de Syrie, Crocus de Syrie (F).

نوع من الزعفران يكثر يربوه في البلاد السورية . شراعه يملو من ٨ الى ١٢ سم . زهرته صفراء اللون يملوها تزييح عايق . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي . اوراقها ضيقة مستطيلة الطول || ازهاره يستمر من كانون الى اذار .

١٢٤٧٦ - زُغُرُور شَالِك * شَوْكَة حَادَة

Crataegus oxyacantha (S). Aubépine commune, Epine blanche, Senelle (F). White thorn, May-bush, Quick (E). Gmeliner dorn, Hagedorn (D). Marruca blanca, Blancospino, Ceresella (I).

نوع من الزرور يملو من ٣ الى ٥ أمتار . شوكه معتدل القدد ، كثيف التجميع . اوراقه مقصصة . نصلها سنن الحافة خلى الصلحة السفلى . ثورته تمد من ٧ الى ١٢ ذرة . زهرته ثنائية اللقطة والثرينة . ثماره ثنائية الصلحة ، مختلفة الالوان لها الاسفر والاخر . جبهها متوسطة القدد ، قطرها نحو ١٥ مم .

١٢٤٧٧ - زُغُرُور شَرْكِي

Crataegus orientalis (S). Aubépine d'Orient, Epine d'Orient (F). Eastern thorn (E). Weissdorn (D). Lazzaruolo d'Orient (I).

نوع من الزرور يملو من ٥ الى ٩ أمتار . اوراقه قليلة التجميع ، نصلها كاند اللون خلى البتلة حل صفحتي . ثورته كثيفة التجميع تمد من ٧ الى ١٥ ذرة . زهرته رباعية او خالصة اللقطة والثرينات . ثماره صغيرة القدد جميعها حجم الكرز العادي .

١٢٤٧٨ - زُغُرُور صِبْغَة الدَيْك

Crataegus crus-galli (S). Aubépine ergot de coq, Epine ergot de coq (F).

نوع من الزرور يملو من ٣ الى ١٠ أمتار . شوكه مستطيل نعيم . اوراقه اعليجية الشكل ، صفة الحافة ، حادة التجميع او قلابية . نصلها لامع البتلة حل صفحتي العليا . ثورته الزهرية تمد من ١٥ الى ٢٠ ذرة . زهرته عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحمرة ، صغيرة القدد ، ناعمة السوط .

١٢٤٧٩ - زُغُرُور عَادِي * نَلَك

Crataegus azarolus (S). Aubépine azaroller, Azaroller, Argéroller (F). Azarole tree, Neapolitan medlar (E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azarolo, Azaruolo (I).

نوع من الزرور يملو من ٣ الى ١٢ م . شوكه قليل الكثافة معتدل القدد . اوراقه قليلة التجميع نصلها لامع الصلحة العليا ، خلى السفلى . ثورته تمد من ٥ الى ٧ اثمار . زهرته ثنائية او ثلاثية اللقطة والثرينات . ثماره لليلة العلم ، كبيرة القدد ، قطرها نحو ٢ سم .

١٢٤٨٠ - زُغُرُور قَرْمِزِي

Crataegus coccinea (S). Aubépine écarlate, Epine écarlate (F).

نوع من الزرور يملو من ٢ الى ٧ أمتار . اوراقه قلبية او مغنولية القامة . نصلها دائم التجميع لونه الى الخضار الباهت ، ثورته الزهرية متوسطة الكثافة . زهرته خلية الجسم ، عشارية الاسدية . ثماره قمرزية اللون قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ مم .

١٢٤٨١ - زُغُرُور قَلْبِيِي الْوَرَق

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزرور يملو من ٥ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القدد تمد من ٣ الى ٥ اثمار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القدد ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .



زرور شالك



زرور عادي



زعفران طويل الزهرة

١٢٤٨١ - زُفْطَان *
Hesperophanes (S).

Hesperophanes (F).
جنس حشرات غاشية من فصيلة القرنيقيات. أنواعه عديدة، جميعها متصلة الله، مستطيلة الشكل، طولها ١٢-٢٠ م. أجسامها زاهية، قرنها الإشتدائي مستطيلة منقطة. ألوان ألوانها ترلوح بين الخسلي والبي. تسرح من الفروب الى القصر || يرقاها تركب وتنشر جميع أنواع الخشب اليابس بما فيها الاششاب المشغولة الخالية.

١٢٤٨٢ - زُفْطَان لُزْمَك *
Hesperophanes cinereus (S). Hesperophanes

cinereus (F). Hesperophanes cinereus (E).
حشرة غاشية غاشية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف ارجل الستديان ولهايات الحور والمساكن الارضية، غناصها غاشية تمشي على اوراق النبات. يرقاها غاشية تركب الستديان والحور والاششاب الخالية المشغولة || جسمها متوسط الله بطول من ١٦ الى ٢٢ م. ثوبا الى الشقة السمرار يطولها مروج اربك يمد الى الحمل الكثيف الاطمل المين. رأسها مستطيل الجرم. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلان مهدبان. ظهرها خفيف القاطب، كثيفات الحمل. ارسافها رباعية المثلث الظاهرة || الاثنى اكبر قدما من الذكر واكد ثوبا منه واتصر زبانا || جيلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب. تسرح من الفروب الى القصر || القبة بطيئة التنشئ تترك الكلال الجسموري بعد التلق بنس ٣٢ شهرا. جسمها شبه مردني الشكل بطول نحو ٣٢ م. ثوبا الى الخسلي الاصفر المواج. رأسها يمر || طول الاكلام الذي يستوجب نحو ٤٠ يوما يتفقي ضمن صلجة مركبة من مواد نباتية مجبونة بالريال.



زعفران لُزْمَك



زعفران غزني



زفطان



زفطان اربك



زفطان التي

١٢٤٧٦ - زُفْطَرَان طَوِيل الزَهْرَة *
Crocus longiflorus (S). Safran à longue fleur, Crocus

à longue fleur (F).
نوع من الزفطران مهده جزر البحر المتوسط. شراعه يملو من ١٠ الى ٢٥ سم. زهرته صفراء الانبوب. يرتقالية الملق، ليلكية البلات، يملوها ترويح بنفسجي. اسديتها صفر. سماتها مقطوعة، يرتقالية اللون. شرعائها شجيلة || اوراقه ضيقة التصل للمثلث الاول، المثلث البشرة || ازهاره يسمر من تشرين الاول الى الثاني.

١٢٤٧٧ - زُفْطَرَان عُرْيَان الزَهْر *
Crocus nudiflorus (S). Safran à fleurs nues, Crocus

à fleurs nues (F).
نوع من الزفطران شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات، سماتها منقسمة، قدية الشكل يرتقالية اللون. شرعائها اري || اوراقه ضيقة مستطيلة. يملو يمل بعد ذبول الارض ثوبا وكونية مستطيلة || ازهاره يسمر من ايلول الى تشرين الثاني.

١٢٤٧٨ - زُفْطَرَان لُيْثَانِي *
Crocus zonatus (S). Safran zoné, S. du Liban, Crocus zoné (F).

نوع من الزفطران مهده جبال لبنان شراعه يملو من ٦ الى ١٠ سم. زهرته ليلكية اللون يتلاتها مقطوعة، صفها خلي البشرة، حايق الصفار. انبوبها خسلي اللون. سماتها كاملة صقية الشكل. شرعائها حادي || اوراقه خيطية غشية مستطيلة || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٢٤٧٩ - زُفْطَرَان مَخْرُوجِي *
Crocus officinalis, C. sativus (S). Safran officinal, S.

autumnis, C. cultivé, Crocus officinal (F). Safran, Crocus (E). Echter safran (D). Zafferano, Croco fiorito, Croco domestico (I).
اعرف انواع الزفطران واسمها منذ اقدم المهد || خروبها كثيرة المهد. شراعه يملو من ١٠ الى ٣٠ سم. زهرته بنفسجية البلات، ليلكية الملق، صفراء الانبوب. اسديتها بيض. سماتها حطرية الراتحة مستطيلة. شرعائها ثنائي القلقة || اوراقه خيطية ضمية. ازهاره يسمر من ايلول الى تشرين الثاني || يستخرج من زهره وصبر يملو زيت طيار كثير اللثع || يحرق زهره حطري العرف من اللثاق يستعمل في القلب وفي الروائح العطرية وفي الصباغ. والجزر الواحد من مسحه يصنع ستة آلاف جزء من الماء. اي ان غراما واحدا من مسحوق الزفطران يصنع ١٠٠ لير من الماء || ومن الرينة البلية فازفطران يملو البحر ويقوي الاصصاب وينشط القلب ويرسه ويوج اباء ويدبر البول والطمث ويسهل الولادة اذا تسمرت. وهو مفاد للتشنج ويطر في الاذن ليسكن آلامها.

١٢٤٨٠ - زُفْطَرَان مَوْشَح *
Crocus versicolor (S). Safran versicolore, Crocus versicolore (F).
نوع من الزفطران شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. يلمفه عند قاعدته شراعات قصير || زهرته حطرية الراتحة، يضاء اللون، موشحة بالبنفسجي. سماتها كاملة. شرعائها مزدوج التركيب || اوراقه خيطية، مستطيلة، خلية التصل || ازهاره يستمر من شباط الى اذار.

١٢٤٨٣ - زُفْطَان أَكْبَه *
Hespérophane gris (F).

حشرة مؤذية من القرنيقيات تدعى زفطان التي، اظلمها.

١٢٤٨٤ - زُفْطَان الَيْن *
Hesperophanes griseus (S). أَكْبَه *

Hesperophanes gris, Longicorne du figuier (F). Hesperophanes griseus (E).
حشرة غاشية مؤذية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف ارجل التي دوت سواها. غناصها تمشي على الازراق والحاء. يرقاها تسردب الافئاد والاضخان والجفوع || جسمها متوسط الله بطول من ١٢ الى ٢٠ م. ثوبا الى الكبة يطولها خل اربه ورتبة شهية. رأسها مستطيل الجرم. عينها كبيرتان نافذتان. زباناها مستطيلان دقيقان. ظهرها مدبب القوط للاحف. غناصها كثيفات الحمل واغرب || الاثنى اكبر قدما من الذكر واجت ثوبا منه واتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر حزيران. تسرح في اللي. تلتقه بعد ظهورها باسرع واسد. تمتع المكن رؤيا تطفها مادة غروية تشبه في مكانها || القبة منذ ادراكها الكلال الجسموري تطول من ٢٢ الى ٢٥ م. ثوبا الى البياض القتي. جسمها مستطيل الرأس والصدر والقمم الاوسط من البطن وينتهي بطرف



رقباتها غبراء اللون، قصيرة القد، تركيب جلود الكرة فقرتها وتغيرها .

١٢٤٩٠ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ * ، مَكْرُومُ النَخْلِ *
Macrotoma palmata (S). Macrotonne du palmier (F).
حشرة خاشبة من القزنييات طويلة نحو ٤٥ م. لونها الى
السرّة الخضرة . زباناها طويلة متعقبة . تسرح في الليل .
تجتمع مكثا على جلود النخل فيقتف من رقات غبراء
اللون ، زباناها الجسم ، سوداء اللبب تنشر الجلود
وتعطها .

١٢٤٩١ - زَعْفَرَانِيَّات *
هي القزنييات فصيلة حشرات من طحيدات الاجنحة ،
اطلها .

١٢٤٩٢ - زَعْفَرَانِيَّة *
Nageoire (F). Fin (E).
الزعنفة هي عضو الحركة الانقباضية في الحيوانات المائية .
ج زعنائف . ولزنايات تقسم حسب موطئها في الجسم الى :
سديرة وبطنية وظهريّة وشرجية وذنيّة .

١٢٤٩٣ - زَعْفَرَانِيَّاتُ الْأَدْنَامِ *
Pinnipèdes (F). Pinnipedia (E).
رَبِيَّة حيوانات لبونة ألفن حياء البحر والبر . انواعها
المعاصرة للمرونة ٣٦ تنضم الى ١٢ جنس ينجمها ثلاث
فصائل كما هو مبين في الجدول التالي || اجسامها شبه
وضعية الشكل ، متفارقة الطول والحجم . اطولها تراوح
من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة
جاسقة . اذانها ومنافقها ملحومة . اسنانها متباعدة الاشكال
والحجوم لكنها وحيدة الصيغة عند كل فصيلة . اعناقها
قصيرة واذانها كذلك . فمها خاسية الاصابع الكمامة
الحطاب والمملوطة ما يسهلها كازنايات || قوتها الاسماك
والقشريات والرخويات . ملجئها الحيائي يختلف مع اختلاف
الانواع . معطها فشري جماعي وبعضها زويبي .

١٢٤٩٤ - زَعْبِج *
Crossemant (F). Croak, Croaking (E).
الزعب هو صوت الغراب كالنبيب والنتيق .

١٢٤٩٥ - زَعْفَرَان * ، زَعْفَرَانِيَّة *
هو الزغرير ، اطلها .

١٢٤٩٦ - شَرْشُورُ جَيْسَل *
Fringilla montifringilla (S). Pinson de montagne, P.
d'Ardennes (F). Mountain finch, Brambling (E).
Bergfink (D).

نوع من الشرشور طوله من ١٨ الى ١٩ سم . رأسه
وظهره ذهبي الى السواد الازرق . جناحه منقط بالابيض .
عقله وسدره الى الصبغة البرتقالية . بطنه وزنكاه بيض .
اطلها مرشاقان بالاسود || يعيش اسراب كبيرة تجوب
البلاد في طلب الحبوب والاشج . قوته الحشرات اعينها
الادباب م يزور النباتات القزنية اعينها البرية || ينش
في الاجمار . انثاء تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها
بتأدية الذكر نحو اسبوعين .

١٢٤٩٧ - زَعْفَرَان *
Cycloconium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات والفطريات
جربه الكتيديّة مهمة الشكل والترتيب . هيفه يجوب
المنطق الخلوية داخل السافات الادمية الى ان يتحرك

مبدى || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى
ثلاثة اسابيع ينغفي في النفق الذي احفرته البرقة .

١٢٤٩٨ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ * ، زَعْفَرَانُ
مَلَمَم *
Hesperophanes fascicu-

latus (S). Hespérophanes fasciculé, Longicorne du
caroubier (F). Hesperophanes fasciculatus (E).
حشرة خاشبة غاشبة مؤذية من فصيلة القزنييات ورتبة
معدنات الاجنحة . تألف الاشجار الزراعية والبرية اعينها
الخرنوب واللين والتوت والبلوط والسنق والبلبل ... خنافها
تبش على الارواق . رقاتها تسردب الافئاد والاغصان
والجلود الاخضر منها واليابس فتسطبها وتكثها || جسمها
متوسط القد يطول من ٢ الى ٢٠ م . ثوبها الى الكمامة
يطولها زغب اطول ومثقة ورياء . رأسها مستطيل الجرم .
عينهاا كبيرتان . زباناها دقيقتان مستطيلتان . ظهورها
مستطيل المسطح ، مستدير المؤخر الاسف . غمداء كثيفتا
العمل والتمشيش || الانثا اكبر قدًا من الذكر واكد ثوبًا
منه ولتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجملقة في اواسط حزيران . تسرح في الليل . تسالط
بعد ظهورها ياسرع واحد . تمتع الممكن تحت الحياء وبين
القصور || البرقة ، عند بلوغها الادراك تمام ، تطول من
٢٠ الى ٢٥ م . جسمها مردي الشكل ، حطلي اللون ،
اظهر الموج ، ابرر الرأس والفكين والشرج ، مبرر الهلب
التمشير النقيق .

١٢٤٩٩ - زَعْفَرَانِيَّة *
Vireux (F). Vireux, Noxious (E).

لتم تعريفي يطلق على النباتات او المواد النباتية التي
رائحتها الكريهة وطعمها القس ينان عن وجيد عنصر ضال
قد يكون جسمها المادة .

١٢٤٩٧ - زَعْفَرَانُ الْعَمْدَةِ * ، هَيْطَرُوبِ *
Hylotropus bajulus, Callidium bajulus (S). Hylotrupe,
Longicorne des charpentiers, Capricorne domestique (F). House longhorned beetle (E).
Hausbock, Belkenbock (D).

حشرة خاشبة من فصيلة القزنييات طويلة نحو ١٦ م .
لونها الى السرّة الخشبية طليها زغبية غبراء || تركيب
الصنوبر حيث تجمت مكثا فيقتف من رقات تنشر
الخشب وتطليه . تمرى بنوع خاص اعمدة التلفون
وبا ابيه .

١٢٤٩٨ - زَعْفَرَانُ الْخَشْبَةِ *
Calembolus flum (S). Algüillonnier, Saperde

grile (F). Grain borer (E). Getraidebohrrer (D).
حشرة غاشبة من القزنييات صغيرة القد طويلا نحو ١٢ م .
لونها الى السرّة تمليها زغبية ملطحة . قوتها الاستشمارية
دقيقة وطويلة || تظهر في اواخر ايار ، تجمت مكثا
على قصب الخشبة تحت السابل فيقتف من رقات
سفيرة تنشر القصب وتقرضها فتسبب كسرها وصقوها
السيلة على الارض .

١٢٤٩٩ - زَعْفَرَانُ الْكَرْمَةِ *
Vesperus xatarti (S). Vespère des vignes (F).
Grape vesperus (E). Vesperus xatarti (D).

حشرة من القزنييات طويلة نحو ٢٠ م . لونها الى الصفار
الحطلي . زباناها مستطيلة . انثاء نصفية القند المنرج .



زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ



زَعْفَرَانُ الْاَمْدَةِ



زَعْفَرَانُ الْخَشْبَةِ



زَعْفَرَانُ الْكَرْمَةِ (ذَكَرُ رَائِي)



زَعْفَرَانُ النَخْلِ



زَعْفَرَانُ

الى الصفار الباهت || ازهرها يستمر من نيسان الى ايار .

Primula sinensis (S). - زُعْدَةُ الصَّيْنِ
Primèvere de Chine (F).

عشبة معمرة رفيعة تنبت في المزارع . اوراقها مقسمة رطلة ، نصلها خلى البشرة جبر المسام القرية || شرانها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهار ثلاثية الالوان المتراكبة . زهره شبيهة البوق ، مستنقعة القاعدة المستعرضة . لونها يختلف مع الشربوب منها الياض والوردي والازرق والاحمر والبنيصبي || ازهرها يستمر طوال الشتاء .

Primula glutinosa (S). - زُعْدَةُ دَقِيقَةٍ
Primèvere glutineuse (F).

عشبة معمرة سبوتية اوراقها مستطيلة مخروطية ، نصلها غدي البشرة النبكة ، حناره غشاري التسنين || شرانها يملو نحو ١٥ سم . ازهاره تده من ٣ الى ٧ لونها الى البنفسجي الزاهي ، عريضا فواح المسطر . ازهرها يستمر من حزيران الى تموز .

Primula elatior (S). - زُعْدَةُ شامِخَةٍ *
Primèvere élevée, Coucou élevé (F).

عشبة معمرة . اوراقها اهليجية ذلقة ، نصلها اخضر الصفحية العليا ، بحري البطل || شرانها يملو نحو ٣٥ سم . ازهاره كثيرة العدد لونها الى الصفرة ، انصافا الى الخضرة الباهتة بترتيب ابيض || ازهرها يستمر من اذار الى ايار .

Primula verticillata (S). - زُعْدَةُ ضَمِيصَةٍ *
Primèvere à fleurs verticillées (F).

عشبة معمرة ترطب في الشطوط البحرية . اوراقها اهليجية الشكل تطبل من ٢٠ الى ٢٥ سم . نصلها وسيد الفلج ، خلى البشرة ، قليل التسنين || شرانها يملو من ٣ الى ٤٠ سم . ازهاره ثنائية الفصمة . كثيرة القند ، فواحة الحرف ، ذخبية اللون || ازهرها يستمر من ايلول الى ايار .

Primula spectabilis (S). - زُعْدَةُ قاصِرَةٍ *
Primèvere remarquable (F).

عشبة معمرة ترطب في الاربة الكنسية . اوراقها سنانية ، نصلها خلى البشرة النبكة ، مسن الحافة النضروفية المختار || شرانها يملو من ١٦ الى ٣٥ سم . ازهارها سداسية او خمالية التجميع لونها الى الابيضاني يملو ملوج وردي || ازهرها يستمر من حزيران الى تموز .

Primula luteola (S). - زُعْدَةُ كَبِيرِيَّةٍ *
Primèvere soufrée (F).

عشبة معمرة سبوتية . اوراقها اهليجية تطبل من ١٥ الى ٣٠ سم . شرانها يملو نحو ٢٥ سم . ازهاره صغيرة القند كثيفة التجميع كبريتية اللون || ازهرها يملو طوال شهر ايار .

١٧٥٢٢ - زُعْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ *

Primula floribunda (S). **Primèvere floribonde (F).**

عشبة معمرة ترطب في الشطوط البحرية . اوراقها بيضيه ، مستطيلة ، مقنونة الطرف . نصلها ازغب البشرة مبتر للمسام القدية ، حناره لاقياسي التسنين || شرانها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره مستعرضة الشكل ، كثيرة العدد ، كبريتية اللون || ازهرها يستمر طوال الشتاء .

بورغاته كروية ، جوية التجميع ، عابقة اللون || ازهاره قليلة العدد والاذى تنقل على اوراق بعض اشجار الحرجية دون ان تفتقها . مظهرها الخارجي بقع صغيرة مستديرة خلية ، شقراء اللون جوية المختار ، تركب التنصل على صفحته السفلى .

١٧٥١٠ - زُفْيِي *. **Tomenteux (F).** **Tomenteus (E).**
نمت وسمي يطلق على اجزاء النبات المغطاة بزغب ليد نام يشبه نفث الثعلب .

١٧٥١١ - زُفْيِيَات *
Bombaceae (S). **Bombacées (F).** **Bombaceae (E).**

قسم من فصيلة الخبازيات يشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع مظهرها اشجار كثيرة دائمة سنها البلاد الاستوائية . ازهارها خشوية ، خماسية البتلات ، كثيرة السدية . ثمارها حبة الشكل تلتف بزورا فريدة او عديدة ينشأها زغب نام التلثة صعيها .

١٧٥١٢ - زُفْيِيَّة *
Bombax (S). **Bombax, Bombace, Ousder, Fromager (F).** **Silk cotton tree (E).** **Sinddenbaumwollbaum (D).** **Bombace, Bambiag (I).**

جنس اشجار كبيرة دائمة من الزليبات . انواعه عديدة مهيدا المناطق الاستوائية .. جميعها سريفة التنو غليظة الجذع تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م . اوراقها زنادية مركبة خماسية الورديات البيضية الشكل . ثمارها حقائق مستطيلة تلتف حدة بزور ينشأها زغب نام جدا قصير التلثة لا يصلح لفزل || بزورها مأكولة بعد التخميص ويستخرج من اوراقها مادة دمنية لما استعملها في البلاد الحارة .

١٧٥١٣ - زُعْدَةُ كَاب *. **Chiromèle (F).** **Chiromel (E).**

جنس غشائفي من هامة الحيار . موطنه ملقة والملايو . انواعه قليلة العدد تتميز بفرطها الاسطوانية المقنونة ، بأذانها المنسبة العالية وبانصافها السلمية البارزة . يعيش جماعات متوحشة البعد . يسرح في اوائل واواخر الليل ، قوته الحشرات . يالفت بجايوف الاشجار الحرجية والفلور والكهوف .

١٧٥١٤ - زُعْدَةُ ، زَهْرَةُ الرَّيْبِ *
Primula (S). **Primèvere (F).** **Primula (E).** **Prmel (D).** **Primavera (I).**

جنس نباتات عشية من فصيلة الريبيات . انواعه كثيرة العدد منها الحولية والوهية والمعمرة . مظهرها بري وبشها ترابي . جميعها تنجيه ، اوراقها قرصية الانتصاب . ازهارها سيواني التجميع يرتكز على شارين دقيقة . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان كوسها خماسية للتسنين ، تويعاتها خماسية للتخميص ، انانيبها اسطوانية الشكل ، لمديتها غشادية لا متدقة . حقائقها خماسية المضارب || اعرف ولشهر انواعه ما يتبع .

١٧٥١٥ - زُعْدَةُ أَذْيَنِيَّة ، أَكْأَن الدُّبِّ الوَحْشِي ، أَكْأَن الضَّعِج *
Primula auricula (S).

Primèvere auriculée, Orelle d'ours sauvage (F). **Auricula, Bear's ear (E).** **Aurikel primel, Aurikeln (D).** **Primavera auricula, Orecchio d'orso (I).**
عشبة معمرة . اوراقها بيضية مسطوية الشكل . نصلها بحري اللون ، خلى البشرة ، مسن الحافة النضروفية المختار || شرانها يملو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها



زُفْيِي



زُفْدَةُ شَاغَا



زُفْدَةُ شِمِي



زُفْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ

٢٠ سم. ازهاره لا تلبية التجميع. مدعها يراوح من ٢ الى ٢٠ لونها ال الوردي يملو ملج بنفسجي. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٠ - زُغْدَة وَرْدِيَّة
Primula rosea (S).
Primavère carminée (F).

حبة معمرة سريرية. اوراتها اطيحية تطول نحو ١٥ سم. نصلها جيل الحصار الفضي سنن الحافة. شرانها يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره قليلة العدد. كبيرة لثقة لونها ال الحمر الوردية الزاهية || ازهاره يستمر من ايار الى نيسان.

١٢٥٣١ - زُغْدَة يَابَانِيَّة
Primula japonica (S).
Primavère du Japon (F).

حبة معمرة سريرية. جلورها عائدة لقرحة. اوراتها اطيحية مسطحة. نصلها مثلثي الحافة يطول نحو ١٥ سم || شرانها يملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متراكبة الاراس التي تمد من ٣ الى ٦. زهره مستعرض الشكل لونها ال البنفسجي الموشح باخضر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٢ - زُغْرُغْ
Aquifère (F).
Aquiferous, Water-bearing (E).

نمت تعريفية يطلق عل الطبقات الارضية التي تحوي بعض الماء او الكثير منه.

١٢٥٣٣ - زُغْرُغْ
Aquiculture, Culture hydroponique (F). *Aquiculture, Fish-breeding* (E).

الزهرية او الزرعة المغرقة هي الزرعة في الماء بدون ترربة. يصار اليها بتلوب العناصر الغذائية المعدنية في الماء فيمتصها النبات وينمو ويشمر كما لو كان مزروعا في التربة.

١٢٥٣٤ - زُغْرُغْ
Aquigène (F).
Aquigenous (E).

نمت تعريفية يطلق عل كل كائن يحيا في الماء او يعيش فيه.

١٢٥٣٥ - زُغْرُغْ عَجَبَالِيَّادِيَّة ، جَمِيل
Cursorius (S). *Courvite* (F). *Cursor* (E).

جنس طير من طوال الساق وفضيلة الزنزقيات. انواعه المعروفة حشرة اصطناعا الصمغى الاسود والافرنجية || اجسامها صغيرة لثقة. اطولها تراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. مناقبها مسطحة ، دقيقة . اجنتها ذلقة . اذنانها قصيرة ، مستعرضة ، مقنطة الاطراف . سيقانها وارباعها محملة . اوتابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر واخضر || امرف انواعه واشهرها الزنفرغ الاغس .

١٢٥٣٦ - زُغْرُغْ أَغْبَسْ ، جَمِيل أَغْبَسْ ، عَجَبَالِيَّادِيَّة الْأَغْبَسْ
Cursorius isabellinus, C. cursor (S).
Courvite isabelle, Courvite gaulois (F). *Cream-coloured cursor* (E).

طائر من الزنفرغ . اسنانه يمتد من صمغى الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والنيالية لانه من الصمغى التي تجوب القرياني في طلب الفرز || جسمه متوسط القند يطول نحو

١٢٥٣٧ - زُغْدَة لَرَجَة
Primula viscosa (S).
Primavère visqueuse (F).

حبة معمرة ترطب في الارربة الرملية. اوراتها بيضية مسطحة السطح ، نصلها كثيف . المسام اللينة القوية الزائجة، لونه ال الحصار الاصفر || شرانها يملو من ٦ الى ١٥ سم. ازهاره لبسة التجميع المصنولي، فواصة الصف ، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٨ - زُغْدَة مَارْدَا
Primula grandis (S).
Primavère géante (F).

حبة عمولة سريرية. اوراتها مسطحة كبيرة القند قليلة الشكل. نصلها كثير المروق ، قليل الزغب ، لاجابي التتسين || شرانها يملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهاره مسطحة متدلية ، لونها ال الصفار الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٢٥٣٩ - زُغْدَة مَحْزُونِيَّة
Primula officinalis (S). *Primavère officinale, Coucou officinal* (F). *Cowslip, Paigle* (E). *Gartenprimel, Schlüsselprimel* (D). *Primavera, Primula odorosa* (S).

حبة معمرة سريرية يقال انها طيبة تلغ الصفار والامام. اوراتها مسطحة ذلقة. نصلها اخضر الصفرة العليا ، بحري السفل || شرانها يملو من ١٠ الى ٣٠ سم. ازهاره جرسية احماها بيض ، ابوالها ملحية ، اعناتها خاسية الزقفة البرتقالية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٢٥٤٠ - زُغْدَة مَحْطَلَّة
Primula vitacea (S).
Primavère rayée (F).

حبة معمرة. اوراتها خفيفة مسطحة . نصلها مائل البشرة ، دقيق التتسين || شرانها يملو نحو ١٥ سم. ازهاره كثيفة التجميع . حراء اللون ، كلوصها جرسية الشكل تملوها حبة خطوط بيض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٢٥٤١ - زُغْدَة مَرْبَرَّة
Primula hirsuta (S).
Primavère hérissée (F).

حبة معمرة ترطب في الارربة الرملية. اوراتها بيضية الشكل. نصلها مثير المسام اللينة الحمراء التي تملو عل مسطحته || شرانها الزهري يملو من ٣ الى ١٠ سم. ازهاره مستعرضة الشكل ، قليلة ، تمد من ١ الى ٣. عنقاتها ابيض ، سارها وردي او ليكي اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٢٥٤٢ - زُغْدَة مَبْقَعِيَّة
Primula helodoxa (S).
Primavère gloire des marais (F).

حبة معمرة ترطب في الاراضي الرطبة . اوراتها سنائية النصل المثلث الاطراف || شرانها يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم. ازهاره متراكبة الاراس التي يراوح مدعها من ٦ الى ٨. زهره مقعر القاعة ، مقعر اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٤٣ - زُغْدَة مَهْدَبِيَّة
Primula marginata (S).
Primavère bordée (F).

حبة معمرة ترطب في الارربة الكليكية. اوراتها اطيحية الشكل . نصلها لحمي التجميع ، حطرها متقارب التتسين ، مهدب الحافة || شرانها يملو من ٥ الى



زغدة لرجة



زغدة يابانية



زنفرغ اغبس

شفاغان. قوائمها مستقيمة ، قصيرة . ثوبها الى الصبغة الناعية المولج || تنص الاثني المكن في لواء الاشجار فيقتف من يقات صغيرة ، غطيلة الشكل ، بقية اللون تردب السماء وتميش عليه حتى الاكمال .

Zaghouana

١٢٥١٧ - زُفْلُونَ *

نظر مجري من فصيلة السحاميات ورتبة العنانيات يركب بعض نباتات الفصيلة الزيفونية واعضاها الحشيش . مظهر الخارجي يقع صغيرة مستديرة لاقياية التجميع تصيب الاوراق الجديدة الناعية تقسبب لها تقسبب التسج الحلوية وتتمج من يمتجها رفعة في البشرة تبدو كاليصور الى ان تتشجر عن بويغات كالحباب لونها الى الجفوة || يكافح عند ظهوره باستهلاك سائل يورده لاهلوا ١ % .

Amanida (S), Amadine (F).

١٢٥٤٨ - زُفْلِيم

جنس صافير صغيرة القد من الجوامث الخروفيات المتأقير . انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة . جميعها بحجم الدوري . الثوبيا متراكبة الالوان الجسيلة . تألف الاهدال والنباتات المبررة الاشجار . قوتها يزور وحويب التبيليات وبعض الحوام والديدان والحشرات الصغيرة || تدن في الاشجار . اناتها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . وذلك على ثلاث مرات في السنة || اشهر انواعه الزيف الطروق .

١٢٥٤٩ - زُفْلِيم مُطْرَق * ، ذُبْعُ التَّيْبِي

Amanida fasciata (S), Amadine à collier, A. bandé, Cou coupé (F), Cut-throat (E).

نوع من الزيف حجمه حجم الدوري الصغير . ثوبه الى الكمية الصبغية يملوا زيفيم ابيض واسود . عسراه ويصقه يبيض . زوره مطروق بخط ارجواني يتنه من مؤخر العين اليسى الى مؤخر اليسرى . جناحاه ذهبه سود . موطنه افريقية الشرقية والشمالية . سره يد من ٢٠ الى ٤٠ || يالف حياة الدجج ويتكاثر بسهولة لكنه لا ينزر .

Amanididae (S).

١٢٥٥٠ - زُفْلِيَمَات *

Amanididae (F), Amadine (E).

فصيلة طير من الجوامث خروفيات المتأقير . اجناسها وانواعها عديدة منظفها من صافير المناطق الحارة || تتميز باجناسها الصغيرة وبمناقيرها الخروفية القصيرة وباذانها المقطعية التي يلفب فيها تقصر . اجنسها مستدة الطول . ثوبيا جيلة الالوان الزاهية . ارشاعها دقيقة || جميعها تألف القفص ، بعضها مستحب الزفوة . قوتها يزور التبيليات || احرف اجنسها واشهرها الزيف والطرور واليداس ...

Satinée (F), Satiny (E).

١٢٥٥١ - زُفْ

صغير الريش ونص بفسهم به ريش لتمام . قال المتني : و كان المرو من زف الزلال .

١٢٥٥٢ - زُفْلَةٌ صَغِيرَةٌ الْفَسْدِ *

Rhiphophorus subdipertus (S), Rhiphophorus à élytres réduits (F), Rhiphophorus subdipertus (E). حشرة وائمة ناعمة خاشرة من فصيلة الزفليات ورتبة عذبات الاجنحة . تألف الاماكن التي تكثر فيها التفويغات

٢٥ م . ثوبه اخيس اللون . رأسه ازرق المولج . عيناه مكملتان بالاسود الذي يمتد كالخط حتى القفن . قوامه واباهره حطيلة الزفوة . كلاء صفر الاطراف و حر المابية . زفان قنية مرفوعة بالاسود والايض . حقله ميتة حطيلة اللون . سقاء الى الزفوة البسرية . رصاف واصابه بلون البرل || يدن انصومه بين الحبابية التي تكتنفها الانشباب المتراكبة الكثيفة . انشاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٥ يوم بينا الذكر يولن لما انشاء .

١٢٥٥٧ - زُفْلَةٌ

Zygote

١٢٥٣٨ - زُفْلَف

Brindilles (F), Sprigs (E). الزفث : دقك الحطب : اطراف الشجر الصغيرة واعالي الثوث والفرج .

Pontederia (S), Pontederia (F).

١٢٥٣٩ - زُفْلِف * جنس نباتات شبيهة برية وزييتية من فصيلة الزفليات . انواعها ثمانية جميعها جسمية متقية وبالية سقها شراعية متصبة لتفتي بالسائل الزفوية . ازلها جيلة الشكل ، سداسية الانقسام ، زفوة اللون || اوراقها متتقة كبيرة لقد طيلة التصل ، عتقا ملاق متليل يطفر بها على سطح الماء || تزوج قزين لكها تحض الصغير .

١٢٥٤٠ - زُفْلِيَمَات

Pontederiacae (S), Pontederiacae (E).

فصيلة نباتية من وحيات الفلقة ستورات الزور . نباتاتها اعشاب جسمية الجلفوع . اوراقها قرصية الانتشاب ، مستقيمة الزناد ، قليلة التصل . ازلها متلية التجميع تقدم على شراخ يعلر الاوراق || منبها المناطق الحارة تعيش في المنافع والمياه العذبة الرائدة .

١٢٥٤١ - زُفْلُون

Pigeonneau (F).

١٢٥٤٢ - زُفْلِيل هو الاديض الصغير ، اطلبه .

١٢٥٤٣ - زُفْلِيلُ التَّيْبِي

هو الحيزان التثري ، اطلبه .

١٢٥٤٤ - زُفْلِيَكَة هي لبن المروج ، اطلبه .

١٢٥٤٥ - زُفْلِيَج ، زُفْلِيَج

Olives sauvages (F), Wild olives (E).

ثمر الدم (الزيتون البري) وهو مثل التبق الصنار يكون اخضر ثم يسود فيسلو في مرارة وصمته مثل صبة التبق . يتركب ويطبخ ويصلى ملؤه حتى يكون وبها كرب المتب .

١٢٥٤٦ - زُفْلَوْرَةٌ طَلَحَة *

Zygoneura frivola (S), Zygoneura frivola (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الشياريات . تألف جميع المواقع القليلة والحاتق والمساكن || جسها صتير القد يطول من ٤ الى ٥ م . رأسها مكور . عينها متلاصتان مع الذكر . مفترقات عن الاثني . زباناها خيطيان . صدرها شبه يفضي الشكل . ورشاعها كبريا لقد ، عددا الخضاب ،



زففل



زففلون



زففلون



زففل صغيرة الفسد

Alaternbaum, Alaternkrenzborn (D). Alaterno, Ilatro, Putine (I).

نوع من الأبنى مهدد شرق البحر المتوسط. يوجد في بعض المناطق الجبلية اللبنانية والسورية. يملو من متر إلى خمسة أمتار. أنصافه وأغلافه مرصعة، وأوراقه عروية، كملمة، متعاقبة. نصلها سنن الحافة يميل من ٤ إلى ٦ أزواج من العروق الماصعة. أزهاره عذبة الثيلات، خضراء الاسدية وتصلصق الذلقة، ثنائية أو ثلاثية البهات. ثماره كروية، حمضية اللد، ناعمة البسوق تليو حمره اللون ثم تسمر ويتسدر مع التسجع. يقال إن تليق ثماره ولغاته ونشبه يسهل المدة ويقوي الكبد والعظام ويذهب باليرقان.

١٢٥٦٠ - زُفَيْر لُبْنَانِي * ، عُوْدُ الْخَيْر

Rhamnus libanocicus (S). Nerprun du Liban (F).

نوع من البق يتكد في جرد لبنان. وهو جنبه صغيرة تليو نحو ١٥٠ سم. ساقها متعصبة خشبها خطلي اللون. أنصافها وأغلافها خلية اللحاء. لورافها متعاقبة بيضية. نصلها جابت النسيج، كثير العروق قتي يبلغ مدحها من ١١ إلى ١٥ زوجاً. أزهارها خشوية خماسية التركيب. ثمارها كروية ثورية حمضية اللد ناعمة البسوق تليو حمره اللون ثم تسدر مع التسجع. يقال إن تليق ثماره يفي الكبد والعظام ويلعب باليرقان.

١٢٥٦١ - زُفَيْرَات

Vent fort et soutenu (F). High and sustained wind (E).

الزفائر والزفائر: الريح الشديدة المهبية في دمام.

١٢٥٦٢ - زُفَيْر

Tonnelle (F). Arbour (E).

خيمة من حديد أو خشب تليها نباتات عارية.

١٢٥٦٣ - زُفَيْر

Exiration

خروج الهواء من الرئتين وهي حركة طيية تتبع الاستنشاق أي دخول الهواء الجري إلى الرئتين.

١٢٥٦٤ - زُفَيْر * ، تَرْجِس لَسِيْمِي

Zephyranthes (S). Zephyranthes (F). Zephyr lily, Swamp lily (E). Zephyrblume, Flammenlilie (D).

Zeffr (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة الفرجسيات. الأنواع نحو ٢٠ مطنها زراعي جميل الزهر المخطط الألوان. شمرايينها جوفاء. أزهارها فردية. لورافها غيقة النصل، قليلة العدد، تنمو متناحرة قرب اتبلاج الزهر. أشهر أنواعه الفريزية ما يتبع.

١٢٥٦٥ - زُفَيْر أْبَيْض

Zephyranthes candida (S).

Zephyranthes blanc (F).

نوع من الزفير شمراينه يملو نحو ٢٠ سم. أوراقه اسطوانية عذبة تليو نحو ٣٠ سم. زهرته يضاء اللون لا عرف لها. أزهاره في أيلول.

١٢٥٦٦ - زُفَيْر أَصْفَر

Zephyranthes citrina (S).

Zephyranthes citrin (F).

نوع من الزفير شمراينه يملو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه ضيقة النصل البائع المتخذة تليو نحو ٣٠ سم. زهرته صفراء اللون طويلاً نحو ٥ سم. ساقها مقنطرة مقصصة. أزهاره في آب.

والصبيوات. عناقها تموش على رسيق الإزهار ويتلها. يرقاتها تليو في الزناير واسارع الكدان ويترها من الحشرات. جسمها صغير اللد يملو من ٥ إلى ٨ م. ثوبها إلى السرة المخططة الصنائية المخرج. وأنها صغير الجسم. زيانها مشطبان. عينها صغيرتان ماصحتان. ظفرها جعتان صغيرتان. رؤشها شافان كيران. يطنها مستعرض الشكل. أوساغها رباعية المقل في الزوج الخلفي، خاشية في الزوجين الامامي والوسطي. لها جبل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملانة في اوالل سزيران وتموش على اوسط ايلول. تسرح في التهار. تساقط في اواسط آب. تنجح لكن قرب غشوات الزناير وفي المواقع القريبة من مجتمعات الاسارع. البقرة عند بلوغها الاذوك اتمام تطول نحو ١٣ م. جسمها مبط الشكل، مستطيل المقدم والرأس، مستطيل الخصر، سداسي الرواج، ضلع التأكير، لجر اللون، وريدي المخرج، عتاي الرأس، اسمر الرواج والشرج. طود الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوماً يتقضي في التربة تحت الجملانة.

١٢٥٥٣ - زُفَيْرَات *

Rhiphporidae (S). Rhiphporidae (E).

فصيلة حشرات واسعة شافرة من رقية غفريات الاجنحة. اجناسها وأزواها المعروفة قليلة العدد مطنها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة وبعضها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط. تألت نباتات الغفريات والشفويات. يرقاتها شافرة تموش على في الزناير. أجسامها صغيرة اللد أو معتدلة. رؤوسها مستديرة. زباناتها متجانسة الاشكال منها الخشبية والمرصعة والمخططة، تركب من ١٥ أو ١١ فصلة. كولاسها وأغلامها لاجمائية الشكل والقد. أوساغها الخلفية رباعية المقل اما الوسطي والامامية فخاشية. المهر اجناسها الزائلة والميمس.

١٢٥٥٤ - زُفَيْر

Asphalte (F). Asphalte (E). نوع من الحمر كيف المادة السوداء اللامعة يستعمل جيوياً مع كسر الحصاة في تغطية رصف الطرقات لتثبيت تكديدها ووقايتها.

١٢٥٥٥ - زُفَيْر، قَبِير

Empoissor (F). To pitch (E). قير.

طل أو لاط التي بالزق.

١٢٥٥٦ - زُفَيْر

Cire, Lorum (F). Cere (E). الزفد خشاء يظف قاعته المتقاد عند بعض فصائل الطير انصها الجوارح والحائم والنباطات. ومن الكاترة من استعمل كلمة قير دلالة على الزفد في حين إن القير هو القوران.

١٢٥٥٧ - زُفَيْر

Tuteur (F). Prop (E).

هو المسند الذي تدع به الشجرة الفتية.

١٢٥٥٨ - زُفَيْرَات

Clemées (F).

سبط من فصيلة الكبريات.

١٢٥٥٩ - زُفَيْرِين الْجُرْد * ، تَبَي مُتَوَكَّدَف

أَلْبَس، أَلْبَس، عود القيس

Rhamnus alaternus (S). Nerprun alatern, Alatern, Bourgue-épine (F). Alaternus, Barren privet (E).



زفرين المر



زفرين لبناني



زفر

في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في القفار . تساقد بعد ظهورها بنمو ستة اسابيع وتفتح المكنة رزماً لتلقيا في الجلالة وتحت الاشجار والحجاة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تغول نحو ١٥ م . جسمها رمدي الشكل ، كثيف الحلب ، حشلي اللون ، اسمر الرأس والرواجب والشرج || طود الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع يتقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

١٢٥٧٢ - زُفِيرِيَّات * Zuphiidae (S). Zuphiidae (F).

فضيلة حشرات لاحة وقائمة من رتبة جمادات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المواقع الرطبة وفضفاض الابر والبيجرات || جميعها صئيرة القند قلما يتجاوز طول الواحد منها ٢٠ م . اجسامها خالية للتقار ، متباينة الالوان الزاهية . رؤوسها كروية ، عضوية الاصداغ ، تركتزر على اعناق دقيقة اسطوانية الشكل . عيونها قليلة التتو . كواشها قليلة الغرض ، شبه قليلة الشكل . احمادها مستطيلة ، مستديرة الأطراف || تسرح في القفار وتبيت في الليل . تسمى بسمرة وتعتبر نطفة . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تتغ من الصوف من الحشرات الدنيا || اظهر اجناسها الزفير .

١٢٥٧٤ - زُقْ * Abecquer, Embecquer (F). To feed (E).

زق الطائر فرشه : اطمه بمقاره : راجع انزل .

١٢٥٧٥ - زُقْ ، تَسْمِين * Gavage (F). Cramming (E).

اطعام الطيور الداجنة قسراً طاماً خاصاً بنية تسميتها .

١٢٥٧٦ - زُقْ * Asque (F). Ascus (E).

خلية نباتية تتصلب الى كيس صغير يشأ فيه بورق القفطور الزقية . ج. انقاق .

١٢٥٧٧ - زُقَاء ، هَبَج * Crl du hibou (F). Cry of the owl (E).

صوت البرم حل اختلاف اجناس .

١٢٥٧٨ - زُقَات ، زُقَج * Crl du singe (F). Cry of the ape (E).

انزاع والزقج : اسم صوت القرد خاصة والفصلك كلاك .

١٢٥٧٩ - زُقَار * Fusicoccum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات يتميز ببيتية البكنيدية التي تنشأ عضوية ثم ترق تصدع الادمة والبشرة . وهي شافئة ، لبينة التركيب ، حشلية الجول . تصبها رديئة الحياء ، مستطيلة الخنق ، بوناتها بيضية شافئة . انواعها قليلة لا ينتم منها اعمارا تستحق العناية .

١٢٥٨٠ - زُقَار السِدْرَاك * Fusicoccum cedrelae

فطر مجهرى يصيب سوق وافصان السدراك . مظهره الخارجى بلخ مستطيلة طولها من ٢٠ الى ٤٠ م . تركيب الحاء السق والافصان فتؤذي وقد تسبب جفافها || يكافح بالاكش والتطهير والمالي بالستوك .

١٢٥٨١ - زُقَار اللوز * Fusicoccum amygdali

فطر مجهرى يصيب اغصان اللوز واقلاده فيمرق سير التسع

١٢٥٧٧ - زُقَيْر حَافِن * Zephyranthes sessilis (S). Zéphyranthe sessile (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ٢٠ سم . اوراقه نحيلة اسطوانية طولها من ٢٠ الى ٢٥ سم . زهرته حلوية حاسنة طولها من ٤ الى ٥ سم . لونها ال كلباش المويج بالاجر . سماتها ثلاثية || ازهاره في نيسان .

١٢٥٦٨ - زُقَيْر فِيرَجِيَّة * Zephyranthes stamesco (S). Zéphyranthe de Virginie (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ٣٠ سم . اوراقه ضيقة مجددة زاهية الخضار طولها من ٢٥ الى ٣٠ سم . زهرته حلوية تركتزر حل زباد يملو الشراف المزدوج القلقة . طولها نحو ٨ م . لونها يستقر حل البياض الثلجي بعد ان تكون بياضاً موهجة بالوردي || ازهاره يستمر من ايار الى سيزران .

١٢٥٦٩ - زُقَيْر مَوْشَح * Zephyranthes versicolor (S). Zéphyranthe versicolore (F).

نوع من الزفير شرخه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه ضيقة مدنية الزام الاخضر طولها نحو ٣٠ سم . زهرته حلوية تركتزر حل زباد قصير يملو الشراف . طولها نحو ٥ سم . لونها يستقر حل البياض المفلط بالوردي يملو مويج اخضر . ازهاره يدم طولاً فصل الشتاء .

١٢٥٧٠ - زُقَيْر وَدِّي * Zephyranthes rosea (S). Zéphyranthe rose (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ١٥ سم . اوراقه ضيقة التصل المسطح طولها من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرته حلوية صغيرة القند تركتزر حل زباد مسطح يملو الشراف . طولها نحو ٢ سم . لونها ودي يملو مويج ليكي || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٢٥٧١ - زُقِيُوس * Ziphius (S). Ziphius (F).

جنس حيوانات بحرية لينة عظيمة الحامة من المحريات متألات الاسنان فضيلة التبريات . انواعها المروقة قليلة العدد اسطانيا ، مسطح بحار العالم || اجسامها كبيرة ، شبه وضية الشكل ، مأمدة الاثاق ، غروية الرؤوس الضخمة ، صغيرة الاعظام . انواها الى الخضار اللانس الازرق المويج ، بطنها الى البياض المسامي || سطحها الحياطي جامي . انواها متوسطة العدد الذي يراوح من ٥٠ الى ٢٥٠ زبياً .

١٢٥٧٢ - زُقِيُوم عَطِر * Zuphium olens (S). Zuphium olens (F).


حشرة قائمة من فصيلة الزفيريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وفضفاض مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر وما تستلح اقتناصه من الحشرات الدنيا . تتميز برائحتها العطرية المأمدة التي تم من وبيها حل به متمر || اجسامها صغيرة القند طولها من ٧ الى ٩ م . ثوبها الى الثلثة السراة تعلوها تزاريق سواء اللون . رأسها صغير الجرم ، اسود اللون . عيونها صغيراتان . زانها عيطان مستطيلان . ظهرها مستعرض الخضر لا يلتصق كامل البطن . جرابها نفضية . ارجافها خاسية المعق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلالة



زفيس



زفير من صر



زقار اللوز

ويؤخر النمو || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل
تركب الحاء عند ابط البراعم . تبدو غبراء اللون ثم حمضية،
تتوهم من نيسان حتى ايلول حيث يخفي أثرها || اضرارها
زهدية لا تستوجب المكافأة .

١٢٥٨٢- زَكَافُ أَشَقِّهِ الْعِلْمُ: ٥٠

Oxynotus rufiventer (S).
Oxynote à ventre roux (F).

نظائر من الجواهر مشروبات المنافع وفضيلة العنبريات .
أصغله من دسكندر ويضئ جزر المحيط الهندي . يألف
الغرائب والجلدات والجنات ، قوته الحشرات والآداب والمعلم ||
صغير الذئب ، حجمة حجم النوري ، ثوب الذكر
متداخل الأسود والأزرق والابيض اللؤلؤي . يطنه في
الفتحة ، ذئبه زاجي الريش ، مزيج بالأسود . ثوب
الانثى في الشفة المؤلفة بالاصفر التام || يطن منه في
الاجناب الرقيقة . الانثى تحضن منابذة الذكر من 4 الى
6 بيضات . التخصم يستمر نحو 14 يوما .

Eurytomus (S), Eurytome (F). زیتاق - ۱۲۵۸۳

يتميز طير من الجوارثم وأهانت المنابر وفصله الشرقايات ،
أنواعه المعروفة ستة أعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة
من العالم القديم - أجسامها قريبة الشبه بالشرقال
متاقيدا قصيرة مستعرضة الاشداني . اجنتها كبيرة ،
ذبرة الاطراف . اذنها مجعدة الطول ، عقيقة . الطرف
المستدير . ألوانها إلى الزرقاء السطام الحماج ومنها إلى الزرقية
الغضراء والحمراء للمناس - قمتها ألوان الجوز . والبدنان .

Crier (oiseau) (F).	زَقْب - ١٢٥٨٤
To cry (bird) (E).	زقّب الطائر : صوت .

Plutus (S) - 12080

Anhinga (F). Anhinga, Darter, Snakebird (E). الزرّج (ع)
طوّلوات الرش. أنصاعه لقليلة مياها بعض أهد
وبيرحات الشاطئ الحار. من أطوارها أنهما تمكث
في مكانها حتى يكتفي عليها تفريخ في الماء وتخرج
بهداً (ع) جسمها يرقص مستقيمة (ع) طليار
ع ٨٥ من ٩٥ سم. استعاطة إسطرابية بالغة الطول.
ورؤوسها صلبة مستقيمة. مستعاطة متفرقة السفلية الشكل
مفرقة الملاحظ. أنثاهما طرية. قوائمها قصيرة مستعاطة
الارتكاز الميكاني. أرفاقها قوية. أقدامها مسطرفة.
أوتها في السواد الخليل يلو سراج أحمر. رؤوسها
الكعبة السراء. ظهورها وبجوانها منقشة. أهداها
ونتها وكلامها غطلة بالأبيض. استعاطة ونقشها
جيرية (ع) قويا الأسماك والقشريات والفتافوخ. نمن
في الإبحار. أنثاهما تبغين من ٤ ل ٥ يعضها
مجانة ذكورها غير ٥ أشهر أنوعها الثامنة
والعالم.

Plotus vallanti (S). ١٢٠٨٦ - زنة باسلة

Anhinga vaillant (F).
نوع من البطة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية.
تكثر على ضفاف النيل وبحيراته وفي العراق وتركيا .
وهي لا تفارق المياه العذبة الا لتتبع على الاشجار او
مخبر الجرف . طولها نحو ٩٥ سم . قوتها ثوب جنسها
يكثر فيه اللوح الاخضر والازرق وتقل فيه قسمة
التنيش والابيض .

Plotus anhinga (S). * زج شالعة - ١٢٠٨٧
Anhinga vulgaire (F). Common darter (E).

نوع من الرقة. طولها نحو ٩٠ سم. فوجها قريب من
 شوب جنبها تكثر فيه الرقشة البيضاء. موطنها مناطق
 ضفاف الأنهار وبحيرات أفريقية الوسطى وأريكة الجنوبية
 والوسطى. وهي لا تفارق المياه الباردة إلا عند الاستراحة
 في ظاهرة النهار.

١٢٥٨٨ - زَكَرِيَّا ، زَكْوَى ، دَمَشَق .

Charadrius (S). Plover (F). Plover (E). جنس طير من فصيلة الزراقية. أنواعه عديدة صغيرة ومتوسطة الحجم. في معظمها يتجرب النائع والقياسات والرياح. وتكثير الأول في أسبانيا رقيقة. والآخر في رومانيا. اجنتها ذلقة. ارساها رقيقة نغيلة. الأولى تراكية الألوان. اذناها موشحة بظهور مسعرة في قوتها الحشرات والبهائم في اختلاف ألوانها. تشبه في القوس تدره في منظرها ما معرضه الجبلون وتكلمه بعض الحقائق الناعمة. انما تبيض ٣ أو ٤ بيضات غشياً وصلباً من اسمن.

١٢٥٨٩ - زكّاف الخوص.

هو الكتاب ، طائر من الزنقانيات ، اطلقه .

١٢٥٩ - زَكَرِيَّا بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُطَّلِبِيُّ

Charadrius hiaticula (S). Grand plover à collier
Gravelot hiaticule (F). Ringed plover (E).
نوع من الزرقاق كبير الجثة يتميز بطقه المستعرض
الاسود وبقائمه الجذوبتين || سره كبير الجلد .
يألف الكتيان الرملية ويصحب الأنهر .

۱۲۵۹۱ - زکریائی شامی، Vanness (F).

Peewit, Lapwing (E).
طائر يعرف باسم شهرته وهو أبو طيط ، أطلقه .

١٢٥٩١ - زَكْوَانِ فَهْمٍ *

Squatarola squatarola (S). Pluvier argenté (F). Grey plover, Swiss plover (E) .

١٢٥٩٣ - زَكَزَاقُ مُذْهَبٌ

Charadrius auratus (S). Pluvier doré (F). Golden plover (E).

نوع من الطيور الجارح يلاذ بحوض البحر المتوسط . ثوبه الشتوي يتخلل عن ثوبه الربيعي . ظهره اسود فلي يظهره صفراء شرجية الشكل ملحية . زوره وصدره ابيض . السراويل الالوان بياض توشم اصفر ويحيط اطراف ابيض . بطنه وعلوياته ونوكاه بيض . صياده ينقله وقائمه سود . اسرابه متوسطة العدد . يألف المروج والمراعي .

الملاحظات والبيانات:

Hoptoptare (F). ١٢٠٩٤ - ١٢٠٩٤

طائر من الطيريات يدعى نهو، اطلبه.



وَقَالَ أَنُصَرُّ الْبَطْنُ



قائمة



زقزاق قطبي



زقزاق مذهب

١٢٦٠٢ - زَقَاتُ الْأَثَلِ *

Stearapis squamosa (S). *Stéarapis des tamaris* (F).
حشرة من الناصعات طولها نحو ٣٠ م. ثوبها الى الخضر
الزبردي، حمار ظهرها الى السمرة يعاوها مراح امر.
يرقاتها تركب فروع واغصان الاثل فتفسد الخشب
وتعطب.

١٢٦٠٣ - زَقَاتُ الْخَوْخِ

Bupreste du prunier (F).
حشرة مشهورة باسم ناصعة الخوخ، اطباها.

١٢٦٠٤ - زَقَاتُ الدَّرَائِي

Bupreste noir du pêcher (F).
حشرة تدعى ناصعة الدرائق السوداء، اطباها.

١٢٦٠٥ - زَقَاتُ السَّنْدِيَّانِ *، ناصعة البَسَطِ
Coræbus bifasciatus (S). *Bupreste du chêne*,
Coræbe bifasciæ (F). *Oak burncow* (E). *Zwei-*
bindiger Prachtkiefler (D).

حشرة من الناصعات طولها نحو ١٥ م. ثوبها الى الخضر
المذهب || يرقاتها تعيش على فروع واغصان السنديان
فتفسدها وتؤذيها.

١٢٦٠٦ - زَقَاتُ الصَّنُوبَرِ *، ناصعة الصَّنُوبَرِ
Chalcophora mariana (S). *Bupreste des pins* (F).

حشرة من فصيلة الناصعات طولها نحو ٢٨ م. ثوبها
الى الحطبي الاسفع الملبج يتعرق الى الاسود في آخر
مهيحا. طيراتها سريع زق || يرقاتها تركب قلف
الصنوبر فتفسدها وتعطب الشجر.

١٢٦٠٧ - زَقَاتُ الْوَرْدِ

Bupreste du rosier (F).
حشرة تدعى ناصعة الورد، اطباها.

١٢٦٠٨ - زَقَاتُ نَسَاعِيٍّ الْبَحْجِ *

Buprestis novemmaculata (S). *Bupreste à*
9 points (F). *Buprestis novemmaculata* (E).

حشرة غاشقة عاشبة من فصيلة الزقنوبيات ورتبة غديات
الاجنسة. موطنها يعم معظم اسماح حوض البحر الابيض
المتوسط. تألف المواق التي يكثر فيها الصنوبر والبروز
والشربين والسرور. خنافسها تعيش على ما تقتضيه من نصل
الارواح. يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون ان تتعدى
على الشجر || جسمها متوسط القد بطول من ١٥ الى
٢٠ م. ثوبها الى السواد الاسفع المراح. غدها وكوسلها
مقبحة بالاصفر. رأسها صغير أجرم يهوى تحت الكوسل.

عيناها كبيرتان بارزتان. زباناها غشيان، منفرجان.
فكهاا ضليمان. كوسلها قبلي الشكل. ظهرها مستدل
الاحاديذاب. غدهاا بليغتا التصغير المتوازي المخطوط

القلبية. ارباعها خاسية السفل || الانثى اكبر قدما من
الذكر واضخم بطنها من واكد ثوبا || جيلها ثنائي الحول.
تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر
الربيع. تسرح في الجبال وقيوت في الابل || اليرقة بطيئة
التنود لتدرك الكمال الجسموري بعد التفت بنحو ١٢
شهرا. جسمها مستطيل المقدم، مستقيم المؤخر، بطول
نحو ٤٠ م. ثوبها الى البياض الاخير. رأسها اسمر اللون

١٢٥٩٥ - زَقَاتُ مَطَوَّقٍ *

Charadrius dubius curonicus (S). *Plover à collier*,
P. de rivage, *Gravière*, *Alouette de mer*, *Gravelot*
naie (F). *Lesser ringed plover* (E).

نوع من الزقاقات صغير القد، اسود المنقار البسيط،
مستدير العين الكسلا، مطوق الصدر، احمر القامة،
واقدم || سره متوسط العدد. يألف المنابع وصفات
الانهار والشلوط.



زَقَاتُ مَطَوَّقٍ

١٢٥٩٦ - زَقَاتُ نَاعِصِي

Hoploptère épineux (F).
مائل يدعى نهيوخ ناعص، اطباها.

١٢٥٩٧ - زَقَاتُ الْبَايَاتِ *
Charadriidae, *Charadriidae* (S). *Charadriidae*, *Charadriidae*, *Charadriidae* (F).
Charadriidae, *Charadriidae* (E).

فصيلة طير من رتبة طول الساق. اجناسها واتواعها
عديدة متماثلة الاشكال والاختلاف والمادات. تتميز
بسمة دمها على الارض وبمنقارها المركبة من جزين جز.
غشوري يمتد من القاعدة حتى ثلي المنقار يسير قري
يكون الثلث الاخير حيث الطرف والمقلط.

١٢٥٩٨ - زَقَاتُ شَرْدٍ
Gezoullier (F).
To chirp, *To warble* (E).

زقاق ورد الحاتر : ربع سرته وطرب به. والزققة شاملة
لجميع الناصيات اما التفريد فناسع ببعضها.



زَقَاتُ



زَقَاتُ الْأَثَلِ

١٢٥٩٩ - زَقَاتُ *، تَمَلَّةُ الْأَرْجَنْجِيْنِ *

Iridomyrmex humilis (S). *Fourmi d'Argentine* (F).
Argentine ant (E). *Argentinische Ameise* (D).

نحلة صغيرة القد، دقيقية الجسم، تطول نحو ٣ م. ثوبها
الى السمرة الحطية. صدرها بيزامزدا اقل سمرة من رأسها
وطيها. النسل الكسامة الشق، الجفنة، تطول نحو ٦ م. ||
تقيم زبها في أي مدع كان ان داخل المنازل ام خارجها.
جراتهم كيرة. عددها بعد ثلاث سنوات لا يقل عن
٢٠ ألفا وقد يبلغ ٤٠ ألفا بعد خمس سنوات || حاملاتها
شديدة النشاط. سرعة الحركة : تسحر على مسطح انواع
التبيل. صر قفها يتكثبا من ولوج جميع الاساكن لذلك
قنها لا حد له لانه يشمل جميع المواد الغذائية واخصها
الحصوم والمواد السكرية || يقال انها انتقلت من الاربعينين
الى قضى اماكل اوروبية منذ ثلاثة اجيال. وانتقلت من
اوروبية الى اساكل الشرق الابيض بنفس الطريقة. وهي
الآن من حشرات سواحل حوض البحر الابيض المتوسط.



زَقَاتُ السَّنْدِيَّانِ



زَقَاتُ الصَّنُوبَرِ

١٢٦٠٠ - زَقَع

Chant du coq (F).
Crowing of the cock (E).
هو صياح الديك. وقع الديك : صلاح.

١٢٦٠١ - زَقَاتُ النَّاصِعَةِ
Bupreste (F).
Buprestis, *Golden beetle* (E).

جنس حشرات من فصيلة الناصعات انواعه عديدة جميعها
حيلة الشكل والالوان الزاكية الناصية الملبج. تعيش
في المناطق المعتدلة الحارة. هي ضوئية اللوح سرية
الطيران والحركة || رقاتها غاشقة تعيش على مختلف
الاشعاب وعلى جذور وسوق النباتات العشبية.



زَقَاتُ نَسَاعِيٍّ الْبَحْجِ

قليلة منها المناطق الاستوائية. جلبوها بحظيرة تنود في الماء. سيقانها ذات سحنة. لورائها قرصية الانتساب، خضرة التجميع، بتلية الشكل، فضلة النصل المخنث الشارب الأطراف. أزهارها فردية محورية لاسقة. يقال إن لورائها تنقب بالزحار وتنقل بول الدم.



زيتون فكام

١٧٦١٨ - زَيْتُونَة * Helicobesidium

نظر مجهرى من الكثرات يتطفل على العديد من النباتات انصها الثقل والزفوران والجوز والشوهد والمخيون والحم واللوفوف والحماض والقطن والقرنفل... || مركب الجذور عند انتشارها فيمنطقها بنماتة وبماتة القرية الخلية الحمراء التي إلى أن يتقي عليها || يكلف يستمال مركبات القيتول وينهم من استمال الملح بمعدل ٣ كيلو في المتر المربع وذلك عند غلو التربة من النباتات.

١٧٦١٩ - زَلَّة * هو فرخ القاطنة.

١٧٦٢٠ - زَكَاة

الزكاة : ما انخرجه الله من الثمر (التاجر).

١٧٦٢١ - زُكَم * هو الخنا، اطله.

١٧٦٢٢ - زَكَاة * Cytologie (F), Cytology (E).

هي السيتولوجية أي علم الخلايا. وهي علم يبحث في ماهية الخلايا وتطوراتها الحياتية من جميع النواحي أن جسموية أو كيميائية أو خلافا.

١٧٦٢٣ - زَكَاة حَيَوَانِيَّة * Cytomologie (F), Cyozoology (E).

فرع من الزكافة يبحث في ماهية الحيوانات.

١٧٦٢٤ - زَكَاة نَبَاتِيَّة * Cytobotanique (F), Cytobotany (E).

فرع من الزكافة يبحث في ماهية الخلايا النباتية.

١٧٦٢٥ - زُكْبَة * Sperme des insectes (F).

Sperm of insects (E).

هو إفراز اللقد التناسلية الذكورية عند الحشرات.

١٧٦٢٦ - زُكْبَة * Cytoblaste (F), Cytoblaste (E).

الزكبة جيلة الخلية النباتية.

١٧٦٢٧ - زُكْبِي * Cytologique (F), Cytologic (E).

كل ما هو خاص بالزكافة أو علاقتها.

١٧٦٢٨ - زُكُون، زُكُون، زُكُون * Zaccen, Zacon

هو الحلق من السلايات، اطله.

١٧٦٢٩ - زُكْبَة * هي الإفاتوسه، اطلها.

١٧٦٣٠ - زُكْبَة، صُرْكة * Sore (F), Sorus (E).

مجموعة الاعضاء التناسلية في بعض الفطور.

١٧٦٣١ - زُكْبَة المُلْكَة * هي مرة السمر، اطلها.

١٧٦٣٢ - زُكْبَة * Zilla (S).

Zille (F), Zilla (E), Stachelkohl (D), Zilla (I).

جنس نباتات شبيهة برية محولة من فصيلة الصليبيات.

كالنكين واللامس والشرج || طور الاكمال الذي يتم في آخر سرداب تحفره البرقة يستمر نحو ٣٠ يوما ويتقي ضمن صلجة غاوية مركبة من نشارة الخشب المصبو بالرياح.

١٧٦٣٩ - زَيْتُون فَصَام * Capnodis carbonaria (S), Capnode carbon-

nier (F), Capnodis carbonaria (E).

حشرة خاضعة لناعمة خضية من الزيتونيات ورتبة مفصلات الاجنحة. تألف الموائل التي تكثر فيها اشجار الورد والخروج. خنافسها تعيش على الاوراق والبراعم. يرقاتها تتجمل الشكير والخشب وتغلب الجلود تحت سطح التربة || جسمها كبير القدر يعلو من ٣٥ إلى ٤٠ سم. ثوبها الى السوداء القطنية تملو حلة مملو. رأسها مستعرض الجرم. عينها كبريتان. زباناها خيطيان. ظهرها ذات الحوض، مستند الطرف القارعة الاخفش. خدماها شديقتا الصلابة. ارساها خامة المعقل || جيلها ثنائي الجيل. الاثنى اكبر قدما وانصر زبانا. تظهر من نيسان الى حزيران وتعيش نحو ٢٠ اسبوعا || البرقة دقيقة مرقاة بلطية التنو. طولها نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى البياض الاخضر. رأسها اسود. فكاها ضليمان.

١٧٦١٠ - زَيْتُونِيَّات * Buprestidae (S).

Buprestidés (F), Buprestidae (E).

وتعرف بالناصعات وناصعات البقر. فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اطلب ناصعات.

١٧٦١١ - زُكُوم * Elégne, Chalef (F).

Zakkoum-oil plant (E).

هو الخلاف، اطله. ورته يلحم الجراح سريعا ويملو الكلف. وسائر اجزائه تنفع من رجع المفاسل والسا والقرس. ويدهن افضل منه.

١٧٦١٢ - زُكُوم بَلَدِي * هو الخلاف الفسق الورق، اطله.

١٧٦١٣ - زُكُوم لِفِي * هو الخلاف الفقي، اطله.

١٧٦١٤ - زُكُوم مَهْدِي * هو الزبيون الاكادين، اطله.

١٧٦١٥ - زَيْبَات * Ascomycètes, Eumycètes (F).

Ascomycetes, Eumycetes (E).

رتبة الفطور الزقية من شعبة الفطريات. تتميز بانحياز شربها وانفصال شيجها وتشبهه وانسيته اللوني. تكاثرها رتي. ارقاها البرقية ورتبة التجميع || وهي تقسم الى مرتبتين : القشريات واللغفيات. أما فصائلها فست. الخثرات والمجيدات والقييات والقييات والمطويات والخثرات.

١٧٦١٦ - زَيْبَة اللسان * Ascoglossa

مرتبة من الرغويات ألمدية.

١٧٦١٧ - زُكْب * Pistia (S).

Pistia, Codapill floatant (F), Water lettuce, Tropical duck-wood (E), Wasserzalat (D), Pistia (I).

جنس نباتات نجمية مائية من فصيلة القلقابيات. انواعها



زك



زكبة

1٢٦٤٣ - زُحَابَة ٥ Zelocova, Abelica (S).

Zelcova, Késki, Orme de Sibérie (F).
جنس اشجار حرجية من البقيعات وفصيلة الانجيرات .
انواعه قليلة . اشجاره كبيرة القد تصل من ١٥ م ٣٠ م .
انتاعده ثنائية الانتساب . اوراقها ثنائية الصنف ظاهرة
البروق ، بيضية الشكل ، مسننة الحافة ، قصيرة
العتق . ثمارها باسمة بحجم الحمص .

1٢٦٤٤ - زُكَم ٥ حوب القزم ، اطلبه .

1٢٦٤٥ - زُكَم ٥ ، وَيَر Dendrohyrax

جنس حيوانات لبونة قاسمة من فصيلة الدماينات .
انواعه ٦ موطنها الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية .
انواعها سوية اللون الازيد الاكمل . موطنها الى الصغار
التي . راجلها العليا غليظة ، مبرها جاحشة . قوائمها
قصيرة . اذانها ثنائية الاطراف ، تألف الاجراع والفايات
وتتسلق الاشجار بخلاف الانسان الذي لا يقوى على ذلك .
قوتها اثنان ونواحي الاشجار وبعض الاعشاب . اذانها تقع
من ٣ الى ٤ اداوس ترصعا من ٦ الى ٧ اسابيع .

1٢٦٤٦ - زُكَمَاء ، صُكْرَة Faucon femelle (F).

الزباء والصقرة : أنثى الصقر . Female hawk (E).

1٢٦٤٧ - زُكَمَة Caroncule (F). Caruncle (E).

قال الخليل : الزلة تكون للحم في لحمها معلقة كالزمر
ولها زلتان .

1٢٦٤٨ - زُكَمَة ، شُؤْرَة Gabarit, Gabari

أخوخ أو رسم أو تخطيط شيء ما بشكله الحقيقي وكامل
قياسه الحقيقية الواقعية .

1٢٦٤٩ - زُكَمَة Fleurs de myrte (F).

الزك : نور الريحان . Flowers of myrtle (E).

1٢٦٥٠ - زُكُل ، إِنْزَلَق Glissement (F).

Sliding, Slipping (E).
حالة الشيء المنزلق أو حركة انزلاق الشيء .

1٢٦٥١ - زُكَيْفَة ٥ Oncidella (S).

Oncidella (F). Oncidella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات ممليات الارجل
الزوية وفصيلة الزنجيبات . انواعها المتناسرة المعروفة
عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المحتلة الحارة ||
اصداؤها معتلة اللحم ، ثنائية المصارع الانتساوية ،
شبه اهليبية الشكل ، قليلة الاحدياب الصاصي الاتحاد
يلونها من القمعة الى الطرف الخلفي اخمدي نافر غروي
الشكل يضيق مع اقترابه من القمعة .

1٢٦٥٢ - زُكَيْفِيَّات ٥ Oncidiidae (S).

Oncidiidae (F). Oncidiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات ممليات الارجل
الزوية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || اصداؤها ثنائية المصارع الانتساوية .
تمتدح على الصفور والنبوت البحرية القريبة من الشطوط .
سرحها دجوي || اشهر اجناسها الزكيفية .

1٢٦٥٣ - زُكَيْفَة

اسم سمكة بحرية يطلق على الكبدية المشفراء (Vicille)
ويطلق على الزطوق (Savonnier) .

انواعها المعروفة اربعة منبتها الشرق . اوراقها حرجية .
ازهارها ليلية . يقال انها لا تنقل من بعض المنافع
الطبية .

1٢٦٥٣ - زُحَاب ٥ Cronartium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزغاييات يتصل بالمصنص
الميرة التالية :

- ١ - مفاكه تنيش وتكاثر تحت ادمة النبات المنحار .
 - ٢ - صفاته الانثوية جرابية المسائل وجيوب عاقلها
تتلف من بويئات ثملوية السطح .
 - ٣ - ذماته وسادية متضبة رباعية الاخية .
- انواعه عديدة تنقل على اوراق واغصان النبات اشهرها
واعرنها ما يلي .

1٢٦٥٤ - زُحَاب الصُّوَر ٥ Cronartium ribicola, Peridermium strobil (S).

Rouille des pins à 5 feuilles (F).

فطر مجهرى يتصل على اعداب الصنوبر فيطبا ويصيب
ذويها وسقطها . ويصيب الحاء فيقرحها ويتغشاها
ويصلب الاشجار وقد يقيد الى اليابس .

1٢٦٥٥ - زُحَاب الصُّوَر ٥ Cronartium flaccidum, Peridermium coruni (S).

Rouille de la pivoine (F).

فطر يعيش طوره الاثدي على لحاء الصنوبر وطوره
الحامى على الفواكه . مظهره الخارجي على الصنوبر
حصف لا قياسي الشكل والحجم لونه يتأرجح بين الاحمر
والاصفر مركب الاغصان والافان من اوسط ايار الى
اوائل تموز فيقرح الحاء ويصلب الاغصان المصاة .
وهو على الفواكه يقع لقياسه الشكل والحجم والتجميع
تركب نصل الاوراق على صفحتها السفلى تسحب انقلاخ
البشرة وانفجارها ثم صلب السيج وذيله .

1٢٦٥٦ - زُحَابِيَّات ٥ Cronartiacae (S).

Cronartiaceae (F). Cronartiacae (E).

فصيلة فطور مجهرية من ربة الدماينات قليلة الاجناس
والانواع . تتميز بعلاماتها الانثوية الشكل والتجميع .
اثيراتها جرابية تملأ سطح الانسية المنحارة . ذماتها
وسادية أو هدية لشكل . بويئات صنفرة كروية .
اعرف واشهر اجناسها الزحلاب والكروبيكس .

1٢٦٥٧ - زُكُلِي ٥ Sismique (F). Seismic (E).

نعت تعريفى يطلق على كل ما له علاقة بالزلازل وبالزلات
الانسية .

1٢٦٥٨ - زُكُلُخَتْ ٥ هو الاندخست ، اطلبه .

1٢٦٥٩ - زُك ٥ Garçure (F). Chap (E).

شقوق سطحية في اطلاب شروح البقر والمزرى .

1٢٦٥٠ - زُكَب ٥

زلب وزلب زال تمام : وبر اي نبت عليه الور .

1٢٦٥١ - زُك Parc (F). Park (E).

الروضة المتفرقة الريانة جادت مياهها وكثر طيرها .

1٢٦٥٢ - زُكُوم ٥ Muscu des canides (F).

Muzzle of canidae (E). هو غلم الكليات والشملا .



زحلاب الصنوبر



زحلاب الفواكه



زلم



زكبة

ظهور مشج بالايض والابيض الاكثر والاسود. قوامه ومناكه وطرائق نمائه جيد. بطنه وباطن مقعده وكعته بيض. وصداه الى الرمة الزرقاء. الذكر اصفر جنة من الاثني واثنى لونا واصلب شكية. عيوب البلاد في طلب القوت والمصيف والمشي. يات الجبال والقباب والارواح. يثن منه بين فروع الاشجار الباسقة. انشاء تحسن من رقتين الى ثلاث رقات نحو الشهر. يئلس قوته عنه الصالح الباكر. يرغب في الجيت اللثة ينشرها مها كانت جلوسها قاسية.



زيلة

١٦٦٠ - زُمَاحِيَّات
Sarcophages
فضيلة من القصور تنتمي الى رتبة الجوارح. اجناسها الحالية تلية تشمل الزباج والكتور.

١٦٦١ - زُمَاح
Cry de l'astruche (F).
Cry of the ostrich (E).
صوت القملة وفي الصلح صوت النعام.



زاج

١٦٦٢ - زُمَاحُ *
Berita (S).
Fisteur (F). Morning-clock (E).
طائر من فصيلة القرايات. انواؤه المروعة ثلاثة موشيا استرالية وصيانية. يات الير والارواح البصرة الاجمار ويقتر من الاساكن الاطاة ولتالز الرقية. جسمه كبير القد بطول نحو ٤٢ سم. قوه اسود اسم. لثاله وظهوره الى البياض الاخير. لواحض جناحه وذنبه الى البياض الناصع. منقاده غرغري الشكل ازرق اللون. حلقة عينه كسنية. جناحه كبير القد بلفظ اللب. ذنبه فيه مقطوع الطرف. وصداه الى السمرة السوداء. اخلاعه هنية. من مزاياه انه يهاجر فريدة الحانه منذ الصباح الباكر. يقات صوته قريية لثبه بختات الزمار ما دعي الى تسميته بالزمار. قوته الاشرار على اغلاط اجناسها وانواعها وانصها الكبيرة ينشأ الجراد. يثن منه في الاجبار البازية لظل المعتدة الانقاع. الاثني تحسن من موتين الى ثلاث سرات في الخيل. حشمتها تراوح من يعضتين الى ثلاث يعضات تقوم بترغيبها دين الذكر الذي يئن لما النداء.



زاج ملكي

١٦٦٣ - زُمَاحُ الرَمَلِ
طائر من القنقع. اطلبه.

١٦٦٤ - زُمَاحَاتُ البَحْرِ
Synagchidae (S).
Synagchidae (F). Synagchidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شعيات البحر اجناسها وانواعها عديدة اشهرها زمارة البحر وسمان البحر.

١٦٦٥ - زُمَارَة البَحْرِ
Synagchus (S).
Synagchus (F). Synagchus, Pipe fish (E).
جنس اسماك صغيرة سميكية. اجسامها غريبة الشكل دقيقة المؤنر المتسلف كالصين. وروسيها مستطيلة كالقنار الانطس الطرف. تحمل زعنفة ظهرية واسعة تقابلها فيه زعنفة بطنية متناحية في الصغر. انواؤه عديدة موشيا. جمع بحار العالم. اسمها واشهرها زمارة البحر الابرية.

١٦٦٦ - زُمَارَة البَحْرِ الابرية *
ابو زُمَارَة
Synagchus acus (S). Synagchus algutia, S. trompetta, S. serpens de mar (F). Needle pipefish (E).
نوع من زمارة البحر بطول نحو ٥٥ سم. تكثر في البحر الابيض المتوسط وقرب شواطئ المحيط الاطلسي.

زمارة البحر الابرية

١٦٦٥ - زُمَاحِيَّة *
Brugnon (F). Nectarine (E).
هي الياض ثمرة اللدراين مها كان شكلها وقد صار اسنادها الى التار المرطاة البشرية. ج زليق.

١٦٦٥ - زُمَاحُ
Zillo
مادة سامة ترتكز على مشقات التالوم. عرضها التجاري المعروف ياتي على شكلين: الشكل الاول حبوب مسبوكة تستعمل القضاء على الفيران والكمبار والمانجس. والشكل الثاني مجوهر وضع غصيصا للاستعمال في مختلف انواع العلوم وهو يفتني على الجرذان والرايات والكمبار واشباهها. اما يجب على كل من يستعمل مستحضرات الزليو ان يكون ملدرا فيبعدا عن متناول الطيور والحيوانات الداجنة لانها مؤذية وقد تكون مية.

١٦٦٥ - زُمَاحُ *
Herpethocherus (S).
Macagus (F).

جنس طير من حارة البزاة وفصيلة الصقريات. انواؤه قليلة جميعا من الجوارح الصغيرة القد طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. انواؤها موشية بيوشة قلب فيها الجوزة. ارياضها شاسعة. وروسيها غليظة. مناسرها قوية عمودية. سواقطها مسطبة. اذناها مستعدة. ارساها ثنية. غالبها حادة. الواحدة زجبة. ارساها قليلة العدد. تجويز البلاد في طلب المصيف والمشي. تألف عماري الماء وطرائف العبابات. قربها الاناوي والعظاء والعمريات واغرات وبعض الاسماك. يقال انه لم ياكل احد من لحمها الا مات. قال الشاعر:

«أهل الهدي أصبحت لم عرو
ليت شمري أم ظلفا الزباج»

١٦٦٥ - زُمَاحُ
Sarcophages
جنس طير من كواسر القصور وفصيلة الزباجيات. انواؤه قليلة جميعا كبيرة اذقة بلقاء الثوب. وروسيها وانعناها غفيرة. سواقطها العبابات. ارساها سرسة غالبها قوية. قربها الجيت اللثة ومنهم من قال ان الزباج ياكل اللحم من ماله. اعرف انواؤه واشهرها الزباج الملكي وزباج امريكية.

١٦٦٥ - زُمَاحُ كليفورني
Pseudogryphus californianus (S). Sarcophages de California (F).

طائر من الزباج طول نحو ١٢٠ سم. وبسطة مقعده ٢٥٠ سم. ثوبه اسود. مقعده ابيض. رأسه اغفر الرشي. كبير المرفوف. اجسد الاذن والزلة. غليظ المنسر. الاصف البيرة. يثن منه على الحفصين وبين غشائيت المنصور في الجبال الربية. اثناء تحسن من رقتين الى ثلاث رقات نحو الشهر. يئلس قوته طول النهار. يرغب في الجيت اللثة مولده امريكية الشالية انصها كليفورنية.

١٦٦٥ - زُمَاحُ ملكي *
Sarcophages gyparcus papa (S). Sarcophages royal, S. papa (F).

طائر من الزباج يعرف باسم ملك القصور طول نحو ٩٠ سم. وبسطة مقعده ١٩٠. رأسه اغفر الرشي خري اللون. منسره غليظ الشكل اسود الانتشاب اخر الهيكل اسمر البيرة المقطوعة المقطاة. عرق يرتقالي اللون. عنقه اغفر اصفر. جثيق مطوق بالازرق.

Plumes sus-caudales (F). **زُمُجِي** ١٢٦٧٦
Sus-caudals feathers (E)
من ريش ذنب الطائر مركزها بين الانفك والزنكي .
منهم من قال اصل ذنب الطائر (Croupion) .

١٢٦٧٧ - **زُمُجِيل** ، **لَحْشَنَالِيَه** ، **زُرْبَقِي البَر**
Lachenalia (S). Lachenalia (F). Tiger lily (E).
Lachenalia (D). Lachenalia, Giglio leopardo (I).
جنس نباتات صليبية من فصيلة الزنبقيات . انواعه كثيرة
البلد . اوراقها صفيحة الشكل . ازهارها سنبلية او
عقودية التجميع يحسبها شراخ اجوف رفيع . اشهر
انواعه البزينة ما يلي .

١٢٦٧٨ - **زُمُجِيل سَحْبِي**
Lachenalia orchoides (S). Lachenalia-orchis (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه صفيحة الشكل لحية التسج
حرفية الخطار المنزج || شراخه يعلو من ١٠ الى
٢٥ سم . ازهاره سنبلية التجميع ، جرسية الشكل ،
عاطرة البتلات ، عطرية الرائحة ، يمشد اللون يطوها
مواج ازرقة او صفراء اللون يطوها مواج اخر || ازهاره
يدوم طوال شهر ايار .

١٢٦٧٩ - **زُمُجِيل مُعَدَتِي**
Lachenalia pendula (S). Lachenalia pendula (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه صفيحة الشكل لحية التسج
تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ || شراخه
يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل ،
عقودية التجميع . متدلية الاوتكار . تحمل صفان من
البتلات الخارجية اقصر من الداخلية لونها الى الحمرة .
اما الداخلية فتصلها بتسجي اللون ومقصبتا لضيقة .
ضروبه عديدة تتميز بالوانها || ازهاره يستمر طوال
كانون الاول والثاني .

١٢٦٨٠ - **زُمُجِيل يَاقُوتِي** *
Lachenalia rubida (S). Lachenalia rubis (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه سنبلية الشكل تطول من ١٢
الى ١٦ سم . وتعرض نحو ٣ || شراخه يعلو من ١٥ الى
٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل عقودية التجميع تعد
من ٥ الى ١٥ زهرة لونها ياقوتي تلبثها الخارجية اقصر من
الداخلية || ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .

١٢٦٨١ - **زُمُحَاط** *
Clasterosporium
جنس ظفور بجمرية من عمار الريديانبات وفضيسة
الحماضيات ، كنانده يضيئة ، مستطيلة ، مدورة ،
جانبية التقسيم ، تذكر حل حيث غليظ يقوم مقام
الجرب || انواعه قليلة ، اعرفها زحاط ابن وزحاط
الشوكر .

١٢٦٨٢ - **زُمُحَاط البُن** *
Clasterosporium coffeanum
نظر بجمري يركب اوراق البُن فيزفيا || مظهره
الحماضي يقع صغيرة مبرقة تملو النصل حل صفحته
الغليا . ثيلد صفراء اللون ، سمره الخطار تسع وتضرب
على السرة يطوها حل قليل الكثافة اشهر اللون يقدوما
الى الذوبان واليباس .

١٢٦٨٣ - **زُمُحَاط الشُّوْكَر** *
Clasterosporium putrefadens
نظر بجمري يركب اوراق الشوكر فيسبها || مظهره

Hétérogénéité (F). **زَمَاع** ، **زَمَع** ١٢٦٧٧
Heterogeneity (E).
هو علم الانجسام الجسوري والشكل الذي يعلو بين
عختلف افراد القرب الواحد في الموقع الواحد .

١٢٦٨٨ - **زُمَاعَة** *
Pleurotoma (S).
Pleurotoma (F). Pleurotoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الاربيل
وخصلة الكريزيات . انواعها المصاهرة المروقة عديدة
منتشرة في مغار بحار البلاد الحارة || اصنافها غروطة
محلقة ، دقيقة الاطباق ، مستطيلة الفتحات الميزابية
الاطراف ، حيلة الاثوان والثراريق والثريرة . اسفاتها
قوية للمادة .

١٢٦٩٩ - **زُمَالَة** *
Bécillière (F).
Livestock trailer (E).
الزالة شاحنة معدة خصيصا لنقل البهائم .

١٢٦٧٠ - **زُمَام**
Herbes hautes (F).
High herbs (E).
هو العشب المرتفع .

١٢٦٧١ - **زُمَالَة**
Invalidité, Incapacité de
travail (F). Disability, Incapacity for work (E).
صفة ما هو لاشري او غير مستوفي الشروط ، والسيور
والقصور وعلم الاحلية .

١٢٦٧٢ - **زُمَت** * ، **أَبُو قَلَسُون**
Pyrrhocorax (S).
Chocard, Corbin chocard (F). Chough (E).
طائر من الغربان ريع الجفة طول نحو ٤٠ سم . ثوبه
اسود اللون اخضر المروج . منقاره اصفر ، عيناه صليتان ،
رساه وغاليه حر || موطنه حوض البحر المتوسط . يعيش
اسرابا كثيرة العدد . قوته الديدان والحشرات والحبوب
والثآليل اصصها البنية || يمش حقه في صووع للصخور
والخاوير . الاثني تحضن وسدحا من ٤ الى ٥ بيضات
لونها الى الياض الالبر يعلو ثقبه اصفر .

١٢٦٧٣ - **زُمَت الجُرْدَة** * ، **عَبِيَق** *
Pyrrhocorax alpinus (S). Chocard des Alpes (F).
نوع من الزم وتو هو طائر من الغربان ريع الجفة طول نحو
٤٢ سم . ثوبه الى السواد الاخضر المروج . منقاره الى
الصغار الحظي . عيناه غرنوبيتان . رساه وغاليه الى
الحمرة الجردية || موطنه جبال سويس البحر الابيض المتوسط
يجبرها الى الحماض والريديان في فصل الشتاء من يمد اليها
في اواسط الربيع || يأنف الحياة الجماعية ، سره لا يقل
من ثلاثة ازواج ولا ينفك المشرة || قوته الحشرات والديدان
والقشريات والحبوب والثآليل ولا يمش من جيفة ايها
شامدا || يمش في صووع الصخور وفي المغاور والاطلال .
اثناء تحضن وسدحا من ٤ الى ٥ بيضات تبنيها اللون خطية
الرقعة اللامسوية التوزع .

١٢٦٧٤ - **زُمُج** هو الزجاج ، اطليه .

١٢٦٧٥ - **زُمُج الماء** * ، **لُورُوس** ، **لُورُوس**
Larus (S). Mouette, Golland (F). Gull (E).
جنس طير من رتبة كليات القدم طوليات الريش
الابيض . يطرن اسرابا فوق الماء فينتظن من السلك .
انواعه عديدة منها الجركة والحوري والدغبة والدنكة
والروروس والزردي والسكي والسويدي والعصبة والروروس .



زَمَاعَة



زَمَت



زَمَت الجُرْدَة



زَمُج الماء



زَمُجِل يَاقُوتِي



زَمُحَاط الشُّوْكَر

١٢٦٩٣ - زهرة في الزراع ، راجع .

١٢٦٩٤ - زهر ، زهر ، قطن ، Croupion (F).
Parson's nose (E).
منبت ذنب الباطر .

١٢٦٩٥ - زهر ، Haloragae, Cercodiales (S).
Haloragae, Cercodiales (F). Haloragae, Cercodiales (E).
فصيلة نباتية من بدايات الالوان ، ذات القلقتين ، مستطيلات القلقات ، ملتصقات الجص ، اجناسها ثمانية



زهر ، زهر

اما انواعها فنحو ١٠٠ نباتاتها اشباب وينيات بعضها مثقبي ويلي . ازهارها غشوية صغيرة القذ غطسلة الالوان .

١٢٦٩٦ - زهر ، Dessalage, Dessalage (F).
Removal of salt (E).
الزهرلة ازالة الملح من الماء .



زهر ، زهر

١٢٦٩٧ - زهر ، Equisetum
جنس تطور مجهرية من فصيلة الزهرليات يتصل على بعض النباتات الزينة فيؤذيها بعد ان يجرد اوراقها ويلوي غشيبها || اشهر انواعها واورقها الزهرلي الياباني .

١٢٦٩٨ - زهر ، Equisetum japonicum, E. azaleae (S). Fausse-
cloque de l'azalee, Galle foliaire de l'azalee (F).
Azalea galls (E). Ohrtappchenkrankheit der
azaleen (D).
فطر مجهرى يتصل على الجلسان (ازاليه) فيؤذي ويجهت .



زهر ، زهر

مظهره الخاربي يجهت في الاوراق وتشويه في البرام والنواهي التي يملونها القطر حيث تبدو كأنها منطقة بارسية خلية بيضاء اللون تكثف بعض الوريقات تقبب تقلص الخشب وتحول فيها المواد النشوية الى سكرية . يكاثف بقلع الانصاف المصابة وينضج النبات بسائل يورده المركز ١٪ او يسهل الفواطر الحجرية .

١٢٦٩٩ - زهر ، Exobasidiaceae (S).
Exobasidiaceae (F). Exobasidiaceae (E).
فصيلة تطور مجهرية من رتبة العاصيات . اجناسها

وانواعها نحو ٦٠ منها تطور مرضية العاصيات تتكون بين الخلايا النباتية هييفا قشيف البنية رزني الصمغ ينشأ تحت الطبقة الادمية . وبها تطور دويبة العاصيات التشمية البسيطة المراثت الخيطية المتصلة || اشهر اجناسها واورقها زراعي الزهرلي .

١٢٧٠٠ - زهر ، Période (F). Period (E).
اسم شامل يدل على الوقت وهو عليه المقام . فالزهر المطبق وهو من اجناس القلقة ، حالة استمرارية لا نهاية لها ولا علاقة لها بالمادة او الحركة || والزهر في العلوم الطبيعية كالفلك مقاييس لاعداد وجودي لا علاقة له بالمكان || والزهر النفسي الذي يقاس بظاهرة طبيعية معينة كدوران الارض حول الشمس يدعى الزهر النفسي || والزهر الحسلي هو الحقبة التي موت بها الارض في تكونها .



زهر ، زهر

١٢٧٠١ - زهر ، Fonte de neige (F).
Melting (E).
الزهرلة سيلان الثلج بعد ذوبانه .

الخاربي يقع صغيرة مستديرة حطية اللون مرمر الحار يملونها خل لفي تركيب الالوان قشيبها وقد تصيب المشائل قشيبها .

١٢٦٩٤ - زهر ، Gasterosteus aculeatus (S). Epinoche commune (F).
Stickleback (E).
سمكة بحرية من فصيلة الزهريات . صغيرة القذ طويلا

من ٣ الى ٥ سم . جسمها عديم القلوس . واورقها ثلاثية . تشبه بالاشكالها الناقلة للثغرة القذ ، ثلاث منها ظهريه وواحدة بطني .

١٢٦٩٥ - زهر ، Spinachia spinachia (S). Epinoche de mer (F).
Pride-back (E).
سمكة بحرية من فصيلة الزهريات . اصلها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . تألف معاش

المحاش والتغاث . الاثنى عند اقتراب زين الثغرة ، من نسيان الى حزيان ، تسلم مع الذكر عشاً من اثث تحبكه بين النباتات البحرية وتلتصق بمادة غروية قفرزها الكلي . الذكر يحرس على السر ولا يغادر البش الا بعد التلح || جسمها صغير القذ ، نحيل الجسم ، بطول من ١٣ الى ٢٠ سم . غطها مثل الاسطاة . فها سنن للكلين . جسمها عديم السيف باستثناء الجانبين المجهزين بنسور ، ٤ صفوف . زهرتها الظهريه خلية الازنكار يستيقها صف من المناس يد من ١٣ الى ١٥ . زهراتها المحوية صغيرة متشعبة الشكل || غطها متوط الصنف غير مرطوب فيه .

١٢٦٩٦ - زهر ، Groupe (F).
Group, Clump (E).
مجموعة نباتية تنصف بذات الاشكال الخاربية او تتحل ببعض الصفات الجنبية المقررة .

١٢٦٩٧ - زهر ، Emeraude (F). Emerald (E).
نوع من الزهر يد وهو حسي بلوري كريم لونه يراوح من الاغصان الى الازرق . غرو به عديدة الصغرا اقلها ازرقة واشدها لمة .

١٢٦٩٨ - زهر ، Zéro-zéro (F).
في المروسة ، اطليا .

١٢٦٩٩ - زهر ، Gasterostidae (S). Gasterostidae (F). Gasterostidae (E).
فصيلة اسماك بحرية وهرية من السمكيات الشائكات

الزواحف . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها دقيقة الاجسام الصغيرة . البحرية منها اكبر قدماً من البحرية .

١٢٦٩٠ - زهر ، Zéro-zéro (F).
هو الارسيون ، اطليا .

١٢٦٩١ - زهر ، Guêpe mâle (F). Male wasp (E).
الزهرور لا ابرة له . وهو الذكر من الزناير .

١٢٦٩٢ - زهر ، في البرعة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او المنقود الزهرى . وهي حنة زائدة وراء القلف ، في كل قائمة زهرتان . يقال فرس ولفاء الزهر . وهي ايضا الشجرة اللدلة في منحرج رجل الشاة .

١٧٧٠٨ - زَيْمَر هو الزر، اطليه .

١٧٧٠٩ - زَيْمَر هو خرطال نوا، اطليه .

١٧٧١٠ - زَيْمَر تَبَوِي هو الخرطال الريان، اطليه .

١٧٧١١ - زَيْمَكَة Fabraea

جنس فلور مجهرية من السقديات وفصيلة الخشاريات يتميز بصلته الصغيرة الحجم التي تتكون داخل الساق الأمامي ثم تنجح نحو الخارج حيث تنفلق . بورها ثنائي الخلية . بورقاتها متصالبة شفعية رباعية // أشهر أنواعها اللوزية الثلاثة التالية .

١٧٧١٢ - زَيْمَكَة السَكْرَجَل * Fabraea maculata, Diplocarpon soraneri, Entomopeziza mespilii, Stigmates mespilii, Entomosporium maculatum (S).

نظر مجهرى يركب أوراق السرفيل ويصيب الثآليل وقد يترى أوراق الاجناس والاكيليا // مظهره الخارجى على أوراق السرفيل ، بقع صغيرة شبه مستديرة تظهر من ٢ الى ٣ سم . تبدو مسطحة على مسطحة القليل العليا ثم تتكاثر نغم كامل النصل . لونها وردي ثم مرجاني ويعتني الى الجفوة المابقة // وهو حصل الاجناس بقع بقات اللون صفرة اللثة مستديرة مسطحة على كامل النصل // اما في الاكيليا فظهر بقعه براوح من ٣ الى ٤ سم . وهي مفرقة الزوايا مسطحة على كامل النصل ، تكثر قرب أطرافه // اضرار منوطه مربوطة التربة المرتبطة بالموايل الجوية المواتية // يكافح باستعمال سائل يورودو المخلوط ٨٠٪ على مرتين ، المرة الاولى بعد تمام الاوراق واثنائية بعد الاول بثلاثة او اربعة اسابيع .

١٧٧١٣ - زَيْمَكَة التَسْرِين * Fabraea earliana, Mollisia earliana, Diplocarpon earliana, Marssonina poenae (S).

نظر مجهرى يركب أوراق التسرين والشيلك فيطلبها . مظهره الخارجى بقع قرونية لا قياسية الشكل ولحمي تظهر براوح من ٢ الى ٦ سم . تركب الاوراق كما تنتشر نغم كامل النصل حيث تقل الحركة النسبية . وقد يركب اذن الثآليل فيصيب مقوطلا // يكافح بمكافحة المنقطة باستعمال سائل يورودو المخلوط من ٨٠ الى ١٠٪

١٧٧١٤ - زَيْمَكَة الرُودَة * Fabraea rosae, Diplocarpon rosae, Marssonina rosae, Actinonema rosae (S).

نظر مجهرى يصبغ أوراق الرود فيطلبها ويسبب قتلها . مظهره الخارجى بقع لا قياسية الشكل ولحمي تلتصق فيها الاستدارة لونها الى الجفوة المابقة تركب النصل على صفحه العليا تضط النسيج بعد الاخلايا وتسبب الاجناس الباك ما يؤدي الى رقت النسيج وعدم انتظام الدورة الهوائية الحولية // يكافح باستعمال سائل يورودو المخلوط من ٨٠ الى ١٠٪ يضاف اليه الصابون المخلوط ١٠٪ او باستعمال الكبريت الميكروني الممزوج ١٠٪ زروينات الرصاص بمعدل ٩٠٪ كبريت ١٠٪ زروينات تشيخا على الكبات من السبع الى الثمان مرات .

١٧٧١٥ - زَيْمَكَة ستايليدوم * Stachylium

جنس فلور مجهرية من السقديات وفصيلة الطحيات . هيفه الكنديه متعصب ، متعصب ، عايق اللون ، يحمل في اطرافه كتلة بسيطة ، شفافة ، بيضيه جشيرة التجميع .

١٧٧٠٢ - زَيْمِج * Cenangium

جنس فلور مجهرية من الزيجيات وفصيلة الخشاريات . سداته ملونة حافتها الجانب تتكون وتنمو داخل الامة فتسبب انغلاقها . كتاته خضرة ، بورها ثنائي التجميع ، اعلايسا للشكل ، بسيط التركيب ، وسيد الخلية ، شفاف اللون او حنطي // له نومان مؤذيان زيج الحور وزيج الصنوبر .

١٧٧٠٣ - زَيْمِج الحُور * Cenangium populeum, Dothichiza populea (S).

نظر مجهرى يصبغ الحور في حالة نيطه وقد يمتد مظهره الخارجى يشوب حنطية اللون تنشئ اللحاء تخلصه يوشاح الى الصفرة القليخ . يركب الاوراق في باطن الامر ثم ينتقل منها بمشيج الى الاثنان والاضغان والسوق // يكافح بقتل الاضغان المويومة ويظهر الجروح وينفخ للمثلل يسائل يورودو .

١٧٧٠٤ - زَيْمِج الصَّنَوْبَر * Cenangium ferrugineum, C. abietis, Dothichiza ferruginea (S).

نظر مجهرى يركب الصنوبر فيؤذيه وقد يصبغ مظهره الخارجى اجزاع يصبغ حطب الصنوبر ، حل سد زامة الاول ، فيطوح به وينفلق بمشيج الى الاثنان والاضغان فيطبها ويذيلها ثم يمت الشجرة به اذ يغضب غشيا بالسورة وبد ان يكسبه بعض الصلابة القاسية العالية .

١٧٧٠٥ - زَيْمِجِيَات * Cenangiaceae (F), Cenangiaceae (E).

عازرة فلور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسداتها القروية ، الملونة ، الحامية ، او الصلبة الجسم ، القائمة على رتبة لينة . تكتاها متشابهة مع تكتاها المشعبة . بورها جديد الاشكال غطفت التركيب وبيها هو وسيد الخلية في الزيج اذ به شفيع اخلايا عديدا في النطر // له جلسان شويران ها الزيج والفر .

١٧٧٠٦ - زَيْمِجَكَة Epicoccum

جنس فلور مجهرية من عازرة الطحيات وفصيلة الكندييات . وظيفته شارة . جربه الكنديه كرودية ، قسيرة ، شفافة اللون . كتاته طرية كروية مابقة السورة . اضرار قليلة الحد والاذى جميعا ربة تيش على حاء الاضغان اليابسة وعلى المواد النباتية للتملة .

١٧٧٠٧ - زَيْمَر ، مَرْوَسُ الدَنْشِ Erythrozepiza glitinea (S), Erythrozepiza glitinea, Trombettsiere, Moros (F), Trumpeter bullfinch (E).

طائر من فصيلة الشرشوريات . وهو من الصائير القواطع التي تجرب البلاد في طلب الرزق . سريره براوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ عصفور . اصنافه خمسة من الجزيرة الى افريقية الشرقية والبالية جميعها في اواخر الربيع ويوجد اليها في اواسط الخريف // طولها نحو ١٣ سم . منقارها غروبي الشكل قصير اللثة . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه نازق . ثوبه الى الصفبة الربادية يطلمها مزاج وردي ، يتميز بصبغاه الاحاد الذي يشبه التزير . يألف البحر والجبال ولا يبتعد عن الماء . ينشئ في تجاويف الصخور . اثناء تخفص من ٤ الى ٥ يقات . قوته الحشرات والحوام والزور البرية .



زيج الحور



زيمكة السرفيل



زيمكة التسرين



زيمكة الرود

1٧٧٢٠ - زَنْكَاوِي ، حَزْكَمِي
Zoniiforme (F).
Belt-shaped (E).
نمت وصفي يملئ كل ما كان شكله كالزئذير أو الخوام .

1٧٧٢٦ - زَنْكَاوِي الصَّيْفِي *
Byturus aestivus (S).
Byturus d'été (F). Byturus aestivus (E).
حشرة وأشعة ثائرة من فصيلة الزئذريات وربة معدلات
الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من
الشرق الأدنى وأروبة . تألف البراري والاحراج البقلة
والأودية الغظلية والمناطق الرطبة . خنافسها تعيش على مثل
الازهار وطلعها . يرقاتها تعيش على التراب البرية وأخصها
معص المصع || جسمها صغير اللد يطل من ٣ الى ٤ م .
قربها الى السرة الصهباء يملؤها خل سحلي . رأسها مستدق
الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها صولجانية
حقيقان . ظهورها قليل الإحدايد مستدير المخضر اللامع .
خفهاها كثيفة الخمل والزيب . أرواغها خماسية الخمل ،
مجنحة الخالب || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الحشرة
المجدولة في أوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح
في التراب وتبيت في الليل || البرية بطيئة النمو تطول مدة
الادراك التام نحو ٦ م . جسمها مبط الجرم ، مستطيل
القدم والرأس ، مستدق المخضر ، صفائي الارباب ،
سحلي اللون ، امر الرأس || طول الكمال الذي يسير
من ١٢ الى ١٥ يما نم في التربة ويتفقس ضمن صلبة
سمكية لتشاء المركب من مواد عضوية ورايب .



نُصَمَة الموز

1٧٧٢٧ - زَنْكَاوِي طَبَات *
Byturidae, Tricixidae (S).
Byturidae, Tricixidae (F). Byturidae, Tricixidae (E).
فصيلة حشرات وأشعة وثائرة من رتبة مجنحات الاجنحة ||
اجنحتها وأزواها قليلة العدد . مهدا يشغل معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة والمتسرة نحو البادية . خنافسها
تعيش على مثل الازهار . يرقاتها تنخر التراب وتطور
داخلها || اجنسلها صغيرة اللد ، مستطيلة الشكل ،
خلية التفشار ، مستمرة الرؤوس ، صولجانية الزبانا
المركبة من ١١ فصلة . احادها مستطيلة لاسعة . جرابها
مستدقة . أرواغها خماسية الخمل تتميز بصغر البقلة الايل
والقراية || اشهر اجنسلها الزئذير .

1٧٧٢٨ - زَنْكَاوِي ، مِحْرَاف *
Biseus (F).
Chamfered edge (E).
اداة تستعمل لسفر في الخشب وليريه .



زَنْكَاوِي صَيْفِي

1٧٧٢٩ - زَنْكَاوِي *
Koeberia (S). Koeberia (F).
جنس نباتات خشية ، برية ، مرموعة ، حولية او معمرة
من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة مدبة منها يتعد
من الشرق الاوسط الى بعض اسواق اروبة || جميعها
خشية متوسطة الارتفاع . صفها شيل ، مستطيل .
ازهارها عتودي منتصب .

1٧٧٣٠ - زَنْكَاوِي *
Ceroaspora (S).
جنس طيور مجهرية من فصيلة الطليحات . تتميز بحجمه
الكثيرة الدغلة القليلة الفروع . كنانته اسطوانية او
مخززية الشكل ، مدبة الطائر للمرضة || انواعه كثيرة
تركب اوراق كنبات . اعرفها ما يتبع .

1٧٧٣١ - زَنْكَاوِي الدَّرَاقِين *
Ceroaspora persica (S).
طير مجهرية يركب اوراق الدراق . ظهره اخارسي

انواعه قليلة تركب المواد الخشبية السائرة الى الاغصان
ومنها نوع يصيب الموز فيؤذي .

1٧٧٣٦ - زَنْكَاوِي المَزْز *
Stachylidium musae, S. theobromae (S). Bout de
cigare de la banane, Maladie du bout de cigare (F).
فطر مجهرية يركب ثمار الموز في اعناقها وتشورها
فيحطبا ويشوها ويؤذي لهاها بعد ان يقوده الى الاغصان .
وقد يمتري ثمار الكاكاو فيحطبا || يكاثف يظهر
الثمار وينشع الموز المحفوظ بسائل شيرلان المحلول ٢ ٪
1٧٧٣٧ - زَنْكَاوِي *
Dessèchement (F). Drying up (E).
هو تجفيف المواد العضوية .

1٧٧٣٨ - زَنْكَاوِي *
Nervule (F). Nervule (E).
الزئ النصيب اللين الذي يجمع بين الاعصاب الرئيسية في
روشن الحشرة . ويؤذي ايضا رلة . ج زئ وزئلات وزئان .

1٧٧٣٩ - زَنْكَاوِي *
Aiguillon caudal (F).
Caudal sting (E).
زبابة المقرب : ابرتها التي تلدج بها .

1٧٧٤٠ - زَنْكَاوِي البَشْر *
Crinoides (F).
Crinoides (E).
صف حيوانات بحرية من قسم الشوكيات . ربة وضالته
واجناسه وانواعه كثيرة العدد . معظمها من متحبرات
الاجناب الغابرة . للماص منها منتشر في جميع بحار العالم
اخصها بحار الاتحاف الحارة والمعتدلة الحرارة || اجنسلها
مركبة من قاعدة وساق وتويع وطباب . طليها مستدير
الشكل يحمل في نغم الصفعة اقلها الفلر والسر . توحيها
خامسة القواس المستطيلة ومنها خماسية جزء || جميعها
في ابدع مهدا ، مستقرة من تتحول بعد ذلك الى حيوانات
ثابتة في موطنها او متفكدة تسرح حيث تشاء || اشهر
فصائلها الماصرة القططويات والمارسرات .

1٧٧٤١ - زَنْكَاوِي مَكْرَدَر *
Empicoris vagabunda (S). Empicoris vagabond (F).
حشرة قاتصة من فصيلة الدرويات وربة مختلفات الاجنحة .
جسمها صغير اللد ، يطل نحو ٨ م . رأسها صغير
الجرم . قصير الخمل ، أصفر اللون . خطهاها مستدق الطول .
عينها بارزتان . زباناها مستطيلان ، ميلتان . كويلها
اصفر اللون يملو خططيل طولي ومتفرع لير . يجنسلها
صغيرة مزوانة سمراء . يلقهاها ولهاها الى الصغار النش .
قائمتها الامساكن مجنوزتان تقطن الا ان المور عادم
المتنش || تسرح في التراب . تألف الخببات والسكان
الرطبة . يكثر وجودها قرب المياه العذبة لانها تقطن
الحشرات التي تعيش في هذه البيئة .

1٧٧٤٢ - زَنْكَاوِي عَيْت *
Didymospora (S).
Didymosporites (F). Didymosporites (E).
عارة فطور مجهرية من فصيلة الطليحات . تتميز ببوغها
الثلاثة الخلية . اجنسلها سمكة : البقوع ، البسلوة ،
الويلترنسيم . الخمل ، الزفانغ ، الكردانة والمبارة .

1٧٧٤٣ - زَنْكَاوِي *
Tige florale (F). Stem (E).
عضو نباتي خشبي أو لني أو عشي منتصب الزئكاز
مستطيل يحمل الازهار .

1٧٧٤٤ - زَنْكَاوِي *
ذبابة صغيرة تكون في الحشوش . ج زئانير (اللسان) .

١٧٣٩ - زَيْتَقِ أَحْمَر * ، زَيْتَقِ مَرْتَقُون

Lilium martagon (S). *lis martagon*, *Martagon* (F). *Martagon-lily*, *Turkish-cap lily* (E). *Martagonlilie*, *Turkenbündel* (D). *Giglio martagone*, *Martagone*, *Turbante* (I).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ إلى ١٣٠ سم. ساقه اسطوانية قوية مغطاة بالاجر. اوراقه اسطوانية التصل ضمية التجميع ، كثيرة العروق || ازهاره كريمة الرائحة كثيرة العدد تطول من ٣ الى ٨ سم ، لونها الى الحمرة البغضوية المابقة يملوها تنميش جلوي . متاكها تبلغ ١٥ سم. ظلها احمر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٠ - زَيْتَقِ اِفْرِيقِيَّة هو القصر ، اسطبل .

١٧٤١ - زَيْتَقِ الْاَبْرَاج

هو البرجبة ، من الزنابق ، اسطبل .

١٧٤٢ - زَيْتَقِ الْاَسْتَاَنَةِ ، زَيْتَقِ خَلْفَقُوْتِه

Lilium chalcedonicum (S). *Lis de Constantinople* (F). نوع من الزئبق يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقه زهاب . اوراقه كثيرة العدد صنية القد ثلاثية ورخامية العروق . ازهاره عادية الريف قليلة العدد ، من ٢ الى ٦ ، لونها ارجواني تطول من النواخل وقطة حمراء || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٣ - زَيْتَقِ الْاَنْد

Lilium andinum (S). *Lis des Andes* (F). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية دقيقة . اوراقه خلية تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض شراعه الزري يملو من ٥ الى ١٠ سم. || ازهاره قليلة الريف وألعد تطول من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة . متاكها تبلغ ١٢ سم. ظلها جلوي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٤٤ - زَيْتَقِ الْبَيْر هو الزبير من الزنابق ، اسطبل .

١٧٤٥ - زَيْتَقِ الْفَيْرُوْج * ، ذَقْن الْحِيَةِ

Ophiopogon japonicus (S). *Ophiopogon japonicus*, *Muguet du Japon*, *Herbe aux turquoises* (F). *Japanese snake's beard* (E). *Japansche schlangennarb* (D). *Erba della turchine* (I). نوع من ذقن الحية الزبيري . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصلها جميل الخضر تقطعه خطوط بيض وسفر . شراعه الزري يملو من ٥ الى ١٠ سم. || ازهاره صنية القد ليكنية اللون تطول نحو ٧ سم. || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران . تمامه صنية الشكل فيروزية اللون يتوم من تموز الى كانون .

Funkle

١٧٤٦ - زَيْتَقِ الْهَمَار

الطلب نكده .

١٧٤٧ - زَيْتَقِ الْوَادِي

هي اللقمة من الزنابق ، اسطبل .

١٧٤٨ - زَيْتَقِ الْبَانَان

Lilium japonicum (S). *Lis du Japon* (F). *Japanese lily* (E). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه خلية اسطوانية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ عروق ثلاثة او خمسة || ازهاره صرية

بمع سمر تملو التصل على سفحه العليا يقابلها حل الصنعة السفلى بمع خلية رمادية اللون || ازهاره زهيدة قليلة الاذى لا تنسج للكانفة .

١٧٣٢ - زَيْنَاة الْقُطْن *

Cercospora gossypii (S).

فطر مجهرى يركب اوراق القطن ، مظهره الخارجي بمع لا قياسية الشكل والمظهر توهم التصل على سفحه العليا || ازهاره زهيدة لا تنسج البناية .

١٧٣٣ - زَيْنَاة شَالِكَة *

Cercospora herpotrichoides (S). *Champignon X* (F).

فطر مجهرى يقال ان اتحاده مع الصمغ يعطى اشد الاذى في بعض الزروع منها الحنطة والشبر || مظهره الخارجي بمع لا قياسية تكثر فيها الاسطالة تركب اتحاد الصمغ ثم مقده السلاحيات فتؤدي الازراق والسوق وقد تظلم الزروع وتلاوي || يكافح مكافحة الصمغ .

١٧٣٤ - زَيْتَان

هو الصيد من الذباب الساع ، اسطبل .

١٧٣٥ - زَيْتَان

Minioptaris (S). *Minioptaris* (F). جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه قليلة العدد . رؤوسها مخروطية ، فرائسها مقلوبة . آذانها متعقبة القد منفصلة . السنن وأجنحتها مستطيلة . اجسامها ريشية طويلا يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . يستطاع من ٣٢٠ الى ٤٠٠ سم . ولذاتها من ٥٠ الى ٦٠ سم . انواها بين الكهبة والسمرة || موطنها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والافريقية الشرقية والشمالية || طليها خفيف سريع ضيقه طيران الخفاف . تعيش ازواجا او جماعات قليلة العدد . تألف المفانور والكفوف واوقاب الصغور والبيوت الخفية . قوتها الحشرات والمفانور .

١٧٣٦ - زَيْتَان

الزنابق : بقلة حارة حريفة مصممة . من ابي حنيفة .

١٧٣٧ - زَيْتَقِ

Lilium (S). *Lis* (F). *Lily* (E). *Lilie* (D). *Giglio* (I).

جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزئبقيات . سوقها وحيدة مستقيمة موقرة . اوراقها القرصية والسوقية رمية التصل مستطيلة . ازهارها هامي الازنكار حقيقي التجميع . ازهارها كبيرة الحجم ، جميلة الشكل ، فواصة العرف ، متعددة الالوان || اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٧٣٨ - زَيْتَقِ اَبْيَض * ، اَزَاذ

Lilium candidum (S). *Lis candida*, *Lis blanc*, *Béton de St Joseph* (F). *White lily*, *Bourbon-lily*, *Madonna-lily* (E). *Weisse lillie*, *Marienlilie* (D). *Giglio bianco*, *G. della madona* (I).

ويعرف باسم زئبق مار يوسف. نوع من الزئبق يملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٩ سم. || ازهاره عديدة ، فواصة العرف ، تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الالبيض يملو توشيح احمر وورقة قرمزية . متاكها تبلغ ١٢ سم. ظلها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



زينة شائلة



زئبق ابيض



زئبق احمر



زئبق الفيروزج

الشكل كثيرة طول من ٦ إلى ١٢ سم. وتقرض من ١٢ إلى ٢٥ سم. || أنهارها طرية ، قليلة البدن ، مختلفة الألوان يكثر فيها الأصفر والبرتقالي والوردي والاريجاني || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٧ - زَيْتِي زَنْجَبِيلِي

هو الفتحولي نبات جبل الزعر ، اطليه .



زيتي انمر

١٢٧٥٨ - زَيْتِي صِيَّي *
Lilium sinicum (S).
Lis de Chine (F). Chinese lily (E).

نوع من الزئبق يملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساقه اسطوانية الشكل ، حراء اللون ، زباد . اوراته كثيرة البدن طول من ٥ إلى ١٠ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٢ سم. || أنهارها حادة البرق قليلة البدن لونها الى الصفار الكبريتي يملو تنديش قصير . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها عايق الصفار || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٩ - زَيْتِي طَرْبُلَسِي هو الزئبق ، اطليه .



زيتي بيري

١٢٧٦٠ - زَيْتِي طَوِيل الزَهْر *
Lilium longiflorum (S). *Lis à longues fleurs* (F).
White trumpet-lily (E). *Königslilie* (D). *Giglio lungo* (I).

نوع من الزئبق يملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه اسطوانية قوية . اوراته متعاقبة طول من ٧ إلى ١٤ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٥ سم. أنهارها طرية البرق طويل من ١٢ إلى ١٨ سم. لونها الى البياض اللطيف . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها أصفر || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٦١ - زَيْتِي عَشَكِيَّي

هي الحلة من الزنجبيلات ، اطليه .



زيتي صيني

١٢٧٦٢ - زَيْتِي خَمِي
Lilium speciosum (S).
Lis brilliant (F).

نوع من الزئبق يملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. اوراته حادة متعاقبة طول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتقرض من ٤ إلى ٥ سم. || أنهارها طرية كثيرة البدن طول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها الى البياض المشج بالاحمر الخمر . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من تموز إلى ايلول .

١٢٧٦٣ - زَيْتِي قَلْبِيَّي الزَوَّي

Lilium cordifolium (S). *Lis cordé*, *L. cordiforme* (F).
نوع من الزئبق ينشئ الازرية الكلية . يملو من ٩٠ إلى ١٥٠ سم. اوراته مدعنة مستعرضة قليلة الشكل نصلها جميل الخضار الزاوي تملو ماجة قرمزية || أنهارها بقية الشكل ، عقوبية التجميع طول من ١٠ إلى ١٦ سم. لونها الى البياض الاخير تملو نمشة قرمزية من القاعل ونضراء من الخارج . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها آخر . أنهارها يديم طول شهر تموز .



زيتي طويل الزهر

١٢٧٦٤ - زَيْتِي كَرُولِيَّة
Lilium carolinianum (S). *Lis de la Caroline* (F).

نوع من الزئبق يربط في الازرية الرطبة . يملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. اوراته اسطوانية الشكل نصلها مالمش البشرة عايق الخضار || حدد أنهارها يراوح من ١ إلى ٢٣ ، لونها الى الصفار البرتقالي || أنهارها صيفي .

العرف ، اقية الازنكار طول من ١٠ إلى ١٨ سم. ياطلها ابيض ، ظاهرا ودي . متاكها طول نحو ٢ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٤٩ - زَيْتِي أَنْمَر * ، زَيْتِي هَرْطَق

Lilium pardalinum (S). *Lis panthère* (F). *Leopard-lily* (E). *Tigerlilie* (D). *Giglio pardo* (I).

نوع من الزئبق يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراته عديدة طول من ١٠ إلى ١٨ سم. وتقرض من ٢٥ إلى ٥٠ سم. || أنهارها كثيرة البدن حادة البرق طول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الزاوي تملو رقطة قرمزية كركشة الثمر . اسديتها مستطيلة . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها جهوري || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٥٠ - زَيْتِي بَهْرِي *
Lilium elgimum (S).
Lis tigré (F). *Striped-lily* (E).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه جهورية اقون زباد الحاء . اوراته متعاقبة متباينة ، خاصة او سباحية البرق . طول من ٧ إلى ١٥ سم. وتقرض من ٦ إلى ١٥ سم. || أنهارها حادة الرائحة كثيرة البدن طول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الباهي يملو تخطيط جهوري اسفح المراج || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٥١ - زَيْتِي بَرَوِي
Lilium browni (S).
Lis de Brown (F).

نوع من الزئبق يملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراته متعاقبة طول من ١٢ إلى ١٧ سم. نصلها عايق الخضار يملو موج آخر || أنهارها عديدة متدلية طول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها الى البياض اللطيف تملو رقطة خطية الاطار بنفسية المحور . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها جهوري || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٢ - زَيْتِي بَرْتُقَالِي
Lilium croceum (S). *Lis safrané* (F).

نوع من الزئبق ينشئ الازرية الكلية . يملو من ٥٠ إلى ١٢٥ سم. ساقه ضعدة زباد . اوراته متعاقبة مستطيلة . أنهارها حادة البرق كثيرة البدن طول من ٧ إلى ١٢ سم. لونها الى الصفار البرتقالي . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٣ - زَيْتِي بَرَوِي

هو البرجية من الزئبقيات ، اطليه .

١٢٧٥٤ - زَيْتِي بَهْمِي
Lilium superbum (S).
Lis superbis (F).

نوع من الزئبق يربط في المواق الرطبة . يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراته سنائية التصل ، مدنية || أنهارها كثيرة البدن حادة البرق لونها الى البرتقالي تملو نمشة جهورية || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٥ - زَيْتِي عِلْكَدُوْهُ هو زئبق الاسنانة ، اطليه .

١٢٧٥٦ - زَيْتِي رَشِيَّي
Lilium elegans (S). *Lis élégant*, *L. de Thunberg* (F).

نوع من الزئبق ضرابه كثيرة البدن تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها مستدلة الشانة عتدة . اوراتها اسطوانية

١٧٧٧٣ - زَيْبُورَات (S). Liliaceae

Liliacées (F). Liliaceae (E).

نوع من الزيتون يربط في الأرتبة المتوسطة الانتماء الجبلية. أوراقه قليلة العدد نصلها جامد التجميع ، خلي الصفحة السفلى ، خامسي أو سباعي المروق . يطول من ٧ الى ١٠ سم . ويبرش من ١٥ الى ٢٠ سم . أزهاره متدلية قليلة المروق . لونها ال الوردي تملو مشة قمرية . متناكها تطول نحو ١٠ سم . ظلمها احمر . انزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٧٧٤ - زَيْبُورَة (S). Liliaceae

١٧٧٧٥ - زَيْبُورَة ، زَيْبُورَة (S). Liliaceae

Pénis des insectes (F). Penis of insects (E).

الزيتون فضيب ذكر الحشرات على اختلاف فصائلها .

١٧٧٧٦ - زَيْبُورَة (S). Liliaceae

١٧٧٧٧ - زَيْبُورَة (S). Liliaceae

الزيتون : شجرة عطرية في طول الدالية ولا عرض لها . وطولها مثل ورق الجوز في منظره وريحه . وطا نور مثل نور المشر ابيض مشرب وطا حل مثل الزيتون سواء . فاذا نضج اشده سواده وسلا جدا يأكله الناس كالزيتون وطا عصمة كعصمة اللبواء وهي تصبغ اللحم كا يصبغ الفرمساد . تدرس غرسا . واحداها زنبورة وزنبارة وزنبورة (السان) .

١٧٧٧٨ - زَيْبُورَة (S). Guêpe (F). Wasp (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيتونيات . انواعه عديدة جميعها جارية ، باذلة ومفرسة . اعرافها واشهرها ما يتبع .

١٧٧٧٩ - زَيْبُورَة جَرْمَانِيَّة (S). Vespidae

Guêpe germanique (F). German wasp (E). Deutsche waspe (D).

نوع من الزيتون الواسع الانتشار . ذكره يطول من ١٣ الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ سم . وعاملته من ٩ الى ١٤ سم . يقيم عشاه في التربة ، يبنيه بالواد الخشبية المنحلة التي تبو كالورق ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون يطول نحو ١٥ سم . باذنها ال الصغار الذهبي يطول نحو ١٥ سم . متناكها تبليغ ١٥ سم . ظلمها ذهبي اللون . انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٨٠ - زَيْبُورَة شَائِعَة (S). Vespidae

Vespa vulgaris (S). Guêpe commune (F). Common wasp (E). Gemeine waspe (D).

نوع من الزيتون الباذن ، الجاريس ، الصغير القدر ، المسم الانتشار، ذكره يطول من ١٤ الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ سم . وعاملته من ١٥ الى ١٦ سم . يقيم عشاه في التربة ويمل الاشجار والحيطان ويبنيه بالواد الخشبية المنحلة . ثوله يد اقل من مئة . لسته مظلة .

١٧٧٨١ - زَيْبُورَة شَرْقِيَّة (S). Vespidae

Guêpe orientale (F).

ويعد الزيتون الاجر . نوع من الزيتون الشائع في الشرق الاوسط . ذكره يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . انتاه من ٢٥ الى ٣٢ سم . وعاملته من ١٦ الى ٢٠ سم . ثوله ال احمر الصفر . رأسه وبروشه اشد سمة من بطنه . اجسته نارية . يقيم عشاه في اي مكان كان . وهو مفترس ، باذن وجاريس ، يقتنص الحبل ويقرض الباز السكرية عند ادراكها اخضاها المنب والتين والبسر .

١٧٧٨٢ - زَيْبُورَة صَغِيرَة (S). Vespidae

Pollistes gallicus (S).

Polliste, Guêpe française (F).

نوع من الزيتون الصغير القدر . ذكره يطول من ١٣ الى

١٧٧٨٣ - زَيْبُورَة كَتَا (S). Liliaceae

Lilium canadense (F). Canadian lily (E).

نوع من الزيتون يربط في الأرتبة المتوسطة الانتماء الجبلية . أوراقه متدلية متجاذبة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . ساقه قوية . لونها خضراء او سباعي المروق . يطول من ٧ الى ١٠ سم . ويبرش من ١٥ الى ٢٠ سم . أزهاره متدلية قليلة المروق . لونها ال الوردي تملو مشة قمرية . متناكها تطول نحو ١٠ سم . ظلمها احمر . انزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٧٨٤ - زَيْبُورَة مَلْعَب (S). Liliaceae

Lilium auratum (F). Lilium doré du Japon (F).

نوع من الزيتون يطول من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية . أوراقه متدلية متجاذبة تطول من ١٥ الى ٢٢ سم . وتبرش من ٢ الى ٣ سم . أزهاره عطرية العرف كثيرة العدد تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . لونها ال البياض الماسي يطولها من الداخل تنسج ارجواني وسط طائر ذهبي اللون يقيم البتلة ال تسين . متناكها تبليغ ٢ سم . ظلمها احمر . شروبه وماله عديدة تختلط بالوانها التي يكثر فيها ال يقل الاصفر الذهبي . انزهاره يستمر طوال الصيف .

١٧٧٨٥ - زَيْبُورَة مَرْتَعُون (S). Liliaceae

ويكتب مرتعون . هو الزيتون الاجر ، اطليه .

١٧٧٨٦ - زَيْبُورَة مَرْتَعُون (S). Liliaceae

هو الزيتون الاجر ، اطليه .

١٧٧٨٧ - زَيْبُورَة مَلِكِيَّة (S). Liliaceae

Lilium regale (F). Lilium royal (F).

نوع من الزيتون يطول من ٥٥ الى ١٥٠ سم . ساقه قوية . أوراقه عادمة الاوراق حتى اقزام الثاني . أزهاره عطرية كثيرة العدد تطول نحو ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون يطول نحو ١٥ سم . باذنها ال الصغار الذهبي يطول نحو ١٥ سم . متناكها تبليغ ١٥ سم . ظلمها ذهبي اللون . انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٨٨ - زَيْبُورَة هَنْتَرِي (S). Liliaceae

Lilium henryi (F). Lis de Henry (F).

نوع من الزيتون يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه قوية . زياه . أوراقه متدلية تطول نحو ١٥ سم . وتبرش نحو ٣ سم . وعاملته خضراء او سباعي المروق . خلي الصفحة السفلى . أزهاره عديدة متدلية من ٦ الى ٩ سم . لونها ال البرتقالي تملو مشة سواد . متناكها تبليغ ٨ سم . ظلمها اصفر . انزهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٧٨٩ - زَيْبُورَة وَاشِنْغْتُون (S). Liliaceae

Lilium washingtonianum (F). Lis de Washington (F).

نوع من الزيتون يطول من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية . زياه . أوراقه متدلية خسية التجميع . سداسية العدد اكثر . اما البتلة فتتدلية . أزهاره عطرية كثيرة العدد تطول من ٤ الى ٨ سم . لونها ال البياض الموشق بالقرمزي . متناكها تبليغ ١٢ سم . ظلمها اصفر . شروبه عديدة منها الوردي والابيض والقرمزي الباقي . انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٩٠ - زَيْبُورَة (S). Liliaceae

Lilium (F). Liliid (E).

نمت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالزيتون كقولك كيتون .



زيتون جرمانى



زيتون شائع



زيتون صغير



زيتون كبير



زيتون البطاطا



زُنة النِّل



زُنة الزُّرَيْتُون



زُنة الشَّوْطَر



زُنة الصُّرْبَا



زُنة القَرْنَل

مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل مبشرة أو كثيفة التجميع ، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ م. لونها زيتوني ، عموماً أبيض ، اطرافها اسمر ، تركب النصل فتؤويه وتغيب الآثار وتضمرها ١٠ يتكافح باستمال سائل يورود او بعض الفواطير المرتكزة على المركبات السبائية .

١٢٧٩١ - زُنة الجُنْجُل ٥

Cercospora cantuariensis (S).

نظر مجهرى يتطفل على لوراك الجنبيل ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة بمادة اللون ، جُزوية الاطراف تركب النصل على صفحتي العليا يقابلها على السفلى يقع خلية، حنطية، زائجة الموضع ٥ انحراف زائجة لا تستوجب المكافحة .

١٢٧٩٢ - زُنة الزُّرَيْتُون ٥

Cercospora didosporioides (S).

نظر مجهرى يتطفل على لوراك الزُّرَيْتُون ٥ مظهره الخارجي يقع فسيحة مهمة الحديد مظهره اللون ، يفسد بالمخاج تسبب ذيل الاوراق واجعلها .

١٢٧٩٣ - زُنة الشَّوْطَر ٥

Cercospora beticola (S). *Cercosporiose de la betterave* (F). *Leaf spot of beet* (E).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق الشَّوْطَر في المناطق الرطبة . مظهره الخارجي يقع كثيرة العدد ، لا يقاسية الشكل والحجم ، مبشرة على صفحة النصل ، لونها الى البصرة يطولها حنار اخر . تقضي على البصرة فتطرحها ثم تمتطعها ويشتاق خيل التركيب فني اللون يسير بها الى البطل . انحرافه قد تكون باهقة لانه يؤثر على نسبة المواد السكرية . يتكافح باستمال اكيلكودور للنحاس عيار ٥٠٪ على الشكل الآتي :

- ١٣ جزوا اكيلكودور للنحاس .
- ١٢ جزوا دقيق .
- ٧٥ جزوا تلك .

يستعمل تغذية على النبات بمعدل ٤ كلو لغم الواحد .

١٢٧٩٤ - زُنة الصُّوْبَا ٥ ٥ زُنة دِيَاو ٥

Cercospora ditau (S).

نظر مجهرى يركب اوراق الصُّوْبَا ويؤذي النبات . مظهره الخارجي يقع صغرية كثيرة العدد. لونها الى الجذوة تركب النصل فتؤويه نحو ربع سمات ٥ يتكافح بظهور اليادر ويشتمال اسد الفواطير الحديثة المرتكزة على المركبات السبائية .

١٢٧٩٥ - زُنة القَرْنَل ٥

Cercospora fabae, C. personata (S).

نظر مجهرى يتطفل على سوق واوراق القَرْنَل ٥ مظهره الخارجي يقع لا يقاسية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٧ م. تركب الاوراق والسوق. لونها الى البصرة تقضي على الاوراق وتبديل النبات ٥ يتكافح بظهور اليادر بمحلول القودولين وينفخ نباتات الموصية بسائل يورود الملول من ١٠ الى ١٠٠ م.

١٢٧٩٦ - زُنة القَرْنِيَّات ٥

نظر مجهرى يتطفل على لوراك سوق بعض القرنيات اغصانها الفضة واللؤلؤ والحشوقة ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل ، لونها الى البصرة لموجها حالات متناوبة صفر الحنار تطرح بالنجح الحنارة فني الى النبات ونمو .

١٦ م. انتاه من ١٥ الى ١٧ وحاملته من ١٠ الى ١٤ . ثوبه اسود اللون يطول تقيج اصفر . حشاه صخر القند ، قمرى الشكل ، يقبض على الجنيات والاشجار البقلة يركزه في دهامة رسيدة قصيرة . قوله لا يمد اكثر من ٥٠ م. قوة الال السكرية والديندان وبض الحشرات والسلم .

١٢٧٩٣ - زُنيُور كَبِير ٥ ، دِيُور

Vespa crabro (S). *Frelon, Guêpe frelon* (F). *Hornet* (E).

نوع من الزُّيُور ، كبير القند واسع الانتشار . ذكره يطول من ٢١ الى ٢٧ م. انتاه من ٢٦ الى ٥٥ وحاملته من ٢٥ م. رأسه اصهب اللون . جشته الى السواد الموضع بالسرعة . زبانه وارسله حر . حشاه لاصق قمرى يقبض به اي مكان كان . ثوبه لا يقاسي العدد لكنه لا يقل عن ٥٠ م. ولا يفوق ١٠٠ م. وهو من الزناوير البقعة الفخرسة البائدة الجارسة يلسع الانسان ان ضايقه ولسنته مثله موزية .

١٢٧٩٤ - زُنيُورِيَّات ٥

Vespidæ (S). *Vespidæ* (F). *Waspen, Faltenwespen, Papierwespen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . اجناسها وانواعها عديدة مظهرها من الحشرات الاشرائية النظام الجامعي البعشي . فيها الذكر والانيث وبالمادة الحنث . ثوب اعشاشها من الاوراق والالياف الخشبية المصروفة فتقضيها في التربة وعلى الحيطان وبين غشائيات الصخور وفي تجاريف الاشجار وطليها ٥ جميعها مفترسة بائدة وجرارية .

١٢٧٩٥ - زُنيُور ٥

هو ليسون اضاليا ، اطليه .

١٢٧٩٦ - زُنيُور ٥

جلس نباتات طيبة ممرمة من فصيلة الساجيات انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والشتلات منهاها المناطق الحارة والاشترائية . اوراقها منفقة متقابلة طيبة او رحيمة للنصل . انحرافها علفية التجميع ناجية . جنودها طيبة مقوية .

١٢٧٩٧ - زُنة ٥

صفة اثرهارة المروية قليلا .

١٢٧٩٨ - زُنة ٥

جلس فطور مجهرية من الريذانيات وفصيلة الفطريات . جريه الكنديية مستطيلة الشكل ، سمراء اللون ، فسيحة الانتشار ، قوسية الارتكاز . كذلكه مستطيلة قاعدية او جانبيه الانتشار ، مفرقة كثيرة الاقسام التسمية البند ٥ انواعه عديدة ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٢٧٩٩ - زُنة البطاطا ٥

Cercospora concors (S). *Cercosporiose de la pomme de terre* (F). *Leaf spot of potato* (E).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق البطاطا ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٤ م. لونها الى البصرة تمليها نقط سود تركب الاوراق على صفحتيها فتؤذيها وتؤيق بالانتاج حشاه يراوح قدرها من ٢ الى ٢٥ ٪ . يتكافح باستمال الفواطير المرتكزة على الكابريت والنحاس .

١٢٧٩٠ - زُنة البُن ٥

Cercospora coffeicola (S). *Maladie des yeux bruns du caféier* (F).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق البُن فيؤذيها ويشوه الالار .

تراكيب بعض التوابل والمستحضرات الصحية الشرقية . ويستخرج منها غرايات شائعة الاستعمال .

١٧٨٠٧ - **زَنْجَبِيل مِيْوْهَ** (S). *Zingiber mioga* (S).
Gingembre mioga (F).

نوع من الزنجبيل يزرع القزوين . يملو نحو ١٠٠ سم . أفراده سنائية كبيرة القد . سبلته الزهرية كثيفة التجميع . أزهاره بيضاء شريطها صفر || مهدد اليابان وهو من النباتات البرية التي تعيش ويوجد في كل تربة وموقع ومكان .

١٧٨٠٨ - **زَنْجَبِيلِيَّات** (S). *Zingiberaceae* (S).
Zingibéracées (F). *Zingiberaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقة الواحدة || اجناسها وأنواعها عديدة جميعها جلمورية مهددا المناطق الاسيوية الحارة || أشهرها الزنجبيل والخلنجان والكرشم والحال وزانرباد .

١٧٨٠٩ - **زَنْجُفَر** هو الزريقين ، اطليه .

١٧٨١٠ - **زَنْجُجُور** ، **سَمَك الْكَرَاكِي** (S). *Esoc* (S). *Esocae*, *Brochet* (F). *Pike* (E).

جنس اسماك نهري من فصيلة الزنجوريات . انواعه هـ جميعها نهمة . مستطيلة الشكل ، واسعة الفخذ ، دقيقة الخطم المفلطح ، حادة الاسنان القوية . طولها يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ سم . وزنها من ٥ الى ٢٥ كيلو . اكلها الى الريدة الرصاصية تنقب مع اقترابها من ثيج الطهر . جوارثها مجزأة بالايض . يطونها الى الصحية . لحها حادي او دون الوسط .

١٧٨١١ - **زَنْجُجُورِيَّات** (S). *Esocidae* (S). *Esocidae* (F). *Esocidae* (E).

فصيلة اسماك نهري من مفتوحات الفئات . اجناسها وأنواعها عديدة معظمها من اسماك المناطق الباردة ، جميعها نهمة مستطيلة الاجسام ، مفلطحة الرؤوس والاسناعم ، قوية الاسنان الحادة || اشهر اجناسها الزنجبور .

١٧٨١٢ - **زَنْد**

زندت البقرة والثانة زندا : اخبرجت رحها عند الولادة .

١٧٨١٣ - **زَنْدَه** ، **زَنْدَه** (S). *Rachis* (F). *Stalk* (E).

محور السبلة والحزيرة والساق والارواق المركبة وغيرها .

١٧٨١٤ - **زَنْدَه الْعَبْد** هو الكارلين الشائع ، اطليه .

١٧٨١٥ - **زَنْدَه بَيْسَل** ، **زَنْدَه لَيْل** (S). *Elephant (grand)* (F). *Elephant (great)* (E).

الفيل الكبير الجنت .

١٧٨١٦ - **زَنْدَه ل** (S). *Cistudo* (S). *Cistude* (F).

جنس حيوانات زحافة مفترسة من السلاحيه وبفصيلة الحشرات . تعيش في المياه العذبة . تألف البعيريات والانهير والمناقم || تتميز بان حافة ذيلها لا تحكم الشقوق على الجسم . قوتها الحشرات والرخويات والاسماك الصغيرة والصفادح || لها ثومان فقط الزندل الادرع وزانرلد المرم .

١٧٨١٧ - **زَنْدَه لْ أَرْدَغ** (S). *Cistudo lutaria* (S). *Cistude bouasse* (F).

نوع من الزندل . موطنها بيند من الشرق الاقل الى اوروبا . تألف المناقم زحفاف الانهر والبيسريرات || جسمها بطول

١٧٧٩٧ - **زَنْدَه الْكَرْمَةِ** (S). *Cercospora vitis* (S).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على اوراق الكرمة . مظهره الخارجي يقع مستديرة حنطية اللون ظاهرا يراوح من ٢ الى ١٠ م . تركيب التصل على صفحته || اضراره لا تسمى الاوراق ولا تتسبب المكافئة الخاصة .

١٧٧٩٨ - **زَنْدَه الْكِشْفِش** (S). *Cercospora marginalis* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكشفش . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مقرنة الزوايا ، سمراء اللون ثم رمادية تركب التصل دون ان تؤذي .

١٧٧٩٩ - **زَنْدَه الْوَرْد** (S). *Cercospora circumscissa* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد والخرج والذوقن . مظهره الخارجي يقع مستديرة مستديرة سمراء اللون فتوح بالتسج المتخارة فتسبب يباسها وانجتها || اضراره قليلة . ينشط في المناطق الساحلية التي يشهها الضباب .

١٧٨٠٠ - **زَنْدَه الْوَرْد** (S). *Cercospora rosicola* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد . مظهره الخارجي يقع مستديرة مملحة اللون تركب التصل على احدى صفحته اضراره لا تسمى التشويه .

١٧٨٠١ - **زَنْشُكاري** (F). *Dysentaria* (F). *Dysentery* (E).

مرض معد يحدث عوارضه فرط الانطلاق البطن . سببه فضيات او تفاحات .

١٧٨٠٢ - **زَنْشُكَر** ، **زَنْشُكَر** (F). *Verdet* (F). *Verdigris* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف استنساخ النحاس الأخضر . محاليله تستعمل في مداواة وسكافنة بعض الامراض الجلدية .

١٧٨٠٣ - **زَنْجَبِيل** (S). *Zingiber* (S). *Gingembre* (F). *Ginger* (E).

جنس نباتات عشبية جلمورية معمرة من فصيلة الزنجبيلات . انواعه عديدة منها البرية والعلبية والزراعية . جلدابرها قرنية الشكل مغداه . سوقها مرققة تشبه سوق الكنا . اوراقها حاصصة متناحية سنائية التصل . اذفلها سبلية التجميع حامية الاوتكنا يحلها شراخ لبي التركيب سرقي الاوراق || اشهر انواعه ما يلي .

١٧٨٠٤ - **زَنْجَبِيل الْكِلَاب** هو لفلل الماء ، اطليه .

١٧٨٠٥ - **زَنْجَبِيل شَمِي** هو الراسن ، اطليه .

١٧٨٠٦ - **زَنْجَبِيل مَقْرُونِي** (S). *Zingiber officinale*, *Amomum zingiber* (S). *Gingembre officinal*, *Amome des Indes* (F). *Indian ginger*, *Common ginger* (E). *Gingiber*, *Ingwer* (D). *Zenzero*, *Zenzvero*, *Pepe zenzero* (I).

نوع من الزنجبيل يزرع لاستساخ الطبي والعصامي . يملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه سنائية متناحية التصل . سبلته الزهرية لينة . اذهار صفر يتلها برتقالية منشطة بالايض || جلدابرها صارية العرف ، لاذعة الطعم ، تحوي زيوت طيارة وواد نشوية وغروية مخلفة . وهي مقرية القلب ، مرققة ، تنشط الباه وتذكى . تنقب من الارياح وعسر الهضم وتحمب للنصر كما انها تدخل



زَنَّة الْكَرْمَةِ



زَنْجَبِيل غَرْزِي



زَنْجُجُور



زَنْدَلْ أَرْدَغ

١٢٨٥٩ - زَهْرَةُ السَّمَاءِ الْجَمِيعَةِ راجع جوليانه .

١٢٨٦٠ - زَهْرَةُ الشَّعَاءِ اطلب كيمنيس .

١٢٨٦١ - زَهْرَةُ الشَّمْسِ في اللدائن ، اطلبه .

١٢٨٦٢ - زَهْرَةُ الْعَصَلِ في السلية ، اطلبه .

١٢٨٦٣ - زَهْرَةُ الْعُطَّاسِ في الأرنكة ، اطلبه .

١٢٨٦٤ - زَهْرَةُ الْعَبْقِ في الترانسيوم .

١٢٨٦٥ - زَهْرَةُ الْعَتَكَبُوتِ في القم ، اطلبه .

١٢٨٦٦ - زَهْرَةُ الْعَصَدِ في النجد ، اطلبه .

١٢٨٦٧ - زَهْرَةُ اللَّيْلِ

في النسيكة من الرجبيات ، اطلبه .

١٢٨٦٨ - زَهْرَةُ الرُّجْجَانِ في الكنتية ، اطلبه .

١٢٨٦٩ - زَهْرَةُ الْمُشْتَرَى

في لخمس المشتري ، اطلبه .

١٢٨٧٠ - زَهْرَةُ شَعْرِيَّةِ في القشاة الثعبانية .

١٢٨٧١ - زَهْرَةُ مَكَايُورِ في الابيجية ، اطلبه .

١٢٨٧٢ - زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ في القمر اطلبه .

١٢٨٧٣ - زَهْرِيَّ (F). Floriforme (F).

نمت رشي يعلق عل ما هو شكله كالزهر .

١٢٨٧٤ - زَهْرِيَّاتِ Helotiscase (S).

Helotiscase (F). Hélotiscase (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشرات ورتبة

الرقبات . أجناسها وأزواجها عديدة تتميز بصدائها الحسية

القصية أو القروية الشكل القائمة على ودية جلدية الرقبت .

يوجد بها مختلف الأشكال والترتيب يكثر فيه الانتظام

الشعبي من الثنائي إلى الثلاثي || لها جفان ملوَّبان

الزينة واللحن .

١٢٨٧٥ - زُهْمٌ ، زُهْمَةٌ ، مَنَحٌ ، قَتَمٌ ، قَتْمَةٌ ،

نَمَسٌ Rance, Rancissement (F).

Rancid, Rancidity (E).

فساد المواد اللدنية على احتلالها . سببه التأكسد وما يليه

من فعل المرأثم . تتأخذ رائحة قوية مسهجة وطعم

حريف كرهه .

١٢٨٧٦ - زُهْمٌ Aniaux non ruminants (F).

No ruminant animals (E).

الزهم ما لا يجر من الحيوان .

١٢٨٧٧ - زُهَيْرِ Polyanthe (F). Polyanthous (E).

كثير الأزهار .

١٢٨٧٨ - زُهَيْرَةٌ Fleuron (F). Flores (E).

زهرة صغيرة ابتدائية يتألف منها قرص الرئيس في أزهار

فصيلة المركبات .

١٢٨٧٩ - زُهَيْرَةٌ Florula, Floscule (F).

هي الزهرة الصغيرة . وكل زهرة من أزهار السنبلة تدعى

زُهيرة .

١٢٨٣٩ - زَهْرُ الْكَسَائِينِ

هو التيجال نبات عشبي زخيفي ، اطلبه .

١٢٨٤٠ - زَهْرُ الْقَوْلُوثِ هو البليس ، اطلبه .

١٢٨٤١ - زَهْرُ الْمَسِيحِ هو السبع ، اطلبه .

١٢٨٤٢ - زَهْرُ النَّسِيمِ ، زَهْرُ الْحَوَاكِ

هو الأبرتس ، اطلبه .

١٢٨٤٣ - زَهْرُ صَرِيمٍ هو القطرم البنفسجي ، اطلبه .

١٢٨٤٤ - زَهْرَاكُ

الزهراء : البقرة الوحشية . والثور الوحشي : أُنْزَر .

١٢٨٤٥ - زُهْرَةٌ ، زَهْرَاكُ Venus (E). Vénus (F).

كوكب سيار ينتمي إلى مجموعة النظام الشمسي . يعتبر

ألم الكواكب المروية . يبعد عن الشمس نحو ١٠٨

ملايين كيلومتر ، وهو بذلك يكون أقرب إليها من الأرض .

ظهور من الشرق عند الفجر يعطيه لقب نجمة الصبح .

ويظهر عند الغروب يعطيه لقب نجمة الليل ونجمة الراعي .

سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ١٢٤٩٢٠ كيلومتر

بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق

٢٢٥ يوماً || المنجمنون يسمون الزهرة السند الأصفر لانها

في السعادة دين المشتري وأضافوا إليها الطرب والسرور

والهجر والإلفة والشيق .

١٢٨٤٦ - زَهْرَةٌ Fleur (F). Flower (E).

الزهرة هي البصير النباتي المختص بالتناسل لحفظ الكيان .

تتشأ الزهرة من برعم وتتألف من تحت يحوي به سوار

خارجي يعرف بالكأس وسوار داخلي يعرف بالتويج

ينتهي بالبتلة ويصل عند انقلاب قاعدته الداخلية مجموعة

الاصدية التي تتألف الاضواء الذكورية || اما تحت الذي

يضمن الاضواء الانثوية فيشكل المخر حيث المحيط

تتلوه اللقطة المكونة من ثلث وبسم .

١٢٨٤٧ - زَهْرَةُ الْأَلَامِ في الآلامية ، اطلبه .

١٢٨٤٨ - زَهْرَةُ الْفَرَسِ في الاندروزاس ، اطلبه .

١٢٨٤٩ - زَهْرَةُ الْفَالَاوُثِ في بنسج الثلاث ، اطلبه .

١٢٨٥٠ - زَهْرَةُ الْفَلَجِ

في النسيكة من الرجبيات ، اطلبه .

١٢٨٥١ - زَهْرَةُ الْجُرُوبِ في السكايبوزا ، اطلبه .

١٢٨٥٢ - زَهْرَةُ الْجَمَّةِ

اطلب زلف الملوك شجرة زينة جميلة الأزهار .

١٢٨٥٣ - زَهْرَةُ الْحَجَرِ في جوز جتهم ، راجعه .

١٢٨٥٤ - زَهْرَةُ الدَّمِ في انقلاب اللبس ، اطلبه .

١٢٨٥٥ - زَهْرَةُ الرَّيِّجِ في الزففة ، اطلبه .

١٢٨٥٦ - زَهْرَةُ الرِّمَالِ في الارناويه ، اطلبه .

١٢٨٥٧ - زَهْرَةُ السَّاعَةِ اطلب الآلية زرقاء .

١٢٨٥٨ - زَهْرَةُ السَّلْحَفَةِ في الحليون نبات زخيفي .

1٢٨٩٤ - زُوجَلَكَة * Zoogléa (F). Zooglosa (E).
ركام من البكتريات تجمعا مادة غروية في اشكال مختلفة قيو كالحطاط المتكاثف في السوائل وكجموعة من النقط والفتيل في الجلود .

1٢٨٩٥ - زُودَعَم * Pizomètre (F).
Piesometer (E).
جهاز يستعمل في قياس انضغاط السوائل .

1٢٨٩٦ - زُودَحَكَة * Pizométrie (F).
Pizometry (E).
علم يبحث في انضغاط السوائل .

1٢٨٩٧ - زُودَحِيَّة * Pizométrique (F).
Pizometric (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو يخص بالزراعة .

1٢٨٩٨ - زُودَحَن * Clerus (S).
Clérude (F). Clerus (E).

جنس حشرات غشبية من فصيلة الزوسنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٥ منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الباردة . اجسامها صغيرة اللد ، مسطحة الشكل . ارجلها غضلفة الاثران المجلعة والمبضعة || مسرعا نهاري . قربتها رقيق ازهار الفصيلة الخيمية || يرقاتها مقترنة تعيش تحت لحاء الاشجار المقطوعة اليابسة || أشهر انواعه زوسن النمل المعروف ايضا بوق النمل .

1٢٨٩٩ - زُودَحَن النحل * Clérude des abeilles (F).
حشرة تدعى بوق النمل ، اطليها .

1٢٩٠٠ - زُودَحِيَّات * Clérudes (S). Clérudés (F).
Claridas, Checkered beetles (E). Buntkäfer (D).
فصيلة حشرات من ليات الهند ورتبة عديمات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٧٠٠ جسمها ٣٢ جنسا || اجسامها مسطحة ، نحيلة . لوانها زائغة جميلة . كواسلها صغيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة || اطاحتها تشبه سطح اصقاع العالم واخصها المتناطح الحارة والمضلة الحرارة || يوقاتها مقترنة تدعى في معظم يوقات الحشرات الخالصة || أشهر اجناسها الزوسن والقرود والفتوس والمشرق والسكروبة .

1٢٩٠١ - زُودَع زَاهِر * Anthicus floralis (S).
Anthicus floralis (E).

حشرة وائمة غاشلة دامت من فصيلة الزودعيات ورتبة عديمات الاجنحة . مجلها بعض اصقاع البلاد الممتدة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . تألف البراري والمواقع الغلة . غناصها تعيش على رقيق الاضراس وبتلاتها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير اللد يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى السرة القلابة باستثناء الكويل ويتمد الظهران ظاهرا الى المعصية يطولها سوط صناعي في الذكر . وأنها شبه مستدير الجسم . زياتها غيطيان . صناعها صغرتان . ظهراتها مستدير الطرف الاصح . غلها قليلا الصغيز . ارجلها الاربعة والوسطى خاصة البغل . رصعاا الخليلان رباعا المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في النهار

1٢٨٨٠ - زُهِيرِيَّة * Flosculeuse (F).
Floscular, Floscious (E).
هي الزهرة المركبة من عدة زهورات .

1٢٨٨١ - زُوانِين * Olivraie, Olivrière (F).
Olive-plantation (E).
هي بستان الزيتون او كرم الزيتون .

1٢٨٨٢ - زُوانِف * Reptiles
هي الزواحف ، اسباعها .

1٢٨٨٣ - زُوانِر الحشيد * هو الحطاف ، اطليه .

1٢٨٨٤ - زُوانِر * Asoles (F). Basis (E).
حجارة كلسات الاتي الاول من البناء .

1٢٨٨٥ - زُوان * Extinction
هو انقضاء المدة القانونية .

1٢٨٨٦ - زُوان الإلتزامات * Extinction des obligations (F). Extinction of obligations (E).
هو انقضاء المدة القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى احد الاسباب المخصوص عليها قانونا وهي : التخلي والبراءة والقسامة والتقدم والفسخ والابدال واتحاد اللنة .

1٢٨٨٧ - زُوان اليَد ، زُوان الخيمكة * Dépossession (F). Dispossession (E).
هو عدم التصرف باليمن الذي كان وضع اليه يمينه .

1٢٨٨٨ - زُوان ، زُوان * Lolium (S).
Ivraie (F). Darnel (E).

جنس نباتات عشبية حولية وحمولة وبمرة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها عسفية النصل . ازهارها مشبيلة . منها البرية التي تلتب في المروج والحروث ومنها الزراعية المعروفة واليخضورية || أشهر انواعها ما يلي .

1٢٨٨٩ - زُوان إيطالي * Lolium italicum (S).
Ray-grass d'Italie (F). Italian darnel, l. ray-grass (E).
نبات عشبي حول قابل الاستنشاق يزدح في المروج والمراعي والحقول .

1٢٨٩٠ - زُوان حشلي * Lolium arvense (S).
Ivraie des champs (F).
نوع من الزوان البري ينبت في الحقول والحروث . كثرته مؤذية لانها تقصر بالزروع .

1٢٨٩١ - زُوان مسكر * هو الحطب دقة .

1٢٨٩٢ - زُوان معمر * زُوان إنكليزي ، تسيلكة * Lolium perenne (S). Ivraie vivace, Ray-grass anglais, Gazon anglais (F). Ray-grass, Ryegrass, Red darnel, Lawn-grass (E). Ryegrass, Dauerholl, Engliches ryegrass (D). Lollo perenne, Lollo vivace, Lajessa (I).
نبات عشبي معمر يعضوي معمر قابل الاستنشاق زراعت منتشرة في معظم البلاد .

1٢٨٩٣ - زُوانِع * هو التذغ ، اطليه .



زوان ايطالي



زوان معمر



زوسن



زودع زاهر

بيضاء اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || توريدها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٠٦ - زُودَعَات *
Scaphopoda (F).
Scaphopoda (F).

الزودقيات فئة من الرغويات وحيدة الفصيلة والجنس .
انواعها نحو ٣٥٠ اشهرها الناتكة .

١٢٩٠٧ - زُودَقِي الياسمين * ، زُودَقِي كَمَيْه *
Limenitis camilla (S). Sylvain azure, Petit
Sylvain (F). White admiral Butterfly (E).

حشرة متراكبة الالوان الجميلة من فصيلة الزودقيات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاذن واوروبية . رافشتها جارية قوتها رشيح الاغبار . سرقتها تعيش على الحمايات والياسمينات || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٨ سم . يسلطها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم .
رأسها مستد الجرم . عيناها كيرتان . زبابانها موشطان .
جيشنها وبطنها الى البني الاسود الموالج || رافشتها متراكبة الاسوان والزخارف والتزيين فيها الاسود والازرق والاطحل والاكلس والاشقع والابيض || لها جيل واحد في الحيل . تظهر القراشة في ايار . تسرح في النهار .
تعاثل بعد ظهورها بسة اسابيع وتفتح الممكن لطعاً مستطيلة على نصال اوراق النبات المائل || السرعة تطول نحو ٣٥ سم .
توجه الى الخضار البشري يطوي غشائ جانبيين وريدين .
قشائرها يمشر الحلب الدقيق . رأسها اسود . رواجيسها الصدرية صفراء اللون اما البطنية خضراء || طور الاكامل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متاسكة النسيج .

١٢٩٠٨ - زُودَم

خيشة عريضة يمر بها تراب الارض المرتفعة الى الارض المنخفضة .

١٢٩٠٩ - زُودَمِيَّة *
Zoximia (S).
Zoximia (F). Zoximia (E).

جنس اشعاب برية بحولة أو معمرة من فصيلة الخبيبات .
انواعها المعروفة قليلة العدد متنبها بعض المناطق الحارة من الشرق الاذن || سفوها مستضفة فراء ، منها الزغبية الماء ومنها المغالية . جلودها خليطة ، مغزلية الشكل .
اوراقها متعاقبة ، ريشة ، لاقامية التضريس . انفراسها صيرلي التجميع . انزعارها بيضاء اللون . اشهر انواعها :
زوزبمية افسنتية الورق (Z. abcinthifolia) .

١٢٩١٠ - زُودَعَة *
Tranche (F). Slice (E).
هي التعلمة من البليخ ونحوه . يقال زمت له زودعة من البليخ . ج . زوج .

١٢٩١١ - زُودَعَات *
Adélomycètes (F).
Fungi Imperfecti (F). Adelomycetes (E).

رتبة فطور مجهرية عديدة المراتب والفصائل والاجناس والانواع . معظمها من الفطور اللاقمية التي تطور .
تكاثرها عديد الاشكال ، نواتجها الفرونية التي كانت من صفاتها المميزة ، تسير الآن ركاب العلم الحديث الذي قضى على ما كان يكتنفها من رهوس || مراتبها اربع وهي الزفانينات والصنباينات والميغانيات والميسانيات .
اما فصائلها فتتسع وهي الدلايات والفريات والصديبات والكنتينات والكحيبيات والطحليات والمناينات واهلكيات والوطحيات .

وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسوري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل اذار حيث تدخل في طور الاكامل فتصل الى حورية وينها الى خنفساء . جسمها عند تمام نموها بطول نحو ٧ م . ثوبها الى البياض الاخير .
رأسها الى السرة السوداء . وهي سداسية الروابج ، مستطبة الطرف الدقيق .

١٢٩٠٢ - زُودَع مَزْر *
Anchicus quisquillus (S). Anchicus insigni-

flant (F). Anchicus quisquillus (E).
حشرة مذبذولة واثمة خاضعة دامت من فصيلة الزودقيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم . تألف البراري والمواقع الدفلة وضفاف البحاري الماء .
خنفسائها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة والصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد ، خلي القشار ، بطول نحو ٣ الى ٤ م .
توجه الى السرة الكستنية يطولها في ظهورها زناران صنباين .
رأسها برصي الشكل يطول قرن قلاب يمتد حتى طرف الحبل .
صفيها صغيرتان . زبابانها خيطيان . غمدانها متتابعان التحزيز ، كتيها الحبل . ارسافها الامامية والوسطى خاسية الحبل . رسداه خلفانيان رباعيا الحبل . غالبها صغيرة || لها جيل واحد في الحيل .
تظهر الحشرة الجليدة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسوري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل شهر اذار حيث تتصل الى حورية . جسمها عند تمام نموها بطول نحو ٧ م . وهو اسطواني الشكل ، مستطبل المقدم ، مستطبل الخؤصر ، سداسي الروابج . ثوبها الى الصفرة القدسة . رأسها كستني اللون || طور الاكامل الذي يتم عادة تحت الجلالة والذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي طلياً من كل غلاف .



زودع مزّر

١٢٩٠٢ - زُودَعَات *
Anchicidae (S).
Anchicidae (F). Anchicidae (E).

فصيلة حشرات واثمة خاضعة دامت من رتبة غدييات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف الاشعاب والنباتات الجنية والمواقع الرملية وضفاف البحاري المائية والمناقع واللاهور || اجسامها صغيرة القد ، خضرة الشكل ، مستعرضة للرؤوس ، مستطيلة الزباني الخيطية المركبة من ١١ فصلة . ابراج جبرانها خاسية الحبل باستثناء الزوج الحلفي فانه رباعي الحبل || يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الزودع والنطقسوس .

١٢٩٠٤ - زُور *
Poitrail, Thorax (F).
Breast, Chest, Thorax (E).

هو وسط الصدر بقل ما ارتفع منه الى الكتفين او ملتقى اطراف عظام الصدر حيث اجتمعت .

١٢٩٠٥ - زُورَاء *
Plagianthus (S).
Plagianthus (F). Plagianthus (E).

مجيرة برية وتزيبية من فصيلة الخبيبات . سلطها فراء نبل من ٣ الى ٦ اذبار . اثنادها واثانها متعصب . اوراقها عابلة متعاقبة ، معتقة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مرطاب سنة اذار ، حيلة الخضار الزاهي . انزعارها غسمة التجميع ، محورية الانكازات ، مستطيلة المالحق ، متعالة ،



زودع الياسمين

١٢٩١٢ - زَوْغُونِيَّة

Zoogonia (F).

Zoogony (E).

الزوغونية علم يبحث في تطور الحيوان. راجع شاة.

١٢٩١٣ - زَوْغِيَّات

Pédipalpes (F). Pedipalp (E).

رَبَّة من المَكَبِيَّات تتميز بامتطالة الزوج الأول من

أرجلها فيبدو كزبان الحشرات.

١٢٩١٤ - زَوْقٌ *، جَسَمِيّ، حَسَل، أَشْتَنَ داوود

Hysopus officinalis (S). Hysop officinale (F). Common hyssop (E). Echter ysaop (D). Isopo sacro (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات. ساقه ليفية

منتصبة فروعها تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها لائقة

سائقة، متضابلة. نصلها سناني الشكل بحري الخضار

يطول من ١ إلى ٣ سم. ويمرض نحو: حمى صفحت

بمسطة كثيفة اللند الطرية || أثماره ضئيلة بحورية

زرقاء اللون. أوراقها وإزهاره طرية الرائحة || أثماره

يتمس من حزن إلى أيلول || وين اسمائه إيسوف

وهي لغة عبرانية أما كلمة زوقا فاصلاها الميرغوثي زيت.

منافعه الطبية عديدة. تلعب أثماره منه وعافس. أوراقه

وأوراقه تنقي من السعال وتقوي المعدة. زيت الطري

المستخرج بالتقطير يستعمل في عدة مستحضرات طبية.

١٢٩١٥ - زَوَّلَم

Palpimanos (S).

Palpimane (F)j Palpimanos (E).

جنس حناكب مفترسة من فصيلة الزووليات. أنواعها

المعروفة متوسطة العدد أطلها جميع أصناف البلاد الحارة

من العالم القديم || أجسامها صغيرة اللد أسطوانية الشكل

مغطاة بطول من ١٢ إلى ١٥ م. أثوابها إلى الحرة

الجزوية أو القنزوية. تتميز بامتطالة الزوج الأمامي

من الجفازم الذي يستعمل لالتقاط الفصص ولا يستعمل

لقتيب.

١٢٩١٦ - زَوَّلَكِيَّات

Palpimanidae (S).

Palpimanidae (F). Palpimanidae (E).

فصيلة حناكب من رتبة الزووليات. أجناسها وأنواعها

المعروفة نحو ٧٠ موطنها البلاد الحارة من العالم القديم ||

جميعها مفترسة، متوسطة القد أو صغيرة. تتميز بخلف

يطربها من الصفائح البنية التي تفصل اللسان من بعضها

البفسر، وبغلافه جفازمها الأمامية التي ترفعها دوماً ولا

تستعملها السير || غائبها أجناس حورية اللون تحملها

تحت الحجارة والحزاز والطالبط || أشهر أجناسها الزوول.

١٢٩١٧ - زَوَّلَك

Démarche du Corbeau (F).

الزَوَّلَك: مشية القراب. وهو الخطر المتخارب في تحركه

جسد المائي.

١٢٩١٨ - زَوَّلِيَّت

Zéolithe (F). Zéoliths (E).

مادة حورية.

١٢٩١٩ - زَوَّلِيَّت

Zonite immaculé (F).

حشرة من فصيلة اللبوديات تدعى صفورة، أطلها.

١٢٩٢٠ - زَوْقَر *

Venus (S).

Vénus (F). Venus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم

معديات الأبريل وفصيلة الزوغريات || أنواعها المعروفة

متوسطة العدد، منتشرة في سطر بحار العالم || أصدافها
شبه صيوانية الشكل، متساوية المصارع، ثلاثية
الاستان الرقيقة. أصدافها مائلة أو متطابقة التحيز
اللتيق. أطرافها مسنة الحار. مشاهها ثنائية، طليقة،
مهذبة الأطراف || تعيش منتشرة في القوال المغمورة بالماء
قرب الشواطئ وصيحات الأبر || لحوبها مأكولة، جيدة
الصنف.

١٢٩٢١ - زَوْهَرِيَّات *

Veneridae (S).

Vénérídes (F). Veneridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم

معديات الأبريل || أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة

منتشرة في سطر بحار البلاد الحارة والمتحدة الحارة ||

أصدافها شبه قلنسوة الشكل، متساوية المصارع،

ثلاثية الاستان الرقيقة. مشاهها ثنائية، أنبوبية،

طليقة، معتدلة الطول، مهذبة الأطراف || أعرف أجناسها

وأشهرها الزيرير والشووش وبقرعة.

١٢٩٢٢ - زَوْهَمِيَّات *

Protohémiptères (F).

رَبَّة حشرات منقرضة من طبقة الصفاكات. أحافرها

تعود إلى الحقبة الخامسة والأخيرة من الأياج الأول،

للمعروفة أيضاً بالحقبة البرية || الاسم العلمي يرمز إلى

أنها من أسلاف صفويات الإجنسة وقد تبين فيما بعد أن

الاتقاء المقدر ينقصه الكثير من الأدلة الراجعة.

١٢٩٢٣ - زَوُّلُوجِي

Zoologiste, Zoologue (F).

Zoologist (E).

مخصص بعلم الحيوانات.

١٢٩٢٤ - زَوُّلُوجِيَّة

Zoologie (F). Zoology (E).

علم الحيوان وهو فرع من التاريخ الطبيعي يبحث في

الحيوان.

١٢٩٢٥ - زَوُّلُوجِيَّة زَرْاعِيَّة

Zoologie agricole (F). Agricultural zoology (E).

علم الحيوانات الناجية أي الزراعية.

١٢٩٢٦ - زَوُّلِيَّت

Zoolite (F). Zoolites (E).

الزووليت البقايا المغمورة المتحجرة من كل حيوان.

راجع صيفة.

١٢٩٢٧ - زَوَّلِيَّتِي، زَوَّلِيَّتِي

Mercure, Hydrargyre (F). Mercury (E).

الزئبق عنصر معدني سائل. وهو المعدن الوحيد السائل

يوجد في الطبيعة منفرداً أو متحلاً بناسر أخرى مختلفة

التركيب || رمزه (Hg - هـ) وزنه الذري ٢٠٠.٦١

ثقله النوعي ١٣.٦١ لونه فضي. يجمد في ٤٠° مع تحت

الصفر ويغلي في ٣٥٠° مع || مركباته عديدة تستخدم

في مختلف الأغراض أهمها الصناعية والكالية.

١٢٩٢٨ - زَوَّلِيَّتِي صَعْدَة

Sublimé de mercure

١٢٩٢٩ - زَوَّلَر، زَوَّلِيَّتَر، زَوَّلِيَّتَر

Rugissement (F). Roaring, Roar (E).

صوت إلأسد.

١٢٩٣٠ - زَوَّلَم

Ocellé (F). Ocellus (E).

زَوَّلَم: عين الحشرة أو بسيطة أو مركبة.



زوقا



زير

١٩٩٣٩ - زَيْتُ زُرَاعِيٍّ ، زَيْتُ ابْنِصْ

Huile minérale, H. blanche (F). Mineral oil (E).
يستعمل من تقطير القطران والكشط وهو ما كونه فمال
يستعمل في المكافئة الشوية .

١٩٩٤٠ - زَيْتُهُ هِي غَنَازِيَّةُ الصَّحْرَاءِ ، اَطْلَبَا .

Olea europaea (S). Olivier (F). * زَيْتُون *
Olive tree (E). Echter Ölbaum (D). Olivo, Ulivo (I).
شجرة مثمرة من فصيلة الزيتونيات . اقليمها اقليم حوض
البحر المتوسط يمتد من فلسطين الى اسبانية ومن مراکش
الى تونس . شروبا عديدة جميعها دائمة ، بطيئة النمو ،
طويلة العمر ، سطوها شخنة عجرا ، قشورها سنجابية
مقلعة كاشية ، انصافها غليظة ، افنانها مستدقة . اورقها
عرو ، صغيرة اللد ، معنقة ، متقابلة ، سنانية النصل
الكامل البسيط الجامد || ازهارها سليل التجميع ، ابلي
الارتكاز سليلته تدعى سيلة . ازهارها خشوية ، صغيرة
جلجلية الشكل || ثمارها لحية السوق ، خضراء اللون ،
بيضة او مستطيلة . صلبها خشوية صلبة . برورها
لوزية || تتكاثر بالبذر والمقل والفسال والشطف .
جميع شروبا سريرية تمشي وتشر في مختلف الاربة
لا تحصى سوى المنافع وكثرة الطرية . وهي متناوبة الحمل
زاعمة غير انه يحسن تسليها لان التسميد يحول دون بده
التناوب بين الحمل والشح .

١٩٩٤١ - زَيْتُونُ الْبَرِّ هُوَ الدَّقْنَةُ الزَيْتُونِيَّةُ ، اَطْلَبَا .

١٩٩٤٢ - زَيْتُونُ بَرِّي هُوَ السَّم ، اَطْلَبَا .

١٩٩٤٤ - زَيْتُونِيَّةُ * Olive
ثمرة الزيتون تتركب ويستخرج منها الزيت بالصر .١٩٩٤٥ - زَيْتُونِيَّةُ الْوَلَدِ Olivacé, Olivâtre (F).
Olivaceous (E).
نمت وصي يطلق عل ما كان لونه كازيتوني .١٩٩٤٦ - زَيْتُونِيَّةَاتِ Oléaceae (S).
Oléacées (F). Oléaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات القلوب . اجناسها وانواعها كثيرة
العدد تنتمي الى ثلاثة اسباط : الزيتونيه والمرانيسه
والياسمينيه .١٩٩٤٧ - زَيْتُونِيَّه Oléifère (F). Oleiferous (E).
نمت تمرني يمر من وجود المادة الزيتية كدولك الخروع
نبات زهي .١٩٩٤٨ - زَيْتُونِيَّه Huileux (F). Oily (E).
ما كان شكله كازيت .١٩٩٤٩ - زَيْتِين Oléine (F). Oleine (E).
احد مركبات الزيتون الدهنيه والشعوم الجامدة .١٩٩٥٠ - زَيْج Table astronomique (F).
Astronomical table (E).
قائمة حسابية فلكية تركز عل تتابع دوران بعض
الاجرام السماوية بموجب ترتيب سماوي خاص يدعى
القنورة . اما الاجرام التي تتألف منها القنورة فهي بترتيبها
المرجع والشمس والزهرة وعطارد والقيمر وزحل والمشتري .١٩٩٣١ - زَيْكَاكَة Accroissement (F). Increase (E).
هو حق زيادة حصة الارث نيا او نقل احد او بعض
الورثة من حصتهم .١٩٩٣٢ - زَيْكَاك Tord-nez, Mouchette (F).
Twitch, Barnacles (E).
لاقط غشي تضغط به جيفلة الفرس فيدل .

١٩٩٣٣ - زَيْكَاك هو المستورد قد من فضيلة السيويات .

١٩٩٣٤ - زَيْكَاك Décorateur (F). Decorator (E).
من تعامل مهنة الزئين .١٩٩٣٥ - زَيْكَاك Chlamydera (S).
Chlamydère (F).
جنس طير من فصيلة الخريشيات . انواعه المعروفة سبعة
موطنها بلاد استرالية . ملينها الحيالي زويبي في الربيع
والصيف ثم جلي . تألف الغابات والادغال . قريبا الكبار
اغصها الدراق والشمش والئين والموز والبرتقال وبعض
الزور وجميع انواع الحشرات || اجسامها معتدلة اللد ،
تعطلي من ٢٤ الى ٣٠ سم . اثنائها خفلة الالوان جميعها
مبفحة وبشوية يقتنازع قفنية الالتشاب . اثنائها عادمة
للقنازع ، بلغة الالوان || من ميزاتها انها تقم بالقرب
من امشاشها سارعا مسقية بالرش تزيها بمختلف
الاديا ، الملونة تبسطها سد من القضايا المحبوبة لتعليها
الاناث كلما اشتهت السفاد || احرف انواعه واشهرها
الزيران المبرش .

١٩٩٣٦ - زَيْكَاكُ مَبْرَشِ Chlamydera maculata (S). Chlamydère tacheté (F).
نوع من الزيران . موطنه بعض مناطق استرالية . يألف
الغابات القريبة من الحدائق والسران . قوته الثار والبزور
والحشرات || جسمه معتدل اللد ، يطول نحو ٢٧ سم .
ثوبه اسود الصفرة العليا المبرقة بالانحر والاصفر
والبرتقالي . صدره وبلته واثنيكه الى الفرة يطولها مزلج
اصفر قفنته برتقالية اللون . ثوب الاثي ابيض من ثوب
الذكر واقل رشفة منه || يدن حشه في الاجمار الرقيقة
ويشم سرعه حيث يستطيع . الاثي تحسن مزان في
الحول وتضع في كل مرة من بيضتي الى ثلاث بيضات
ترخها بمثابة الذكر .

١٩٩٣٧ - زَيْكَاكَة ، عَشْبَةٌ هندية Hemidesmus indicus (S). Hémidesme indien,
Salsaparilla de l'Inde (F). Indien sarsaparilla (E).
Halbuden, Indische sarsaparilla (D). Salsaparilla
d'India (I).
جنية عارضة معمرة من فصيلة الصلصليات . اورقها
معنقة قلبية ، نصلها اخضر الصفرة العليا ، عاين
السفل . ازهارها متكونية التجميع ، محورية الارتكاز
ملوانة || يقال انها لا تخول من المنافع الطبية . تستعمل
لقرين .

١٩٩٣٨ - زَيْت Huile (F). Oil (E).
سائل دعي نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور
النباتات الزيتية ومن ضخوم الحيات وغيرها || والزيتون
تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وبنافة . جميعها أقل كثافة
من الماء ولا تقرب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة
اغصها الطعام والاضادة وصناعات الصابون والشح .



زيران مبرش



زيتون



زيتونة

١٢٩٥١ - زيتون

هو اكسيد الرصاص السليمي . له لونه احمر القنبر . يقتل البعوض . صلاته من ٢ الى ٣ || يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع عنه الصدأ .



زيتون

١٢٩٥٧ - زيتون صرصور

Cicadatra quadra (S). *Cigale criarde* (F). *Psosiph cicadatra* (E).

حشرة صرارية من فصيلة الزيتونيات . جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم . يستعمل تزاحم من ٥٥ الى ٦٤ سم . || ثوبها الى الكسني الاسمر تملو زخارف بريقالية في الرأس والكتف . وفي جانبي البطن . الصلصة السفلى من البطن سوداء . رأسها مستعرض ضخم . عظمها مثلث الطويل . صناديق كيرتان . زباناها صفراء . كوتلها شبه مربع . اجنتها فضائية ، شفافة ، مدبجة بالاسود . قوائمها نشطة مهيبة || تسرح في النهار . تتميز بكثرة مرصرتها . تألف الحراج والحداق القديمة الاجار .



زيتون البحر

١٢٩٥٨ - زيتون صرصور

Lyrissus plebejus (S). *Cigale commune* (F). *Common cicada* (E).

حشرة صرارية مهيبة من فصيلة الزيتونيات . جسمها كسني الى ١٠٠ سم . || ثوبها كسني اللون اسفح الحراج . الصلصة السفلى من البطن الى الصلبة عليها حمار اسود يتقلب الى الاصفر عند مؤخر البطن || رأسها مستعرض الجرم يطول يتجمع ابيض واثني . عظمها غرزي الشكل . صناديق كيرتان . زباناها صفراء ، مديقان . كوتلها شبه مربع الشكل . اجنتها فضائية شفافة ، قليلة المروق ، كثيرة الانصاب . قوائمها نشطة ، مهيبة || تسرح في النهار . مهيبة في جميع الحراج اما يكثر ويحدا حل الصنوبر .



زيتون الصنوبر



زيتون الغاب

١٢٩٥٩ - زيتون

Barbus . هي اطراف الفرس .

١٢٩٦٠ - زيتون

Zizania (S). *Zizania, Riz d'eau* (F). *Water oats* (E). *Wasser reis* (D). *Zizania* (I).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة اورانها صفية النسل . زنادها متكونة التجميع . ثمارها حبوب دقيقة مستطيلة مأكولة سكرية الطعم وافر المذاق النشوية || الشجر انزلها : الزيتونية الرقيقة الورق (*Zizania latifolia*) وهي عشبة مسرة مأكولة الجلع منها نباتات منافع الصين . والزيتونية الكندية (*Zizania canadensis*) وهي حولية تزود بها المأكول .



زيتون صرصور



زيتونية

١٢٩٦١ - زيتون

Perameles (S). *Péramèle, Bandicoot* (F). *Bandicoots* (E).

جنس حيوانات جلمة لاجه من فصيلة الزيتونيات ورتبة الجرابيات || انواعه المروفة حسة موطنها بلاد استراليا || اجسامها ريمية تطول من ٤٥ الى ٦٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها اسفينة الشكل ، مستطلة المقاطع الدالة . اذنانها كاسية تطول من ١٠ الى ١٦ سم . || قوسا الديدان والحشرات المختلفة والسائل .



زيتون

١٢٩٦٢ - زيتونيات

Peramelidae (S). *Peramelidae* (F). *Peramelidae* (E).

فصيلة حيوانات جلمة لاجه من رتبة الجرابيات . اجسامها المروفة اربعة موطنها بلاد استراليا . رمتها الاجراع || اجسامها صغيرة القند ، مستطلة الشكل ، جسمها لا يتجاوز حجم الارنب . رؤوسها اسفينة مستطلة المقاطع . قوائمها الخلفية اطول من الامامية . نظام تركيب اسامها

١٢٩٥٢ - زيتون

Cigale (F). *Seventeen year locust* (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيتونيات انواعه عديدة طولها يراوح من ١٦ الى ٤٠ سم . ويستطاع من ٤٥ الى ١٠٠ سم قوائمها غظلة الاوان يكثر فيها الاسود والاسمر والابروي . تمش على بعض الاجار الحرجية والزراعية اعصها الصنوبر تتميز بصورتها الحادة للاستقطعة المزنية كاتها تقول فيها زيتون .

١٢٩٥٣ - زيتون احمر

Tibicen haematodes (S). *Cigale rouge* (F). *Red cicada* (E).

الاسم العلمي يعني ه نمار . حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات ورتبة حشرات الاجنحة . جسمها كبير القند ، يطول من ٢٨ الى ٣٨ سم . يستطاع من ٧٦ الى ٨٦ سم . || ثوبها الى الصنابي الاحمر المالح . رأسها مستعرض مستعرض يطول يتجمع اخضر وافر واسفر . عظمها مثلث الطول . صناديق كيرتان جاسطان . زباناها مديقان ، صفراء . كوتلها مربع الشكل ، مديقان والافير والاحمر والاصفر . حية بطنا اخر . اجنتها فضائية ، ملطها مبروقها رصاصها عتابة اللون . قوائمها صغيرة مهيبة || تسرح في النهار . تألف الحراج والقدابات .

١٢٩٥٤ - زيتون البحر

Scyllarus latius (S). *Scyllarus, Cigale de mer* (F). *Shrimp* (E).

حيوان من القشريات حماريات الارجل . مهيبة في مياه السواحل البنانية .

١٢٩٥٥ - زيتون الصنوبر

Cicada orní, Scutiger orní (S). *Cigale panschée* (F). *Orni cicada* (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات . جسمها مستطع الجرم يطول من ٢٢ الى ٢٨ سم . يستطاع من ٦٨ الى ٧٨ سم . || ثوبها الى البني الاشعث يبق في الرأس والكتف . عظمها غرزي الشكل . صناديق كيرتان جاسطان . زباناها ريشي الشكل عند الذكر ، عظمي عند الانثى . كوتلها مديقان ، مديقان بالابروي . بطنا اصفر اخيد . اجنتها فضائية تملو ، في الزوج الامامي ، بعض التكت المسر || تسرح في النهار . رمتها الحراج اعصها حراج الصنوبر .

١٢٩٥٦ - زيتون الغاب

Cicadetta sylvestris (S). *Cigale sylvestre* (F). *Wood cicadetta* (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات . جسمها شبه وشي الشكل ، يطول من ١٨ الى ٢٢ سم . يستطاع من ٤٦ الى ٥٤ سم . || ثوبها الى البني الاسمر يطول يتجمع ماني في الرأس والكتف . رأسها عريض . عظمها مستط الطول . صناديق كيرتان . زباناها صفراء . كوتلها شبه مربع . بطنا غرزي الشكل ، عتابة اخيد . اجنتها فضائية ، متعابة المروق والاصعب . قوائمها صغيرة ، مهيبة || تسرح في النهار . تألف القابات واجار خفاف مجاري الماء .

١٢٩٦٨ - زَيْفُون صَغِير الْوَرَق

Tilia cordata, *T. parvifolia* (S). *Tilleul à petites feuilles* (F).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أروبة. ثمرته تملو من ٥ إلى ٢٥ م. أوراقها قليلة الشكل، صغيرة القد. نصلها حلق الصفحة العليا، أزرق السفلى. ثماره صغيرة الحجم غالية من الأنسل || ازهاره يستمر من حزيران إلى عوز.

١٢٩٦٩ - زَيْفُون فَهِيءٌ وَ جَيْسُون

Tilia argentea (S). *Tilleul argenté* (F).

نوع من الزيفون الزبني مهدد الشرق الأدنى، ثمرته هرية الشكل. لثانها خلية الحاء. أوراقها متوسطة القد، نصلها حلق البشرة فني اللون والمالح. ثماره بيضية الشكل بيضاء الصلوع || ازهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

Tilia mongolica (S). *١٢٩٧٠ - زَيْفُون مَنُغُولِي*
Tilleul de Mongolie, *T. à feuilles de vigne* (F).

نوع من الزيفون الزبني مهدد الصين. ثمرته تملو من ٢ إلى ٨ م. أوراقها صغيرة القد ثلاثية الفصوص نصلها سنن الحافة، مائل البشرة. ثماره غالية من الأنسل. ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

١٢٩٧١ - زَيْفُون مِيَشُوكِي

Tilia michauxi, *T. neglecta* (S). *Tilleul négligé* (F).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أمريكا الشمالية. ثمرته تملو من ٢ إلى ٢٥ م. لثانها حر السماء أوراقها تملو من ١٠ إلى ١٧ سم. نصلها أزرق الصفحة السفلى يصفر عند دخيل أغريق || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

١٢٩٧٢ - زَيْفُون هُولَنْدِي

Tilia platyphyllos, *T. europaea* (S). *Tilleul de Hollande* (F).

نوع من الزيفون الزبني مهدد أروبة. ثمرته تملو من ٢٠ إلى ٤٠ م. لثانها زباد الحاء. أوراقها تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. نصلها أخضر الصفحة العليا، حلق السفلى الموشة بالأزرق. ثماره اجاسية الشكل، خلية الصلوع البارزة || ازهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

Tiliaceae (S). *١٢٩٧٣ - زَيْفُونِيَّات*
Tiliacées (F). *Tiliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مهدد المقالات. اجناسها وانواعها عديدة منها الاجبار والشجيرات والجنابات والاشباح. أوراقها متعاقبة. ازهارها فردية أو متقوية التجميع، عومري أو تاجي الارتكاز. ازهارها غشوية، صغيرة القد، عطرية الرائحة.

١٢٩٧٤ - زَيْفُون الْحَقْل

Lycops arvensis (S). *Lycopside des champs* (F).

نبات عشبي بري معروف من فصيلة الجسنيات. شكله قريب الشبه بالاشوة. يختلف عنها بالازهار المرفوعة الانابيب || ساقه منتصبة، قليلة الفروع، تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة، لينة، مزينة النصال. ازهاره طرفي الارتكاز. انقاره بنفسجية اللون في اولى حملها ثم زرقاء. تنويره يستمر من حزيران إلى آب || يعتبر من النباتات المروية المسنة والمدرية.

لا يختلف عن النقر. اجرة انثاء مستقلة الرعاية تلتف ثمانية اطياف وتتفتح من الوداء || أشهر اجناسها الزيزب والكريبوب.

١٢٩٦٢ - زَيْفُون عَنَكِيَّوِي ٥ زَيْفُون شَكْرِي ٥

Styphus schaefferi (S).

Styphus araeformis (E). حشرة نائلة دامت من فصيلة الجملليات وثنية مفصلات الاجنحة. تألف الموامق التي يكثر فيها البراز. تعيش على يصر الماهز والقمم وعلى أنسلع والمواد النباتية المنسلة || جسمها صغير القد بطول من ٦ إلى ١٠ م. قوسها إلى السواد الكامد. رأسها مستعرض الشكل. زباناتها دقيقان. صينها صغيرتان. ظهورها ضيق الطرف المقطوم الذي لا يلتصق كامل البطن. ارسافها خاسية النعل || الذكر اكبر قدماً من الانثى واصلق قوساً منها وقصر سريراً || لها جيل واحد في الحول. تقطر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع ويبقى حتى اواخر الصيف. تسرح في التبار. تساف في شهر آب. تنجح الحكن في البر وتطمره في القرباب || البقرة عند بلوغها الكمال الجسموري تطلو من ١٤ إلى ٢٢ م. جسمها مستطيل الجسم، ضلع الكثير، قصير الرواجب، شحلي السنين، جتري الرأس || طوره الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة.



زيفون عنكبيي

١٢٩٦٤ - زَيْفُون

Tilia (S). *Tilleul*, *Tilio* (F). *Linden*, *Lime tree*, *Lime-blossom tree* (E). *Lindenbaum*, *Linde* (D). *Tiglio* (I).

جلس اجبار حربية وزبينية من فصيلة الزيفونيات. انثاءه عديدة اوراقها متعاقبة، متعاقبة، عابلة. ازهارها عطرية، نورية، عومرية، خاسية الفصل والقياسات مهددة الاسدية. احشائها صناعية. تقشورها ليفية تستعمل استعمال القطن. ازهارها وأوراقها طيبة مرققة وبيضاة القطن. تسكن السلك وتفيد الصدر. تهلك الاصاب كالابرئين وتفيد الالتم. ويستخرج من زبونها مادة مهدية شائعة الاستعمال الطبي || أشهر الوداء ما يتبع.

١٢٩٦٥ - زَيْفُون الشَّرَقِي

هو الخلاف الضيق الورق، اطلبه.

١٢٩٦٦ - زَيْفُون اَمْرِيكِي

Tilia americana, *T. glabra*, *T. nigra* (S). *Tilleul d'Amérique* (F). *American lime-tree* (E).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أمريكا الشمالية. ثمرته تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. أوراقها تملو من ٩ إلى ٢٠ م. وتعرض من ٦ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة عابق الخضار، سنن الحافة، مستطيل المتق. ثماره كروية غالية من الأنسل || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زيفون شائع

١٢٩٦٧ - زَيْفُون شَائِع ٥ زَيْفُون مَبْدُول

Tilia vulgaris (S). *Tilleul commun* (F). *Common lime-tree*, *C. lindae* (E).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أروبة. ثمرته تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. أوراقها متوسطة الحجم. نصلها سنن الحافة، مدبب القصعة، ياهت الخضار. ثماره مستطيلة، خلية الصلوع البارزة || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زيفون الحقل

١٢٩٨٧ - زَيْطُولُ أَصْفَر

Ixia viridiflora (S).
Ixia verto (F).

نوع من الزيطول شراعه يملو نحو ٣٠ سم. سبلته قصيرة. ازهاره كبيرة اللد لونها الى الاخضر تتوسطها بقعة سوداء. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٣ - زَيْطُولُ أَصْفَر

Ixia lutea (S).
Ixia jaune (F).

نوع من الزيطول شراعه يملو نحو ٣٠ سم. سبلته رديدة. ازهارها كبيرة اللد ، فليسة البرف المستحب ، صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٩٨٤ - زَيْطُولُ بَهِي

Ixia speciosa (S).
Ixia superbe (F).

نوع من الزيطول شراعه يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. سبلته طويل نحو ١٥ سم. تحمل من ٦ الى ٧ ازهار كبيرة اللد حراء اللون || ازهاره من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٥ - زَيْطُولُ عَدَكي

Ixia paniculata (S).
Ixia en panicule (F).

نوع من الزيطول شراعه يملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره ملطحة التجميع ، كبيرة اللد ، مستطيلة الاطراف ، لونها الى الالبيض المشع بالاحمر . بقعها الوسطى سود . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٢٩٨٦ - زَيْطُولُ مِسْبَال

Ixia polystachya (S).
Ixia à plusieurs épis (F).

نوع من الزيطول شراعه يملو نحو ٣٠ سم. يحمل ٣ سبلات ازهارها بكثيفة التجميع قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الالبياض الناصع . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٧ - زَيْطُولُ مَطْلُخ

Ixia maculata (S).
Ixia à macule (F).

نوع من الزيطول شراعه يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. سبلته قصيرة . ازهاره بكثيفة التجميع لونها الى البرتقالي المشع بالالبيض والمطلخ بالاحمر . بقعها الوسطى زرقاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٨ - زَيْفَان

Déviation (F). *Deviation* (E).
الزيفان والزيف هو التغير الطارئ على الاتجاه الطبيعي مما كان سببه .

١٢٩٨٩ - زَيْفَم

Eau salée, saumâtre (F).
Salt water, Briny water (E).

يقال للين المالحه عين زيفم ويقال للين المذبة عين ميم .

١٢٩٩٠ - زَيْفَاء

Daphniphyllum (S).
Daphniphyllum (E).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القريبيينات . مهدا بعض اصقاع الشرق الاقصى . ساقها تنمو نحو ١٥ م. اوراقها سنانية الشكل طويل من ١٢ الى ١٨ سم. وتقرض من ٥ الى ٧ سم. ناعما جلدية ، غضر الصفحات العليا ، طسل السفل . ازهارها ثنائية المسكن ، حذيفة الجرم ، عتقودية التجميع ، محورية الارتكاز . الذكرية منها عديدة القصل والاسدية . اما الانثوية فتلاية المياسم . ثمارها لحية زيتونية الشكل والحلم تحوي عصمة واحدة صغيرة .

١٢٩٩٥ - زَيْتُونِي *.

Emberiza cyrlus (S). *Ziti* (F).

طائر من الجوارم وفصيلة الثشوريات . موته معظم مناطق اروية مجموعا في طلب المصيف والمشت . قوته الحشرات والبروز || جسمه صغير اللد يطول نحو ١٦ سم. ثوبه جميل الالوان المتداخلة تكثر فيه الشبهة الزرقاء يملؤها تمشيع اصفر واخضر ، وتمشيع اسود في الرأس والجنح ، وايض واثنع في الصدر والبطن . زوره اسود . محمره الى الشقة. عيناها مكلحات بالاسود. منقاره صغير الجرم. ذنبه غارق الطرف .

١٢٩٩٦ - زَيْتُونِيَات

Cicadidae (S). *Cicadidae* (F). *Cicadidae* (E).

فصيلة حشرات من صفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها كثيرة اللد تتميز باجنحتها الشفافة . بذوائجها الثلاثية الزئام وباصوات ذكورها الصرصرية . جميعها من حشرات المناطق الحارة والمستقلة . حشرات الكاملة تعيش من ٦ الى ١٠ اسابيع قوتها للفس الذي تحبب منه افنان مختلف الانهار || انثاها تفتح نحو ٤٠ مكتة في عام الانصاف والافناد الباهية تفتتح من ربات تعيش في التربة نحو اربعة اعوام حل جلور مختلف الالماشب والنبات.

١٢٩٩٧ - زَيْتُونِيَات *

Sisyridae (S). *Sisyridae* (F). *Sisyridae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذافات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة اللد ، نحو ٣٠ ، منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والصحرة نحو الهادة . تألف صفاف مجاري الماء . انثاها تجمع الحكن على النباتات المائية || اجسامها صغيرة . سبله اجنحتها تراوح من ١٠ الى ١٦ سم. رؤوسها شبه مكورة . عينها جاحظة . قرونها الاستعمارية عينية مستطيلة . اجنحتها شبه متساوية بين الزويين . كواسلها قصيرة . بطنها اهلجية الشكل . انثاها قصيرة المزوات || يرقاتها مائية ، مفترسة || لشهر اجناسها الزيزيرة .

١٢٩٩٨ - زَيْتُونُورَا

Ziziphora (S). *Ziziphora* (F). *Ziziphora* (E).

جنس نباتات طعية ، برية وسولية من فصيلة الثشويات التريجات . انواعها ٨ جميعا برية منها الشبية للعادة والتبسية والجنبية . اوراقها مقابلة ، كلمة ، سنانية زغية . ازهارها محورية وتاجية .

١٢٩٩٩ - زَيْطَلَة

هي الارض الرصاصة ، المطبة .

١٢٩٨٠ - زَيْطَلَة

هي للاهرة الربداء ، المطبا .

١٢٩٨١ - زَيْطُول *

Ixia (S). *Ixia* (F). *Corn tily* (E). *Klebschwerzel* (D). *Ixia* (I).

جنس نباتات يسلم من فصيلة المسمليات لوانوعه المعروفة ٣٥ جنما تربوية وصناعية . اوراقها قرصية الالتفاف مستطيلة ، لصلها ضيق الصفة الجلمدة المتصبة . ثمارها الزهرية طويل من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها سليل او حلقى التجميع . ازهارها جملة الشكل والالوان الزرقية . يستخرج من بصلها عصارة لزبة صناعية || لشهر انواعه الزيبونية ما يتبع .



زيتوني



زيفول

١٢٩٩٨ - زيتانة فضية * Ablette (F).

Small bleak (E).

سمكة بحرية صغيرة القد فضية اللون تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. حراشفها لؤلؤية المادة، صناعية، تلمس على الشرج وروح الشرق. تستعمل في صناعة اللؤلؤ الكاذبة.

١٢٩٩٩ - زيتب * Zkibel, مسك رصي ,

Polistes tuberosa (S). زيتب طرابلسي

Tubéreuse, T. des jardins (F). Garden tuberosa (E).
Echte tuberosa (D). Tuberosa (I).

الواحدة زينة. نبات عشبي يصل صسمي مسمر من فصيلة الوردية. أوراقه خضراء مستطيلة مخددة النصل. ثمراته الأزهرية سائي الشكل ، موزق ، يطول من ٧٠ إلى ١٥٠ سم. ازهاره سائي التجميع. ازهاره مستطيلة، جميلة، بيضاء اللون، فواحة العرف الذي يستخرج من ازهاره بالتقطير حطر فاخر عتيق. ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين.

١٣٠٠٠ - زيتكة هي انصاليا كسموس ، اطلها .

١٣٠٠١ - زيتكة * Zinnia (S).

Zinnia (F). Youth and oldage (E). Zinnia, Schmuckzinnia (D). Zinnia, Fiori stellini (I).

جنس نباتات من فصيلة المركبات معقودة التبريد على اسم الطبيب البوتاني «زين» انواعها وفروها كثيرة المند جميعها عشبية حولية زينة مهدا للمكسيك. سوطها فراء تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها حاشنة متعاقبة جميلة الخضار. ازهارها رؤسية، فردية، تاجية الارتكاز، عديدة الالوان السوية او الموشحة. وهي من النباتات السروية المبلولة في جميع الحدائق، ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف.

١٢٩٩٩ - زيتونات * Chromoportées

مادة تطور بجمهرة من فصيلة الطليحات. اجناسها ثلاثة : الأفيوكلاديم ، الميسايوفوز والنيكروسترويه .

١٢٩٩٢ - زيتع الزيتع : ضرب من البوع صغار .

١٢٩٩٣ - زيتلوز، كسيلوز، عخبوز Xylose

مادة سكرية تستخرج من قصب اللوز الصغراء وقش الخنطة وعشب الزان ونبات الطويل الخ .

١٢٩٩٤ - زيتمكل Zymme

خيرة عجمالية تحول صروب السكر الى كحول وغاز كربوني .

١٢٩٩٥ - زيتولوجية * Zymologie (F).

Zymology (E).

الزيمولوجية علم التخمير او الاغيار .

١٢٩٩٦ - زيتاب Zinebe

فاطور زراعي شديد اللعج لا يلقي النبات يرتكر حل مادة كربمات الزنك يستعمل في مكافحة الامراض الفطرية اعصها المليلير .

١٢٩٩٧ - زيتانة ، سمكة يضاء Salmo (S). Able, Poisson blanc (F). Bleak (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشبوطيات. انواعه عديدة موطنها بميرات واهر الشرق الاذل وأوروبية. جميعها صغيرة القد دقيقة | اعرف انواعه واشهرها الزيتانة الفضية .



زينة فضية



زيتب



زينة



س



ساج

١٣٠٠٨ - سكاركة ، وكينكة Lamelle (F).

رأية صغيرة من الزجاجة متاحة في الفكة تشمل لتغطية القطاعة المطلوب فحمها تحت الجهر .

١٣٠٠٩ - ساج * ، دلب هندى Tectona (S).
Tack, Tok' (F). Teak-tree, East Indian oak (E).
Teakbaum, Indische eiche (D). Tak (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الساجيات . انواعها ثلاثة جميعها اشجار ضخمة دائمة وظلمة . اوراقها متعككة ، متقابلة ، ريشية الشكل . نصلها خالي البشرة ، بارز العروق والشرايين . اغصانها عتقودي التجميع ، متصب الجلس ، ناهي الاوتكاز . اغصانها عتقودي صخرة ، بتلاتها ليس . ثمارها نوبية كروية مأكولة . اغصانها شديدة الصلابة . وقصها كثيفة الاذرات المتراصة التي تحول دون الانفعال بالمواد الخارجية . تشمل خاصة في صناعة السفن .

١٣٠١٠ - ساجو Sajou

هو السوس قود من فصيلة السوسيات .

١٣٠١١ - ساجول ، سوجل ، سوجكة Clisse (F). Wicker (E).

غلاف القارورة يحبك عادة بالقضبان الخفيفة او بقند القصب .

١٣٠١٢ - ساجوم Moullant (F). Wetzling (E).

كل سائل شديد اللبونة واللزوجة يضاف الى الادوية الزراعية ليزيد انتشارا واصفاً .

١٣٠١٣ - ساجيات Verbenaceae (S).

Verbenacées (F). Verbenaceae (E).
وتعرف أيضاً برعي الحام . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيادات التعلالة . اجناسها وانواعها كثيرة

١٣٠٠٢ - ساجي Septennal (F). Septennial (E).
هو ما يدوم سبع سنوات او ما يماز كل سبع سنوات .

١٣٠٠٣ - ساجي Gagnant (F). Winner (E).

الذي خيل الحلية وهي عشرة عند العرب اولاً السابق المعروف بالهلي ثم الفسل ثم الحسل ثم التال ثم المراتح ثم الماطف ثم الخطي ثم الخويل ثم العلم ثم السكت .

١٣٠٠٤ - سابسدييات ، سبتدييات ، سابسدييات Sapindaceae (S). Sapindacées (F). Sapindaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة التعلالات . اجناسها ١١٨ تشمل زهاء ١٠٠٠ نوع . منها الاشجار والشجيرات والجنات والفسلفات والاشواب . اغصانها رباحية او لحسية التركيب . ثمارها كعبورية او نوبية .

١٣٠٠٥ - سابيوت ، سابيوط Carpe (F). Carp (E).

هو الشبوط ، اطلب .

١٣٠٠٦ - سابييا Sabia (S).

Sabie (F). Sabia (E).
جنس نباتات جنسية معمرة من فصيلة السابيات . انواعها سبعة معظمها زراعي قزني || اغصانها كبيرة ، جملة ، حراء اللون ، كثيرة الاسدية الصفراء الملهية || تزود في المراكن لانها تنقى البرد .

١٣٠٠٧ - سابييات Sabiaceae (S).

Sabiaceae (F). Sabiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة التعلالات مرتفعات اليبس . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٢٠ جميعها جنات صغيرة واعشاب معمرة منها بعض مناطق افريقية الاستوائية والحارة || اشهر اجناسها السابيا .

تنبى اللون || بوفاته اعليجية شفاة قياها نحو
٣×٥ ميكرون || يكلف باقتلاع النباتات الموصية
وباستمال النورة الزراعية لاجتناب استمرار زراعة
المنبوت او القطن سة بعد سة في نفس الموضع .

١٣٠٢٢ - **ساجيد** (F). Decurrent (E).
نمت وصفي تمرني لكل ورقة او جزء منها كالنق
والضلع تنمو لاصقة بالند او البليقة او اللين .

١٣٠٢٣ - **سكاد** Tapir
هو السناد ، اطليه .

١٣٠٢٤ - **سكاج** هو قرفة ملابار ، اطليا .

١٣٠٢٥ - **سكاجحة** (F). Downpour (E).
السجاجة للشجدة الانهار التي تصرع النبات .

١٣٠٢٦ - **سكادوكان** هو اشة الصباغين نوع من الحرازان .

١٣٠٢٧ - **سكاديبي** (F). Sexennial (E).
هو ما يلوم ست سنوات او ما يعادى كل ست سنوات .

١٣٠٢٨ - **سكالات الاجنحة** (S). Megaloptera
Megaloptères (F). Megaloptera (E).
رنية حشرات نافقة من طبقة عصيات الجناح تشمل
فصيلتين والعديد من الاجناس والاناوع . جميعها كبيرة
القد او متوسطة . رقاتها مائية لاحة .

١٣٠٢٩ - **سكادون** (F). Nictitans (E).
نمت تعريفى يطلق حل كل غشاء متحرك من قطب الى
قطب كما في غشاء العين الثالث عند الطير .

١٣٠٣٠ - **سكادات الاجنحة** (S). Mecoptera
Mécoptères (F). Mecoptera (E).
رنية حشرات من طبقة سفليات الجناح . كانت كثيرة
الانتشار في الاسحاب النافرة . تتمثل الان بفصيلتين .
اعظامها لاهقة . زباناها عديدة الفواصل .

١٣٠٣١ - **سكاج هندي** هو المستويه ، اطليا .

١٣٠٣٢ - **سكاذي** (F). Sarcocarpe
من اللبأ ما هي لحمية اللدق .

١٣٠٣٣ - **سكاريه** * ، **سكاريه** ، **سكير** ، **سكير**
Istophorus nigricans (S). Makira, Voilier (F).
سمكة بحرية بيوض مفترسة من فصيلة السبيليات ورنية
ثلاثكات الزعانف . اعطائها المناطق الاستوائية من المحيط
الاطلسي . تتميز اسرع سمكة معروفة . سرعة عصبها تقارب
١٢٠ كيلومتر بالساعة || جسمها كبير اللقد ، وشفي
الشكل ، يطوله نحو سة امتاز . ثوبا الى الزرة البحرية
يمضي في الظهور ويختفي في البطن . تتميز اولاً بكبر
زعنفها الظهرية المستعرضة الزرقية التي تبدو ، عند نشرها ،
كالشراع . ثم باستطالة زعنفتها الخشوية القليلة المرض .
وتتميز ايضاً باستطالة عظم فكها العلوي الذي يبدو كالبرع
المستقيم النصل المذهب الطرف || يقال انها تعيش نحو ٤٠
سنة وتكون يافعة بمر ٣٨ سنوات || لحمها كامن
الصفن ، كثير المادة الزيتية .

١٣٠٣٤ - **سكاسلي** هو الثيرموپ الحزني ، اطليه .

العدد فيها الاشجار والشجيرات والجنات الماداة . وفيها
النباتات الطبية والمقوية والمضادة السموم || اشهر
اجناسها الساج وربي الحام والارثه .

١٣٠١٤ - **ساجينة** * Sagina (S). Sagina (F). Pearl-
wort (E). Lagerkebel, Sternmoos (D). Sagina (I).
جنس نباتات عشية من فصيلة القرنفليات . انواعه
قليلة جميعها معمرة صغيرة اللقد ، سويتها حزنية ، اوراقها
خززية متقابلة متحدة القاعدة . ازهارها يضاء اللون ،
صغيرة اللقد ، عادية القالدة والطلاة || اشهر انواعها
النبات التالية .

١٣٠١٥ - **ساجينة ذرية** Sagina subulata (S).
Sagina subulée (F).
نوع من الساجينة تعلو من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها خززية
ذرية . ازهارها خماسية التركيب . ازهارها يستمر من
ايار الى تموز . ترغب في الارثية الرملية .

١٣٠١٦ - **ساجينة زبانه** Sagina pilifera (S).
Sagina pilifera (F).
نوع من الساجينة تعلو من ٣ الى ٨ سم . اوراقها صغيرة
زباء النصل . ازهارها خماسية التركيب كبيرة البلات .
ازهارها يستمر من حزيران الى آب . ترغب في الارثية
القليلة الانساج .

١٣٠١٧ - **ساجينة ممتسكة** Sagina procumbens (S). Sagina couchée (F).
نوع من الساجينة تعلو من ٢ الى ١٠ سم . ازهارها
رباعية التركيب . ازهارها يلوم من ايار الى تشرين
الاول || ترغب في الارثية الرملية .

١٣٠١٨ - **سكوير** Circe (F).
Circe, Circinus (E).
الساحر كوكب . سيار من الخفس يحمل رقم ٣٤ . يمد
اكتشافه للفلكي هـ شكونزك عام ١٨٥٥ .

١٣٠١٩ - **ساحل** ، **سجداح** Littoral
الارض القريبة من الشواطئ البحرية .

١٣٠٢٠ - **سكروج التنبوت** Phaeolus schweinittii (S).
فطر ربي من فصيلة السميات مركب معطر الراتنجيات
اعصها التنبوت . اروسه زرية الشكل خفيفة . صفحتها
اللبا عمدة عمودية كيفية الحرافش الخفيفة اللون الصفاء
المليح . لبها اسفني التركيب لونه الى الصفرة المايقة .
مشبه ابيض الحيف الكثيف يمتري النبات في مستوى
الجذور وينفذ الى قلب الجذع بعد ان يسطب الحشب
الذي يتسول شيئاً فشيئاً من سكبات كبيرة قياها نحو
السنى الى سكبات صغيرة فاصفر حتى تنتهي بنجم
ذرة التنبار .

١٣٠٢١ - **سكروج التنبوت** Phaeolus manihotis (S).
فطر من فصيلة السميات مركب جذور التنبوت واللقطن .
مشبه كثيف الحيف يمتري الجذور من مركز انتشارها
فيلفها يوشاح ارد اللون اسفني التركيب يقضي على
الجرادة وعل التبادل النافس || اما الفطر فانوسه
خلية السطح الاحل ، كبيرة ، مستديرة ، عمدة ، قطرها
نحو ٢ سم . لبها اصفر مخلي . لبها غني للتركيب



ساجية



سارية



سافراس

١٣٠٤٧ - سائل أرضية
Tige souterraine (F).
Underground stem (E).
هي الساق التي تنمو في التراب كالجملود .

١٣٠٤٨ - سائل حو
Ramier (mâle) (F).
Ring-dove (male) (E).
هو ذكر الورشان .

١٣٠٤٩ - سائل سوداء
Jambe noire (F).
Black leg (E).
وصم بكيري يركب البطاطا في سوقها ودرناها فيلخيا
الشد الاذي . مبيه الكروية البنكروية اطلها .

١٣٠٥٠ - سائل عاركة ، سائل
Tige grimpante (F). Climbing plant (E).
هي التي ليس لها من لقوة ما يكفيها للانتصاب فتسلق
غيرها وترتكز عليه .



سافرية

١٣٠٥١ - سائل سقولة
Tige tuberculeuse (F).
Tuberous stem (E).
هي الساق المكونة من الدرن والساقل .

١٣٠٥٢ - سائل سقولة ، زاحفة
Tige rampante (F). Prostrate, Runner (E).
هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء فتزحف على
الأرض .

١٣٠٥٣ - سائل ملتفة ، عنبية ، عذبة
Tige volubile (F). Twining plant (E).
ساق تلتف على دعامتها .



سافرة

١٣٠٥٤ - سائل منتصب ، صعدكة
Tige dressée (F). Dress stem (E).
كل ساق تستطيع الانتصاب بطلها .

١٣٠٥٥ - ساكن
Stator
نمت تمرني يعلق على القسم الثابت من الحركات
الآلية .

١٣٠٥٦ - ساكي ، سكي
Pithecia (S).
Saki (F).
جنس قرد امريكية من فصيلة البشريات . انوله ٦
مولها شال ابركة الجنوبية || جميعها كسلانة قليلة
الحركة . اجسامها ربة . ورونها مستديرة شارفة الوجة .
قوامها متوسطة الطول . اذنانها طويلة جللة لا اخاذة
اوتاجا سوية الااليان يكثر فيها الاسر وشحاته . شموها
قليلة الكثافة متوسطة الطول . تألف الثنايات الثقيلة .
تسرح في الليل . مرتها الاشجار . جماعها قليلة العدد .
قوتها الفار والاسل .



ساكي

١٣٠٥٧ - سالك ، سلك
Serpent noir (F).
Black snake (E).
الاسم السوداء الثوب .



سائل أسفغ

١٣٠٥٨ - سائل العروس هو القطيفة اطلها .

١٣٠٥٩ - سائل أسفغ
Selatosomus latus (S).
Taupin bronzé (F).
حشرة من السالويات طولها نحو ١٦ مم . ثوبها الى السرة
السفاد يملوها بواج اخضر || تركب ازروع والبقول .
رقبتها اسطوانية مسطحة كقوي جلود حلة نباتات .

١٣٠٥٥ - ساسفرا ، ساسفرا
Sassafras (S). Sassafras, Bois odorant (F). Sassafras
tree, Ague tree (E). Sassafrasbaum, Fenchelholz
(D). Sassafraso, Sassafrasso (I).

شجرة وسيدة الجنس والوع من فصيلة الفاريات . منبها
كثا وقطوريه . شخبها صناعي اصفر اللون ، خفيف
الوزن عطري العرف . اوراقها تفسل استعمال القليلات
والثوابل وذلك بمد تجفيفها وتحمها .

١٣٠٥٦ - ساسم هو الايتوس ، اطله .

١٣٠٥٧ - ساسمة
Ebénisterie (F).
Cabinet-making (E).

الاسمة نجارة الساسم اي الايتوس وغيره من الاشباب
الفاخرة المائلة .

١٣٠٥٨ - ساطور
Fendoir (F). Cleaver (E).
آلة حادة يقطع بها اللحم والعظم .

١٣٠٥٩ - ساعه
l'Horloge (F). Horlogium (E).
الساعة كوكبة نجوم مقيمتها الجنوب . مركزها فوق كوكبة
النهر . عدد نجومها ٢٤ لهما من المرتبة الخامسة .

١٣٠٤٠ - ساهو
Sagou (F). Sago (E).
دقيق نشوي مدق يستخرج من لب جلود بعض
التخلبات والسيكاسيات التي تنبت في البلاد الحارة .

١٣٠٤١ - ساهولة ، شجرة الساهو ، نخل
النشأ
Sagu rumphii, Macroxyton
sagu (S). Sagoutier (F). Sago-palm, Sago tree (E).
Sagapalm (D). Sago, Sagou, Palma da stoffe (I).
جنس اشجار معمرة من فصيلة النخلات . مبدعا البلاد
الطارة يستخرج من لب جلودها مادة نشوية مغلقة تسمى
سافر لها فاتها عند قوم تلك البلاد .

١٣٠٤٢ - ساف
Crin (F). Coarse hair (E).
شر الذنب والهلج .

١٣٠٤٣ - سافرة
Sparganion (S).
Sparganier (F). Reed-grass, Bur-reed (E). Igelkol-
ben (D). Sparganio (I).
جنس نباتات جلدورية مائية معمرة من فصيلة البليات
انواعها المبرونة ثمانية . اوراقها متعاقبة لافنة مسطحة .
نصلها مرياني الصلصة الضيقة . ازهارها ابطية الانكاز
وعذبة ، فسية التجميع ، متباينة ، كروية الشكل .
اشهر انواعها شريط الماء .

١٣٠٤٤ - ساق
Jambe (F). Leg (E).
من اعضاء الحيوان وهي بين الفخذ والوعروب .

١٣٠٤٥ - ساق
Tibia
هي في الحشرات السفو المستقيم الكائن بين الفخذ
والرابع .

١٣٠٤٦ - ساق ، جذع
Tige, Tronc (F).
Trunk (E).
هي الجود الاصل في النباتات الوعائية . تقوم على
الجلد وتقلو صعدا في سطر النبات وتوصل الانصاف
والورق والبر .

* ١٣٠٦٥ - سالكول حتملي

Agriotes niger, *Elatér niger* (S). *Taupin velu*, *Agriote velu* (F).

نوع من السالكول طوله نحو ١٢ م. قويه الى السواد القسبي تملو خلة خيرا. يكثر وجوده في اوائل الربيع. يركب مع رقاته الجوزية اللون زروع الحطة والشعير وسائر التصيليات الزراعية والبرية والشوئدر وشاكل التبغ في الحقل.

١٣٠٦٦ - سالكول مشير
Taupin rayé (F). هو سالكول الحصيد، اطله.

١٣٠٦٧ - سالكول منقط *، **لاقون منقط ***
Lacon punctatus (S). *Lacon ponctué*, *Taupin ponctué*, (F). *Lacon punctatus* (E).

حشرة غافلة مغمرة من فصيلة السالكولات وربة معدمت الاجنحة. تألف غابات الصنوبر وأحراجة. غناها تمشل على بعض اوراق النباتات البرية وعلى ابر الصنوبر. يرقاتها تمشل على المواد الخشبية المتصلة وعلى ما تقتضيه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد، يطول من ١٦ الى ٢٠ م. ثوبا اسود اللون تملو حرافش فضية شديدة الصغر تبدو كالتقط. رأسها كبير الحجم. فكاهها ضليمان. عيناها صغيرتان. زباناها عظيمان. اطرافها مستديرة الطرف للاحسف. ارسافها خلمية المقل || الاثن اكبر لدا من الذكر واكد ثوبا منه واقتصر زبانا || جيلها رباعي الحقل. تظهر الحشرة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواخر آب. تسرح في النهار. تسالط بعد ظهورها باسبوعين وترز للمكن في التربة تحت الجفلة || البرقة سلكية الشكل، قنية اللون ثم تصفر مع تقدم العمر || طول الاكمال الذي يستمر نحو سبعة اسابيع ينقضي في التربة على حد يراوح من ١٠ الى ٢٠ م.

١٣٠٦٨ - سالكولات *
Elatéridae (S). *Elatéridés* (F). *Elatéridés*, *Snapping beetles*, *Click beetles*, *Wireworms* (E). *Feldschnellkäfer*, *Schnellkäfer*, *Dratzwürmer* (D).

فصيلة حشرات من ربة مهديات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القد. زباناها مركبة من ١١ فاصلة وهي غشبية الشكل او مشابرة او مشطية. ارسافها خلمية المقل. من ميزاتها انها اذا رقت على ظهورها او وضعت كذلك تسقط لاصطادها تلوها البيضي ونظما ترافها بضع سلتيمرات ترافها قرقة خاصة. رقاتها اسطوانية مستطيلة، اجسامها قوية جلدية، لونها الى الصفرة العنابية || تركيب جلود وبيولور وصائل عدة نباتات.

١٣٠٦٩ - سالكولوم *، **بكدولس جبكي**
Selinus (S). *Sélin* (F). *Milk parsley* (E). *Kummel-silge* (D). *Appio di montagna* (I).

نبات عشبي بري ممر من فصيلة الحميميات. منه البلاد المعتدلة المناخ. يكثر في بعض اقاليم سوس البحر المتوسط. يقال انه لا ينمو من المناطق الطبية المجبة للتهدية.

١٣٠٧٠ - ساءم
Paltre (F). *To graze* (E). ساءم الماشية تادها الى المرض ورماء.

* ١٣٠٦٠ - سالكول اطحل

Lacon murinus, *Brachylacon murinus* (S). *Taupin gris* (F).

حشرة من السالكولات طولا نحو ١٦ م. ثوبا حتملي تملو رقة للحداد. تركيب بيلات الورد واوراق بعض النباتات فتقرضها || البرقة صفراء اللون سلكية الشكل كثيرة الفقدور تركيب جلود الزروع والشوئدر والبطاطا وشاكل الاجار المشرية.

١٣٠٦١ - سالكول التبع *
Agriotes ustulatus (S). *Taupin noir*, *Agriote noir* (F).

حشرة من السالكولات طولا نحو ١٥ م. لونها اسود لامع. يكثر وجودها في اواسط الربيع، تعيش على مختلف النباتات البرية وتقتض سوق شاكل التبغ، عند جملها، يمتص على سطح التربة. يكافئ باستمال اسد الحوافير الفصاة تمفيرا على البرقة عند آخر حراة عقبها التشتيل.

* ١٣٠٦٢ - سالكول الحصيد

Agriotes obscurus, *A. lineatus*, *Elatér segeus* (S). *Taupin des moissons*, *T. rayé*, *T. obscur*, *Agriotes des moissons*, *A. rayé*, *A. obscur* (F). *Striped elaterid beetle*, *Click beetle*, *Dark elaterid beetle* (E). *Saatschnellkäfer*, *Feld-Humusschnellkäfer*, *Düsterer-Humusschnellkäfer* (D).

اسم يطلق على عدة حشرات من السالكولات اجسامها متشابهة يصعب منها تمييزها. طولا يراوح من ٧ الى ١٠ م. الارباعا بنية اللون تملو شمشة خلية. اتحادها جملة. رقاتها اسطوانية الشكل، مستطيلة القد، جلدية البقرة، صلبة التركيب، بنية اللون. ذنبية المسنوج تركيب مع رقاتها تخلف الزروع والبقول والتبرغ.

* ١٣٠٦٣ - سالكول الرياض

Selatosomus cruciatus (S). *Taupin des fuites* (F). حشرة من السالكولات طولا نحو ١٢ م. لونها حتملي. فهداما الى الصفرة النبراء تملوها خطوط سود || تركيب الاجار الحريمية والازينية اعصها السنديان والرزنيون.

* ١٣٠٦٤ - سالكول بصادق

Agriotes sputator (S). *Agriote cracheur*, *Taupin cracheur* (F). *Agriotes sputator* (E).

حشرة مؤذية غافلة لاهمة من السالكولات معدمت الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية وافريقية الشالية. تألف المروج والمراعي والغلي والناقل. غناها تمشل على اوراق النباتات الحرموية والبقالية وعلى بيلات الزراعات اعصها اذمار القصبية الصنوبرية. يرقاتها تمشل على جلود التصيليات والجزر والشوئدر || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ م. ثوبا الى السمرة السوداء الكسنية المراج. رأسها معقودب الشكل يطول في مقدم الجنبية شبه ازار يمتد بين الزبائين. زباناها عظيمان طويلان. عيناها صغيرتان. اكسلها معقل الايدياد، كثيف التمشيل والخل.

ارسافها خلمية المقل || الاثن اميز قدأ من الذكر واكد ثوبا منه واقتصر زبانا واغشم بندا || جيلها رباعي الحقل. تظهر الحشرة في اوائل الربيع وتبقى حتى اوائل الصيف. تسرح في النهار || يرقها بعلية لنمو لا تدرك الكلال المسموري الا بمس ثلاث سنوات فيصبح طولا اذ ذلك نحو ١٨ م. ويستقر ثوبا على الصفرة التمامية. السقاء المراج || طول الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما وينتهي بظهور الحشرة الجملانة.



سالكول اطحل



سالكول التبغ



سالكول الحصيد



سالكول الرياض



سالكول بصادق



سالكول غفط



سالكول خلي



سالكولوم

- 13071 - سَامٌ. Vénimeux (F). Venomous (E).
نعت تعريفى يطلق على كل حيوان حوى بعض السم؛
أو باستطاعته القلق سمه لثأ أو نفاً الخ....
- 13072 - سَامٌ أَبْرَصَى هو الورقة، الخليا.
- 13073 - سَامِيكٌ. Ichtyophage, Placivore (F).
Ichthyophagous, Piscivorous (E).
مفرد بالسلك من مختلف الحيوان والبر.
- 13074 - سَامِيلٌ. Limitvora (F). Limitvorous (E).
الذي يعيش في الإسمال والالواح ويقنات من محتوياتها
المضوية.
- 13075 - سَاكُور. Diamant brut (F).
Rough diamond (E).
هو اللسان الخام كما يوجد في الطبيعة (رابع سار).
- 13076 - سَاكُورُوسٌ. Citharoxylum (S).
Citharoxylon, Côtelet, Bois fidèle (F). Fiddle-
wood, Savannah wattle (E). Gaigenholzbaum (D).
Legno fidèle (I).
جلس شجيرات برية من فصيلة الساجيات مهددا للبلاد
الاستوائية. إصفاها جزيرة، ثمينة، تستعمل في صناعة
آلات الطرب.
- 13077 - سَايِفٌ. Caprophage (F).
Caprophagous (E).
نعت تعريفى يطلق على كل حشرة تعيش على سلف
القنطاريات.
- 13078 - سَايَهِ. Produire alternativement (F).
To produce alternately (E).
ساعة الشجر: حل سنة وتناثر أخرى، والشجرة السنية
تدعى سنياء.
- 13079 - سَايَئِيَّةٌ هي كناعورة. ج. سوان.
- 13080 - سَاهَجٌ. Fumifuge (F).
Smoke-preventing (E).
نعت تعريفى يطلق على كل شيء أو مادة تهدد الدخان.
- 13081 - سَاهَجٌ. Vent violenc (F).
Strong wind (E).
الرياح الشديدة الريح.
- 13082 - سَاهِرٌ، ذَيْلُ الْكَلْبِ. Cynosurus cristatus (S). Cynosurus, Crételle des
prés (F). Dog's tail-grass (E). Echtes kammgras (D).
Ventolans dei prati, Lentoians crestata (I).
نبات عشبي طلي يري من فصيلة النجيليات وسيط
المكشريات، مهدد حوض البحر المتوسط. يملو نحو
٦٠ سم. يتكرر في الحشاب والجبال وفي المراعي الطبيعية.
ثم جيد الصنف مغروب فيه.
- 13083 - سَاهِكَةٌ. Vent fort (F). High wind (E).
هي الريح القوية الهبوب تحرك الشجر.
- 13084 - سَاهُورٌ. Halo
الساور كالمائة والطفولة ينفذ القصر بدارة.
- 13085 - سَاكِدٌ مُتَوَكِّلٌ. Dominant
صفة العامل البيولوجي للطلب.
- 13086 - سَاكِيس. Palefrontier (F).
Groom, Ostler (E).
حامل يمسح الخيل فيقدم لها الطعام ويحميها ويرسها.
- 13087 - سَاكِغ. Assimilable
هو من المواد الغذائية ما كان قابلاً لتفصيل.
- 13088 - سَاكِيلُ الْمِيْزَان. Salk
سالك الميزان نجم يسير وراء نجوم برج الميزان فيبدو
كأنه يسوقها.
- 13089 - سَاكِيل. Fluide (F). Flaid (E).
صفة الأجسام اللامسكة الأرات، والسوائل تقسم إلى
تسعين السوائل اللامسكة والسوائل الغازية.
- 13090 - سَاكِيلٌ، مَحْتَلٌ. Bouillie (F). Wash (E).
السائل حسب الأساطيع الزراعي غليظ مائع مركب
من مواد مختلفة مذابة أو معلقة في الماء، والسوائل
الزراعية عديدة تستعمل في مكافحة الحشرات والأمراض
الفطرية.
- 13091 - سَاكِيلُ بُوْرُو، مَحْتَلٌ بُوْرُو. Bouillie bordelaise (F). Bordelaise wash (E).
سائل مركب من كبريتات النحاس مع الكلس في الماء
يعدل ١٪ سلفات النحاس وقدره كلس حراق يضاف
القيح ١ ٪ كالزين. وهو أقدم الفواظير وأهمها انتشاراً.
خصائصه ميزان عطيفة سنياً أنه يفيد النبات دون
أن يذوي الأوراق ويسهلها. يلتصق جيداً بجميع الأجزاء
التي يلتصقها. لا خطر عليه من الوجبة السمية وعرض
ثم الذي يحمله بمثلها الجميع || وهو يضر بمرج
عقول الكلس الحراق (الخام) مع مخلول سلفات النحاس
بنسبة واحد إلى واحد أو ٢ إلى ٣ أو ٤ أو ٤
إلى ٤. واختلاف هذه النسب يمد إلى اختلاف النبات
والوسم الفطري للتصديق وزين الاستعمال. ويجب ألا
يعزب من يال أحد؛
١ - أن النحاس هو المنتشر الفعال في هذا السائل.
٢ - وجوب تخفيف هذا السائل في أوعية خشبية أو
فخارية.
٣ - مراعاة تماثل نسبة الكلس من سلفات النحاس
لأن زيادة الكلس تلحق بفائدة السائل كفاطور كما
وإن زيادة النحاس تذي فاعليته القاصرة بالسام
والبشرة.
٤ - أن غليظ بورو الجاهز المورق في الاسواق
لا يوازي السائل المنكح تخفيفه في الزمرة.
٥ - أن أفضل ما حضر واستعمل بيئياً.
- 13092 - سَاكِيلُ بُورَغُونِي. Bouillie bourguignonne (F).
سائل مركب من سلفات النحاس وكبريتات الصودا
مع الماء يعدل ٢٪ سلفات النحاس مع ١٪ كبريتات
الصودا. ولا يجوز استعمال هذا المخلول قبل أن يثاكن من
زوال سميته ويتم ذلك باستعمال ورق الفرنزول الآخر
فإن ازرقته الورقة عند تطبيقها بالحليل كان السائل
قلوباً وصح استعماله وإلا أضيق إليه ملوب الكبريتات
حتى زوال اللون الآخر.



ساهر

١٣٠٩٢ - سَائِل حَاشُورِي

Bouillie insecticide (F). Insecticide wash (E).

هو ما صنع خاصة للقضاء على الحشرات التي تترى النباتات الزراعية وقد يختلف باختلاف المادة النشطة التي يتركز عليها ونسبة عنصرها الجمالي .

Bouillie arsenicale (F). سَائِل زَرْيُخِي (E).

كل سائل حاشوري يدخل في تركيبة الزرنيخ . ولما كان الزرنيخ من السموم الفتالة لذلك يجب استعماله بروتية على أن لا يتسنى استخدامه أبداً زمن الإزهار والمعد .

Bouillie au savon (F). سَائِل صَابُونِي (E).

يتركب من كبريتات النحاس والصابون في الماء وذلك بمعدل ٢٪ كبريتات النحاس مع ٢٪ من الصابون . وقد يضاف مذوب الصابون حتى أزرقاق ورقة الطرشول .

Bouillie fongicide (F). سَائِل فَاثُورِي (E).

هو من السوائل ما جعل خاصة لمكافحة التطور والقضاء عليها .

Bouillie cuprique (F). سَائِل نُحَاسِي (E).

هو كل سائل كانت إحدى مواد النحاس من مركباته التسمرية الرئيسية .

١٣٠٩٨ - سَائِل نَوَوِي

Enchylème, Suc nucléaire (F). Enchylème, Nuclear succus (E).

هو السائل اللبني الذي يحيط بالجميلة .

١٣٠٩٩ - سَائِل هَضَام

Suc digestif (F). Digestive succus (E).

عصارة حامضة طبيعية تفرزها المعدة تسهياً لحضم الطعام وتخليه .

١٣١٠٠ - سَائِلَة ، سَائِلَة (F). Liste en tête (F).

من شيات الخيل يعي الفترة التي تسيل على قصبه الألف .

١٣١٠١ - سَائِلَة (F). Quadrupède herbivore (F).

السائمة كل راعية من الدواب . ج سوائم .

١٣١٠٢ - سَائِلَة (F). Alchiba (F).

السيا نجيم من كوكبة الغراب ويدهى أيضاً غياه ويتقار الغراب .

١٣١٠٣ - سَائِلَة (F). السيل : البدو يحمله السيل من بلد الى بلد . ج سايلا .

١٣١٠٤ - سَائِلَة ، سَائِلَة (F). Vin (F). Wine (E).

هو الخمر الجيدة . والسبَّاق : بياح الخمر .

١٣١٠٥ - سَائِلَة (F). Index (F). Fore finger (E).

السيابة والسبَّاق والسبَّاق والمشيعة والمشيعة هي الاصبع التي تلي الإبهام .



سبَّاق .

١٣١٠٦ - سَبَّاقِيَّات (F). Pterophoridae (S).

سَبَّاقِيَّات (F). Pterophoridae (S).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . أنواعها المعروفة نحو ٦٠٠ منتشرة في معظم اسواق العالم || تسرح من الدروب الى قصبه الليل . طوائها خفيف الحركة ، محتدل القرصه والحرم || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، قضيفة . رؤوسها معتدلة الحجم . عيونها صغيرة ، ناشرة . قرونها الاستشعارية نحيلة . ملابسها نحيلة . مراهقها مستطيلة . حلماتها مقعودة . بطونها سهيفة الحبل ، عادمة الزغب . روافشها صغيرة ، مستطيلة الشكل . الامامية منها ثنائية الاصابع المنثقة الاطراف ، الخلفية ثلاثية الاصابع المستقيمة . جرازمها ثامة النسر . ظنايبها الخلفية مستطيلة ، ثنائية المناسخ الطويلة || اساريها مستغلطة الاجسام ، زبده . تميش داخل الثمار او داخل الافناد التي تنقبها وتغذله || خادراتها تحمي طور الاكمال مؤرصة مغلقة بالحصيفة او مزورة بخيط حريري المادة .

١٣١٠٧ - سَبَّاق

هو البستان المهد لزراعة البقول ، راجع بستان خضر .

١٣١٠٨ - سَبَّاق

هو الزيل ، راجعه .

١٣١٠٩ - سَبَّاقَة (F). Limnimétrie (F).

علم يبحث في التغيرات الدورية التي تطرأ على مستوى سطح المياه في مكان معين .

١٣١١٠ - سَبَّاقَس ° ، سَبَّاقَس

Sargus annularis (S). Sargus spirallion, Sargus, Spartin (F). Sar, Sargo sparus (E).

سمكة بحرية من السرغوس وفصيلة الفرغيات . تكثر في المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل . نوبا الى الكهبة الفضية يملؤو تجذيع بافت . وفي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

١٣١١١ - سَبَّاقَة (F). Bouldere (F).

الموضع المخصص لجمع النفايات من تراب وواضخ .

١٣١١٢ - سَبَّاق الطيَر

Oiseaux de proie, Rapaces (F). Rapacious birds, Birds of prey (E).

وتة من الطير تدعى الجوارح .

١٣١١٣ - سَبَّاقِيَّي الأَسَدِيَّة (F). Heptandre (F).

لعت وصني تعريفي يطلق على الأزارار المسببة الإقصاء الذكورية .

١٣١١٤ - سَبَّاقِيَّي الأَصْلَاح (F). Heptagone (F).

كل شكل هندسي مسطح الاضلاع .

١٣١١٥ - سَبَّاقِيَّي الأَقْلَام (F). Heptagone (F).

لعت وصني تعريفي يطلق على الأزارار التي يحبل وزجها سبعة اقلام .

١٣١١٦ - سَبَّاقِيَّي ° (F). Bague (F). Ring (E).

السباق حاتم في رجل الطائر من جارح وغيره .

١٣١١٧ - سباق الخيل (F). Course de chevaux (F). Horse-race (E).

ركض الخيل لمعرفة أكثرها صلابة وقوة وصلاية ومجاعة . وسباق الخيل من أنواع الرياضة التي اشتهر بها العرب . وكانت خيل السباق تعرف بالحلبة (راجع سابق) . وسباق الخيل يجري الآن في ميادين خاصة وفقاً لنظم مرمية الاجراء يتقيد بها كل صاحب جواد .

١٣١١٨ - سيقان (F). Moustaches des animaux (F). Whiskers (E).

السيقان عند الحيوان كالسودل او الشارب عند الانسان . وهي مجموعة من الحلب تملو الشفة العليا .

١٣١١٩ - سيقان (F). Sabal

جنس نباتات برية و زينة من فصيلة النخلات . انواعه عديدة . معظمها جلبي وبعضها شجري . اوراقها زنادية ، مروحية . ازهارها كالفوري سربها كثير القزوع . جانبها نصفية . ازهارها عشوية ، لائحة الزركاز . ترتيبها ثلاثة البتلات . ثمرها كروية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، ثلاثية البذور ، غير مأكولة . اشهر انواعه ما يلي .

١٣١٢٠ - سيبال أدسون * و سيبال أمروط (F). Sabal adansonii (S). Sabal d'Adanson, S. glabra (F).

سالة مستنق . اوراقها مروحية ، هيئة التشرم ، قشرها نحو النسر ، لونها الى الأخضر البهري ، زنادها متصب الزركاز يملو نحو ٩٠ سم . || يشكو من مقفوره الاشمالي الذي يقوده الى كثرة الفسائل .

١٣١٢١ - سيبال أمير (F). Sabal blackburniana (S). Sabal prince (F).

بطي . النمو سالة تملو نحو عشرة امتار . قشرها يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . اوراقه حيلة الخضار . الباقي . قشرها نحو ١٥٠ سم . زنادها باحت اللون ، جانبي الزركاز يطول نحو ٨٠ سم . || يرغب في المواقع الرطبة ويحب في الحدائق المحصنة .

١٣١٢٢ - سيبال مكسيكي (S). Sabal mexicana (S).

Sabal du Mexique, S. serrulata (F). بطي . النمو . جذعه يملو نحو ٦ امتار . اوراقه مضفرة قشرها لا يقل عن ١٣٠ سم . زنادها منشاري الحافة يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . || اقليمه الشولفي البحرية . يرغب في الاراضي الرطبة والمواقع الدافئة .

١٣١٢٣ - سيبال مؤتف و سيبال مظلي (F). Sabal umbrellifera (S). Sabal paraol (F).

نوع من السبال . موطنه جزر الانتيل وبني وكوبا . جذعه متصب ابيض يرتفع من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقه كبيرة ، مروحية ، قشرها نحو ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار البهري . زنادها مؤتف شاكلة يطول نحو ١٠٠ سم . || يرغب في الارربة المصنعة الانساج والرطوبة .

١٣١٢٤ - سيبال لجيمي (F). Sabal minima (S).

Sabal aculea (F). نوع من السبال العادم الجذع . اوراقه مستطيلة الزناد . تميز بكتل التشرم ، جميل الخضار الزاني || يرغب في الارربة الخفيفة المعتدلة الرطوبة ، يحثى المواقع الباردة . تكثر زراعته في المراكب .

١٣١٢٥ - سيبال نخلي * (S). Sabal palmetto (S).

Sabal glaucescent (F). سالة قصيرة . اوراقه طويلة الزناد ، مستطيلة الخوص المنتعجة . مستطيلة الزرع . كثيرة التفريش . نصلها الى الخضار البهري وتحسين عند انصاف زانه الثالث . يرغب في الارربة المنصعة الانساج والرطوبة . يزرع في المراكب والحدائق . يتكاثر بالبذر .

١٣١٢٦ - سيبالنج (F). Considérant (F).

سبب ، اعتيابر (F). Preamble (E). هو في القرب المحقوقي احد الانساب التي ينس عليها الحكم سواء اكان قضائياً ام اداليا .

١٣١٢٨ - سيبب (F). Cause

هو القصد الذي يلزم في سبيله شخص نحو شخص آخر . وقد يكون ناقماً وعاطفاً ورافعاً وعطوفاً وصورياً الخ .

١٣١٢٩ - سبب الابتلال (F). Rescisoire (F).

هو السبب الاصل الذي بني عليه الابتلال . (E). Rescissory (E).

١٣١٣٠ - سبت * (S). Alcea scifolia (S).

Alcée rose, Passe-rose, Rose de mer (F). Andwerp Althea (E). Stockrose (D). Altas rosea (I). نوع من الخيلاني وهو نبات زراعي زينة ممر يملو ٥٥ الى ١٠٠ سم . سالة فرطه . اوراقه عشوائية . نصلها خامسي التفريش سنن الحافة . ازهاره كبيرة مكسية قشرها نحو ٥ سم . لونها الى الحمرة الوردية . ازهاره يستمر من حزيران الى الجليل .

١٣١٣١ - سبت (F). Pneu tannée (F).

Tanned leather (E). جلد البقر وكل جلد مدبوخ لا شعر عليه . وان كان عليه شعر ووبر وصوف فهو مصحب .

١٣١٣٢ - سبتفولوم * (F). Septoglossum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريثات . انواعه ثلثة اللد والاذي تنيش على الانداد والاوراق . || كئانده فسية التجميع ، ثنية اللون ، ثلثا في الادة . بورياته مستطيلة الشكل ، مؤنورة ، وربة الانقسام الثنائي او الخامسي || اشهر انواعه سبتفولوم الشيكلي .

١٣١٣٣ - سبتفولوم الشيكلي * (F). Septoglossum fragariae (S).

فطر مجهرية يركب اوراق الشيكلي البهري والزراعي . مظهره الخامسي يقع سماء اللون ، فزينة الاطار ، مرقعة الزرايا ، قشرها يراوح من ٣ الى ٨ سم . تركيب نصل الاوراق ثنائي || يتكاثر بتغير البصيل قبل غرسها بواسطة الحامض الكبير في الخليل من ١٥ الى ١٧ ٪ .

١٣١٣٤ - سبتفولوم * (F). Septomyza

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريثات . انواعه عديدة معظمها رمية تركيب الاعشاب المقطوعة والمواد العضوية . تميز ببولياتها المحصنة الناشئة في الطبقة الادية . كئاندها مستطيلة ، مؤنورة ، شاكلة ، قياسها نحو ٣×١٥ ميكرون .



سبال ادسون



سبال نخلي



سبت



سبتفولوم الشيكلي

الرطبة وتتغذى على نشاطات اشم الشمس || يلعو على الأساط والأغاد يقع صغيرة عديدة مبرحة أو كيفية التجميع نقل الحركة التنسفة وتكونت لنمو || في سبيل الوقاية يمسح حطب البصل في أماكن موهبة ثم ترمضه بعض الوقت لاشعة الشمس المباشرة .

١٣١٤٢ - سبجة الشهبان

Colletotrichum claviae
نظر مجهري يركب اوراق الشهبان فوطجيا || مظهره الخارجي نقط سود مبرحة تملأ صفحة التصل تضوّل سير النسخ وتكون النمو وتسي الى الاضرار والالزاح || يكافح باستعمال اللوالب التنسفة الحويذة بمعدل ١ %

١٣١٤٣ - سبجة الكتان

Colletotrichum lini
نظر مجهري يركب الكتان في مختلف ادوار وتكوين من حين انتاش البزرة في التربة حتى الاضرار وتكوين البزور الجديدة || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة فضاء اللون سمراء المائلة تركب السوي والاوراق وتلتاح الزهرة وانحاءها || يكافح بتطهير البذار بواسطة الاملاح الفلزيقية .

١٣١٤٤ - سبجيل

Spigelia (S). Spigelia (F).
جس نباتات شتية حولية او مدمرة من فصيلة الورديات .
الوانه ٣٠ بعضها زينة ومنها البري الطبي . سويها نزهاء .
اوراقها متعاقبة لائحة لائحية الشكل || ازهارها انبوية .
ثمارها جرداء كروية الشكل صغيرة القد . بزورها دقيقة .
اشهر انواعه مالبي .

١٣١٤٥ - سبجيل طبي * ، عشبة الهند

Spigelia anthelmia (S). Spigelia anthelmintica (F).
Indian pink, Worm grass (E). Indisches wurmkraut (D). Spigelia, Erba de bachi (I).

نبات عشبي طبي بري حولي يلعو من ٢٥ الى ٤٠ سم .
اوراقه متعاقبة سنائية التصل . ازهاره دقيقة لونها الوردية .
باطنها اصفر ، ثمارها جرداء كروية صغيرة القد || اوراقه وازهاره وسويها طيبة موهبة وطاردة للديدان .

١٣١٤٦ - سبجيل ماريلاندا

Spigelia marylandica (S). Spigelia de Maryland (F).
شتية سبروتية مدمرة تلعو من ٢ الى ٩٠ سم .
اوراقها كاملة .
نصلها يضيي الشكل ، ذات اقسام الاخير ، خلي المروق .
ازهارها مستطيلة خمسة التخصيص . صفراء اللون كمارها كروية مزدوجة || ازهارها يمشر من ايار الى تموز .

١٣١٤٧ - سبجيليات

هي الورديات نصيلة نباتية ، اطباها .

١٣١٤٨ - سبجي ، قلايدي

Moniliforme (F). Moniliform (E).
لمت تمريري يدل على شكل خاص من اشكال الزباني ونحوها قوامه فواصل سبية متتابعة ثقبه السبجة او القلادة .

١٣١٤٩ - سبجي ، عديقية

Screptococcus (F). Screptococcus (E).

ويقال لها مكرورة سبية ومكرورة عقدية .
مستديرة الشكل شائعة توجد في كل مكان .
تكثر بنوع خاص في المواد المغانة .

١٣١٤٥ - سبج

Ochropsora
نظر مجهري من نصيلة الورديات وحيد الجنس النوع يتميز بالبيات المبردة وبدماماته الاسطوانية الشكل القصيرة القد والتلطيخ القامدة || يتفعل على الثيرة فتركب الارزاق حل صفحتها السفلى .
مظهره الخارجي يقع نصيلة لائحية الشكل والحم لونها الى الصفرة ثم تنحرف الى الختلي حيث ترفع البشرة وتقرسها || اضراره زديدة لا تتسبب للكافة .

١٣١٤٦ - سبجة

Colletotrichum
جنس تطور مجهري من نصيلة الورديات . يتميز بجله الملن القاتم على التسميات الكندية || انواعه عديدة وفوطية ، اعرافها ما يتج .

١٣١٤٧ - سبجة الاسبانج

Colletotrichum spinaciae (S). Anthracnose de l'épinard (F). Spinach anthracnose (E).
نظر مجهري يركب اسفل الاسبانج فيصيب يباس الارزاق مظهره الخارجي يقع يضيي ظمرا من ١ الى ٢ سم .
تركب نصل الارزاق حل صفحته .
نصائنه سبروتية ، كتابله وشية مستوية او قليلة التجميع ،
قياسها ٣×١٧ ميكرون || يكافح باستعمال الاملاح التنسفة .

١٣١٤٨ - سبجة البطاطا

Colletotrichum stramentarium, C. solanicoles (S). Darcose de la pomme de terre, Enroulement flasque (F).
نظر مجهري يصيب البطاطا فيسطب الشمن ويقرح الورد .
مظهره على السور قبل الاضرار وبمده سقر ويحل واستطالة ثم قليل وانفلات في الارزاق يقع يباس التصل . وهو من الدمرات والجلود والسور ، حتى ارتفاع ٢٠ سم .
يقع صغيرة مفرقة الزوايا ، فضاء او سمراء اللون باضة اللون .
ويتم قطع البزرة المصابة بسط ، حل مقطعا ، ويوجد حلقه صفراء او سمراء اللون تلعو المنطقة القشرية .
يقال انه لا يبيش في المناطق التي تلعو ٦٥٠ مترًا وأنه يرغب في المناطق الظليلة || يكافح بتطهير البذار وباحتجاب الاربة الموهبة .

١٣١٤٩ - سبجة البندورة

Colletotrichum phomoides
نظر مجهري يركب ثمار البندورة قرب ادراكها نضجيا .
مظهره الخارجي يقع مستديرة غالية اللون مبرحة ثم مراكية تشبه البشرة ثم الب || يكافح باستعمال الاملاح التنسفة ويهم من يضيف الكبريت .

١٣١٥٠ - سبجة الحمضيات

Colletotrichum gloeosporioides (S). Anthracnose des citrus, A. des limes (F). Anthracnose of limes, A. spot, A. tear-stain (E).

نظر مجهري يصيب بعض انواع الليمون منها الاراج والليمون الهندي والخامض والمحو والتانج والبرتقال .
مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب نصل الارزاق يقابلها جفاف في نواحي الاثنان فيصيب يباسها .
يكافح باستعمال سائل بوردر المحلول ١٪ او غيره من الفولباير الحديثة .

١٣١٥١ - سبجة الزيتون

Colletotrichum circinans (S). Anthracnose des lilacées (F). Anthracnose of lilacosa (E).
نظر مجهري يركب بصل الزيتون وسويها . يسط على اللواتق



سبجة البندورة



سبجة الحمضيات



سبجة الزيتون



سبجيل طبي

١٣١٦٦ - سَبَّوْدَة الْمُتَوَسَّط

نوع من السبب يعرف بأبي اليسر، الحلبه.



سبب شائع

١٣١٦٣ - سَبَّوْدُ غُولَة ، قَتَبَقْلَة

Spergula (S). *Spergula*, *Spergula* (F). *Spurry* (E). *Spark*, *Spergula* (D). *Spergula* (I).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من القترنليات .
سوقها خضراء فراءه . اولياتها لينة متعاقبة غليظة النصل .
ازهارها فردية ، زائدية ، صغيرة ، وردية || أشهر
انواعها السببغولة الحلقية .



سبب الحلبه

١٣١٦٤ - سَبَّوْدُ غُولَة حَلْبِيَّة *

Spergula campestris (S). *Spergula des champs*, *Spergula* (F). *Sylvan spurry* (E).

نوع من السببغولة الزراعية الحولية تنمو من ٢٠ الى
٥٠ سم . تزرع في المراعي الاستيعابية لأنها تعتبر من
الاعشاب المفيدة التي تقيد الإقذار الحلوب وتحميها
على الدبر .



سببغولة حلقية

١٣١٦٥ - سَبَّوْدُ ، سَبَّوْدِي

Rustique (F). *Rustic* (E).

لمت تعرفي يطلق على كل نبات لا يتطلب تربة صينة
ومناخ خاصة ويقتضيه نمطه .

١٣١٦٦ - سَبَّوْدُ *

Saparda (F). *Saparda* (E).
جنس شجرات عشبية من فصيلة القترنيات || انواعها
عديدة . اجسامها مستطيلة لينة وسليمة . زراعاتها شوكية ،
مستطيلة ومقومة . يرقاتها تعيش على المواد الخشبية الحية
واليابسة || احرقت انواعها واضرمتها ما يلي .



سببغولة حلقية

١٣١٦٧ - سَبَّوْدُ أَشْبَر *

Saparda carcharias (S).
Saparda chagrinée, *Grande saparda* (F). *Gross*
popular borer (E). *Grosser Pappelbock* (D).

نوع من السببغولة طوله يراوح من ٢٢ الى ٢٨ سم . نوبه
الى الخيطي الاخير تملأ بمخة سوداء . عليه غصن لثكنة
اصعب اللون || يرقته غاشقة تقرض جلود الحور
كثيرة لثعلبها .



سببغولة حلقية

١٣١٦٨ - سَبَّوْدُ الْبُنْدِي *

Oberon linearis (S).
Saparda du noisetier (F). *Oberon linearis* (E).
Haselbock (D).

نوع من السببغولة طوله نحو ١٣ سم . نوبه الى السوداء
الاسفج . زياتها وارجلها صفراء || يرقته تركب اثنان
البنق تقرضها وتسبب يباسها .



سببغولة حلقية

١٣١٦٩ - سَبَّوْدُ الْحَوْر *

Saparda populeus (S).
Saparda du papulier (F). *Popular borer* (E). *Kleiner*
Pappelbock (D).

نوع من السببغولة طوله نحو ١٣ سم . نوبه حتى اللون ملو
مواج بني . عليه كثيف التجميع اسفج اللون || يرقته
تركب اثنان واثنان الحور تقرضها وتعلبها .



سببغولة حلقية

١٣١٧٠ - سَبَّوْدُ سَلْسِي *

Saparda scalaris (S).
Saparda échelle (F).

نوع من السببغولة طوله نحو ١٦ سم . نوبه الى الخيطي
الاسفج المواج ملو يتجزع وزدائس سود تشبه السلم .
عليه قليل التجميع اسفج اللون || يرقته غاشقة غالبة
تركب مختلف الاجمار والاعشاب اصعبها الاستيعاب
والجوز والحور وتتغذى وتكرز تقرض حله وشكير الاجمار
الحية والاعشاب اليابسة .

١٣١٥٠ - سَبَّحَة هي للنقع ، الحلبه .

١٣١٥١ - سَبَّحَة مَالِيَّة

Marais salzet, *Selin* (F). *Salt marsh* (E).

كل ارض تركبها المياه البحرية وترسب فيها الملح .

١٣١٥٢ - سَبَّحَات

Bryndes (F).
رتبة من الحالبات اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنجم
الى فصليتين الحروكيات والصبرغيات .

١٣١٥٣ - سَبَّوْد

سبب الفرخ بدا ريشه يشبه .

١٣١٥٤ - سَبَّوْد

Bourra (F). *Kind of down* (E).
ما يطلع في رؤوس النبات وراعيه قبل ان ينشجر . ج اسباب .
والسبب ما تلبه من الشعر او الور .

١٣١٥٥ - سَبَّوْد

Plumule (F).
الجزء النابت من البزرة او الحبة .

١٣١٥٦ - سَبَّوْد

Caprimulgus (S).
Engoulevent (F). *Goatsucker*, *Nightjar* (E).

جنس طير من فصيلة السببات . النوع ٧٥ مقترن
في جميع الاقطار . اجسامها مستطيلة . رؤوسها حلقة
مقلطحة . مناليتها صغيرة . اشداها . واسعة . انماها
قصيرة . اجسامها غليظة مستطيلة . انماها قصيرة
سمرلة || تقترن في الارض بين الاضباب والادفك .
انماها يتدح من ٤ الى ٦ يشات تحضنها من ١٦ الى
١٨ يوما || جميعها من الرواس القواطع . قترنا
الغدرات حل اختلطها في اشهر انواعها السبب السد القاطع
والدفنة .

١٣١٥٧ - سَبَّوْد شَائِع ، ٦ أَبْرُصِي

Caprimulgus vulgaris (S). *Engoulevent commun* (F).
Common nightjar (E).

نوع من السبب طوله ٢٨ سم . وريشته ٥٨ سم . ريشه
شديد النعومة متوسط اللون لونه الى القمرة والسواد يملو
تديج وتديج وتؤشج || وهو من القواطع يحوي البلاد
في طلب المصيف والشتي يقترن في لبنان بغير النبت .

١٣١٥٨ - سَبَّوْدِيَّات

Caprimulgidae (S).
Caprimulgidae (F). *Caprimulgidae* (E).

فصيلة السببات من رتبة الجوارح المتفرقات المنالير .

١٣١٥٩ - سَبَّوْد ، سَبَّوْدِي

Soudage (F). *سَبَّوْد ، سَبَّوْدِي* (F). *Soudage* (E).

تجري حتى الطبقات الارضية وتنامرها .

١٣١٦٠ - سَبَّوْد

Glaréoles (F). *Glaréoles* (E).

جنس طير من السببات القترنليات . انواعها المعروفة
١٥ جميعها من القواطع . اسبابها قليلة العدد . تألف
الشعير والريشة والمناخ السببة . انواعها رصاصية اللون .
انماها وطونها بيضاء . قوادها واطراف انماها ، الغافة
سود || اشهر انواعها سبب المتوسط .

١٣١٦١ - سَبَّوْدِيَّة *

Sobralia (S). *Sobralia* (F).

جنس نباتات تربينة من السبليات . منها اريكة
الوصل . ازهارها خلية البشرة ، حبة الشكل ، مزركشة
الالوان الفلحة الزائدية للمواج || تزرع في الماكن
والصاري .

Sepsis (S). سَبْسِيْدَة ١٣١٨٢
Sepsis (F). Sepsis (E).
 جنس حشرات من فصيلة السبسيديات ورتبة ذوات الجناحين. أنواعه المعروفة عديدة أصلاً مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٦ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة ، حولها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل. ملاسها غامرة . أصطامها صغيرة . كولسها شبه اسطوانية ، محزورة . بطونها خفيفة القاعدة والمؤخر . رؤوسها قليلة الخضاب. قوائمها مستطيلة . أطولها كبيرة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة تعيش على رقيق الأزهار اغصانها الخشبات . البرقة نائلة او دامتة .

Sepsidae (S). سَبْسِيْدِيَّات ١٣١٨٣
Sepsidae (F). Sepsidae (E).
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجسامها وأصطامها المعروفة عديدة منتشرة في جميع أقطار العالم || أجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة ، حولها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . ملاسها صغيرة او غامرة . بطونها خفيفة القاعدة والمؤخر . رؤوسها قليلة الخضاب . افخاذ وفنابيب قوائمها الامامية والخلفية مجهزة بمخاض حادة || ذكور بعض أنواعها مجهز بلدد تنضح افرازات عرفها كعرق الخنثوق || الحشرة الجملانة تعيش على رقيق الازهار او على المواد النباتية او الحيوانية الجزئية المتحلل . البرقة قد تكون غاضلة او دامتة او لائلة او للابسة || الشهر اجناسها السبسيدي .

Tribu (F). سَبْسِيْدَة ، قَبِيْلَة ، وَدَف ١٣١٨٤
Tribe (E).
 مركزه في تصنيف الاحياء بين الفصيلة والجنس . لذلك فالفصيلة تشمل بعض الاسباط والسبط يشمل عدة اجناس .

١٣١٨٥ - سَبْسِيْدَة نبات كالدن مرعى جيد (السان) .

Septupler (F). سَبْسِيْدَة ١٣١٨٦
 ضاحك الشيء سبع مرات . To increase sevenfold (E) .

Bêta féroce (F). سَبْسِيْدَة ، سَبْسِيْدَة ١٣١٨٧
Carnivorous animal (E).
 هو الحيوان المفترس . ج. سبع وسبع . م. وسبة . ومن الطير ما أكل اللحم خالصاً . وأرض سبة اي كثيرة السباع .

١٣١٨٨ - سَبْسِيْدَة هو الجمليل ، اطلبه .

la Bête (F). the Beast (E). سَبْسِيْدَة ١٣١٨٩
 كوكبة نجوم مشهورة باسم القلب ، اطلها .

Baguer (F). To ring (E). سَبْسِيْق ١٣١٩٠
 سبق الطائر اذا جعل السباق في رجله .

Epi (F). Ear of corn (E). سَبْسِيْكَة ١٣١٩١
 السبله والسبولة : السنبلة من الحنطة ونحوها . وهي أيضاً شكل من اشكال الازهار قوله محور تجتمع حوله الازهار . وتضاقب || يقال اسبل الزرع : اذا غرست سبلته .

Glaeolidae (S). سَبْسِيْكَة ١٣١٩١
Glaeolidae (F). Glaeolidae (E).
 فصيلة السبر من الزرقائيات تنتمي الى رتبة طولك السلك .

Cypris (S). سَبْسِيْكَة ١٣١٩٢
Cypris (F). Cypris (E).
 جنس حيوانات مائية من القشريات الدنيا الصفيحات وفصيلة السبرسيات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات ونباتق العالم القديم || اجسامها عديدة الصغر ، حادة التسكم ، مستطيلة الزباني . أطولها ملونة ، ملسة ، رقيقة ، ثنائية المصارع الصغية الملمدة .

Cypridinidae (S). سَبْسِيْكِيَّات ١٣١٩٣
Cypridinidae, Cypridinidae (F). Cypridinidae (E).
 فصيلة حيوانات مائية ، بحرية ونهرية ، من القشريات الدنيا الصفيحات || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر نهري || تتميز بأطولها الثنائية المصارع الصغية || أشهر اجناسها وأكثرها انتشاراً السبرسي .

١٣١٩٤ - سَبْسِيْكَة هو نصف المعروف ، اطلبه .

Seps سَبْسِي ١٣١٩٥
 من سمج الحيوان لفرق الذكور امين الملوغ . هو اللسان ، واجبها .

Gongyle ocalé (F). سَبْسِي أَنْصَر ١٣١٩٦
 هو اللسان النمرة ، اطلها .

Seps chalcidé (F). سَبْسِي مُعَقَّق ١٣١٩٧
 هو اللسان المعقطة ، اطلها .

Savane (F). Savanna (E). سَبْسِيْب ١٣١٩٨
 هو المفازة الشاسعة للترامية الاطراف كرت مروجها واشجارها الطويلة المرمية .

Felis ruppelli (S). سَبْسِيْب ١٣١٩٩
Chat de Ruppell (F). Cat of Ruppell (E).
 نوع من السنائير البرية قريب الشبه بكتاف . موطنه الحيشة والندوة ويصر . جسمه يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وزنه من ١٦ الى ١٨ سم . ثوبه الى الصبغة الرمادية . يقطن مع اقربائه من سَبْسِي الطير ويطلق تجزيع مفرق أسود يكتنفه من قاعدة الفتق الى طرف الذنب .

١٣١٨٠ - سَبْسِيْتَان هو الدقيق ، اطلبه .

Cybister (S). سَبْسِيْتَر ١٣١٨١
Cybister (F). Cybister (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من عمديات الاجنحة وفصيلة الكيزويات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم اغصانها المناطق الحارة . اكثر انواعه يألف المياه العذبة وبعضها بحري . قوتها كل ما تيسر من حشرات وقشريات وبلابيط واسماك صغيرة || اجسامها كبيرة اقترى ، اهلجية الشكل ، مبطلة . تتميز بكبر قوائمها الخلفية ايجافية الشكل والاستمال . أطولها سوية الالوان المابقة . يكثر فيها الجروي والكسني واليني والاشهر اللامس .



سبرس



سبسيب

Cebus (S). * مَسْجُور * ١٣٧٠٦ - مَسْجُور

Sajou (F). Sajou, Sapajou (E).

جلس قرد امريكية من فصيلة السجويات . أنوعه ١٩
موطنها يمتد من البرازيل الى نيكاراغوا || أجسامها
رشيقة . رؤوسها صغيرة . قوائمها مخصصة للطي . أذنانها
كاسية مغلقة لا أعادة . أنوفها قصيرة الشعر اليد
التيان الأولان || تألف القلائد . مرتها الجوارح
تسريح في قما || جماعها قليلة العدد تتألف من
ذكر وثلاث أنثى ويضئ الجراء || قوتها الجار والبرام
والشحات ويضئ الطير .

Cebidae (S). * مَسْجُوتات * ١٣٧٠٣ -

Cebidae (F). Cebidae (E).

فصيلة قردة من المكاربات موطنها البلاد الامريكية .
أنوعها المروفة ٦٦ تنجسها ١٥ اجناس . تتميز بجلودها من
الاصفاء والكتائب . باستطاعتها اجسامها الرشيقة وبأذنانها
الأعانة || تألف النباتات والاحراج الكثيفة الرطبة .
تعيش على الاشجار تنقل حليها بقفة مدعشة . جماعها
تد من ٢٠ الى ١٥٠ || قوتها الجار والبرام والحشرات .
الأنثى تقسم من جرد الى جردون || أما اجناسها
فهي التالية بالترتيب الابجدي : آكل ، اواكوري ،
بركيتل ، دروكولي ، ساي ، سيوس ، ستور ،
كرزورتيكسي ، كليترش ، لقوقيش .

١٣٧٠٤ - مَسْجُوت ذهبي هو النوع ، اطله .

١٣٧٠٥ - مَسْجُوتة هي اليسان الاسود ، اطله .

١٣٧٠٦ - مَسْجُول ، ثُوم قسيبي

Allium fistulosum (S). Ciboules (F). Welsh onion (E).
نبات يصل عمره من فصيلة البصليات . اولاه قرصية
الانتساب متصبية تطول نحو ٢٠ سم . يتصلها شراخ
اجوف يصل نحو ٥٠ سم . تكلمه قسمة كثيفة ، سويانية
الفكل ، ازهارها بيض اللون غصير المراج || ضروره
الرعاية عديدة جميعها تربى في الاراية البالية الخفيفة .
وي تسمك كسيلة وليس كسرة .

Crin (F). Coarse hair (E). مَسْجُوب ١٣٧٠٧ -

السبي من الفرس : شعر القامية والرف والذنب .
فروس غثيف السبي . الرواسدة سبية .

١٣٧٠٨ - مَسْجُودج هو الجيار ، اطله .

١٣٧٠٩ - مَسْجُور ، كَحُول

Alcool, Esprit-de-vin (F). Alcohol (E).

سائل يستخرج من تقطير التينة او صير العنب المختصر
او غيرها من الثمار والحبوب وغضف المسواد النباتية
المختصرة || وهو سائل شفاف . سويج التبخير ،
حاد الحليم يكرى الحلق . يغلي في ٧٨ + سغ . ويجمد
عند ١٣٠ - سغ .

١٣٧١٠ - مَسْجُوك هي اللون الابيض ، اطله .

١٣٧١١ - مَسْجُوطر

نوع من مالك الحزين يضي بلشون جبار . كيتيه ايويلزادر

١٣٧١٢ - مَسْجُوكة هي ذنب الصلب ، اطله .

١٣٧١٣ - مَسْجُوكة هي الابل ، راجه .

Jaguarondi (F). مَسْجُونِي امريكي ١٣١٩٢ -

سويان لاح مقترس يضي جنفوندي ، اطله .

١٣١٩٣ - مَسْجُونِيات

هي السبديات لفصيلة نباتية ، اطله .

Spondylus (S).

Spondyle (F).

بحار متوسط القند حديد النواي السلفية يكثر في بحار
البلاد الحارة .

١٣١٩٥ - مَسْجُوك هي الاغراس الامريكي ، اطله .

١٣١٩٦ - مَسْجُونِيات

Sapotaceae (S). Sapotaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين ، وحيدات القامة ،
مرتفعات الجص . اجناسها ٣١ منها المناطق الاستوائية
والحارة . فيها الاشجار والشجيرات والجنات . اولاهها
متعاقبة ، كلملة ، جليلة النصل . ازهارها ابطية الازكاز .
ثمراها حنينة الشكل . يستخرج من مظهر اجناسها صارة
صلبة صناعية تدعى طبرخي || اشهر اجناسها الاغراس
والبرام والاباجان والكنيت .

١٣١٩٧ - مَسْجُوج * Sabeteu (S).

Sébaste (F). Norway haddock, Rosefish (E).

جلس اسماك بحرية من شالكات الزمانف وفصيلة الجلائنيات .
أنواعه المروفة نحو ٣٥ . جميعها من اسماك بحار المناطق
الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها ممتصة القند صغيرة .
سهلها مبرافي الشكل ، شالك المقصية . زعانفها الظهرية
متعاقبة تتميز بشدها الشالك الاطراف . اولاهها زاهرة
الالوان الزاينة || اعرف أنواعه واشهرها سبيبة المتوسط .

١٣١٩٨ - مَسْجُوكَة المَسْجُوطَة * Sébaste

Sébaste dactylopterus (S). Sébaste de la Méditerranée (F). Mediterranean Rosefish (E).

سمكة من السبوج اسطالها البحر الابيض المتوسط . طولها
نحو ٢٢ سم . ثوبها الى الريدة الفضية الموهجة بالاعضر
الوردي . زعانفها جلدة وبزركشة بالاعضر الرصاصي
المراج . زعانفها الشرجية مسلمة بمنخس حاد || لحمها
كامن الصنف مأكول .

١٣١٩٩ - مَسْجُور Ardoise (F). Slate (E).

حجر طوي التركيب سهل التصفيح رصاصي اللون
ازرق المراج او اسود . يتصل استعمال القرميد في تغطية
سقوف البيوت .

١٣٢٠٠ - مَسْجُورِيَمَة Spononema

جلس فطور مجهرية من فصيلة الاولانيات . أنواعه قليلة
عمودة الاذن . بكينديتها تدور مظلة ثم تنزلق عند
الطراف جيلا . بينفاها يفضية او اسطوانية الشكل ،
سبيبة شفاقة .

١٣٢٠١ - مَسْجُورِي Saka-colour, Bluish-grey (E).

نمت وصفي يطلق على ما كان لونه لون السبور .



سبديس



مَسْجُوكَة المَسْجُوطَة



سبور



سبور

S. nux vomica سترينكوس النقي، جوز النقي.

S. ignatii إينياس، فول إينياس.

S. icaia إيكاجيا.

S. dewevrei دويلري.

S. colubrina كولوبرينا.

S. ligustrina ليفسترينا.

من فئة النباتات الجعالية التي تسمي أقم والتي كان استعمالها على الحراش شائعاً فيما مضى عند زواج أفريقية وأمريكية نخص بالذكر :

S. toxifera سترينكوس توكسيفرا.

S. rouhamon روهامون.

S. curara كورار.

S. castelnaei كستلي.

لحاء الجاهرا طيبة وبهشها يبيد الكلب والجملاد .

١٣٢٢٢ - سترينكوس القترع ، لكند ، لكند

Strychnos potatorum (S). Strychnos des buveurs (F). Clearing nut tree (E). Bergkrähenaugenbaum (D). Noce potatora (I).

شجرة من السترينكوس عذبة المنبت كبيرة دائمة . ثمارها مأكولة اللب ، بزورها حادة العناصر السامة ، روق الماء المكر وتنقيه .

١٣٢٢٣ - سترينكوس النقي* ، جوز النقي.

Strychnos nux-vomica (S). Strychnos vomiquier, Vomiquier (F). Nux vomica tree (E). Brachnussbaum (D). Noce vomica, Fungo di levant (I).

شجرة دائمة متوسطة القد ، ساقها كهيأة السعد ، اغصانها مرسة . افتادها شائكة . اوراقها بيضية النصل ، خاسية البروق . ازهارها حامى الايتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها كروية بحجم التفاح لونها الى الصفار البرتقالي . سيقانها لباني التركيب ، لبيض اللون مأكول . بزورها نحو ١٥ وهي لاقياسة الشكل ولقد . لونها الى الكهية البدرام بلها زغب هلي الشكل اسمر اللون . هذه البزور تحوي :

١ من الى ١.١٩٪ سترينكين

من ٧ الى ١.٥٪ بروسين

ويستدل من الهيدروليز ان تركيبها المعقوي يشمل ١.٥٪ من المنوز و ٨.٥٪ من الفلكتوز.

١٣٢٢٤ - سترينكوس النوبة

Strychnos innocua (S). Strychnos inoffensis (F).

شجرة من السترينكوس مهده النوبة ثمارها مأكولة اللب اللذيذ الحامى . بزورها حادة العناصر السامة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية المعوية .

١٣٢٢٥ - سترينكوس إينياس* ، فول إينياس

Strychnos ignatii (S). Strychnos ignatier, Fèves de St Ignace, Vomiquier, amer (F). St Ignatus bean (E). Bittere Ignatie, Ignatienbaum (D). Fava di Sant' Ignazio (I).

جنية عارضة سريعة من السترينكوس . مهدها جزر الفيليين وزرع في الكوشئين والحد الشرقية . اوراقها بيضية الشكل دائمة . ازهارها بيض . ثمارها كروية بحجم البرتقال الصغير . قشورها ملس ، لونها الى الصفار

١٣٢١٤ - صيت الحشن في البلادين ، اطلبه .

١٣٢١٥ - صيت عذبة في وزال الشرق ، اطلبه .

١٣٢١٦ - سقالة

Residu (F). Residue (E). هي الرذالة من المواد النباتية للمصونة كتفل ، لسان والشوندر والكرتون .

١٣٢١٧ - سترانج

Stratège, Stratégiste (F). Strategus, Strategist (E). من كان اختصاصه السرية .

١٣٢١٨ - سترانجي

Stratégique (F). Strategic (E). ما هو نخص بالسرية على اختلاف اهدافها .

١٣٢١٩ - سترانج

Stratège (F). Strategy (E). السرية فن تنظيم القوى الحربية والسياسية والاقتصادية والمعنوية عندما تدعو الحاجة إن في حالة الهجوم أم في حالة الدفاع . وبالتالي تعتبر السرية السياسية فن ترتيب وتجهيز وتوجيه جميع الاعمال المتروية في إطار مصلحة معينة .

١٣٢٢٠ - سترطوسوم

معدن اصفر اللون يوجد في الطبيعة مزوياً ببعض المعادن والعناصر اغصانها الرصاص ويها البحر (ست-ست) وزنه الاتي ٨٧٥ وقلته النوي ٢٥٤٥ || نالته الكهرناتية ضيقة . ينكثك الماء بالحرارة الطبيعية وينتج مع الكور واليد والكبريت . اما اغصانه الصناعية المختلفة فهي ما يتجم من مزيج مختلف الحامض .

١٣٢٢١ - سترينكوس ، سترينكوس

Strychnos جلس نباتات برية وزراعية . من فصيلة اللوفانيات . انواعه ٦٥ تقسم الى ثلاث فئات . فئة النباتات الصحية ، الطبية ، غير المؤذية . فئة النباتات السامة . وفئة النباتات الجسالية (الكرارية) . معظمها اثمار وجبهيرات وبنينات عارضة وبهشها عسبي || مهدها البلاد الاستوائية . اوراقها منقطة متعاقبة كاملة . ازهارها حلقة التجميع ، ابطية او قاجية الايتكاز . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية الحامى ، لحمية اللب ، ليفية القشرة . بزورها تحوي بعض الجواهر القسالة والمواد الطبية النافعة ، والقلوية السامة كالسترينكين والبروسين والكرار . لحاء الجاهرا يستعمل في علاجات الاراضى الجلفلة . اغصانها تنفع الاراضى الصلبة || من فئة النباتات غير المؤذية والطبية نخص بالذكر :

سترينكوس ايبوا

S. iboga إيبوكا

S. innocua إينوكوا

S. potatorum بوتاتوروم

S. spinosa سبينوا

S. vacuosa فاكاكوا

S. coecifolides كوكوليد

S. melanocarpa ميلانوكاربا

من فئة النباتات السامة التي تقضي على الجهاز الحوي نخص بالذكر :



سترينكوس النقي



سترينكوس إينياس

١٣٢٣٣ - سكارين (F. Searine) (E).
مادة دهنية قوامها الكليسيرين وأحد الحامض الدهنية.
تستخرج خاصة من لحم الحيات لا سواها.



مثل ناسك

١٣٢٣٤ - سكتيكية

السكتيكية طائر يشبه اليام (حيط المحيط).

١٣٢٣٥ - سكتير هو الفارس، اطلبه.

١٣٢٣٦ - سكتيركا (F. Sckra) (E).
رسنة قياسية مؤلفة من جهاز خاص يتعصب متراً كمنها
واحداً من الحطب.



سنتور، زباط

١٣٢٣٧ - سكتيرس ساجور (F. Sctyr) (F).
هو الحبان لاسار، اطلبه.

١٣٢٣٨ - ستروانوس (F. Styranus).
جنس فطور مجهرية من عائلة الحياتيات فضيلة
الكيميائية. يتميز بكرياته البارزة الطرف الغزبي
الشكل. كرائه طرية الانكماش سمية تصبح سمراء
اللون. انواحه قليلة جميعها روية تعيش حل المواد البتالية
والفضوية المتلفة.

١٣٢٣٩ - ستيلسبور (F. Scilbospore).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريديات. انواحه قليلة
العدد والأشكال. تركيب طلاء بعض الفريديات الحرجية.
يتبين بوضوح الكينية المعلقة التي تقلب برفها من فتحة
شقيقة تصدها بعد التفتت. يوفها عسلانية -
غروبية، مؤطرة، وباعية الانقسام، سمراء اللون.



ستيلسبور

١٣٢٤٠ - سيثروب جيتور (F. Scythrops) (E).

Scythrops novae-Hollandiae (S).
Scythrops géant (F).
طائر من فصيلة القيقويات ورتبة المنسلطات، موطنه
ينته من ماليزيا إلى أستراليا. جسمه كبير لكنه يطير
نحو ٦٠ سم. يسلطه نحو ٩٠ سم. قوته إلى الكهبة
المرفوقة بالابيض والاسود. رداؤه إلى انخضار الزئي المالح.
متفاده كبير وضلع. حنة حنة طافية اللون. حنة مطوقة
بجدار اسود. اخلاعه حنية لكنه كثير الجبل والحذر.
يعيش جماعات قليلة البعد الذي يراوح من ٦ إلى ١٢.
قوته الغريزية يحل اصدلها متفاده الصلح ثم الزور
والخشرات اصحاب الحيات الاجنسة والجراد. طيرانه
طويل الشوط قليل التصيد والتجيب. لا تفتش
بل تنقع البيض في اصفائش فريدا من البليز ولا تنقع
في العش الواحد أكثر من بيضة.



سثروب جبار

١٣٢٤١ - صج (F. Endouire) (F).
صج الحلاط: سمه بالطين الرقيق. والسمية هي المشية
التي يملأ بها العين وفي المائلة والملاق وللط واللط واللط.

١٣٢٤٢ - صجج (F. Enduc) (F).
الحلاط الرقيق مها كان مصدره وبها كانت غايته.

١٣٢٤٣ - صججاس (F. Pleuronectes) (E).
جنس اسماك بحرية يعيش من فصيلة جانبيات العمود ورتبة
اللسانوات. انواحه المرفقة عشرة. اصنامها شطوط البحر

الترتقال. سوتها لابي مر الطم. يزورها من ١٠
ال ١٢ لونها إلى الكهبة الزرقاء المالح يملأون زغب طلي
الشكل.

وهذه البزور تحوي: ١٥% من السريكتين
١,٥% من البروسين.

١٣٢٤٤ - سريكنوس الفابون (F. Strychnos) (S).
سريكنوس الفابون ان تركيا الضوي يشمل
٤٤% من المنور و٦% من البكتوز.

١٣٢٤٥ - سريكنوس فاكوكا (F. Strychnos) (S).
سريكنوس فاكوكا، سريكنوس
فاكوكا، سريكنوس فاكوكا.

١٣٢٤٦ - سريكنوس شاليك (F. Strychnos) (S).
سريكنوس شاليك، سريكنوس شاليك، سريكنوس شاليك.
نوع من السريكنوز مهدد مفسك. وهو شجرة صغيرة
القد شالكة، ثمارها برتقالية الشكل والحجم. لها
مأكلي زهر الصانعة السكرية للصناعة الطم. يزورها
قليلة العدد عادمة العناصر الجمالية.

١٣٢٤٧ - سريكنوس فاكوكا (F. Strychnos) (S).
سريكنوس فاكوكا، سريكنوس
فاكوكا، سريكنوس فاكوكا.

١٣٢٤٨ - سريكنوس فاكوكا (F. Strychnos) (S).
سريكنوس فاكوكا، سريكنوس
فاكوكا، سريكنوس فاكوكا.

١٣٢٤٩ - سريكنوز (F. Strychnos) (S).
سريكنوز، سريكنوز، سريكنوز.

١٣٢٥٠ - سكتل (F. Néophron) (F).
سكتل، سكتل، سكتل.
جنس طير من الكواسر ينتمي إلى فصيلة النسريرات.
انواحه قليلة جميعها كبيرة الجثة تتميز برأس اصلي وحتى
اغفر يسقط طويل وذنب قصير ويسر احسن البيرة
الشديدة الانعكاف. أشهر انواحه الستل اناكس.

١٣٢٥١ - سكتل ناسك (F. Néophron) (F).
سكتل ناسك، سكتل ناسك، سكتل ناسك.

١٣٢٥٢ - سكتل ناسك (F. Néophron) (F).
سكتل ناسك، سكتل ناسك، سكتل ناسك.

١٣٢٥٣ - سكتل ناسك (F. Néophron) (F).
سكتل ناسك، سكتل ناسك، سكتل ناسك.

١٣٢٥٤ - سكتل ناسك (F. Néophron) (F).
سكتل ناسك، سكتل ناسك، سكتل ناسك.

Combustible ١٣٢٥٤ - سججور ء سججور
هي القيد من اي نوع كانت .

Dicline ١٣٢٥٥ - سججج
نمت تفرعي يطلق على كل نبات لاقياسي الانظام
الزمرى .

Marne calcaire (F). ١٣٢٥٦ - سججيل
Calcareous marl (E).
تراب كثرت فيه نسبة المواد الجصية من كربونات
الكلس مع بعض الصلصال والقليل من الرمل والمواد
النضوية .

Engraissement (F). ١٣٢٥٧ - سجج - سججج
Fattening (E).
هو تسمين للماقية . يقال سمحت البقرة اذا سميت
غاية السن . فهي صالح وساحة ج صالح وصباح .

Cachrys (S). ١٣٢٥٨ - سججاء
Cachryde (F). Cachrys (E).
جنس نباتات عشبية مسمرة برية من فصيلة النسيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد منها في بعض مناطق الشرق الاذن
واسيا الوسطى والاشالية || سقها منتصبه خلية السحاء ء
قليلة الفروع او كثيرتها بالنسبة الى النوع . اوراقها
ضيقة الاتصال المستطيلة ء كثيفة الحمل والزغب . ازهارها
صويالي التجميع . ازهارها صفراء اللون . تنويرها ربيعي .

١٣٢٥٩ - سججاء
هو الزباد ليات عشبي طيب شمري يجرس ازهاره النحل .

Nuage (F). Cloud (E). ١٣٢٦٠ - سججاب
هو القيم كان فيه ماء او لم يكن فيه . راجع غيم .

Synotus (S). Synotta (F). ١٣٢٦١ - سججاء ه
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات له نوعان يتميزان
بأذانها المسترسمة المنعطف فوق الجبهة . مناعيرها
جوفية تظهر عند قلم الفرجة . اذانها مستطيلة .
موطنها لسحب الارباء يشل بعض مناطق اسية واروپه
وافريقية لسحابة الكسول والقسم الاكبر من امريكة
التيالية والجنوبية لسحابة الامريكية . ج سحا .

١٣٢٦٢ - سججاء كسول ه
Synotus barbata (S). Synote barbata (E).
Synotus barbata (F).

نوع من السحبا موطنها فسيح الاربياء يمتد من الهند وبلاد
فارس الى الشرق الاذن واروپه وافريقية الشالية .
فويها الى القرية السراء يديق مع اقترابه من شبح الظهور
وبرها اسود القاعسة اصعب الطرف . جسمها ربيع قصير
طوله نحو ٩ سم . اما بسطه فنحو ٢٧ سم . والذنب ٥ سم .
تميش منفردة . ذكورها لا تقرب انثاهما الا في زين
الكوم . الانثى تقنع جروين تحملها حتى القطار .
طيرانها بطيء تألف جميع الاكابر لا تبيت اسيرها واحدا
في محل واحد . وهي لا تغشى المطر والزاوي . مسرعا
يدوم من القرب الى فسة الليل بين القصر العميق الى
البروع . قوتها الحوام والذباب والحشرات .

Alr, atmosphère (F). ١٣٢٦٣ - سججاح ء سججك
Alr, Atmosphère (E).
هو الهواء والجو . و سلق الترس في السكك .

الايض المتوسط والمحيط الاطلسي والمهادي والمهدي ||
اجسامها بيضية او اطيالية الشكل . منطقة الجرم .
اطولها تراوح من ٣٠ الى ٩٠ سم . رؤسها مسننة
مستوية الاطام . زعانفها الظهرية والثربية لاسفة تتصل
بالايلية || حولها جيدة الصفء ء اللينة الغام .

١٣٢٤٤ - سججاس مؤزر * ء سججاس ء أم
الزرد
Pleuronectes zebra, Solem
zebra (S). Pleuronecte zèbre, Synapture zèbre (F).
Striped Pleuronect (E).

سمكة من السجاس . اطعامها بمحار البلاد الحارة والبحر
الايض المتوسط || جسمها اطيالي الشكل بطول من ٣٠
الى ٤٥ سم . خضاب قويا يختلف بين البين واليسار .
الجانبي الايمن اخضر اللون ء يملوه تأخير شديد السمرة يمتد
كالاطواق من الخطم الى طرف الذيل . الجانب الايسر الى
الشفية الفراء || راسها صغير الجرم ء معتدب الخطم .
اسنانها صغيرة ء ذرية . عيناها صغيرتان ء لامتساويتان
يمينا الاثكاز . زعانفها الظهرية والثربية متصلة
بالايلية || شعها جيد الصفء ء مأكول .

١٣٢٤٥ - سججاف
Diaphragme (F). Diaphragm (E).
حجاب حاجز يستعمل لتحديد فوعة التور في آلة التصوير
واشبابها .

١٣٢٤٦ - سججاء
سججاء اللبن الكثير الماء وهو ارق ما يكون .
١٣٢٤٧ - سججج
سموت البقرة : سحت عند حلبها .

١٣٢٤٨ - سجججج
هو الاربيان ء اطلبه .

١٣٢٤٩ - سجججج
Terre moyennement compacte (F). Fairly compact soil (E).
الارض ليست يسلية ولا سهلة ء اي المتوسطة الاتماج .

١٣٢٥٠ - سججج
Roucoulement (F). Cooling (E).
صوت القمري .

١٣٢٥١ - سججج
Mamelle volumineuse (F).
Voluminous udder (E).

السجل : الفرع العظيم . بقرة سججاء : عظيمة الفرع .
وضعر سججيل واسجل : مثقل واسع .

١٣٢٥٢ - سججج عقاري
Registre foncier.
Livra foncier (F). Register landed (E).

هو السجل الرسمي الصادر عن الدوائر العقارية بين
للنطقة ورق العقار ويساحت واسم المالك وطريقة امتلاكه
والحقوق العميلة المنسبة على العقار . ومن خصائص
هذا السجل ان قيوده منشئة المحقوق التي تشير اليها .

١٣٢٥٣ - سجججلاط ه
Nyctanthos (S).
Nycanthos (F). Arabian jasmine (E). Nachtblume (D).
Nicantho, Gelsomino d'Egitto (I).

جنس نباتات جنينية فناء من سبط الياحميات وفصيلة
الزيتنيات . منها بلاد الحارة . اوراقها متعاقبة ء
بيضية او اطيالية الشكل . ازهارها صويالية التجميع
محورية وتالية الاثكاز ء جميلة الشكل ء قشدية او ثنائية
اللون . تنفتح عند غروب الشمس من حرف ذكي اخاذ
وتعطي مع انبلاج القمر .



سجاس مؤزر



سجلاط



سجاء



سجاء كسول

Lima (S).

Lima (F). Lima (E).



سحار

* سحابة ١٣٢٦٤

Aérobiose (F).

* سحابة ١٣٢٦٤

حياة الكائنات السحابة (الهوائية).

* سحابة ١٣٢٦٥ هوائي، إيروبي

Aérobique (F). Aerobic (E).

نمت ترميني يطلق على جميع الاحياء الهوائية التي لا تستطيع الحياة وتتكاثر بعيداً عن الهواء.

* سحابة ١٣٢٦٦ هوائية، إيروبيك

Aérobic (F). Aerobic (E).

صفة الكائنات الهوائية التي لا تستطيع البقاء منقطعاً عن الهواء.

Varanidae (S).

Varanidae (F). Varanidae (E).

* سحابة ١٣٢٦٥

اسم شامل يطلق على بعض اجناس القورل. تتميز باستقامة اجسامها وبالسحب الملتصقة الزقية. اوتابها زائفة الاوتان ثمان الوصل الذي تعيش فيه.



سحاف الزيتون

* سحابة ١٣٢٦٦

Limidae (S).

Limidae (F). Limidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم، عادات المصايد. اجسامها وانواعها المعروفة متنوعة البند. معظمها من متحمرات الاباح الثاني. الانواع القليلة المعاصرة منتشرة في جميع انحاء العالم. تتميز باسديانها الشامعية المتخدي، يكثر فيها الشكل القروطي. اعرف اجسامها واشهرها السحابة.

Poumon (F). Lung (E).

* سحابة ١٣٢٦٨

السحارة والسحر والسحر: الرئة.

Sedilindes (F).

* سحابة ١٣٢٦٩

سبط من فصيلة الجيمييات يشمل عدة اجناس اصحاب السمار والقمرة والفيل والسنتوت والبادجان.

* سحابة ١٣٢٧٠

Bacterium savastoni, Phytomonas savastoni (S). Bactériose de l'olivier, Tuberculose de l'olivier, Tumeur bactérienne de l'olivier (F).

وسم بكتيري يصري الزيتون فوركب بعض الانفاد الفتية الضعيفة ثم ينتشر ويمس معظم الانفاد والافاضان. مظهره الخارجي ذليل خشية التركيب لاقابسية الشكل والحجم والانشقاق، تلب فيها الاستدارة تقفي على البثرة والفكرير لانها ترتكز على اللادة الخشبية وتسفرها في نفسها فتصل دين تبادل اللسع او وصوله. يكافح بطنخ الاجار المصابة بحلول فليوسيكينات البوديوم المركز ٠.٥ ٪ وذلك بعد قطع جميع الاجزاء المصابة وسرورها. وقد يحسن تسميه الزيتون بالمواد الضوئية مع اجتناب كثرة الاوزن.

* سحابة ١٣٢٧١ Dumping (F). Dumping (E).

السحابة عمل اقتصادي تمارسه بعض البلاد على حمل صادراتها او على انواع مينة منها فتعرضها في الاسواق الخارجية بسعر ادنى من السعر المحلي حتى وادف من ثمن التكلفة.

* سحابة ١٣٢٧٢ Pécule (F). Peculium (E).

المقت من السحل. وما اكتسبه وقته لنفسه المرووس. وما قتر لنفسه السجين او الاسير طيل مدة عقوبته او امره.

Ecole (F). Shell (E).

* سحابة ١٣٢٧٣

هي قشر ابر والشعر ونحوه.

Cerebra (S).

Cerebra, Manglier latex (F). Indian mango tree (E). Ostindischer mangosbaum (D). Cerebra (I).

* سحام ١٣٢٧٧

جلبس اثمار دائمة هريمة كبيرة لثد من فصيلة الفليات. انواعه قليلة اورثاقها مثقبة متناوبة الحلجوية اصحابها جلدي للنج عايق الخضر. ازهارها يفر او وردية ثمارها بيضية الشكل ولقد، وحيدة المينة الكبيرة الصلبة. وهذه الاشجار جميع اجزائها من الساق الى الورقة والثمرة غزيرة العصارة الجمالية المينة.



سحابة

Puccinia

* سحام ١٣٢٧٨

جلبس فطور مجهرية من فصيلة الساميات تتميز بعلاماته الانزاسية الشكل التي تلب فيها الاستدارة والصفانة. مشبه الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا النسيج النباتية. فاعلمه ثملوية مبدئة او متقاربة مرصقة التجميع. انواعه المكونة المعروفة عديدة عليها اسمها ما يتبع.



سحام

* سحام أسفح ١٣٢٧٩

Puccinia triticea (S).

Rouille brune du blé, R. b. du froment (F). Orange leaf rust (E). Braunrost des weizens (D).

فطر مجهرى شديد الاقوى يصيب القمح في جميع اصابته فينفخ الانتاج ويؤدي الصف اذ يقلقه بعض المواد الغذائية. مظهره الحلوي بدور قرصية مبدئة، لانظامية، مستوية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ١٥ م. تركب النصل على صفحتيه ولا تصف من القمة والساق وصفحات السنبال. ثيو صلبة اللون، براقالية الاطراف، ثم تنحرف الى الخزوة فالسفرة. تنضج من خيرات بيضة شديدة التصبغ لونها الى السفة تتطير ككباب. يكافح بمشعال الكبريت الميكروني او احد الفطاريات الزراعية المرتكزة على الكبريت واملح النحاس.



سحام أسفح

١٣٧٨ - سُحَامُ الزَّرْعِ *، مَرَقَ الزَّرْعِ *

Puccinia graminis (S). Rouille noire, Rouille linéaire des céréales (F). Stem rust of grain (E). Schwarzrost (D).

نظر مجهرى يصيب أكثر النباتات النجيلية وأخصها الزرع فيطبع الصف والسائل ويلصق القصر بالمصقول. مظهره الخارجي بثور قرعية تملأ نصال الصف فتبدو صفيرة مستديرة ثم تكبر وتتصلب حتى تبلغ ١٢ م. لوها يكون إلى الشقرة المائقة ثم ينحرف نحو السرة عند ارتفاع بشرة النسيج التي يعقبها التفتير ويملأ النبار البويي || وقد يركب الزيدات والسيليات فينتجها ببوره وقرصه الخيطية التي تنتهي نهاية بثور الصف. انحرار قد تكون حسيبة فيما لو مكنته العوامل الجوية من سرعة الانتشار || مكافحته صعبة تستوجب الكثير من العناية. يكافح :

أولاً - باستعمال الفطوب المروقة بقوة مانعها والتي صار اختيارها اقليمياً في هذا السيل أو الفطوب الباكورية كالفلورس أورور (Florence aurea) الذي صار اختياره في لبنان وهو يقاوم هذا الورم لانه يتركه باكراً قبل انتشار السحام.

ثانياً - باجتنب الاكثار من عنصر الزروت لانه ينشط المواد البينية والخضرية ويؤخر الإدراك فيمرض الزرع إلى الإصابة.

ثالثاً - باستعمال الكبريت الميكروني تفعيلاً على الزرع عند ظهور الورم. وهناك فواظير أخرى عديدة يمكن استعمالها لكنها باهظة الثمن.

رابعاً - بالقضاء على جميع نباتات البربريس (الأثرارة) القريبية والبينة من الحقل لأنها الزوج الثابت والبوزة الحقيقية التي يعيش فيها عليها السحام.

١٣٧٩ - سُحَامُ الزَّرْعِ الْأَصْفَرِ *، مَرَقُ الْأَصْفَرِ *

Puccinia glumarum, P. rubro-vers (S). Rouille jaune des céréales (F). Yellow rust of wheat (E). Gelbrost (D).

نظر مجهرى شديد الاذى يصيب الزرع في جميع أصنافه وعلى اختلاف أنواعه وضروبه || مظهره الخارجي يتتابع على ثلاث مراحل. في الاول بثور صفر صغيرة اللقد متصلة متتابعة على شكل الحنجر تركب النصل في زامة الاخير بمزارة عروية. وقد يبلغ امتدادها من ٢ إلى ٣ سم. ويعد محيطها المتوازية من الثلاثة إلى الستة. وفي المرحلة الثانية اصفرار على ينصل الصف ينتج في الزام الاخير على شكل قند متقطعة متوازية تحمل في جوفها بوع السحام الاصفر الزاهي. وفي المرحلة الثالثة بثور حسية الشكل رائحة تركب الصف بدون انتظام وتصيب السوق والاغصان والسائل. صفرتها غامقة ذعية الملع || يكافح بالكبريت الميكروني تفعيلاً على الزرع منذ المرحلة الاولى. كما يحسن تلف جميع النباتات الخضرية وذلك باستعمال المبيدات الخاصة. ومن المستحسن أيضاً سرق الحقل أو أثر الحصاد.

١٣٧٧ - سُحَامُ السَّيْسَمِ *

Puccinia anthrini (S). Rouille du moffier (F). نظر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على السيم فيطبع الأوراق ويضعف النبات وقد يصيب موته || مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة حطية اللون غفراء الاطوار خضية التجميع تملأ نصال الأوراق على صفحاتها السفلى

١٣٧٠ - سُحَامُ التَّرْتُشُولِ *

Puccinia helianthi (S). Rouille du tournesol (F). Sunflower rust (E).

نظر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على مختلف أنواع وضروب الترتشول. يركب الأوراق فيؤذيها وقد يصيب جفاتها وسوقها باكراً. مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة لاقليمية التجميع والارتكاز لوها إلى الصهبة المائقة تركب النصل على صفحة السفلى تغطى النسيج وترتدق القسغ وتصب الصف وتلف انتاج الحقل || يكافح باستعمال الادوية الفطورية اخصها المركزة على عنصرى الكبريت والنحاس.

١٣٧١ - سُحَامُ التَّرْتُشُولِ *، مَرَقُ التَّرْتُشُولِ *

Puccinia bromina (S). Rouille des bromes (F). Bromus rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على جميع أنواع وضروب الترتشول وهو كثير الانتشار في اوروبا وافريقية الشمالية || مظهره الخارجي بثور قرعية ممتدة أو متاخفة طول النصل على صفحة العليا تبدو صفيرة اللون وردية الاطوار الضيقة ثم تنحرف إلى الجفوة ويبقى عليها حتى تنجبرها || يكافح عند الاقتضاء مكافضة غير من السحام.

١٣٧٢ - سُحَامُ الثُّومِ *، مَرَقُ الثُّومِ *

Puccinia alli (S). Rouille de l'ail (F). Garlic rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على بعض نباتات الفصيلة الزنبقية وانحصار الثوم والكراث فتركب الأوراق دون ان يقع بها الاضرار. مظهره الخارجي بثور لوها إلى الصهبة، مصغرة ذائغ الفطر تملأ نصل الأوراق بدون انتظام ولا قياس ثم تنحرف تدريجياً نحو الجفوة البنيصية وينتشر عليها حتى تنجبرها || انحرار زغبية لا تستوجب المكافضة.

١٣٧٣ - سُحَامُ الْخَازِيَاَتِ *

Puccinia malvacarum (S). Rouille des malvacées (F). Hollyhock rust (E). Malvenrust (D).

نظر مجهرى يصيب أكثر الخازيات في اوراقها وسوقها وزادها فيطبعها ويلهبها || مظهره الخارجي بثور صفيرة تركب الأوراق على صفحاتها السفلى وتركب السوق وكثير الزهر. تبدو برتقالية اللون يحيطها اطوار بتفسي ثم تنحرف إلى الجفوة السوداء حيث ترغف كالتماليد دون ان تغير البشرة. وبعد ذلك بارية أو خسة اسابع مظهر ذائغ الفطر على التنايل فتبدو حطية اللون ثم تتحول إلى حطية خضية يعلوها سراج ايض. يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المفلط ١٪ عند ظهور الفطر وينتخ مرة ثانية موصداً بعد الاول بامبيسين || ومنهم من استعمل ريننتات ليرتقاي وهي ملقية اذا امتلعت في يده الامر ولكنها تصعب عدية النتج عند ظهور الملائع.

١٣٧٤ - سُحَامُ الدُّوْمِ *، مَرَقُ الدُّوْمِ *

Puccinia maydis, *Aecidium oxalidis* (S). Rouille du maïs (F). Maize rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على الذرة في جميع البلاد والاتالم. أثيراته تعيش على الحاشي ومنها تنقل إلى الذرة. وهو من صنف الذرة ذائغ ممتدة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحة بمزارة الفلج فيبدو النسيج النحار قليل الخصب اشقر البثور المتحبة بالاصفر ثم ينحرف لوها إلى الاصعب فالخضلي المايق || انحراره غالباً محدودة لا تستوجب المعالجة.



سحام الترتشول



سحام الترتشول



سحام الثوم



سحام الخازيات



سحام الذرة



سحام الزرع



سحام الزرع الاصفر



سحام الميسم

سُحَام الشَّعِير - سُحَام قَصَب السُّكَّر



سحام الشعير



سحام الشيفان



سحام الكرز



سحام الكرز الحامض



سحام الخيلون



سحام النعنع



سحام قصب السكر



سحام الهندباء

السفل قصب جفاف النسيج والنصل || وهو على السوق يثور ميمرة قليلة العدد لأنها إلى الصبغة الباهية الحليئة للون || يكافح يظلم الأوراق المصابة ويضعف النبات بساق يورث الحيد الملوئ ١/٢

١٣٢٩٣ - سُحَام الكَشْمِي

Puccinia ribis (S). Rouille du groseillier (F).
فطر مجهرى يتطفل على الكشمش فيؤذي به وقد يمتد ظهوره الخاربي يقع نسيجه تركب نصل الأوراق النامية فتلوها . ثبو شذراء الين ثم تنصرف إلى السرة الزخمية وتتفتت يبيض النسيج المتناثر التي يتبعها يابس النصل وضعت الشجرة || يكافح باستعمال امد السوائل الفلوكسيلية الحاملة ١/١ نصفًا حل الكشمش قبل ازهاره .

١٣٢٩٤ - سُحَام النَعْنَع

Puccinia menthas (S). Rouille des menthes (F).
فطر مجهرى يتطفل على بنس النعنعوات اصعبها النعنع . مظهره الخاربي يثور صغيرة مهباه الين تركب الأوراق حل صفحتها السفلى وتتلو الجليلير وتلوي تصرفل سير النصل ونسب ذبول الأوراق ويغوث بهد أن تجمن التلوي رطل حين سيال نشاطها || يكافح بالتتابع وحرق النباتات المصابة قبل تقضي الوم . بين المستحسن من النعنع بالازوت النيتريكي الذي يخلصه على مقاومة هذا الفطر .

١٣٢٩٥ - سُحَام الحَلِيَّة

Puccinia asparagi (S). Rouille de l'asperge (F).
Asparagus rust (F). Spargelrost (D).
فطر مجهرى يتطفل على سوق الحليون فيطبلها ويؤذيها . مظهره الخاربي يثور لمة الشكل وردية اللون تملو السوق ميمرة بدون انظام تصرفل سير النصل وتضرر النبات . يكافح باستعمال مئة وسائل اولها سائل يورث نصفًا حل النبات . ثانيا الكبريت تمعيرًا على التربة والنبات . ثالثا دينتر كرازيلات السودا . رابعا ذرع الفروث للنبات التي تقاوم هذا الفطر .

١٣٢٩٦ - سُحَام الحَشْدَبَاء

Puccinia elichorii (S). Rouille des chichorées (F).
فطر مجهرى يتطفل على اختلاف أنواع وفروث اخشاب فصوب الأوراق ويصطبها || مظهره الخاربي يثور وافضة مستديرة لأنها إلى الصبغة تملو النصل حل صفحته السفلى تضطبه وتمزقل نمو النبات || يكافح باستعمال سائل يورث الحلي من ٥٠ الى ١٪ حين ظهور الموراض .

١٣٢٩٧ - سُحَام قُرْمُزِي

Puccinia purpurea (S). Rouille du sorgho (F).
فطر مجهرى يتطفل على قلة البيضاء فيؤذيها ويضعف انتاجها || مظهره الخاربي يقع نسيجه قزمية الين تملو النصف واغصانه تضطبه وتضيق ال نمو النبات بهد ان تمزقل سير نشه || يكافح بمكافحة غيره من السحام .

١٣٢٩٨ - سُحَام قَصَب السُّكَّر

Puccinia kuehni, *Uromyces kuehni* (S). Rouille de la canne à sucre (F).
فطر مجهرى يصيب قصب السكر حين ان يؤذيها يصيب له حليا يذكر || مظهره الخاربي يقع مستطيلة او مردية الشكل ميمرة بدون انظام قليلة العدد تركب

تتسبب تغيير بشره النسيج ونصل الأوراق الذي يهبط مع النبات ويؤذي به || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تمعيرًا على النبات مثل ظهور الفطر على ان تمدد العملية من المرات إلى الثلاث مرات . ومنهم من ينصح باستعمال سلقور البيناسيوم الحمول ٥٠٨ ٪

١٣٢٩٨ - سُحَام الشَّعِير * ، مَرَق الشَّعِير *

Puccinia hordei, *P. anomala* (S). Rouille naine de Forge (F). Barley rust (E).
فطر مجهرى يتطفل على الشعير فيؤذي ويضعف من مقدوره الانتاجي ومن صفاته المشفوفة في صناعة البيرة . مظهره الخاربي يثرة صغيرة تملو نصل المصبة عند غرب الزرع وتكون يثرة واحدة على النصل الواحد . تبو يضاء الين ثم تنصرف نحو البريقال وتتفتت عند الفجانبها بالون الاصهب الامر || يكافح بمكافحة غيره من السحام .

١٣٢٩٩ - سُحَام الشُّوْثَان * ، مَرَق الشُّوْثَان *

Puccinia coronata, *P. coronifera*, *P. heli* (S). Rouille couronnée de l'avoine (F). Crown rust of oats (E). Kronen rost des hafers (D).
فطر مجهرى يتطفل على الشوثان وحل بعض التصيليات البرية . أثباته تمض عمل التصيليات والخلانيات . تظهر خلال شهر حزيران فيسود يقع مرامة سفر أو حر مستديرة صغيرة على صفحة النصل السفلى يقابلها على الصفحة العليا انتضاعات في النسيج واليثرة لأنها إلى الجروة || وهو على عصف الشوثان ضائع ميمرة بدون انظام تركب النصل ورطه حل صفحتها قدير يقع مستديرة ومستطيلة ميمرة ومترامة كالهاة لأنها إلى الصبغة الزخمية ثم تنصرف إلى الجروة وتتفتت بالون البنفسجي المائل || يكافح بمكافحة غيره من السحام بهد القضاء على ودجه الطبيعي للين أو الخلف .

١٣٢٩٠ - سُحَام الصَّبَا * ، مَرَق الصَّبَا *

Puccinia vineae (S). Rouille de la pervanche (F).
فطر مجهرى يركب مختلف أنواع القصب فيؤذيها وقد يقتضي حليا || مظهره الخاربي يثور مستديرة كيفية التجميع تركب الأوراق حل صفحتها السفلى ونسب السوك والفروع . ثبو مهباه الين ثم تنصرف نحو الحلي حيث تتغير من بوغ حياي لمر || اماالأوراق المصابة حيث صغيرة فقد رافضة النصل الخشن مهبم الحلية || يكافح عند ظهور الوم يستعمل سائل يورث الحلي ١/١

١٣٢٩١ - سُحَام الكَرَز * ، سُحَام لَدَرَّاك * ، سُحَام لَدَرَّاك *

Puccinia carni, *P. pruni-spinosa* (S). Rouille du carlier, R. du pêcher (F). Rust (E). Zwetschenrost (D).
فطر مجهرى يصيب الكرز والدراتي والحوخ فيؤذي بعض اوراقه دون ان يقع بها امراضًا تذكر || مظهره الخاربي يقع سفر تركب النصل حل صفحته السفلى يقابلها على الصفحة العليا مواج اجر أو بنفسي يدمر بعض الوقت ان تنحجر البثرة من بوغ حياي اصهب الين .

١٣٢٩٢ - سُحَام الكَرَزِيَّات * ، سُحَام الكَرَزِيَّات *

Puccinia chrysanthemi (S). Rouille du chrysanthème (F).
فطر مجهرى يصيب الكرزانيات في اوراقها ويؤذيها فيؤذيها . مظهره الخاربي يثور صغيرة مستديرة ميمرة قليلة العدد لأنها إلى الصبغة الزخمية تركب الأوراق حل صفحتها

تتركب من ١١ فصلة . ايجادها لاسفة . جرامها نشطة .
اراسها ثلاثة المقل || اشهر اجناسها السحليل والسهبية .

Traffic Illicita (F).

١٣٣٠٤ - سَحْتٌ

Illicit traffic (E).

السحت والسحت الرقاعة المحظورة أو ما سقطت من
مكاسب عرمة .

Bourgeon à fleurs (F).

١٣٣٠٥ - مَسَحْنَةٌ

Blossoms bud (E).

الاية القليظة في اللمن .

Abrasion (F).

١٣٣٠٦ - مَسَحٌ

Abrasion, Attrition (E).

السح الإستهلاك بالاحتكاك المستمر كسح الأسنان
في القم وكسح مياه البحر لصخور الجواهر .

Traumatisme (F).

١٣٣٠٧ - مَسْحَةٌ

Traumatism (E).

الأثر الذي يحدث من غشش أو جرح . ج مسح ومسحوج .

Broyage (F). Crushing (E).

١٣٣٠٨ - مَسْحٌ

دق الشيء اشد الدق .

Pécune (F).

١٣٣٠٩ - مَسْحَلٌ ٥ ، نَقْدٌ

السحل النقد من الدراهم .

Chaetodon (S).

١٣٣١٠ - مَسْحَلٌ

Chétodon, Poisson papillon, Demoiselle, Bando-
lière (F). Butterfly fish (E).

جلس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها عديدة
جميعها صغيرة القد ، قصيرة ، مبطلة ، عرشها يوازي
ثلاثة ارباع طولها . ألوانها جميلة زائفة متراكبة عليها
تجتمع مفرس متقابل وزركشة بيضاء لامة || موطنها
بحار البلاد الحارة . انواعها المبرودة في المتوسط
ثلاثة :

Chaetodon saxatilis (S).

سحل الصخور ، تقترت

Chétodon saxatilis (F).

Chaetodon argenteus (S).

سحل فضي

Chétodon argente (F).

Chaetodon maculosus (S). عروسة البحر .

Chétodon maculé (F).

Salep

١٣٣١١ - مَسْحَلَبٌ

مادة نقوية تستخرج من بعض انواع السحلب الزراعي .

١٣٣١٢ - مَسْحَلَبٌ ٥ ، عَصَى الْقَسْلَبِ ، عَصَى

الكتب ، قَائِلُ أَخِيهِ ، سَقْلُورِيُونُ

Orchis (S). Orchis, Barbène, Sazyron, Salep (F).

Orchis, Lizard orchis (E). Bockerslenszunge (D).

Orchide, Satirione, Testicolo di cane (I).

جلس اشباب عشقولة معمة من فصيلة السحليات .
انواعها للمروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبهشها زراعي
وتربسي . يستخرج من ساقها بعض انواعها مادة نقوية
يبيعها بيطخ كالحليب ويؤكل || اعرف انواعها
واشهرها :

Orchis maculée

سحلب أبيض

Orchis d'Anstolie

سحلب أناسولي

نصل الصف . فهو حطية التي عمالة جملة ضيقة
تبينة ثم تنحرف نحو السرة وتبين على سحرها حتى انفجارها .

١٣٣١٩ - سُحَامٌ مَشَاتٌ ٥ ، مَرَقٌ الشَّيْطَانِ ٥

Puccinia dispersa (S). Rouille brune du seigle (F).

فطر مجهرى يتطفل على التيلم فيؤذيه . مظهره الخارجي
يبدو قرصية ميمرة بدون انتظام تركب النصل على
صفحيه وتصيب الالحاد والوق وسيفقات السنايل .
يتلو مستدرة صغيرة لونها الى الصبغة ثم تكبر وتفتش
فينصرف لونها الى الجلوة وتفسر من يوغ هبابي لونه
الى الجلوة السراء || يكاثف كثيره من السمام .

Pucciniae (S).

١٣٣٠٠ - سُحَامِيَّاتٌ ٥

Pucciniae (F). Pucciniae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة السحليات تتميز بظلالها
الانزاسية التركيب والانتظام || دعاماتها فردية أو
عديدة الانزاسية . بويضاتها فردية أو شفعية الانقسام عمولة
على احيات (زكاثر) شاذة فردية أو ملوطة جامدة
وسرعة السط . خديتها خاضعة لجميع الامينات كيشا
كانت || اجناسها عديدة . اشهرها زوايا واقتصاديا
الثانية التالية : السمام ، القشول ، الصدنية ، الصنعة ،
الضبعة ، الظفرة ، الكشولة والمسيلية .

١٣٣٠١ - مَسْحَبٌ الْمُوَافَقَةِ (F).

Right of consent (E).

عمل يميزه القانون يقضي بالماله الموافقة المتفق عليها .

١٣٣٠٢ - مَسْحَبِيلٌ لَمِزِيٌّ ٥

Endomychus coccineus (S). Coccinella écarlate (F).

Endomychus coccineus (E).

حشرة دامت من فصيلة السحليات ورتبة مدميات الاجنحة .
قالت القبايات والاسراج . حنافسها ويرقاتها تموش على
الفطور وامشاجها وعلى المواد النباتية المنطحة || جسمها
صغير القد وطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الحمرة
القرنزية يملؤها في وسط كوشها بقع سوداء ويملونها في
ظهورها اربع بقع سوداء ، يشجان في كل شد . رأسها
معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلتان
صفا الاطراف . ظهرها ضيق الخضر المستدير اللاتس
قدها محززان ، كفيها الخسل . اراسها ثلاثة المقل ||
جا لها واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلادة في اوائل
ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتستن
في الليل || البرقة عنه يملؤها الكيال الجسوري تطول نحو
٨ م . جسمها سكي التركيب ، قليل التقويس ، سداسي
الرواسب ، اسر القين ، جزوي الرأس ، كيف الزنب ،
مبهر الخبل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة
اسابيع يقضي تحت قشور الاشجار المائلة ضمن صلبة
متساكة الفشاء المركب من مواد نباتية معوجة بالرياح .

١٣٣٠٣ - مَسْحَبِيلِيَّاتٌ ٥

Endomychidae (S).

Endomychidae (F). Endomychidae (E).

فصيلة حشرات دامت من رتبة مدميات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المبرومة قليلة العدد مدها البلاد المعتدلة الحرارة .
تألف الموطن المسوية الرطوية حيث تتكاثر الفطور التي
تموش عليها || جميعها صغيرة القد واهليجية الشكل
تحتل المركز الوسطي بين القرنيات والدمسقيات . رؤوسها
مستدرة . زباناها معتدلة الطول ، صفة الاطراف ،



سحام مشات



سحليل غرمي



مسح



مسحلب



سحلية

حينما صغرتان تلصقها احيان شفاقة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني الاخير الثلاث . عنقها متوسطة الطول والشحانة . جلدها متناح التنايل الدقيقة . ذنبها سريع الطرب والانقسام . قريبا الى الصهبة الجوزية المنسقة يملوا موج الحمل اغبر ينسجم مع الحيطان واخفاية التي تكثر من المكوث عليا || يباتها الششري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا . تحسر قشلاها يند غروبها من يباتها ياسبورع وتساقد يند ذلك ياسبورع || الاثني تبين من ٦ الى ١٢ شلفة تطورها في الربل او في المواتسح الاجنزية المعرض النافذة || تسرح في التهار وتلتاق السطوح السموية . قتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والحوم || تستبر من الزحافات النافذة .

١٣٣١٩ - سحلية عصفراء * ، سحلية عصفراء ،

عقلاية عصفراء (S). Lacerta viridis (S).
Lézard vert (F). Green lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المحتلة الحارة || جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عراي الثورن . حينما لوزيتان تلصقها احيان شفاقة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني الثني الثلاث . عنقها متوسطة الطول والشحانة . اسامها دقيقة مجهزة بالظاير حادة . جلدها متناح التنايل الدقيقة . ذنبها سريع الطرب . قريبا اخضر اللون ، اسف المروج ، تملو قبة عمارة زينة تنتهي عند قاعدة الذنب . الذكر يتبين بزماء اللون ويلزق الترس || يباتها الششري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا . والاثني تبين من ٨ الى ١٦ شلفة تطورها في الاجنزة والديبال || تأثن المروج والاماكن الرطبة . تسرح في التهار الاثني برفقة الذكر وتبين منه في حمر واحد || قتها الحشرات والديدان والباب والحوم . تستبر من الزحافات النافذة .



سحلية الحيطان



سحلية عصفراء

١٣٣٢٠ - سحلية رشيقة * ، سحلية رشيقة ،

عقلاية رشيقة (S). Lacerta agilis (S).
Lézard agile, Lézard des souches (F). Agile lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المحتلة الحارة . الاثني اكبر قدما من الذكر . جسمها يطول من ١٨ الى ٢١ سم . رأسها عراي الثورن . حينما صغرتان ملصقتان يابها شفاقة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني . عنقها متوسطة الطول والشحانة . جلدها متناح التنايل الدقيقة . ذنبها سريع الطرب والانقسام || قريبا الى الصهبة السمراء المنسقة بالاسود والابيض . يباتها الششري يستمر نحو اربعة اشهر . الاثني تقع من ٦ الى ١٢ شلفة تطورها في الديبال . تأثن العمران والوبر عل السواء . تسرح في التهار . حبرها حيث تركب في الليل تفق سطيل تقفده تحت جلوح الانهار المنسقة على التربة || قتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والحوم || تستبر من الزحافات النافذة الملية .



سحلية رشيقة

١٣٣٢١ - سحلية وكود * ، سحلية وكود ،

عقلاية وكود (S). Lacerta vivipara (S).
Lézard vivipare (F). Viviparous lizard (E).

حيوان سريو من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المحتلة الحارة || جسمها يطول من ١٥ الى ١٨ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عراي الثورن . حينما



سحلية وكود

Orchis de Gallée	سحلب جليلي
Orchis melle	سحلب ذكر
Orchis à larges feuilles	سحلب عريض الورق
Orchis papilionacée	سحلب فراشي
Orchis des marais	سحلب معني

١٣٣١٢ - سحليات ، سحليات

Orchidaceae (S). Orchidacées, Orchidées (F).
Orchidacées (E).

فضيلة نباتية من وحيدات الفلقة . منتبها الاقاليم الحارة . انواعها المعروفة نحو ٢٥٠٠٠ تضم الى ٩٥٠ جنسا تنجمها خمسة اسباط : البايوبيات والجوزيات والحاجبيات والسحاب والونيليات || جميعها ثنائية السائل ، قرصية السوق ، مستطيلة الارزاق الكاملة . ازهارها متباين الاشكال . ازهارها جميلة الالوان الفزائية ، بعضها صلي العرف الفواح وبعضها حديد لا عرف له او كرية الزجاجة .

١٣٣١٤ - سحليات * ، سحليات * ، سحليات * ،

Acares (S). Acares, Homme pandu (F).

جنس نباتات مصفولة من فصيلة السطيات . انواعها المعروفة ٧ اصنافا تمتد من الهند الشرقية الى اوروبا الوسطى والاجنوية || اولها خلية ، مياضية ، صمكة النصال ، جميلة الخضار . شراعه الزهري قرصي الانتساب . ازهارها سلبية التجميع ، مثلية || سطها يرطب في الارربة الرملية ويحبها يجرود في الجصية || يستخرج من سطها السحلب .

١٣٣١٥ - سحلية ، سحلية

Lepereau (F).

Young rabbit (E).

هي كل اذن صغير اقلع من الحرق وقار له .

١٣٣١٦ - سحليات

Cheastodontidae (S). Cheastodontidae (E).

فضيلة اسماك من المنظمات الاشكالت الزمانف موطنها بحار المناطق الحارة الاستوائية . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد اجسامها مغطاة بفضية او مستندرة الشكل . الارباب متراكبة الالوان المزخرفة ، الفزائية الجميلة || اشهر اجناسها :

Chelmo	التشع
Pomacanthus	البحر
Hemichromis	الذنفوب
Ploxax	الرباني ، الرباني
Cheastodon	السحل
Zanclus	الشوش
Holocentrus	الطويل ، الكنف

١٣٣١٧ - سحلية ، سحلية ، سحلية

هي البطاية ، اطبا .

١٣٣١٨ - سحلية الحيطان * ، سحلية الحيطان ،

عقلاية الحيطان (S). Lacerta muralis (S).

Lézard des murailles (F). Wall lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المحتلة الحارة || جسمها يطول من ١٩ الى ٢٢ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عراي الثورن .

Mellerax musicus (S). **السحون الغريد ***
Mellerax chanteur, Autour chanteur (F).
Mellerax polygonus (S). **السحون المسنح**
Mellerax rayé (F).

وهما من الجوارح الثلاثة لانهما يقضيان على جميع انواع الاناعي والمظاظ والوزغ والخشرات .

Cryptostictis **١٣٣٢٨ - سَحْبَة ***
 جنس فطور مجهرية من فصيلة البصليات . يتميز ببكتياته البيضاء المجهرية في قطبها بأهداب مسنطة . انوامه قليلة العدد والاذى كرب بعض النباتات الحرجية .

١٣٣٢٩ - سَحْبَة مَقْمُومَة *
Bembidion ustulatum (S). **Bembidion brulé (F).**

حشرة قاضية ناعمة من عذبات الاجنحة وفصيلة الرشيديات . موطنها يمتد من الشرق الاطلس الى اوروبا . تألف المواقع الرطبة اعصها غشاف مجاري الماء ، حيث تكثر الديدان والخشرات الصغيرة || جسمها يطول من ٥ الى ٦ سم . راسها وكولها الى الخضار الالوس . يهدأ الى السيرة الكسئية الخضراء المروج . فكاهها ضلجان . ذبائهاا دقيقة . جتاهها صغيرتان ناشزتان . ظهورهاا قليل الاسدياب ، مستدير الطرف اللاحف ، ثنائي التبرزيز القدي القاطب . اراسهاا خاسية البقل || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجلائدة في الربيع وتبقى حتى الخريف . تسرح في النهار || البرقة عند تمام الادراك تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الجرم ، قائم السرة . راسها وفرجها ودراجها الى السواد القصبي || طورا الاكمال يستمر نحو ٥٠ يوما ويقتضي ضمن غلاف وايم في لفق قليل الاتحاد تحلده البرقة في الجلائدة او في النبال .

١٣٣٣٠ - سَحْبَة *
Leptoconchus (S). **Leptoconque (F).**

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عذبات الاريل وفصيلة الرخويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جدار البلاد الحارة من العالم القديم ، اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداهاها صغيرة رقيقة ملونة جرابية الشكل فسيحة الجيوب دقيقة الاعقاب الطائية . تعيش لاصقة بمذائع الرجزان او بصخور الحشاف المعصورة .

١٣٣٣١ - سَحْبَاتِيَّة *
Septobasidiaceae (S). **Septobasidiacées (F).** **Septobasidiaceae (S).**
 فصيلة فطور مجهرية من رتبة التعاميات وسيدة الجنس . عذبة الانواع . ظهورهاا تتشكل بالاشتراك مع القرزليات التي تسير عليها على عدة نباتات منها الحشفيات والاجناس والفتاح والسليان ... || كان مهذا امريكة افريقية وانه قد انتشرت الآن في معظم اقطار العالم .

١٣٣٣٢ - سَحْبَة *
Huile de radis (F). **Radish oil (E).**
 مادة زيتية طيبة تستخرج بالعصر من بذور الفجل . متلفها وفوائدها عذبة تستعمل في علاج الحفر والامراض المعوية وصعوات المرارة .

١٣٣٣٣ - سَحِيل *
Phelloderme (F). **Phelloderm (E).**

نسج نباتي قليل السلق يفصل الطبقة اللغنية من الخشب .

لوزيتان صغيرتان تلتفها ايجان شفاة متحركة . اذناها غشافتا الغشاء الصلياني الاخير الغلاف . متفها قصيرة مسنطة . جلدها متنايع التماثيل الدقيقة . ذنبها مستقيم الطرف سريع المسب || ثوبا متراكب الالوان ، اسفح الموج ، يكثر فيه الاخضر والجوزي والجوزي والخضفي وتلمو خطوط من النقط متضاربة الالوان من الابيض الى الاسمر والاسود || يباهاا اللغوي يستمر نحو اربعة اشهر . والاثني تقسم من ٦ الى ١٢ بحليلة طول الواحدة منها لا يتجاوز ٢٥ م . || تألف المروج والحدائق وضفاف الانهار ومجاري الماء ويبيت السكن الرطبة . تسرح في النهار || قوتها الخشرات الصغيرة والديدان والذباب والحولم || تعتبر من الزواجات الناعمة .

١٣٣٣٤ - سَحَابَة *
Sorosporium
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الراخويات . طياهاها رسيمة الخلية تجمعها حواشد لائساية الجسم تنفكك منه بلوشها من بويذات فردية || انواعها قليلة اشهرها سماه الدخن وسماه الترفليات .

١٣٣٣٥ - سَحَابَة الدخن *
Sorosporium panic-millicae, Sphaelotheca panic-millicae, Uesiago panic-millicae (S).
 فطر مجهرى يركب مبيض ذرة الدخن فيسحق الى بيرة يورغ فضيرات . وقد يصعب كامل الاضرار فيسحق على مثاقيلها كاتها اعداب فم تملوها التكايل وتلفها الارواق اللدابة || يكتفى غالبا ذلك بتعطيل البذر اما بمحلول الفرمول المركز ٠,٥ ٪ او بمحلول سلفات النحاس المركز ٥,٥ ٪ .

١٣٣٣٦ - سَحَابَة الترفليات *
Sorosporium saponariae (S).

فطر مجهرى يصعب بعض الترفليات يركب . قرص الزرة عند انتفاخ البيلات حيث يكون حقلته البورية الخنطية الابن الى ان تبلغ كامل دورها الحياتي فتفلق من غيرات خنطية السرة ودية الموج || يكتفى بقطر وسحق الاضرار الموصية .

١٣٣٣٥ - سَحْبَة *
 وكلاء يشبه السحيرة ابيض ينبت في البراق والاكمام ، ولست بمشبه ولا تجر وي اقرب الى الحفرية والصليان . وقال ابو حنبله السمس ينبت تحت الصليان والكتكث الا انه يطول فقيها في السماء ، وربما كان طول السحبة طول الزيل واغصم (السان) .

١٣٣٣٩ - سَحْبَة * **شيكار**
Schéma (F). **Diagram, Drafte (E).**
 غنط تخطيطي يوضح نسبة ابعادات الدالة ومختلف علاقاتها في الموضع المقصود .

١٣٣٣٧ - سَحُون *
Melbeaux
 جنس طير من البراة وفصيلة السقريات . حديد الذعن ، قوي الشكبة ، ربح الجفة طوله نحو ٥٥ سم . بسطه تراوح من ١١٨ الى ١٢٢ سم . موطنه افريقية الشرقية والبيضا . يألف مجازي المياه . قوته الاناعي والخشرات . يأن في الاجهار الرطبة اناها تحفن في رفات نحو ٤ اسابيع || له نومان فقط :



سماه الدخن



سحون غريد



سحيرة شعرة



سحبة

13344 - سحابة (F). *Estor fontalis* (F). *Fontal water* (E). سحابة ماء أصفر غليظ يخرج من المشية عند الوحم .

13345 - سحابة هو السلف ، أظله .

13346 - سحابة (F). *Agneau et Agnelle* (F). *Lamb and Ewe lamb* (E). ولد للفنان أو لغير ذكر كان أو أنثى ج تلح وتخال وتولن .

13347 - سحابة (F). *Berrage* سحابة حايض يقام في يومه الشهر إما لتخفيف مرارة الخلق والماء ولما تلحقه ويمكن تصريفها عند الطلب أو الاستعانة من طاقته الولادة .

13348 - سحابة هي الحلة الكبيرة ، أظله .

13349 - سحابة (F). *Diplontemona* (F). تست تفرغ ويطلق كل كرة عدة أمهيتها غشت عند البيلات أو القناعات .

13350 - سحابة سحابة (F). *Cabrio gigas* (F). *Cabrio gigas* (F). سحابة حشرة غاشية من فصيلة السحابتات وربة سفحات الانجسة . تألف الاسراج والحدائق . غشاشة غاشية قوتها ما تقضم من اوراق النبات . يرقاتها غاشية تعيش على جلوس الاشجار وسطحها || الذكر بطول من ٢٠ الى ٢٤ م . ثوبه ثنائي اللون كسني الرأس والكعيل ، الخشن البطن والجراميز . رأسه كبير الجرم . عيناه كبيرتان . زبانه دقيقان . ظهره مستطيل الشكل ، مستدير الطرف اللامع . بطنه فاخر المرك الخشن القرون || الانثى بطول من ٢٤ الى ٢٨ م . جسمها دار عادم الجناح غشاشة جندحتان متفلتان . زباناتها قصيران مستطيلان . بطنها اعطليجي الشكل ، مستطير الجرم ينهي بمرق مدب الطرف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتعيش حتى اواسط تشرين الاول . قمرح في الليل وبيوت في النهار || ليربة مدونة الشكل بطول عند ادراكها تمام من ٣٢ الى ٤٠ م . وهي مداسة القرواج ، صفراء اللون ، فراء الملقح ، كسنية الرأس .

13351 - سحابة (F). *Pincho* (F). *Lath, Slat, Strip of wood* (E). لوح صتير من الخشب القريق .

13352 - سحابة (F). *Cabronitidae* (F). *Cabronitidae* (F). فصيلة حشرات غاشية من ربة غشيات الجناح || اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق المعتدلة الحارة . تألف الاسراج والحدائق والجناح . يرقاتها غاشية تعيش على جلوس الاشجار || اجسامها متوسطة لفته تتميز بالاختلاف الاصاعي بين الذكور والاناث . ذكورها مجنحة ، مستطيلة الاعمار والزباني المشاوية للكتين . الانثى ملو ، مامدة الجناح ، قصيرة الاعمار المنطقلة ، صغيرة الزباني السمكية المنطقلة . جراميزها نسيطة . اصنافها غاشية القمل || اشهر اجناسها السحابة .

13353 - سحابة (F). *Examina* (F). *Stamen* (E). العضو الذكري في الزهرة . وهي مركبة من حامل يسمى

13334 - سحابة (S). *Melanopsis* (S). *Melanopsis* (F). *Melanopsis* (F). جنس حيوانات مائة من الرضويات سفحات الارض وفصيلة السديقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة . تعيش في المياه العذبة || امدها شبه اعطليجية الشكل ، سوداء اللون ، يربية الاطبا ، مغرقة الفجوات المسطحة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقنونة ثنائية الجراس القروية المسطحة المعينة .

13335 - سحابة بقلة . ج حماء (السان) .

13336 - سحابة (F). *Terre franche* (F). *Thorough soil* (F). السخاخ والسخاخ والسخاخ . الارض البنية الحرة ، تصلح لحظ الزراعات .

13337 - سحابة ، أبو سحابة (F). *Gryllomorpha dalmatina* (S). *Gryllomorpha* (F). حشرة دجوبة عديمة الجناح من فصيلة الجندبتات . ذكورها اصفر قدام انتاهما بطول من ١٢ الى ١٤ م . والانتى بطول من ١٧ الى ١٩ م . ثوبها الى الصفار الخشن بطول ريشة سراد . ارجلها سداسية . زباناتها عجيبة ، مستطعة ، فاقتة الطول . مركها كالير محاط بقومين ضفوفين || تعيش في الاماكن القليلة المظلمة وفي الحافز والظلم . سرسها دجوبي يتد من الدفش الى الفجر . قوتها جميع المواد الغذائية باستثناء الحوم وله تفضل المواد النباتية على غيرها .

13338 - سحابة (F). *Symphodial, Sympodique* (F). *Symphodial* (E). ما كان السخند من ميزاته الجسورية او العاداة . كقولك انتاش ضادي او نحو ضادي كما هي الحال في بعض القصور العنانية .

13339 - سحابة (F). *Piumula* (F). *Piumula* (E). السخام الفريش الذين تمت اجنحة الطير .

13340 - سحابة (F). *Sphaeritaceae* (S). *Sphaeritaceae* (E). مارة طور مجهرية من فصيلة السطويات وربة الزقيات اجناسها وانواعها المؤدية عديدة || تتميز باصنافها الصلبة العادية الالوان التي تطلق من سمام مستمرة . اما ارتكاز اصنافها فقد يكون فرديا او نسبيا تجمع ربة واحدة || احرف اجناسها التي تهتم الاقتصاد الزراعي . الدامق ، الدافعة ، الروزائية ، القصصان ، السوط ، البتردية ، الكدوة ، المصاع ، الشبح ، والتعليق .

13341 - سحابة هو الانذر ، أظله .

13342 - سحابة هو ما يخرج من بطون ذوات الحفر او ذوات الخلف قبل ان تأكل .

13343 - سحابة ، جملوك (F). *Bithed* (F). *Bithed* (E). التصاق عضون نباتان ببعضهما بعض كورقين او صولجين .



سحابة



سحابة



سحابة



سحابة

سرسها جوي. تدو عل الارض بشفة وتلتاق الاجمار
برفاة || تدن اشائها اما في تجاوياف الاجمار القريبة
من سطح الارض او بين الاصناف الشائكة للترابة ||
اشهر اجناسها السلاف والبزبور .

Stratigraphia (F). **سدائك** *
Stratigraphy (E).

جزء من الحفلة يبحث في الصخور المتسدة .

Stratigraphique (F). **سدائي** *
Stratigraphic (E).
ما له علاقة بالسداكة كفتك درس التربة السدائي .

Bécote, Bétolr. **سدكم** *
Bécoute (F). Swallet, Sink-hole (E).
السدام حاجز صني يتدفق جري الماء .

Syma (S). **سدك** *
Symé, Halcron-acie (F). Syma (E).
جنس طير من الاجرام واعانت الخناير وفضيلة القرائيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها استراليا وجزر الزانج .
تألف المنافع ونسفات الانهر واخوارها . قوتها الاسماك
الصغيرة والبلابل والقشريات || اجسامها رمية صغرة .
ستاليفها كبيرة مسنة الافلاك مما جعلها تتسكن من الاسماك
بسهولة . اثوابها الى الربة يطولها مواج ازرق اخضر في
الراس والرداء والجنابين والذنب . صدورها الى الربة
الصناعة .

Aculte (F). Recalpt (E). **سد** *
راجع اسوتي .

١٣٣٧ **سيدر** * ، نبق المسح ، شجرة النبق
Rhamnus spina Christi, Zizyphus spina Christi (S).
Nabka, Nabquah, Epine du Christ, Juljabier d'Orient (F).
Christ's thorn, Nabk tree (E). Christdorn,
Christdornbrustbeere (D). Spina di Cristo, Giugliolo di Palestina (I).

شجرة برية شائكة من فصيلة النبقيات . مهدا فلسطين
يقال ان اكليل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح
كان منها . لشوكها شقية ، مخروطية ، قوية ، جامدة ،
ذرية لنها الى الناني . حشبا شدة الصلاة شائع
الاستعمال الحربي || يستعمل في السياجات الحية فيفرس
على ابعاد تراوح من متر الى مترين .

١٣٣٨ **سيدر البتر** هو الفساح ، اطلبه .

١٣٣٩ **سيدر** * ، نوكه ، شربين عطر ،
شربين الاكار

Cedrea odorata, Toona odorata (S). Cédrel odorant,
Toons odorant, Acajou femelle, Faux-acajou (F).
West Indian cedar, False cedar (E). Bastard
cedar, Barbadoecedar (D). Cedro acajou, Cedrella
odorosa (I).

توه هو الاسم المندى . شجرة حرجية وتربيتية من فصيلة
الايزونديات. تنمو من ١٥ الى ٢٥ م. اوراقها مركبة.
وريقاتها وتربة براوح حدحا من ١١ الى ٢٣ . نصلها
مالس البشرة . سنن الحافة لونه الى الخضار الباهت .
ايزرارها طلي التجميع . ايزرارها غشوية ، جلجلة

الجلجل ينهي طرفه العلوي بجزء مستطع يعرف بالثير
او الشك ، يتكون حادة من فصين مستطيلين يفرزان
ويحضنان جذوات القلق . ج اسنة .

Scaminal **سدائي** *
تمت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالاسدية .

١٣٤٥ **سداد** هو التفتب ، راجعه .

Bouchon (F). Cork (E). **سدادة** ، فلتنة
هي السهام التي يسه به ثقب القارورة وما اشبه .

Sedifore **سداسي** *
ما كانت ايزارها سداسية التجميع .

Héxandre (F). **سداسي** *
Hexandrous (E). ما كانت اسبته سداسية التركيب .

Hexapode (F). **سداسية الأرجل** *
Hexapod, Hexapoda (E).
اسم شامل يطلق على جميع الحشرات السداسية الأرجل
للشواوية . انحصار فرشات حشرشيات الاجنحة .

Hexapécate (F). **سداسية التفرع** *
Hexapetalous (E). سفة الازهار المركبة من ست بتلات .

Hexactinellidae (F). **سداسية الشعور** *
Hexactinellides (E). رتبة من الاشبح السواني .

Fusidium **سدك** * ، فوزيديوم
جنس طور مجهرية من التوسيات وفضيلة الطحيمات .
انواعه قليلة العدد والاذى . بعضها رمية تركب خاء
الانسان الباهت .

Phytogénétique (F). **سدكة** *
Plant-breeding (E).

السداة علم يبحث في انتخاب وانتاج اجود البذار .

Stringope (S). Stringope, **سدال** *
Perroquet nocture, Kakapo (F). Kakapo (E).

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة السداليات . موطنه
زيلانة الجديدة . يألف الغابات والبراري الكثيرة المش .
ملجته الحلي زويي . سرجه جوي يستمر من القروب
الى الشجر . فيه آثار الالبانة والمسائل والنواهي واخشرات
واساريمها والفساد || جسده كبير القد . راسه قروب
لقبه برأس القنادة . ذنبه شبه مخروطي الشكل . منحل
الطلي . ثوبه الى الخضار المظفرة المائجات يطول تجميع
وتسبيج اصفر في الرداء والجناب والصدر والبطن ، وقلعة
شدية الصرة في الذنب .

Phréntis (F). **سدالة** * ، سدالة
Phrenitis (E). التهاب الحجاب .

Phrénique (F). Phrenic (E). **سدائي** *

Stringopidae (S). **سدائيات** *
Stringopidae (F). Stringopidae (E).

فصيلة طير من التسفات ينطاول الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلانة الجديدة
واسترالية || تتميز برووسها الشبية برووس القناد .



سداف



سدك



سدر

Cardia (F). Cardia (E). - ١٣٣٨٠ - صدك

السلك هي فتحة المريء مركزها بالقرب من القلب .

Stratifier (F). To stratify (E). - ١٣٣٨١ - صدك

سدك التبر . لقد بسفها فوق بعض نبي صدك .

Indination (F). Inclination (E). - ١٣٣٨٢ - صدك

السلك والجلبة والميل واحد .

Boute-en-train (F). - ١٣٣٨٣ - صدك

Stallion kept with mares (E).

الفصل الذي تعرض عليه الاثاث للاستئجار في ودقها فلذا ضمنت يوزي عليها من السجل للشتب .

Scydmaenus (S). - ١٣٣٨٤ - سيدفين

Scydmaena (F). Scydmaenus (E).

جنس حشرات من فصيلة السدينيات ورتبة غدييات الالجنة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اقطار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هياها ، طول نحو ٣ م . رؤوسها طليقة ، صغيرة ، شبه مكورة . حيزها بارزة . قاذيرها صغيرة . ملابسها الفكية مسطحة . قرونها الاستشعارية صولطانية ، مهدبة الفصل . كولسلها عمودية . اغمارها لائحة ، عادمة التضخيد . قوائمها نشطة ، مهدبة الاضداد والفنايب والاراسخ . اوتياها رسيمة الون ، تكثر فيها الجروية فالشفقة قاصصة || جميعها دامة تعيش في التيرب والجلطة والبردي التباي ونعت القشور والحاء .

Scydmaenidae (S). - ١٣٣٨٥ - سيدفيليات

Scydmaenidae (F). - ١٣٣٨٥ - سيدفيليات

فصيلة حشرات من غدييات الالجنة ، اجسامها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في مسطر اقطار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، طول من ٢ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مكورة . حيزها بارزة ، قاذيرها وفكوكها لانظامية ، ملابسها مسطحة . قرونها الاستشعارية صولطانية ، مركبة من ١١ فصلة . كولسلها لاقصامة الشكل ، تكثر فيها الاسطالة . اغمارها لائحة ، عادمة التضخيد . قوائمها نشطة . ابراسها خاسية العقل || جميعها دامة تعيش بين القشور والحطاب والبردي التباي وفي التيرب || اشهر اجسامها السدينوس والسديني

Indute (F). Indutium (E). - ١٣٣٨٦ - صدك

في عباتي يوسيد في اوراق السرخس يحضن الراكثم او اكياس البرخ . وهو ايضا انشاء الرقيق الذي يخلط البرد ويكن الحشرات .

Cydath (S). Cydath (F). - ١٣٣٨٧ - صدك

جنس حشرات صغيرة ومتوسطة القند من فصيلة القاصيات . اوتارها نحو ٦٠ مظهرها مركب الاالوان الباقية كالاسود والاسمر يعيش على الاضداد البرية يحضن نسلها . اشهر انواعها المؤنثة السدينوس والسديني

Cydath bicolor (S). - ١٣٣٨٨ - سيدكوس ابلق

Cydath bicolor (F). نوع من السدينوس صغير القند يضي بشكل مخطط الجسم طول نحو ٨ م . ويعرض قوه ابلق الون . رائحته كرجبة ركب القيثول والكرية فينض التلغ ويؤذي النبات .

الشكل ، متدلية ، يضاء الون ، حرقية الرائحة المتحمية . ثمارها يزور بقلعة مجنحة || عشها جبل الون يشبه الاكاسور ويشتمل اسماءه . رائحته رائحة تقرب من رائحة الارز .

Cádrón (F).

- ١٣٣٧٦ - سيدرون

شجرة تنحى سياها ، اطلبها .

- ١٣٣٧٧ - سيدريت التجليات

Sideritis lithargyr (S). Sideritis des graminées (F). Sideritis lithargyr (E).

حشرة ملونة من فصيلة السقيات ورتبة حرشليات الالجنة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها جارية قفها رقيق الاثمار . مرتبها توش على صف التجليات || جسمها متوسط القند بطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٢٧ م . رأسها صغير الحجم . منياها كيرتان . زباناها عيطان . مرتبها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الحظلي الاصفر الموالج || روشناها الاماميان الى الحظلي الصنابي الموالج تملو نقطة وعلى يضاء وتقرص حادري اسمر . روشناها الخلفيان الى الصغرة تملوها مشعة سمراء || لها جبل واحد في الحبل . تظهر البراشة في حزيران ويقي حتى آب . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع الكنك لسطح مسطحة على الصفحات السفلى من نصال الالراق || السرعة طول نحو ٤٠ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبا الى الصغار اللدس تملو سمكة خطوط قاطبة سمراء الون وتسعة خطوط متفرقة جزوية الون . رأسها اسمر . مدبا الى السمرة للقباء . وارجباها شديدة السمرة || طور الاكمال الذي يسمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تنفذ السرعة على عمق ٤ او ٥ م .

- ١٣٣٧٨ - سيدريت مكدوك

Sideritis vicellina (S). Sideritis vicellina (F). Sideritis vicellina (E).

حشرة من فصيلة السقيات ورتبة حرشليات الالجنة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها جارية قفها رقيق الاثمار . مرتبها تمس على متوسط القند بطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٣٧ م . رأسها معتدل الحجم . منياها كيرتان . زباناها عيطان . مرتبها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الحظلي الاصفر الموالج || روشناها الاماميان الى الصغرة تملوها مشعة صناعية وخطوط متفرقة سمراء الون وتقرص حادري اسمر . روشناها الخلفيان الى الصغرة تملوها مشعة سمراء . اغمارها الى البطلة النقصية || لها جبلان في الحبل . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وفراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتضع الكنك على الصفحات السفلى من نصال الالراق التي تلبس التربة || السرعة طول نحو ٤٠ م . جسمها ماس القشور . ثوبا الى الصغار الرقي الاصفر الموالج يملو سمكة خطوط قاطبة سوداء الون وتسعة خطوط متفرقة صفراء . رأسها الى السمرة الاربعونية . مدبا الى الركبة . وارجباها الى السمرة القاقية || طور الاكمال الذي يسمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تنفذ السرعة ضمن جلاب من التلغ .

- ١٣٣٧٩ - صدكسي Sexcuplex (F). To sexcuplex (E). - ١٣٣٧٩ - صدكسي

جمل الشبه ستة اشعاف .



سدريت التجليات



سدريت مؤنثة



سدمن



سدنوس ابلق

والبحيرات والمناقع || اصنافها متباينة الايكال والاحجام
يكثر فيها الشكل المردلي المتساوي الخالطة حتى القبط ||
اعرف اجناسها واشهرها السديفة والصحية .

١٣٣٩٩ - صدكيم ، رَهَج Stratus
نوع من النجوم وهو خطوط من السحب الشفافة الرقيقة
المستطيلة تملأ الاقن وتنتد عواذاته .

١٣٤٠٠ - صدكيم Nébuleuse (F). Nebula (E).
سديم سُدُم . متطورات شمالية تبدو كشدة نجوم عاتقة
الضوء المجهل عل هيئة صباية يضاء || اختلاف اشكالها
ومعالمها وماحياتها المقدرة دعى الى ترتيبها في عدة فئات .
اشهرها السديم الحلزونية ثم المنتشرة فالخسفية فالغازية فالقائمة .

١٣٤٠١ - صدكيم Archégonie (F).
Archegonium (E).
السدن قصبة تحضن البضو التناسلي الانثوي من الطعالم
والكبديات ومستورات الزهر الوعائية . وفي السدن تربية
البويضة القابلة للاخصاب .

١٣٤٠٢ - صدكيم Apotheca, Apothécis (F).
Apothecium, Shield of lichen (E).
هي ثقت الحزاز واشباهه من النبات . قسم وتضمن الجراثيم
التناسلية .

١٣٤٠٣ - صدكيم Ruta (F). Rue (E).
جس نباتات عشية رية طيبة معمرة من فصيلة السليديات.
اوراقه متعاقبة مركبة ازهاره صفراء مكنوكي
التجميع ، هامى الارتكاز . ازهاره غطوية رباعية
البتلات ، شمالية الاسدية || اشهر انواعه ما يلى .

١٣٤٠٤ - صدكيم البهر Ruta montana (S). Rue sauvage, R. de montagne (F).
Mountain rue, Wild rue (E). Bergrante (D). Ruta
montana, R. flocchiosa (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي طيبى بري يملو من ٤٠
الى ٨٠ سم. ساقه ليفية خالية اللحم . اوراقه ثلاثية
التشريح والتفريرض الضيق || ازهاره الى الصفرة .
منافع الطبية دون منافع السذاب الحزني واقل فاعلية .

١٣٤٠٥ - صدكيم الماعز Rue de chèvre (F).
Goat's-rue (E).
هو المكناكة الحزنية ، اطبا .

١٣٤٠٦ - صدكيم سوروي Ruta angustifolia (S). Rue d'Alep, R. à feuilles
étroites (F). Syrian rue, Aleppo rue (E). Aleppo
rue (S). Ruta frangula (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي بري طيبى يكثر في
بعض المناطق السورية . يملو من ٣٠ الى ٧٠ سم.
اوراقه جالسة سنائية . تشريحها ضيق التفريض، لانياسي
الشكل . ازهاره الى الصفرة . بتلاتها قارصة مشرشرة .
منافع الطبية تمتاز منافع سذاب البهر .

١٣٤٠٧ - صدكيم عَطِير Ruta suaveolens (S).
Rue parfumée (F).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي زراعى تربى معم
يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كاملة مستطيلة ملوكة
الطرف تطول نحو ٢ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهاره

١٣٣٨٩ - صدكيم مُدْهَب الرُكْبَانِي Cydnus flavicornis (S).

Cydnus à antennes dorées (F).
حشرة من المذفوس وفضيلة القبابيات . جسمها صغير
القد ، مفلطح ، شبه بيضى اللون ، يطول نحو ٤ سم .
تورها الى الجائرة يملوها مروج يراوح من الخفلى الى الاسود .
رأسها شبه مكنور ، اطرافها الداعلية مجهزة بطبق من الهلب
القصرى الشائك . خطها مستدل اللول . عينها صغيرتان
نازحتان . زيانها قديميا اللون . كويلها بيض الجانيين
مالس الوسط . يلبها كثير الهلب المنسطح . قشرها
شفاف . قوامها نطيفة . فتانيها الامامية موكلة الاطراف
الشائكة || مرتها اصحاب الشطوط . يكثر وجودها حل
الزل حيث تتنم بسرعة مدقة || راجعها كريمة .

١٣٣٩٠ - صدكيمات الجناح Mecoptera, Ptenoptera (S). Mécoptéroïdes, Pteno-
ptères (F). Mecopteroïdes, Ptenoptera (E).
طقة حشرات مجنحة تشمل اربع رتب وهي
الاجنسة بحرفشيات الاجنحة وذات الجناحين ومادات
الاجنسة .

١٣٣٩١ - صدكيم Nébuleuse (F). Patch of haze (E).
هو الدخن ظل الغيم وعلى حبه انة الشمس .

١٣٣٩٢ - صدكيم Rosée de la nuit (F).
Night dew (E).
السدى هو لى الليل . ويلى السدى ما كان في اول الليل
والسدى ما كان في آخره .

١٣٣٩٣ - صدكيم Datta varta (F). Sour datta (E).
السدى هو البلع الاخضر قبل ان يلو .

١٣٣٩٤ - صدكيم Plancha à dessin (F).
Drawing-board (E).
المغية لوح من الخشب ملجوم الاطراف مربع الشكل
او مستطيل .

١٣٣٩٥ - صدكيم Schedir
السدري نجم نير من كوكبة ذات الكوسى . يميرون عنه
في الجدل العام بالتيم ألفا من الكوكبة المذكورة .

١٣٣٩٦ - صدكيم Aréole (F). Aréole (E).
تؤلل قلمسوي الشكل ازغب البشرة او شائكة يكون
في حاد بعض النباتات اسمها الصبار .

١٣٣٩٧ - صدكيم Melanis (S).
Mélanis (F). Melanis (E).
جس حيوانات مائية من الرضويات منبات الاصيل
وفضيلة السديليات . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة
في جميع اصقاع العالم . تعيش في المياه العذبة الراكة
القليلة النور || اصنافها مدوية عذرة سوداء اللون .
اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقنونة ثنائية القواس المميونة .

١٣٣٩٨ - صدكيم Melanides (S).
Mélanides (F). Melanides (E).
فضيلة من الرضويات منبات الاصيل . اجناسها وانواعها
عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في الانهر



سديفة



سذاب البهر



سذاب سورى

١٣٤١٨ - مُرْبُوعِيَّة (F). Fougères, Filicales.

صنف من شعبة مستورات الزهر الباطنية. يشتمل السرخس والخنشار وكزبرة البئر وبطيرها || مركزها في سلم الرقي النباتي يأتي بين الخوازيق وباديات الزهر. وهي من ذوات الجذور الحقيقية || ضماؤها وأجناسها وأنواعها المعرضة لا تحصى لأنها كانت أكثر النباتات انتشاراً وبانيتها جميعاً. أما أجناسها المعاصرة فنحو ١٥٠ وأنواعها لا تقل عن ٦٠٠٠ || بها طبقات اللحم الجاهري سوى تفحم وتحمير ما تراكم وتكس من السرخس وبطيرها في الحقة الكربونية التي دامت أكثر من ٣٠٠ مليون سنة.

١٣٤١٩ - مُرْبُوعِيَّة

المراد والبراد من اللحم ما اضر به البشش فيس يسقط قبل ينه.

١٣٤٢٠ - مُرْبُوعِيَّة هو النظم، الملب.

١٣٤٢١ - مُرْبُوعِيَّة (F). Sénilité (F). Senility (E).

المراد الوهن الجسدي الذي يميل بالرجل منه الشيخوخة.

١٣٤٢٢ - مُرْبُوعِيَّة المُضْطَرِبَّة هي التشوية، الملب.

١٣٤٢٣ - مُرْبُوعِيَّة، هُدُوءِي Contagion, Infection

قابلية انتقال الأمراض الميكروبية من فرد مريض إلى آخر سليم.

١٣٤٢٤ - مُرْبُوعِيَّة Cave (F). Case, Caller (E).

محظير تحفظ فيه بعض المحاصيل الزراعية الصناعية أو غيرها كالخمر والجبن الخ.

١٣٤٢٥ - مُرْبُوعِيَّة Collecteur (F). Collector (E).

صريف كبير تكتفي إليه مياه المصارف فيسببها إلى الشجرة.

١٣٤٢٦ - مُرْبُوعِيَّة

Troupe, Troupenau, Banc de poissons (F). Troop.

Flock, Herd, Drove, Shoal of fish (E). اسم شامل يطلق على القطيع الكبير من الطير والحيوان والسماك.

١٣٤٢٧ - مُرْبُوعِيَّة، سُرْبِيَّة Rangée de vigne (F).

Range of vine-branch, Row of vine-branch (E). الصف من تصرب الكرمة.

١٣٤٢٨ - مُرْبُوعِيَّة Seraptes (E).

Sérapias (F). Serapites (E).

جنس نباتات برية ممررة من فصيلة السبليات. أنواعها الممرقة خمسة منها حوض البحر الأبيض المتوسط || بعضها شراعية منتصبة جيزة. أوراقها متعاقبة حاشية مستطيلة، متساكنة اتصال الضيقة. أزهارها هلي شبه متبلي التجميع. أبعادها كبيرة أرجوانية اللون أو جوية || جميع أنواعها تزيينية تزروع في المازن.

١٣٤٢٩ - مُرْبُوعِيَّة Stromateus (E).

Stromatée (F). Stromateus (E).

جنس اسماك بحرية من شالكيات الزمانات وفضيلة الاسقمريات. أسطفاها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

صفراء اللون، حطرية العرف الرنذي || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول.

١٣٤٠٨ - مُصَدَّبٌ مُخْزِنِي *، فِينَجِيْن قَتِين

Ruta graveolans, R. hortensis (S). Rue officinale, R. fédaie, R. des jardins (F). Common rue, Herb of grace (E). Rauter, Garten ruta (D). Ruta, Ruta dei giardini (I).

نبات عشبي طبي يري يطول من ٣٠ إلى ٨٠ سم. ساقه ليفية متصلبة. تصل أوراقه عميق التفريش. لونه إلى الأخضر الأزرق. أزهاره منتصبة اللون يتلونها مقبرة الشكل متجمعة الصفحة، مسنة الحالة || وهو نبات كزهره كزهره من اللحم، للزاع، حريف. يستخرج منه بالتقطير دهن طيار له منافع البالية. يستعمل منتقلاً للجلد ويدراً للطحس وينبها للعدة وخافضاً للحرارة ويضاداً للتشنج ولطارد البهتان.

١٣٤٠٩ - مُصَدَّبِيَّات Rutaceae (S).

Rutacées (F). Rutaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللبنتين، مستقلات القلمات، مرتدمات المبيض. أنواعها كثيرة العدد تبلغ ٧٠٠ أجناسها ٨٠. جميعها ٩ أسباط. جميعها من نباتات الاقاليم الحارة والمعتدلة. فيها الأشجار والشجيرات والاحشاش || أوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتضاربة منها المتناحية أزهارها خشوية. ثمارها برؤوس بسيطة أو جراء مدينة الاغنية.

١٣٤١٠ - مُرْبُوعِيَّة، مُرْبُوعِيَّة، مُرْبُوعِيَّة Frai (F). Spawn (E).

بيضة السمكة ولحمي صمتر. ج. سرء وسرء.

١٣٤١١ - مُرْبُوعِيَّة Frayer (F). To spawn (E).

سرء السمك؛ باض.

١٣٤١٢ - مُرْبُوعِيَّة

المراد: شجر تنخذ منه القسي الواحدة مرارة. (السان).

١٣٤١٣ - مُرْبُوعِيَّة هي الكورولة، الملب.

١٣٤١٤ - مُرْبُوعِيَّة المُضْطَرِبَّة هو السورجبان، الملب.

١٣٤١٥ - مُرْبُوعِيَّة المُضْطَرِبَّة هو الحرم، الملب.

١٣٤١٦ - مُرْبُوعِيَّة هي زئان الخيل، راجسه.

١٣٤١٧ - مُرْبُوعِيَّة *، سُرْبِيَّة شَالِك، قَصْب

ذَقْمِي، عَوَاقُ الْمَاءِ

Lysimachie vulgaris (S). Lysimachie commune, Chasse-bosse, Herbe aux cornilles (F). Common loosestrife, Yellow loosestrife (E). Goldfieberich, Gemeiner Weiderich (D). Lismachia vulgare, Mazza d'oro, Cosaria (I).

نوع من السرجع وهو نبات عشبي معمر يطول من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه متعاقبة ضيقة ثلاثية. نصلها سنان الشكل خلي البشرة. أزهاره عريضة التجميع. ترويض ذهبي اللون. نصلها حار اختار للهاب || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب. يرغب في الأتربة المتوسطة الانساج والرطوبة.



مُصَدَّبٌ مُخْزِنِي



سراجية

١٣٤٤٠ - سربوطة * Ceratode (F).

هو ديب الحوت، جنس اسماك كبيرة القد تعيش في المياه العميقة.

١٣٤٤١ - سربوطة * Ceratophorum

جنس طيور بحيرية من الرديانيات وفصيلة السحليات. يتميز بكتلاته المؤثرة للشعبة الانقسام الباقية اللون التي تحمل في اطرافها بعض السحليات المحلية القريبة الشبه بالزبان || انواعه قليلة العدد والاى تركب الاوراق دون ان تغطيا .

١٣٤٤٢ - سربوطة * Ceratosoma (S).

Cératosoma (F). Ceratosoma (E). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات معليات الاصيل وفصيلة الخياشيم وفصيلة اللوريسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصنافها بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها عريضة مستطيلة عديدة الظهور الثلاثية التحويات. رؤوسها ثنائية القياس، غياشها ضيقة التجميع تتركز على حلقات انبوبية قواعدا تلاصق قواعد التحويات للظهيرة الاخرى. ارجلها زوجية متدلة الطول ضيقة .

١٣٤٤٣ - سربوطة * Cerithinella (S).

Cérithinella (F). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات معليات الاصيل وفصيلة السربويات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من مستحزات الطليقة الجبورية والبيض الآخر منتشر في سطح بحار البلاد المعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصنافها صغيرة، ردينية الشكل، متشابهة الحلوثة حتى الانقلاب. فوئتها ضيقة، ارفقتها مستقيمة. رؤوسها صغير، لها مربع الشكل والخلف. لاستساها مستطيلتان.

١٣٤٤٤ - سربوطة * Ceratites (S).

Cératites (F). Ceratites (E). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات رؤسيات الاصيل وديانيات الخياشيم وفصيلة السربويات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعا من المستحزات. اصنافها تشتر في الخفية البرية الى التراسية || اصنافها اسطوانية الهيكل قرصية الشكل، كثيرة المحجرات والفلورج النافرة المتفرعة.

١٣٤٤٥ - سربوطة * Nucella (F).

Nucellus (E). السربية او النسيلة مجموعة النسخ الوثنية التي تتألف منها الكتلة المركزية في بؤفة النباتات بديات الزهر .

١٣٤٤٦ - سربوطينات * Ceratitidae (S).

Cératitidae (F). Ceratitidae (E). فصيلة حيوانات بحيرية من الرغويات رؤسيات الاصيل وديانيات الخياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعا من مستحزات اواخر الاباج الاول واولى الاباج الثاني || اعرف اجناسها السربيت .

١٣٤٤٧ - سربوطين * Séroline (F).

نوع من الخفايش الضيقة يدعى عشاف الليل ، اطلبه .

انواعها المعروفة خسة تتميز باجسامها المحلية الشكل، وزياداتها الظهيرة والكثيرة المتجلية المقعرة || رؤوسها صغيرة ، غلظتها قمعية مستديرة ، ملتحها بقعة تكاد تكون منقطعة || ألوانها مختلفة الالوان تكثر فيها الربعة القلبية المواج || اعرف انواعها واسمها سربوطة المتوسط .

١٣٤٤٨ - سربوطة المتوسط * Stromateus fiatola (S).

Stromateus fiatola (S). Stromateus fiatola, S. de la Méditerranée (F). Stromateus fiatola (E).

نوع من السربوطة . سمكة بحرية يبيض . اصلها البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ، مبط الجرم ، معني الشكل ، بطول نحو ٢٠ سم. ثوبا الى الربعة المرجانية الضيقة المواج تتبع عند الظهر وتكثر وتكثر عند البطن وبعدها تسليج ذهبي في الشطر الاصل من الجانبين || رأسها صغير القد . غلظتها شديد المقعر ، متناهي الطرف. زعانفها الظهيرة والكثيرة مستطيلة ، مقعرة ، متجلية الشكل . زعنفتها لليلية غائرة مستطيلة الجناح || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٤٤٩ - سربوطة * Stromateus fiatola (S).

في الاثران نبات من الخلدات ، اطلبه .

١٣٤٥٠ - سربوطة * Stromateus fiatola (S).

في الاثران الأرض في الاثران السري ، اطلبه .

١٣٤٥١ - سربوطة البحر * Stromateus fiatola (S).

في قصبة الماء ، اطلبه .

١٣٤٥٢ - سربوطة البحر * Stromateus fiatola (S).

في اثنان للسر ، اطلبه .

١٣٤٥٣ - سربوطة الفرس * Stromateus fiatola (S).

سرة الفرس نجم نير من كوكبة الفرس الاصل من مركز على السرة .

١٣٤٥٤ - سربوطة التجف * Stromateus fiatola (S).

في اذن جودا من الفلورج للأوكولة ، اطلبه .

١٣٤٥٥ - سربوطة * Stromateus fiatola (S).

Cyrtostoma (F). Cyrtostoma (E). جنس طير من الجوامث رقيات المتناثر وفصيلة المتفرجات . انواعها المعروفة سبعة ، اصنافها القارية الاسترالية وجزر ماليزيا || اجسامها ريمة . متناهدا مستطيلة ، غرزية الشكل ، قليلة التفويص . اذنانها صغيرة . ارجلها دقيقة، مستعدة الانقطاع . اذنانها الى الخصرة الزقية المواج ، بطونها الى الصفار الكبيرتي . اعناق ذكورها زبرجدية تحاصي المواج || قوتا الحوام وديق الاتزار .

١٣٤٥٦ - سربوطة * Carthipops (S).

Carthipops (F). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات معليات الاصيل وفصيلة السربويات. انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من مستحزات الطليقة الطباشيرية والبيض الآخر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اصنافها غروبية، متشابهة الحلوثة حتى الانقلاب . حلقاتها قليلة الثور ، ضيقة التضيق والتضيق المتفرق || اعرف انواعها السربوطة المدرة (C. tubercularis).



سربوطة المتوسط



سربوطة



سربوطة



سربوطة



سربوطة

* سَرْفُول بَرْي * ١٣٠١٧

Anthriscus sylvestris (S). Cerfeuil sauvage, Chérophylle (F). Wild chervil, Cow parsley (E). Wilder kälberkropf (D). Cerfoglio salvatico (I).

نبات عشبي بري محلي. منه المروج والمرابي الجبلية. جلده مستطيلة فائقة يقال إنها لا تخلو من بعض العناصر الجحالية الصارة بالحول.

* سَرْفُول بَكَلِي * ١٣٠١٣

Anthriscus cerefolium, Scandix cerefolium (S). Cerfeuil cultivé (F). Chervil (E). Kerbel, Kälberkropf (D). Cerfoglio coltivato (I).

بقلة زراعية حولية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها مأكولة مستعينة العلم، فواحة الحرف البطر || تجود في جميع الأتربة المحضلة الانساج.

* سَرْفُول عَطِر * ١٣٠١٤

Myrrhis odorata (S). Myrrhis, Cerfeuil musqué (F). Myrrh, Sweet fern, S. cleya (E). Spanische Süssholde (D). Mirride, Finocchiella odorata (I).

جلس نباتات شدية حجازية معمرة من فصيلة الشبقيات. أنوعها قليلة الممد منها البرية والزراعية. البرية صغيرة الجلود المستطعة. ساقها ترتفع نحو ٧٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة اللد، خلية النصل الثلاثي التقليل. رائحتها ذكية الحرف تشبه الآيسون || أما الزراعية فجلودها حجازية الشكل، غليظة اللحم. كانت ولا تزال من النباتات المفيدة الانتشار لأنها ترطب في المناطق البحرية الكثيرة الضباب.

* سَرْفُول لَفْشِي * ١٣٠١٥

Chaerophyllum bulbosum (S). Cerfeuil bulbeux, C. tubereux (F). Turnip rooted chervil, Parsnip chervil (E). Rubenkälberkropf (D). Cerfoglio bulboso (I).

نبات عشقولي بقلي محلي. جلده لفي الشكل كبير اللد. ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، خلية النصل ثنائية أو ثلاثية التقليل || جلده أبيض الحباب، سكري العلم، يحوي من المواد الغذائية ما قدره نحو :

٣,٥ ٪ مواد ازوتية

٥,٤ ٪ مواد دهنية

٢٧,٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وهو من النباتات التي ترطب في الأتربة الجواراة الحصى للفسيوة العناصر الغذائية.

* سَرْفُولَتِ اسود * ١٣٠١٦

راجع مستند اسود.

* سَرْفُولَتِ مَبْدُول * ١٣٠١٧

Salamandra terrestra (F).

هو المستند المبلول، اطلبه.

* سَرْفُولَتِات * ١٣٠١٨

Urodæles (F). Urodela (E). رتبة حيوانات من صف الضفدعيات. اجناسها وانوعها كثيرة الممد جميعها أربع فصائل || معظمها مائي وبعضها قاربي. تتميز بمراء جلودها وما تنقسمه من مواد اكاثة سامة || أشهر فصائلها المستندليات.

* سَرْفُولَة * ١٣٠١٩

Acarvule السرفولة هي البكنية التي لا يمكن تمييز جيلها عن القصة البرولية.

كارواق المتنباه. ازهارها ووليمية مستطيلة، المالحق، لونها ال الوردي يتصلها تشيح حاقن || شوح اوراقها وازهارها عند البرك، يقبه اليد || ازهارها يتشر طولك الصبغ والخريف.

* سَرْخَد * ١٣٥٠٢

هو سرفو البربر، اطلبه.

Sargus (S).

Sargus (F). Sargo, Sargus (E).

جلس اسماك بحرية من القرشيات الشائكات الزعانف. أنوعها عديدة جميعها يقبض الشكل مقلطة. رؤوسها غليظة وقصيرة. زمانها الثانية فائقة. سقمها حولي رقيق || ألوانها عديدة فيها القفي واللحي والمرجاني والاسمر الزيتوني || أشهر أنوعها الاربعة التالية : السرفوس المألوف والمستنير والسباس والحفارة.

* سَرْفُول حِدَادِي * ١٣٥٠٤

Sargus (F). هو السرفوس المستنير، اطلبه.

* سَرْفُول مَأْلُوف * ١٣٥٠٥

Sargus vulgaris (S). *Sargus commun* (F). Common Sargo (E).

نوع من السرفوس ينتمي الشكل، بقفي اللون، حاقن الظهر، يكثر في البحر المتوسط || يتغير من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

* سَرْفُول مَسْتَدِير * ١٣٥٠٦

Sargus rondeletii (S). *Sargus mouchon*, *Sargon* (F).

نوع من السرفوس مستدير الشكل، مستطيل الزعنفة الذنبية الفائقة. ثوبه اطمل اللون يملو موانج قضي وتوش ودي. ظهره احمر من جانبيه وبطنه. يكثر في البحر المتوسط || يتغير من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

* سَرْف * ١٣٥٠٧

Apathique (F). *Apathetic* (E). تمت ترميمي يملو على من كان عادم الشعور ويتغير بالكسل والتفرد.

* سَرْفَة * ١٣٥٠٨

Chenilla (F). Caterpillar (E). اسم ترميمي يملو على رقات القراشات منذ لقلها حتى دخولها في طور الحادة.

* سَرْفُوس مَسْتَدِير * ١٣٥٠٩

Syrphus corollae (S). *Syrphe angulirandé* (F).

حشرة نائمة من السرفديات. شكلها كالبابية. طولها نحو ٨ م. رأسها اصفر اللون. يملها جلد الاسود. تنح مكها على الاوراق التي يركها الارق فينتفخ من رقات دويدية، حلقية الشكل، فضاء اللون تلتقن الارق وتقتصره.

* سَرْفُوس مَوْكُور * ١٣٥١٠

Syrphus boissae (S). *Syrphe à ceinture* (F).

حشرة نائمة من السرفديات. شكلها كالبابية طولها نحو ٩ م. رأسها اصفر. يملها منظر ضبوط وزلاكن سيد || رقاتها مفترمة تقضي على الارق.

* سَرْفُول * ١٣٥١١

هو الاطريال، اطلبه.



سرفوس مألوف



سرفوس مستدير



سرفوس مجلد



سرفوس مزور



سرفول بري



سرفول بقلي



سرفول عطر



سرفول لفي

١٣٥٢٠ - سُرُون أبيض الذرقة *، سُرُون

Anisoplia leucaspis (S).
الزُرُوع *
Anisoplia arvicola (F). Pastoral chafer, Cereal chafer (E).

حشرة وأشة غاصلة مؤذية من فصيلة الجملليات ذرقية مندقات الاجنحة. موطنها يشمل معظم المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى الى اوروبا واوريقية الشالية. تألف المزارع والحقل. غنصاتها تعيش على اوراق النباتات المختلفة الانواع وعلى صفت الجملليات. يرقاتها تعيش على جذور الزروع والنباتات المروية || جسمها صغير اللد ، يطول من ٧ الى ١٠ م. لوها الى انفسار الامس تلوح في القمدين زركمة صفراء. رأسها صغير الحجم. يور معظمه تحت الكويل. عينها صغيرتان ، باردتان. زباناها مرتبعتان ، صمليتان. كويلها منحوب الشكل. جرابها معدة الطول ، ماسلة الانفاذ ، مسنة القناتيب. ارساخها خاسية المعلى ، مهدبة الحوافي || الاثني ابر في اللد من الذكر والمظ بنق واطول سرها واكد ثوبا || لها جبل واحد في الحقل. تظهر الحشرة في اوائل ايار وتبقى حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة بطيئة النمو لذلك الكمال الجسوري بعد التفت بنته اشهر. جسمها مقوس يطول نحو ٢٢ م. لوها الى الحقل. رأسها والحلقه الصدرية الاولي الى السرة || طور الكمال يستمر من ٤٠ الى ٥٠ يوما.

١٣٥٢١ - سُرُوب *، Carophytum (S).

Cérophyte (F). *Carophytum* (E).

جنس حشرات من فصيلة السُرغديات ذرقية غديات الاجنحة. انواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من المالحين القدم والجدي || اجسامها مسطوية الشكل ، هيأة ، تطول من ٥ الى ٩ م. رؤوسها مستدة الحجم والشو. حشرها صغيرة ، باردة. تأثيرها وبلاسها نظامية. قرونها الاستشعارية مسطحة عند الذكور، مشاربة عند الاناث. كويلها منحوبة مقنونة للقدم والمخسر. الحماة لاحقة ، تحيلة التنديد القناتيب ، قوائمها نشيطة. اثوابها ملونة || تألف لنباتات التي تكثر فيها الاجحار الورقية كالصنوف والجور والسندباد ، لانها تعيش مع يرقاتها في الجروع النخرة.

١٣٥٢٢ - سُرُوبيات *، Carophytidae (S).

Cérophytidae (F). *Carophytidae* (E).

فصيلة حشرات من شهبات الاجنحة. اجسامها وانواعها الممرقة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة والحارة || اجسامها صغيرة اللد ، مسطوية الشكل، معدلة البسيط ، تطول من ٥ الى ٩ م. رؤوسها مستدة الحجم. حشرها صغيرة ، باردة. تأثيرها وبلاسها نظامية. قرونها الاستشعارية مسطحة عند الذكور ، مشاربة عند الاناث. مركبة من ١١ فصلة. كويلها شبه مكورة. الحماة لاحقة ، تتميز باستقامة مداور القوائم الراسي والحلقية. ارساخها خاسية المعلى. اثوابها ملونة || تألف للنباتات التي تكثر فيها الاجحار الورقية حيث تعيش في جلوسها النخرة || اشهر اجناسها السُرُوب.

١٣٥٢٣ - سُرُوب عظيم *، Rhingia rostrata (S).

Rhingia à grand rostre (F).

حشرة من ذوات الاجنح وفصيلة السُرغديات. جسمها متوسط اللد ، يطول من ٩ الى ١١ م. رأسها كبير الحجم،

شبه يرمي الشكل ، اسفر اللون. غطها غروطي. مكها شديد النطق. عينها كبيرتان عريضتان. زباناها دقيقتان صغيرتان. صدرها الى القرقة المسددة. يطها كالباطية ، اسفر اللون. صتاها اللوح. قوائمها الى الصفرة الصتائية. رؤشهاها غطها المسددة || تظهر الحشرة الجملطة من ايار الى تشرين الاول. مسرحها البراري والقبائط. قوتها رقيق الانفسار || الاثني اكبر قدام من الذكر تمتع مكها في برز الحويان يفتت من يرقات نائلة تعيش على البراز حتى الكمال.

١٣٥٢٤ - سُرُوب البصل *، Eumerus strigatus (S).

Mouche des oignons, *Eumerus décharné* (F). *Lesser bulb fly* (E). *Kleine Zwiebelmückenfliege*, *Zwischelalmückenfliege* (D).

حشرة صغيرة من السُرغديات طولها من ٧ الى ٨ م. لوها الى انفسار الاسمر طولها ثلاثة وراكس مسر || تظهر في ايار ثم تمتع مكها على اوراق البصل والقرق والبطاطا يفتت من يرقات تقرض الاقراص الجملية والنباتات.

١٣٥٢٥ - سُرُوب الدُرُج *، Merodon aeneus (S).

Merodon aeneus, *M. clavipes* (S). *Merodon*, *Mouche des narcisses* (F).

حشرة من السُرغديات طولها من ١٥ الى ١٧ م. اجتم من النحلة ، زباه الجسم ، لوها الى السرة || تظهر في ايار. تمتع مكها على اوراق الدُرُج وبشر القناتيب يفتت من يرقات تنجب ثوبا نحو القرس البصيل فتقرض ولا تتركه الا عند آخر السلاخ قبل ان تتصلب الى ملداه كزود.

١٣٥٢٦ - سُرُوب العنبر *، Orthoneura elegans (S).

Orthoneura élégante (F).

حشرة ناعمة من فصيلة السُرغديات. اجسامها كثيف الجسم ، صغير اللد ، يطول من ٧ الى ٩ م. رأسها منحوب المس انفسار. غطها وكها صغيران. صدرها الى ارجوانيتان. زباناها دقيقتان ، صغيرتان. صدرها الى الحماة الملح. يطها شديدة السرة ، احضر الحماة قوائمها الى السرة السوداء. رؤشهاها قناتيبا انفسار || تظهر الحشرة الجملطة في الصيف. ممرها البراري والحقل والزرود. الاثني اكبر قدام من الذكر ، تمتع مكها على سوق النباتات التي يركبها الارق يفتت من يرقات شديدة الصغر كسي وراه الارق فتقرض.

١٣٥٢٧ - سُرُوبيات *، Syrphidae (S).

Syrphidae (F). *Syrphidae*, *Mower flies*, *Flower flies* (E). *Schwefelfliegen*, *Schwärzfliegen* (D).

فصيلة حشرات من ذوات الاجنح اجناسها وانواعها معدلة لا تقل عن ٧٠٠٠ جنسها صغيرة اللد خضة. طولها يراوح من ٣ الى ٢٠ م. رؤوسها بفسضة صغورها. قرونها الاستشعارية ثلاثية القناتيب. الاثنا زاجية مستدة. نمط اجسامها يعيش على شجر الانذار، وفيها الحماة والنباتات || مكها دقيق الجسم لاقامي الشكل والوضع والجنس. قد تمتع على اوراق النبات او تقتل به في الماء الزاكن الاخرى من رزة في الارق وفي بعض التطور || يرقاتها خضة ، صغيرة ، شكلها شكل البصل لوها الى السرة وفيها الاخرى والاسفر والحقل. يبي والنجمة او هواكة او نائلة. مظهرها ارضي وبشرها عالي والارضية منها تلم الاوراق التي تركبها وتقرض الاقراص الجملية والنباتات.



سُرُون أبيض الذرقة



سُرُوب



سُرُوب انصم



سُرُوب البصل



سُرُوب الدُرُج

١٣٥٢٨ - سرق

Fibrans (F).
Scaple fibre (E).

نسيج اصطناعي أكثر لاذقة من الود، سله قصير
الكيلة يجمع بالقتل .

١٣٥٢٩ - سرق

Acroclinium (S). Acroclinie (F).
جلس نباتات عشية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات .
أولاه مدينة تبت يرية في الإصقاع المحتلة . منها نوع
واحد زواحي ترابي يفي السرق الودي .

١٣٥٣٠ - سرق وودي

Acroclinium roseum (S). Acroclinie rose, Immor-
telle rose (F). Everlasting, Immortelle flower (E).
Schmaier sonnenfögel (D). Acroclinie (I).

نوع من السرق وهو نبات عشبي حولي ترابي . يعلو
من ٢٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه متعاقبة لاطة . نسلها
سنائي الشكل ، ضيق الصفحة . أزهاره ودية قطرها
نحو ٤ سم . لونها إلى الودي ، حادها أبيض || أنفراره
يستمر طوال الصيف .



سرق وودي

١٣٥٣١ - سرقاط زباني الأصابع

Suricata tetracycla (S). Suricata tetracycla (F).
حيوان لبون لاسم وحيد الجنس والنوع من فصيلة آثر بادمات
موطنه بعض مناطق أفريقية الجنوبية || جسمه صغير القد ،
قريب إليه بالنسب . طوله نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب
الذي يبلغ ١٥ سم . قوائم قصيرة رباعية الأصابع ، خفيفة
الجران ، أخصها الانامية . جلده كثيف الوبر . وبزه
أحر القاعدة والقسم الأسفل ، أطول القسم الأمامي المشوب
بعض الصغار . لذلك ويضاء صغيرتان مطوختان بالأسود .
ذنبه إلى الخطم الصفراء باستثناء الطرف الأسود .
يضع بالأسود || ملجئه الحياتي جاني . يألف الموالع
الرميلة حيث تنفر له سهولة استغفار الأوتار . قوته
الحيوية أعصها الجردان والثفان ثم يصل الثباتات
الرفسية .



سرقاط زباني الأصابع

١٣٥٣٢ - سرق

Vin scarbe (F). Sharp wine (E).
هو النبيذ الحامض الطعم ولا يكون ذلك إلا في الخمر
الجديدة التي يتعصها بعض السكر .

١٣٥٣٣ - سرقين

Compost
هو السباد الطوري المختبر الناتج من مختلف أوساخ وكتاسة
والقادر للزراعة يضاف إليه بعض الكلس بمعدل ١٠٪
تسهيلاً لتحويله واشتباره ورسمة تمليه نيا بعد .

١٣٥٣٤ - سرقيني

Humigane (F). Humigan (E).
لنت ترميمي يطلق على كل مادة تنتج الدبال .

١٣٥٣٥ - سرق

Corque, Cornicula (F).
Small horn-shaped cup (E).
زائدة قرنية مزدوجة لاقامية الشكل تتحلل بما الحشرات
المستقيمة الاجنحة مركزها تحت آخر رتبة فوق الحلقة
التربية مثل سرك الهيك الذي يشبه الجلم .

١٣٥٣٦ - سركة

Pardrix (femelle) (F).
Partridge (female) (E).
أنثى الجمل .

١٣٥٣٧ - سركوستوماتيات

Sericostomatidae (S). Sericostomatidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المرفوعة مدينة منتشرة في معظم اقطار البلاد المحتلة
الحرارة || اجسامها صغيرة ، سمره اللون . اجنحتها ممتدة
الطول ، كثيفة الخمل الذي يفي الاصاب والبرق .
للانسل الفكية عند الذكور مستقيمة الخمل المرموص
الذي يبدو كالقناع امام الرصد . وتتميز ذكورها أيضاً
بمعدن زنايلها المسننة الطرف || اساريمها تنيش في المياه
الجارية ملحوة بجلايب ، نهاية الاشكال ، ويكثر فيها
الغروطي .

أشهر اجناسها :

Sericostoma (S). السركوسية
Goera (S). القوروة
Silo (S). السيلو
Curnocia (S). الكوروسيا
Lasiocephala (S). اللال يوسيفالا

١٣٥٣٨ - سركوپ قناسي البعج

Cercopla quinqueangulata (S).
Cercepe quinqueangulata (F).
حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول
نحو ٩ م . ثوبها إلى السوداء الاسفغ تملو خس بقع حر .
رأسها مستعرض ، قليل الثقب . خطمها ممدد الطول .
صناعتها صغيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كويلها
محلوب . حقيقتها صغيرة ، عرصة . ظهورها كامل
الحنجية ، لاسف . روشانها غشائيان ، شفافان . يطنها
اسود على صفحتيه . قوائمها لثيفة سداه اللون || مبدولة
في كل مكان . قوتها النسخ تنصه من اوراق الاصباح .

١٣٥٣٩ - سركوپ عدسي

Cercopla sanguinea (S). Cercepe sanglante (F).
حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول
نحو ١٢ م . ثوبها إلى السوداء الاسفغ الملطخ بالاحمر .
رأسها مستعرض ، قليل الثقب . اسود . خطمها ممدد
الطول . صناعتها صغيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان .
كويلها محلوب . حقيقتها مزوانية . ظهورها كامل
الحنجية ، لاسف ، شديد الحمرة الاريجوانية ، مبيج
بالاسود . روشانها غشائيان ، شفافان . يطنها اسود على
صفحتيه ، احمر الحيد . قوائمها إلى السوداء || يكثر
ويجودا حيث تكثر الاصباح والنباتات الدغلية . قوتها
النسخ تنصه من الارواق .

١٣٥٤٠ - سركوپيات

Cercopidae (S).
Cercopidae, Aphrophora (F). Spittle bugs,
Froghoppers (E). Schaumzikaden (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطيفة
لصبرات الجناح . اجناسها وانواعها المرفوعة مدينة ،
معظمها يألف البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة
الحرارة || اجسامها صغيرة مبطلة . رؤوسها مستديرة .
نواحيها ثنائية الزناب . عوضاً كبيرة . قرونها الاستعمارية
قصيرة ونحيلة . تتميز بظنايبها الخلفية المادنة الاكفكار ،
لكنها مجوزة بمناسخ حادة . وتتميز أيضاً بالقفز يساعدوا
على ذلك أسطالة قوائمها الخلفية .

الى السمرة الكستنية . فكادما غليمان . وهي سداسية
الرواسب ، ثلاثية القالب الطرفية ، محورة الملب الجانبي .

١٣٥٤٨ - سرموكود * *Ovovivipare (F).*

Ovoviviparus (E).
نمت تمرني يطلق على الحشرات البويضة القوية كما في
بعض القترزيات والذباب التي يتم حضان مكثها وتلقه
داخل الجسم عند طرف الانطوية .

١٣٥٤٩ - سرموج * *Anus*
هو غرغز القتل اي طرف المني المستقيم .

١٣٥٥٠ - سرموج * *Ephippiger ephippiger (S).*

Ephippigère, Porte-selle, Porte-hotte, Hottoux (F).
Ephippiger (E). Setzelschracke (D).

جندب من القترزيات ثوبه الى الصفار الخشن . طوله
٢٧ الى ٤٠ م . كسبه كبير القدر مسروج ،
يعطو تهلجج متصالب امير اللون . زبانا دقيقتان
مستطيلتان . مرز كالسيف شكلها واستقامة . مجاديه
شدنية القصير . اجنسته ريزية . انفاده كبيرة . سيقانه
دقيقة لا تمكن من القفز المستمر . يتكرر ويجهه في المرامي
وبين الاشباح وحل الارض البور . قوة القفز الاخضر .
وقد يركب الكروية فيقضي على عليها ويلبثها .

١٣٥٥١ - سرموكيات * *Mégascopéus (F).*

Megascopéus (E).
رنية حشرات متفرقة من طبقة الطماكات . اساطيرها
تعود الى الحقبة الاخيرة من الاباج الاول المعروفة ايضا
بالحقبة البرمية || اساطيرها تقل عن ان حشرات
كالت كبيرة القدر ، قضيفة الاجسام ، مفترسة كما هي
الحال عند السبابس الماصرة .

١٣٥٥٢ - سرمجان * *Aeschna (S). Aeschna (F).*

جنس حشرات مفترسة من السرمانيات . انواعه عديدة
تعيش قرب الماء قربها الذباب والحوام وبعضها يقرض
التحلل .

١٣٥٥٣ - سرمجان شائع * *Gomphus vulgatissimus (S). Aeschna commun (F).*

نوع من السرمان طوله نحو ٥٠ م . جوشه اعضر اللون
يعطو تسليج اسود . يملكه مستطيل الشكل بترتبه تهلجج
اصفر . أرجله سود || يقرض الذباب والحوام والتحلل .

١٣٥٥٤ - سرمانيات * *Aeschnidae (S).*

Aeschnidae (F). Aeschnidae (E).
فصيلة حشرات من رنية الفراشات . اجنستها وانواعها
عديدة تتميز بقوة طيرانها وبامتداد اجنستها عند الراحة .
انثاها تسرع في الماء الراكة فضلت بمكثها على سطحه .
مسطها من الحشرات المفيدة لانها تقتدر الحوام .

١٣٥٥٥ - سرموج * *Lysmachia (S).*

Lysmachia (F). Lysmachia (E).
جنس نباتات عشبية مسيرة من فصيلة الربيديات . انواعه
نحو ٥٠ مظهرها بري وبسطها ترابي . اورلقها متعاقلة
وسبا غسبية ثلاثية ار ريمانية التسبيج . ازهارها غامية
الازرناكاز ، عشوية متصبة او سبلية || منسبا
الجلد الحارة والمتصلة . ترطب في المواقع الرطبة . اشهر
انواعها ما يتبع .

١٣٥٤١ - سرموكود * *Sarcoda (F). Sarcoda (E).*

السرموكود مادة حيوانية عادمة الاغذية والشرابون .

١٣٥٤٢ - سرموكويل * *Sarcocolla (F).*

هي ذبابة السم ، اطلبها .

١٣٥٤٣ - سرموكولا * *Sarcocolla (S).*

Sarcocolla (F). Sarcocolla (E).

جنس جنات مسمرة من فصيلة البقياس . موطنها الشرق
الاقصى . سيقها فراء متصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م .
ازهارها صغيرة لاجناسية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن
صفراء اللون . ثمارها نووية .
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٣٥٤٤ - سرموكولا مسكندرية القوق * *Sarcocolla rusdolia (S).*

Sarcocolla à feuilles de fragon (F).

نوع من السرموكولا . ساقه متصبة تملو نحو ٢٠٠ م .
اورلقها لامعة التصل تطلو من ٣ الى ٥ م . ازهارها صغيرة
الحمى ، صفراء اللون الباهت . ثماره كروية الشكل
حراء اللون ، متينة اللحم .

١٣٥٤٥ - سرموكولا صفصافي القوق * *Sarcocolla saligna (S).*

Sarcocolla à feuilles de saule (F).

نوع من السرموكولا . ساقه زيا العادم متصبة تملو من
١٢٠ الى ١٥٠ م . اورلقها شبيه بارواق الصفصاف ،
تطلو من ١٠ الى ١٢ م . ازهارها الى الصفار الكبريتي .
ثماره بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٦ - سرموكولا هوكر * *Sarcocolla Houkeriana (S).*

Sarcocolla de Houker (F).

نوع من السرموكولا . ساقه تملو من ٩٠ الى ١٢٠ م .
اورلقها احليجية الشكل تطلو من ٥ الى ١٢ م . ازهارها
الى الصفار الباق . ثماره نصف كروية الشكل سيوا
اللون .

١٣٥٤٧ - سرموكولا بنفسجية * *Cerooma violacea (S). Cerooma violet (F).*

Cerooma violacea (E).

حشرة طيبة واثمة غاشلة وانجته من فصيلة المادويات ورنية
الحرارة من العال القديم . تألف البراري . غشاشها تعيش
على ازهار فصيلة المركبات . يقاتها وانجته تعيش على ما
تستطيع اقتحامه من الدب والمكن || جسمها متوسط القدر
يطول من ١٢ الى ١٤ م . ثوبها الى الزرقوة البنفسجية
يعطوها موانج اعضر . رأسها مستدير الشكل . زباناها
صنوتائين . عيناها صغيرتان . ظهورها مستدير الطرف
اللاصق || من ميزاتها انها تنقرض عند لمسها مادة صفراء
اللون كروية الرائحة . وان جهازها التنفسي وطوارها يحس
مادة لائقة تنجج الجلد بتدر الجاء والايلاج . ويتر ما يجلها
من الحشرات الطليعية . اما نسبة البلاسين الموجودة فيها
فتتراوح من ٩٠ الى ١٠٠٪ || الاثاق ابرز قدام من الذكر
واجهت ثوبا من راضخ يطن || لها جيل واحد في الخيط .
تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وقبض حتى اواخر
تموز . تحرق في النهار || البرقة تطلو نحو ٢٠ م .
جسمها مبسط الشكل ، اسمر اللون ، اثبر الموانج . رأسها



سرموكولا بنفسجية



سرموج



سرمان شائع



سرموج

ممتعة ، متناقة ، كبيرة اللقد ، شاربة ، غليظة الشكل .
نصلها حديد المروق ، كثير التجميع ، لونه الى الخضار
المايق || اوراقها تستعمل استعمال السبانخ . اما بزورها
قلبية مسهلة وبقوتها .

١٣٥٦٤ - سَمَرُج بَحْرِي * ، قَطَف بَحْرِي ،

Atriplex halimus (S).
Arroche marin, Pourpier de mer, Halime (F).
Ses-orache, Ses purslane (E). Meerportulak, Ständ-
melde (D). Porcallana marina, Disciplina
fratrum, Malochia (I).

جنية برية غشوية تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم.
ترغب في المواقف الساحلية الشرقية على البحر . اوراقها
مأكولة وقد تملل . يكثر استعمالها في بعض المناطق
الاسبانية والانكليزية .

١٣٥٦٥ - سَمَرُج بَرِّي * ، قَطَف بَرِّي

Atriplex hastata (S). Arroche des champs (F). Wild
orache (E). Spiessmelde (D). Atriplice astata (I).
عشبة برية حولية تكثر في الحقول المزروعة . اوراقها
مستطيلة سنائية . ترعاها الماشية ليحسن حالها ويجيد
دراها .

١٣٥٦٦ - سَمَرُجِيَّات

Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (S).
Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (F). Chen-
opodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها واولاها عديدة .
اصنافها البلاد الممتدة الحارة . جميعها احشاش ونباتات
بعضها يرغب في السبانخ المالحه .

١٣٥٦٧ - سَمَرُجِيَّات * Dictyoptera (S).

Dictyoptères (F). Dictyoptera (E).
رؤية حشرات تقتني الى طبقة الوردانيات ، تشمل عدة
فصائل اشهرها نبات وردان والسرغويات . اجناسها
وانواعها زهاء ٤,٠٠٠ اكثرها من حشرات البلاد الحارة
وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة .

١٣٥٦٨ - سَمَرُجِيَّات Serombus gallus (S).

لوع من اللداع يمكن منه اطعام الطيب .

١٣٥٦٩ - سَمَرُجَة * ، مَكِينَة * ، (سَكَن المَشْمُور)

Cerithe (S). Cérinthe, Mélinet (F). Honeywort (E).
جلس نباتات عشبية مثالية برية حولية او معمرة
من فصيلة الحششيات . الوانها المعروفة نحو ١٢ . جميعها
احشاش فزاه . اوراقها متناقة حاشية بحرية اللون .
ازهارها سفلية متجميع صغيرة اللقد ، صفراء اللون اورانية .
تفرز رقيقاً صلي المادة يحمره التملل || اوراقها طيبة
تستعمل في علاجات العين . يزود تسكن للمصن لروايح
الجذب والظهور . وفرزة منه مع الزعفران والبصل يد
الطهر كمين على الحمل . وهو ينجح الباء || اشهر انواعه
ما يلي .

١٣٥٧٠ - سَمَرُجَة خَشَبِيَّة * ، مَكِينَة خَشَبِيَّة *

Cerithe aspera (S). Cérinthe rugueuse, Mélinet
rugueux (F).
نوع من السمرجة المشتربة البرية الخولية . عشبتها تملو
من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها اطليجية الشكل . اذنياتها

١٣٥٦٩ - سَمَرُج رُبَاعِيَّة الْوَرَق

Lysimachia quadrifolia (S). Lysimache à 4 feuilles (F).
نبات معمر منه امريكة القباية . يملو من ٣٠ الى
٩٠ سم . ساقه زباه . اوراقه متناقة ، لائقة ، ضمية ،
رباعية . نصلها اخضر اللون على سفحتها . ازهاره كبيرة
اللقد ، فريدة ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزنادة متدلية .
لونها الى البياض اللثني || ازهاره يستمر من حزيران
الى آب .

١٣٥٧١ - سَمَرُج سَالِك

مشهور باسم سراجية . اطباء .

١٣٥٨١ - سَمَرُج عَنَقِيَّة

Lysimachia atropurpurea (S). Lysimache pourpre-
noir (F).
نبات حولي او عويل يملو نحو ٦٠ سم . ساقه سرسة .
اوراقه متناقة اطليجية . نصلها مائل البشرة ، اخضر
الصفحة العليا ، طاق السفل . ازهاره متوسطه الكثافة
متدلية . لونها الى احمر العنقية || ازهاره يستمر
من تموز الى ايلول .

١٣٥٨٩ - سَمَرُج مِزْوَال

Lysimachia ephemerum (S). Lysimache éphémère (F).
نبات معمر يملو نحو ١٥٠ سم . ساقه سرسة . اوراقه
لائقة ، متناقة ، سنائية . نصلها بحري اللون . ازهاره
عشوية ، منتصب ، مستطيل . ازهاره صغيرة اللقد ،
بيضاء اللون || يزهر من تموز الى آب . يرغب في الارربة
الكلسية .

١٣٥٩٠ - سَمَرُج مُسْتَبِل ، سَمَرُج عَيْثِي

Lysimachia barystachys (S). Lysimache à gros
épis (F).
نبات سروي معمر منه الصين . يملو نحو ٦٠ سم .
ساقه زباه . اوراقه متناقة اطليجية . نصلها خيل البشرة
اخضر الصفحة العليا بحري السفل . ازهاره سبل الشكل
كثيف التجميع . ازهاره صغيرة اللقد بيضاء اللون || يزهر
من حزيران الى تموز .

١٣٥٩١ - سَمَرُج مَوْشَم

Lysimachia punctata (S). Lysimache ponctuée (F).
نبات معمر يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقه زباه .
اوراقه متناقة ضمية ثلاثية او رباعية التجميع . نصلها
سنائي الشكل ، خيل البشرة على سفحتها . ازهاره صفراء
اللون يطولها تبيح اخر ويهيب وودي || ازهاره
يستمر من حزيران الى تموز .

١٣٥٩٢ - سَمَرُجِي ، قَطَف

Atriplex (S). Arroche (F). Orache (E).
جلس نباتات برية ، عشبية حولية او غشوية مسرة
من فصيلة السمرجيات . الوانها عديدة منها الاقاليم
المعتدلة . ساقها غزيرة العصارة اللينة الزجة . اوراقها
متناقة . ازهارها قياسية متباينة الالوان || اشهر انواعه
ما يلي .

١٣٥٩٣ - سَمَرُج اَبْيَض * ، قَطَف اَبْيَض

Atriplex hortensis (S). Arroche des jardins, A. épi-
nard, Belle-dame, Bonne-dame, Chou d'amour,
Follette (F). Orache, Butter leaves, Mountain spi-
nach (E). Gartenmelde, Grünkraut (D). Atriplice,
Spinacione, Bells dama, Bletons (I).
بقلة زراعية حولية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها



سَمَرُج اَبْيَض



سَمَرُج بحري



سَمَرُج بري



سَمَرُجَة

الاسجام قطرها من ١٠ الى ٥٠ مليميكرون. اشهرها واعما انتشاراً يورس Y ويورس A ويورس X ويورس S ويورس Y ويورس M. كل منها يشكل غرباً منفرداً له ميزاته الخاصة. جميعها مؤذية لتعلب الاوراق والسيقان. وفي من الاصنام المتصصة الي حيز البلم حتى الآن من مائلتها ولقضاء حليها. فاقايتها باجتناب البادار الملوث والارتية اللويوة والقرارات المائلة القرية هي غير حاية مستطاعة الآن .



سُرْتَج البطاطا

١٣٥٧٧ - سُرْتَج التَبَاق * (F). Mosaic du tabac (F). Mosaic disease of tobacco (E).

نوع من السُرْتَج تسيبه يورس مركبة قصبية الشكل تطول من ٢٠ الى ٧٠ مليميكرون تنتقل مع السُغ الى سائر اعضاء النبات اعصها الاوراق والسيقان || مظهره الخاصي ، حل الاوراق اللينة ، بلع حلقية وبهاثة لانهامية الشكل والارتوب تلو صفحة التعلب يتقويه الى عطف الاشكال التشوية القرية اعصها الاستطالة والتفريص والتجسيد والاكشاش . وانذا اخرى الاوراق بعد اكثال نموها يتجها دون ان يشو شكلها .



سُرْتَج التَبَاق

١٣٥٧٨ - سُرْتَجَة * ، فيلدا دلفس

Philadelphus (S). Syringa (F). Syringa, Mock orange (E). Jasmingeranscauch, Falscher Jamin (D). Syringa, Floro d'angolo, Pistenza (I).

جنس شجيرات برية ورتيئة من فصيلة السُفريسات (الليليات). انواعها نحو ١٥ مقيها فرعا . فروعها متعاقبة . اوراقها عابلة ، معققة ، متعاقبة ، يضيئة التصل المسن الحلقه || ازهارها كيرة الله ، جميلة الشكل ، مختلفة التجميع ، لثقة ليليات النبتة ، كثيرة الاسدية ، يضاء اللون . بعضها فواح المشع المثل القصار || اشهر انواعها القرينية ما يليق .

١٣٥٧٩ - سُرْتَجَة زَيْبَة (S). Philadelphus hirsutus (S). Syringa hirsuta (F).

شجرة سرورية مهددة امريكة الشالية . تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم . نصلها منشاري الحلقه ، غلي الصفحة السفلى || ازهارها عادمة الكرف ، يضاء اللون قطرها نحو ٣ سم || تزهر في حزيران .

١٣٥٨٠ - سُرْتَجَة شالكة

Philadelphus coronarius (S). Syringa commun (F).

شجرة سرورية حديثة الشروب مهددة القوقاز واوربية . تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصلها سناني الشكل ، مائل الصفحة العليا ، غلي السفلى ، مهدب الحلقه || ازهارها فواحة الكرف ، يضاء اللون ، خاسية التجميع ، كيرة الله ، قطرها نحو ٤ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



سُرْتَجَة

١٣٥٨١ - سُرْتَجَة صَغِيرَة الوراق

Philadelphus microphyllus (S). Syringa à petites feuilles (F).

جنية زينة مهددة امريكة الوسطى . تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقها سنائية تطول نحو ٣ سم . نصلها ازغب الصفحة السفلى . عادم للتئين || ازهارها مشيرة الله ، مرفية الرائحة ، يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

مسقطلة . نصلها مهدب الحلقه المسنة ، مدرن البشرة على صفحته . ازهارها متدلية ، قوتجها ارجوانية اللون ، صفر الاطراف || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٣٥٧١ - سُرْتَجَة صَغِيرَة * ، سُرْتَجَة صَغِيرَة (S). Carinthe minor (F). Carinthe petite, Málnet minor, Petit málnet (F). Small honey-wort, Waxflower (E). Gelbe wachablume (D). Erba valois (I).

نوع من السُرْتَجَة للثرية البرية وهي حفية محوة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها مستديرة الاذنات ، يضيئة الشكل . نصلها مدرن الصفحة العليا . ازهارها الى الاصفار الكبريتي يملوها عند قواعدها يتقبح خلبي السند ابيض اللون او احمر . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٥٧٢ - سُرْتَجَة مَالِسَة * ، سُرْتَجَة مَالِسَة (S). Carinthe glabra (S). Carinthe glabra, Málnet glabra (F).

نوع من السُرْتَجَة للثرية للمصرة . يملها تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها يضيئة الشكل ، دليقة الاذنات ، نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهارها ذهبية اللون عجنة النصوص . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

١٣٥٧٣ - سُرْتَجَة مَكَارِبَة * ، سُرْتَجَة مَكَارِبَة (S). Carinthe retorta (S). Carinthe retorta, Málnet retortum, M. de montagne (F). Honey-wort (E). Wachablume (D). Cerinta (I).

نوع من السُرْتَجَة للثرية البرية وهي حفية حوية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مستديرة الاذنات ، اعليجية الشكل . نصلها مدرن البشرة على صفحته . ازهارها صفر التريجات ، بتضحية النصوص || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٥٧٤ - سُرْتَجَة مَلَطَحَة * ، سُرْتَجَة مَلَطَحَة (S). Carinthe maculata (S). Carinthe maculée, Málnet maculé (F).

نوع من السُرْتَجَة للثرية للمصرة . يملها تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم . اوراقها اعليجية مسقطلة ، اذناتها مستديرة . نصلها مدرن الصفحة العليا . ازهارها نارية اللون يملوها عند قواعد نصوصها يتقبح ازرق || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٣٥٧٥ - سُرْتَج * ، مُسَيَّسَة (F). Mosaïque (F). Mosaic (E).

جنس اصنام يوربية فتاكه حيدة الانواع تصيب النبات لثوية وقد تقضي عليه . يوربها ذرية الله لا تخضع بالجاهر العادية لان طولها يراوح من ١٠ الى ٦٠ مليميكرون . وهي تموش داخل السُغ النباتية وتتلف اليها مع السُغ بواسطة الجروح والاناديش والحشرات القاضية والماصة || اشهر انواعها واعرها سُرْتَج البطاطا والتبغ والبنورة والشليك .

١٣٥٧٦ - سُرْتَج البطاطا *

Mosaïque de la pomme de terre (F). Mosaic of potato (E).

نوع من السُرْتَج تسيبه يورس اسطوانية الشكل مختلفة

١٣٥٨٢ - سُرْتَجَة عَادِيَة السُرْف

Philadelphus inodorus, *Doutia corymbosa* (S). *Seringa inodora* (F).

شجرة سبروتية مهددة أمريكية الثالية. تطلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضيه مديدة المنقصة، تطلو من ٦ الى ١١ سم. نصلها من الحافة، خلى المروق || انزعارها عمدة السرف، وريه التجميع، فردية او ثلاثيه، قشرها نحو ٤ سم. لونها اليباض المالحى || انزعارها يستمر من ٤ الى ٥ اسابيع ابتداء من لوائل ايار.

١٣٥٨٣ - سُرْتَجَة كَبِيرَة الزَهْر

Philadelphus grandiflorus (S). *Seringa à grandes fleurs* (F).

شجرة روفه مهددة أمريكية الثالية. تطلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه تطلو من ٨ الى ١٤ سم. نصلها مالى الثيرة، مشاري الحافة || انزعارها قليلة السرف، يضاء اللون، كبيرة اللد، قشرها نحو ٦ سم. حناقيها الزهرية مسطلة قليلة الكثافة || انزعارها يستمر من نيسان الى ايار.



سُرُون صياد

١٣٥٨٤ - سُرْتَجَة مَكْسِي كَة

Philadelphus mexicanus (S). *Seringa mexican* (F).

شجرة سبروتية مهددة المكسيك تطلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها حرة صغيرة اللد تطلو نحو ٥ سم. نصلها جلدي الصفرة من الحافة || انزعارها حرة الرائحة، يضاء اللون بعلها، عند انكشاف بتلاتها، من الدامل، تنمش اربوينا || انزعارها يستمر من سربان الى تموز.

١٣٥٨٥ - سُرْتَجِيَّات

Paleoptera (S). *Paleoptères* (F).

شعبة سحرات من طائفة المهنات اصل. تشمل حاليا طليتين واربع رتب ترميها ما على :

١ طبقة البليات التي تشمل رتبة الالفويات ورتبة الزنبريات.

٢ طبقة العوسيات التي تشمل رتبة الجحليات ورتبة الرماشات.

١٣٥٨٦ - سُرُونَف

Bald buzzard (F). *Bald buzzard* (E).

السُرُونَف ج سرائيف، جس طير من القيان ولسيلة الصقريات. انواعه عديدة جميعها من القاطم : اجنبتها مسطلة ذلقة. منارها قوة، شديدة الانكشاف، عصبة البرة الذرية || يالف الانهر والبحيرات والسطوط البحرية. قوة الاسماك، يلفن منه في الانهار الزلية او حل الصغور الثالثة قرب مجاري الماء. اناته تحسن وصفا من ٣ الى ٤ رفقات نحو الشهر || اشهر انواعه واحدها السُرُونَف السباد.



سُرْمِت بَلَح

١٣٥٨٧ - سُرُونَف صَبَاد *، سُرُونَف يَحْمَرِي، عَكَب نَسْرِيَة

Pandion haliaetus (S). *Bald buzzard* (F). *Asprey* (E).

نوع من السُرُونَف ريع اجلة طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم. ريشه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. رأسه وصغته ويطه يفس. صدره مبلج وينمش. ظهره الى السمرة ذبه بحد يستطو سُرْتَجَة متساوية. عيناه الى السمرة الباقية. مسره وضالته سود || يالف السطوط البحرية ومجاري الماء. قوة الاسماك.

١٣٥٨٨ - سُرْمِيَّت

Cirrhites (S). *Cirrhites* (F). *Cirrhites* (E).

جس اسماك بحرية من فصيلة السرميات. انواعه المعروفة ستة، اصطلح المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها اعطليجية الشكل تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم. جميعها فردية الزعانف الظهرية المستطلة الكثيرة المناعس. زعانفها الشرجية ثلاثية المناعس الحادة. اقلها متباينة الالوان منها الاصفر والاشهب والاصفر البحري والاحمر والاريد الرصاصي، جميعها مزودة الظهر والجوانب || اعرف انواعها واشهرها السرميت الجلع.

١٣٥٨٩ - سُرْمِيَّت مَجْدَع

Cirrhites maculatus (S). *Cirrhites maculé* (F).

نوع من السرميت. اصطلح البحر الاحمر. تيش قرب الجلع. لونها الخالي جامي. اجسامها متوسطة العدد || جسها اعطليجي الشكل، متغل التسطيط، يطلو نحو ٢٥ سم. رأسها خالفت الجبهة، اسر اللون يطلو تنقيط اصفر. عظمها قصير. شفتها دون الصط. صيها كيرتان، مستديرتان، نادرتان. زعنفتها الظهرية مسطلة، قاطبة، القسم الامامي منها تسامي المناعس المتناوبة الطوك، المرقطة بالجلوي. زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة. زعنفتها الشرجية ثلاثية المناعس المنسقة الحادة. زعنفتها الذيلية مقنطية الطرف || لونها الى الكهبة، يعلوها في ظهرها وجانبها تيجج وتجميع اسر || لحمها متوسط الصفت، مأكول.

١٣٥٩٠ - سُرْمِيَّات

Cirrhitidae (S). *Cirrhitidae* (F). *Cirrhitidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكات الزعانف. اجسامها وانواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || اجسامها مستدلة اللد، اعطليجية الشكل، تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم. سفنها صغير الحجم مستدير الشكل. زعانفها الظهرية والشرجية تحمل مناعس حادة || اعرف اجناسها واشهرها السرميت.

١٣٥٩١ - سُرُو

Cupressus (F). *Cupress tree* (E). *Echte yprasse* (D). *Cipresso* (I).

جس اشجار حربية وزينية من سبط السوروبات وفصيلة السوروبات. انواعه نحو ١٥ تنقيتها السوروبية العامة ترتكر في الميزات التالية : بتالقتها موزقة، راعمها مشاة بالاوراق. اوراقها حرة، فلسية، متنايلة، مقلقة، مرصوسة على اربعة صفوف يبي ساعدة القاعدة، والزام الاويل || انزعارها طرية وصيدة اللق والمسكن، والذكورية منها كثيرة الاسدية وتيبوب الروع || ثمارها اكرار كروية الشكل تتألف من جراحات مسطبة، ليفية، جامدة يراوح طولها من ٦ الى ١٤ || يزورها صغرة بمنجعة لا قياسية الشكل والحمى || اشهر انواعه ما يتبع.

١٣٥٩٢ - سُرُو أُرِيْزُونَة

Cupressus arizonica (S). *Cuprés de l'Arizona* (F).

شجرة سبروتية سرية التو مهددة اريزون من امال امريكة. تطلو من ٢٠ الى ٢٥ م. بتالقتها دقيقة، لاقياسية الانتظام. اوراقها رائحة، قلبية، شديدة الصغر، لونها الى الخضار الازرق. رعمها رائحي ابيض اللون. انزعارها الذكورية كبريتية اللون اما الانثوية

١٣٥٨ - سُرُو مَكْنَاب

Cupressus macrabiana (S). *Cypress de Mac Nab* (F).
شجرة جادسة بطيئة النمو مهدبا كليفورية. تملو
٢٥ الى ١٠ متر. بتالقتها قصيرة جامدة لاقياسية
الارتكاز. اوراقها فلسية، مستعرضة، راتحة، صمها
راتني ابيض اللون. اكرازها عداية المرامات || ترطب
في الاقاليم الحسنة والارضية السقية الغور المتوسط
الامتداد والرطوبة.



سرو شائع

١٣٥٩ - سُرُو تَحْيَس، سُرُو الْخَابِر

Cupressus funebis (S). *Cypress pleureux*, *C. funebris* (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو. مهدبا الصين. تملو من
٢٠ الى ٢٥ م. بتالقتها نظامية، مبططة، جيلة الخشار
البات. اوراقها مديية، حديشة الخشار الزاهي. اكرازها
صغيرة قطرها نحو ١٢ م. جراثمها من ٦ الى ٨ لونها
ال زبدية البسود || تحيد وتنمو في جميع الارضية.

١٣٦٠ - سُرُو
Ovipars (F). *Oviparus* (E).
هو كل حيوان يتكاثر بالسرور البسود او البسود، راجح بيض.

١٣٦١ - سُرُو
Cupressinées (F).
سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل السرو والرعر والرعر والصنوبر والصنوبر.



سرو كليفوريه

١٣٦٢ - سُرُو
Chitridinae (S). *Chitridinées* (F). *Chitridinae* (E).
مرتبة من رتبة الفطور البشبية تشتمل على فصليتين
الصنوبريات والمروقات.

١٣٦٣ - سُرُو
Oolithe (F). *Oolithe* (E).
آربة كلسية مسنوبة الى الجودية ذاتها كسر البسود.
اشهرها.

سُرُو بياض
Oolithe blanche (F). *White oolithe* (E).
سُرُو حديدية
Oolithe ferrugineuse (F).
Ferruginous oolithe (E).

سُرُو دحية
Oolithe miliare (F). *Miliary oolithe* (E).
سُرُو كبيرة
Oolithe grande (F). *Big oolithe* (E).

١٣٦٤ - سُرُو، سُرُو، لَيْسَك
Lapex, *Lapex*
دبار طبيعي لاقياسي البسود والامتداد عند سطح البسود
الجسي، ج. اسرة.

١٣٦٥ - سُرُو
Criquet (F). *Locust* (E).
هو الجراد من أي جنس او نوع كان.

١٣٦٦ - سُرُو
Certhium (S). *Certhium* (E).
جنس سبوتات بحرية من الرغويات مدييات الاربع
وفصيلة السبوتيات. انواعه للرغوة كثيرة البسود بعضها
من متحجرات الانسحاب الاول وبسوها محاسر متشتر
جميع جدار البلاد الحارة والحسنة الحارة || اصداها متباينة
الاشجام، جميعها غروطية عازنة وبسوها التنديد الولوي.
الوانها سوية تطلب فيها الخضابات القاتمة.



سُرُو

١٣٦٧ - سُرُو
Rigole (F). *Trench* (E).
جري ماء الساقية او الري.

فال الخشار البحري || اكرازها صغيرة البسود قطرها نحو
٢٥ م. لونها الى الجودية بيلوها حل صماني. جراثمها من
١ الى ٨ م. وهي جيلة الشكل شائعة الامتداد الزهني.
تحيد في جميع الارضية ولا تحيد الكلسية.

١٣٥٩٣ - سُرُو بَحْرِيّ الْكُون

Cupressus glauca, *C. lusitanica*, *C. coutantii* (S). *Cypress glauque*, *Cedre de Goa* (F).
شجرة سبروتية في الاقاليم الحارة، جادسة في الحسنة.
مهدبا المكسيك. تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. بتالقتها
نظامية، رطابية الانسداد، بحرية اللون. اوراقها
مديية عادية الرشح الراتني بحرية الخشار. ازهارها
الذكورية صفراء اللون بيلوها موالج ارجواني اما الانثوية
فال الزبدية المزودة بالبسود || اكرازها صغيرة
بشبية الشكل لونها الى الجودية القاتمة || تحيد في جميع
مواقع ساحل البحر المتوسط وفي كل تربة.

١٣٥٩٤ - سُرُو حَمَلَايَا
Cupressus torulosa (S). *Cypress toruleux* (F).

شجرة سبروتية في الاقاليم الباردة والحسنة، جادسة في
الاقاليم الحارة. مهدبا حلايا. تملو من ٢٥ الى ٤٠ م.
بتالقتها نظامية، قياسية، دقيقة البسود، فسقية اللون.
اغتادها وبسوها مديية. اوراقها حديشة الصفر عاقبة
الخشار. ازهارها الذكور صفراء اللون اما الانثوية
فال الزبدية البشبية. عشاها اخر اللون تلم الرقة.
اكرازها صغيرة. جراثمها مقرنة || لها قربان مهوران.
Cupressus torulosa corneyana, *C. tor. majestica* (S).

١٣٥٩٥ - سُرُو فَسَك

Cupressus sempervirens (S). *Cypress commun* (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو مهدبا صوب البحر المتوسط
فروجا حديشة تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. بتالقتها دقيقة،
غيراء اللون، لاقياسية الارتكاز. اوراقها فلسية،
حديشة الصفر، عاقبة الخشار، راتنية الراتحة. قطر
كرزها يراوح من ٣ الى ٤ م. ويحد جراثمها من ٨
الى ١٤ || اقلها المناطق الحارة والحسنة. لا تستعمل
كثرة الصنع والبسود. تحيد في جميع الارضية. تفضل
الري. تستعمل لصد الرياح || فروجا المهور
حسة، اعمارها السمية ما يلي:

Cupressus sempervirens contorta, *C. s. fastigiata*,
C. s. horizontalis, *C. s. thuyaeifolia*, *C. s. variegata* (S).

١٣٥٩٦ - سُرُو كَشْمِير

Cupressus
cashmiriana (S). *Cypress du Cachemire* (F).
شجرة رطبة بطيئة النمو مهدبا الهند والباك. تملو من
١٠ الى ١٥ م. بتالقتها نظامية تحيلة دقيقة. اوراقها
بحرية الخشار. اغتادها وبسوها متباينة الانواع.
اكرازها كروية قطرها يبلغ ١٥ م. جراثمها من ٨
الى ١٢ لونها الى الحسنة الباك || تستمر من اجل
الانواع الازيدية كنها قليلة الانتشار نظرا لعلابها
الترية والرطوبة.

١٣٥٩٧ - سُرُو كليفوريه

Cupressus goveniana (S). *Cypress de Californie* (F).
شجرة جادسة بطيئة النمو مهدبا كليفورية. تملو من
١٠ الى ١٥ م. بتالقتها غيلة، قصيرة، جالسة الانتداب.
اوراقها عاقبة الخشار. اكرازها كروية قطرها نحو
٢ م. جراثمها صفراء اللون بيلوها موالج بنفسجي لامع.



سريع



سرعة



سرولة المرسط



سطاقس النائع



سطاقس جرمانى

١٣٦٠٨ - سُرِّيَّات *

Cerithiidae (S).

Cérithiidae (F). Cerithiidae (E).

قصيلة من الرغويات مغليات الاربيل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاقحاب الاول والبعض الآخر منظر في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصنافها غروبية عازلة ، قريبة القوابل الثائرة ، مفرغة الاحاديد ، شبه مستديرة القوقعة المنحنية يلتصق بحصى الراس || اعراف اجناسها واشهرها الريرت والسروتنه والسروتنه والنسوتيه والبيطس .

١٣٦٠٩ - سُرِّيَّات * هو البرواق ، اطليه .

١٣٦١٠ - سُرِّيَّات *

Didelphus (S). Sarigue (F).

جنس حيوانات راسمة من الجربايات . انواعها المعروفة ٤٠ موطيا امريكية الوسطى والجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طويلا يراوح من ١١ الى ٥٦ سم . واذاها من ٧ الى ٣٨ سم . رؤوسها اسطوانية . اذانها كبيرة مستديرة . اصنافها غليظة جرابزها قصيرة . اظفارها سادة . اذاها اعادة ، مستطيلة ، كاسية الزام الاول حشوية الثاني والثالث والرباع || اجرة اذانها كبيرة لقد مطاة . املاوها وربة الترتيب يراوح مدحها من ٧ الى ٢٥ . مجبل الاثني بدوم ٢٥ بيتا تنصع على اثره من ٤ الى ١٦ دوصا . وهي من الحيوانات الشاذة تسرح في الليل . قوتها الحشرات عمل اختلاف انواعها والزخافات مع الاقاصي والصابغين ويصنها ويأثار السكرية عند الحاجة .

١٣٦١١ - سُرِّيَّات * هو الصف من الكرم . راجع سرية .

١٣٦١٢ - سُرِّيَّات *

Serica (S).

Sérique (F). Serica (E).

جنس حشرات خافضة من غفديات الاجنسة صليبيات لقرنن وضفلة الجليات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطسة ، شبه اهليجية الشكل ، محدبة الرأس والكولوس والقص ، تطول من ١٤ الى ١٨ سم . رؤوسها مستعرضة . متاكها للفاضة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرققة ، صفيحية الالمراط . احمادها شديدة لاسفة . قوائمها نشيطة ، متعطة الضفلة . اثنائها وحيدة اللون السوي يكثر فيها الكسني ثم الاصعبر والاسود والاسمر ، جميعها سلاء المراج || تعيش على المواد النباتية المختلفة .

١٣٦١٣ - سُرِّيَّات *

Seriola (S).

Sériole (F). Seriola (E).

جنس اسماك بحرية من الاسمريات شالكانت الزمائف . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصلاتها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة لثقة ، اهليجية الشكل ، تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . القوابل الى الرتبة السفلية المراج تبق وتقتد سميتها مع الاتراب من تيج الظهر وتزهر وتبيض عند البطن . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتداوين ، الجزء الخلفي نظاسي مستطيل ، الجزء الامامي صغير القذ ، ناشر المناسخ اعصها المنخس الامامي المؤذي لطح الرأس . زعنفتها الذيلية فارة || اشهر انواعها واهرها سرولة المرسط .

١٣٦١٤ - سُرِّيَّات *

Seriola dumertii (S). Sériole de la Méditerranée.

S. argentée (F). Silver seriola (E).

نوع من السرولة . سمكة بحرية يبيض . اصلاتها البحر

الايض المتوسط . مسرعا يمي ولا تقترب من التقاف والمجادح الا في الربيع والخريف || جسمها اهليجي الشكل يطول من ٨٠ الى ٩٠ سم . قوابل الى الرتبة القفصية تزرق وتقتد زرقها عند الظهور وتزهر وتبيض عند البطن . رأسها محتل الجرم ، قصير الخيط . صيها كيركان . فكها الاسفل يتقدم الاعل . اسنانها كثيرة المدد . زعنفتها الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتداوين . الجزء الامامي ونحي الشكل ناشر المناسخ الحادة اعصها الاول المنطقتا نحو الرأس . الجزء الثاني نظاسي الشكل ، عادم المناسخ . زعنفتها الذيلية فارة || لحمها متوسط الصنف ، مأكلي .

١٣٦١٥ - سُرِّيَّات *

Euvé (F). Hard-headed (E).

كل سمكة اثنى لا يزال جرابها الشلطي مليء بالسرة تمت بالسريرة .

١٣٦١٦ - سُرِّيَّات *

Sociologie (F).

Sociology (E).

السيولوجية علم يبحث في الجماعات البشرية وفي النامش الاجتماعية .

١٣٦١٧ - سَطَائِس *

وهجرة تنبت في التدار في اطلان المياه ترعاها المشاية وينسل بورتها الرووس « (السان) .

١٣٦١٨ - سَطَائِس *

سَطَائِس * هو السطاقس ، اطليه .

١٣٦١٩ - سَطَائِس *

Pilar (F). Pillar (E).

كل عمود فالت ترتكز عليه السلطنة واثا شبه .

١٣٦٢٠ - سَطَائِس ، سَطَائِس *

Stachys (S). Epilaira (F).

جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات . انواعها زهاء ٢٠٠ معظمها عشبي وبشها جنبي . سوطها فراء . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، معتقة . ازهارها سفلية التجميع تاجية الازتكاز اكثرها صطوة || اشهر انواعها يتبع .

١٣٦٢١ - سَطَائِس النائع *

Stachys palustris (S). Epilaira des marais, Ortie des marais, Ortie morte (F). Marsh betony, Clown's all-heal, Marsh wound-wort (E). Sumpflizest (D). Scabiosa palustris, Spigo fiorito (I).

نوع من السطاقس وهو عشبة برية معتقة تملع نحو ١٠٠ سم . ساقها فراء . اوراقها مقطوعة . ازهارها ارجوانية اللون . تستعمل في تطيب بعض الملل الجملانية .

١٣٦٢٢ - سَطَائِس جرمانى * ، قناره ، وُرْطَوْرَه *

Stachys germanica (S). Epilaira de Germanie, Sauge molle, Stachyde, Epi flauri (F). German stachys, Downy wound-wort (E). Deutscher ziest, Ziest (D). Stachide germanica, Spica fiorita, Madre salvia (I).

نوع من السطاقس وهو عشبة برية ويزينية سمرة . تملع من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها مفصلة زياء اللحاء . اوراقها ثليبة القامضة . نصلها خلي البشرة ، مسن الحافة . ازهارها ويزية اللون ، فضية السلة ازراء || ازهارها يستمر من سزيران الى ايلول .

١٣٦٢٢ - سَطَائِلُ سَبْيَلِي * ، إِرْوَالِيَّة ،

سَطَائِلِيَّة

Stachys recta, S. procumbens (S). Espièdre droite, Crapaudine (F). Upright hedge nettle (E). Bergzieg (D). Erba giudea (I).

نبات عشبي طليحي يري معمور من السطائيل. يطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقه قليلة الفروع زينة بالساق. اوراقه سنانية. نصلها خالي البشرة يبدو كأنه فضي. ازهاره مستطيلة الشكل كثيفة الخضر || كان شائع الاستعمال الطبي وقد اعمل لكراهية رائحته.

١٣٦٢٤ - سَطَام * Origne (F). Origin (E).

هو الاصل ج سلم.

١٣٦٢٥ - سَطَام * ، أهر مِلَقَط * Anastomus (S). Anastome (F). Anastomus (E).

جنس طير من طول السال وفصيلة المغالان. ازهاره المبرومة قليلة العدد اسطواني بعض مناطق افرقية الوسطى والشرقية والهند وجزر الزايح. ملجتها الحياني جامي. يتكرر ويوجدوا قرب الشطوط ويجاري الماء. قوتها الاسماك والقشادع والتمارين والورث || تتميز بصفاتها متناهيها المستطيلة المشطوقة المحيطة الدائرية كالمشاش. اصنافها وقوامها مستطيلة. اذنانها قصيرة. اجنتها لاحقة. اقنوبها الى البيض الاغبر بالسقاء الاذنان وطراف الاجنحة السود.

١٣٦٢٦ - سَطَلَّة

هي سطح سفح البيت من اي طابق كان.

١٣٦٢٧ - سَطَح Surface

١٣٦٢٨ - سَطَح * ، مَسْتَوٍ Plan

١٣٦٢٩ - سطح مُتَنَاقِص * Quadricque (F). Quadric (E).

١٣٦٣٠ - سطح مُتَقَوٍ Surface plane (F). Level surface (E).

١٣٦٣١ - سَطَوَاك هو الجدار القيد ، اطلبه .

١٣٦٣٢ - سَطَوَر * Suthora Nipalensis (S).

Suthora du Népal (F). طائر ويعد الجلس والنوع من الجوارح غرطويات المناظر وفصيلة الترقنيات. موطنه يتعد من الهند الى الصين ، يتكرر ويوجد في غابات التنبال. ملجته الحياني جامي. انواعه قليلة العدد. قوته الحشرات ويكتها ويرقاتها وثمار وايزور البرية || جسمه شبيه بالقرقف الكبير. طوله نحو ١٥ سم. يتميز ببقعته القصيرة وبذنبه المروحي الشكل حته الانقباض. ثوبه الى الخضار البنفسجي الماجة. يمتد الى البركة الصفراء اللواج.

١٣٦٣٣ - سَطَوَرِيَّين هو السطح ، اطلبه .

١٣٦٣٤ - سَطَوَر * Insolation (F). Sun-stroke (E).

هو الشمس ، اطلبه .

١٣٦٣٥ - سَطَاذِي * Carex, Lâche (F).

Carex, Sedge (E). Segge (D). Carico, Lica (I). جنس نباتات جلمودية معمرة من فصيلة السدييات. انواعها المبرومة زهاء ٥٠٠ سقها لثالية الاعلى. اوراقها

بامتدالة سقها وهي عصائية الشكل ثلثية الحروف الحادة التقاضية . ازهارها وحيدة الثقل متبيلة التجميع . جذاميرها طرية مبرقة || اشهر انواعها ما يليح .

١٣٦٣٦ - سَطَاذِي الرَّعَل * Carex hirta (S).

Carex hirsuta, Lâche des sables (F). نوع من السادي يطول من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مستطيلة البصل القصير القالب الحرف. ساقها فضية اللون. يعيش في الروال القاحلة ويستعمل لتثبيتها كاثب .

١٣٦٣٧ - سَطَاذِي بَلْدَنَسِي * Carex baldensis (S). Lâche du Mont Baldo (F).

نوع من السادي يطول من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مستطيلة شبيهة . سبلته الازهرية قصيرة مستعرضة تكتنفها ثلاث اوراق صغيرة شائكة || يرفب في المواقع الجبلية والارابة الكلسية.

١٣٦٣٨ - سَطَاذِي هَمْرَاغِي * Carex acrospes (S).

Lâche à hampe (F). نوع من السادي . قصبة ساقه غمرائية الشكل تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه شبيهة مستطيلة اقصر من قصبة الساق. حذوكه الازهرية يطول من ٨ الى ٢٠ سم. وهو عديد السنايل المنسية بالانهب والاخضر || يرفب في المواقع الظليلة والارابة الرطبة.

١٣٦٣٩ - سَطَاذِي هُنْدُوذِي * Carex beccina (S). Lâche à grappes (F).

نوع من السادي يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه حطلي من ٧٠ الى ١٨٠ سم. نصلها جلدي التجميع ، اريوطي الحظر . ازهاره حذوكي التجميع ، ساقها كبيرة اتقد لنها الى الحسرة || يعيش في المراكن والندال .

١٣٦٤٠ - سَطَاذِي هَدَاك

نوع من السادي يعرف بالنب ، اطلبه .

١٣٦٤١ - سَطَاوَر هو الكلب مرض عيبت ، اطلبه .

١٣٦٤٢ - سَطَاط Fragrance

الريح الطيبة من كل شيء واذهر واخضر واثار وويرها .

١٣٦٤٣ - سَطَب * Ezhre (F). To stretch (E).

سبب اثني مطه ونسب اثني تطط .

١٣٦٤٤ - سَطَك Capacité, Contenance (F).

هي القصور الاستياقي (E). Capacity, Excant, Area (E).

١٣٦٤٥ - سَطَقَر ، مَسَقَر Thymus (S).

Thym (F). Thyme (E).

جنس لبلات عشبية خشبية معمرة من فصيلة المغفويات. انواعها عديدة جميعها من الاثورية . مهادها البلاد المعتدلة . اوراقها صغيرة ، كاملة ، متعاقبة ؛ نصلها غدي الصلبة ، ازغب البشرة ، فده عصائية الارتكاز ذرية الحنجم خفية بطر التيميل || انواعها صغيرة اتقد ، حطرية الحرف ، وديسة اللق الى اوليك . اشهر انواعها يتبع .



سطائيل سبيلي



سطام



سطر



سادي الزيل سادي بالنبس



سادي غمرائي سادي هندی



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَاسِ



سَعْتَرُ أَرْبَا



سَعْتَرُ شَالَح



سَعْدُ شَرْقِي

١٣٤٦ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَعْتَرُ بَرِّي ، زَعْفَر
Thymus serpyllum (S). Thym serpolet, T. sauvage,
Serpolet (F). Creeping thyme (E). Feldquendel,
Thimian (D). Timo serpillio, T. salvatico, T. cedraeo,
Serpillio (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو نحو ٢٥ سم. ساقه فراء، فروصها
السفل أغنية الانتصاب، ثم ترتفع. أوراقه أحليجية. نصلها
مهبب الفصم، يبارز البروق، خلل البشرة. أزمان
وريدة اللون. يستخرج من أوراقه وأزهاره التيسول.

١٣٤٧ - سَعْتَرُ الْبَاسِ * ، سَعْتَرُ قَارِصِي ، حَافَا
Thymus capitatus (S). Thym de Crète (F). Headed
thyme (E). Kretischer thymian, Kopfthymian (D).
Timo di Crota (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقه لواء.
أوراقه بيضية الشكل، العلوية منها أعرض نصلًا من
السفل وأقل زيفًا وصلًا. أزهاره وريدة اللون. أوراقه
وأزهاره بلسمية العرف والمخ يستخرج منها حطر السَعْتَرِ.

١٣٤٨ - سَعْتَرُ الْغُرُطِ * ، سَيْسْتَرُ ، نَعَامَ ،
نَعَامُ الْمَلِكِ ، زَيْبَرِيَّة

Thymus glaber (S). Thym glabre (F). Wild thyme,
Mother of thyme (E). Wilde thymian (D). Sermolino,
Timo glabre (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقه خجلة
كثيفة الفروع المنتصب. أوراقه خيفة، مستطيلة،
نصلها حافر الفصم، مائل البصرة، خفيف الحصار.
أزهاره وريدة اللون يملوها موليح أريزوني || يرغب في
المواقع الرطبة.

١٣٤٩ - سَعْتَرُ شَاكِبِ * ، سَعْتَرُ شَاكِبِ

Thymus vulgaris (S). Thym commun, Farigoule (F).
Garden thyme, Pot-herb thyme (E). Thymian-
quendel, Gartenquendel (D). Timo comune, T. col-
tivato, Erbuocca, Popolina (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ساقه كثيفة
الفروع الخشوية المنتصب. أوراقه سنالية خيفة.
أزهاره ليلية اللون. يعيش في جميع الأودية. يفضل
الكسبة ويحب الرطبة || يستخرج من أوراقه وأزهاره
حطر السَعْتَرِ ويده.

١٣٥٠ - سَعْدُ

Cyperus (S). Souchet (F). Sedge (E).

جنس نباتات صفولية، عشبية، معمرة من فصيلة
السميات. أنواعه عديدة، جميعها منتقية من نباتات المناطق
الحارة. أوراقها سنالية مستطيلة. سيقانها شراخية يملوها
أزهار سليل التجميع تكثفه قسمة ورقية طولة من ثلاث
أو أربع ورقات || أشهر أنواعها ما يلي.

١٣٥١ - سَعْدُ الْأَحْمَرِيَّةِ

ويسمى سَعْدُ الْحَمَامِ، منزل من منازل القصر البانية يتزلفها
القصر في الليلة الخامسة والعشرين. وهو أرملة كواكب
متقاربة واحد منها، في وسطها، أنور الجميع. وقيل أما
هي سعد الاحمريّة لأن عند طلوعه تخرج الحشرات الخفية
من الأرض || يقب سعد الاحمريّة يدعى الزهرة.

١٣٥٢ - سَعْدُ الْبُكُورِ

سعد البارع نجمان متقاربان من كوكبة القوس الأعظم
مركزهما في السعد.

١٣٥٣ - سَعْدُ الْبِهَامِ Baham, Biham

سعد البهام نجمان ثيران من كوكبة القوس الأعظم مركزهما
على رأس القوس.

١٣٥٤ - سَعْدُ الْخَصْرِ ، سَعَارُ حُلُو ، عَكُوبُ ،

Cyperus alopecuroides (S). كَرْشِي
Souchet à nattes (F). Foxtail sedge, Maz sedge (E).
Zypergras (D). Giunco cannellino, Testa di riccio (I).
نوع من السعد الجلموري المداد، شراخه يملو نحو المتر.
أوراقه قروية خفية طولها ٧٥ إلى ٩٠ سم. وتعرض
من ٨ إلى ٢٠ م. نوته الزهرية فائقة || يعيش في
المتنق والأراضي الرطبة. أوراقه تستعمل في صناعة
الحصر.

١٣٥٥ - سَعْدُ الْأَذَاكِحِ

منزل من منازل القصر البانية. وما كوكبان ثيران بينهما
قيد ذراع، في بحر أحدهما نجم صغير كأنه يلعبه لقربه
منه || قال بعض علماء الفلك أن السعد الذابح كوكبان
متربعان على التلال منها كوكب صغير يكاد يلمس به
يسرى الذابح ولذلك سمى العرب السعد الذابح لزمهم أن
الذابح شاة وقد ذبحها.

١٣٥٦ - سَعْدُ السُّعُودِ Sedalsuud

منزل من منازل القصر البانية. وهو ثلاثة كواكب أحدها
ير والآخران دوله. والعرب تسميه به || يقب سعد
السعود يدعى الجبهة.

١٣٥٧ - سَعْدُ الْمَطَرِ

سعد المطر نجمان من كوكبة القوس الأعظم مركزهما على
الرربة البسي.

١٣٥٨ - سَعْدُ النَّكَالِ Cyperus natalensis (S).

Souchet du Natal (F).
نوع من السعد الجلموري المداد، شراخه يملو من ٦٥
إلى ١٠٥ سم. أوراقه مستطيلة خيفة النصل. سنابله
متوسطة الكثافة تكثفه قسمة ثلاثية الأوراق القصيرة.
يقب في الأودية المتوسطة الاندماج والرطوبة. يعيش
في المراك.

١٣٥٩ - سَعْدُ الْحَمَامِ Hemam, Homam

سعد الحمام نجمان من كوكبة القوس الأعظم مركزهما على
السنق.

١٣٦٠ - سَعْدُ بَلَحِ Albali

سعد بلع منزل من منازل القصر البانية. وما نجمان متقاربان
في البحر لمتساويان في القدر والقيس. ويسمى الأكبر
بالأ كانه بلع الآخر واحد ضوء. وهو من كوكبة الدلو،
طلوعه الليلة ثبتي من كائني الثاني وسقوطه ليلة ثبتي من
آب || يقب سعد بلع يدعى الطرف.

١٣٦١ - سَعْدُ شَرْقِي * ، سَعْدُ عُسْتَدِيرِ ،

سَعْدُ الْحَمِيرِ ، وَزْنِي ، صَبَاحُ الْخَيْرِ
Cyperus rotundus (S). Souchet rond (F). Nut-grass
(E). Runde zyperwurzel (D). Cipero orientale,
Stancia rotunda (I).

نوع من السعد المدام الجلمور. صفاته عديدة، بيضية
الشكل، كالقروية الرائحة. أوراقه مستطيلة. شراخه

Cours de change (F).

سر القطع

تعلو من ١٠ الى ٣٠ م. سنبله خازنة صويالية || يكثر في الارزة الوطنية. يتبر من النباتات الضارة.

Cours légal (F).

سر قانوني

Cours moyen (F).

سر متوسط

١٣٦٦٢ - سعد عطر* Cyperus longus (S).

Souche odorant, S. long (F). Gellingale, English galangale (E). Galgentwurzel, Langes zypergras (D). Cyparo lungo, C. odoroso, Cunzia (I).

نوع من السعد. جلموده مداد عطر لا صائل له. شراجه تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. لوراه شديدة الطول || سنبله مروحية الازنكار تكتنفها قسمة ثلاثية الاوراق || يمتش في المالحات وعلى ضفاف الماء.

١٣٦٦٣ - سعد مأكولي* هو سب الزلم، اظله.

١٣٦٦٤ - سعد مروحي* Cyperus flabelliformis (S). Souche en éventail (F).

نوع من السعد الجلمودي الزكوي. شراجه اسنخي الجوف، غليظ القاعدة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. لوراه جامدة التصل تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. وتبرش من ١٥ الى ١٠ سم. سنبله ازهرية مروحية تتجمع جملة الشكل. يزرع في المراكب. يرغب في الرطوبة المستمرة.

١٣٦٦٥ - سعد ظفلي* Cyperus alternifolius (S).

Souche à feuilles alternes, Petit papyrus, Ombrelle (F).

نوع من السعد الجلمودي البامد السائل. لوراه القرصية صلبة اللد، قليلة العدد. شراجه يرتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم. تعلو سنبال زهرية مظلمة الشكل تكتنفها قسمة رفيعة يتراوح عدد اوراقها من ٦ الى ٢٥ || يكثر زراعته في المراكب لانه سبروي وجبل الخصار.

١٣٦٦٦ - سعدان* Singa (F). Ape (E).

سعدان، قرد. اسم شامل يطلق على جميع انواع القرد ج سعادين. حلقة اللذي فيقال لها سعدانة (السان).

١٣٦٦٧ - سعدان، قرد* Singa (F). Ape (E).

اسم شامل يطلق على جميع انواع القرد ج سعادين.

١٣٦٦٨ - سعدان، وكلمة* Chêne (F).

Chêne (F). كلمة. زائدة قريبة للمادة تعلو قائمة القرس.

١٣٦٦٩ - سعدان* Chêne (F).

سعدان اللذي : ما اطاف به كاللثة. وفي اشد مدخل الجردان من ثلبة القرس.

١٣٦٧٠ - سعدان* Cyperaceae (S).

Cyperaceae (F). Cyperaceae (E). فصيلة نباتية من سعاديات الفلقة تشمل السعد والسادي وسب الزلم.

١٣٦٧١ - سعد* هو الكلب مرض شيت، اظله.

١٣٦٧٢ - سعد، هيتي* Taxa (F). Price, Rate (E).

تعرفة الفوائد السنوية التي ينتجها مبلغ قدره ٢٠.

١٣٦٧٣ - سعد* Cours (F). Market, Price, Rate (E).

هو ما يتقدم عليه من البضاعة يما وشراء على ان تكون الصفقات متتالية كالمتقدمة في المصنف، وسر السوق... وهذا السر قد يكون :

١٣٦٧٤ - سعد* Cours forcé (F).

سر الزامي

١٣٦٧٤ - سعد القابليل* Taux de capitalisation (F). Capitalization rate (E).

هو السعر الذي تكتنه شركات التابليل والتأمين لحساب فوائده الاموال والاحتياطيات.

١٣٦٧٥ - سعد الخصم* Taux de l'escompte (F). Rate of discount (E).

هو السعر الذي تحسب به كل عمليات الخصم والقصر في يوم معين وسوق معينة.

١٣٦٧٦ - سعد القابلة* Taux d'intérêt (F).

Rate of interest (E). سر القابلة يكون اما قانانيا وهو ما يقره القانون او اتفاقيا وهو ما يحدده الاتفاق.

١٣٦٧٧ - سعدان* هو الاناباز جنة برية تصنع في تخلف الثياب.

١٣٦٧٨ - سعدان* Anabaz (F). Anabaz (E).

سبط من فصيلة السمقيات.

١٣٦٧٩ - سعدان* Calorie

هي الوحدة الحرارية او الوحدة في قياس الحرارة.

١٣٦٨٠ - سعدان* Palma (F). Palm (E).

هي قصب النخل وهي مركبة من جريدة تحمل الحوص اي الوردقات.

١٣٦٨١ - سعدان* هي القروية، اظله.

١٣٦٨٢ - سعدان* فراشة حلوية كمن قوية الثياب، اظله.

١٣٦٨٣ - سعدان* فراشة حلوية كمن قوية الفراء، اظله.

١٣٦٨٤ - سعدان* فراشة حلوية كمن قوية الشوار، اظله.

١٣٦٨٥ - سعدان* هي القروية فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة.

١٣٦٨٦ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٨٧ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٨٨ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٨٩ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٩٠ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٩١ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٩٢ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.

١٣٦٩٣ - سعدان* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكرا واثي يتبعها من الصغرين الى الثلاثة. الاثي تقع ولدا واسدا رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر الازرق. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر والذره وبعض الفول. وهو يألف الثياب الكيفية والنياض البعيدة عن كل عمران.



سعد عطر



سيلة

١٣٦٩٨ - سَمَكَة * Mycetophagus (S).

Mycetophage (F). Mycetophagus (E).

جنس حشرات من فصيلة السفاجيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض غابات وسراخ البلاد المتحدة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، متدلة الاحدياب ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م. رؤوسها مستديرة الجرم ، غروبية الشكل. حيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. كواسلها متدلة الجرم. احمادها لاحقة ويلوحا تحدي قاطب. قوائمها نشيطة. اوتوبها ثنائية البين || تألف الغابات والخارج تعيش على بعض انواع القفطور من الفاريقيات والسيمات .

١٣٦٩٩ - سَمَكَة جِيَات * Mycetophagidae (S).

Mycetophagidae (F). Mycetophagidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة ، اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في سطر غابات وسراخ البلاد المتحدة الحرارة ، اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها متدلة الجرم. حيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. مركبة من ١١ فصلة. كواسلها كبيرة. احمادها لاحقة. قوائمها نشيطة. ارساخها رباعية البقل. اوتوبها ملونة || تألف الغابات والخارج. تعيش على بعض انواع القفطور اعصمها المتنية الى الفاريقيات والسيمات || اشهر اجناسها السفاجة .

١٣٧٠٠ - سَمَكَة ، كَوْم Coputia, Sallia (F).

Coputia, Covering (E).
نرو ذكر الحويان الى الانثى. اذا غرِب الجواد الحبر قيل قما وزا .

١٣٧٠١ - سَمَكَة ، سَكَط Opercula (F).

Gill-cover (E).
السطاط والسفط ج اسقاط. هو القشاة القفروني المادة الذي يلبس التجويف الخيشوي عند الاسماك. وما سقاطان او سقاطان ايم وابسر .

١٣٧٠٢ - سَمَكَة طَائِفَة * Callimorpha dominula (S).

Callimorpha dominula (F). Callimorpha (E).

حشرة من فصيلة السقاطيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا الجنوبية والقرية . فرائسها صلبة تعيش على ذخيرتها المعوية . سربتها خاضلة قوتها اوراق النبات واحصها الحس والهندباء والقراس والنبج ولسان الحمل ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ م. يستطاع تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. وأنها متدلة الجرم. حيتاها كيرتان. زباناها خطيان. مرشها جعفة. حيوستها كيثف الحمل. كسني البين. بطنها احمر يطو مراح وودي وسط لبني قاطب شديد الاسرة || روشناها الاناثيان الى الخضار الانلاس تملو بقمع مستديرة صفراء وبقتان برتقائيتان. روشناها الخلفيان الى الحمرة يطو مراح صناعي ويطو حمار كسني اسود وبقتان وبقة طرية يحمل كامل التزام الاخير. تنضيب روشن الاثى لا يختلف الا بالبرتقالي الذي يتحول الى حطبي || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في الليل. تماثل على ظهرها باسوب

١٣٦٩٧ - سَمَكَة

ما تملك من اللغز الاصل من البير ونحوه .

١٣٦٩٨ - سَمَكَة الشَّجُوم

سمك النجوم عشرة وهي سمك بالغ وسط الاعية وسمك اللانيم وسمك السمود وسمك الاربية من منازل القمر . ثم سمك نائرة وسمك الملك وسمك البلام وسمك المارم وسمك البارح وسمك سطر وسمك البتة ليست من المنازل. كل منها كوكبان.

١٣٦٩٩ - سَمَكُوط هو الاغصيا ، اطلها .

١٣٦٩٠ - سَمَكُوط ، عَطُوس Tabac & priser (F).

Snuff (E).

مسحوق التبغ يستعمل شأ الكثيف ، يستحصل عليه من اوراق التبغ المسحوق بعد تنعيمها ويزنها ببعض المواد العطرية او الحريفة || وقد تحلفت قيمة السموط باختلاف صفته وبنواده الاولى اذا كان مسحوقا تصال الاوراق او شلوها .

١٣٦٩١ - سَمَكِير هو الماكاك المهيون ، اطلها .

١٣٦٩٢ - سَمَكَب Beasin d'eau (F).

Wart water (E).

صنن الزرع والنبات .

١٣٦٩٣ - سَمَك * Coluber lineatus, تشاباب

C. jaculus, C. asotus (S). Dard, "Serpent volant" (F). Coluber lineatus, C. jaculus (E).

حية يبروس من البواقيات وفصيلة الحفشيات غلليات الاعاميد . جسمها قليل التضامة يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبا الى الكمية الريدا يطو خط اسود يمتد من الخلف الى طرف الذنب وضمان احمران عايقان ايم وابسر يمتدان من الشفتين الى الذنب . رأسها لوزي الشكل . زاوية شفتها فسيحة الملاتي . حيتاها صغيرتان ، حادتان . عدد استناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاصل من اسفلها اربعة صفات ثابتة خلفية الارتكاز تهرين السم في كل عضو تصببه عندما يرق حتى مستواها الداعلي || تألف الاخراج والمضاب ، تملق الاشجار وتلقب كالسم من حيرة الى اخرى ومن كل مكان مرتفع الى آخر متفطش || بيتها الشتوي يمتد نحو خمسة اشهر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والوزغ والقطا والفئران والجرب . تنقص في غريبتها الكبيرة الحجم بالتفليس ثم تبطلها بعد ذلك || اغلاقها شربة . فسيها صغير حاد . تبلي كامل نحوا بمر ١٥ سة وتعيش نحو ١٢٠ سة || الاثى تسلك بمر خمس سنوات وتضع من ٢٤ الى ٢٥ بيضة مجعومة في سجين تطهرها في وقع دافئ جنوبي المرش || تحير من التصابين الخفية .

١٣٦٩٤ - سَمَكَة الإجماس هو حلة الاجاص ، اطلها .

١٣٦٩٥ - سَمَكَة الزَّرْع هو حلة الزرع ، اطلها .

١٣٦٩٦ - سَمَكَا Plante épineuse (F).

Thorny plant (E).

كل شجر له شوك .

١٣٦٩٧ - سَمَكَا ، شَعَاك ، حَمُوك Barbe de bœ (F).

Beard of corn (E).

هي حسك شتية الحقة والشير .



سَمَكَة



سَمَكَة



سَمَكَة طَائِفَة

وتفتح المكن لطخاً على فصائل الأزراق || السرة طول نحو ٤٢ م. جسمها اسطواني الشكل ، مثلث السك ، أسود اللون طول ثلاث خطوط من النقطة الصفراء وضلعاً الى الزرقاة الرصاصية . ثعلبها متوجة بالهلب الاسود || طول الاكامل الذي يستمر من ٢٤ الى ٣٧ يوماً ويتفشي ضمن صلبة متينة الهلبك تسحبها السرة تحت ثقلور الانجبار وفي شدة الرعي .

١٣٧٠٣ - سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ *

Callimorpha dulcitra (S). *Callimorpha agreeable* (F). *Callimorpha dulcitra* (E).

حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . قراشها جارية قوتها رقيق الأزهار وظلها . سرتها خاضعة قوتها اوراق النباتات العشبية || جسمها مسطو القد طول نحو ١٧ م. . بسطها تراوح من ٥٠ الى ٥٥ م. . رأسها معتدل الجرم . ميناءها كيرتان . زبالها خضبان . مرشها مستطيل . جوشها بني اللون كثيف الغل . بطنها احر اللون يملو غط ثجبي قلب اسمر || روشتها الانسيابية الى الكشحي الاسود الموج يملو تقيج ابيض . واصفر وزربان من القلط البهش والصفير . رواش الاثى عادمة التقيج . روشتها الخلفيان الى العشرة البرتقالية يملوها تقيج متبضع كمن || غا جمل واحد في الحول . تظهر القراشة في حزيران . تسرح في الليل . تعاطل بمد ظهورها ينمو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من فصائل الاوراق || السرة طول نحو

٣٥ م. . جسمها اسطواني الشكل ، اسود اللون ، اصفر التقيج ، مثلث السك تملو في كل ثلثة فسة من الهلب الاثري . رأسها اسود . مداه الى الحطلة القائمة || طول الاكامل يستمر نحو ٢٤ يوماً ويتفشي ضمن صلبة تسحبها السرة بين فروع النبات ولقصبها .

١٣٧٠٤ - سَفَاطِيَّاتٌ *

Hymenophyllidae (F). السفاطيات فئة من الرصاص مستورات الزهر الوالية .

١٣٧٠٥ - سَفَاطِيَّاتٌ *

Callimorphidae (S). *Callimorphidae* (F). *Callimorphidae* (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة عطلات القرن . اجناسها وانواعها المروفة نحو ١٢٠ معظمها من حشرات البلاد الحارة المنتشرة نحو الاستوائية || جسمها معتدل القد . اجسامها فيه اسطواني الشكل . رؤسها صغيرة . ميناءها زائفة . قوتها الاستشارية خيطية . بسطة . ملابسها صغيرة ، جالسة . مراشها كبيرة ، مصطلة . رواشها الامامية اكبر من الخلفية واقل استدارة منها واكثر ثجبياً وزرಕ್ಕೆ . سداتها جانبية الارزكاز ، مصطلة الجرم . ارتجلها ثامة اللنو ورياعة المنطس || مكها مكرور الشكل . اسارها مثلثة النشار ، ضمية الهلب . عاداتها تلتصق بصلبة متينة محدة الهلبك || اشر اجناسها السفاطة .

١٣٧٠٦ - سَفَاكِيٌّ *

Cochlearius cochlearius (S). *Savaco huppé, Bec-en-cuiller* (F).

طائر من طول الساق وضعية اليشونيات . اساطه المناطق الاستوائية الامريكية . تألف صفات الاثري وللتاين مسرعه دجري يستمر طوال الليل . قوته الاساك والقشاق والزرزغ والقنداق والرعوعات ... || جسمه مكنل معور .



سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ



سَفَانٌ



سَفَانٌ



سَفَانٌ



سَفَجُورُ الزَّرَقِ

١٣٧٠٧ - سَفَانٌ *

Cephenium (S). *Cephenium* (F).

جنس حشرات من فصيلة السمينيات ورتبة عثبات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٥٥ منتشرة في جميع اطراف العالم || اجسامها صغيرة ، طولها من ٢ الى ٣ م. . رؤسها صغيرة شبه مكورة . ميناءها قليلة البروز . قوتها تآشيرها وتكوكها صغيرة . ملابسها كبيرة . قوتها الاستشارية صولطانية . كواسها مخدبة ، فيه اريسة الشكل ، الحامدا لاسطة ، عادمة التقيج . قوتها نسيطة . انواها وسيدة اللون ، يكر فيها المجزوي الاسلم فالاسود فالاصفر فالاصفر فالاصفر || تألف المراج والقنات حيث تكثر الضباب التي تعيش عليها .

١٣٧٠٨ - سَفَانَاتٌ *

Sphagninidae (F). *Sphagninidae* (E).

رتبة من الضباب تشل نصليتي السفايات والقزنيات .

١٣٧٠٩ - سَفَانَةٌ *

Hypophylus seven (S). *Séphen* (F).

حيوان بحري من السفقيات الاطلاق وفصيلة الطرقينيات . اصطله كمنه من الخليج العربي الى الصين || جسمه بما فيه القالب يطل نحو ١٨٠ سم. . ثوبه الطوي الى السرة الحطية الموج . ثوبه السفلى الى البيرة اثنية . منجسه اللابل نحو ١٥ سم. || لحمه متوسط الصنف ، مأكول . اما جلده فخاخر الصنف مغروب فيه .

١٣٧١٠ - سَفَانِيَّاتٌ *

Sphagnacidae (F). *Sphagnacidae* (E).

فصيلة من الضباب تنصلي الى رتبة السفايات اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الضباب .

١٣٧١١ - سَفَقَجَةٌ *

هي الاسطراف ، اطليه .

١٣٧١٢ - سَفَجُوجُ الرِّيحِ *

Direction du vent (F). *Direction of wind* (E).

وجبة هبوب الرِّيح .

١٣٧١٣ - سَفَجُورُ الزَّرَقِ *

Dryops caerulea (S). *Dryops bleue* (F).

Dryops caerulea (E).

حشرة قانصة وانجبة من فصيلة السفجوريات ورتبة عثبات الاجنحة . تألف المروج والمراعي وضلعان مجاري الماء . قوتها للواد الضوية وبأ قسطل اقتناصه من الحشرات الدنا . || جسمها صغير لقلد طول من ٩ الى ١٠ م. . قوتها الى الزرقاة خلد سفي وجوز اسف . رأسها مخروطي صغير . فكها ذربان . ميناءها كيرتان جاسطتان . زبالها عيطان دقيقان . ظهورها لا يلف السكة

المهزلة الرياح المحوج . يرغب في الاربة العميقة الغور المتوسطة الانتاج والرطوبة الموزونة التركيب الحكسي . ثماره تحسن صفات في الاربة الجنية || يتكاثر بالبذر والتغصن والتفريد والتغصن || ينمو على ابعاد تراوح من ٤ الى ٦ امتار || وهو من الانجبار التي يفسدها التقليل لانه يجد من نشاطها بين مقدورها الانجابي . اشهر شروبه الزراعية ما يلي .

١٣٧١٨ - سكرجكل البرتغالي C. du Portugal
ضرب سيروني يطول نحو ٦ م . ثماره كبيرة اللد متوسطة الوسط . مزينة الرأس والغلب . لهايا خضر الصارة متوسط النضوة || ينمو في جميع الاربة المعتدلة التركيب العميقة الغور || ينشئ الجفاف وكثرة الكلس والربل .

١٣٧١٩ - سكرجكل الصين
هو الشنط الصيني ، اطلبه .

١٣٧٢٠ - سكرجكل اليابان
هو الشنط الياباني ، اطلبه .

١٣٧٢١ - سكرجكل النجم C. d'Angers
ضرب جاحد يتطلب مواقع خاصة لانه ينشئ الصقيع . يطول نحو ٤ م . ثماره كبيرة اللد . فزيرة الصارة ، صطرية العرف ، ذكية العلم ، قليلة النضوة || ينمو في جميع الاربة العميقة الغور ما عدا الكلسية والرملية .

١٣٧٢٢ - سكرجكل شمسين C. champion
ضرب امريكي واسع الشجرة . فطره شديدة النشط فادقة تلون نحو ٧ م . ثماره كبيرة اللد ، ذكية العلم والعرف ، فزيرة الصارة ، قليلة النضوة || ينمو في جميع الاربة المتوسطة الانتاج والرطوبة .

١٣٧٢٣ - سكرجكل عادي C. commun
ضرب سيروني صنع الانتشار يعيش في معظم الاربة والمواقع . يطول من ٢ الى ٤ م . ثماره كروية متوسطة اللد . لهايا متوسط الصارة ذكي العلم والعرف .

١٣٧٢٤ - سكرجكل هندي
هو الدوسينة عجيبة شمرة ، اطلبه .

١٣٧٢٥ - سكرجكل * Coing (F). Quince (E).
ثمرة السفرجل . لهايا جامد للمكسر حامض العلم ، متوسط النضوة ، يستعمل في المربيات . يزودها لزجة شامة الاستعمال الطبي .

١٣٧٢٦ - سكرس Saxifraga (S). Saxifrage (F).
Saxifraga, Rockfool (E). Steinbrech (D). Saxifrage (I).
جس نباتات عشبية من فصيلة السفسريات . انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها عشبية خشبية . اكثرها معمرة ومنها حولية وشجيرة . معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اورثاها متعلقة ، صغيرة اللد ، لحية النسيج ، لهايا البسطة والمفرشة والمستنة . تصالها خلي البشرة منتج الصفة . ازدهاها خلمية التركيب . يزودها صغيرة الحجم تكثر فيها الانتشار || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

الفريشة . هذاها تصاحبها التحيز المتساوي الخطوط . ارباها خلمية العقل || لها جبل واحد في الحق . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتمشي حتى اواسط ايار . تسرح في التبار . تساق في اوائل الربيع وتضع المكن تحت الحافة والقصور الصلبة وتعلم والحجارة وفي ثقوب الاعشاب الناعمة || والبرقة منذ تمام اذكاها تلون نحو ١٥ م . جسمها فيه اسطواني الشكل اسمر القرب ، كثيف الغلب . اسود الرأس والرقاب والشرج المهزب بركين دقيقين || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اشابيع ينشئ في التربة .

١٣٧١٤ - سكرجوريات * Drypidae (S). Drypidae (F). Drypidae (E).

فصيلة حشرات لاحة من رتبة خمليات الاجنحة . اجناسها وانواعها المهزلة قليلة العدد ، معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المرامي والنياس والمواقع الرملية || جميعها صغيرة اللد ، جملة الانواع الزراعية الباعة . دروسيا مستعيرة ، مستطلة الاطعام والازدحام . عيونها جاحطة . كواسلها متوسطة مستطيلة . اجناسها مقلوبة الاطراف ، تصاحب الخفوة المتوازية || تسرح في التبار وتعيش في الليل . تسمى بمرقة وتطير بشفة || قوتها المواد المضوية المختلفة المصادر . اشهر اجناسها السفسجور .

١٣٧١٥ - سيفدليل * * سيفدليل * Cavadilla (S). Cavadilla, Cavadilla (F). Cavadilla, Cavadilla (E).

نبات عشبي دولسي طلي معمر من فصيلة السورجانيات . اورثاها قرصية الانتشار ، عصلية الشكل ، مستطيلة اللد ، ازدهاها سبلي التجميع يركتز بل شراج دقيق مسط . انجاس صغيرة اللد ، ارجوانية اللون سود المراج . ثمارها جرابية الشكل ، يزودها دقيقة ، مضلمة ، قسيمة اللون || يستخرج من يزودها عدة مواد قلوية اقهرها السنفيلين والخربيثين والخلص الخريفي || مسحوق يزودها شديد الفاعلية كان ولا يزال يستعمل في القضاء على القمل .

١٣٧١٦ - سيفدليلين * * سوكايلين Cavadilla, Sabadilla (F). Cavadilla (E).
مادة فيه قلوية لا تتكبر لتستخرج من يزود السنفيلين ويظهر .

١٣٧١٧ - سكرجبل * Pyrus cydonia, Cydonia oblonga, C. vulgaris (S).

Cognassier, Colgnassier (F). Quince tree (E). Echte quince, Bruquitta (D). Cotogno, Pomo cotogno (I).
السفرجل ج . سفارج صفاريل . ثمرة شمرة من فصيلة الورديات وصيدة الجنس والتروخ عديدة القسود . ثمارها مأكولة وترهب . يزودها طيبة . ينشئ تلون من مرتين الى ثمانية امتار . ساقها قصيرة سرسة حمراء اللون . اجناسها فارقة متوسطة . اورثاها عابدة ، بسطة ، كاملة ، متعاقبة ، ينشئ الشكل ، قليلة النضوة . تصالها بارز المروق ، خلي الصفحة السفلي . ازدهاها خلمية التركيب لنشأ الى البياض الوردية . ثمارها كروية الشكل او شبه كروية مستطيلة ، كبيرة اللد ، لحية البشرة ، مسحة العرف ، جامدة اليا . عيونها تألف من ٥ غرفيات تحضن الكثير من البذور || يعيش السفرجل في الاقاليم الحارة والمعتدلة . ينشئ الملقح الطليقة



سفنيل



سفريل



سفرجلة

١٣٧٢٧ - سُقَرَسُ الحَصَى *

Saxifraga granulata (S). *Saxifrage granulée*, Herbe à la gravelle (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها حرة ككلوية. نصلها مفصص الحثار. ازهارها كبيرة اللدة، بيضاء اللون، صطرية العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران || يقال انها طيبة، اورتها نافعة تريل البول والحصى.

١٣٧٢٨ - سُقَرَسُ الظِّل *

Saxifraga des ombrages, Mignonnette, Désespoir du peintre (F).

بجلة جادسة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراتها احليجية رفيعة، عتقها كثيف الزئب. نصلها مقر الصفص. مشفاري. الحلة || ازهارها مستترفة بيضاء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. رطب في الموائع اللطيلة التمشيط العرطوة.

١٣٧٢٩ - سُقَرَسُ عَشِين *

Saxifraga aspera (S).

Saxifraga rugueuse (F).

بجلة سبروتية معمرة رطب في الاثرية الرملية. تملو نحو ٢٠ سم. اورتها غاذقة الرواكيب. أوراتها صغيرة، نصلها مهدب الحثار، يطول نحو ١٥ سم. وعرس نحو ٣ || ازهارها بيضاء اللون وكسوها مروج اصفر. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٧٣٠ - سُقَرَسُ سَرَحِي *

Saxifraga sarmentosa (S). *Saxifrage sarmentueuse* (F).

بجلة جادسة معمرة تملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوراتها مستحية بالايض والاخر. حثار نصلها ارجواني. ازهارها حري الشكل، ازهارها يمش تملوها مشية صفراء || زهر من ايار الى تموز.

١٣٧٣١ - سُقَرَسُ سَرَحِي *

Saxifraga crustata (S). *Saxifrage incrustée* (F).

بجلة معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراتها كلوية الشكل نصلها مذهب الصفص، سرجي التتجزع، اصفر الحثار || ازهارها حثكوية التجميع غامية الارتكاز لونها الى البياض المشع بالابيض || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. رطب في الاثرية الكلسية.

١٣٧٣٢ - سُقَرَسُ سَرَحِي *

Saxifraga cymbalaria (S). *Saxifrage cymbalaire* (F).

عشبة حولية جادسة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها صفراء اللدة، مستترفة الشكل، خلية لو سباعية التتبعص الكولي، نصلها مشج بالايض || ازهارها صفراء. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

١٣٧٣٣ - سُقَرَسُ طَحْلِي *

Saxifraga hypnoides (S). *Saxifrage mousse*, Gazon d'Angleterre, G. turc, G. mousse (F).

عشبة سبروتية معمرة. اورتها مستطيلة الرواكيب اليفضورية. ساها موزقة تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراتها قوية التجميع. مستطيلة الاثاق الزغصة الاسطوانية || ازهارها يمش. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || رطب في الاثرية الرملية والموائع الجلية.

١٣٧٣٤ - سُقَرَسُ كُسُوي *

Saxifraga cuscuteformis (S). *Saxifrage-cuscuta* (F).

بجلة رطبة معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها مستحية،

مكوبة، نصلها خلى البثرة، سنن الحلة. ازهارها حري، قليل الكلفة. ازهارها يمش بطولها مروج اصفر. تيش في الراكن. زهر من حزيران الى تموز.

١٣٧٣٥ - سُقَرَسُ مَقْرُونِي *

Saxifraga cuneifolia (S). *Saxifrage cunéiforme* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها قرصية التجميع. نصلها غروبى الشكل، اعشر الصفص العليا، جزوي السفل. ساها عاصمة الورد. ازهارها صفيرة اللدة بيضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب. تخشى الموائع الحارة.

١٣٧٣٦ - سُقَرَسُ مُسْتَكْبِلِ الْوَرَق *

Saxifraga rotundifolia (S). *Saxifrage à feuilles rondes* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساها موزقة. أوراتها كلوية الشكل. نصلها خدي التبعج، خلى البثرة. سنن الحلة. ازهارها مشقة بالاصفر والاخر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٧٣٧ - سُقَرَسُ مُسْتَكْبِلِ الْوَرَق *

Saxifraga longifolia (S). *Saxifrage à longues feuilles* (F).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٨٠ سم. أوراتها مستطيلة. نصلها مقر الصفص. ازهارها كثيرة العدد، بيضاء اللون، يطول نحو اصفر ومشفة حراء || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٧٣٨ - سُقَرَسُ مَيْفِيكُر *

Saxifraga myota (S). *Saxifrage changée* (F).

عشبة جادسة حولة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها متعاقبة احليجية، نصلها جامد الصفص، مهدب الحثار سنن الزام الاخير || ازهارها حري الشكل. ازهارها مديدة البتلات لونها الى الصفرة بطولها مروج رتقالي. زهر من حزيران الى آب. رطب في الاثرية الكلسية.

١٣٧٣٩ - سُقَرَسُ مُشْتَبِه *

Saxifraga secundaria (S). *Saxifrage dressée* (F).

عشبة سبروتية حولة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها غروبية الشكل، ثلاثية التتبعص. نصلها خدي ترج. ازهارها تير ودية وتلتي بالايض || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٧٤٠ - سُقَرَسِيَّات ، سُقَرَسِيَّات

Saxifragaceae (S). *Saxifragaceae* (F). *Saxifragaceae* (E).

السقرسيات او القلييات كما سماها بعضهم فصيلة نباتية من ذوات القلتين عطلة القنات. اسماها وابجها وانواعها كثيرة العدد. معظمها نباتات شوية. جميعها خشوية الازهار، قليلة البزور.

١٣٧٤١ - سُقَرَكِيَّة * سُقَرَكِيَّة

Sphyraena spec (S). *Sphyrae*, Brochet de mer, Espec (F). *Ses-pite* (E).

سمكة بحرية من شاكات الزنائف وحيدة الجنس والتوع موطنها مياه البحر المتوسط. تتميز بسلطانها. رها ذلق الخمل. نوما الى الرية الكفصية يتبع من اقترابه من فيج الظهور || وفي من اسماك الشولي النباتية، جيدة الصنف، مستحبة العلم.



سُقَرَسُ الحَصَى



سُقَرَسُ سَرَحِي



سُقَرَسُ شَشَن



سُقَرَسُ سَرَحِي



سُقَرَسُ سَرَحِي



سُقَرَسُ مُسْتَكْبِلِ الْوَرَق



سُقَرَسُ طَحْلِي



سُقَرَكِيَّة

Spongipellis

١٣٧٥٣ - سَنَدِيَّات

فطر من السيات يركب اششاب يقض الراتنجيات اعصابا التنوب والاسفوفه فيصيب الطفن المكسبي الذي يشقق الخشب ويفصله ، بالطول والعرض ، الى مكعبات متراكبة متتابة عديدة الصلابة تحيطها من جميع جوانبها اغشية للمشحج الحليمية الحطعية اللون || اما اللشجر فثقبته كلوية الشكل قطرها نحو ٤ سم. اطرافها غائرة متخلية مركبة من طيتين العليا اسفنجية الميكال سماكتها نحو ٣ م. والسفل ليفية حرسية سماكتها من ١ الى ٥ م . خضابه قليل الالوان يظلم فيها الحطبي واليتبي . لبابه ابيض . بويضاته اهلالية الشكل طولها من ٣ الى ٥ ميكرون .

Ruscus (S). Fragon (F).

١٣٧٥٤ - سَنَدِيَّات

جس نباتات سرخسية عشية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها عديدة . سوقها مضامة . رذاتها جلدية ، سنانية الشكل . انهارها نصلية الانثخاب . ثمارها عتية حمره اللون . يزورها سيد || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٧٥٥ - سَنَدِيَّات ذُلُي ، حَبَّ النار

Ruscus hypophyllum (S). Fragon hypophylle, Laurier alexandrin (F). Alexandrian laurel (E). Alexandrinischer lorbeer (D). Rusco a foglie nude, Lauro alexandrino (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤ الى ٨٠ سم. رذاتها تحمل من ٥ الى ٦ انهار . انهارها ثنية اللون . ثمارها الى الحرة المابطة .

١٣٧٥٦ - سَنَدِيَّات كَبِير ، هو الرعد ، اطلبه .

١٣٧٥٧ - سَنَدِيَّات لاسع

Ruscus aculeatus (S). Fragon piquant, Petit-houx, Houx-fralon, Buis piquant, Myrte épineux (F). Butcher's broom, Knae holly, Box-holly (E). Echter müsedorn (D). Ruscopungente, Brusco (I).

جنية ذفلية برية وزينية ترهب في الاربة الكنسية . تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. رذاتها صلبة ذلقة مديدة لاسعة . انهارها فردية او ثنائية التجميع ، غشراء اللون . جذاميرها طيبة لتدخل في بعض المستحضرات النباتية وفي مدقة القيق تلبه الحقم وتقتطع الدم .

١٣٧٥٨ - سَنَدِيَّات لسن ، لسان الفرس

Ruscus hypoglossum (S). Fragon hypoglosse, Langue de cheval (F). Horse tongue, Double tongue (E). Zungenmäusedorn (D). Rusco lingua-pagans, Bislingus (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رذاتها لسة سنانية طولها من ٦ الى ١٢ سم. انهارها عتقية ثلاثية او خماسية التجميع .

١٣٧٥٩ - سَنَدِيَّات لُيُون ، هو الحرقلة لناعمة ، اطلها .

Sphnodon (F).

١٣٧٦٠ - سَنَدِيَّات

حيوان بيوض من غطويات الروس يقضى ايضا هتيره ، اطلها .

Sphindidé (S).

١٣٧٦١ - سَنَدِيَّات

Sphindidé (F). Sphindidé (E). فصيلة مشحات من غطيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المحصلة الحرة

Grain de poussière (F).

١٣٧٦٢ - سَنَدِيَّات

Grain of dust (E).

اصغر ما يكون من ذرات البقيق والغراب وهي التي ترتفع كالتيار .

Sophisme (F). Sophism (E).

١٣٧٦٣ - سَنَدِيَّات

الفسطة برنة استدلالية مغالطة .

Ecal'e d'oignon (F).

١٣٧٦٤ - سَنَدِيَّات

Scale of onion (E).

سقط ج اسفاط . كل طبقة من طبقات البصلة لتحي سفاطاً .

Grain de colocynth (F).

١٣٧٦٥ - سَنَدِيَّات

Seed of colocynth (E). سلع . حبة الخنظل ج . سلع .

١٣٧٦٦ - سَنَدِيَّات المتخريجين

Catarrhiniens (F). Catarrhiniens (E).

في مجموعة قريود العالم القديم من آف تخريز متقاربان ويقربها تحت الالف || انواعها واجناسها كثيرة العدد تجتمعها ثلاث فصائل : اشباه الانسان والمجربيات والمجربيات .

Macrocyte (S).

١٣٧٦٧ - سَنَدِيَّات

Macrocyte (F). Macrocyte (E).

لبات بحري من اشنيات البحر . اطلاته مطع بحار الناطق المعتلة الحمرارة || كلاليتها نشطة قوية . صالة وصيلة السرعة المبط ، تقطو من ١٠٠ الى ٥٠٠ م .

١٣٧٦٨ - سَنَدِيَّات

Peau écailleuse (F). Scaly skin (E). سكين هو كل جله اعشن كجلد التسلسل .

Raja sephen (S).

١٣٧٦٩ - سَنَدِيَّات ، سَنَدِيَّات

سكة من الشقين كبيرة القد تقطو نحو ٨٠ سم. مرتها قاع البحر .

Cacoepongie (S).

١٣٧٧٠ - سَنَدِيَّات

Cacoepongie (F). Cacoepongie (E).

ويحى الاسفنج الجامة . جس حيوانات بحرية ركنية من الاشويات وفضيلة الاسفنجيات . انواعها المرفقة قليلة العدد اطلاته مطع مجاح البحر الابيض المتوسط || تتميز بألوانها القزمية التركيب الجامة التي لا تصلح للاتصال .

Siphneus (S). Siphné (F).

١٣٧٧١ - سَنَدِيَّات

جس حيوانات لبونة قاضية جامة من المكبريات وفضيلة القاربات . انهاره خسة جميعها صغيرة لقد موطها البلاد الاسورية من الصين حتى بحر قزوين || اجسامها رمية تقطو نحو ٢٥ سم. اذناها ٣ سم. روتوها شبه كروية . عينها صغيرة . اذناها لافقية . جرابها قصيرة خماسية الاصابع . اطرافها مستطيلة مقوسة جامة تمكها من سرعة الحفر في التربة || انهارها الى الكهة كثيرا . تبقي عند الظهر . ويبيض عند البطن || قوتها الاحشاب والجذور ويسائر المواد النباتية .

١٣٧٧٢ - سَنَدِيَّات ، سَنَدِيَّات

طائر كثير الاستئان (الميري) .



سَنَدِيَّات



سَنَدِيَّات



سَنَدِيَّات لاسع



سَنَدِيَّات لسن

١٣٧٧٣ - سِقَائِيَات (F). Buses, Buzétons (F).

عجزة طير من فصيلة السقريات تغزل حبة اجناس : البقاعة ، الصرارة ، الخولم ، النعيل والفرناق . جميعها ربة الجفة . وروصها خضرة . مناسرها قصيرة عذبة البهرة اللرية . سولطها وانثائها مستطلة . ارساها قصيرة . غالبا قوية . اطافرها شديدة الانقباض || مهددا العالم . قوتها القواضم والنفقات والحشرات لذلك فهي من الطيور النافعة || تنس اركائها في الاشجار الباسقة الرقيقة . انثائها تقص من رفة إلى اربع زفات تحضنها بتدوير الذكور نحو اربية اساميع .

١٣٧٧٤ - سِقَائِيَات (F). Buteo (S). Buss (F).

جنس طير من عجارة السقاوات . انواعه زهاء ١٧٥ جميعها ربة الجفة . وروصها خضرة . مناسرها حادة . ارساها غليظة وقصيرة . غالبا عفية . اطافرها حادة . سولطها مستطلة الطول || تلحف الاذناب || قوتها القواضم على اختلاف انواعها والحيات والقطا والفرناق واشجارت . لذلك تعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها || اشهر انواعها ما يتبع .

١٣٧٧٥ - سِقَائِيَات (F). Buteo desertorum (S). Buss des déserts (F).

نوع من السقاوة موطنها الصحاري والقبلي طولها نحو ٦٠ سم . ثوبها يختلف مع فصل السنة ولكن تغلب فيه الكهبة المظلمة . ذنبها عريض التجزيع . صيادها الى الحشرة . منسرها حطلي النفاضة . اسود البهرة . رسداها ورعاليها الى الصفرة الناعمة .

١٣٧٧٦ - سِقَائِيَات (F). Buteo borealis (S).

نوع من السقاوة موطنها الولايات المتحدة الأمريكية طولها نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الكهبة الصائبة . وأنها وفطرها وسقطها اسود من صدرها وبلها وانتيكها . ذنبها اخضر اقل يعلو تجزيع اسمر .

١٣٧٧٧ - سِقَائِيَات (F). Buteo vulgaris (S). Buss commune, B. vulgaire (F).

نوع من السقاوة موطنها لبحر الابرياء يمتد من اقاصم الشرق الى اطراف اوروبية وافريقية . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبها عذبة الالوان يختلف مع فصل السنة وتقدم الاسمر . تغلب فيه البهرة . ذنبها مستعرض التجزيع . صيادها جرووتان منسرها ازرق النفاضة اسود البهرة . رسداها ورعاليها صفر .

١٣٧٧٨ - سِقَائِيَات (F). Buteo lineatus (S).

نوع من السقاوة موطنها شرق الولايات المتحدة الأمريكية طولها نحو ٧٠ سم . تتميز بتمكنها الثامنين الحمر . منسرها ازرق النفاضة افسر البهرة . غالبا حر . اطافرها سود . تألف ارجاع البتولا والقيظ والمراير .

١٣٧٨٠ - سِقَائِيَات (F). Lacertidae (F). Lacertidae (F).

فصيلة حيوانات زسطة من ربة السقائيات المشققات الالسة . اجناسها ١٨ وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها رفيقة مستطلة . ثوبها زاهية الالوان صفراء المويج .

والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٢ الى ٣ م . وروصها صغيرة . عيها بارزة . تأثيرها وبلانها نظمية . قروتها الاستشمارية دبوسية الاطراف ، عشارية الفصل . كولسلها مستطلة الشكل . امحادها لاسفة . ارساها خاسية المنقل . اربها ملونة || تعيش على المواد النباتية وخاصة الفطور التي تنمو على جلعج الاشجار || اشهر اجناسها السننوس (S) Spidichus . طولها نحو ٢ م . ثوبه الى السوداء الفضي يملو على ثام . تألف ارجاع حيث تكثر الفطور ويملو على ثام .

١٣٧٧٩ - سِقَائِيَات (F). Réformé (F). Reformed (E).

السفوف من الخيل التي تصنع منها السداد .

١٣٧٨٠ - سِقَائِيَات (F). Echinus esculentus (S). Oursin comestible (F).

نوع من الاجنيس المأكول وهو كروي الشكل ، معلوم النفاضة ، كثير الشوك . يكثر في البحر الاخر ويريد في المنسوط .

١٣٧٨١ - سِقَائِيَات (F). Saphir (F). Sapphires (E).

هو الباليوت الازرق ويصل ايضا لازورد .

١٣٧٨٢ - سِقَائِيَات (F). Fane (F). Haulm, Dead leaf (E).

هو الشجر يشعل ما سقط من اوراق الاشجار ويشعل ايضا سرق اوراق النباتات القليلة غير المأكولة من الانسان سرقق واوراق البطاطا .

١٣٧٨٣ - سِقَائِيَات (F). Sphaeronomes (S).

جنس طور مجهرية من فصيلة السقريات . بكنياتها عضوية او سطحية الارتكاز . يهية او كروية الشكل ، صفراء او عناية الجول . قصباتها مستطلة الشب لتتبي بكنالك يهية || انواعه عديدة مظهرها ربي مركب الحلب والجماد ديد ان يسلب النبات او يؤذي كثيرا .

١٣٧٨٤ - سِقَائِيَات (F). Argo, Carène.

Charlot de mer, Vaisseau des argonautes (F). Argo, Argo novis, Vela argo, Pyxis (E). السفينة كوكبية نجوم جنوبية الميخ مركوها تحت الكلب الاكبر || مددا تجهرية ٦٤ اميزدا واشهرها التير الذي على الميخات الجنوبي وهو من الميخات الاكبر وقسمه العرب وسهيك . ولسهيك اسطورة راجعها في القصرى البانية . ومن التجهرم البارزة المائدة الى طله الكوكبية و القوس و دو مركب القوس .

١٣٧٨٥ - سِقَائِيَات (F). Aéronel (F). Alérazit (E).

السفينة الجوية كل مركب تحته طائفة النافيت ، اي طائفة حركاته ، من الارتفاع الى الارض والسير في الجو .

١٣٧٨٦ - سِقَائِيَات (F). Alérazit (E).

السفينة الجوية كل مركب تحته طائفة النافيت ، اي طائفة حركاته ، من الارتفاع الى الارض والسير في الجو .

١٣٧٨٧ - سِقَائِيَات (F). Alérazit (E).

السفينة الجوية كل مركب تحته طائفة النافيت ، اي طائفة حركاته ، من الارتفاع الى الارض والسير في الجو .

١٣٧٨٨ - سِقَائِيَات (F). Alérazit (E).

السفينة الجوية كل مركب تحته طائفة النافيت ، اي طائفة حركاته ، من الارتفاع الى الارض والسير في الجو .



سقاوة البهارة



سقاوة شمالة



سقاوة مشوطة

١٣٧٩٩ - سَقَطَر * ، سَقَطَر *

من الزعانف الشريفة ويكثر زعانفها الصدرية وبصر زعانفها الظهرية الخلفية الارتكاز || تحسب أحماكها وأرغها السقلين .

Sparus striatus (S). *Sparus strid*, *Scathare* (F). *Scather* (E).



سَقَطَر

١٣٨٠٤ - سَقَطَر *
لثاحية المنسبة البريلة من الشط .

١٣٨٠٥ - سَقَطَرِيَّاتُ الْفُطُومِ (F). *Tectibranchs* (F).
رقية حيوانات من الرغويات الطدية غلظيات الخراشيم .

١٣٨٠٦ - سَقَطَرِيَّاتُ الرُّؤُوسِ *

Stegocéphalus (F). *Stegocéphalous* (E).

رقية من الصفصيات التصيرة يمد عيها إلى الإبراج الأبل
وقد انقرض معظمها في أوائل الإبراج الثاني . بعض حيواناتها
كانت تشبه التاسع وبعض الآخر يشبه السط . جميعها
كانت مصفحة الرؤوس المسطحة .



سَقَطَر

١٣٨٠٧ - سَقَطَر *
Porcellana (S). *Porcellane* (F). *Porcellane* (E).

جنس من فصيلة السقلطيات . أنواعه المعروفة قليلة
العدد منتشرة في سطح بحار العالم ومنها البحر الأبيض
المتوسط || أجسامها صغيرة ، بيضية الشكل . ظهورها
مغطاة الإحدياد ، صلبة اللون الجامدة . أرجلها
كبيرة ، مهيئة للأظفار وبمساهة الزوج الخلفي التفتيق
الجرم والفرع الارتكاز . ملاحظها طليقة ، مبطلة ،
شديدة النقط . زنها غليظة مسطحة . أرجلها إلى الأخضر
الالسي أو الجزوي لمطوها رشفة سفراء يختلف انتشارها
بالنسبة إلى الأنواع .



سَقَطَر

١٣٨٠٨ - سَقَطَرِيَّاتُ *
Porcellanidés (F). *Porcellanidae* (E).

فصيلة من القشريات عشاريات الأرجل فصريات الأبل
تتميز بقلة الزوج الخلفي من أرجلها الخلفية في المحيط
الظهوري بدلاً من المحيط البطني . أجسامها وأرغها عديدة
منتشرة في سطح بحار العالم .

١٣٨٠٩ - سَقَطَرِيَّاتُ * ، مَقْمُودَةٌ

Convolvulus scammonia, *C. syriacus* (S). *Scammonia*, *S. d'Alep* (F). *Scammony plant* (E). *Purgier-winde*, *Syrtyche winds* (D). *Scammonio*, *Scammon d'Aleppe* (I).

نبات طبي حشبي لبني حارث من فصيلة اللبانيات أرقها
متعاقبة رعية مظنة الزوايا . أزهارها أبلية الارتكاز
طويلة الزناد ، بيضة الشكل ، صفراء البين مشربة
البياض . يستخرج من جلودها صابرة ورائحة صنية
كثيرة الاستعمال الطبي .



سَقَطَرِيَّاتُ

١٣٨١٠ - سَقَطَرِيَّاتُ * في اللبانيات فصيلة نباتية .

١٣٨١١ - سَقَطَرُ مُشِير *

Centropomus lineatus (S). *Centropomus rayé* (F). *Centropomus lineatus* (E).

سمكة بحرية يابوس من فصيلة القرنيحات شاككات الزعانف .
أصطانتها سطح أقاليم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق
المحيط الأطلسي || جسمها الحلبي الشكل ، يطول من
٢٥ إلى ٣٥ سم . ثوبا إلى الكهبة القصية . ظهرها فضي
البن ويملو في جانبيها تشقير تشقير قالب أصفر ذهبي .
رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخلف ، كبير الشفق . لكها



سَقَطَرُ مُشِير

١٣٨٠٠ - سَقَطَر * في القارة الآرية ، أطلسيا .

١٣٨٠١ - سَقَطَر *
Cynopterus (S). *Cynoptère*, *Mégère sans queue* (F).

جنس سيوان من فصيلة الطوطيات . أنواعه المعروفة
قليلة يقال أنها ثلاثة . جميعها أسيرة شرقية ، صغيرة القد ،
براه ، طليقة قراس ، تصيرة القرفضة . طويلا يراوح
من ١١ إلى ١٢ سم . وبسطها من ٥٠ إلى ٥٥ سم .
تميش بجصات قليلة العدد . تألف التمثل والاشجار
الحربية . قوتها آثار حل اختلاف أنواعها أعصها المنة
والغزاة .

١٣٨٠٢ - سَقَطَرِيَّاتُ * ، مَكَلَاةُ الْبَحْرِ *

Squatina squatina (S). *Squatina*, *Angé de mer* (F). *Angel-fish*, *Angel-shark*, *the Monk* (E).

سمكة بحرية ولون مقترنة من فصيلة السقلطيات . أصطانتها
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي .
سمرحها جي قلا تقترب من المهاجم والشلوط . قوتها الاسماك
البطيطة والرغويات والقشريات || جسمها معتدل التبطيط ،
شبه صلي الفوزن ، يطول من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم . رأسها
غليظ عريض مبط الجرم ، مقنوم الخلف الألفي . فها
طري الارتكاز واسع الشفق . استنابها صغيرة مهيئة الأطراف
الحادة المتشعبة . صيناسا كبيرة ، منسجها ريفسها
صغيران . زعانفها الصدرية والخروية كبيرة الحجم فائدة
كالجناح . زعانفها الظهرية صغيرة القد ، غلظيتها
الارتكاز الذي يتنامى قاعدة الخلف ، الخروية الشريفة
طاسة لا أثر لها إلا الأليلية لعددة الجسم فائدة || جسمها
متوسط الصنف ، مسكها جيد يستعمل في صناعة الألبدة
الشنية .

١٣٨٠٣ - سَقَطَرِيَّاتُ *

Squatinidae (S). *Squatinidae* (F). *Squatinidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولودة من السقطنيات ودية الأشقوق .
أجسامها وأرغها المعروفة قليلة العدد . أصطانتها جميع
مناطق البحر الأبيض المتوسط والناطاق القرية من التناقل
في المحيط الأطلسي || سمرحها جي ولا تقترب من المهاجم إلا
نادرا جدا . قوتها الاسماك البطيطة والقرشيات والقشريات ||
جسمها معتدل التبطيط ، خروية لشوزن ، تطول نحو
١٥٠ سم . رؤوسها مبطلة مسطوية الأعظام . تتميز بتجليها

الشكل ، مشدود التشاد . ثوبها الى الخضار الاكهب تملو نشة سمراء وسط ثيابي اسود وسمطان جانبيا الى الجلوة . ويعطونها في كل سكة من سكهها البطينة اربع نقط سود متوتية بالحب . رأسها الى الجلوة القامة . منها الى الربة السراء . وواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلابها من الطين .

١٣٨١٩ - سَقَنُورٌ ، عَفَشَةٌ ، قَبُوتَات

Pressure (F). Pluck, Harslet (E).

هو كل ما له قيمة ثانوية في النضابة كالتربة والقلب والكروش والقوام الخ .

١٣٨٢٠ - سَقَنُورٌ ، Hanger (F). Outhouse, Shed (E).

السقفة والصفة بناء زراعي مكشوف الجانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية ويستعمل أيضاً لايلاء المحاصيل .

١٣٨٢١ - سَكٌّ Araneus (S). Epeira (F).

جس حناكب كبيرة القد . انواعه نحو ٨٠٠ موطنها العالم .

١٣٨٢٢ - سَكٌّ Gîte du scorpion (F).

هو جسر السقرب . Lodging of scorpion (E).

١٣٨٢٣ - سَكٌّ مَفْجُوعٌ * Araneus diadematus (S). Epeira à diadème (F).

Garden spider (E). Kreuzspinne (D).

نوع من الحناكب المقرنة المجلولة ، ثنائيات الروايا سداسيات المشاق ، من فصيلة الرعيبيات || جسمه مشتمل

الثقيد بطول نحو ٩ م . عند التكاثر ويؤ ١٥ م . عند التكاثر .

المنكة . صدراها يرمي الشكل ، صغير القد ، حنفي اللون . عيناها زنجيتان . خيشما صغيران ، ذريان . لكاه

متدلا الطويل . بطه اهلبيبي الشكل ، حنفي اللون تملو

نقط نظامية تدر كالدرد المرفوف . جمراته مستطيلة ،

كثيفة الملب القصير || يألف البراري والحدائق . شه

كبير القد . يتسبه بين الاجار والادغال ، قوته الحشرات

والذباب والهاوم || يعتبر من الحناكب النافعة اللاذعة .

١٣٨٢٤ - سَكَايُوزَةُ ، جَمْرِيَّةٌ ، زَهْرَةُ الْحَرْبِ Scabiosa (S). Scabieuse (F). Scabious (E). Skabiose (D). Scabiosa (I).

جس نباتات برية وتزييلية من فصيلة الدنسيات

انواعه نحو ٥٠ منها الجنيات والاشباب الحولية والحرقة

والمعرة . اوراقها متطابقة مركبة ومفرقة . ازهارها

روسية طويلة الزناد . جملة الشكل والالوان . كانوا

يؤمنون فيها في الماضي القريب مدة غواص طيبة منها

الشفا من الجرب والفلس وغيرها من الامراض الجلدية .

اشهر انواعها ما يلي .

١٣٨٢٥ - سَكَايُوزَةُ الْفُولُزَار Scabiosa caucasica (S). Scabieuse du Caucase (F).

شبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ م . اوراقها مسنة

الحافة ، جملة الخضار الزاهي || ازهارها كبيرة القد

قطرها نحو ٦ م . لونها الى الزرق السالوة || ازهارها

يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٨٢٦ - سَكَايُوزَةُ بَسْتَانِيَّةٌ * Scabiosa purpurea (S). Scabieuse des jardins, Fleur des vœux (F).

شبة حولية عديدة الشروب تملو من ٤٠ الى ٩٠ م .

الاسفل يتقدم الاحمل . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متراصة . عيناها كيرتان ، ناشرتان ، رفيتا الراكاز . زعانفها

الظهريه اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها

قلبي الصف ، مغرب فيه .

١٣٨١٧ - سَقَنُورٌ Scincus (S).

Scincus (F). Skink (E).

جس حيوانات من العظاء القصرات الاسنة . انواعه

ثمانية منها غشافت الانهار والصحارى الاسوية

والافريقية . جميعها اكبر من السحالي والخنزير . قوائمها

خلفية الاصابع . اذنانها صغيرة . اكلانها بجمجمة ،

ظهورها مدببة يسفرة وولد . بطونها الى البياض الاثير .

كان ولا يزال يستعمل ، بعد تحميره وتجفيفه بالماء ،

لتسبب الباء والامناظ . وهو شائع الاستعمال في مصر والسودان

ويطرحها من البلاد الافريقية . ومنهم من قال انه يلهب

بالفالج والقوة والقرص والرباع والمفاصل .

١٣٨١٨ - سَقَنُورِيَّات Scincidae (S).

Scincidae (F). Scincidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظاء قصيرات الاسنة

منها السقنور واليدفة ورضامة البقر والحكاكة || انواعه

نحو ٤٠٠ مظهرها من زحافات المناطق الحارة .

١٣٨١٩ - سَقَنُورُ الْأَجَلِ Déchance du terme (F).

ه سقط سن للمئين في الاجل الموقوت متعلقاً متدا لا يطم

لحماً مستحقاً بعد انذاره رسمياً بسقوط حقه في الاجال

الباقية فيصح المئين اذا ذلك واجب الاداء . هذا وقد

يسقط الحق في الاجل الموقوت ، قانونياً ، في ساقتي :

اظهار افلاس المئين او اذا قام المئين باعمال تحط من

قيمة الضمانات المرسدة .

١٣٨١٥ - سَقَنُورُ اللَّهِ هَوَى Férémpion d'Instance (F).

هو اعاء اكار كل اجراء في الدعوى يتطرق به للمضى

عليه بعد انقضاء مدة مملوكة .

١٣٨١٦ - سَقَنُورِيَّات Scincidae (S).

Scincidae (F). Scincidae (E).

هو اسقاء او ارواء الحيوان والنبات .



سَقَنُور



سَقَنُور



سَقَنُور



سَكَايُوزَةُ بَسْتَانِيَّةٌ

الزناد. خميرة التركيب ، خامسة الفصل || أشهر انواعه سكب الغرب .

١٣٨٣٤ - سكب الغرب *

Sanicula europaea (S). *Sanicle d'Europe*, *Sanicle mille* (F). *Common sanicle*, *Wood march* (c). *Echta heilknecke*, *Sanikel* (D). *Sanicola*, *S. maschia* (I).

نوع من السكب هو نبات عشبي، جلمووي، طيب، بري، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهارا وردية اللون. يتصلب في القلب البيطري. اورثاقه تقيد الاثمار عند الانزعاج وبعد الوضع لانه يستعمل الخلاس اي خروج المشية .

١٣٨٣٥ - سكب
Scape هي في الحشرة اول قفلة من الزئبان .

١٣٨٣٦ - سكب
Planche basse (F). *Shallow bed* (E). مستطيل او مربع من التراب حشن وصل متدفقا عن سطح التربة لاقبال واستقبال ماء السقاية .

١٣٨٣٧ - سكبتيات
Saniculae (F). *Sanicles* (E). سهل من الخبيات عديد الاجناس والانواع اشهرها السكب .

١٣٨٣٨ - سكبتينج هو انجذاب البسم ، اطله .

١٣٨٣٩ - سكتة ، حثيطة ، حنطكة ، حثريية دم
Apoplexie, *Coup de sang* (F). *Apoplexis*, *Apoplexy* (E). استقنا شديد مع زف او رشع او السكب دموي في النجسة الملع او غيره .

١٣٨٤٠ - سكر
Batardeau, *Vanne* (F). *Coffer-dam*, *Wazar-gate* (E). حاجز يتحرك من فوق الى تحت يترعى طريق الماء فيسبح بمرور او عنه . وهو ايضا سد يسمح بتحويل الماء من مجرى الى آخر .

١٣٨٤١ - سكر
Sucre (F). *Sugar* (E). مادة حلوة اللذاق متبلورة سهلة اللويان في الماء . كثيرة الانتشار في المملكة النباتية توجد في جلمور النبات وسوى واورثاقه وتغذى || وهو من الوجبة الكيالية يشتم الى مادة بسيطة تدعى غلوكوكوز كا في الشب وسطر التار .

١٣٨٤٢ - سكر
وهو السكر الذي صار قابلا للاختبار اي السكروز

١٣٨٤٣ - سكر العنب
Glucoze هو الفلوكوز ، اطله .

١٣٨٤٤ - سكر متعكس
Sucre Inverti (F). *Inverted sugar* (E). هو السكر الذي صار قابلا للاختبار اي السكروز الذي تحول الى غلوكوكوز وفالوكوز .

١٣٨٤٥ - سكرات
Saccharate كل مركب من السكر مع اكسيد معنفي .



سكايوزة حثيية



سكايوزة ورد الحام



سكب الغرب

اورثاقها ملتصحة ، رباعية . خلية التصل || ازهارها كبيرة اللثا لونها يختلف باختلاف الفرب فيها البنفسجي والازرق والبيجي والوردي والايض والاصفر والوشج . جميعها نلحة العرف المشي || ثمارها خلية البشرة ، ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٣٨٣٧ - سكبتيوزة حثيية *
Scabiosa arvensis (S). *Scabieuse des champs*, *Langue de vache* (F). *Scabious*, *Pin-cushion flower* (E). *Ackergrindkraut* (D). *Scabiosa dei campi*, *Ambretta* (I).

عشبة طرية برية معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اورثاقها ملتصحة مشرودة مستطيلة القفص الوسطي . تصلها زغبية البشرة ، الحسل اللون || ازهارها صغيرة اللثا قفصا يراوح من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الزرقوة اليلكية . ميرها مسكي العرف || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٣٨ - سكبتيوزة عططرة

Scabiosa canescens (S). *Scabieuse odorante* (F). عشبة معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اورثاقها كبيرة اللثا مشرودة ، قشرها ندي الشكل || ازهارها كبيرة الحليم ، زرقاء اللون ، عطرية العرف . ثمارها خلية البشرة ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٨٣٩ - سكبتيوزة كبريتية

Scabiosa sulphurea (S). *Scabieuse jaune soufre* (F). عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم. اورثاقها كاملة مستطيلة مدنية . تصلها ازغب بالصفحة ، الحسل اللون . ازهارها خلية البشرة ، كبيرة اللثا ، كبريتية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٣٨٤٠ - سكبتيوزة نجمية

Scabiosa stellata (S). *Scabieuse étoilée* (F). عشبة حولية تملو نحو ٥٠ سم. اورثاقها ملتصحة ، رباعية ، سلتة . تصلها خلي البشرة الحسل اللون || ازهارها مستطيلة الزئاد ، متوسطة الكبر ، قفصا نحو ٤ سم. لونها الى اليباض اليلقي ، حنارها اصفر || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٣٨٤١ - سكبتيوزة ورد الحسام *

Scabiosa columbaria (S). *Scabieuse columbaria*, *Columbaria* (F). *Small scabious*, *Lilac flowered scabious* (E). *Taubenskabiose* (D). *Scabiosa columbaria* (I). عشبة معمرة عديدة القفصوب تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اورثاقها مفصصة وسفلة الحلقة . تصلها خلي البشرة بمرى اللون || ازهارها كبيرة اللثا لونها يختلف باختلاف الفرب . فيها الاخضر والازرق والايض والاصفر . ثمارها خلية البشرة ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٨٤٢ - سكبتيوزة
Aérologie (F). *Aerologie* (E). السكاكة علم يبحث في احوال الجو الرقيق وفي مختلف مساحجه الصاعدة والمنخفضة .

١٣٨٤٣ - سكبتي
Sanicula (S). *Sanicle* (F). جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الكيبيات .

انواعه ثلاثة اورثاقها طويلة التريبات كفيضة مفصصة . ازهارها عشكولية التجميع ، حامية الارتكاز ، طويلة

* سَكْسِكِيد ، سِيلِيكْسِيَس * ١٣٨٥٨

Cinxya (S). Cinxyde (F). Cinxya (E).

جنس حيوانات زساقية برية وبائية من فصيلة السلحفايات .
أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق افريقية اخضراء
غنية والبلاد المجاورة || اصنافها متوسطة القد . اذنانها
لاخرة ، عذرة بالطول والعرض ، مفصلي الاطراف
الخلفية ، تطفل كمثل الجسم || جميعها حاصلة قوتها
الاحتباب البرية والمائية .

* سَكْسِيَك * ١٣٨٥٩

Saxicava (S).

Saxicava (F). Saxicava (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم ،
وفصيلة الصلغويات . أنواعها المعاصرة قليلة اصنافها بعض
مناطق البحر الابيض المتوسط والحيط الاطلسي || اصنافها
شبه هرية الشكل ، متسلسلة ، غلدة ، متوسطة القد . تعيش
مشابها مستقلة . مصاريها عادية التسنين . تعيش
لاصقة بالصخور الكلسية . ليفها غزير المادة كثيفة .

* سَكُّع ، بَعُورُ مَرْمَرٍ ، زَهْرُ الْمَسِيحِ ،
عَرَنْتِيْفَا ، وَكَلَف ، حَبِيزُ الْمَشَايِعِ ،
بَغْلَاغِيَس ، رَكَلَف ، يَرْبَع ، سِيَكْلَامِن

Cyclamen (S). Cyclamen, Cyclame, Pain de pour-
ceau, Arthanite, Artanite (F). Cyclamen, Bleeding-
sun, Sow-bread (E). Cyclamenvelchen (D). Cicle-
mino, Tubero florito, Pan porcino (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الربييات
انواعه نحو ١٢ صنفها مستمرة مبطلة لونها الى الجفرة
القاتمة . أوراقها زائغاة قرصية الانتشاب مستطيلة الزائد .
ازهارها خاسية التركيب ، فردية التجميع ، متسكة
الارتكاز . ثمارها كعابر صغيرة ، كروية ، عديدة
البذور . كان ولا يزال من النباتات المغايرة
التي تشغل في تركيب عدة مستعمرات . وهو شائع
الاستهلاك في الطب البيطري عصارة صنفها غنية بالسكسين
وهي مادة قلبية غلدة ومنهم من استعمالها في صيد الاسماك .
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

* سَكُّعُ اُرُوبِي * ١٣٨٦١

Cyclamen europaeum (S). Cyclamen d'Europe (F).
حبيسة متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم . ثلاثيات الجذرية
عشوية التركيب تتم كامل الصنفه السفلى . أوراقها
قلبية . مستدرة الزوايا ، نصلها جامد النسيج ، اخضر
الصنفه العليا المنسجة بالابيض ، احمر السفلى || اذنانها
مرفقة الرائحة ، وديدة اللون ، يطولها مزاج قزمي . مالبقيها
تطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها يستمر من تموز
الى تشرين .

* سَكُّعُ الْبَنْدَلِيَّةِ * ١٣٨٦٢

Cyclamen
neapolitanum (S). Cyclamen neapolitan (F).
حبيسة كبيرة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٢٠ سم .
ثلاثيات الجذرية حنارية حنيفة || أوراقها قلبية الشكل ،
ميمة الزوايا ، نصلها جامد التركيب ، ابيض التليج
والخامة . اذعانها يضاء اللون او وديدة يطولها عند اعناقها
توشيح احمر . مالبقيها تطول نحو ٢٠ سم . || ازهارها
يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

* سَكُّعُ النَّصْرِ * ١٣٨٦٣

Cyclamen coum (S).
Cyclamen de Cos (F).
حبيسة صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم . أوراقها يغيية

١٣٨٦٤ - سَكَّرَان (F). Invert sugar (E).
في خيرة السكر التي تحول السكر الى غلوكوز ولفركوز
قابليتين للاختبار .

* سَكَّرَان هو النج الاسود ، الحلبه . ١٣٨٦٧

١٣٨٦٨ - سَكَّرَان * Scopolia (S). Scopolia (F).

Scopolia (E). Tollkraut (D). Scopolia (I).
جنس نباتات عشوية بطورية معمرة من فصيلة
الباذنجانيات . انواعها قليلة جميعها زراعية .
سوقها قاذرة . اوراقها مستطبة بسيطة متناحية . ازهارها
فردية ، ابطية ، كوية ، مملحية ، متدلية || اعرف
انواعها ما يتبع .

١٣٨٦٩ - سَكَّرَان اصْفَر Scopolia lurida (S).

Scopolia jaunditica (F).
عشبة زرقانية مهددا الهند . تملو نحو ١٥٠ سم . ازهارها
خلسية التفصيص صغيرة القد تبدو عطره اللون ثم
تتحول الى الاصفر وتكتفي بالابيض || ازهارها
يستمر ٥ اشهر ايام من اواخر آب .

١٣٨٧٠ - سَكَّرَان الغريب Scopolia carnolica (S).

Scopolia de carniole (F).
عشبة معمرة مهددا غربي اوروبية . تملو من ٣٠ الى
٦٠ سم . ازهارها جلوية اللون متوسطة القد || ازهارها
يستمر من نيسان الى ايار .

* سَكَّرَانه هي الزوان ، الحلبه . ١٣٨٨١

١٣٨٨٢ - سَكَّرَانَه * Soldanella (S).

Soldanella (F). Sea bind-weed (E). Straudwindes,
Bärwinde (D). Soldanella (I).

جنس نباتات عشوية برية جبلية معمرة من فصيلة
الربييات . انواعها خسة . سوقها غراغرية تملو من ٥ الى
٢٠ سم . اوراقها جلدية مغزولة مستديرة . ازهارها فردية ،
حامية ككلال الشراخ . لونها ورجمها يختلفان مع نوعها .
لها الاحمر والبنفسجي والازرق والبيجي .

* سَكَّرُ تَبَت * ١٣٨٨٣

هو الابولج والقديم ، الحلبه .

١٣٨٨٤ - سَكَّرُورُ Saccharose (F).

Saccharose, Cane-sugar (E).
هو المادة الحلاوة الموجودة في صلب قصب السكر والشوكر
والقندر والاصفندان . وهو مفكور في التبلور ثقله القوي
١,٦٠٦ غلوه المائي متيسر .

١٣٨٨٥ - سَكَّرِي Saccharoux (F). Saccharous (E).

يعتوي حل سكر .

١٣٨٨٦ - سَكَّرَان Saccharine,

Sucre de houille (F). Saccharin, Glusidom (E).
هو سكر القند المجري ، مسروق ابيض شديد الحلاوة
كزبد حلاوته ٣٠٠ مرة من السكر المعروف . يستخرج
من قتران القند المجري . يستخره مفرأ بالصمغ
ولا يميزون استعماله الا في السيلة .

١٣٨٨٧ - سَكْسَكُ Talapoin (F).

هو هيرس سكار . الحلبه .



سَكَّرَان



سَكَّرِيَا



سَكِيد



سَكِيد



سَكُّع اُرُوبِي



سَكُّع الْبَنْدَلِيَّةِ

ضيقة المؤخر للذب. اتحادها لا تلتصق كامل البطن. قوائمها نسيجة، متصلة الجرم. أثوابها حجابية التخصيب منها ربيدة اللون ومنها مبيجة ومزركشة || جميعها دلتة تعيش تحت القشور والقماذ وفي الاخشاب النخرة.



سُجَّع لَبَلِي

١٣٨٧٠ - سُجَّعِيَّات (F). Scaphidiidae (F).

فضيلة حشرات من فصيلة الابنية. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد، منتشرة في معظم غابات المناطق المعتدلة الحارة والحارة || اجناسها صغيرة طولها من ٩ م. وذوها مسطحة، ملوثة. عينها صغيرة، بارزة. تكاثرها وفكوكها قياسية. قرونها الاستعمارية لانظامية، منها الصلحانية ومنها الخيطية، جميعها مركبة من ١١ فصلة. كواشها محدبة، شارقة، تلتصق القسم الاكبر من الرأس. اتحادها مائلة لا تلتصق كامل البطن. بطونها مدببة المؤخر || جميعها دامة تعيش تحت القماذ وفي الاخشاب النخرة وفي تكاثر القشور القاذبة || اشهر اجناسها السكفيد.

١٣٨٧١ - سُكَل (F). Synodontis (F). Schal (F).

الشكل ج أسكال. جنس ابيك هيرية من فصيلة السلوريات تكثر في مياه الانجر الافريقية. تتميز بخصامة شكلها واسوداد لونها وصفر رؤوسها وتذهب ملهاتها البت.



سكيد

١٣٨٧٢ - سُكَل (F). Ascalaphus (F).

جنس حشرات لافلية من فصيلة السكليات ورتبة شاربانات الابنية. انواعها المعروفة عديدة، مملها بألف الاقاليم المعتدلة واليبس الآخر يعيش في المناطق الحارة او المتوسطة الحرارة || اجناسها متوسطة القدر وكبيرة. بطونها تتراوح من ٣٥ الى ٨٠ م. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، كهيئة الملب الخلق. اجنسها مسطحة، بعضها شفاف واليبس الآخر مغطى. جميعها ملوثة. خضابها الرئيسي اصفر او عاجي تلوينها ينجع وزخارفها يراوح لونها من الاسمر الى الاسود. قرونها الاستعمارية مسطحة تنتهي بطور من الملب التام سفية الشكل او مطية. صغورها متصلة التفتحة، كهيئة الملب النقي. بطونها اسطوانية او مدونة الشكل، سواء اللون، ملوثة بالاصفر او الازهر او العاجي || يربطها شبه يفسية الثفرون، متصلة الخيطية، بارزة الحار السكسي الذي يلو كاستان المنشار. رؤوسها مريضة، ناعضة. ملاسها الفكية كلابية الشكل، مسنة من الداخل. جميعها مفترسة تعيش بين الاشجار وتحت الحجارة.



سكلاف

١٣٨٧٣ - سُكَلِيَّات (F). Ascalaphidae (F).

فضيلة حشرات من فصيلة الجناح ورتبة شاربانات الابنية. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم || اجناسها متوسطة القدر وكبيرة. بطونها تتراوح من ٣٢ الى ١١٥ م. رؤوسها شبه مخروطية، كهيئة القزب والملب النقي. عينها كبيرة، جاسقة. قرونها الاستعمارية غطية، مسطحة، تنهي بمجموعات من الملب والقزب يكثر فيها الشكل المثلث ثم الصفي. صغورها، من الكحول الى اليرباد، زله. بطونها شبه مدونة الشكل. اجنسها

الشكل تملها مناوج السجج لونه الى الخضار المايق. ازهارها عادية اللون، شديدة الحمرة، صغيرة القدر، مالحيتها طولها نحو ٨ م || ازهارها يستمر من شباط الى اذار.

١٣٨٧٤ - سُجَّع رَيْمِي (F). Cyclamen vernum (F).

حصيلته صغيرة القدر قطرها نحو ٢ م. قلائها الجارية محورية قرصية. جلودها ضمية الانتشاب || اوراثها قلبية، ظاهرها ازرقا. تملها جامد السجج اغضر الصفحة العليا، مالح السفل || ازهارها وردية اللون، قليلة اللون. متوسطة القدر. مالحيتها طولها من ١٠ الى ٢٥ م. || ازهارها يستمر من اذار الى ايار.

١٣٨٧٥ - سُجَّع فارسي (F). Cyclamen persicum (F).

نبات رده يتطلب بعض العناية الخاصة. صغوبه عديدة تختلط بالزهرات والازهار وانكالت بقلتها || حصيلته متوسطة القدر قطرها يراوح من ٤ الى ٦ م. اوراثها يفسية، تملها مراكب التسليخ والتدريج، مسن الحافة، شديدة الخضار العابق || ازهارها كبيرة القدر، محدبة الاطراف فيها المكسبة والمجاوبة والمهدبة. مالحيتها طولها من ٢٥ الى ٣٠ م || ازهارها يستمر من تشرين الثاني الى اذار.

١٣٨٧٦ - سُجَّع كَلْبِي (F). Cyclamen cilicium (F).

حصيلته صغيرة القدر قطرها نحو ٣ م. قلائها الجارية محورية قرصية. جلودها ضمية الانتشاب || اوراثها قلبية مسطحة. تملها مناوج السجج اغضر الصفحة العليا المثل السفل || ازهارها وردية اللون تملها نغمة ارجوانية زرين فائدة البلات. مرها متوسط الارجح. مالحيتها طولها نحو ١٢ م || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

١٣٨٧٧ - سُجَّع لَبَلِي (F). Cyclamen libanoticum (F).

حصيلته متوسطة القدر قطرها نحو ٥ م. لونها الى الجوزة. قلائها الجارية محورية قرصية || اوراثها قليلة مسنة الحافة. تملها اغضر الصفحة العليا، جلوي السفل. ازهارها متوسطة الحجم، عريضة الرائحة، وردية اللون، بقلتها مسنة التامدة. مالحيتها طولها من ١٢ الى ٢٥ م. || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٣٨٧٨ - سُجَّعِيْن، سِكَلَامِيْن (F). Cyclamine (F).

مادة قلبية سامة تستخرج من صغارة السكج تستعمل في مكافحة الحشرات وفي بعض المستحضرات الطبية الليطرية.

١٣٨٧٩ - سُكَلِيد (F). Scaphidium (F).

جنس حشرات من فصيلة السكفديات ورتبة جمعيات الابنية. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض غابات وحراج الاقاليم المعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة القدر، اطليبية الشكل، طولها نحو ٦ م. رؤوسها مسترسمة، ملوثة. عينها صغيرة، بارزة. قرونها الاستعمارية صولجانية. تكاثرها وفكوكها وبلاستها نظامية. كواشها كبيرة، محدبة، شارقة، تلتصق معظم الرأس. بطونها



سِكَّة

لا تؤكل. يتكاثر بالبراءة أما يفضل غرس الشجرة كما هي وذلك بعد انتاش بذرهما الذي يحصل منه وضعا في مكان رطب || وهو رطب في الأثرية الخليفة العيقية القنور ويتطلب الى سادة او عوائل باقية يتسلقها .

١٣٨٩٥ - سِكَّة ، حَوْش
Chêner (F).
To castrate, To geld (E).
انزعز الحصىين في الاسنة والبركاش والبركاش ونفيرا .

١٣٨٩٦ - سِكَّة
Masse (F). Hesper (E).
جيرة كبيرة من القصب تستعمل في نقل بعض الثيار والحمار .

١٣٨٩٧ - سِل ، قَدْرُون ، سَحَاك
Tuberculeux (F). Tuberculois (E).
مرض معد خطر يمس السيل واللالا وتدرن في الحيوان ، والسحاب في النبات .



سِكُون

١٣٨٩٨ - سِل ، قَدْرُون ، قَدْرُون
Tuberculosis pulmonaire, Phthise pulmonaire (F).
Phthisis, Consumption (E).
مرض معد يصيب الرئة فيطبخها . كلفه العالم الالمان كوخ عام ١٨٨٢ وهو من الامراض غير الوراثية اما يعيش في الهواء واليساق وانفازات الجسم والملايس والاعصنة وفي حليه الماشية المصابة || تحصل عندها اسما باستنشاق الهواء الملوث من طريق الجهاز التنفسي الى الرئتين او من طريق الجهاز الهضمي بواسطة الاعدية الملتصقة .

١٣٨٩٩ - سِكَّة
Sarcophorus (S). Sarcophore (F).
جلس طير من فصيلة الزرقانيات اطلق الثوب طويل الرجلين هذه القناني الافريقية .



سِلَا

١٣٩٠٠ - سِلَا ، دُوْدَة عَيْطِيَّة
Trichocapulus (S). Trichocéphale (F). Trichocapulus, Thread worm (E).
نوع من الديدان السلكية الدقيقة المسطحة . رؤوسها شعرة اطرافها مدببة . تعيش طفيلية في الاسماء اخمصها للمبي القليلط .

١٣٩٠١ - سَلَاح
Thecopora
جنس طيور مجهرية من فصيلة الثصيات ، يتميز بدهاماته الحظية اللعاب ، الجولية القوية المسطحة ، الشفوية الانتقام والثانية او الرباعية الاغنية || اليوم قليلة تعيش طويلا الاثدي على الصنوبريات ، الشجرها واعرفها سَلَاح البرقوق .

١٣٩٠٢ - سَلَاح الْبَرْقُوقِ
Thecopora palli, T. areolata (S). Routile des pruniers (F).
نظر من السلاج يقضي طوره الاثدي على الصنوبر . ويقتل في طوره النامي على البرقوق والخوخ والكزبر . مظهره الخلفي يقع حر فضلة الزوايا تركب الدورات على صفحتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بنور قوسية لاجلالية للشكل ولحمي لونها الى الجوزة فالسرة تسبب التسحق وتنب ذليل الدورات وسقطها || يتكاثر بالاجساد من الصنوبر المويود وباستعمال القنابر الحديثة الخالية من المولد النامية .



سَلَاح البرقوق

١٣٨٨٩ - سِكَّة ، سُرْعُونَة الْبَحْر
Squilla (S). Squille, Mante de mer (F).
جنس دوابات بحرية من القناريات فيات الابل . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في مجار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة . خلفها رقيقة متدبة بالسك المدرية الاربع الاول . اما السك الاربع الثانية طفيلية . يطبخها كبيرة مسطحة . الزوج الاسامي من قوتها بالغ القسامة والكبر مجهز للخطف كما هي الحال عند السرعية || غولها مرغوب فيها مأكلة .

١٣٨٩٠ - سِكِين
Coutre (F).
Ploughshare, Coulter (E).
جزء من المحراث حاد الطرف يقطع كتل التراب عموديا .

١٣٨٩١ - سِكِينِي السِّن
Caltridenté (F).
Caltridentale (E).
من الحيوان من كانت اسنانه حادة الاطراف ، سِكِينِي الشكل .

١٣٨٩٢ - سِكِينِي الْمِنَاد
Caltricrostre (F).
Caltricrostral (E).
من الطير من كان منقاده صلب الطرف ، حاد كالسكين نخس بالذكر القلق والبلشون .

١٣٨٩٣ - سِكِينِي الْفَرْق
Cuterfolié (F).
Cuterfoliate (E).
من النبات ما كانت اوراقه سِكِينِي الشكل .

١٣٨٩٤ - سِكِينِي
Sachium edule (S). Chayote, Chacho, Chuchu (F).
ليات زراعي ممر ويسعد الجلس والنزع من فصيلة القرعيات . مهده بلاد المكسيك ونبا انتشر في سائر اقطار العالم . جلوره دنية كبيرة القند . ساهه لينة مسلفة تطول بصفة امتار . حوافها ثلاثية او خماسية التركيب . اوراقه متعقبة كفية خماسية القصوس والبروق ، تطول وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . اذله ابطية الانتساب صفراء اللون ، ذكرية وانثوية . الذرية متعديسة التجميع والانثوية فردية . ثمار تؤكل مطبوخة وهي كبيرة القند بفضية الشكل ، مقنونة القلب ، مفسلة القشرة المهدوبة ، المتصصة ، البثرة الفتوة . لايها جانبا للمادة البيضاء اللون يحسن حبة كسنتية الشكل ، كبيرة القند ، حقة القشار ، المنة جزء من لباب الشجرة تحوي العناصر التالية

٩١,٠٠٪	ماء
٢,٢٪	مواد دهنية
٢,٢٨٪	مواد سكرية
٢,١٦٪	مواد ازوتية
٢,٣٤٪	مواد غير ازوتية

دزوات جلوره تستعمل استبدال البطاطا في تون من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام . وتحوي ما قدره ١٥,٠٠٪ من النشا ٢,٥٠٪ من المولد الازوتية
معد دزوات البتة يزارع من ٣ الى ٧ يتعلم منها الثلث أي من البتة الواحدة الى الدزواتين ويجب ان تكون البتة حولية او محولة اما اذا زاد عمرها عن السنتين تصبح ليفة

Blépharite (F). Blépharitis (E). **سُلَاقِي** ١٣٩١١ -
هو رده الجفن أو التهاب الجفن .

Anthropologie (F). **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٢ -
Anthropology (E). السُلَاقِيَّة علم طبائع الانسان .

Lévrier (F). **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٣ -
Greyhound (E). سُلَاقِيَّة كلاب عداء تصيد الثزالن والأرانب والغالب
وينتأج أوى تمييز باستطاعة اجسامها وقوامها .

Monoblepharidae (S). **سُلَاقِيَّات** ١٣٩١٤ -
Monoblepharidées (S). Monoblepharidae (E).
فصيلة ظفود بحيرية من مرتبة التسنليات ورتبة
البليضيئات .

Race (F). **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٥ -
Race, Breed (E). جراح افراد متشابهة من نوع واحد تستعمل صفاتها
بالزراعة . ومن المستحسن استعمال سلالة في النبات وورق
في الحيوان .

Raciel **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٦ -
ما هو منوط بالسُلَاقِيَّة أو العنصر .

Phalange (F). Phalanx (E). **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٧ -
السُلَاقِيَّات عظايا في الاصابع .

Phalangides, Faucheurs (F). Phalangide, Mowars,
Harvestermen, Daddy longlegs (E). Weberk-
nachte (D). **سُلَاقِيَّات** ١٣٩١٨ -
رَبَّة من المنكوبيات زبيلاتها طوال الارجل ذفلاها عشرين
كالخسافين .

Entre-nœud, Mérihalles (F). **سُلَاقِيَّة** ١٣٩١٩ -
Internode (E). جزء الساق بين عقدتين .

Age de la charrue (F). Plough-beam (E). **سُلَب** ١٣٩٢٠ -
نصاب المزارع أو قومه . وهو الجزء الجامع لسائر اجزاء
المزارع .

سُلَب ١٣٩٢١ -
السلب من القصة : قفرا . والسلب : ماء حجر في
البن يصل منه الخيال وهو اجفى من ليف القل واصلب .

سُلَبِيَّة ١٣٩٢٢ -
السلبج والسلبجة ضرب من الذهب ج سلابج .

سُلَبِيَّات ١٣٩٢٣ -
Tropaeolum (S). **سُلَبِيَّة** ، **سُلَبِيَّة** ، **سُلَبِيَّات** ، **سُلَبِيَّات** ،
Capucine (F). Nasturtium (E).

جنس نباتات عشبية ليفية مدادة من فصيلة السلبزيئات .
انواعها ٣٥ مظهرها امريكي المنبت . سيقانها عديمة الخواثق .
اوراقها متعاقبة مجنبة ، حاليها لولبية . ازهارها محورية
الارتكاز ، كوروسها ثنائية التركيب ، مهبازية التناعد .
تويجاتها خمسية البتلات الملقطة . اوراقها . وازهارها
مأكولة قريبة الشبه من الرشاد || اعرف واشهر انواعها
ما يلي .

Maematopus (S). **سُلَاج** ١٣٩٠٣ -
Hultrier (F). Oyster-catcher (E).

جنس طير من طوال الساق وفضيلة السلاجيات . انواعه
المعروفة عشرة منتشرة في معظم انحاء العالم . ملجتها الحيواني
جامي . اسراجها تمتد بعض المئات . جميعها من القواطع
الجلجلة . قوتها الرغويات والقشريات والديدان ... ||
اجسامها ربة متوسطة القد . متفادها مسطيلة جالسة .
اجتمعتا شاركة تلحف الاذناب . ارسافها دقيقة متعددة
اللول . اسابمها ثلاث مسطيلة الجرم ، مستقيمة
الانفاثير . القصيرة || تدفن في الكفتان والخابب .
انحاصها قدر سطحية يحيطها اطار من حطام الصدف
والقريع . اناثها تقص من يعضين الى ثلاث يعضات
تغصنها وسدحا ٢ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها
سلاج كتش .

سُلَاج كُتْدُش ١٣٩٠٤ -
Maematopus oestralegus (S). Hultrier-pie,
Bécasse de mer, Pie de mer (F). Sea pie (E).

طائر من السلاج . موطنه يشغل معظم انحاء العالم القديم .
مستاء البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مصيفه البلاد الباردة .
يألف القشوط البحرية وفضلات الانهر والمستنقعات . ثم
يعد بعض المئات || جسمه متوسط القد بطول نحو ٤٤ سم .
بسطه نحو ٨٦ سم . قوته ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهر
والعنق ، ابيض الجبين والجبين والساق والاذناب . جناحا
سود النصفه العليا ، يفي الاياهر والنصفه السفلى .
ذنبه ابيض اللحم الاطراف ، اسود الطرف . حلقة عينه
قرنزية اللون . جوفه برتقالية . منقاده احمر القاعدة
والجسم ، اسود الملقط . ويحده الى الحجرة || اناده لا
تخفن اكثر من يعضين .

Haematopodidae (S). **سُلَاجِيَّات** ١٣٩٠٥ -
Hématopodidae (F). Haematopodidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق . اجناسها وانواعها المعروفة
قليلة جميعها من القواطع الجلجلة . ملجتها الحيواني
جامي . اسراجها وافر العدد . قوتها القشريات والرغويات
والديدان والاسماك الصغيرة || اجسامها متوسطة القد ،
الاذناب ملونة || اشهر اجناسها السلاج وكبيرة الماء .

سُلَاجِيَّة ١٣٩٠٦ -
Chelonia (S). Chéloniens (F). Chelonia (E).

رتبة من الزحافات البيوضة تشغل خمس فصائل تمييز
باجسامها المبططة المدية الظهر . رؤوسها صغيرة . اعناقها
متوسطة الطول . لذكورها عادمة الانسان . قوائمها غليظة
وصغيرة . بطونها قرنية الكتف . ظهورها مدببة ذهابا .
اما فصائلها فهي : الحسليات والرتريات والقرقيات
والسحليات والجبليات .

سُلَاسِكَة ١٣٩٠٧ -
Plasticité (F). Plasticity (E).

هي الانطباع ، الطبع .
سُلَاسُوس ١٣٩٠٨ -
Rajac حراوية .

سُلَاسُوسَة ١٣٩٠٩ -
Hirudiniculture (F). Leech-breeding (E).
هي فن تربية السلق وتكثيره .

سُلَاسُوسَة ١٣٩١٠ -
Vin de goutte
هو ما يسيل من العنب قبل حصره .



سلاج كتش



سلاجي

١٣٩٢٤ - سَلْبُوتٌ عُثْلِيَّةٌ ، سَلْبُوتٌ عُثْلِيَّةٌ ، كَبُوسِيْنٌ عُثْلِيَّةٌ

Tropaeolum pteleophorum (S). *Capucine* de Lobb, *C. velue* (F). Lobb *nasturtium* (E).

عشبة ليلية مدادة زياء تطول من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها مجنبة، ضلها يستعمل كالحشكة. ازهارها برتقالية اللون. يتلاتها السفل ستة الحار او مهدبة || ازهارها يستمر نحو ٥ اسابيع ابتداء من اواخر تشرين .

١٣٩٢٥ - سَلْبُوتٌ رَشِيْقٌ ، سَلْبُوتٌ رَشِيْقَةٌ ، كَبُوسِيْنٌ رَشِيْقَةٌ

Tropaeolum speciosum (S). *Capucine gracieuse* (F). عشبة ليلية مدادة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها خفية التفصيص رقة تكون سداسية. نصلها خلى البشرة مل صفحة السفل. ازهارها ارطوانية اللون. مسطلة الهاميز ، قليلة البلات || ازهارها يستمر طوال الصيف وانحريف .

١٣٩٢٦ - سَلْبُوتٌ صَغِيرٌ ، سَلْبُوتٌ صَغِيرَةٌ ، كَبُوسِيْنٌ صَغِيرَةٌ

Tropaeolum minus (S). *Capucine minora*, *Petite capucine*, *C. naine* (F). عشبة ليلية متقلبة تمل من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستديرة ، اضلاعها مسطلة . ازهارها صفراء اللون يملو تضيح ويخرج امر || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

١٣٩٢٧ - سَلْبُوتٌ عُثْلِيَّةٌ ، سَلْبُوتٌ عُثْلِيَّةٌ ، كَبُوسِيْنٌ عُثْلِيَّةٌ

Tropaeolum tuberosum (S). *Capucine tubéreuse* (F). عشبة ليلية مدادة وعارية تطول نحو ١٠٠ سم. جلورها سفولية غروطية او اعليجية الشكل. اوراقها خامة التفصيص. نصلها مالى البشرة. ازهارها صغيرة البلات المستديرة ، منها الى الصفرة. صالقات مأكولة لتستعمل استعمال البطاطا .

١٣٩٢٨ - سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ ، سَلْبُوتٌ كَبِيرَةٌ ، كَبُوسِيْنٌ كَبِيرَةٌ ، أُوْعُتَجَرٌ ، طَرَطُورُ الْبَاشَا

Tropaeolum majus (S). *Capucine majore*, *Grande capucine*, *Cresson d'inde* (F). *Tail nasturtium*, *Tail Indian cress*, *Canary creeper* (E). *Kapuziner-Indische kresse* (D). *Astuzzia maggiore*, *Nasturzio maggiore* (I).

عشبة ليلية مدادة عارية تطول نحو ٣٠٠ سم. ساقها ليلية خفة مالة الساج. جلورها غطية نجمة كثيرة الانشباب. اوراقها مجنبة الشكل ، نصلها نام البشرة الائمة ، بحري الحصار. ازهارها لردية التجميع ، بحورية الارتكار ، مطوية البلات ، عديدة الاوان لها الاخر والاربعاني والقرنزي والبرتقالي والاصفر || وهي حولية في المناطق المعتدلة ، مسرة في المناطق الحارة . ازهارها يستمر طوال السنة || ذروع القرنزي وكثبات يفل . ازهارها حريقة العلم السحب . تجارها الفتية تستعمل استعمال الكبر في الفلحات . يقال ان ازهارها واورقها لا تخمر من التلذذات المقرية .

١٣٩٢٩ - سَلْبُوتَات

Tropaeolaceae (S). *Tropaeolaceae* (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات القلفة مستقلات القنالات .

اجناسها وانواعها عديدة جميعها عشية او ليلية مدادة وعارية عادمة الحلقان .

١٣٩٣٠ - سَلْبُوتٌ

Zorotypus جنس حشرات ملسة ، واثمة ، صفرة اللد ، تعيش في التربة . انواعها قليلة . ذكورها حامدة الحنط . اناتها مجنبة . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل . ارساها ثنائية المقل . اما جهازها التناسلي فبني .

١٣٩٣١ - سَلْبُوتَات

Zoraptera (S). *Zorapteres* (F). *Zoraptera* (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الذراريات . انواعها عديدة جميعها من الحشرات الملسة ، والاثمة ، الصفرة اللد . اقلبيها البلاد الحارة . تعيش في القرباب . اناتها مجنبة قشيرة اللون البسيطة . ذكورها حامدة البين عادمة الحنط . قرونها الاستشعارية قلابية . ارساها ثنائية المقل .

١٣٩٣٢ - سَلْبُوتٌ

Sceloporus (S). *Scelopora* (F).

جنس حيوانات زسقة من الطاء وفسلة البيشنيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها من طاء امريكية الوسطى والثنائية || اجسامها صغيرة اللد ، قصيرة القروس الفطس ، غليظة البطن ، ربة القوائم القصية . اثنائها مخلفة الاوان يكثر لها الاخضر والاصفر وتغطي قناب اسد او جروي || قناتها الحشرات الصغيرة والذندان والذباب والحمام .

١٣٩٣٣ - سَلْبُوتٌ

في السلبوت ، املية .

١٣٩٣٤ - سَلْبُوتٌ

Salpigo (S). *Salpigo* (F). *Salpigo* (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة عمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع القطار العالم || اجسامها صغيرة ، حادة ، تطول من ٤ الى ٧ م. رؤوسها شبه غروطية الشكل . صيها بارزة . تكاثيرها وبلاسها نظامية . قرونها الاستشعارية صليانية كاسلها مطوية الخدم ، خفية الخواصر الضصور . احمادها لاسفة . قوائمها نجمة . اثنائها وفسلة البين باكشيتها . اولها الساكنة الوردي والاشهب والادس والصفاني . الاسم || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الازهار . جميعها واثمة او دامة .

١٣٩٣٥ - سَلْبُوتَات

Salpingidae (S). *Salpingidae* (F). *Salpingidae* (E).

فصيلة حشرات من عمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متصلة البدن منتشرة في جميع القطار العالم || اجسامها صغيرة ، اعليجية الشكل ، حادة البسيط ، تطول من ٣ الى ١٠ م. رؤوسها غروطية الشكل . صيها بارزة . تكاثيرها وبلاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل والحجم . احمادها لاسفة . قوائمها نجمة . ارساها خامة المقل باستثناء الزوج الحلقى الرباعي . اثنائها ملوكة || جميعها واثمة او دامة تعيش على الازهار او على المواد النباتية السطحة || اشهر اجناسها السليين والكثير .



سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ



سَلْبُوتٌ



سَلْبُوتٌ



سَلْبُوتٌ

الازرق تحوي من ٢٢ الى ٣٥٪ من الزيت الاصفر الصناتي الشائع الاستعمال الصناعي. كسبه على نحو نحو ٥٪ من الاوت من وعر من الباتبات السبروية المعلقة التي لا تتأثر كثيراً بالأقلم بشرط ان لا تحت فيه الرطوبة. يوجد في جميع الارربة العميقة الفور غير انه ينضج المأسكة المنسوجة.

١٣٩٤٨ - سَلْتَم حَلْطِي *

Brassica napus sylvestris (S). *Navette*, *Chou-colza* (F). *Nape*, *Naphew*, *Winter rape* (E). *Stackrüb*, *Kohlrüb* (D). *Navone*, *Cavalo navone* (I).

نبات عشبي دهني على برقي وزراعي من فصيلة الصليبيات قريب الشبه من السلق الا انه اصفر قدام واحد ساعة. يزدهج اما لاستفراخ دهن بزوره التي تحوي نحو ٢٣٪ من الزيت واما كملف القاشية يفيد الفصع ويهلط اللد.

١٣٩٤٩ - سَلْتَم

Pardreau (F). *Young partridge* (E). السليح والسلف والسلك : فرخ الحجل . ج سلمان .

١٣٩٥٠ - سَلْتَم

Poulette هو حصص الدجاج من الائمة المصنوعة للشجبة الذنية بصدر الاوت. متوسط تركيبة الكيلوي :
زيت ٢٥,٥٪
حامض فسفوري ١,٥٪
عناصر مختلفة ٦,٢٪

١٣٩٥١ - سَلْتَم

السلح : بهاء الباه في البذران وحيا كان . يقال ماء المد وماء السلح وماء الكرخ .

١٣٩٥٢ - سَلْحَفَة

Tortue (F). *Tortoise* (E). السلحفاة كوكبة نجوم شمالية الموضع مشهورة باسم قنطرة ، اطلها .

١٣٩٥٣ - سَلْحَفَة

Testudo (S). *Tortue* (F). *Tortoise* (E). جنس سلاحف من فصيلة السلحفايات . انواعه ١٤ منتشرة في جميع البلاد الحارة . جميعها ارضية المسرح خاضلة طويلاً بأرواح من ٢٠ الى ١٠٠ سم . ذلها متوسط الاضطهاد أكبر الآن تملو قدر قليلة مربية الشكل او مستطيلة ، لوها الى السرة الزرقية || تألف المراهي والسويل . تقضي حياتها الشجري الذي يدوم نحو ٤ اشهر في جسر قليل اللود تحفره في التربة .

١٣٩٥٤ - سَلْحَفَة الْبَرّ

Tortue terrestre rude (F). نوع من السلاحف مشهور باسم سلحفاة خشنة ، اطلها .

١٣٩٥٥ - سَلْحَفَة عَشِيَّة *

Testudo scabra (S). *Tortue raboteuse*, *T. terrestre rude* (F). *Rough tortoise* (E).

سلحفاة برية خاضلة من فصيلة السلحفايات . طولها كال تمجلا لا يتجاوز ٢٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٤ سم . الاثنى اعرض من الطيل واقصر منه . فارق اللول والبرص نحو ٢ سم . || ذلها يبعثي الشكل تملو قدر قليلة المادة . ثوبا الى السرة الزرقية . واسكها اسطواني الشكل ، اظفر اظفر . تقدها اظفر حاد الانسان . لسانها متوسط الطول ملسا . تحتها ذليلة التجماع عند الانكماش .

١٣٩٦٦ - سَلْت هو الشليم ، اطله .

١٣٩٦٧ - سَلْت

Panier, *Corbelle* (F). *Pannier*, *Basket*, *Hamper* (E). سل صغير من القصب او القضبان الخفيفة يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

١٣٩٦٨ - سَلْت

في الابداسيون الاسباني عشبة علفية محققة تسمن عليها الايتار والافنام . انبعاثها مثيرة تجربها للتلح .

١٣٩٦٩ - سَلْت زَوَاعِي في العرن ، اطله .

١٣٩٦٠ - سَلْت عَرَف الْبَلِك في عرن الكرم ، اطله .

١٣٩٦١ - سَلْت * ، نَعْبَة (F). *Celsia* (S).

سلج سليلج . جنس نباتات برية وتربلية من فصيلة الخنازريات . معقودة التصريف على اسم اليوناني المويدي اولات سلازيس (*Olaf Celsius*) || اوراتها مفرقة . ازهارها عصفوري التجميع . ازهارها صغيرة القند مختلفة الالوان المابقة || عرف انواعها الزراعية يتبع .

١٣٩٦٢ - سَلْت اِكْرِي (F). *Celsia cretica* (S).

Celsia de Crète, *Queue d'ours de Crète* (F). عشبة سبروية محولة مهدا جزيرة اكرت . ساقها تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها متعاقبة لاشعة || ازهارها وردية اللون كبيرة القند . ساقها واوراتها لزجة || ازهارها يستمر من سزيان الى ايلول .

١٣٩٦٣ - سَلْت عَرُصِي الْوَرَق

Celsia bugulifolia (S). *Celsia à feuilles de bugle* (F). عشبة سبروية ممررة مهدا تراقية والساحل اليوناني . ساقها تملو نحو ٥٠ سم . اوراتها السفلى خضبة التجميع ، يفضية الشكل ، مفرقة ، فصلها مائل البشرة مائل الخضار || ازهارها الى الصفرة السمرار يطولها تسليج ازرق وولج اسف .

١٣٩٦٤ - سَلْت قُرْصِي (F). *Celsia glandulosa* (S).

Celsia de Chypre (F). عشبة سبروية محولة مهدا قبرص ووسائل الاناذية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراتها متعاقبة خلية وفضية التصل || ازهارها صغيرة القند صفراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٩٦٥ - سَلْتَان هو الخلقوم .

١٣٩٦٦ - سَلْتَج

Huitre (F). *Oyster* (E). صفة بحرية نيا شوي ، يؤكل . ج سليج . اطلب محار .

١٣٩٦٧ - سَلْتَم *

Brassica campestris (S). *Colza* (F). *Colza*, *Rape*, *Carcol-oil plant* (E). *Otraps*, *Kolza* (D). *Colza*, *Napo oleifera* (I).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الصليبيات . جذره وكثي . ساقه غرامه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراته متعاقبة مفرقة ملتفة ، فصلها خلي اللروق سنن الحافة ، بحري الخضار . ازهارها عصفوري التجميع . ازهارها صغيرة رباعية البتلات . يضا اللون او صفراء . ثمار عرولية مستطيلة . بزوره صغيرة دقيقة مستديرة لوها الى السوداء



سلج



سلج



سلح حقل



سلحفاة عشيّة

١٣٩٦٦ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ

Tragopogon geropogon (S). *Salisfia glabra* (F).
نوع من السلفيل الأبيض. هذه مناطق حوض المتوسط.
عشبة سولية تملو من ٢٠ إلى ٨٠ سم. أوراقها مرطاة.
التصل. ثنائيات السنتات. أزهارها حرة، اللون.
أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران.



سلفيل المرج

١٣٩٦٧ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * فَوْصِي

Tragopogon crocifolius (S). *Salisfia sauvage* (F).
Wild salisfia, Goat's beard (E). *Wildier bocksbart* (D). *Salisfia salvatica* (I).
نوع من السلفيل البري. هذه مناطق حوض المتوسط.
عشبة سولية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. أوراقها بحرية
الخضار الباهت. أزهارها صفراء القرم، بفسجية
السنتات. أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

١٣٩٦٨ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ أَيْض

Tragopogon orientalis (S). *Salisfia blanc*, S. à feuilles
de poireau (F). *White salisfia*, *Salisfia*, *Oyster plant*
(E). *Haferwurz*, *Wurzelbocksbart* (D). *Salisfia*,
Scorzobianca (I).
نوع من السلفيل البلي الأزاعي. فروبه عديدة منها
الخالية والمحولة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه وكلية
الشكل بقلية. جلوه سحرية مسطلة يضاء اللون
ماكولة. أزهاره إلى الصفرة اللحية || يربط في الازرة
المجيدة التركيب، المتوسطة الانماج واللينة بالمسود
الفضرة.



سلفيل بري

١٣٩٦٩ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ مَبْدَلِي

Tragopogon porrifolius (S). *Salisfia commun* (F).
Common salisfia (E).
نوع من السلفيل البري. هذه مناطق حوض البحر
المتوسط. عشبة سولية أو محوة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم.
أوراقها خالية التصل، بحرية الخضار. أزهارها كبيرة اللثة
لونها إلى البفسجي الباق. لورائها وطلورها مأكولة.
أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٣٩٧٠ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ وَدِّي

Tragopogon ruber (S). *Salisfia rose* (F).
نوع من السلفيل الأبيض هذه المناطق الجبلية. عشبة
مسرة تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها بحرية الخضار. أزهارها
وردية اللون يملوها موج أرجواني || أزهارها يدوم
اسابيع ابتداء من أوائل أيار.

١٣٩٧١ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Colonne vertébrale,
Rachis (F). *Vertebral column*, *Spinal column* (E).
مجسومة الخرزات الممتدة من قاعدة الرأس إلى حسب
المصمم.



سلفيل شرقي

١٣٩٧٢ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

١٣٩٧٣ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي
هو البرستوج من الاسماك المنشرة، اطليه.

١٣٩٧٤ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

هو البرستوج المصري من أضر الاسماك والندما.

١٣٩٧٥ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ

هو صرعة الجدي، اطليه.

توأمها تصيرة وفليظة. اصابعها كبيرة الاظافر المجدبة ||
تسرح في القهار وفي الليل. قوتها الاشباب والمواد النباتية
والحيوانات والخرابطين || تعيش نحو ٨٠ سنة وتحتفظ
بقاتها التناسلية أكثر من ٧٠ سنة.

١٣٩٥٦ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Chersides, *Testudinidae* (S). *Chersides*, *Testudinidae* (F). *Chersides*, *Testudinidae* (E).
فضيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحيات. مهددا
كلود الحارة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها خاضعة
أرضية المسرح، عطية اللقطة للمحمية. ذيلها عذب
الشكل تملو قتر قرنية لاقياسية الشكل والحجم. زعفها
سداسي الثفر يخرج منها الفراس والذنب والقوائم الاربع
التي تنكشف وتختفي، عند الاستراحة أو الخوف، داخل
اللقطة || أشهر اجناسها السلحفاة والشرسين.

١٣٩٥٧ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Volutella (S).
جنس طيور مجهرية من صمارة الطحانيات فضيلة
الكتكتيات. يتنيز بشجة المعني التجميع ويكناله الحلية
الاطراف || انواعه قليلة العدد والافى. اعرفها سلمية
البار.

١٣٩٥٨ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Volutella fructi (S).
نظر مجهرى يركب البار التناسلية المضمومة اخصبها انضاح
والاجاس والدرائن والسفرجل والفلج والشمش || مظهره
الحاربي تدف ملل أسود اللون يملو البشرة المنطوية
نفضها ويضئ الب ويغور فيه.

١٣٩٥٩ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Mue (F). *Moulding* (E).
سلفة الخي: جلدتها إلى تسليغ ضبا. يقال: هذا ارق
من سلف الخي.

١٣٩٦١ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Incontinence (F). *Incontinency* (E).
عدم استعساك البرد أو الفاط.

١٣٩٦٢ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Salisfia (F). *Salisfia* (E).
جنس نباتات عشية برية وزراعية من فصيلة المركبات.
لورائها عصفية الشكل، ثنائياتها وسيدة الصف. بزوها
مقارفة دقيقة يملوها حرك ريشي || أشهر انواعها ما يلي.

١٣٩٦٣ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

هو السلفيل الشرقي، اطليه

١٣٩٦٤ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Salisfia noir (F). *Scorzozara* (E).
هو اللدبع الزراعي، بقلة مأكولة الاوراق والجذور.

١٣٩٦٥ - سَلَطَانَاتُ الْجَبَلِ * عَمْدُ لَقَرِي

Tragopogon pratensis (S). *Salisfia des prés*, *Barbe*
de bouc (F). *Shepherd's clock*, *Yellow goat's beard*
(E). *Bocksbart*, *Weissenbocksbart* (D). *Salisfia dei*
prati, *Barba di becco* (I).
نوع من السلفيل البري هذه الشرق الاوسط. عشبة
مسرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها سباحية المروق
خالية التصل. أزهارها كبيرة اللثة، صفراء اللون.
أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران

١٣٩٨٧ - سلطة المصان * - *Marasmius sacchari* (S).

نوع من السلطة يركب عيدان المصان يقيفي على نموها بعد ان يمتلئ السليمان السفلى، عند انتشابه ليأطفا، عيشه اليه الاصفر الذي يسبب احمرار وجفاف العفد، ثم اسفرار الصف وذبوله في مظهره الخارجي فطر ابيض اللون، يحمل الجسم، اوسرته جرسية الشكل قطرها نحو ١٥ م. يعيش على العيدان المقطوعة. نمته كثيفة الغشور تقسم من ٥ الى ٢٠ في يتكاثر بانتزاع الاقدام والمواد رايح للميوعة وبالاكثر من الاسمدة الازوتية التي تنشط النمو اليهي والغشوي.

١٣٩٨٨ - سلطة الموز * - *Marasmius seminatius* (S).

نوع من السلطة يركب اريمة الموز ويظهر فيطليا ويقيفي على الاوراق في مظهره الخارجي فطر صغير اللد، ساقه اسطوانية تحمله بيضاء اللون. اوسرته صابنية، ظهرها نحو ١٠ م. ثوبها متراكم الاولان، مظهره البياض والصفرة والحمرة في يتكاثر في اول هذه بانتزاع الاقدام الميوعة وينتفخ الازوتية باحد المركبات النحاسية المحلولة ٢.٢ فيضاف اليها ١.٥ ٪ من الكلس في وما حل هذا الفطر لا يقرب الا التباينات الضعيفة في المراتق الرطبة. لذلك يحسن اجتناب الاسكان الرطبة واستعمال الاسمدة للمطوية انحصار الازوتية التي تنشط الالياف والمواد الغشوية.

١٣٩٨٩ - سلطة حبيكة * - *Marasmius perniciosis* (S). *Balai de sorcière du caucayer* (F).

نوع من السلطة واسع الانتشار يكثر في البلاد الحارة. يركب بعض النباتات انحصار الكاكاو فيجيش الانسان والتموي. وقد يصيب الثمار فيطربها في مظهره الخارجي فطر صغير اللد. ساقه اسطوانية تحمله جرسية طويلا نحو ١٥ م. لونها الى الصفرة الزاهية. اوسرته كلسوية قطرها من ٢٠ الى ٢٥ م. لونها الى الجوة في يتكاثر بالتقاع وحرق الاجزاء الميوعة وينتفخ الاجزاء بسائل يورده بعد طلي الجروح بالمستحلب البالي.

١٣٩٩٠ - سلطة

سلف البقرة وقشاة : خرج ناهاما وهي سالخ. والسلمو في ذوات الاطفال بمنزلة البزبل في ذوات الاطفال لانها اقص استنجا. قوله البقرة اول سنة حبل ثم تبع ثم جلع ثم ثي ثم رباب ثم عليس ثم سالخ سنة وسالغ سنتين الى ما زاد. وقشاة اول سنة حلق ثم جلع ثم ثي ثم رباب ثم عليس ثم سالخ. ج. ع. ل.

١٣٩٩١ - سلطة - *Alexan* (F). *Chestnut* (E).

من الثوب او ألوان الحبل وهو الذي غطيت شفرته.

١٣٩٩٢ - سلطة - *Pardreu* (F).

سلطة صغير الحبل ان كان ذكرا اما الانثى قسلة.

١٣٩٩٣ - سلطة، مستغف، كرتب، كرتاب - *Scarfage*

حرث سطحي بالسلفة تتبشر به ذرات الثوب ولا تقبل.

١٣٩٩٤ - سلفات، كورتات - *Sulfate* (F).

اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

١٣٩٩٦ - سلطة التقدير

Pouvoir discrétionnaire (F). *Discretionary power* (E). هي السلطة التي لم يبين مسلكها بقائمة قانونية تدير عليها.

١٣٩٩٧ - سلطة القضاء

Autorité de Justice, Judicature (F). *Authority of Justice, Judicature* (E).

هي السلطة المنوطة لقضاة بان يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال.

١٣٩٩٨ - سلطة قضائية

Pouvoir judiciaire (F). *Judiciary power* (E). هي التي استندت اليها ولاية القضاء.

١٣٩٩٩ - سلطانين * ، سلطانين

Crabe (F). *Crab* (E).

السلطان والسلطون والكرمران والمعلم اسماء شاملة تطلق على عدة حيوانات مائية أو قازية من القشريات المشاريات الاصل.

١٣٩٨٠ - سلطانين الصخر

Pouper (F). حيوان من القشريات يدهي بوزار، اعطيه.

١٣٩٨١ - سلطانين نهري

هو سرطان النهري، اعطيه.

١٣٩٨٢ - صلح * ، حلق

Cissus (S). *Cissu* (F). *Sorrel-vine, Wild grape* (E). *Cissu-planta* (D). *Cisso* (I).

جنس نباتات معمرة حرة عارية من فصيلة الكرديات. انواعه عديدة منها غلبة الساق كبيرة الحجم تمتد نحو سمة امتار. ومنها متوسطة وصغيرة كسائر المتراوات. يستخرج من جلوعها عند حرها عصارة مشروبة نافعة تروي الغليل في اورانها يبيضا او ليلية الشكل. نصلها قليل القرب جميل اخضر الشبيب، من الحافة. حولها غلبة القرب عجيبة الاطراف. انماها صغيرة خضراء اللون. ثمارها عنبية صغيرة اللد في ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٩٨٣ - صلح مربع

Cissu quadrangulairis (S). *Cisse quadrangulaire, Riz du singe* (F). *Edible stamed vine* (E). *Wildweinebaum* (D). *Vite cisse* (I).

نوع من السلح الممداد الارض الصمغ. هذه البلاد الحارة. يطول من ٥ الى ١٠ امتار. ساقه زياء. اورانها معتقة مربعية الشكل، نصلها خالي البشرة اقرب الزناد والصلح والبروق في تسنها غزير المادة مر العلم يروي الشطن.

١٣٩٨٤ - سلطة هي السلطة، اعطيه.

١٣٩٨٥ - سلطة، عفدة دركية، عفدة

Scrofela (F). *Scrofela* (E).

علة مدلية المظهر الخارجي سببا اعتلال في التوازن الثلاثي وانسياع في الجسم يوجب لاقبال مختلف الجراثيم.

١٣٩٨٦ - سلطة

جنس فطور مخفية من الفاريقونيات. انواعه عديدة تركب نباتات المناطق الحارة انحصار الحربية وبعض النباتات المروية منها الموز والصلح في اشيع انواعه واضرارها ما يقع.



سلطان



سلح



سلطة المصان

بالخامس الكبريتي . تركيزه التجاري الموصوف بحوي
٤٠ أو ٥٠ ٪ من التيتانيوم الصف ٥
في مكانة الخشبات علولا بالله بمثل يروح من ٥٠
ال ٢ ٪

١٤٠٠٢ - سلفات
Emprunt (F). Borrowing (E).
السلفة والاستلاف هو القرض .

١٤٠٠٣ - سلفات
Sulfatage (F).
Sulphating (E).
في المعالجة بالسلفات .

١٤٠٠٤ - سلفات
Sulfatage (F).
معالجة الخمر بالسلفات اي بالخامس الكبريتي .

١٤٠٠٥ - سلفات
Sulfurage (F).
في المعالجة بالسلفور وقد تحقن الآرية الزراعية بسلفور
الكبريت لقتل الحشرات الجارية والخشبات .

١٤٠٠٦ - سلفور الكربون ، كبريت الكربون
Sulfure de carbone (F). Sulphid of carbon (E).
سائل طيار حريف لا لون له يحترق قتال الجراثيم
والخشبات .

١٤٠٠٧ - سلفوسيانيد
Sulfocyanure (F).
Sulphocyanate, Sulphocyanide (E).
مادة جرسانية قوية في حريف الامونياك تقضي على
الاعشاب والخشبات .

١٤٠٠٨ - سلفونترات الامونياك
Sulfonitrate d'ammoniaque
سماد كيماوي ازوتي يحوي ٢٦ ٪ من الازوت سببا
١٩٥ ٪ ازوت امونياكي بلي الاخلال و ٦٥ ٪ ازوت
تبريكي سريع الانفعال والتشليل .

١٤٠٠٩ - سلفيت
Sulfite (F). Sulphite (E).
ملح مركب من حمض الكبريت وبلادة اخرى .

١٤٠١٠ - سلفيديات
Sulfidates (F).
راجع دقيقات .

١٤٠١١ - سلق
Beta vulgaris (S).
Poirée, Bietta, Bietta (F). Swiss-chard beet (E).
Beetkohl, Beet, Gartenmangold (D). Bietta,
Bietola, Costa (I).

نبات عشبي يقل زراعي من فصيلة البسقيات . قريب
للشبه من الشبتان . جلوه وتدي لبي ورائحة قديمة
لتجسس ، كبيرة لثقة مستطيلة ، نضجا خليط البصل ،
مالس البصرة ، شديد الخضار ٥ يتكاثر بالبذر .
انتاش يزود بم بشرة ايام وقابلة الانتاش تنمو نحو
٦ سنتوا ٥ يوجد في جميع المواقع ويربغ في الآرية
للحماية للثنية بالنصر الازوتي .

١٤٠١٢ - سلق الماء
١٤٠١٣ - سلق بيري
هو جار النهر ، اطبخ .
هو حيفس المناع ، اطبخ .

الثانية من ثاقه مع بعض المادد اعصها الحديد والنحاس
والكلسيوم واليوتاسيوم والصوديوم الخ .

١٣٩٩٥ - سلفات الامونياك

Sulfate d'ammoniaque (F). Sulphate of ammonia (E).
سماد كيماوي ازوتي ابيض اللون ، دقيق البرفلة ، يحوي
نحو ٢٠ ٪ من الازوت الامونياكي الطيخ الاخلال
بسبب تربيته وما يتخللها من تحاميل وانفصالات موضحة
تسريعا ظروف التربة ورائحتها وسالها الحكمة ٥ وهو
من اشهر الاسمدة الازوتية ولقدما استعمالا . يصنع
ميدليا ، لكافة النباتات وجميع الآرية التي لا تقتر
الى الكلس اعصها الحمرية التي يروح دافها بين الدرجة
السابعة والثامنة (راجع دائف) ٥ يحسن استعماله باكر
قبل حاجة النبات الى خمسة او ستة اسابيع وذلك ليتسكن
من اجتياز شئ التحاميل والاختبارات الالوية لتربيته
وقاها بمثله ٥ ويجرد ايضا طوره في الآرية بعد ذره
للا تسريه الاطلال او تجرد مياه الري .

١٣٩٩٦ - سلفات البوتاس
Sulfate de potasse (F). Sulphate of potash (E).

سماد كيماوي يتخلل من كلوريد البوتاس بعد معالجه
بالخامس الكبريتي ٥ وهو مسحوق ناعم اصفر اللون
او ابيض يبري من ٤٦ الى ٥٢ ٪ من البوتاس الحريف
مع ٢٥ ٪ من كلوريد البوتاس ٥ وهو سريع اللزبان
بالماء وسريع الانفعال والتشليل يصلح لجميع الآرية
اعصها الثقيرة بالكلس (راجع بوتاس) .

١٣٩٩٧ - سلفات الحديد ، كبريتات الحديد ،
زاج اخضر

Sulfate de fer, S. ferreux, Vitriol vert, Couperose
verte (F). Sulphate of Iron, Green vitriol (E).

ملح متبلور اخضر اللون طعم الحام يلوخ في الماء
الساخن . يستعمل في التطهير وفي مكانة بعض الامراض
الفطرية اعصها اللذان والصفون والريتان ٥ ويستعمل
ايضا كمشاب يغطي على اللسان والمخيشان والشاء .

١٣٩٩٨ - سلفات الصودا ، كبريتات الصوديوم
Sulfate de sodium, S. de soude (F). Sulphate of sodium,
S. of soda (E).

ملح ابيض اللون متبلور من اللذان طابع الاستعمال
البطري يصلح المنة جرحه تخفف باخلطاف الحيوان .

١٣٩٩٩ - سلفات الكلسيوم ، كبريتات الكلس
هو الجبس ، اطبخ .

١٤٠٠٠ - سلفات النحاس ، كبريتات
النحاس ، زاج الازرق

Sulfate de cuivre, Vitriol bleu, Couperose bleue (F).
Copper sulphate, Blue vitriol (E).

ملح متبلور ازرق اللون ، حريف الطعم اللطيف
يلوخ في الماء . تقلله سامي يجرى ورقة الخريف
الزرقاء . يستعمل في مكانة سظم الامراض الفطرية
وفي وقاية الاعمدة والمساند والمسابك من حيث الحشرات
وقوضها .

١٤٠٠١ - سلفات النيكوتين
Sulfate de nicotine (F). Sulphate of nicotine (E).

سائل قلوي سام يستخرج من ثمن التبغ بعد معالجه



سلق

١٤٠٢٢ - سِلْكُوتُ أَرْجَوَانِي *

Carabus violaceus (S). *Carabe pourpre* (F).
حشرة من السلكوتوطا يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م.
ثوبها إلى السواد اللامع. ظهورها أسفع المواج. جانبها
إلى أنضار الإبرواني. تألف الجنائن وأحداق والإحراج.
مسرحتها المويحي يستمر من أواخر الصيف إلى أواسط الشتاء.
تقترس جميع أنواع البرقات الصغرة والحزرون والبراق.

١٤٠٢٤ - سِلْكُوتُ بَهِي *

Carabus splendens (S). *Carabe resplendissant* (F).
حشرة من السلكوتوطا يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م.
ثوبها إلى الصفرة اللحية يعلو مواج أخضر. مسرحتها
يستمر طوال الصيف وأخر الصيف. تألف الجنائن والإحراج
كثُر في الإقليم الجبلية. تقترس الحزرون والسبازق
وتختلف الحشرات الدجوية.

١٤٠٢٥ - سِلْكُوتُ حَقَنِي *

Carabus arvensis (S). *Carabe des champs* (F).
حشرة من السلكوتوطا يراوح من ١٢ إلى ١٨ م.
ثوبها إلى الزرقاء العابقة يعلو مواج أسفع. مسرحتها المويحي
يستمر طوال الخريف والشتاء. تألف الحزرون. تقترس
تختلف أنواع البرقات.

١٤٠٢٦ - سِلْكُوتُ مَدَّ هَب *

Carabus auratus (S). *Carabe doré, jardiniera, Sargent, Vinaigrier* (F).
حشرة من السلكوتوطا يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م.
ثوبها إلى أنضار الذهب يعلو مواج زرجدي سامع.
زبانها وأرجلها صناعية اللون. تألف الحزرون وأحداق
والسبازق. مسرحتها يستمر من أوائل الربيع إلى أواسط
الخريف. تقترس الحزرون والبراق ويمكّم الحشرات
الدجوية والجلل.

١٤٠٢٧ - سِلْكُوتِيَّات *

Carabidae (S). *Carabidés* (F). *Carabidae, Ground beetles* (E).
Laufkäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة عُمَدَات الإيجنة. أجسامها
وأناوعها كثيرة العدد. معظمها كبير القد. أثوابها
سوية الألوان العابقة اللامعة. تألفها قوية. قرونها
الاستثمارية خفيفة. أرجلها طويلة. أرساغها خماسية
المقل || تسرح في الليل وتبيل في النهار تحت الإحراج
والأشجار. جميعها من الحشرات النافعة؛ تقترس
الضارة أعينها الحزرون والبراق والمفسديات.

١٤٠٢٨ - سِلْكِيَّات *

Nematoda (S). *Nématodes* (F). *Nematodes* (E).
طبقة الديدان السلكية من شعبة المحيطيات تشمل العديد
من الفصائل والأجناس والأنواع منها الصفر والمذاب
وغيرها.

١٤٠٢٩ - سِلْكُ

السلم مجموعة كواكب متعاقبة أسفل من المانة من بينها.

١٤٠٣٠ - سِلْكُ ، نَبَّاح

Scalaria (S). *Scalaira* (F). *Scalaria* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الأبريل
وفصيلة السليبات. أنواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في

١٤٠١٤ - سِلْكُ مُصَلِّع * ، سِلْكِيَّة ، لَبْدَان

Beta cicla, B. vulgaris foliosa (S). *Betta à cardes, Beta-épinard* (F). *Leaf-beet, Egyptian chard beet* (E). *Ägyptischer beta, Ag. gartenmangold* (D). *Bietola foglia* (I).
حشر من السلق البقل الزراعي يتميز بكبر أوقافه
وفلاحة خلوصها وسماكته نصلها إلى المائتين الشفيرة.
الحفيرة || يحد في جميع الأتربة البدائية المعدلة الانساج
التيه بالنصر الآزوي.

١٤٠١٥ - سِلْكَان

Loup (F). *Wolf* (E).
هو الثوب والآثى سلقه. ج. سلق.

١٤٠١٦ - سِلْكِيَّة

هي السلق المصنع، أطلقه.

١٤٠١٧ - سِلْكُ

Pardreu (F). *Young partridge* (E). *سِلْكُ*
فرخ الحجل الذكر، والآثى سلكه.

١٤٠١٨ - سِلْكُ حَدِيدِي

Fil de fer (F). *Iron wire* (E).

الاسلاك الحديدية أنواع منها لملاء تستعمل في تسليد
الشجر وغيرها ونسبها شائعة تستعمل في إقامة الحواجز منما
من الصدي.

١٤٠١٩ - سِلْكَان ، دَجَاجَة الْحَرَاك

Bonasa (S). *Gélinotte* (F). *Hazelhen, Hazelgrouse* (E).
Hazelwild (D).
جنس طير من عمارة الضرسيات. وفصيلة الطيوريات
موطنه يمتد من شمال البلاد الآسيوية إلى أوروبا وشمال
أفريقية الشمالية. يتميز بفقرات الصغيرة وبفقر منقاره.
ثوبه إلى الخوازة لونه زرقه صباه وبياض وطلاء وسواد.
طوله يراوح من ٣٥ إلى ٤٠ سم. الآثى أصفر كذا من
الذكر. قوته البرام والجواب والآثار من اختلاف أنواعها.
يمش ذكراً وأثى. يمش في الأرض يرقب الفصوص بين
الأدغال الباردة أو بين الخفاش وفي تخاليف الصخور.
إنشاء تقسم من ٨ إلى ١٢ بيضة تحضنها وبعدها || له
نومان السلكان الشائع وسلكان للشرق.

١٤٠٢٠ - سِلْكَانُ الشَّرْقِي

Bonasa severtzovi (S). *Gélinotte d'Orient, G. des steppes* (F).
طائر من السلكان طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب
الألوان والرقعة، موطنه شمال البلاد الآسيوية. يألف
الأحراج والأدغال.

١٤٠٢١ - سِلْكَانُ شَاخِ

Bonasa sylvestris, B. betulina (S). *Gélinotte des bois, Poule des bois, P. des coedriers* (F).
طائر من السلكان طوله نحو ٤٥ سم. ثوبه متراكب
الألوان والرقعة، موطنه يشمل نصف الأقطار الأوروبية
وشمال أفريقيا الشمالية. يألف الأحراج الكثيفة الظليلة.

١٤٠٢٢ - سِلْكُوتُ

Carabus (S). *Carabe* (F). *Carabus, Carabid* (E).
جنس حشرات دجوية مفترسة نافعة من فصيلة السلكوتيات.
أنواعه عديدة منتشرة في جميع الأقاليم الحارة والمعتدلة.
أجسامها كبيرة القد. أثوابها عابقة الألوان السوية.
من ميزاتها الخاصة أنها إذا ذهرت من شيء قلقت من
شربها يسأل لأصابع يكثر فيه الحامض السي. رقاتها
مفترسة. أجسامها مبطنة تستنق عند الجرائح || أشهر
أنواعها ما يلي.



سلْكُ مُصَلِّع



سِلْكَانُ شَاخِ



سِلْكُوتُ أَرْجَوَانِي



سِلْكُوتُ بَهِي



سِلْكُوتُ حَقَنِي



سِلْكُوتُ مَذْهَب

جميع بحار العالم . جميعها مقترنة قوتياً بالرخويات والكرويات الصغيرة || أجسامها متباينة الحجم ، يكثر فيها المسفر . أصدافها سلبية ، لامعة ، مردنية ، محزونة ومعددة ، تحديقها يبدو كالرقع المستدير .

١٤٠٣١ - سلم ، سلم *Acacia fissa* (S). *Mimosa blond*, *Acacia blond* (F).

نوع من البسوط وهو شجرة من الغطاء مبررة الشوك الحاد . تكثر في البادية . ورقها يضيء القزط يصلح للباغة . الواحدة سلمة .

١٤٠٣٢ - سلم التفرجة ، عكس التفرجة

Dénitrification
تحول يحصل في الاربة الرملية بتأثير ميكروبات خاصة تحول النتريتات الى نيتريت فاميثاك فازوت . وهو بذلك يكون عكس التفرجة وفيه ضرر كبير لان النتريتات اسهل والقرب تمثيلاً وامصاصاً من النيتريت .

١٤٠٣٣ - سلمون ، سلمون ، سلمك سلمكان *Salmo* (S). *Saumon* (F). *Salmon* (E).

جنس اسماك بحرية - نهريّة مقترنة لاحد من فصيلة السلمونيات . انواعه نحو ٥٠ جميعها كبيرة القند تليح كامل نحوها بمر ست سنوات حيث يراوح طولها ، بالنسبة الى انواعها ، من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || والسلمون من الاسماك التي تعيش وتتكاثر في انحاء البنية وقد تعيش في المياه الملوحة دون ان تتكاثر لانها لا تسر في البحر . اما الايد في المياه العذبة فتكون صغيرة القند متوسطة الجوده . وهي يحاطها الطبيعة ترسل الى المياه العذبة في الثشاور وتسراً في الكواكين ثم تعود الى البحر بعد لقف سرتها وذلك في اواخر شباط . اما صغبرها فيقيم في الله الملب ردياً يبلغ الحولين فيوسل اذ ذاك الى البحر ويهوى عيشه جنبه ومعادته الفطرية في التجول والتمسرة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٠٣٤ - سلمون البحريرات *Salmo lacustris* (S). *Saumon des lacs* (F).

نوع من السلمون الايد المتوسط الصنف واللده . يعيش في المياه العذبة . يبلغ كامل نمو بمر ٥ سنوات . طول يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم .

١٤٠٣٥ - سلمون البنايع *Salmo fontinalis* (S). *Saumon de fontaine* (F).

نوع من السلمون الايد المتوسط الصنف واللده . يعيش في مياه البنايع العذبة الباردة . طول يراوح من ٥٠ الى ٨٠ سم . يبلغ كامل نمو بمر خمس سنوات .

١٤٠٣٦ - سلمون صلا ، سلمون مبدول ، سلمون مرفوف *Salmo salar* (S).

Salmon commun (F). *Common salmon* (E).
نوع من السلمون الرجل الكبير القند طول ، عند اكمال نموه ، يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . قوته متراكب الاولان . ظهوره اردوازي ويصلو موج ازررق . جانبها الى الزبد اللبسية . يسلط الى الحمره || اثناء تسراً بظرف ثمانية ايام من ٢٠ الى ٢٦ لقف سرات تنقف بعد اربعة اسابيع ثم تنحور وتتلخ وتبلغ كامل نموها النضي بمر مت سنوات .

١٤٠٣٧ - سلمون كليفوريه ، سلمون كينات *Salmo quinnat* (S). *Saumon de California*, *Quinnat* (F).
نوع من السلمون الرجل الجيد الصنف يرغب في مياه المناطق الباردة . طول يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . قوته متراكب الاولان تقف في ظهور اثره وتقف في بطن الحمره .

١٤٠٣٨ - سلمونيات *Salmonidae* (S). *Salmonidae* (F). *Salmonidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة مقترحات المائات فيها السلمون والدرنة والحدل الخ .

١٤٠٣٩ - سلمى *Stellaria* (S). *Stellaira* (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية وبحولة وبعمرة من فصيلة القرنفليات . انواعها الحمره عديدة اصنافها مطر اقال البلاد المعتدلة الحارة || سقمها خلية الحاد ، فراه . اوراقها لانظامية الازتكاز ، منها المتصلة والمتعاقبة ، ومنها الممتدة واللاحة والقلبية المتصلب والسائبة والرحية . ازهارها فردية او حثكوية التجميع . اشهر انواعها :

سلمى وسطى ، حشفة القززال *S. Media* (S).

سلمى زهاب ، حشفة القززال المرفية *S. pubescens* (S).

١٤٠٤٠ - سلميات *Scalaritides* (S). *Scalaritides* (F). *Scalaritides* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مبديات الاويل اماميات المتصلة . اجناسها وانواعها للمرعة قليلة العدد مقترنة في جميع بحار العالم . جميعها مقترنة . ملجينا الحماي ، جامي ، جامعاتها قليلة العدد || اصدافها متباينة الاجسام ، محزونة ، يكثر فيها الشكل الموزي || اعرف اجناسها السلم .

١٤٠٤١ - سلونوغرافية *Sclénographie* (F). *Selenography* (E).

وصف القمر ورمه
١٤٠٤٢ - سلوب *Longiligne* (F). *Longiline* (E).

نمت تعريفي يوصف به الطول في الحيوانات الداجنة .

١٤٠٤٣ - سلوت *Scalotus* (S). *Scalote* (F). *Scalotus* (E).

جنس حيوانات زحافة من الغطاء وفصيلة السقرويات . انواعها المعروفة عديدة . اصنافها فسيحة تمتد من الفريفة الاعشوائية الى الشرقية ويحضر مدفكر || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، حادة الاعتناق ، رؤوسها قصيرة . قوائمها شديدة الصبر وين الاطراف من لا قوائم له . انواعها سوية الاولان يكثر فيها الكتني الاسمر الاسف || قوتها اللباب واغلام ولديان .

١٤٠٤٤ - سلور *Charas* (F). *Silurus*, *Shedfish* (E).
جنس اسماك نهريّة من فصيلة السلوريات . انواعه نحو ١٢ معظمها من اسماك مياه البلاد الحارة . جميعها مخلقة الرأس ، مستطيلة الشكل ، حادة الحراشف || اشهر انواعه سلور الماسي والبربور والبر والياش والشلبة والقرموط .



سلم



سلمون صلا



سلوت



سلور

السرة تنقل على مكن الحرفيات ويدأها أعصها دودة ورق القطن والودعة للقارضة .

١٤٠٥٥ - سكونة الطلياريات *

Inostemma boeldi (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجسم ، مستطيلة الأفراس . طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تنقل على مكن الطلياريات وتقتني عليه .

١٤٠٥٦ - سكونة القمامية *

Microphanurus semistriatus (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجثة القصيرة طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تنقل على مكن جميع انواع القمامية .

١٤٠٥٧ - سكونيات *

Scallionidae (F). *Scallionidae* (E).

فصيلة حشرات نائمة من رتبة فشاتيات الاجنسة المنصورة . اجنحتها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، غليظة الرأس والبطن ، الزوايا الى السرة العادة الموج || تنقل هي ورفقاتها على مكن الثناكب وحرفليات الاجنسة ويمل بعض الديدان واليرقات .

١٤٠٥٨ - سكوني هي الصرد نوع من البتلوق ، اطلها .

Amnion, Poche d'eau (F).

Amnion, Bag of water (E).

السل الكيس الذي يكثر فيه الولد حين يخرج من الرحم ، وهو الغشاء الورقي الداخلي الذي يلف المجر أي الجنين .

Lyra (F). *Lyra* (E).

١٤٠٦٠ - صلياني

الصلياني كوكبة نجوم شمالية الخيعة مشهورة باسم قيثارة ، اطلها .

Gymnantha (F).

١٤٠٦١ - سكيب *

نمت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته تتكون من الاضاء التناسلية دون سواها ، أي دون فصل وبيلات ...

Romeria (S).

١٤٠٦٢ - صكيح ، رميركة

Rosmeria (F). *Rosmeria* (E).

جنس نباتات شبيهة حولية بزية من فصيلة اخشافيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلاطها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سيقانها غراما ترتفع من ٢٥ الى ٤٥ م . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ريشية التفريش . ازهارها طرفية ، فردية ، متعاقبة الحجم أو كثيفة ، قرزية اللون أو بنفسجية . الثمرها ...

R. orientalis (S).

السلح الشرقي

R. hydrida (S).

السلح النقلي

١٤٠٦٣ - سكيخية هي القرقة الصيلية . اطلها .

Huile de noix de muscade (F).

Oil of nutmeg tree (E).

١٤٠٦٤ - سكيخية

دعن جوز اللب .

Scyllidae (S).

١٤٠٦٥ - سيلديات *

Scyllidae (F). *Scyllidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من السلفنقيات القرشيات . اجنحتها وانواعها المعروفة قليلة العدد مشتركة في معظم بحار العالم

Clariss oronthe (S).

١٤٠٤٥ - سلور العامي

Clariss de l'Oronthe (F).

ويسمى السك الاسود . نوع من السلور يكثر في العامي . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السرة الخضراء . لحمه عادي الصنف ، يذلل اللطاف .

Silure commun (F).

١٤٠٤٦ - سلور الفرات

Common silure (E).

هو الجري ، اطلها .

Clariss du Nil

١٤٠٤٧ - سلور النيل

هو القرموط نوع من السلور يكثر في النيل .

١٤٠٤٨ - سلور جتيس *

Silondie du Gange (F).

سمكة ثورية من مفتوحات الخانة وفصيلة السلوريات . اصلاطها نهر الجنس أي الفنج || جسمها اطليلي الشكل ، كبير القد ، متدل التبط ، طولها نحو ٢٠٠ سم . رأسها صغير الحجم ، غريبي الشكل . عظمها كبير القد . مناهها كيرتان ، صاحتان . زعنفتها الظهرية الاولى متدلة الخيم اما الثانية فتشبهه الصفر . زعنفتها الثانية لينة . ثوبها الى الوردية السمر الغضبية الموج || لحمها كامن الصنف ، مأكول .

Siluridae (S).

١٤٠٤٩ - سلوريات

Siluridae (F). *Siluridae, Catfishes* (E).

فصيلة الجري والسلور وهي من الاسماك العذبة اطراف .

١٤٠٥٠ - سكرس ، تاسط ، تفسس

Nepenthes (S). *Népenthe, Népenthes* (F). *Nepenthes, Pitcher plant* (E). *Kannenstrauch* (D). *Nepenthes Planta de broche* (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السلويات . انواعها نحو ٣٠ منها البلاد الحارة . جميعها عارشة بزية وريشية . اوراقها متعاقبة سانية الشكل المسطيل الذي ينتهي بمخاريط طول قدره ثم يتحول ويصغر عند طوله يصبح كالجراب المجاسي يملو غذاء يعلق ويصنع عند الانتفاخ يمتنع فيه رحيق سكري حامز لرج تفرزه غدد خاصة لا يجذب الحشرات فلذا ما دخلت الحشرة لا تفرق الرحيق ازلفت في السائل وانطق عليها النطاء تفرق وتتمل وتصل الى غذاء يمتصه النبات || ازهارها سليل أو محكول التجميع . اثمارها صغيرة القد ، ثنائية المسكن || يقال ان مناهها اطلية عذبة .

Nepenthesaceae (S).

١٤٠٥١ - سكونيات

Nepenthesaceae (F). *Nepenthesaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل جنس السلور دون سواه .

Le Lévrier, Chiens de

١٤٠٥٢ - سكونيان

chasse (F). *Canes Venatici* (E).

السلويان كوكبة نجوم شمالية الخيعة مركزها بالقرب من الدب الأكبر . نجمها عديدة أبرزها من المرتبة الثالثة . هي تشتمل على سديين لوليين قريبا للشبه بكلي سيد .

١٤٠٥٣ - سكون

هو سليليات القنديل يستعمل مطهراً للأسماء .

١٤٠٥٤ - سكونة الحرفيات *

Telenomus bombycis (S).

حشرة صغيرة من السلويات طولها مليمترو واحد لها الى



سلور جتيس



سلور



سلوة الحرفيات



سلوة الطلياريات



سلوة القمامية

Coque du Levant (F). ١٤٠٨٨ - سم السمك

Indian berry (E).

ثمرة السنبيل بتفاحة الشكل صغيرة اللد جنبها يحوي مادة قلووية ، حريفة ، مرة وبقية تدعى منيسبرمين (Ménispermine) ولها يحوي مادة جمالية سامة تدعى بيكرتوكسين (Picrotoxin) القليل منها يتخذ اعصاب السمك ويقتضي على بعض الحشرات اغصها للقراد وللسمك وما اشبه .

Cotation (F). Quotation (E). ١٤٠٨٩ - سميكة

السكة بيان سعر المصالحات والاسهم ، راجع تسمين .

Stomata, Pore (F). Stoma, Pore (E). ١٤٠٨٤ - سم

ج سام . واسم هي المنافذ الطبيعية اي الثغوب البنية للموصلة بين الخلايا الالدية في ورق النبات وصوته .

Micropyle ١٤٠٨٥ - سم

ثقب البويضة النباتية . ج سام .

١٤٠٨٦ - سم الحلو هو النمل ، اطلها .

١٤٠٨٧ - سم الحوت هو ثمرة القرمية .

٦. في الامثلة الاخرى الطرية					٤. في الامثلة الطرية					١. في الامثلة للزراعة				
مادة لثافة	ازوت	فسفوري	حاصل	كلس	مادة لثافة	ازوت	فسفوري	حاصل	كلس	مادة لثافة	ازوت	فسفوري	حاصل	كلس
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
سحق لثام	١٢,٠٠	١,٠٠	-	-	عصير الراعي	٥,٥٣	٠,١٨	-	-	كسب قسسم	٦,٦٠	٢,٥٠	١,١٠	-
سحق القطن	١٣,٥٠	-	-	-	فاقة	٥,٥٩	٠,١٢	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
سحق قطن	٩,٠٠	-	-	-	اول	٤,٤٤	٠,٠٩	-	-	لوسنات	٥,٢٠	٠,٦٠	-	-
سحق الخلد	٧,٥٠	-	-	-	سليم	٤,٤٥	٠,١٣	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
بها السك	٨,٠٠	٤,٠٠	-	-	فلم	٥,٥٣	٠,١٣	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
زيت صوف	١٢,٠٠	-	-	-	لوس	٥,٥٠	٠,١١	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
لوز	٤,٣٥	٠,٧٠	-	-	لوس	٤,٤٠	٠,٠٨	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
قطن قشاق	١٠,٤٤	٠,١٥	-	-	ورق قطن	٥,٥٠	٠,٠٩	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
جبر قشاق	١,٠٠	٠,١٧	-	-	ورق صوف	٥,٥٠	٠,١٢	-	-	كسب قطن	٤,٢٠	١,٣٠	-	-
٧. في بعض المواد النباتية الممكن استعمالها كسميد					٥. في الامثلة الصلبة					٢. في الامثلة الطرية				
مادة لثافة	ازوت	فسفوري	حاصل	كلس	مادة لثافة	ازوت	فسفوري	حاصل	كلس	مادة لثافة	ازوت	فسفوري	حاصل	كلس
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
قش الحظوة	٠,٤٨	٠,٢٢	٠,٦٣	٠,٢٧	كسب قسسم	٥,٥٠	٢,٦٠	١,٠٠	-	ورق الخيل	٢,٦٠	٠,٥٩	٠,٣٨	٠,٤٧
قش الخرفال	٥,٥٩	٠,٢٣	١,٦٣	٠,٤٣	كسب جز لثام	٣,٢٠	١,٢٠	٢,٣٠	-	ورق الخيل	١,٠٣	١,٥٠	١,١٢	-
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٩	١,٠٧	٠,٣٣	كسب السليم	٥,٠٠	٢,٨٠	١,٣٠	-	قش القطن	١,٥٠	٠,٣٢	٠,٢١	٠,١٥
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب لثام	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	٥,٢٠	١,٠٠	٠,٢٠	١,٦٠
مصالح الحظوة	٥,٢٢	٠,٤٠	٠,٨٤	٠,١٧	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	٣,٤٠	١,٣٠	٠,٨٩	٠,٣٣
مصالح الخرفال	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
مصالح اللوز	٠,٤٨	٠,٢٢	١,٠٧	٠,٣٣	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	٣,٤٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
مصالح القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش القطن	٤,٤٠	٠,٢٥	٠,٨٩	٠,٣١	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش اللوز	٠,٦٤	٠,١٣	٠,٤٥	٠,٢٥	كسب قسسم	٥,٠٠	١,٨٠	١,٣٠	-	ورق الخيل	١,٢٠	١,٣٢	٠,٢٥	١,٨٦
قش														

٨. في الاسمدة الأزوتية الطبيعية					٩. في الاسمدة البوتاسية				
مادة باذلة	إجمالي	نيتروجين	نيتروجين	نيتروجين	مادة باذلة	إجمالي	نيتروجين	نيتروجين	نيتروجين
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
إزوتك	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٢٠,٥٠	مخلفات البتاس	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
موتيلات	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٢٠,٥٠	كلوريد البتاس	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
أورب، بيرة	٤٦,٠٠	—	—	٤٦,٠٠	سلفيت	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
برازيل	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	سلفيت	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
سرفيت الأمونياك	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
سلفات الأمونياك	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
سلفيت	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
الأمونياك	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
سلفيت الكلس	٢٠,٥٠	—	—	٢٠,٥٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
كلوريد الأمونياك	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٢٠,٥٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
نترات الأمونياك	٢٠,٥٠	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٢٠,٥٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
نترات البتاس	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
نترات البير	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
نترات الشيل	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
نترات الصودا	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠
نيتروبنز	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	رود الفوسفات	٢٨,٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠

١٤٠٩٠ - صمغ ، صمغ Canal de l'oeuf (F). سماد البتاس Poudrette

سماد فسفوري مسحوق أسود اللون ينتج من ترسيب وتجهيز
البراز. ينتج من الاسمدة المحلية النشطة لأنه لا يندمج
أكثر من سنة. يحرق :

من ١٥٠ إلى ١٥٠ / ١٥٠
٢٥ إلى ٢٥ / ٢٥
٣٥ إلى ٣٥ / ٣٥

١٤٠٩١ - صمغ ، صمغ Epigénie (F). سماد البتاس Engrais potassique

هو كل سماد أسمدة البتاس من أي مصدر كان .

١٤٠٩٢ - صمغ ، صمغ Engrais (F). Fertilizer (E). هو كل ما يضاف الى التربة الزراعية من مواد استيعابية
او تكميلية الغاية منها حفظ الخصب ولتسهيل الحيوية
البينية وتحسين القيمة الحركية والكبادية واستدراجها نحو
الافضل || فالباد اذا يمد الى التربة ما يستعمله النبات
من مختلف العناصر الرئيسية التي بدونها لا يستمر إنتاج
ولا يقوم اقتصاد. وهو يقسم الى قسمين : فسفوري وسلفي .
وهو وضعا في الجدول احصاه اعرف المواد المستعملة
كاسمدة فسفورية وأشهر الاسمدة الكبادية المعتمدة مع
ما تحتوي عليه من عناصر غذائية ومقاديرها .

١٤٠٩٣ - صمغ آزوتي Engrais azoté (F). سماد آزوتي Azotized fertilizer (E).

هو كل سماد اسمه الآزوت مهما كان مصدره ان عضوي
او معدني .

١٤٠٩٤ - صمغ الآلغ ، صمغ Goémon (F). سماد الآلغ Seaweed (E).

هو الآلغ حل اختلاف أنواعه يجمع ويترك بعض الوقت
الى ان تلتصق الأسماك وتترسب مله ثم يكس من جنبه
الى ان ينضج فيتمثل كباد فسفوري يحرق :

من ٦٤,٥٠ إلى ٦٤,٥٠ / ٦٤,٥٠
من ٣٧,٥٠ إلى ٣٧,٥٠ / ٣٧,٥٠
من ١٠,٥٠ إلى ١٠,٥٠ / ١٠,٥٠
من ٢٧,٥٠ إلى ٢٧,٥٠ / ٢٧,٥٠

١٤٠٩٥ - صمغ كيميائي Engrais chimique (F). سماد كيميائي Chemical fertilizer (E).

هو كل سماد يصنع في المعامل بيطا كان او مركبا .
فالاسمدة الكبادية اذا مواد معدنية استخرجت الحاجة
فليجدها العلم له عوز النبات المزراية الى الاغذية
الرئيسية الضرورية الواجبة لتفسيه ونمو ولكل حل الامتصاص
وتوجيهه للتوجيه الاقتصادي العلم نحو الاقبال الصحيح

المسكن || اوراقه وزوايه وصارفة سقة تستعمل في عدة صناعات كالدهانة والصبانة والبلاد || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٤١١٢ - سَمَادُ الدِّبَاغِين * ، تَمَتَم

Rhus cortaria (S). Sumac des corroyeurs, Roure des corroyeurs, Corroyère, Vinaigrier (F). Sumach, Tanner's sumach (E). Eselbaum, Gerbersumach (D). Seimmaco, Scottano romano (I).

هو السباق المعروف الميلول في البلاد اللبنانية السورية . فبجيرة عابلة تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . فروعها زاهية البعد اوراقها مركبة تد من ١٠ الى ١٥ ورقة نصلها باحت الخضار خلي الصفة السفل . ازهارها عثكولي كفيف التجميع يطول من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهارها خضراء اللون . ثمارها بلسنية الشكل ، جردية اللون ، خلية البشرة . يزورها شديدة الصلابة معقولة || اوراقها دباغية . سوق ثماره من التوابل الحامضة المانصة المشهورة .

١٤١١٣ - سَمَادُ الصَّبَاغِين ، عَرَبَرَب

Rhus cotinus (S). Sumac des teinturiers, Fuscat, Arbres à perruque (F). Smoke tree, Wig tree, Venetian sumache (E). Echter perückenstrauch, Perückenstrauch (D). Sommacco à parrucca, Scutano, Rubione (I) .

بجيرة عابلة تملو من ٧٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة . ورقاتها سنائية ذلقة . نصلها حايق الخضار ، خلي الصفة السفل . ازهارها تاجي الارتفاع هربي الشكل . اوراقها دباغية وصباغية ، غصبا اصفر اللون .

١٤١١٤ - سَمَادُ الطَّلَاء * ، عَرَبَرَب

Rhus vernix (S). Sumac vernis, Bois chendelle (F). Lac sumach (E). Lackbaum, Firnisumach (D). Sommacco d'India (I).

شجرة عابلة تملو نحو ٦ امتار . ساقها مائلة البعد . اوراقها مركبة تد من ٥ الى ٢١ ورقة نصلها سنن الزام الاعبر ينمو حايق الخضار اللامع ثم ينصرف الى الجلود . ويتنفي في اوائل الخريف باحمر البرتقالية || ازهارها ابطي . ازهارها صفراء اللون ، خلية البشرة . ثمارها بلسنية تطرها نحو ٤ سم . يزورها مضلة . ثمارها واوراقها وصارفة قلبية لبادا جملها اروي || عصارها خمرية ، تستخرج بالبخار ، يصنع منها الكهني الفاسر الصنت .

١٤١١٥ - سَمَادُ الْبَلَك * ، رُحُسُ الصَّنَائِقِ

Rhus verniciflua (S). Sumac à laque (F).

شجرة عابلة تملو نحو ١٠ امتار . ساقها مضلة البعد . اوراقها مركبة تد من ٧ الى ١٣ ورقة نصلها بطول نحو ١٦ سم . ازهارها هربي الشكل عثكولي التجميع . ازهارها الى الصفار الباهت || يستخرج من ساقها بالبخار حصاره صفية لزجة يصنع منها الكهني الياباني الفاخر الصنت .

١٤١١٦ - سَمَادُ جُمَاعِي * ، رُحُسُ السَّامِ

Rhus toxicodendron (S). Sumac vénéneux, Arbre du poison (F).

جنية عارضة عابلة تطول نحو ٥ امتار . اوراقها مركبة ثلاثية . نصلها قلمي الشكل ، ذرب النعصة ، اذنب النعصة السفل . ازهارها عثكولي التجميع ، محوري الارتفاع . ازهارها خضراء اللون . ثمارها مجهم وشكل الحصى ، ملها بالبشرة ، صفراء اللون || ثمارها جمالية تحوي بعض المواد القلبية الفتالة .

والانتاج الزايف الاثام || لذلك فالاممجة الكجارية حديثة لانها وضعت ، ولا تزال توضع وترق مع العلم والتقنية سدا لحاجة النبات وظروف التربة والاعلالم || تقسم الاممجة الكجارية الى ثلاثة عناصر رئيسية : الازوت وحمض الشفوف واليوراني . ثم تلبها العناصر الثانوية كالكلس والمغنيزيوم والكريت واليورق ، الخ .

١٤١١٧ - سَمَادُ مَرْكَب * ، عَنَّاغَرَسُ مَرْكَب

Engrais composé (F). Compound fertilizer (E).

هو كل سماد سوي كامل او بعض العناصر الرئيسية وقد شاع استعمال الاممجة للصناعة المركبة نظرا لما تحققه من اقتصاد ملموس وين نتائج طيبة .

١٤١١٨ - سَمَادُ مَعْدَنِي * ، عَنَّاغَرَسُ مَعْدَنِي

Engrais minéral (F). Mineral fertilizer (E).

هو كل سماد مصدره معادن الارض يستخرج ويستخلص في سبل التربة وراثت .

١٤١١٩ - سَمَادُ وَسِيط * ، عَنَّاغَرَسُ وَسِيط

Engrais catalytique (F). Catalytic fertilizer (E).

هو السباد الكجاري المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطت بمفعيله الخيمية ثباتها المزدودة دون ان تلتصق منه || الاممجة الوسيطة مدينة بجمها من العناصر الثانوية والثالثية . اشهرها الكبريت والمغنيزا واليورق المثيزا .

١٤١٢٠ - سَمَكَر * ، تَوَدْرِيح ، فِجَلُ الْجِمَالِ

سَمَكَرُ بَرِّي ، سَمَكَرُ بَرِّي ، سَمَكَرُ الْبَرِّي ، اَطْلَب .

١٤١٢١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٢ - سَمَكَرُ شَالِك * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٣ - سَمَكَر * ، تَوَدْرِيح ، فِجَلُ الْجِمَالِ

سَمَكَرُ بَرِّي ، سَمَكَرُ بَرِّي ، سَمَكَرُ الْبَرِّي ، اَطْلَب .

١٤١٢٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٢٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٣٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٤٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٥٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٦٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٧٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٨٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤١٩٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٠٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢١٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٢٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٥ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٦ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٧ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٨ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٣٩ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٤٠ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٤١ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٤٢ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٤٣ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

١٤٢٤٤ - سَمَكَرُ الْخُضَر * ، سَمَكَرُ الْخُضَر * ، اَطْلَب .

صنيرة القد. اجسامها صنيرة ، ثنائية الخناصير الطليقة
المستطيلة || تعيش في الاسمان والرمال القليلة النور .

١٤١٢٦ - سَمَاقِيَّات *
Pammobidae (S).
Pammobidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم .
اجسامها وانماؤها المبرومة عديدة معظمها من متحجرات
الاراضي الثالثة || اجسامها صنيرة القد او متوسطة .
مستطيلة الخناصير ، اصداؤها شبه طليقة الشكل ، جميلة
الالوان المتراكبة الزاهية || اعرف اجناسها واشهرها البياض
والدمامة .

١٤١٢٧ - سَمَكَم
Fourm rousse (F).
Reddish ant (E).

١٤١٢٨ - سَمَكَمَة ، مَخْطَفَة ، حَمِص
Cypselus (S). Martinet (F). Swift (E).

جنس طير من فصيلة السبايات . انزاعه المبرومة ٢٠
جمها من التراب ذات الخفيف والمخفي . اجسامها
مستطيلة . اجنتها غارقة الطول . اذنانها فاقرة . ارجلها
قصيرة مدرولة . مناهرها صنيرة . اشدانها واسنة || وهي
من الطيور النافذة التي تقضي على الحباب والحلم واليهوض
وبعض الحشرات الاخرى . تتميز بجريتها الشديدة
والكثافة تحت السطح . طيراتها فاقرة السرعة . تكثر اوكارها
في اجاب الصخور وتحت سطوح البيوت . انها تحسن
رسخها من يفتحين الى ثلاث بياضات زهاء اسبوعين . اشهر
انواعها ما يلي .

١٤١٢٩ - سَمَكَمَة الصُرُود * ، حُرُور
Cypselus melba, Micropus melba (S). Martinet alpin,
M. à ventre blanc (F). Alpine martin (E).

من اكبر انواع السباية . تألف البلاد الجبلية ، يكثر
ويجدها في الفرج الاذني وطلستن . طولها نحو ٢٣ سم .
ثوبها الى السواد الضحكي . بطنها ابيض ، صدورها مخيط
بخط اسمر .

١٤١٣٠ - سَمَكَمَة رَمْدَاك * ، مَخْطَفَة اسْمَر
Cypselus murinus, Micropus murinus (S). Martinet
murin (F). Little grey (E).

سماة متوسطة القد طولها نحو ١٧ سم . ثوبها الى الاربعة
المدراء . عنقها ابيض موطأ وسائل البحر المتوسط وفي القوس
والرفيق الشرقية والجزيرة .

١٤١٣١ - سَمَكَمَة سَوْدَاك * ، حُرُوق
Cypselus apus, Micropus apus (S). Martinet noir,
M. de murailles (F). Black martin (E).

سماة كبيرة القد طولها نحو ٢٢ سم . ثوبها الى السواد
الاسفنج يطوق مزاج اخضر . زورها ابيض الضحل .
تألف جميع بلاد حوض البحر المتوسط وفي كتوفل في
الداخل .

١٤١٣٢ - سَمَكَمِيَّات
Cypselidae (S).
Cypselidae, Apodidae (F). Cypselidae (E).

فصيلة الطيور السباية من الجوامع المبرومات الناقير
اجناسها وانماؤها عديدة . جمها من الطيور الجاهجة التناقل
الصغيرة القد ، المستطيلة الجناح ، السريعة الحركة والخفيفة
الطيران || معظمها من القواطع . قويا الحشرات والحلم .

١٤١٣٣ - سَمَكَم
Pomacanthus symnus (F).
سمكة بحرية تسمى حائل سمان ، اطفاها .

١٤١١٧ - سَمَاق حَرْتَه ، عُرْب
Rhus pentaphylla, R. albidia (S). Sumac à 5 folioles
(F). Hawthorn like sumach (E). Spitzdorn (D).
Sootano alba (I).

شجرة مبرومة تملون الى ٧ اذنا . ساقها وورونها
شاذكة . اورقانها مركبة ثلاثية او خمسية الوريقات .
نصلها مالى البشرة ، مستطيل الشكل ، ثلاثي التسنين .
ثمارها حلوة الطعم مأكولة || اورقانها دباغية وصياغية
لكنها متوسطة الصنف .

١٤١١٨ - سَمَاق عَطْرِى
Rhus aromatica (S).
Sumac aromatique (F).

شجرة عابلة تملر من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اورقانها مركبة
لثائية . نصلها مسنن الخلفة حلوي الرائحة عند التفرك .
انزعارها متشكلى مستطيل يسبق الازلاق . انزعارها صفراء
الون || تزرع لثمين ترعر من اذار الى نيسان .

١٤١١٩ - سَمَاق كَاذِب ، حُرْب
Rhus succedanea (S). Sumac succédané, S. à lard
(F). Tallow sumach, Japanese wax tree (E). Japanischer
sumach, Wachsaum (D). Sommesco da sego (I).

يكثر في الشرق الاقصى شجرته تملر نحو ٦ اذنا .
يستخرج من ساقها بالخر مصادة صمغ لزجة يصنع منها
الك الصبي المدوي الذي يعتبر من الاصناف الوسطى .

١٤١٢٠ - سَمَاقِي
Granit, Porphyro (F).
Granit, Porphyro (E).

حجر السباق وهو حجر صواني قاس اسود اللون او احمر
او اخضر او موشح بالاحمر والاصفر والجلوي .

١٤١٢١ - سَمَاك
السماك منزل من منازل القمر الشامية ، ويدهى السماك
الازرق لان ليس امامه شيء من حين ان السماك الراجع الذي
لا يثقله القمر ، يتجه كوكب يقال له راية السماك .

وبعض العرب يحمل من السباكين ساقا الاسد || وذهب
السماك يدهى بطن الحوت .

١٤١٢٢ - سَمَاك اَهْرُوك ، سَمْبَلَة
Epi, Spica (F). Spica (E).

السماك الازهر او السنبلة نجم لير من برج العقراء . مركزه
بالقرب من اليد اذنا السماك الراجع . يبعد عن الارض نحو
٢٠٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٣ - سَمَاك رَامِج
Arcture, Arcturus (F).
Arctures (E).


السماك الراجع نجم ثير اخر من كوكبة العقراء . مركزه
بين فطلي البقار اي السواد . ويدهى حارس البقار لانه
لا يقبل حتى تحت اشفة الشمس . يبعد عن الارض نحو
٤٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٤ - سَمَكَم
دودي في الماء الثلج .

١٤١٢٥ - سَمَكَمَة *

Pammobius (S).
Pammobie (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة السبايات . انزاعها المبرومة تناثر لثة . بعضها
من متحجرات الاراضي الثالثة والبيض الآخر معاصر
متشتر في جميع بحار العالم || اصداؤها شبه عظمية الشكل ،



سَمَاة



سَمَاة الصُرُود



سَمَاة رَمْدَا



سَمَاة سَوْدَا

١٤١٤٧ - **سَمَحَق** (P). *Periosteum* (E).
جليلة رقيقة لينة المادة تنفي العظام .

١٤١٤٨ - **سَمَحَق** ، **عَكُوس** *Cirro-stratus*
نوع من الغيوم المتصلة البعد مظهرها طبقات متتابعة
أفقية الارتكاز وشاحية الشكل مسطيلة يتخللها بعض
الكتل المائية .

١٤١٤٩ - **سَمَح** *Germination (début)* (F).
هو بدء الانتاش . راجع **أَنْشَأَ** .

١٤١٥٠ - **سَمَعَة** ، **صِرْم** *Sous-variété* (F).
Sub-variety (E).
السمة ج صمخ . هي أفراد من ضرب واحد تتميز بصفات
خاصة جعلها يكتسب بعض الشيء من القرب المتعددة منه .

١٤١٥١ - **سَمَعَة** *Epigenèse* (F). *Epigenesis* (E).
السمة هي الطريقة المتبعة في تمييز... تكون الاجسام
المركبة عند إضافة ما كان ينقصها أو ما كانت تفتقر
اليه جبروتها .

١٤١٥٢ - **سَمَد** *Engraisser* (F). *To manure* (E).
استعمل المهاد التربة .

١٤١٥٣ - **سَمَر** *Clair-obscur de la lune* (F).
السمر اسم ظل القمر .

١٤١٥٤ - **سَمَر**
هو السطح اللويبي الظلمة . ويبدأ عن ابي سمنة : « جهر
من المشاء وليس في المشاء اجود غشياً منه ينقل الى
القرى تنفسى به البيوت » الراسدة سمره . ويقال ان
الشجرة التي يبيع تحتها رسول الله كانت سمره .

١٤١٥٥ - **سَمَرَمَر** * ، **سَمَرَمَر**
Pastor roseus (S). *Martin rosalin*, *Etourneau*
roze (F). *Rose-coloured starling* (E).
بين اسماءه باذنجان وسلכות وسفرماي . طائر قنبراني
وحيد الجنس والنوع من فصيلة الثروازير طوله نحو ٢٣
سم . رأسه ورثه وصفه وبنامه ويذكاه الى السواد
الازرق المالح . سائر ريشه احمر ودي . منقشاه
ويجدها الى الصفرة في موطنه البلاد الحارة يجمعها في
طلب الصيد والمخفى قوته الجراد والجنادب والقيايط .

١٤١٥٦ - **سَمَرَوِيَّة** * ، **قَصَب** *حر*
Simaruba (S). *Simaruba* (F). *Simarouba* (E). *Simarubum* (D). *Simaruba* (I).
جنس الشجر حرجية طيبة من فصيلة السمر وبيات . انواعه
٦ منها امريكا الوسطى ، سيقانها لمساء الماء تملو
من ه الى ٢٠ م . اورقانها متعاقبة بسيطة او مركبة .
انزاعها متكرري التجميع تاجي الارتكاز . انزاعها خشوية
خامسة البتلات || انشاجها صلبة مفرد اللون فاحرة
الصف . لحاء سيقانها واضحا مرة الطعم طيبة . نقيها
يستعمل في مكافحة الحشرات . يحرق اورقانها وتنتجها
مضاد لسم الاقضي وقد يستعمل في مما لجة السلس وبعض
الامراض الجلدية .

١٤١٥٧ - **سَمَرَوِيَّات** *Simarubaceae* (S).
Simarubaceae (F). *Simarubaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القلمات .

١٤١٣٤ - **سَمَانَة** *Callie* (F). *Quail* (E).
راسدة السمان طائر من الطيوريات . يقال سمانى الواحد
وليس والواحدة سمانة جميعها سمانيات .

١٤١٣٥ - **سَمَانِي** * ، **قِرِي** ، **قَتِيل** *الزهد* ،
Coturnix (S).
قِرِي *Callie* (F). *Quail* (E).
جنس طير من صمارة الحبيليات وفصيلة الطيوريات
واحدته سمانة وقراية ، جميعا سمانيات يربي . انواعه نحو
١٥ جميعها من القواطع مظهرها صغير . القند . طولها
يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . انولها الى الصبهة الخفيفة
المقل المزدوجة والرامي والكروم قتها الاشباب والحوب
والطوام || الانثى اصغر قدماً من الذكر واهن لوناً .
تدثر انصوبها في الادلخال وبين الاشباب الكثيفة
ورصمه بالعيش التام . تضع من ٨ الى ١٥ بيضة
تحضنها وحدها زهاء ثلاثة اسابيع .

١٤١٣٦ - **سَمَبَلُفُورَة** **مُحْتَشِمَة**
Cymbalophora pudique (F).
هي الطنوسية المحتشة ، الظلمة .

١٤١٣٧ - **سَمَت** *Azmut* (F). *Azmuch* (E).
اصطلاح علمي فلاني يدل على نقطة زهرية واقعة فوق رأس
الراسدة تدعى سميت الرأس يقابلها نقطة اخرى تقع تحت
قدم ذات الراسدة تدعى سميت القدم او التنظير . وسمتا الرأس
والقدم هما قطبا دائرة الانثى .

١٤١٣٨ - **سَمَت** **الرأس** *Zénith* (F). *Zénith* (E).
هو التنظير اي سميت القدم .

١٤١٣٩ - **سَمَت** **القدم** ، **نَظِير** ، **نَظِير** *السَمَت*
Nadir
سَمَة *Stigma* (F). *Stigma* (E).
الجزء الاقل من مقلقة الزهرة وهو الذي يتقبل الويلع .
وهي في الحشرات المفصلي فوعة تنفسية سطحية مباشرة
الاتصال بالانابيب التنفسية .

١٤١٤١ - **سَمَة** *Necte* (F). *Mating* (E).
سمنة من خوص تبسط تحت الثقل ويهدم من الاجنار
الثقرة ليعلط عليها ما تنثر منها . ج س .

١٤١٤٢ - **سَمَة** ، **عَلَامَة** ، **وَسَم**
Etiquette, *Marque* (F). *Ticket*, *Mark* (E).

١٤١٤٣ - **سَمَة** **الشجر** *Marcelage* (syrv.) (F).
Marking of trees (E).
علامة يضعها مأمور الاجراع على بعض الاشجار الحرجية
الجارى قطعها .

١٤١٤٤ - **سَمِي** *Zénithal* (F). *Zenithal* (E).
غصن يسمت الرأس .

١٤١٤٥ - **سَمَح** *السبح* : المود لا حدة فيه .

١٤١٤٦ - **سَمَحَج**
السماج و**السَمَج** : القوس الطويل النهر .



سماني



سمر



سمر به

ماحتان ، زعنفتها الظهرية تمتد من الخيط إلى طرف الذيل .
زعنفتها البالية مستديرة الطرف || لحمها فاخر الصنف ،
مغروب فيه .

١٤١٨٧ - سمكة الشكل
Ichtyomorph (F).
Ichtyomorphous (E).

١٤١٨٨ - سمكة
Vase (F). Silms, Mud (E).
ج سمل وسماك وسماك وسمول . بقية الماء والحماة في
الحوض والقدير .

١٤١٨٩ - سمكة
السلق : لا تقدر لا نبات فيه وقيل القاع المستوي الاسلس
الابر لا يجر فيه . ج سلق .

١٤١٩٠ - سمكة
Rhagio (S).
Rhagio, Lepels (F). Rhagio (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات وربة ذوات الجناحين.
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة
والمتدلة الحارة والباردة || اجسامها متفاوتة القد تطول
من ١٢ الى ١٨ سم . رؤوسها كبيرة ، قليلة التكوير ،
مستقلة . حيوها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطامها مستطيلة . ملابسها
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها شبه مدنية الشكل .
رواشنها كبيرة ، ملونة . فنانها قوائمها الوسطى والخلقية
ثلاثية المفاصل الحادة . اناها ملونة || تألف الخراج
والفأبات والخالتي . جميعها قانصة . يرقاتها والجمه
في التيريب والخالفة والاعشاب النعرة .

١٤١٩١ - سمكة البيات
Rhagionidae (S).
Rhagionides (F). Rhagionidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء
استراليا . جميعها غائلة ، متفاوتة || اجسامها متفاوتة
القد ، تطول من ٦ الى ٢٠ سم . رؤوسها قليلة التكوير ،
مستقلة . حيوها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطامها مستطيلة . ملابسها
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها مستطيلة . رواشنها
ملونة || اناها اكبر قدأ من ذكورها . يرقاتها والجمه
تميش حل ما تستطيع اقتراسه من دويسات تحسح في
محيطها || اشهر اجناسها السليطة والتيريس .

١٤١٩٢ - سمك
Beurre (F). Butter (E).
سلا الزبدة المصنوعة بالمخاض الرية المتينة .

١٤١٩٣ - سمك
Engraisser (F). To fatten (E).
بالغ في تغذية الحيوان لتسمين لحمه وزيادة وزنه .

١٤١٩٤ - سمك نباتي
Cocose, Végétaline
هو دهن جوز الهند اي زجر الكانجيل . وكل دهن مأكول
مصدره النبات .

١٤١٩٥ - سمكة
Griivère (F).
Thrush aviary (E).

طيرة فسيحة مشبهة الجوانب والسف تستعمل لتربية
السن .

١٤١٩٥ - سمكة
Poissons (F). Fish (E).
حيوانات قفارية من خلق الماء تعتبر من ذوات اللحم
البارد ومن ادف الحيوانات القفارية || رتبها وعضائها
واجناسها وانواعها نحو ٤٠٠٠٠ . تتميز باعضائها التنفسي
المركزة حل الخياشيم التي تقوم بعملية تبادل الغازات .
وبعضها الحركة التي تستند على الزعانف والمضلات .

١٤١٩٦ - سمكة أحمر
هو النوع ، اظلم .

١٤١٩٧ - سمكة التيرس
Rhombus (S). Turbot (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المفلطحات . انواعها ٧
موطنها الاقنيس الاطلس والبحر المتوسط . جميعها كبيرة
القد مستديرة مبطلة . طولها يراوح من ٤٠ الى ١١٠ سم .
انها الى الصبغة المختلفة المزيج يعلوها تزيين اسود .
لحمها لليل اللحم ، فاخر الصنف .

١٤١٩٨ - سمكة الكراكي
Brochet, Esox (F).
Esox, Pike (E).
هو الزنجير جنس اسماك نهرية كبيرة القد مستطيلة .

١٤١٩٩ - سمكة سلبان
هو السلبان من الاسماك الشهيرة .

١٤١٩٠ - سمكة فقي
هو النسيمة ، اظلم .

١٤١٩١ - سمكة متعجر
Ichtyothete

١٤١٩٢ - سمكة موسى
Solea (S). Sole (F).
جنس اسماك بحرية من الملسوات الجانيات اليوم انواعها
سنة موطنها جميع البحار . اجسامها مفلطحة صغيرة
القد او متوسطة . طولها يراوح من ١٥ الى ٦٠ سم .
لحمها لليل اللحم فاخر الصنف . اجودها اميها ثيجا .

١٤١٩٣ - سمكة
Poisson (F). Fish (E).
رايح اسماك . ج سمك وسمك وسمك وسمك . اظلم .

١٤١٩٤ - سمكة بيشه
هي الزينة ، اظلم .

١٤١٩٥ - سمكة طائرك
Poisson volant (F).
Fish volant (E).

السمكة الطائرة كوكبة نجوم جنوبية المبحر مركزها تحت
برج الدلو || عدد نجومها ١٧ . جميعها من المرتبة الخامسة
وبادونها .

١٤١٩٦ - سمكة موسى الشاكبة
Solea solea, Pleuronectes solea (S).

Sole commune, Parérix de mer (F). Sol, Soul (E).
نوع من سمك موسى . سمكة بحرية يروض من فصيلة
جانيات اليوم . اعطائها مفلطحة بجار البلاد المتدلة الحارة
واعصها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك اسلم
الغاف . جميعها توجي الحركة || جسمها مبطط الجرم ،
الطليقي الثورن ، يطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . تتميز
بالاستلقاء على الجانب الايسر مما يجعل عنها في الصبغة
البي من الرأس . فوقها مائن المحيط التي تموش فيه .

الصبغة التي الى المحتل المزيج . الصبغة اليسرى
الى الليرة البيضاء . رأسها صغير الجرم ، انفس الخمل ،
مستل اللشق . فكها الاصل يتقدم الاسفل . استناها
صغيرة ، ذوبة ، عديدة الصفوف . حيتاها صيرتان ،



سمك التيرس



سمك موسى



سمكة موسى الشاكبة

١٤٢١٣ - سَمْنُونَةُ الْحَرَّعِ *

Semanotus laurasi (S). *Sémanote du genre-vrier* (F). *Semanotus laurasi* (E).

حشرة غاصلة غاشية من فصيلة القرنيبات ورتبة غمدات الاجنحة. تألف الجروود حيث يكثر الحرير والدفان والابيل. خنافسها تمشي على الارواق والازهار وخوا المراهيب. يرقاتها تركب الجروح والاضغان فتفترها وتدرجها حتى الشكير || جسمها متوسط لثقة يطول من ٩ الى ١٢ سم. عند الذكر ومن ١٥ الى ١٨ سم. عند الانثى التي تتميز ايضا بكير المزو. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والكولور والزبان والبلغم والجرازم ، افصح الظهران الخصب بجمدة متفرقة سوداء. رأسها معتدل الحجم. حينها كيرتانا جاسطتان. زباناها خيطيان مهبان. ظهراتها مستدير الطرف اللاحف عند الذكر || جيلها ثلاثي الجيل. تظهر الحشرة الجملانة في فينان ويأتي حتى ايلول. تسرح في النهار. تشابه هذه ظهورها بنحو ثمانية اسابيع. تزلز المن بين التفتور || البرقة عند الادراك تمام تطول من ١٨ الى ٣٠ سم. جسمها منحذب الظهر ، مبط الملب ، قصير الرواجب النولية. ثوبها الى السرة يطول موج اشجع وتفتيح اخر عند الحلقه الصدرية الثانية التي السكة البطنية قبل الاخيرة. رأسها جزوي اللون يغور من الحلقه الصدرية الاولى || طور الاكمال الذي يستمر من ٥ الى ٥٥ يوما ينقضي عنه مدخل آخر تلقى احتفرته البرقة ضمن صلح من المواد النباتية المعجولة بالريال.

١٤٢١٤ - سَمْنُونُكَة *

Scymnorhinus, *Scymnus* (S). *Scymnorhine* (E). *Scymnus* (E). جنس اسماك بحرية سرابدة من فصيلة السمندليات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها البحر الابيض المتوسط وتغلق مناطق المحيط الاطلسي اعصها المنطقة المتحدة المغرب الى البرتغال || مسرحها ليلي ولا تشاهد قرب المهاد الا نادرا. قوتها الاسماك الصغيرة والسرطان والقشريات والرخويات || اجسامها اهليجية الشكل ، تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية. اعظامها ذلقة ، متفرجة الاضداد. اسنانها صغيرة ، متفرقة الاشكال ، متألثة في الفكوك العليا والسفلى. الزوايا الى الزرقة البحرية الرياء الخليج تنقب مع اقترابها من الفير وتبيض وتغير عند البطن ، ويطلو في جوانبها تجلجج اسود منكر الخطوط المتوازية || حولها بين متوسطة السنف وكاعنة. مسوكة فاخرة. مرغوب فيها || اشهر انواعها السمندوة المشقة والسمنودة المساء.

١٤٢١٥ - سَمْنُونُكَة مُشَقَّةٌ * - عَمْرُونَة

Echinorhinus spinosus (S). *Echinorhine*, *Requin bouclé*, *Bouclé* (F). *Prickly-shark* (E).

نوع من السمندوة. سمكة بحرية سرابدة. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك البجاج. اخلاطها حنية ، تغشى الانسان وتبتعد عنه || جسمها اهليجي الشكل يطول من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. مسكها عشن ميمر الشكل المشقة يتناسخ بحجة ذرية الاطراف. ثوبها الى الزرقة البحرية الرياء الخليج يمين وتشتد زرقته مع الاقتراب من ليل الطور وينير ويبيض عند البطن. ويطلو في جانبها تجلجج اسود منكر الخطوط. رأسها معتدل الحجم ، ذلق الخط. لها سفلى الايتكاز. شفها معتدل الرحابة. اسنانها متراصة ،

١٤٢١٧ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ * ، سَمَنْدُور ، سَمَنْدَر

Molge (S). *Triton* (F). *Triton*, *Newt* (E).

جنس هويات زملاقة قازية من السمندليات. انواعه نحو ٢٠. جميعها صيرة لثقة مسطيلة الشكل مبطلة. حمار ظهورها ثنجي الايتكاز من الحافة. حمار اذنانها عديم التنسج. الزوايا مزرقة وسجدة وبديعية || قوتها البيدان والخلوم واللافط. تألف المناطق تيش فيها حتى فصل الشتاء. بيتها الشري يدوم نحو ٤ اشهر تنحس فيها تحت الحجارة وفي الاراب.

١٤٢١٨ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ الْمَبْدُول

Triton vulgaire (F). اطلب نيوت مبدول.

١٤٢١٩ - سَمَنْدَلُ مَبْدُولٌ * ، سَمْرُونَة

Salamandra salamandra (S). *Salamander* (E). *Salamandra terrestra* (F).

حيوان قازيز سرابدة من فصيلة السمندليات. جسمه متوسط لثقة دماي القدام يطول نحو ٢١ سم. عند الذكر ونحو ٢٤ سم. عند الانثى. رأسه مبط ، مستدير الخط. واسع الشف ، كامل التنسج في الفكين. عيناه صغيرتان جاسطتان. عنقه بالغة القصر. قوائمه قصيرة وفليظة. التامعات الاربعة رابعا الاصابع اما الخلفيتان فخاصيتها. جلده مشعل التفتور. ثوبه الى السواد اللامع يطول تفتيح اصفر عند من الرأس الى طرف الذنب || يعيش نحو ٢٤ سنة. يألف شبات مجاري الماء. يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة. قوته الحشرات والبيدان والرخويات || الاثني تنفع على حافة الماء من ١٥ الى ٢٠ سديلا طول الواحد منها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. تغلق كلمة الاضداد ، كبيرة الخياشيم الخاطية. وبعد مرور ساعة من الوضع تلتغ الاثني بمصارها في الماء فتبقى نحو سبعة اشهر الى ان تنفلس خياشيمها || يعتبر من القوازيب النافعة.

١٤٢١٠ - سَمَنْدَلُ كَيْفَات

Salamandridae (S). *Salamandridae* (F). *Salamandridae* (E). فصيلة من السمرنويات اجناسها وانواعها عديدة تنحسها اربع عمارات افهرها السندل والسمنودور.

١٤٢١١ - سَمَنْدُور مَبْدُول

Triton vulgaire (F). هو التريت المبدول ، اطلبه.

١٤٢١٢ - سَمْنُونَة *

Semanotus (S). *Sémanote* (F). *Semanotus* (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنيبات ورتبة غمدات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الباردة. جميعها صيرة لثقة ميمرة الملب التيق المسطيل. اجسامها تطول من ٨ الى ١٨ سم. رؤوسها وكولها سود او حمر. اعظامها معتدلة الاولان منها الاصفر والاشباح والخلني والوردي والاسمر والاخضر. جميعها تنحس بالاسود وتفرغها عند اتصافها جدة عابطة اللون يثلج فيها الاسود || تسرح في النهار. تطهر في اواسط نيسان وتبقى حتى ايلول. مرتمة الازهار الحربية والبرية || يرقاتها غاشية تمشي على جلوح وانصان الحرير والابيل والازاب الخ...



سمندل الماء



سمندل مبدول



سمندل الحرير



سمندلة مشقة

١٤٢١٩ - سَمُورُ مَعْصَبِ الرَّاسِ *

Scymnus frontalis (S). *Scymna à tête br.* (F).
Scymnus frontalis (E).

حشرة غائلة آفة نافعة من فصيلة المصقيقات ورتبة غليقيات الاجنحة. تألف جميع الاماكن التي يكثر فيها الاراك لانها مع رقاتها تعيش عليه || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السواد القمي يميل في كل غده بقعته حمراء. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زباناها صقيان دقيقتان. فكهاا نثقيتان. ظهورها مستدير الطرف الاخسف. غمداما شديدا الصلابة. كوكبتها ثلاثة. ارساها مستطيلة. ورتبة المقل || اجسامها الحولية لثالة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع. تسرح في النهار. تتغذى بعد غروبها بياسمين. تمتع المكن لطفاً شغفياً البعد على نصال الاوراق || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ مم. جسمها مستطيل الشكل. سطلي اللون المزجج. ابيض الخمل القلبي التجميع || طور الاكمال قلبي تستمر نحو ثمانية ايام يتغني على النبات المائل حيث تتدل البرقة من نصل الورقة الى ان تم مراحل التطوير وينطلق القفار.



سمورة مساء



سمور سوردي



سمور معصبة الرأس



سوزل



سمور

رتبة الصقوف في الفكين. عيناها لوزيتان. زانفانها الظهريه اثنتان. زانفانها الذيلية كبيرة القند تكمل القرعية || تصاد لسحبا الفاعر ولزيتا. لحمها كامن الصنف.

١٤٢١٦ - سَيَّوْدَةُ مَسَاءَ * و لَيْحَةُ

Scymnorhinus lichia, *Scymnus lichia* (S).
Scymnorhine, *Liche* (F). *Scymnus lichia* (E).

نوع من السمودة. سمكة بحرية مقترمة. اصطناع البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك المياح. احداها رضية لا تشاكس ولا تقرب من الانسان || جسمها وضي الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم. سمكها مادم القبول والمنافس. ثوبها الى الوردية السوداء البنفسجية المولج يميلها تمضيح اسود من الخط الجانبي الى شبح الظهر وتمضيح اخضر فايض من الخط الجانبي الى قم العين. رأسها مستدل الجرم. مستغض الجبهة. ذلق الخطم. لها سفلى الازنكاز. شدقاها مستدل القرعية. اسنانها متوسطة الحجم. مثلة الزوايا. ورتبة الصقوف في الفكين. عيناها لوزيتان. زانفانها ثقتان صغيرتان. زانفانها الظهريه اثنتان. زانفانها الذيلية كبيرة جمدافية الفلقة العليا. مزوانية السفلى || تصاد لسحبا الفاعر ولزيتا الجيد. لحمها كامن الصنف.

١٤٢١٧ - سَيَّوْدَةُ يَاتِ *

Scymnorhinidae, *Scymnorhinidae*, *Scymnidae* (F).
Scymnorhinidae, *Scymnidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية سرودة من السمقليات ورتبة الاشكال اجناسها واناؤها المعروفة قليلة العدد. اصطناعها معطر بحار العالم || اجسامها اعطليية الشكل تطول من متر الى ستة اذنان. انواها الى الزرقة البصرة الطمودة المولج يميلها تجليح مفرقش اسمر في الجانبين. سوكها بعض انواها شقيقة ابدان شاككة. رؤوسها غروطية. اصطناعها ذلقة. اشدافها مستدلة الانفراج. اسنانها لاقامية الانضمام بين الفكين || اناها معتدلة انتشار تفصح في كل مرة. في فصل الصيف. من ٣٠ الى ٤٥ جمراً || اشهر اجناسها السمودة والمريفة.

١٤٢١٨ - سَمُورُ سَوْرِي *

Scymnus syriacus (S). *Scymne syrian* (F).
Scymnus syriacus (E).

حشرة غائلة نافعة من فصيلة المصقيقات ورتبة غديات الاجنحة. تألف الحقائق والمبالل وبياتين الحشويات. خنافسها ويرقاتها تعيش على القرمزيات والمظفرات || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السودة الكستانية تملحها شحيمات مستطيلة تمتد الى الخمل الاصهب القلبي التجميع في الكسول والقلمين. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زباناها صقيان صغيران. ظهورها مستدير المؤخر الاخسف. غمداما شديدا الصلابة. ارساها ورتبة المقل || اجسامها الحولية لثالة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اواسط نيسان. تسرح في النهار. تتغذى بعد غروبها من مكثها بياسمين. تمتع المكن لطفاً شغفياً نصال اوراق النبات المائل حيث تعيش القرمزيات والمظفرات. البرقة عند بلوغها الادراك اتمام طول نحو ٤ مم. جسمها اعطليي الشكل. ثوبها الى السودة الكستانية المايقة يميلها نحو اخضر || طور الاكمال الذي يستمر نحو سبعة ايام يتغني على النبات المائل حيث تتدل البرقة وتتدل من نصل الورقة.

١٤٢٢٠ - صَيَّهَاد *

Diplodadium
جلس تطور مجهرية من القشقيات فضيلة اللوسيات. جره الكتيبة متصبة يميلها فروع شقيقة لتتبي بكتاله فردية او شقيقة التجميع. كنانها مستطيلة شاككة ثنائية الخلية || انواعها عديدة مظهرها لا يذ. وبهها يتغفل حل المواد الفسفرة والنياتية المتحلة.

١٤٢٢١ - صَيَّهَاد *

سمور الزروع: لم يظف بليات. السمورة في الزروع هي عدم الاشطاء. والانواع او الفرويق السمورة في القليلة الاشطاء.

١٤٢٢٢ - سَمُورُ الْاَل *

Diastata adusta (S).
Drosophila des fleurs (F).
حشرة صغيرة من الحشيات (ذباب الحبل) يكثر وجودها في اللتاقع وعلى الازهار والثمار الناضجة.

١٤٢٢٣ - سَمُور *

Mustela (S).
Mustela, *Mustela* (F). *Mustela* (E).
جنس حيوانات لاحة مقترمة من السموريات. انواها عديدة موطنها العالم. تألف الاسراج والقطايات. لتلق الاشجار وتسرح في الليل والنهار || اجسامها مستطيلة. رؤوسها اسفلية الشكل. اصطناعها ذلقة مقلمية. اذنانها عريضة كاسية. اذنانها مستطيلة جيلة. جرازها قصيرة. غالبا ذرية حادة || اناها تفصح من ٣ الى ٤ جمراء. تيمر بعد وضعها بياسمين وتتسلق الاشجار بصر ٧ اسايح.

١٤٢٢٤ - سَمُورُ صَوْرِي *

هو الزربان. لظله.

١٤٢٢٥ - سَمُورُ شَائِع، عَمَز، سَمُور *

Mustela martes (S). *Mustela commune*, *Mustela commune* (F). *Common Marten* (E).

نوع من السمور. طولها نحو ٤٨ سم. ارتفاعها ٢٥ وذنبها ٣٠ سم. فويالها الجوزة الخلية. صفه وذودها وصدرها يبيض. موطنها لحوال الشرق الاقصد واروپا. يسرح في الليل والنهار وهو من الحيوانات الجريئة البطافة التهمة التي لا تفت من اي حيوان كان تستطيع اليه سبيلا.

كالاجاص والخوخ والجوز والكتنا. ويركب جلوع
بعض الاجار الحرجية كالستيان والقيقب والسبط
والصفصاف والخور والدلب || مشبه يدخل من
الجروح للقدية اليابسة فيسري الالفة ثم القلفة
الخشبية الاولى التي يمتلئها بمادة لزجة كالصم تغطي
شيئا فشيئا بعد ان تشقق الخشب بالطلل والمرض على
شكل مربعات تحيطها من جوانبها البتة اغشية المشيج
البيضاء اللون || اما اللط بعد ذاته فهو كالقصع المتراكبة
المنبسطة الحوائط المتصعبة المشربة . يظهر من ايار الى
تشرين وهو سريع النمو قطر نكته يبلغ نحو ١٠ سم .
فيصه عدة الاوان ينطب فيها الاصفر الكبريتي ويوجد
فيها الحطلي الباقي والزاهي والبرتقالي والوردي والاصهب
والاشرق والبنّي والايض الاخير || وهو من القلوع
المأكولة لكته يشكو من ملوثة المز العظم . كانوا ولا يزالوا
يستخرجون منه مادة صلبة صفراء اللون .

١٤٢٧٧ - سمية حوشية

Polyporus squamosus, Melanopus squamosus (S). Polypore squameus (F). White rot (E). Schuppiger porling (D).

ظفر من السميات كثير الانتشار يركب جلوع وارويات
وجلوع بعض الثباتات الحرجية اخصها الخور والصفصاف
والشث والستيان والزان وقد يصيب البتيت والدلب والجوز .
تجته كلوية الشكل طليبا نحو ١٠ سم . لونها بني او
سحلي . يطول سنة من الحراشف اللينة الباقية الملوحة .
لباه ابيض اللون طري في اول صيف ثم جلدي عند
الادراك . رائحة كرائحة السبل وهو من القلوع المأكولة
المتعبة الطعم || اضراره قليلة لانه قلما يغط الخشب
والقلب || يكالغ بالظهور بعد انتزاع القلوع وتنظيف
الجرح من الشكير اليابس والخشب الموروم .

١٤٢٧٤ - سميج *Epigène (F). Epigène (E).*
لثت تعريفى يطلق على كل ما اتصف بالهامة .

١٤٢٧٥ - سميدور *Triton*
هو سميدل الماء . اطله .

١٤٢٧٦ - سميدور عيبدول *Triton vulgaire (F).*
هو التوت المبلول . اطله .

١٤٢٧٧ - سميروم هو الكرفس البري . اطله .

١٤٢٧٨ - سميم *Calluna vulgaris (S).*
Calluna vulgaris, Bruyère commune, Brando (F). Heather, Common ling (E). Gamales heidekraut (D). Brendolo, Scopa carnica, Erica scopia (I).
جثة برية معدرة من فضيلة الخشنيات . ساقها رفعا
تطول من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها غسبة . رباعية .
مقابلة . ازهارها رباعية التركيب ليلكية اللون || تكثر
في المناطق الجبلية الرملية . تستعمل استعمال الشج لقتل
وحي صنعة المكائس .

١٤٢٧٩ - سميطر

السميطر والسميطر والسميطر اعماء غشقة لثام واحد
يلقى البشون الجبار طويل جدا يرى ابدأ في الماء
الفضفاض . اطله .

١٤٢٧٦ - سموريات، صرغوريات، هوسيات
Musculidae (S). Musculidae (F). Musculidae (E).
فضيلة حيوانات لاجحة مفترسة تشمل السمور والسرورب
واين عرس والقضاعة والقشقم والقربان والقشزون
والرائل الخ :

١٤٢٧٧ - سمولس * لبين الماء

Samolus valerandi (S). Samole, Mouron d'eau (F). Brook-waed, Water pimpernel (E). Samoskraut, Salsbungen, Wasserpimpernel (D). Samolo, Pimpernelia aquatica (I).

نبات عشبي بري متقني من فضيلة الربيعيات . ساقه
متصبية . اوراقه معتقة بيضية متعاقبة . ازهاره صفودي
التجميع . ازهاره صفيرة اللد يضاء اللون خامية البتلات .
يقال ان عصاره ساقه تلزم الجرح بصره .

١٤٢٧٨ - سموم *Vent chad (F). Hot wind (E).*
الريح الحارة . قال ابو عبيدة السموم بالهار والخور
باليل .

١٤٢٧٩ - سميات *Polyporaceae (S). Polyporacées, Polyporiacées (F). Polyporaceae, Polyporiaceae (E).*

فضيلة ظفور من رتبة العمايات نكاتها كثيرة الخشب جلدية
التركيب او قليلة تحمل على صفحتها السفل بعض
السمام والتجاويف . يورقاتها شفعية التجميع رباعية
شذافة او ملوثة || اجناسها وانواعها عديدة منها سوية
وبها معدرة تغطي وتعيش على الاجزاء البالية من غشفت
الاجار الحرجية والسمامية والزيتية والشمرة || مشبهها
يسري الماء والفكر والقلب فيسبب انحلال حواجز
الايضية والخلايا ثم ينفض بيضه الكثيف على الاجزاء
الخشبية فيطبخ ويوصمها بصفته القلي او الكسبي او
التنخري او الهلالي || وبها اجناس تغطي على الانحاشاب
المقطوعة والمنصوبة لتفنيها وتطبخها || اشتهر اجناسها
من الربيعية الاقتصادية الزراعية : الحافرية ، الزار ،
الساجوج ، السنجية ، السمية ، الطبق ، الليليس ،
التوس ، الفزيت .

١٤٢٨٠ - سمية *Polyporus (S). Polypore (F).*
جاس ظفور من السميات . انواعه عديدة منها المأكولة
وبها الكفزة والسامة . ربعضها يتغلغل على الثبات فينجح
به بعض الاضرار .

١٤٢٨١ - سمية البين * *Polyporus coffeae (S). Phitriose du caféier (F).*

ظفر يبي من السميات يركب البين على اعضاء الترية .
يبيض من الستين الى الثلاث سنوات وقد يغطي الجلود
والجالح || وبها كمية الطل تشا عنه اربعة الساق اذا
يكالته المستطيلة ، القفصية الشكل ، الزرية التركيب ،
تتمد الى الجلود وتغطيها بشبكة من المشج تمسح على ما
تفرزه الجلود من مواد سكرية يسببها ونخر الكوشيل .
يكالغ بالقضاء على الكوشيل التي تمسح سطح حياتها
خارج التربة على اعضاء ثبات الحوائية .

١٤٢٨٢ - سمية السندريكان

Polyporus sulfureus (S). Polypore sulfureux, Pourriture rouge du chêne (F). Brown checked wood rot (E). Schwefelgelber porling (D).


ظفر يبي من السميات يتغلغل على سرق الاجار المشربة



سمولس



مئة البين



مئة الستيان



سم

١٤٢٥٠ - سَنَاحَة بَرِّيَّة ، قَالْبِل ، قَالْبِل

Cassia tora (S). *Cassia fedida*, *C. survaeg* (F).
نوع من السنا البري الحلبي. كزينة الزينة، كثير انتشاره
الحلبة. سوك يوازي سينا والعريش ويزرع في الجزيرة والصحراء.
شجيرة تملأ من الماء إلى الغلة أثمار.



سنيق

١٤٢٥١ - سَنَاحَة حَلْبِيَّة

Cassia corymbosa (S).
Cassia corymbiforme (F).
نوع من السنا البري. شجيرة جادة تملأ من ٢٠٠
ال ٢٠٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خلية الأوراج.
وربها سنانية النصل. عناقيدها الزهرية خفيفة الشكل،
محورية وتأتي الارتكاز. أثمارها متصلة اللد، حيلة
الصغار. ثمارها قرن لينة خشبية. صبارها سلوة
العلم زينة. أثمارها يذوق أربعة أسابيع بتبقى في البوترة
الأول من تموز.

١٤٢٥٢ - سَنَاحَة مَرِيَّانْدَة

Cassia marylandica (S).
Cassia du Maryland (F).
ويسمى السنا الأمريكي. نوع من السنا البري البحري
يملأ من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه ثنائية أو تساعية
الأوراج. وربها حلية النصل، كالشكة الكرون.
عناقيدها الزهرية كثيفة التجميع. أثمارها في الصغار
الزهرين. أثمارها يسمر من آب إلى تشرين.



سنا مزهار

١٤٢٥٣ - سَنَاحَة مَزْهَر *

Cassia floribunda (S).
Cassia floribunda (F).
نوع من السنا البري. وهو جنة جادة تملأ نحو
٢٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خلية الأوراج. وربها
سنانية النصل الفصيص اللرب. عناقيدها الزهرية حثولية
الشكل. ثمانية الارتكاز. أثمارها كثيفة التجميع.
أثمارها يسمر من حزيران إلى تموز.

١٤٢٥٤ - سَنَاحَة صَكِّي * ، سَنَاحَة حَبْكَايِي *

Cassia scutifolia (S).
Cassia à feuilles aiguës, Séné moka, Cassia séné (F).
نوع من السنا البري الحلبي يكثر وجوده في تمام البحر
الأحمر. ثمره سنينة اللد تملأ نحو ٢ أثمار. أوراقها
خسائية أو سباعية الأوراج. وربها خفيفة النصل
الأخضر الأطول المائل. تقع أوراقه وتعود سهول
السننة.



سنا صكي

١٤٢٥٥ - سَنَاحَة

Sua (F). *Soot* (E).
هي المادة السوداء التي تتجمع وتظلم على جدران المداخن
وقد تتصلب كماء الزرق لأنها لا تخلو من.

١٤٢٥٦ - سَنَاحَة مَبْدُولَة *

Diasa dias (S). *Diasa commun* (F). *Common diasa* (E).
حورية من المناكيب الساعية لقائمة ثنائية الرواية،
سلبية المقتات، من فصيلة القوطيات. جسمها صغير
اللد يملأ نحو ٨ سم. عند الذكر وهو ١٢ سم. عند الأنثى.
صغارها قنسي الشكل، صغير الجرم، اسمر اللون.
عيناها زرقاوتان. شفها صغارها. تكاثرها في جدرانها
متباعدة الطول، كثيفة الحب. يبطأ يغيي الشكل،
حتي اللون تتوسطه بقعة بيضاء. تألف الأوراج
للحشرة وتقترب من الساكن الحشرة. قنسي الحشرات
الصغيرة. تسرح في الجدار. يباتها القوي يسمر نحو
خنة أشهر. مكثها صلبة لويطة الشكل تحركها تحت
الحجارة. تعيش الآنثى إلى حين. تخرج المكان وتضعه



سَنَاحَة مَبْدُولَة

١٤٢٥٠ - سَنَاقِي

خيشة في البئر تحيط بفتح الثور كالطوق وما يسميان.

١٤٢٥١ - سَنَاقِي الدَكْب

Crassicauda (F). *Crassicaudate* (E).

نمت ترميفي يطلق على كل حيوان متماثل اللب.

١٤٢٥٢ - سَنَاقِي السَّاقِي

Crassicaule (F). *Thick-stemmed* (E).

نمت ترميفي يطلق على كل نبات ساقه سميكة.

١٤٢٥٣ - سَنَاقِي الزَّوَكَة

Crassifolia (F). *Crassifolia* (E).

نمت ترميفي يطلق على كل نبات يحمل أوراقا متماثلة.

١٤٢٥٤ - سَنَبَلَقِي *

Cephalocax (S). *Céphalocax* (F).

جنس الشجار حرجية سبوتية بطيئة النمو من الملقحيات.
أنواعه المروفة قليلة العدد. جميعها شرقية التمت مبعها
الباهان والصين والهند وإيران. الشجار تملأ من ١٥
ال ٢٠ م. أغصانها متعاقبة. أوراقها أبيض. نصلها ضيق
الصفحة يملأ من ٥ إلى ١٠ سم. ويخرج من ٤
٦ سم. صفحته السطلي مقبوسة إلى خمسة خطوط ثلاثة
منها خضف واثنان اشيران. أثمارها وسيدة للسكن. طليقة
التجميع. أغصانها صلبة حيلة الصف، شائعة
الاستعمال السناني والمزني.

١٤٢٥٥ - سَنَبَلَقِي

Tarin commun (F).
هو لكثير المبدل، أغلبه.

١٤٢٥٦ - سِين *

هي في الحيوان مقدار البصر من الولادة. وفي الشجرة
من يده نموها. وتعرف من الأوراق بلحمس استنها.
أما من الشجرة فلهم من مراكز النمو السقية في قطاع
ساقها.

١٤٢٥٧ - سِين *

Dent (F). *Tooth* (E).
من ج استنان. تعتبر الأسنان من أعضاء الجهاز الهضمي
لأنها تقدم بوظيفة سحق الطعام وإعدادها في مركزها في
استنخ تلك الطوري والسلي. تتكون من ثلاثة أجزاء
التي تتلف وتلتصق بالجوهر. ومن طينتين: التلافية للاسفة
والجسمية الباطنية للحسوة. وتنقسم الأسنان إلى عدة
أنواع مرجحها العمل المنوط بكل منها. في الخيل مثلا،
تقسم إلى: ثلثة ورهاية وقارح ولاب وفريس.

١٤٢٥٨ - سِين "الْحَبْوَز" هي حرن لقم، أغلبه.

١٤٢٥٩ - سَنَاقِي

Cassa (S). *Cassa, Séné* (F). *Senny* (F).

Cassa, Senna (E). *Kassia, Sene* (D). *Cassia, Senna* (I).

جنس نباتات مدمرة من فصيلة القزليات. أنواعه زهاء
٤٠٠ منظرها بري ويضعها زراعي ترميفي. فيها
الاجبار والاشجيرات والجنابات. أوراقها مركبة، وبيضة،
ثلمية. أثمارها متفرجة التجميع. أثمارها سنينة أو
متصلة اللد، قصيرة الأنبوب، متراكبة الفصص والتلات.
ثمارها قرن عذريتي أسطوانية مسطلي. منغصها الحلبة
سوية. أشهر أنواعه الحلبة والزيقية ما لي.

ويمش الذكور الى حين يكوم الاثني التي تنقضي عليه ||
تعتبر من الدواب المقيمة .

Emeri (F). - سَنَبَدَج ، سَنَبَدَج (F).

Emery (E).
سموق شديد الصلابة ينجم عن تحطيم القرند يستعمل في
صقل وحش وتلك المادان والاخشاب .

Place (F). Ton (E). - سَنَبَك

من اجزاء الحافر عند الخيل .

1٤٢٦٨ - سَنَبَل

هو الثناوين ، اطلبه ، مة الازرق والحداقي والاطليبي .

1٤٢٦٩ - سَنَبَل هِنْدِي هو اذخر مكى ، اطلبه .

1٤٢٧٠ - سَنَبَكَة ، سَنَبَكَة ، سَنَبُولَة

Epi (F). Ear of corn (E).

هي ثورة بعض الثنائات انحصها النجيلية . والسنبلة
جميعية من السليلات المتتامة المركبة على محور واحد .
اما السنبلة فهي وحدة التزير وقد تكون ورة أو شعبة
التجميع . ثمارها صوب جافة .

1٤٢٧١ - سَنَبَكَة

Epiage (F). Earing of grain (E).

راجع اسبال .

1٤٢٧٢ - سَنَبَكَة

شعبة من النجيل تعرف بالنجيل الازرق . اطلبه .

1٤٢٧٣ - سَنَبَكَة

Epi (F). Spica (E).

نجم لير من برج المدراء يعرف بالسالك الازل ، اطلبه .

1٤٢٧٤ - سَنَبُولَة

Cymbula (S). Cymbula (F). Cymbula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منجمت الايل
وفصيلة السيلوليات . انواعها المرفوعة ثلاثة اعطائها البحر
الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي انحصها
الجنوبية || اصداها غسرية الماء ، اهلجية الشوزن ،
شائكة الاطراف ، شائعة . اجسامها شفافة ، صغيرة
الرؤوس ، ثنائية القواطع والعيون ، وبيدة الاعظام .
زمانها مسطحة رقيقة ، بيضية الشوزن || تسبح وتقوم
على ظهرها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء .

1٤٢٧٥ - سَنَبُولِيَّات

Cymbulidae (S). Cymbulidae (F). Cymbulidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات منجمت الايل .
اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها صغيرة ، اهلجية
الشكل ، معتدلة التنطيط ، غسرية الماء ، متجانسة
المصاريع ، مسطحة الزعانف اي الاربدة المسطحة
البيضية الشوزن || اعرف اجناسها واشهرها السنبولة .

1٤٢٧٦ - سَنَكَة حِسْكِيَّة ، سَنَكَة هَالِيَّة

Exercice (F). Financial year (E).

هي في الاصطلاحات الحاسبية حساب السنة من المدة
التي تنقضي بين حسابين متتامين || وهي في الاصطلاحات
المالية حساب المدة التي تنقضي بين ميزتينيتين .

1٤٢٧٧ - سَنَكَة هَوِيَّة

Année-lumière (F). Light-year (E).

السنة الفوقية هي المسافة التي يجتازها الضوء بمدة ٣٦٥
يوما بمعدل ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر بالثانية . وقد تبلغ نحو
عشرة آلاف مليار كيلومتر .

1٤٢٧٧ - سِنَابِيَّات

Hypocraesae (S). Hypocraesae (F). Hypocraesae (E).

عمارة فلور بجمرية من فصيلة المشويات ورتبة الزرقوت .
تتميز باصنافها البدينة الزاوية الالوان || اجناسها
عديدة تختلف باختلاف وثل البروغ وشكل الثوبية وما
تصله من اصناف || افرها من الوجهة الزراعية
الاقتصادية الاجناس التالية : الرءاء ، الماكوب ،
المروحة ، الهوم ، القصبية ، القنار ، الحجة ،
الهكة ، الثوبلة والوشية .

1٤٢٧٨ - سِنَاك * ، كَابِير ، كَابِيرُوس ، صَاد

Tapirus (S). Tapir (F). Tapir (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة السناديات . اولاه خمسة
منها واحد اسوي واربعة امريكية . جميعها كبيرة
الجلقة القصصة ، طليقة الفراس والخطم الذي يشبه الخرطوم
القصير . ثوبها ابيض اللون ، اذنها صغيرة مستقيمة ، ذيلها
بالط القصير || اختلافها حية تعيش في المناطق والاحراج
الكثيفة قوتها الاعشاب ويولدور النبات .

1٤٢٧٩ - سِنَاكِيَّات

Tapiridae (S). Tapiridae (F). Tapiridae (E).

فصيلة حيوانات برية وحيدة الجنس تتميز بفخامة الجفة
وطول الخطم وصغر الاذن وقصر الذيل . قوائمها ثلاثية
الاصابع الخلفية .

1٤٢٨٠ - سَنَّاكَة

Gompholobium (S). Gompholobium (F). Gompholobium (E).

جنس نباتات برية جنسية ومشيعة معمرة من البذراريات
وفصيلة القرنيات الفرفرية . انواعها المرفوعة نحو ١٢
منها بعض مناطق استرالية || اوراقها صغيرة النصال
متقابلة . ازهارها عنقودية التجميع . ازهارها محورية
الارتكاز او تاجية ، عطرية العرف ، منها الابيض
والاصفر والوردي والايواني || اوراقها وازهارها جمالية
لذيذ الماشية وقد تسب لها التسم ولوت .

1٤٢٨١ - سَنَّاك

Bosse (F). Boss, Hump (E).

حدية في ظهر البير وهي كتلة حدية تعلو السلسلة
القفيرية يستند منها الجمل ما يننيه عن الطعام اذا خلا
جوفه من الغذاء .

1٤٢٨٢ - سَنَّاك

Basifuge (F). Basifugal (E).

لست تعريفية يطلق على كل نبات هامى التوجة فقط .

1٤٢٨٣ - سَنَّاكَة

Production alternative (F). Alternative produce (E).

صفة الاتجار المتناوبة الحبل كالزيتون .

1٤٢٨٤ - سَنَّاك الرَقِي

Lance d'arrosage (S). Sprinkling spear (E).

جهاز يوضع في طرف القنصل أو التبريج لضبط الماء
وتوجيه رشه .

1٤٢٨٥ - سَنَّاكِي

Lancéolé, Lanciforme (F). Lanceolate (E).

ما كان شكله كالسنان .



سناد

١٤٢٨٨ - سنجاب النخل *

Sciurus palmarum (S). *Escureuil palmiste* (F). *Palm squirrel* (E).

نوع من السنجاب صغير القذ طولهُ نحو ١٥ سم. وذنبه ١٢، ثوبه ألّ الصبغة البهلاء ملوّه ثلاثة خطوط يمش تقطبه من النقرة إلى الذنب || موطنه الهند. يأكل الأجار المشرّة أخصها النخل ويقترّب من الأماكن الآلة.



سنجل

Sciurus indicus (S). *سنجاب الهند* * *Eureuli de l'Inde* (F). *Indian squirrel* (E).

نوع من السنجاب الكبير القذ طولهُ نحو ٤٥ سم. وذنبه ٤٠، ثوبه متعدد الألوان رأسه واذنائه وصنقه وأبوابه إلى الجلاوة القزينة للوج. ظهره وذنبه وبرازمه سود. يترك إلى الصفرة البنية || يأكل الإرجاج الكثيفة يسرح في البئر. قوته البئر والمعاد البنية.



سنجاب النخل

١٤٢٩١ - سنجاب شائع *

Sciurus communis (S). *Escureuil commun* (F). *Common squirrel* (E).

نوع من السنجاب موطنه فصح أوسع الأبعاد يمتد من أقاصي الشرق إلى أطراف أوروبا. جسمه مستطيل لشكل يبلغ نحو ٢٥ سم. وذنبه ٢٢ سم. ثوبه ألّ الصبغة الصبانية، صدره ويقل إلى البياض. فرائضه مستعنة شائعة الاستعمال.

Sciuridae (S). *سنجابيات* * *Sciuridae* (F). *Sciuridae* (E).

فصيلة حيوانات لبنة قاضية تشغل عدة أجناس والنبه من الأنواع. أعرف أجناسها السنجاب، الجلمج، والناميه والمخلوط والمربوط والمختلج والمختلج والبربريس. جميعها مستطيلة الأجسام والأذنان، ملوّه الجرايط العليا موطنها العالم. تألف الثياب والأشراج. تتسلق الأشجار، قوتها البئر ومختلف المواد النباتية.



سنجاب شائع

١٤٢٩٣ - سنجابيات الشؤوب *

Sciurumorphes (F). مرقية حيوانات لبنة من رتبة القوائم تشغل ثلاث فصائل السنجابيات والحاروديات والحيريات.

Centrospora (S). *سنجة* * جنس فطور مجهرية من الرقائيات وطبيعة الطعيات.

يتميز بكتانهة المستطيلة الملبه المنحنية الشكل والرقائيات. الأول || ينقل على الأوراق فيقرها ويقل البئر فيملها قبل ادراكها || أنموه للمرقية اثنتان :

Centrospora acerina (S). *سنجة الأسفندان* * *Centrospora bromi* (S). *سنجة البرون* *

Bigarrure (F). *Metley* (E). *سنجة* * أجناس الأشكال والألوان دين رابط أو قواس.



سنجة

Anergia (F). *Anergy* (E). *سنجيلة* * السجلة أخطاء عوارض الالتهابات.

Pachycephalus (S). *سنجوس* * *Pachycephalus* (F).

طائر من الجواثم سنات المنقتر يتسلي إلى فصيلة المهرجات. موطنه يمتد من العراق إلى ماليزية - محبب موهبا ومضاهبا في طلب القوت. قوته الحشرات والبروز والباراة.



سنجوس

Centrosoma *سنروزوم* هو الجسم المركزي الجبري في الحيوان والخلوي في النبات.

سنروزوم هي العملية، أمليا.

Santonine (F). *Santonin, Santoninum* (E).

جهر فعال يستخرج من مختلف أنواع الشج أخصها الشيحان. وهو من المواد الطبية الشائعة الاستعمال.

Castgrade *سقيفاد* مقسوم إلى مئة درجة.

Castigramme (F). *Castigram* (E).

الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها القرام.

Scintilla (S). *Scintille* (F). *Scintilla* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات إجلاليم وصفيحة اللولويات. أنموه المرفوعة نحو ٥٠ منتشرة من خط العرب إلى خطوط الهند ويبرز أثيرانيا || أصدانها بيضبة الشوزن، ولحمه اللين، ثالثة المصارع، مالة السطوح جميلة الألوان الزائفة.

Centilire *سلفيلتر* الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها الأير.

Centimetre (F). *Centimetre* (E). *سانتيمتر* * وحدة قياسية مرقية تساوي جزء من أصل مئة جزء الذي يتألف منه المتر. والسانتيمتر يقسم إلى عشرة ملليمترات.

سنج - *سنج* - *سنج* السنج والسنج هو الثياب، أمليا.

Sciurus (S). *سنجاب* * *Eureuli* (F). *Squirrel* (E). *Eichhörnchen* (D).

جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة السنجابيات. أنموه نحو ٧٥ سم. جميعها صغيرات القذ، مرقعات الجواثي ولها الذئاب طوالب جيليات الصف. تألف الأشراج والقابات. تتسلق الأشجار بسرعة وخفة. قوتها المواد النباتية. تفضل البئر والرقيمات والرقوي. يقال أنها تستلذ يمش الصائير || ترتب أجناسها في صفوح الأشجار، مداخلها من الشرق وغارها من الغرب. أناتها تقسم من ٣ إلى ٦ أصداس تبصر يد وضها بانبسوح || أعرف أنموه وأشهرها مايلي.

Sciurus vistrinosus (S). *سنجاب القاب* * *Eureuli des jungles* (F).

نوع من السنجاب صغير القذ طولهُ نحو ١٢ سم. وذنبه كذلك. ثوبه ألّ الصبغة الصبانية ملوّه ثلاثة خطوط صفر تقطبه من نقرة الرأس إلى طرف الذنب || موطنه سرينديب. قوته البئر. يقترّب من الأماكن الآلة ويدخل المساكن في طلب السكاكر والخلويات والبيض.

من أي نوع كانت ان سنية او غيرها ، الى مستأجرها ومن الواجب ان يشتمل على كل شروط عقد التخل .

١٤٣٠٨ - سَنَدٌ ثَلَاثِيٌّ (E). Triptyque (F).
هو من السندات الخاصة التي يصرح بها اشتراء بعض الاشياء وقتياً . انحصار السيرات على ان يعاد تصدير امثالها .

١٤٣٠٩ - سَنَدٌ قَائِلُ الْإِسْتِزَاكِ Obligation amortissable (F). Redemnable obligation (E).
هو السند الذي يمكن تسديد قيمته من طريق الاستهلاك .

١٤٣١٠ - سَنَدٌ قُسْطُ التَّأْمِينِ Billet de prime (F). Bonus bill (E).
هو سند أذني يلزم به المؤمن ان يدفع الى المؤمن قسط التأمين في يوم يتفقان عليه .

١٤٣١١ - سَنَدٌ حَامِلُهُ Billet au porteur (F). Bill to bearer (E).
سند يلزم موقه دفع مبلغ معين من المال في موقه معلوم الى أي شخص كان يحمل هذا السند .

١٤٣١٢ - سَنَدٌ لَدَى الْإِطْلَاعِ Billet à vue, B. à volonté (F). Bill payable at sight (E).
سند يلزم موقه ان يدفع الى شخص سمي او لأذله مبلغاً من المال بمجرد تقديم السند اليه .

١٤٣١٣ - سَنَدٌ مُرَوَّرٌ Passavant (F). Passe, Permit (E).
سند بيان بضائع خاصة لرسوم جمركية او غيرها غير مباشرة نفق منها في مرورها الى وقت معين ومن مسافة محددة .

١٤٣١٤ - سَنَدٌ مُتَقَدِّرُ الدَّوْلِ Effect négociable (F). Negotiable bill (E).
من السندات التجارية المتقوية بالتحويل والتعامل بها . تحوّر في صيغ خاصة وتكون قيمتها وأجها الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد اجل قصير .

١٤٣١٥ - سَنَدٌ مُتَصَرِّفٌ Effect bancaire (F). Bankable bill (E).
هو السند الذي يحمل جميع الشروط المطلوبة لحسمه من البنك .

١٤٣١٦ - سِنْدَارِيَّةٌ * ، دُوَيْرِيَّةٌ * Deuterophoma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتشبه ببيكتيداه الحبيبة التركيب ، الموصوفة التي ، الخالية من التوتية الظاهرة . يوفات قائمة عند أطراف المشع الذي يلفف جويل البكتيدية الداخل في لونه الوسيد المعروف والمندوس حتى الآن هو التالي .

١٤٣١٧ - سِنْدَارِيَّةُ الْحَمِيَّاتِ * ، وَهْمٌ سِكْتُو Deuterophoma tracheiphila (S). Mal secco (F).
فطر مجهري يصيب البسول الحامض والاربع . مظهره الخارجي جفاف فباني يحمل بعض الانداز بعد اصفرار وذيل اوراقها يبقية جفاف الماء وانحراف لون المادة الخشبية نحو الجوزة الزائفة ثم السرة القائمة || يكالغ بتقليم وحرق الاجزاء الموصوبة وتطهير الجروح .

ملحبه الخيالي جامي . جماعته متصلة السند || جسمه صغير القند بطول نحو ١٨ سم . رأسه كبير الجرم ، متقارب مستد الخيم ، ضلع . جناحه ذلقان . ذنبه مسطيل الشكل ، مغطرم الطرف . ثوبه الى الشقعة السوداء تيقن في الرأس ولراده وتغير في البطن . زوره حاجي اللون يطوقه حمار اسود يمتد من قاعدة انتشار الى العين فالمنتق فأمل الصدر . ايلابه منشفة بالاخير . متقارب ورشاء واصابعه الى السرة القائمة || يدن منه في الاشجار الرقيقة . الاثني تحفن وسدما من ٤ الى ٥ بيشات . الاكر يئين ها الفناء .

١٤٢٩٨ - سَنَخٌ هو الغشروب ، اطبخ . ج اسنخ .

١٤٢٩٩ - سَنَخٌ Collet (F). Collier, Neck (E).
السرخ هو الأصل . وهو الجزء من الجذع تقدره التربة . ج اسنخ وسرخ .

١٤٣٠٠ - سَنَدٌ Obligation
كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط .

١٤٣٠١ - سَنَدٌ Billet (F). Bill (E).
كل ورقة مكتوبة تحتوي على التزام يدفع مبلغ معلوم من النقد .

١٤٣٠٢ - سَنَدٌ ، مُسَكَّنَدٌ Titre (F). Bond (E).
هو المحرر الذي يوضح فيه للمحل القانوني او للعقد المادي الذي يحدث آثاراً قانونية كسند الدين وسند الملكية . والسند صيغ عديدة ، أشهرها :

سند إذني
سند اسمي
سند إطلاق تصرف الدين
سند إسمائي
سند أولي
سند تطليقي
سند حامله
سند وهي
Titre à ordre (F).
Titre nominatif (F).
Titre paré (F).
Titre reconnaît (F).
Titre primordial (F).
Titre excusatoire (F).
Titre au porteur (F).
Titre putatif (F).

١٤٣٠٣ - سَنَدٌ إِذْنِي Billet à ordre (F). Bill payable to order (E).
سند يصعد من موقه بان يدفع الى شخص آخر مبلغاً معلوماً بعد اجل قصير لدى الاطلاع على السند .

١٤٣٠٤ - سَنَدٌ الْخَوْنُ ، سَنَدٌ هَبَاكِين Warrant
سند أذني يثبت بموجبه دفع بضائع موقه في الخازن السوية .

١٤٣٠٥ - سَنَدٌ الرَّهْنُ الزَّرَاعِي Warrant agricole (F). Agricultural warrant (E).
سند أذني يدفعه الزارع الى دائنه يثبت به انه رهن له دين تقبله من الحيازة سبتجات زراعية او حثاداً صناعياً ومخاصيل ومأرا او عقارات بالقيمة او بالتخصيص .

١٤٣٠٦ - سَنَدٌ الرَّهْنُ الْمَقَارِي Cédule hypothécaire (F). Mortgage schedule (E).
سند مغنور القيد كالأوراق المالية يدل على قيد الدين على المقار في السجل العقاري .

١٤٣٠٧ - سَنَدٌ الصَّن ، لَدَى كَرَةِ الشَّحْن Connaissance (F). Bill of lading (E).
إيصال بالبضائع لشحونية يقسمه صاحب الشحنة ،



سندارية الحميات

الاصابع || جسمها صغير لثقله يطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها مخروطي الشكل. عينها لوزيانية صغيرة. اذنانها خافتتا الغشاء السورالي الاسمر الغلاف. منقحاً مستطلة القصر والحنطة. ذنبها مستطال الطول، سريع الانقسام. ثوبها الى الصلبة الخشبية تلوحا رقيقة بمراء وتغطى الجير. ساقها ثوبها كثيف بالفصولة اي انها تلتصق المحيط المحيطة المحيطة فيه || الاذن اكبر قليلاً من الذكر ولها ثوباً سم. تعيش من ٤ الى ٨ يضيأت فطرها في الموائل الجنوبية المرضي || تألف الرياح وكثيراً الرمل. تعيش في انفاق تتخلها بين جذور النبات. تسرح في النهار ولها في الليل. قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والهامم || تعتبر من الزواقات النافعة.

١٤٣٧٥ - سِنْدِيَّيْ هو السندباد الاصغر، اطلبه.

١٤٣٧٦ - سِنْدِيَّيْكَانْ بَلْطُوق Quercus (S).
Chêne (F). Oak tree (E). Eiche (D). Quercus (I).

جس أجار حرجية من فصيلة السندباديات. أنواعها زهاء ٣٠٠ معظمها أجار كبيرة دائمة. اشجارها صلبة صناعية. اوراقها جامدة جلدية. ثوبها بلوطية حلقة. قشور بعضها فولية واوراقها دهاية || أشهر أنواعها ما يلي.

١٤٣٧٧ - سِنْدِيَّيْكَانْ أَيْتِيَش Quercus alba (S).
Chêne blanc (F).

شجرة جامدة مهددة ارمكة الشالية. طولها من ٢٥ الى ٣٠ م. ساقها بيضاء اللحاء. اوراقها عابطة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٧. ثوبها ثلاثي او رايحي التضخيم الجانبي، ازغب الصلبة السلي، ابرط العلوي. لونه يتغير مع العمر من الاخضر الباهت الى البنيجي || ثمرتها صغير الحراشف. بلوطها طري القشور والباب.

١٤٣٧٨ - سِنْدِيَّيْكَانْ أَحْمَر Quercus rubra, Q. borealis (S). Chêne rouge (F).

شجرة شريوة تطول من ٢٥ الى ٥٠ م. ثوبها وزهايا جلوية اللون. اوراقها تطول نحو ٢٢ سم. وتعرض ١٥. ثوبها مستعرض التضخيم، واسع الاطراف، جامد اللسيج اللامع الذي يتغير من الخضار الباهت الى الحمرة الجلوية || ثمرتها هي الشكل مستطال الحراشف. بلوطها كبيرة، حلقة، لها الى الحمرة السوداء.

١٤٣٧٩ - سِنْدِيَّيْكَانْ أَخْضَر بَلْطُوق Quercus flex, Q. Ballota (S). Chêne vert, Yew, Ballota (F). Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Ballota oak (E). Stechelche (D). Eice, Lccio, Lecina, Quercus verde (I).

نوع شريوة كثير الحشود يربط في الآلة الكلكية. أجارها تطول من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها فلسة. ساقها حلقة اللحاء الصلبة الكمامة. اوراقها حرة، لاقامية الشكل والنتن، ثوبها حلق الخضار الاس، مره، تد من ٦ الى ١٠ ازواج || ثمرتها بجمرة اللون، زغبية الحراشف المراكية.

١٤٣٨٠ - سِنْدِيَّيْكَانْ أَرْغَب Quercus lanuginosa, Q. pubescens (S). Chêne pubescent (F).

شجرة جامدة تربط في الاراضي الكلكية. طولها ٦

Utricularia (S).
Utricularia, Lentibularia (F). Bladder-wort, Hooded water milfoil (E). Wassenschlauch, Grosser wasserhalm (D). Utricularia, Erba vassica (I).

نبات عشبي يري مالي من فصيلة السندباديات. جلوده حرجية، ساقه طراخية. اوراقه مركبة ريشية عيطة. ازهاره فردية او مضوية التجميع تركل على السراخ. لها يختلف مع الانواع نها الاصفر والاحمر والازرق.

١٤٣٨١ - سِنْدِيَّيْكَانْ Lantibularia, Utricularia (S).
Lentibulariades, Utriculariades (F).
Lantibularia, Utricularia (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات الفلقة، قليلة الاجناس والازواج جميعها من النباتات المائية التي تعيش في غرة الماء او تطفو على سطحه. اشهرها السندباد.

١٤٣٨٢ - سِنْدِيَّيْكَانْ Thibaudia (S).
Thibaudia (F).

الواحدة سندباد. جنس شجيرات برية وفردية من فصيلة الخنثيات. انواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية من المابين للقدم والجلد || ساقها فردا طولها من مترين الى اربعة امتار. اوراقها متعاقبة، سنالية التصال الجامدة الاقامة. ازهارها نسي الجسم، محوري الايتكان. ازهارها جملة الشكل، عديدة اللون. جميعها الى الحمرة المتفاوتة التضخيم والملاجات.

١٤٣٨٣ - سِنْدِيَّيْكَانْ Tetracelis articulata (S). Thuya articulata, Cypraea à sandarac (F). Sandarach tree (E). Sandarachbaum (D). Sandaraca (I).

شجرة حرجية وسيدة الجلس والنوع من السرويات. مهدا جبال الاطلس. ساقها فردا، كثيرة العقد القرابية. بلوطها اللين، طولها من ٥ الى ١٥ م. ثوبها حلقة. اوراقها ضمية، رايحية، حرة. اكرانها كروية طرها رايح من ٨ الى ١٢ م. جراتها اربع خير متساوية اللون || يستخرج منها صمغ السندباد المشهور. اشجارها فاخرة الصنف طرية اللون.

١٤٣٨٤ - سِنْدِيَّيْكَانْ Callitris (S).

Callitris (F). Arar tree (E). Echter schmuckzapfen (D). Callitris (I).

جنس أجار وشجيرات حرجية من السرويات. انواعها نحو ٢٥ ساقها طولها من ٤ الى ٢٠ م. افرانها كثيفة التجميع. اوراقها فلسية الشكل، حرة. ازهارها وسيدة اللق والسكن. اكرانها شبه كروية، سلمية او ثمانية الجراعات الشفوية الشكل، الخفدة. يزورها اهلحلبة وسيدة الجناح || يستخرج من بعض انواعها صمغ السندباد الذي يشبه صمغ السندباد ويستخدم استماله. لها أجار خنية بالظان. اشجارها رامة، جيدة الصنف شائعة الاستعمال الصناعي.

١٤٣٨٥ - سِنْدِيَّيْكَانْ Pammodromus (S).

Pammodrome (F). Pammodromus (E).

حيوان يربط من البطاء وفصيلة السقايات قايما بالاسنان، مكثيات الاينة الحرجية، ولبايات القوام، خاصيات الجوهري من الماخذ.



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد

الحراثة. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها لمساء اللحاء. يتألفها من عدة. أوراتها حرة، بيضية، مسنة الزام الأخير. نصلها جامد النسيج، بحري الخضار، خلي الصفعة السفلى، يطول من ٧ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ || تفرقها خلي الحراشف الدقيقة. بلوطها مستطيلة.

١٤٣٣٧ - سِتْدِيكَن بِلَاح ، بَلَحْج

Quercus coccifera (S). *Chêne kermès*, *C. cocciné* (F). *Kermes oak*, *Scarlet oak* (E). *Kermes alch*, *Kermesbaum* (D). *Quercia della cocciniglia*, *Quercia del kermes* (I).

شجرة دقلة مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الأراضي الكلسية، ثلثو من ١٥ إلى ٤٠ م. أوراتها حرة، احليلجية، ذلقة، تطول من ٢ إلى ٦ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٥ م. نصلها صلب النسيج المائل للانع، لونه أ. الخضار الزاهي، حذاه مفرس الحافة، فسح الاضلاع، شالك الحلب || تفرقها شالك الحراشف المتراكبة. بلوطها لاس قشرة الحطيلة يطوى توضيح عايق.

١٤٣٣٨ - سِتْدِيكَن عَصَصِي كَلْمَر

Quercus conferta (S). *Chêne à glands fasciculés* (F).

شجرة سريرية جميلة الشكل ثلثو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أوراتها حاملة مستطيلة، نصلها متواج الصفعة. خلي البشرة السفلى. نصوسه عديدة، متقاربة، ضيقة الاضلاع || تفرقها قلنوسو الشكل، قليل العمق، متراكب الحراشف النقية الدرية. بلوطها تطول نحو ٣ سم. يطوى نسيج مستطيل عايق. ثمارها ثنائية او ثلاثية التجميع.

١٤٣٣٩ - سِتْدِيكَن رُوسِي ، مَكُول

Quercus aegilops (S). *Chêne vilain*, *C. aegilops* (F). *Valonian oak*, *Valani oak* (E). *Knoper eiche*, *Valonian eiche* (D). *Quercia da concia*, *Q. della vallois* (I).

شجرة سريرية مهدها الشرق الأدنى ثلثو من ٢٠ إلى ٢٥ م. أوراتها حاملة، بيضية، مسنة الزام الأخير، تطول من ٦ إلى ١٢ م. وتعرض من ٣ إلى ٧. نصلها جامد النسيج، مشاري الحافة || تفرقها كبير اللد مستطيل الحراشف شائع الاستعمال في البهاية والصباغ.

١٤٣٤٠ - سِتْدِيكَن شُورِي * ، سِتْدِيكَن الْفَلِين

Quercus suber (S).

Chêne liège, *Surfer* (F). *Cork oak*, *Cork tree* (E). *Kork eiche*, *Korkbaum* (D). *Quercia sughero* (I).

شجرة جامدة مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط. يتكرر ويوجد في أفريقيا الشمالية، ترطب في الأتربة الرملية. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. خام ساقها شجرة قوية التركيب يستخرج منها الفلين. أوراتها حرة، داخلة الخضار، تطول من ٣ إلى ٦ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٤٠ م. نصلها بيضي الشكل جامد النسيج، امرو الصفعة العليا المائقة الخضار، انقب السفلى الطلاء اللين. حروته من ٥ إلى ٧ أزواج || تفرقها غروفي الشكل اطول الحراشف القصيرة المستعرضة. بلوطها متوسط اللد، مدبب الشلام.

١٤٣٤١ - سِتْدِيكَن صَبَاغِي

Quercus tinctoria, *Q. velutina* (S). *Chêne querceron* (F).

شجرة سريرية ثلثو من ٢٥ إلى ٣٠ م. يتألفها وزيتاتها خفيفة، زبد البشرة، صفراء اللين. أوراتها تطول

إلى ٢٠ م. جلدها زلي. ساقها عذراء متعرجة. قهوها مسطحة، عتقة، سواد اللين. انثائها ويتألفها زبد اللحاء. أوراتها حاملة، خلية الصفعة السفلى، تطول من ٨ إلى ٨ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ || تفرقها صغير اللد، مدبب الحراشف الشائكة. بلوطها دقيقة، مستطيلة، مدووجة، سادة الشلام الاسود.

١٤٣٤١ - سِتْدِيكَن أَسْوَد

Quercus ferruginea (S). *Chêne noir* (F).

شجرة ريفية مهدها امريكا الشمالية. ثلثو من ١٥ إلى ٢٠ م. أوراتها كبيرة اللد تطول نحو ٢٢ سم. نصلها ثلاثي او خماسي التجميع، جامد النسيج، جلدي الحاد، خلي الصفعة السفلى || تفرقها رمي الشكل. بلوطها صغيرة اللد، ابرية الشلام.

١٤٣٤٢ - سِتْدِيكَن آسِي الْوَرَق

Quercus myrsinaefolia (S). *Chêne à feuilles de myrte* (F).

شجرة سريرية مهدها اليابان. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها مسطحة اللحاء، أوراتها حرة، احليلجية، آسية، تطول من ٨ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٢ إلى ٤. نصلها غائر المروق امروط البشرة. بحري اللين.

١٤٣٤٣ - سِتْدِيكَن أَشْعَر ، سِتْدِيكَن تُرْكِي ، لِكْ

Quercus cerris (S). *Chêne chevalin*, *C. de Bourgogne*, *C. lombard*, *Cerro*, *Doucier* (F). *Iron oak*, *Mossy oak*, *Turkey oak* (E). *Zerrleiche*, *Turkische eiche* (D). *Quercia cerro*, *Cerro* (I).

شجرة سريرية مهدها الشرق الأدنى واروپة ثلثو من ٢٠ إلى ٣٥ م. أوراتها حاملة تطول من ١٥ إلى ١٤ م. وتعرض من ٤ إلى ٦. نصلها جامد النسيج، عايق الخضار البحري، رهاضي او سداسي او ثنائي التجميع. حروته الرئيسية تد من ٦ إلى ١٥ أزواج يتخللها اصابع متعرجة بيضاء || تفرقها قوي الحراشف الحطية الحطية البشرة.

١٤٣٤٤ - سِتْدِيكَن الْوَرَق * ، عِذْر

Quercus alata (S). *Chêne starle* (F).

شجرة سريرية حرمية الشكل ثلثو من ٢٠ إلى ٢٥ م. يقال ان مهدها الجزائر وهي مخلوطة في بعض جرد جبل وادنتين من لبنان. أوراتها حاملة تطول من ٨ إلى ١٥ م. نصلها جامد النسيج، مفروض الصفعة المستديرة التجميع، تفرقها اطول اللين غروفي الحراشف الحطية البشرة. بلوطها كبيرة اللد طويلا نحو ٤ سم. وقطرها ٢.

١٤٣٤٥ - سِتْدِيكَن الْكَلْمَس ، سِتْدِيكَن الْبَرْتُكَل ، عَصَصِي

Quercus lusitanica (F). *Chêne à galles*, *C. du Portugal*, *C. des teinturiers* (F). *Dyer's oak*, *Gall oak*, *Nut gall oak* (E). *Eiche gallicana*, *Galliptel eiche* (D). *Quercia della galla* (I).

شجرة سريرية مخلوطة، ضيقة اللوحة، متصبة القروع ثلثو من ١٥ إلى ٢٠ م. انثائها ويتألفها خلية اللحاء. أوراتها حاملة تطول من ٥ إلى ١٥ سم. نصلها بيضي الشكل مفروض الحافة، ضيق الاضلاع، خلي الصفعة السفلى، انقبس العليا || تفرقها مدبب الحراشف بلوطها مستطيل الشكل، مدبب الشلام.

١٤٣٤٦ - سِتْدِيكَن بَحْرِي الْوَرَق

Quercus glauca (S). *Chêne glauque* (F).

شجرة سريرية مهدها اليابان ترطب في المناطق المعتدلة



سدتيك انرز



سدتيك انرور

جماد النسيج ، سنن الحافة ، حروف متزاوية الخطوط
عدها يراوح من ٨ الى ١٢ زيباً كل واحد منها يتطو
بسن || تقربها اطليحي الحرافش . بلوطها طويل
نحو ٤ سم قطرها ٢ سم .

١٤٢٤٨ - سِتْدِيَان لَاطِي لَاطِي الزَّهَر *

Quercus sessiliflora (S). *Chêne sessile*, C. à crochets, Rouvre, Durin (F).

نوع سبروتي عديد الثروب يطول من ٢٠ الى ٣٠ م .
اوراثها مستقلة لا اذنية . نصلها ساهي او ثنائي التخصيص ،
خلي البشرة حل صفحت السفل || تقربها حاد الاذان ،
حقيق الحرافش المتراكبة . بلوط سوي اللون الخلي ،
محبس الشلام .



سِتْدِيَان كَسْتِي الزَّهَر

١٤٢٤٩ - سِتْدِيَان لَيْبَان *

Quercus libani (S). *Chêne du Liban* (F).

شجرة سبروتية مهدها جبال لبنان تملو من ١٠ الى ١٢ م .
اثنائها صغيرة اللد لونها الى الصفار الخلي . اوراثها
عابطة تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ .
نصلها جماد البشرة ، منشاري الحافة ، حاقب الصفحة
العليا القديمة الخضر ، باحت السفل الصفراء الموح .
تقربها يضي الحرافش الجملدة الحليمة .



سِتْدِيَان لَاطِي الزَّهَر

١٤٢٥٠ - سِتْدِيَان صَافِي *

Quercus aquatica (S). *Chêne aquatique* (F).

شجرة جمادة ترطب في للمواقع القريبة قرب مجاري الماء .
تعلو من ١٥ الى ٢٥ م . اوراثها صغيرة اللد ، قصيرة
العتق ، مفرصة . نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم . وهو
اسرط البشرة حل صفحته || تقربها صاهي الشكل .
بلوطها غليظة ، قصيرة ، حادة الشلام .



سِتْدِيَان لَيْبَانِي

١٤٢٥١ - سِتْدِيَان صَدْبَب الزَّوْك *

Quercus acuta (S). *Chêne à feuilles aiguës* (F).

شجرة سبروتية مهدها الشرق ، ترطب في للمناطق الجنوبية
المستوية . تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراثها حرة ،
يضية ، مديبة اقزام الاخير . نصلها عدم التسنين يطول
من ٧ الى ١٤ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . يلو احمل
اللون كليل الزهب ثم يتحول الى الخضر الاصفر .
تقربها متراكب الصفات الحرافش البقية .

١٤٢٥٢ - سِتْدِيَان عَرَبِي *

Quercus mirbecki (S). *Chêne de Mirbeck*, Zâne (F).
Overcup oak, Mirbeck's oak (E). *Quercia blanca aquatica* (D).

شجرة سبروتية ترطب في المناطق المعتدلة للشجرة نحو
الحارة . مهدها افريقية الشالية واسيايا . تعلو من ٣٠
الى ٣٥ م . بانقتها زاء . اوراثها عابطة . مستقلة .
نصلها جماد النسيج مفصص الحافة || تقربها جامد
الاذان ، ثخين الحرافش القصيرة .



سِتْدِيَان مَرْتَد

١٤٢٥٣ - سِتْدِيَان مَرْتَد * ، سِتْدِيَان مَرْتَدِي ، وُور *

Quercus pedunculata, *Q. robur* (S). *Chêne pédonculé*, Roure, Gravolin (F). British oak, Female oak, Red oak (E). Steichele, Rozeiche (D). Rouvre, *Quercia pedunculata* (I).

نوع سبروتي عديد الثروب . اجماره حرة الشكل تعلو
من ٣٠ الى ٥٠ م . اوراثها عابطة مستقلة لزناد .
نصلها رباعي او خمسي التخصيص ، ازغب البشرة ينعو
اخضر اللون ثم يتحول ويتغير الى ان ينتهي بالاحمر .
تقربها عجب الحرافش الصغيرة القصيرة .

من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٥ . نصلها
جماد النسيج ، سنن الحافة ، فسح الاضلاع ، خلي
الصفحة السفل || تقربها قلنسوي الشكل . بلوطها
صغيرة وقصيرة لونها الى السرة الحليمة .

١٤٢٤٧ - سِتْدِيَان كَصْفَانِي الزَّوْك *

Quercus phellos (S). *Chêne saule* (F).

شجرة رقيقة ترطب في للمناطق الجنوبية وفي الاراية للوصلة
الانصاج السميكة الثوب . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م .
اوراثها مستقلة مديبة اقزام الاخير ، حسيكة البضة .
نصلها يطول نحو ١٠ سم . ويعرض ٢ سم . وهو اسرط
البشرة حل صفحته . ينعو اخضر اللون وينتهي ، في
الخريف ، الى الحمرة الصفراء الموح || تقربها
قلنسوي الشكل ، دقيق الحرافش ، لونه الى الجورة .
بلوطها صغيرة اللد ، سمره اللون .

١٤٢٤٣ - سِتْدِيَان صِيْثِي *

Quercus chinensis, *Q. variabilis* (S). *Chêne de Chine*, *C. variable* (F).

شجرة جمادة مهدها الصين ترطب في للمواقع الباردة تعلو
من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراثها عابطة تطول من ٨ الى ٢٠ سم .
وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جماد النسيج . سنن
الحافة ، خلي الصفحة السفل التي تدير نفسية اللون .
تقربها متعرض الحرافش القصيرة الصلبة .

١٤٢٤٤ - سِتْدِيَان طَوِي * ، سِتْدِيَان التَّوَكْسِي *

Quercus toza (S). *Chêne cauxin*, *C. doux*, *C. brosse*, *C. angoumois* (F).

شجرة جمادة ترطب في المناطق الجنوبية . تعلو من ٣
الى ١٥ م . جلودها ممداء ، غليظة ، غلسلة . اثنائها
زباء اللحاء وردية اللون . اوراثها عابطة تطول من ٦
الى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . نصلها خلي الصفحة
السفل || تقربها مسير اللد متباعد الحرافش القوية .
بلوطها صغيرة ، لونها الى السرة ازيتية .

١٤٢٥٥ - سِتْدِيَان شَكْوِي الزَّوْك *

Quercus laurifolia (S). *Chêne laurier* (F).

شجرة جمادة مهدها امريكة . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م .
اوراثها تشبه اوراق اللار . نصلها يطول من ٨ الى
٢٠ سم وهو اسرط الصفحتين ، جميل الخضر الباهن .
تقربها قلنسوي الشكل ، صغر الحرافش القوية .
بلوطها صغيرة اللد ، متخيلة اللون ، يطولها موح صغر زيب .

١٤٢٤٦ - سِتْدِيَان كَبِير التَّحْمَر *

Quercus macrocarpa (S). *Chêne à gros fruit* (F).

شجرة سبروتية جملة الشكل مهدها امريكة الشالية .
تعلو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراثها عابطة تطول من ١٠
الى ٤ سم . نصلها خلي التخصيص ، صفحت العليا
جملة الخضر ازباني اما السفل لخميلة البشرة لونها
الصمبة || تقربها عيطي الحرافش التي تدير كالاذاب .
بلوطها كبير اللد طوله يراوح من ٥ الى ٦ سم . لونه الى
الجورة .

١٤٢٤٧ - سِتْدِيَان كَسْتِي الزَّوْك *

Quercus castaneifolia (S). *Chêne à feuilles de châtaigner* (F).

شجرة سبروتية مهدها افريقيا تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م .
اوراثها عابطة ايمارية الشكل كاوراق الكتنة . نصلها

الجُلع والافتاد. اوراقها غليظة اي انها تغلق من مركبة ريشية، في عهد الفتوة، الى غلظ بسيطة مبطنة في عهد البلوغ || جميعها من النباتات الراملة مهددا بالبلاد الحارة. احرف واشهر انواعها ما يتبع .

١٤٣١٤ - سَنَطُ اَبْيَضٍ، هَرَسِي (S). *Acacia albida*.
 Acacia blanc, Mimosa blanc (F). White scacia (E).
 Weisses akazie (D). Albergo blanco (I).

شجرة زينة بمرقطة. ساقها مغطاة بالحاء اوراقها مركبة عابلة. ازهارها زبدية اللون.

١٤٣١٥ - سَنَطُ اَزْرَقٍ (S). *Acacia cyanophylla*.

Acacia bleu, Mimosa bleu (F).
 شجرة زينة بمرقطة تسلم من مرقين الى ٦ امتار. فلدها مستطيلة الشكل، نصلها لاصع اللسج الاخضر اللون، الازرق المواج. متناهيها الزهرية صغيرة القد. ازهارها كروية متوسطة الحجم جملة الزبدية المتخرج || ازهارها يستمر طول شهر آذار.

١٤٣١٦ - سَنَطُ اَزْهَبٍ (S). *Acacia pubescens*.
 Acacia pubescent, Mimosa pubescent (F).

شجرة زينة جادة تسلم من مرقين الى ثلاثة امتار افتانها ورافاتها زباه. اوراقها عابلة مركبة. امشاطها خيطية الورقات قد من ١٠ الى ١٥ زوجاً. متناهيها الزهرية محورية وتاجية الاكثر. ازهارها خلية المالحق لونها الى الصفرة النائية || ازهارها يدوم طول شهر آذار.

١٤٣١٧ - سَنَطُ اسْتَقْبُولٍ

هو ابيزيا الحرير، اطليا.

١٤٣١٨ - سَنَطُ اسودّ

Acacia nigricans, A. rufesfolia (S). *Acacia noiretre, Mimosa noiretre* (F).

شجرة زينة جادة مظلية الشكل. افتادها ورافاتها مضطمة الزوايا. ورافاتها غليظة. اوراقها عابلة، مركبة، امشاطها خيطية الورقات المستطيلة، نصلها الى الخمس المالحق الاسود المواج. ازهارها فردية او خمسية التجميع، فواحه العرف الذي، لونها الى الصفار الكبريتي. ازهارها يدوم طول شهر نيسان.

١٤٣١٩ - سَنَطُ اسودّ الخشيب

Acacia melanoxylon (S). *Acacia à bois noir, Mimosa à bois noir* (F). Black wattle, Green wattle (E).
 Schwarze akazie, Schwarzwattle (D). *Acacia nera* (I).
 شجرة جادة هريسة الشكل. كبيرة القد تسلم من ١٠ الى ٣٠ م. افتادها مضطمة الزوايا. فلدها متناية مستطيلة، نصلها حاقب الخمس الاسود المواج. ازهارها كروية الشكل، كبيرة القد، فواحه العرف، صفارها كبريتي. ازهارها يستمر من آذار الى نيسان.

١٤٣٢٠ - سَنَطُ السَنغال، قَتَاد، هَسَاب

Acacia senegalensis, A. verek (S). *Acacia du Sénégal, Gommier blanc* (F). Gum tree (E). Weissliche akazie, Vereksbaum (D). *Acacia del Senegal* (I).

شجرة مهددا بالبلاد الافريقية تكثر في السنغال يستخرج منها اجود الصوغ الحريية.

١٤٣٢١ - سَنَطُ العنابيد (S). *Acacia pycnantha*.

Acacia à pompons, Mimosa à pompons (F).
 شجرة كبيرة الحجم، خمسية الشكل، تسلم من ١٠ الى

١٤٣٥٤ - سَنَطُ يَكَنَ مَسْنَن اَلْوَرَقِ

Quercus dentata (S). *Chêne denté* (F).

شجرة بمرقطة جليلة الشكل مهددا باليابان تسلم من ١٥ الى ٢٠ م. يتناهيها مستطيلة خليقة زباه الحاد، زغبيا اصفر اللون. اوراقها عابلة، كبيرة، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم. نصلها صمك اللسج الجامد، ساهي او ثنائي التضمين. هريسة بارزة خلية البشرة. صفحتها السفلى زبابة طلاء. تفرقها مستطيل الحرافش الخيطية البنية. بلوطها يبيضي الشكل، متوسط الحجم.

١٤٣٥٥ - سَنَطُ يَكَنَ مَسْنَن وُثِي

Quercus macdonnata (S). *Chêne troyan* (F).

شجرة بمرقطة مهددا باليابان تسلم من ١٥ الى ١٢ م. افتانها خيطية صغيرة. اوراقها عابلة، قصيرة المتق، تطول من ٤ الى ٦ سم. وتعرض نحو ٤. نصلها جامد اللسج الاخضر على صفحته، سنن الحافة، عند هريسة يراوح من ٨ الى ١٢ زوجاً || تفرقها خيط الحرافش المستطيلة الممققة.

١٤٣٥٦ - سَنَطُ يَكَنَ مَسْنَن عَجَري

Quercus pauciflora (S). *Chêne des marais* (F).

شجرة بمرقطة تجرد في الشتاء ولا تغطي الرمال القاحلة تسلم من ٢٥ الى ٤٠ م. اوراقها تطول من ٨ الى ١٢ سم. نصلها ثلاثي التضمين، ازغب البشرة. خلل الفصم والمروق || تفرقها صاهي الشكل، دقيق الحرافش الرفيعة البريئة الطب. بلوطها متوسطة القد، كستنية اللون.

١٤٣٥٧ - سَنَطُ يَكَنَ يَتِيَات

Cupuliferes (F).
 هي فصيلة ابيليات من ذوات الفلقتين البدييات المتشالات.

١٤٣٥٨ - سَنَطُ يَكَنَ

Syndic de faillites (F).
Assignes in bankruptcy (E).
 هو الوكيل القانوني من انقضى ومن كتلة الدائنين.

١٤٣٥٩ - سَنَطُ يَكَنَ

Anamirta paniculata (S).
Anamirta, Coque du Levant (F). Cockles plant, *Cocculus indicus* (E). Kokkalekornstrauch (D).
Anamirta, Coccois di Levante (I).

لبات بري وزراعي ممر وسيد الجلس والقرح من فصيلة القرنيات. مهدد بالبلاد الحارة اخضها الاسوية. ثمار طيبة، عطرية، مسهلة ورفيعة شائعة الاستعمال تنهي سم السمك الحله.

١٤٣٦٠ - سَنَطُ يَكَنَ

Marle commune (F).
 هو السمور اشالح، اطليا.

١٤٣٦١ - سَنَطُ يَكَنَ

Plante enraciné (F).
Rooted slip (E).

كل فصيلة او عطف وما اشبه استقلت بطولها وبنات غربها.

١٤٣٦٢ - سَنَطُ يَكَنَ

Pointe des vertèbres du dos (F).
 حرف فقار الظهر سنن.

١٤٣٦٣ - سَنَطُ يَكَنَ

Acacia
 بنس الشجار ونباتات برية وصناعية وزينة من فصيلة القرنيات. انواعها زهاء ٤٠٠ مغطيا شاك



سَنَطُ يَكَنَ



سَنَطُ اسودّ الخشيب

١٤٣٧٨ - سُطُ صَمْفَرِيٍّ، طَلْح، أَمْ غِلَان، بَنَكْ

Acacia gummifera (S). *Acacia gommier* (F). *Marocco gum tree* (E). *Berberische akazie*, *Tischbaum* (D). *Acacia gummifera* (I).

شجرة من العشاء كثيرة الشوك الحاد الخشن مهددة أفريقية الشالية وقد انتشرت في جميع الاطراف الحارة . يستخرج منها صمغ السط الطيب الرائحة لكثير الاستعمال .

١٤٣٧٩ - سُطُ عَرَبِيٍّ، قَرْظ، شَوْكَةُ لَيْطِيَّةٍ

Acacia arabica (S). *Acacia arabique*, *Mimosa arabique*, *Gommier rouge* (F). *Gum-arabic tree*, *Egyptian acacia* (E). *Arabischer gummibaum* (D). *Acacia arabica* (I).

شجرة برية وزراعية مبلولة في الشرق العربي . يستخرج منها الصمغ الاخر وهو متوسط الصنف يعتبر دين صمغ الطلع والمشاب .

١٤٣٨٠ - سُطُ حَرْعَرِيٍّ،

Acacia juniperina (S). *Acacia-génévrier*, *Mimosa-génévrier* (F).

جنية تزيينية مبروتية تملو من مَرَيْن الى ثلاثة امتار . انتفاخها اسطوانية زياذ الحاد . فلحها صغيرة اللد ، حمرية الشكل ، صلبة اللصل ، ذاككة القعدة ، لونها الى الخضار الباهق . ازهارها سلبية التجميع لونها الى الصفار البهوي || ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

١٤٣٨١ - سُطُ حَسَكِيٍّ، شَبَّة

Acacia mellifera (S). *Acacia mellifera*, *Mimosa mellifera* (F).

شجرة تزيينية مبروتية جبلية الشكل تملو من ٣ الى ٥ امتار . مهددة الين وتهايم بحر القلزم . اوراقها حاملة مركبة . ازهارها عشوية التجميع ، صلبة اللون . صمغها قليل الانتزاع جيد الصنف .

١٤٣٨٢ - سُطُ كَذَابٍ

هو البرويبية السطية ، أطليا .

١٤٣٨٣ - سُطُ كَشَوٍّ، كَدَّاهَنْدِيٍّ، خَيْرِإ

Acacia catechu (S). *Acacia au catechu*, *Cachoutier*, *Catéchu* (F). *Catechu tree*, *Khair tree* (E). *Katechu akazie*, *Kaca-mimosa* (D). *Acacia di catechu* (I).

نوع من السط الآزاعي يستخرج منه الكاشور .

١٤٣٨٤ - سُطُ لَوْتِيٍّ، سَمَر

Acacia spicocarpa (S). *Acacia à spirales*, *Mimosa à spirales* (F).

شجرة برية وزراعية كثيرة الشوك تسهل التسج ساقها تصيرة . فرمها وانتفاخها عديدة متدلية الاطراف . اوراقها مركبة ، حاملة . ازهارها صفراء اللون ، قليلة الكثافة ، خفيفة البرق .

١٤٣٨٥ - سُطُ مُجْتَمِعٍ

Acacia elata (S).

Acacia alifé, *Mimosa alifé* (F). جنية تزيينية رطبة تملو نحو المتر . اوراقها بالبالسة . فلدية ، قنفة ، جناسية الشكل تنتهي بمسكة سادة . ازهارها الى الصفرة البالية || ازهارها يستمر ٤ اسابيع ابتداء من اواسط آذار .

١٤٣٨٦ - سُطُ رِيَّاسَةٍ

Acacia rissana (S).

Acacia de Rissé, *Mimosa de Rissé* (F). شجرة مبروتية تزيينية تملو من مترين الى ٦ امتار . انتفاخها مضلعة متدلية الاطراف كالقرب . اوراقها فلدية

٣٠ م . فلحها منجل الشكل ، مالم الصفحة الالامية الباقية الخضار . عناقيدها الزهرية جاسنة مسطيلة . ازهارها كبيرة اللد ، عطرية البرق ، لونها الى الصفرة اللحية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٣٧٢ - سُطُ الْعَمَّيَرِ

Acacia farnesiana (S). *Acacia farnésa*, *Mimosa farnésa*, *Cassier*, *Cassie* (F). *Cassia*, *Popinac*, *Sponge tree* (E). *Antillen-akazie*, *Schwammbaum* (D). *Acacia farnésa*, *Farnesia odorosa* (I).

جنية مبروتية تزيينية وصناعية تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها حاملة مركبة . امشاطها وزرة ثلاثية او خمسية او سباعية . وزيقاتها عطرية تده من ١٥ الى ٢٠ زيبا || ازهارها كروية ، كبيرة اللد ، فواحة البرق الطري يستخرج منها بالتقطير صمغ العنبر المشهور || ازهارها يستمر طوال الصيف وانخريف .

١٤٣٧٣ - سُطُ عَطْفِيٍّ الْوَرَقِ

Acacia linearis (S). *Acacia à feuilles linéaires*, *Mimosa à feuilles linéaires* (F).

شجرة تزيينية تملو من مترين الى ٥ امتار . فلحها ثلاثي البرق ، نصلها عظمي الشكل يطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . ومرض نحو ٢ م . ازهارها صغيرة اللد ، سلبية التجميع ، زائجة الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر طوال شهر شباط .

١٤٣٧٤ - سُطُ ذَمَّاعٍ، صَيَّال

Acacia seyal (S). *Acacia seyal*, *Arbre à gomme*, *Dellie* (F). *Sittah tree*, *Shittim wood*, *Thirsty thorn* (E). *Seyal akazie* (D). *Acacia seyal* (I).

شجرة برية وزراعية كثيرة الصارة المسلية . صمغها يعتبر دون صمغ القَرْظ .

١٤٣٧٥ - سُطُ رَائِبِيٍّ، سُطُ كَثِيرِ الْوَرَقِ

Acacia retinodes, *A. floribunda* (S). *Acacia floribond*, *Mimosa résineux* (F).

شجرة تزيينية مبروتية دائمة تملو من ١٠ الى ١٥ م . انتفاخها لعمصة دقيقة طوية . اوراقها فلدية ضيقة مسطيلة رسيمة البرق . عناقيدها ازهرية تاليجة الاينكاناز . ازهارها كروية ، فواحة البرق ، صفراء اللون . ازهارها يستمر طوال السنة .

١٤٣٧٦ - سُطُ مَسَحٍ

Acacia cultriformis (S).

Acacia-coutre, *Mimosa-coutre* (F).

جنية تزيينية جاسنة تملو من متر الى مترين . ساقها وقرورها اوراقها مرسة . فلحها يهسية الشكل ، جاسنة التسج البحري اللون . ازهارها عشوية التجميع ، عناقيدها رطلة مسطيلة || ازهارها يستمر ٤ اسابيع تبداً في اوائل ايار .

١٤٣٧٧ - سُطُ شَالَعٍ، سُطُ عَمَّيَرِيٍّ، مِيْمُوزَا

Acacia decurrens, *A. dealbata* (S). *Acacia parfumé*, *Mimosa commun* (F). *Silver wattle*, *Wattles* (E). *Silberakazie*, *Weisstliche akazie* (D). *Acacia dealbata* (I).

شجرة مبروتية مبلولة تملو من ٨ الى ١٢ م . انتفاخها وانتفاها خلية الحاد . اوراقها حاملة مركبة . امشاطها عديدة . وزيقاتها حمرية . نصلها متوسط الصلصة في التهار ، ثنايا في البلى || ازهارها فواحة البرق ، لونها الى الصفرة الزائجة . يستخرج منها بالتقطير صمغ العنبر || ازهارها يستمر من كانون الى آذار .



سط ذاك



سط عربي

الى ٢٠ سم. تتميز بأجسامها الكبيرة المستديرة ، بزنافنها الظهرية المستطيلة الشائعة الشاككة ، بشكل ظهورها وبطنها المقنطرة المتوسر || ألوانها شديدة البهتان أكثر فيها الأحمر والأزرق والبرتقالي والوردي والفضي .

١٤٢٩٧- سُتْقُ أَثَر ، تَيْسَن

Holocentrum rubrum (S). *Holocentre rouge* (F). سمكة بحرية يعيش من السفق وفضيلة التعديلات . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط . كثير وجودها قرب الشواطئ والمخارج المصرية وألبانيا || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الحمرة الازرقوانية يعلوها موج اسفح . رأسها شبه مخروطي الشكل قصير الخيط . عينها كيرتزان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة كبيرة ، مستطيلة ، شاككة القسم الاسامي . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٤٢٩٨- سُتْقُ شَانِي

Holocentrus chani (S). *Holocentre chani* (F). سمكة بحرية يعيش من السفق . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط أعضائها المخارج التركية واليونانية || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٨ سم. ثوبها الى الزبداء السمر المغايرة الماجات القنسية . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها الاسفل يتقدم الاسفل . عينها كيرتزان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١٠ متضخية الأطراف الحادة و١٥ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف مأكول .

١٤٢٩٩- سُتْقُ شَتَام

Holocentrus ghanam (S). *Holocentre ghanam* (F). سمكة بحرية يعيش من السفق . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط أعضائها المخارج الأفريقية || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الكحلة القنسية يعلوها في جانبيها غطان أخضران وصف من الخضسات صغير النقط المستديرة . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها متعادلان . عينها كيرتزان ، بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١١ متضخية الأطراف الحادة و٩ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة ، حلالية الشكل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٤٣٠٠- سُتْقُ مَبْدُول

Holocentrus vulgaris (S). *Holocentre commun* (F). *Common Holocentrus* (E). سمكة بحرية يعيش من السفق . أعضائها معظم اقالم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || سرسها المخارج . طليتها الخياطي كرسوي . جسمها شبه أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٨ سم. عراشها ستة المخار . ثوبها متعادل الالوان تقلب فيه التسمية القنسية ويعلوها في جانبيها خط خمس البقع المستديرة البرتقالية اللون . زنافنها الى الزبداء السمر يعلوها موج اسفح . رأسها يبرسي الشكل ، قصير الخيط . شفتها متوسط الانفرج . فكها متعادلان . عينها كيرتزان ، نازحتان ، وطحا الارتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة ، شائعة ، مستطيلة تتألف من ١٧ شعاع منها ١١ متضخية الأطراف الحادة و٦ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية

مستطيلة لونها الى الخضار البحري || أنفها سفلية ، ناعمة || كثيفة التجميع ، متدلية ، لونها الى الصفرة الفاحية || أنفها يضمر نحو ٥ أسابيع يتفق في اوائل نيسان .

١٤٣٨٧- سُتْقُ مُسْتَقِيل الْوَرَك

Acacia longifolia (S). *Acacia à longues feuilles*, *Mimosa à longues feuilles* (F). شجرة تزيينية تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. أنفادها مضلة الزوايا . فلحها متاني الشكل بطول من ٥ الى ٢٠ سم. ويخرج من ١٥ الى ٢٠ سم. منابها الزهرية مستطيلة . أنفادها صغيرة القند شديدة الصفار || أنفادها يضمر من آذار الى ايار .

١٤٣٨٨- سُتْقُ مَشَوَاك

Acacia armata (S). *Acacia armé*, *Mimosa armé* (F). شجرة تزيينية سرودية شاككة تملو من متر الى مترين . فلحها يضيبة الشكل بطول نحو ٣ سم. أنفادها عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، لونها الى الصفار الباهت . أنفادها يضمر من نيسان الى حزيران .

١٤٣٨٩- سُتْقُ هِلَالِي

Acacia lunata (S). *Acacia en croissant*, *Mimosa en croissant* (F). شجرة تزيينية سرودية تملو نحو ١٠٠ سم. فلحها حلالي الشكل بطول نحو ٢٥ سم. منابها الزهرية صغيرة الحجم محوري من ٤ الى ١٥ أنفاد لونها الى الصفرة الشائعة . أنفادها يضمر من شباط الى آذار .

١٤٣٩٠- سُتْقِيَات

Mimodées (F). *Acacia*, *Mimosa* (E). سهل من فضيلة القرنيات . اولمة زهد ١٥٠٠ منها الاجهار والشجيرات والجنات والاشجار السمر . منها الاسقام الحارة والصدئة . اوراقها متضخية ، مركبة ، ريشية . أنفادها صغيرة متضخية أو عشكولية التجميع ، محورية ولحاجة الارتكاز ، لثالية أو رباعية أو خماسية الاجزاء .

١٤٣٩١- صَيْغ

Jointure des doigts (F). *Jointing of fingers* (E). هي السلاسل التي تصل ما بين الاصابع والرسغ ، ج استماع .

١٤٣٩٢- صَيْغِيَّة

Indignation ١٤٣٩٣- صَيْغِيَّة راجع تخم .

١٤٣٩٤- صَيْغِيَّة

هو الاقنعة المشيرة ، اطليا .

١٤٣٩٥- صَيْغِيَّة ، صَيْغِيَّة ، صَيْغِيَّة ، صَيْغِيَّة ، صَيْغِيَّة

Gousse, *Ecale*, *Comp* (F). *Mask*, *Pod*, *Shell* (E). ثمرة فضيلة القطنيات كالذول والباس وطليقة وغيرها . وهي وهاء ذات مصراعين يتفتح به تمام لحيه من بعض البزور .

١٤٣٩٦- سُتْقُ

Holocentrus (S). *Holocentrus* (F). جنس سمكة بحرية من فضيلة التعديلات الشاككات الزنايف . اولمة المروقة نحو ٣٠ مولها بجار المناخن الحارة . جسمها صغيرة القند مأكولة ، طولها يراوح من ١٢



سُتْق



سُتْق لُحَام



سُتْق مَبْدُول

تقابل الظهيرة . زعنفتها الليلية فاتحة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

سفنقيات

١٤٤٠١ - سفنقيات
مرتبة اسماك بحرية من رتبة الاشلاخ تشمل القرشيات والسفنجيات البحرية .

١٤٤٠٢ - سفنقيات
هو القرن ، اطليه .

١٤٤٠٣ - سفنقيات
Ctenophora festiva (S). Ctenophora agréable (F).

حشرة لافقية من ذوات الجناسين وفصيلة السفنجيات . جسمها معتدل القبة قريب الشكل بقصم القيقول يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى السرة السطوة يملأها تجذيع وتيج اصفر . زباناها قناديا الشكل ، عذما التجلد . رؤسها الى الصغار الخفي تملو بقية سراء في وسط الزام الاخير || الاتي اكبر قدماً من الذكر . بطنها مردي الشكل . تظهر الحشرة الجلدة من ابار الى تشرين الاول . تألف الحراج والذباب والعدائق والنباتين || تمتع الاتي مكها في غاء الاجار الحرة المظلمة . يرقاتها تعيش مل المواد النباتية والمعدنية المنحلة .

١٤٤٠٤ - سفنقيات

في القرنيات فصيلة نباتية ، اطليا .

١٤٤٠٥ - سفنقيات
Sanvitalia (S). Sanvitalia (F).

جس نباتات عشية حولية زينة من الشرفيات وفصيلة المركبات . ازهاره ثلاثة . اوراقها منتنة متعاقبة . لصلها يضي الشكل مهدب القاعدة لونه الى الخضار الاصل . انماها جزوية الرؤس الوسطي ، رتقالية السوات اخارية . يزورها مجتمعة ثنائية او ثلاثية الحك . انماها يستمر طوال الصيف .

١٤٤٠٦ - سفنقيات
Hierofasco (S). Gerfaut (F). Gerfalcon, Gyrfalcon (E).

جس طير من عازة الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد الباردة . الزامه سعة . جميعا من الجوارح الكبيرة البطة . البنية الشكل والهندام . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويصلها من ١٣٥ الى ١٥٠ سم || انماها تختلف مع النوع والممر يغلب فيها الابيض . مناسرها قرية منتقاة البرة الذرة الحادة . سواقلها كبيرة القبة ، ذلقة الاطراف . لانها مستطيلة جالسة . خالها قوية . تألف الاجراج والجبال المشرقة على البحر . تصيد السحاب والاراب ويقتل القروم والبيل والاوز والنورس . تكثر في الاجمار البسقة او بين شماليه الصقور النيرة . انماها تبني وتجنس من ٤ الى ٥ دنانير نحو ٤ اسابيع . اما انماها ستة فهي :

Gerfaut blanc (F).

سفر ابيض

Gerfaut de Norrège (F).

سفر النروج

Gerfaut d'Islande (F).

سفر ايسلند

Gerfaut du Groenland (F).

سفر غروينلند

Gerfaut de Hallbell (F).

سفر هليل

Gerfaut du Mexique (F).

سفر المكسيك

Egretta garzetta (S).

١٤٤٠٧ - سفنقيات

Aligretta garzetta (F). Little egret (E).

طائر من البشريات يحرب المناطق الجنوبية المعتمة من

اليابان الى اروية وافريقية واسبالية || طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى البياض الباهي . منقاره اصفر الانتساب . اسود الجسم . يتميز بريشه الخافي القاهر السن . يعيش اسراباً كبيرة . يألف النلق . قوته الاسماك والقشاد ويقتل الحشرات . يثن بين الامل والقصب انماه تبني وتجنس ثلاث يمشات .

١٤٤٠٨ - سفنقيات
Cénomanian (F).

Cenomanian (E).

صاف حصيلي يجتر قاعدة سفات الطبقة الطباشيرية بالماليا .

١٤٤٠٩ - سفنقيات
Sommet d'une plante (F).

Summit of plant (E).

اربع جزء في النبات .

١٤٤١٠ - سفنقيات
Zébu (F). Zebu, Indian ox (E).

السنة ج سم في الايقار الهندية الرقيقة الحاركة السني الشكل . اطلب دوابي .

١٤٤١١ - سفنقيات
Cyme

شكل من الاقمار النوري قوله ان المالحق الزهرية تتلف في نقطة واحدة وتبلغ علوا واحدا مسطوريا في الانتساب والازكاز .

١٤٤١٢ - سفنقيات
Arbre à production alternative

تمت تعريفه يطل كل كى تجربة تحمل سة ويقتل اخرى كا في الزيتون .

١٤٤١٣ - سفنقيات
Sénouin (F). Senouin (E).

صاف حصيلي يشمل النصب الاوسط من الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤١٤ - سفنقيات
هو الكس ، اطليا .

١٤٤١٥ - سفنقيات
Pells (S). Chat (F). Cat (E).

جس حيوانات صغيرة القبة من فصيلة السنوريات ورتبة القوام منها برية وحشية ومنها الية لا يطر منها بيت || اسماء السنور كثيرة اشهرها القبط والحمر والقبين واليس والبين والخيخ والحليل والحمر والدم وايزون والكنيس والحارون والفتاري || اما كنهه فابو خداني وابو فروان وابو الموش وابو خاشع .

١٤٤١٦ - سفنقيات
هو الزباد ، اطليا .

١٤٤١٧ - سفنقيات
Chat tigré (F).

حيوان لاسم مغربي يضي مرقى ، اطليا .

١٤٤١٨ - سفنقيات
Felis catus, Catus ferus (S). Chat sauvage (F). Wild cat (E).

اكبر انواع السنابر ولشدها بطلأ واصليها حيدا . طوله الكامل يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . جسمه من ٣٨ الى ٤٤ ذنابه من ٣٢ الى ٣٦ اما طول الى الحاركة فوراوح من ٣٧ الى ٤٣ سم . ثوبه الى الصبغة الصفراء والسمراء يملو تخطيط وتجزع اسود || يألف الاجراج ويرح في الليل ويقتل الاجمار . يمتد على كل حيوان وطار يستطع اليه سيرا .



سفر



سفنقيات



سنور بيري

١٤٤٣٠ - سَهْطِيَّات المَنَاقِبِ

هي مشروبات المناقِب ، اطبخها .

١٤٤٣١ - سَهْطِيَّة Epillet (F). Spikelet (E).

هي وحدة التزوير في شكل الازهار السنبل . يجمدها المرسون المتتابع الارتفاع كل محور واحد يؤلف السبله .

١٤٤٣٢ - سَهْطِيَّة Parapside (F). Parapside (E).

السبله جزء من الحلقة الصلبة الثالثة ، عند الخشرات ، توصل ثلثة اليرباد بالجناح وتثبتها فيه . وهما الثتان ينفى ويصرى .

١٤٤٣٣ - سَهْطِيَّات

السنيق كوكب ثير ابيض الضوء .

١٤٤٣٤ - سَهْطِيَّة

Mitra (S).

Mitre (F). Mitre (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وضيعة السليبيات . انواعها المرفوعة كثيرة العدد والمعاصر منها يتناثر ٢٥٠ اصلها من بحار البلاد الحارة والاستوائية . معظمها يعيش على مدافع الريان || اصدها عرناصة الشكل ، غروطية الاقطاب الحلزونة مستطيلة الفروج الشقية . اجسامها عادمة التشعور ، صغيرة الرؤوس ، ثنائية الفراش ، مستطيلة الاضلاع || انواعها المرسومة في البحر الابيض المتوسط صغيرة القد باعثة الالوان . اما انواع بحار المناطق الاستوائية فكيرة القد ، جميلة الزخارف والالوان الزاهية || يعيش في الحشد « مأذنة » .

١٤٤٣٥ - سَهْطِيَّات Mitrada (S).

Mitridae (F). Mitridae (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل امايات الحياض . اجسامها وانواعها عديدة ، بعضها من متحشرات الاراضي المائية والبيض الآخر معاصر || اصدها بليلة الحلزونة ، مديبة الاقطاب ، ضيقة التجويف القاعدي اللانسوب الاستدارة || اعرف اجناسها واشهرها السنومة .

١٤٤٣٦ - سَهْطَا ، سَهْطِيَّات

السها والسهي نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

١٤٤٣٧ - سَهْطَب ، سَهْطَبَة Scappe

البرية والقلاذ وكل منبسط سهل يبعد اطراف المسية القرامية .

١٤٤٣٨ - سَهْطَة Squame (F). Squama (E).

حشفة صغيرة طبيعية او عارضة .

١٤٤٣٩ - سَهْطِي Squameux (F). Squamous (E).

لمت تعريفي وصي يطلق على الاشقية الحيوانية الحشفية السطح .

١٤٤٤٠ - سَهْطِيَّات Squamata (F).

Squamata (E).

رثة من الزحافات . التصنيف الحديث يقسمها الى مرتبتين : مرتبة الحيات ومرتبة البطانيات .

١٤٤٤١ - سَتُور دَاجِن

Felis domestica, Catus domesticus (S). Chat domestique (F). Domestic cat (E).

هو القط المروث بالبيس واخر الحجل والخيخع والبيسن . شرويه كثيرة السند اصطناعا المسلم ، الاثني اصغر قدماً من المذكور ، عملها يدوم نحو ٩ اشايح وهي تقع من ٣ الى ٦ جراء فيسر النور يمد وضعا بالسيوسين .

١٤٤٤٠ - سَتُور شِيرَازِي * قط أنقره

Catus angorensis (S). Chat angora (F). Angois, Angora cat, Persian cat (E).

فرب من السُتُور الداجِن هي الخلق مستطيل الور الجليل الناعم .

١٤٤٤١ - سَتُور مَهْمَكَة * سَتُور مَهْمَكَة

Catus maniculatus (S).

سَتُور مَهْمَكِي Chat ganté (F). Egyptian cat (E).

نوع من الساتير البرية والذاتة مهد بلاد التوبة . قدمه المصريون في عهد الترامنة وانتقل مع الرحالة وقوافل التجار من بلاد الى بلاد فوصل الى اوروبا عن طريق الجزيرة وسورية وتركيا ووصل الى الاندلس عن طريق ليبيا وتونس والجزائر . طوله الكمال نحو ٧٨ سم . جسمه ٤٤ وذنبه ٢٤ ثوبه سوي اللون يمتد عند الظهر . فرائحه رفيعة مجزعة .

١٤٤٤٢ - سَتُور مَنُول * Catus manul (S).

Chat manul (F). Manul cat (E).

نوع من الساتير البرية القوية الشديدة اللطف . هذه جبال وبنات المنول . طوله الكمال ٧٨ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٢٨ اما طول فحس ٤٥ سم . لونه مزيج من الاصفر والابيض والاسمر رأسه مبيج بالاسود . غذاء عرمان بالاسر السابق . اذنان صغيرتان . ذنبه مطوق التجزيع بالاسر .

١٤٤٤٣ - سَتُورِي Félin (F). Féline (E).

لمت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى فصيلة السُتُوريات .

١٤٤٤٤ - سَتُورِيَّات Felidae (S).

Félidés (F). Felidae (E).

فضيلة حيوانية من رتبة الفوام تشمل السنور والاسد والبر والثر والرشق والمانك الخ .

١٤٤٤٥ - سَتُوط Nidicole (F).

لمت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تنقف بيشة مرياطة لا تستطيع الاستغناء من ابوها بعض الوقت .

١٤٤٤٦ - سَتُوتُو هو انطاف ، اطله .

١٤٤٤٧ - سَتُوتُو الماه

هو التزيم من كليات القدم ، اطله .

١٤٤٤٨ - سَتُوتُو Alternativité de la fructification

صفة الاجبار المتناوبة الحمل . يقال نبات سنو ورجرة سنه .

١٤٤٤٩ - سَتُوتُو ، سَتُوتُو Annual (F).

Annual, Yearly (E).

هو كل نبات يزهر في الحول الذي ينبت فيه ثم يذبل ويموت عقب الاجمار .



سنور داجِن



سنور شِيرَازِي



سنور مَهْمَكَة



سنور منول



سِنَة

١٤٤٥٥ - **سَهْلُون** (F). **Vive**

جنس اسماء بحرية مشهورة باسم ترخين ، اغلب ترخين .

١٤٤٥٦ - **سَهْلُون صَغِير** (F). **Vive petite**

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين صغير ، اطلمبا .

١٤٤٥٧ - **سَهْلُون عَنَكَبُوتِي** (F). **Vive araignée**

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين عنكبوتي ، اطلمبا .

١٤٤٥٨ - **سَهْلُون مَبْدُول** (F). **Vive commune**

سمكة بحرية تسمى ترخين مبلط ، اطلمبا .

١٤٤٥٩ - **سَهْلُون مَشَعِ الرَّاس**

Vive à tête rayonnée (F).
سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين مشع الرأس ، اطلمبا .

١٤٤٦٠ - **سَهْلُونِيَّات** (F). **Trachinidae**

فصيلة اسماء بحرية تسمى ترخينيات ، اطلمبا .

١٤٤٦١ - **سَهْرُج** (S). **Haliastur vocifer**

Pygargue vocifer (F). Also called **burd**, **African sea eagle** (E).
طائر من الشبلي ينتمي إلى عمارة البنيان وفصيلة الصراريات .

يقال له من أجل البنيان وأحياناً وأجلاً ، موطن القارة الإفريقية . طوله نحو المتر . ثوبه أبيض فاحش . رأسه ورأسه وعينه وبنيته وباطن منقوش وبنيته إلى البياض الثلجي . ظهره وظاهر منقوش وبنيته إلى البياض الأزرق المالح . مخالبه صفراء . قوته الطير والاسماك والطيانات الصغيرة ولا يفت من البشر أبناً شاهده كأن له في اقتناصه لذة خاصة .

١٤٤٦٢ - **سَهْرُج** ، **عُكْبَاب مَوْزَرَة**

Pseudoeas, **Aquila fasciata** (S). **Pseudoeas**, **Alge à queue barrée** (F).
طائر من البنيان وسيد الجلس والترح . جسمه مستطيل

القد وصفه كاسي الریش . مخالبه طويلة . ثوبه إلى البنية الصفراء . مخالبه موزر بالأبيض . ذنبه مشوح بخطوط متعرجة لونها إلى البياض الباهي || يمر من البنيان الأوابد موطنه يمتد من الهند إلى الشرق الأوسط واليونان وإيطاليا وإسبانيا وإفريقية الشمالية . يألف الطيانات والأصراج ويجري للماء وصفات البعيريات يصيد البيط والورز والجميع والحوسل والحمام والطيال . ينته حقه في صيد السمور للذينة الثانية . انتاه تبيض ولتين تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع .

١٤٤٦٣ - **سَهْرُج** (F). **Pseudoeas**

السمور شرب من البنيان يسمى أيضاً السهوك ، اطلمبا .

١٤٤٦٤ - **سَهْرُج أَشْكَل** (S). **Sahir dubius**

Sahir douxas (F).
حشرة من السهر وفصيلة القاشيات . جسمها صغير

القد ، مبطط ، أطليجي اللون ، يطلي نحو ٨ م . || ثوبها إلى الزرق البنيضج يعطوها موطج شكل يسود فيه الأخضر فالأصفر فالأحمر || وأنها مستطيل الجسم ، قليل التكاثر . غطسها مستطيل الطول . ميناها صغيرتان ، ماحتان . زباناها مستطيلان . كوكبها محبب الظفر .

١٤٤٤١ - **سَهْل** (F). **Plain**, **Flat country** (E). **Plaine**

سهل ج سهل : هي الأراضي المستوية السطوح . مبدعها يمد إلى عاملين أساسيين : الارساب أو التحات والثرية .

١٤٤٤٢ - **سَهْم** (F). **Action** (F). **Share** (E).

هو حصة أحد الشركاء في شركة مساهمة . وهو يبادل جزئاً من مجموع الأجزاء التي قسم إليها رأس مال الشركة .

١٤٤٤٣ - **سَهْم** ، **حِصَة** (F). **Part**

هو جزء من ذمة مالية .

١٤٤٤٤ - **سَهْم الإِثْتِفَاع** ، **سَهْم التَّمَتُّع**

Action de jouissance (F).
هو السهم التي دخلت قيمته وما زال حاصله يتقاضى ربحاً سنوياً عنه .

١٤٤٤٥ - **سَهْم الرِّامِي**

كوكب تير من برج الرامي المعروف ببرج القوس .

١٤٤٤٦ - **سَهْم المَاء** (F). **Sagittaire**

هو القطعة جنس لاباتات مالية من المزاريات .

١٤٤٤٧ - **سَهْم التَّصَاب** (F). **Action de quotité**

هو كل سهم لا يقدار له إل قيمة معينة من التقد .

١٤٤٤٨ - **سَهْم إِتْخِيَاك** ، **سَهْم مُفَضَّل**

Action de préférence, **A. de priorité** (F).
هو السهم الذي يمانى بالأسبقية إلى السهم الأخرى إما بزيادة حصته في الأرباح أو في اقتسام الشركة عند حلها أو في حق التصويت أو في هذا كله مجتمعا .

١٤٤٤٩ - **سَهْم دُو حَلَاة** (F). **Action à prime**

هو السهم الذي يصدر بسعر أعلى من سعره الحسي .

١٤٤٥٠ - **سَهْم رَأْس المَال** (F). **Action de capital**

هو السهم الذي تقابله حصة في رأس المال سواء أكانت حياً أم نفذت يقابله سهم العمل أو سهم الصناعة الذي تكون الحصة فيه عملاً بديلاً .

١٤٤٥١ - **سَهْم هَبْتِي** (F). **Action d'apport**

هو السهم الذي يسلم إلى الشريك مقابل تقديم حصته حياً .

١٤٤٥٢ - **سَهْم حَمَالَة** (F). **Action au porteur**, **Titre au porteur**

certificat, **B. bond** (E).
هو السهم الذي لا يبين فيه اسم شخص معين ولكن يميزه لاباتات ملكيته .

١٤٤٥٣ - **سَهْم مَدْفُوع القِيمَة** (F). **Action libérée**

هو السهم الذي دخلت قيمته كاملة أو كان معادلاً لحصة قدما حاصله حياً .

١٤٤٥٤ - **سَهْم مُتَعَدِّد** ، **سَهْم مُتَعَدِّد الدَّاعِوَات**

Action à vote plural, **A. privilégiée** (F).
هو من الأسهم التي تحظى حلتها في الجمعيات المسوية أصواتاً أكثر مما لحصة السهام الأخرى التي تصادف معها سراً .



سَهْرُج

١٤٤٧٥ - سَوَاعِد (F). Vaisseaux mammaires (F).
Mammary ducts (E). هي مجاري الحليب في القرسح .

١٤٤٧٦ - سَوَال (F). Epizootie (F).
مرض المال وملاكه من آفة تسميه .

١٤٤٧٧ - سَوَام فَتُوَح * (F). Cyanocitta cristata (S). Cyanocitta huppé (F).
Blue Jay (E).

طائر من فصيلة الغربان . يعتبر من أجل طيور أمريكا الشمالية . يألف الإحراج والغابات ، قوته الحشرات والبزوط والثمار والبزود ويبيض المصابير ويحلبها || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . صلته العليا ، من قرأس إلى القلب ، زرقاء اللون سفاه المراج . صفته السفل من الزور إلى الاتنيك ، ريداء اللون يضاء المراج . عند أسد يمتاز بجبهة وفلاة سوداء قلوب عتق . جناحاه وذنبه مجعدة بالأسود والأريد . رأسه عروج بكشفة سوداء يطولها مواج أزرق || يدن عن في الأشجار الرقيقة . الاق تحسن وضعها من ة إلى ه يضايت بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

١٤٤٧٨ - سُوَيْفُوسُفَات (F). Superphosphate
من الاسمدة الكيماوية الرقيقة . يشل عنصر الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد التزلاية الموجودة في الخلايا النباتية || خواصه وصفاته عديدة أميزها :
- حفن جذور النبات على الانشباب والتكاثر .
- سح النبات على أتران الأتزارار وجودة البزيع وحسن التأثير والمقد ومع التخلص .
- تشييط وحماة المادة البنية في السماء وبرادة الجلور وتقوية الناعة الذاتية وتمكينها من السمود في رجه الاوصام الجرثوية .
- الحول دين شلوة الأزوت وعواقبه الوضبة فبا لو زادت نسبتة من الممدل الاقص .
والسوفسفات على اشكال منه المادي والمزدوج والمثلث وهذا يمد الى نسبة ما يحويه من الحامض الفسفوري القابل للذوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || يدر على الأربة كالبوتاس قبل التزراعة ببعض الوقت ويظهر جيدا ذلك تتمكن الحلات الطبيعية مع الانعاشها الكيماوية من تحويلة الى غذاء قابل للتشيل منه حابة النباتات اليه .

١٤٤٧٩ - سُوَيْفُوسُفَات السطام (F). Superphosphate of os.
من الاسمدة الفسفورية الضوية الجزيلة النفع يحوي من ١٢ الى ١٨ ٪ من الحامض الفسفوري القابل للذوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || وهو بطي الانفعال ينشط البيئة الجرثومية ويضما على التكاثر النظمي .

١٤٤٨٠ - سُوَيْجَر (F). Oléastre (F).
هو خللاص الضيق البزوق ، اطليه .

١٤٤٨١ - سُوَحَر هو الصفصاف ، اطليه .

١٤٤٨٢ - سُوَدَق * ، صَعَرُ البَعْد (F). Falco nigriceps (S). Faucon des canards , Aléto (F).
طائر من الصقور القزطوط التي تجوب البلاد الممتدة الحارة . جثته تقارب جثة الشاهين وهو أفر الريش ،

جسمها وحشبا ظهرها ممتدلا الطول . قشرنا شفات . بطنها الى السرة . قوتها مباشرة الحلب القصير || راحتها كرية .

١٤٤٨٦ - سُوَيْرُ مَطْلُح * (F). Sehirus maculatus (S).
Séhira maculé (F).

حشرة من السهر وفصيلة القاسياتيات . جسمها صغير القد ، مفلطح ، شبه يضي الشوز ، بطول نحو ٧ م . || فورجا الى الزقة الحدية المراج يطولها تلطيخ اضر اشهب . رأسها صغير الحجم . عظمها مصطل الطول . زباناها مستطيلة . عينها صغيرتان ، غارتان . كسولها قمي الشوز . جسمها وحشبا ظهرها ممتدلا الطول . قشرنا شفات . بطنها الى السرة القاعة . قوتها مباشرة الحلب || مرتها الكثير من الاعصاب اعصها الشفويات || راحتها كرية .

١٤٤٨٦ - سُوَيْفَة (F). Opercule (F).
Operculum, Cover (E).
هي الغلاف الرقيق الذي يسد مخاروب النحل . وهي غطاء اجنات الحامض . وهي لشاة الفسفوري الذي يلصق مناعير البير الخ ...

١٤٤٨٧ - سُوَيْل (F). Canope (F). Canopus (E).
نجم من كوكبة السفينة يتميز بريق لماله الذي يأتي بمد البرجوس والأبرق . يمد من الأرض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية أي نحو مليونين مليار كيلومتر .

١٤٤٨٨ - سُوَيْمَة ، بَلَمْنِيَت * (F). Boelenmitas (S). Boelenmita (F). Boelenmitas (E).
جنس حيوانات بحرية من القزويات وأسيات الارجل مزدجيات الحامض . وفصيلة السفينيات . انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من احافير الحفلة التريامية . حياكلها صغيرة سمية الشكل .

١٤٤٨٩ - سُوَيْمِيَت * (F). Boelenmitidae (S). Boelenmitidae (F). Boelenmitidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القزويات وأسيات الارجل مزدجيات الحامض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من صخورات الاذينة الفائرة . يبدو ان ظهورها يمد الى العصر البليوري وانقراضها كان في العصر البليثيني .

١٤٤٩٠ - سُوَيْمَة التِيَّة (F). Mauvaine fol (F).
Dichonesty, False-hood (E).
هو معرفة الانسان ما ينطوي عليه عمله اثنائوني من حير وبجرام .
١٤٤٩١ - سُوَاك هو الراعوب ، اطليه .

١٤٤٩٢ - سُوَاكِيَّة هو زردور البادية ، اطليه وين اسماله ام سليمة .

١٤٤٩٣ - سُوَاكِيَّة هو البركت ، اطليه .

١٤٤٩٤ - سُوَاكِيَّة

فجر واحدته سواة . قال ابو جنيبة : السواس من الضفاد يحوي شبه بالمرح له سفة مثل سفة المرح وليس له شوك ولا ورق ، يطلى في السماء ويصنل تحت وقال ايضا السواسي والمرح والمنج متشابهة .



سُورَق



سُوَام مَرَج



سُوَدَق

اسمع أفراس، اسم الفهر اللؤلؤ، لثير البين. راسه وصفتة وظهوره وسفاهه وذنبه سفح اللؤلؤ. مسره وعاليه سو || ين في الانجرار الباسقة الثانية. يمسره اللؤلؤم والليلر اعصمه الجردان والليل. ١٤٤٨٣ - سَوْتِيَّان، مِيَزُوكَرَب (F). *Méscarp* (F). *Mesocarp* (E).

هو الجزء المتصل من غلاف الثمرة يعرف بـ **مِلَاب** في ثمار الفركاس. تلتفه الخلة ويلتصق بالثوبكرب حيث المجمة أو البثور.

١٤٤٨٤ - سَوْتِيَّان

هو الزرودة الدائم الخضرة، اطله.

١٤٤٨٥ - سَوْتِيَّان، سَرَّاحِ الْفُلَّةِ

Colchicum (S). *Colchique* (F). *Colchicum*, *Meadow saffron* (E). *Lichtstume*, *Zeltrose* (D). *Colchico* (I). جنس نباتات بصلية طليعة ممتدة من فصيلة السورتيانيات. ازهره زاه ٢٠ مظهرها بري ويضاهي زراعي. مثالها الفلية مدينة اعصمه در البيل وتسهيل للمعة وتسكرن الاصصاف والحلح على السن. ويستخرج منها مادة قلوية تدعى كلثمين شائعة الاستعمال الطبي || اوراقها قرصية الالتشاب سنائية التصل المستطيل. ازهارها كبيرة القدة مسطوية الانبوب مدالية البتلات المتسوية. ثمارها كسابر حقة الشكل تظهر مع الارواق بعد ذبول الزهر واكبات ذوبه. الثمر انواعه ما يتبع.

١٤٤٨٦ - سَوْتِيَّان اَبْيَشي

Colchicum candidum (S). *Colchique blanc* (F). نبات سبروتي مهده بهال الشرق الاوسط. ديفسته برمية الشكل متوسطة الحجم. اوراقه شبيقة مسطوية مفاضة. ازهاره صغيرة القدة، بيضاء اللون، طويلة المآبر الصفر. ازهاره يستمر من آب ال ايلول.

١٤٤٨٧ - سَوْتِيَّان اصْفَر

Colchicum luteum (S). *Colchique jaune* (F). نبات سبروتي مهده الصمم والافلاك. ديفسته صغيرة الحجم اجاصية الشكل. اوراقه شبيقة مسطوية، نصلها محدد المسطحة الزاوية المخاض. ازهاره صفراء اللون، بتلاتها بيضيه الشكل خلية البشرة الداخلية || ازهاره يستمر من نيسان ال ايار.

١٤٤٨٨ - سَوْتِيَّان الجبيل، قَرْجِ الارض

Colchicum montanum (S). *Colchique de montagne* (F). نوع من السورتيان مهده المناطق الجبلية ذات الاربية البردية. ديفسته صغيرة القدة قطرها نحو ٢ سم. اوراقه تطلو من ٨ ال ١٥ سم. وتعرض من ٧ ال ١٢ سم. ازهاره صغيرة القدة قطرها نحو ٥ سم. طولها يراوح من ٦ ال ١٢ سم. || وهو السورتيان الليلي المشهور ديفسته تدعى خيرة الصلار وبزاز القفة ولينة برمية.

١٤٤٨٩ - سَوْتِيَّان اخضر، * عَمَل، قَاتل

Colchicum autumnale (S). *Colchique d'automne*, *Veilleuse*, *Tue-chien*, *Safron des prés*, *S. lézard* (F). نوع من السورتيان الباطل. ديفسته بيضيه الشكل

١٤٤٩٠ - سَوْتِيَّان الشرق

Colchicum byzantinum (S). *Colchique d'Orient*, *C. à feuilles de varaire* (F). نبات سبروتي مهده الشرق. خروبوه زراعية مدينة. ديفسته كبيرة القدة، كروية الشكل، مغلطية القامة. اوراقه تطلو من ٢٢ ال ٢٥ سم. وتعرض من ٧ ال ١٠ سم. نصلها خطاط المسطحة كمثل الخربوق. ازهاره كبيرة القدة مسطوية الانبوب الابيض، خلية البتلات الوردية اللون || ازهاره يستمر طوال الشتاء.

١٤٤٩١ - سَوْتِيَّان الصمغ

Colchicum haumknechtii (S). *Colchique d'Hauknecht* (F). مهده بهال الصمغ. يرغب في الاماكن الصخرية. ديفسته شبه يرضية قطرها نحو ٦ سم. يطلوها حتى يبلغ ٧ سم. اوراقه شبيقة التصل الخند المسطحة. ازهاره خلية البشرة، صفراء اللون، وردية الفروق، مسطوية الانبوب || ازهاره يدمر طوال شهر تشرين الاول.

١٤٤٩٢ - سَوْتِيَّان بَرَكِينُون

Colchicum parkinsonii (S). *Colchique de Parkinson* (F). نبات سبروتي مهده غابات الشرق الادنى. ديفسته متوسطة الحجم. اوراقه اطيحية مسطوية، نصلها متراوح اخضر فالحش التربة. ازهاره متوسطة القدة، انبوبا ابيض اللون، بتلاتها ضلعة ومزجة بالابيض والاربعاني، مآبرها زرق || ازهاره يستمر من آب ال ايلول.

١٤٤٩٣ - سَوْتِيَّان دَكِّي

Colchicum decaleni (S). *Colchique de Decalene* (F). مهده الشرق الاوسط. يزرع للزوين. يستمر من النباتات الرقية. ديفسته متوسطة القدة قطرها نحو ٤ سم. اوراقه الارلى سنائية التصل ثم ثلثها اوراق شبيقة، ذلقة الزام الاخضر. ازهاره صغيرة القدة، وردية اللون، خلية البتلات || ازهاره يستمر من تشرين ال كانون الثاني.

١٤٤٩٤ - سَوْتِيَّان حَرَّيشِ القَرْجِ

Colchicum hircanicum (S). *Colchique à larges feuilles* (F). نبات سبروتي مهده الشرق الادنى. ديفسته متوسطة الحجم. اوراقه كبيرة قارضة تطلو من ١٥ ال ٢٥ سم. وتعرض من ٥ ال ٩ سم. ازهاره مسطوية الانبوب، بتلاتها مدبية الزام الاخضر، خلية البشرة، لونها ال اليلكي يطلو مروج اربعاني، مآبرها صفر || ازهاره يستمر من آب ال ايلول.

١٤٤٩٥ - سَوْتِيَّان فَاحِي *

Colchicum speciosum (S). *Colchique superbe* (F). مهده الشرق الاوسط. يزرع للزوين. ديفسته كبيرة القدة، قطرها نحو ٦ سم. اوراقه تطلو من ٢٠ ال



سورتيان الحريف



سورتيان فاحي

١٤٥٠٢ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus candidus (S). *Schizanthus blanc* (F).
 عشية حولية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اورانها ورشية
 قليلة الالبيد واللتنين. ازهارها كبيرة القند مستطيلة
 الانبوب، مفرصة الصفحة السفلى، لونها الالبياض
 الماجي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٣ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus grahmi (S). *Schizanthus de Graham* (F).
 عشية حولية او حولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها
 مستقلة القنوع. زلفها مبشر التجميع. اورانها ورشية
 مهدبة. ازهارها كبيرة القند، وردية اللون، صفراء
 التبييض، يرتقلا الزواكش || ازهارها يستمر من
 حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٤ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus pinnetus (S). *Schizanthus penné* (F).
 عشية حولية او حولة تملو من ٢٥ الى ٦٠ سم. ساقها
 قنوع، فرونها كثيفة التجميع زبداء اللون. اورانها
 ورشية مهدبة. ازهارها كبيرة القند بنفسجية اللون صفراء
 التبييض والمروق || ازهارها يستمر من حزيران الى
 ايلول.

١٤٥٠٥ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus gracilis (S). *Schizanthus grêle* (F).
 عشية حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اورانها زبداء
 اللون. ازهارها صغيرة القند ليلكية اللون يملوها تبييض
 بنفسجي حناره اصفر || ازهارها صبي.

١٤٥٠٦ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Charançon (F). *Weevil* (E).
 كلفة شاملة تطلق على معظم الحشرات التي تقتب الى
 فصيلة السويات. ج سون || هي يعملها خنافس
 صغيرة القند تقرب الحبوب وتوقع بها اشد الاذى.

١٤٥٠٧ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Calandra oryzae (S). *Charançon du riz* (F). *Rice weevil* (E).
Reiskäfer (D).
 حشرة من السويات طويلا من ٢ الى ٤ سم. جسمها
 مستطيل الشكل. لونها الالبياض المخلطة تحمل على غنمها
 اربع بقع حر || تركب شلب الارز وتقرضه قبل
 قشره.

١٤٥٠٨ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Peritelus sphaeroides (S). *Périzèle gris* (F).
Peritelus griseus (E). *Grauer Rüsselkäfer* (D).
 حشرة من السويات طويلا يراوح من ٥ الى ٧ سم. لونها
 حنلي اللون يملو زغبة ليرة وولاج اسف || تركب
 برام الانجرار والشجيرات المختلفة الاجناس والانواع بما
 فيها التفاح والبقون والكزبرة والتبغ تقرب اطرافها او تقضيها
 وتوقع بها اشد الاذى || يرتقلا تمش في التربة على المواد
 المنسوبة للمنسوبة.

١٤٥٠٩ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Hylobius abietis (S). *Souk le cèdre* (F).
Charançon du sapin, *Hylobius du pin* (F). *Fir-tree*
weevil, *Pine weevil* (E). *Grosser branner Rüssel-*
käfer (D).
 حشرة من السويات. طويلا نحو ١٠ سم. لونها الالبياض
 الكستنية يملو تبييض مفسف الزواكش اصفر اللون.
 تركب الاقان واليناق الحولية تفضي عليها. تمرى

٣٠ سم. وتقرض من ٧ الى ١٠، ازهارها كبيرة حولية،
 لونها الالبياض المخلط بالاصفر || ازهارها يستمر نحو ٧ أسابيع
 يتعفن في اواسط ايلول.

١٤٤٩٦ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Colchicum amabile (S). *Colchique gracieux* (F).
 نبات جانح مهدب الشرق. ديوسته صغيرة القند،
 اورانها خلية للتصل بالباح الخضر. ازهارها نخلة،
 مستطيلة الانبوب، خفيفة القنوع، اهليلية البتلات.
 يتلها زبداء البشرة الناعمة يملوها تضطبط وتزعج ودي
 واربراني || ازهارها يستمر طويلا شهر ايلول.

١٤٤٩٧ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Colchicum variegatum (S). *Colchique panaché* (F).
 نبات مروج مهدب. ديوسته
 متوسطة القند. اورانها متصبغة لطيف من ٢٠ الى ٣٥ سم.
 وتقرض من ٢٥ الى ٣٥ سم. ازهارها مستطيلة الانبوب
 الالبياض اللون، يتلها خلية البشرة، وردية اللون،
 يملوها موج اسر || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٨ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Colchicaceae, *Melanthaceae*, *Melanthaceae* (S). *Colchicaceae*, *Melanthaceae* (F).
Colchicaceae, *Melanthaceae* (E).
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقة تشل السونجان والمربوق
 وغيرها.

١٤٤٩٩ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Glycyrrhiza, *Liquiritia* (S). *Régisse* (F). *Liquorice plant* (E). *Süßholz* (D).
Regolizia (I).
 جنس نباتات مخشوشة مصرية من فصيلة القرنيات الفرشية.
 انلوه مهدبة يملوها زراحي صناعي. تتميز بامتطالة
 جلوريا الجلمودية. اورانها متصافية مركبة وزرية.
 وريقاتها يمينية التصل، عابقة الخضر. ازهارها
 سبلي التجميع، ابي الالبياض. ازهارها صغيرة القند
 لونها يخلط مع الفروع، فيها الالبياض والازرق والبنفسجي.
 ثمارها قرين صغيرة مبطلة. زروها مستديرة مفلطحة.
 احرف واشهر انلوه السون الفزني.

١٤٥٠٠ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Glycyrrhiza glabra, *Liquiritia officinalis* (S). *Régisse*
officinalis (F).
 جنبة صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. جلوريا جلومودية
 مدادة اسطوانية الشكل، جرادتها سرء اللون، لها اصفر،
 سكري القلم. مادته القنعة تسمى «رهبوس» وهو
 سهل خفيف يناسب المرقش والشرع والحلابل. يتبع
 الصدر ويقي الكبد. مسحوه شائع الاستعمال الطبي
 ويصنع منه شراب حرق السون المستحب الناتج.

١٤٥٠١ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus (S). *Schizanthus* (F).
 جنس نباتات عشبية حولية او حولة من فصيلة الخانزريات
 انلوه ٨ سمها زربية. اورانها متصافية مركبة ورشية.
 ازهارها سني التجميع، تاجي الالبياض. ازهارها
 حولية الشكل، مفرصة، زغبة الالوان الشلة || احرف
 انلوه واشهرها ما يلي.



سوس غزني



سوس ابيش



سوسة الارز



سوسة البرام



سوسة القنوب

جميع أنواع التوتوب والصنوبر || يرقاتها تعيش على الجملوح الملقوية اليابسة .

١٤٥١٠ - سوسة الجزر *

Liperus coronatus, *Molytas coronatus* (S). Charançon de la carotte (F). Carrot weevil (E).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. ثوبها إلى السواد اللامع || يرقها صغيرة القدر سماء اللون، سوداء الرأس. تركب بطور الجزر فتقرضها وتكثفها .

١٤٥١١ - سوسة الخنطة *

Calandra granaria (S). Charançon du blé (F). Granary weevil (E). Kornkäfer (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٣ إلى ٤ سم. جسمها مستطيل الشكل . ثوبها إلى السمرة الخنطية . تقرض البر وتكثله وقد تصيب السلت والشعير والذرة . يكثر ويوجد في الأهرار والمخازن .

١٤٥١٢ - سوسة الزيتون *

Otiorynchus meridionalis (S). Charançon de l'olivier (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوبها إلى السواد القمعي يميلو حلب مبهر وأصفر . ارتبطها حر تركب أوراق الزيتون فتقرض ساقه تصل || يرقها تعيش في التربة على جملوح النباتات البرية .

١٤٥١٣ - سوسة الصليبيات *

Ceuthorrhynchus assimilis (S). *Ceuthorrhynchus des crucifères*, Charançon de la rave (F). Turnip seed weevil (E). Kohlschotenrüssler (D).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٣ سم. جسمها يفي الشكل ، حطلي اللون . تركب زهور الصليبيات اغصانها الفت والتسليم والخرول والمولفون .

١٤٥١٤ - سوسة القليل *

Lixus algeris (S).

Charançon de la fève (F). حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٣ إلى ٢٢ سم. لها اسنود لاصع يميلو مزاج حطلي || تركب مع ريقها الاوراق والازهار والحبوب .

١٤٥١٥ - سوسة القررة *

Amelorrhynchus melanarius (S). *Ceuthorrhynchus du cresson* (F).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٥ سم. ثوبها إلى الحطلي الباقع يميلو تجزيع احطل اللون مستطيل الخطوط ومنقرضها || تركب اوراق القررة وتمتص سبكها على الزهر يلفظ من ريقات تلهم الكرميات والبروزور .

١٤٥١٦ - سوسة الكافور *

Otiorynchus ligustici (S). Charançon de la livèche (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. لوبها افيفش اللون ، اسفح المزاج || تركب الكافور وبعض النباتات الاخرى كالكرمة والشمندر والقنصة حيث تقضم البراعم والاوراق || يرقها تعيش في التربة على جملوح النباتات .

١٤٥١٧ - سوسة الخندقة *

Otiorynchus sulcatus (S). *Charançon sillonné* (F). Vine weevil (E). Dickmaulrüssler, Gefurchter (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. ثوبها إلى السواد اللامع يميلو مزاج حطلي . زياتها زياء

الافواصل، زفها ذهبي اللون . تركب تخلف قنابات الحقلية والكرية حيث تعيش على البراعم . ريقها فتكث بالجملوح وبارقاس النباتات الزينة .

١٤٥١٨ - سوسل *

Schizandra (S). *Schizandre* (F). جنس نباتات جنية عارضة من فصيلة السوليات . انواعه ١٢ منها البرية والزرينية . اوراقها عابلة متعاقبة مسقة ، ستانية . ازهارها ابلية او محورية الانكاز || اشهر انواعه الزرينية ما يلي .

١٤٥١٩ - سوسل البحر *

Schizandra rubriflora (S).

Schizandre rouge (F). جنية مبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٤ امتار . اوراقها احليجية الشكل تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عناقية مستطيلة ، متعاقبة ، لونها إلى الحمرة البالية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٠ - سوسل الصين *

Schizandra chinensis (S).

Schizandra de Chine (F). جنية مبروتية عارضة تطول من ٤ إلى ٦ امتار . اوراقها يضية ذلقة ، نصلها سنن الحلاقة تطول نحو ٨ سم. ازهارها متعاقبة التجميع ، محورية الانكاز ، عديمة البتلات ، من ٩ إلى ١٢ ، عطرية البرف ، لونها إلى الحمرة . ثمارها عنقية ، قريضة اللون ، حامضة الطعم ، مأكولة || ازهارها يستمر من ايار إلى سزيان .

١٤٥٢١ - سوسل كبير الزهر *

Schizandra grandiflora (S). *Schizandra à grandes fleurs* (F).

جنية جادحة، عارضة، طولة من ٤ إلى ٦ امتار . اوراقها يضية الشكل ، عادية التسنين . ازهارها كبيرة القد ، متعاقبة التجميع ، لونها إلى الحمرة القويضة . ازهارها يستمر من نيسان إلى ايار .

١٤٥٢٢ - سوسل مرمرى *

Schizandra marmorata (S).

Schizandra marbré (F). جنية عارضة طولة من ٤ إلى ٦ امتار . ريقها اسطوانية ، حراء اللون . اوراقها يضية ، نصلها عايق الخفسار . احتلقها جوية . ازهارها صغيرة القد مبرية ، متعاقبة || ازهارها يدم طوال شهر ايلول .

١٤٥٢٣ - سوسل هنري *

Schizandra henryi (S).

Schizandre de Henry (F). جنية مبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٤ امتار . ريقها ثنائية الانقسام الخنقة . اوراقها احليجية ، ذلقة الزام الاشعر . نصلها جميل الخضار الزماني ، قليل التسنين . ازهارها ابلية ، فردية ، كبيرة القد ، عديمة البتلات ، يبيضاء اللون ، عطرية الرائحة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٤ - سوسليات *

Schizandraceae (S).

Schizandraces (F). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القنالات . اجناسها وانواعها المعروفة لا يتجاوز عددها ١٧ . جميعها نباتات جنية عارضة . بعضها بري والبعض الآخر قريضي . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، مسقة ، ستانية اتصال الجنبية الخفسار . ازهارها محورية او ابلية الانكاز ، الانثوي سنيل التجميع ، اما الذكرى قريضي . ازهارها صغيرة



سوسة الجزر سوسة البحر



سوسة الزيتون سوسة الصين



سوسة القليل سوسة القررة



سوسة الخندقة سوسة الكافور



سوسل

اوراقه شيقة للتصل المحين . ازهاره ثلاثية او رباعية
التجميع طول نحو ٦ سم. قناتها متعاقبة لونها الى الصفار
البايت . بتلاتها الى الصفار الباقى يطوى لتريق بتسجي
اللون ، حطلي الموضع || ازهاره يستمر من نيسان
الى ايار .

١٤٥٣١ - سوسن أحمر Iris fulva (S).

١٤٥٣١ - سوسن أحمر Iris brun-roux (F).
تبات جلمودي سبروتي رطب في الاماكن الرطبة .
ساقه نحيلة طول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها طول
نحو ١٠٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ . ازهاره متوسطة القد ،
حامدة للعروق والرق . بتلاتها الخارجية والداخلية حنطية
اللون يطويها تشيح بتسجي واخضر ، والداخلية منها
ثنائية التفصيص || ازهاره يستمر من حزيران الى
تموز .

١٤٥٣٢ - سوسن الجوزاء Iris unguicularis (S).

١٤٥٣٢ - سوسن الجوزاء Iris à ongllet (F).
تبات جلمودي حاد الساق ، وسيد الزهرة ، رطب
في المارص الجنوبية والاماكن الناطقة . اوراقه حنطية
الشكل ، لتصلها جامد اللنج ، اخضر الصلحة العليا ،
بحري السفلى . زهره مستطيلة الانبوب ، كبيرة القد ،
فواحة للعرق ، بتلاتها الخارجية والداخلية الى البياض
الزاهي . حطايها ابيض || ازهاره يستمر من كانون
الثاني الى نيسان .

١٤٥٣٣ - سوسن المتألق Iris pseudacorus (S).

١٤٥٣٣ - سوسن المتألق Iris pseudacorus (S), Iris faux-acore, I. des marais,
Flembe d'eau (F), Yellow Iris, Yellow water flag (E),
Gelber schwertel, Wassertschwertlilie (D), Iride
gialla, Spadella d'acqua (I).

تبات جلمودي سبروتي ملول يعيش في المواقف الرطبة
وحل مجاري الماء وضيقات الانهار . يطول من ٥٠ الى
٢٠٠ سم. اوراقه حنطية الشكل ، بحرية للتصل .
ازهاره كبيرة القد حافظة العرق حامدة المرق . بتلاتها
الخارجية والداخلية الى الصفار الزاهي يطوى لتريق حطلي.
ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٣٤ - سوسن النمر Iris tigré (F).

١٤٥٣٤ - سوسن النمر Iris tigré (F).
تبات قزحي من فصيلة السوسنيات مشهور باسم حومة ،
اطبا .

١٤٥٣٥ - سوسن باهت Iris pallida (S).

١٤٥٣٥ - سوسن باهت Iris palé (F).
تبات جلمودي سبروتي يطول من ٦٥ الى ١٠٠ سم.
ساقه نحيلة منتظمة ، شرانها ابيض اللون . قناتها
قبل التلاصق الزهر . ازهاره متوسطة القد . حرقها ليموني
الرائحة . بتلاتها الخارجية والداخلية زرقاء اللون الباهت .
حرقها اصفر الانتساب ، ابيض الطرف || ازهاره
يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٦ - سوسن بحري Iris halophila (S).

١٤٥٣٦ - سوسن بحري Iris maritima (F).
تبات جلمودي سبروتي رطب في المواقف الساحلية البحرية .
يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه زباء للتصل ، بحرية
اللون . ازهاره متوسطة القد حامدة المرق . بتلاتها الخارجية
بيضاء اللون ، برتقالية المتق ؛ بتلاتها الداخلية حمرة
بالاصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

ملونة ، الذكورية تحمل اربع بتلات والاثورية ثمانية ||
اشهر اجناسها السوسل الذي كان يعتبر في التصنيف
أسابق من فصيلة المفلوات .

١٤٥٣٥ - سوسن Iris (S), Iris (F), Iris (E).

١٤٥٣٥ - سوسن Iris (S), Iris (F), Iris (E).
جلس لباتات برية وزراعية من فصيلة السوسنيات اتولاه
زعد ١٠٠ سمها جلمودي وبهها دوصي . حطايها
غليظة . اوراقها متعاقبة ، متساوية السطح ، فصلها
مستطيل الصلحة متصل او حصي الشكل . ازهارها
كبيرة القد ثلاثية الانقسام متميز باجزائها الخارجية
المنخفضة الاطراف بينما الداخلية منتصبة وباتلاتها
القضيرة التي تعلوها سات نامية ملونة || اشهر انولاه
الزراعية ما يتبع .

١٤٥٣٦ - سوسن أبيض Iris florentina (S).

١٤٥٣٦ - سوسن أبيض Iris florentina (S).
١٤٥٣٦ - سوسن أبيض Iris de Florence (F), Florentine Iris, Orris-root
plant (E), Florentinische Iris, Veilchenschw-
wertel (D), Iride fiorentina, Giglio bianco (I).

تبات جلمودي سبروتي مهد الشرق العربي . يطول من
٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره كبيرة القد ، فواحة العرق
الطري . بتلاتها الخارجية بيضاء اللون ، زرق الرصاص ،
حرقها اصفر . بتلاتها الداخلية حافية البياض . حطايها
مستطيلة وحيدة اللون الكبريتي || ازهاره يستمر
من نيسان الى حزيران . يستخرج من جذاميره مواد طبية
نافعة ويستعمل من ازهاره مواد عطرية تدخل في صناعة
الطوب .

١٤٥٣٧ - سوسن الجرد Iris imberbis (S).

١٤٥٣٧ - سوسن الجرد Iris imberbis (S).
تبات دوصي جانح . مهد افريقية القناتية . ساقه طول
من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه مستطيلة شبه اسطوانية .
ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، بتلاتها الخارجية
مستوية اما الداخلية فقضيرة ومفلطية || ازهاره يستمر
من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٨ - سوسن إسباني Iris xiphium (S).

١٤٥٣٨ - سوسن إسباني Iris d'Espagne (F).
تبات دوصي جانح . ساقه طول من ٣٠ الى ٦٠ سم.
اوراقه مستطيلة ، اسطوانية ، غندة اللون . ازهاره
كبيرة القد مستوية العرق . بتلاتها الخارجية الى الصفار
الزاهي ، بتلاتها الداخلية بتسجي اللون الانحاص يطوى
لربوي || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٤٥٣٩ - سوسن أحمر Iris lurida (S).

١٤٥٣٩ - سوسن أحمر Iris brunnea (F).
تبات جلمودي سبروتي يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم.
ازهاره كبيرة القد ، حار قناتها يجمع قبل التلاصق
الزهر . بتلاتها الخارجية زرق القنطرة والرق الاول ،
صفير سائر المفضلة للمرة بالبفسجي . حرقها اصفر
الجسم . اسد الطرف . بتلاتها الداخلية صفير الانتساب ،
زرق الصلحة تعلوها رشفة جوية || ازهاره يستمر
من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٠ - سوسن أحمر Iris lutensana (S).

١٤٥٤٠ - سوسن أحمر Iris jaunâtre (F).
تبات جلمودي سبروتي يطول من ١٠ الى ٣٠ سم.



سوسن أبيض



سوسن اسباني



سوسن المتألق

١٤٥٤٣ - سَوَسَن رُوذْبَاخ Iris rosenbachiana (S).

Iris de Rosenbach (F).

نبات دقيقي ، عديم الساق ، رف . اوراقة قصيرة .
ازهاره قليلة البند . بتلاتها الخارجية زبدية الانتشاب ،
بنفسجية السفنة ، عابية الختار . بتلاتها الداخلية الى
البنفسجي الباق ، يملو تجزيع يرتقالي || ازهاره
يستر من شباط الى اذار .

١٤٥٤٤ - سَوَسَن سِنْدْجَار Iris sindjarana (S).

Iris du Sindjar (F).

نبات دقيقي جادح ، مهد جزيرة اين ماهر . ساقه
قصيرة تملو نحو ١٢ سم . اوراقة جملة الخشار الزاهي .
ازهاره كبيرة القند ، خافتة العرف . بتلاتها الخارجية
زرقة اللون ، صفراء المرق ، بتلاتها الداخلية اعليجية
للشكل منحنوية اللون || ازهاره يستر من اذار الى
نيسان .

١٤٥٤٥ - سَوَسَن سَوْرِي Iris lortetii (S).

Iris de Lortet (F).

نبات جلمودي سروتي مهد الجبال اللبنانية السورية .
يملو من ٢٠ الى ٤٥ سم . ازهاره متوسطة القند خافتة
العرف ، بتلاتها الخارجية الى الزرقه البهارية المنشة والمقره
بالخزوة . مرها ذهبي اللون . بتلاتها الداخلية وردية
يملوها تمرق بنفسي || ازهاره يدم طول شهر ايار .

١٤٥٤٦ - سَوَسَن سِيْبِرِيَّة Iris sibirica (S).

Iris de Sibérie (F).

نبات جلمودي سروتي رطب في المناطق الباردة . ساقه
اسطوانية جواء تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه انشامية
جواء اللون ثم تستقر عند اككال نوحا حل الاخضر
الباق . ازهاره صغيرة القند حيوية الرائحة . قناباتها دسوة ،
بتلاتها مستوية الشكل ، الخارجية منها يضاء البياض
ثقوبها زرقه زاهية ، والداخلية الى الزرقه البنفسجية .
ضروبها الزراعية عديدة ، فلهاها الوأنا || ازهاره
يستر من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٧ - سَوَسَن شَالِب Iris versicolor (S).

Iris versicolore (F).

نبات جلمودي سروتي مهد امريكا الشمالية . يملو
من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه زباء انتشل . ازهاره كبيرة
القند عادية العرف والمرق . بتلاتها الخارجية بضية الشكل
بنفسجية اللون عابية الوسط . بتلاتها الداخلية وردية
اربعولية او يضاء اللون || ازهاره يستر من ايار
الى حزيران .

١٤٥٤٨ - سَوَسَن شَبْكِي Iris reticulata (S).

Iris réticulé (F).

نبات دقيقي جادح . ضروبها التزيينية عديدة فلهاها
بالوأنا واسطالة انانيبها . سقاها اثرية او شديدة القصر .
اوراقها صفية الشكل ، تصليا يملو من ٢٠ الى
٣٠ سم . ازهارها كبيرة القند ، فواسة العرف . بتلاتها
الخارجية والداخلية متشابهة الحجم واللون يملوها نثيك
ايض السدة ، اصفر اللحام || ازهاره يستر من
شباط الى ايار .

١٤٥٤٩ - سَوَسَن شَوْشَان Iris sutsana (S).

Iris de Suse, l. doull, l. tigré, l. crapaud (F).

نبات جلمودي رف مهد بلاد فارس . يملو من ١٥
الى ٥٠ سم . ازهاره كبيرة القند عادية العرف . بتلاتها

١٤٥٣٧ - سَوَسَن بَقْلِي ، سَوَسَن دَوْقِي ،

Iris azyrinchiura (S).

نبات دقيقي جادح مهد حوض البحر المتوسط . ساقه
تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه خطية ، منبسة .
ازهاره صغيرة القند . اسديتها متفحة الاقلام ، لونها
الى الزرقه الليمكية بتلاتها الخارجية موشمة بالاصفر .
ازهاره يستر من نيسان الى ايار .

١٤٥٣٨ - سَوَسَن بِيْرْمَرْك Iris bismarkiana (S).

Iris de Bismarck (F).

نبات جلمودي سروتي مهد الشرق الاوسط . يملو
من ٣٠ الى ٤٥ سم . ازهاره متوسطة القند عادية العرف ،
بتلاتها الخارجية الى الصفرة المنشة والمقره بالخروة
يتوسطها بقية كسنية . مرها اصفر اللون . بتلاتها
الداخلية الى البياض الزهري يملوها تمرق ازرق .
ازهاره يدم طول شهر ايار .

١٤٥٣٩ - سَوَسَن تَوْرُس Iris teurt (S).

Iris du Taurus (F).

نبات دقيقي جادح . مهد جبال توريس . اوراقه
صغيرة القند ، ضيقة النصل ، مفتحة الخشار . ازهاره
متوسطة الحجم . بتلاتها اعليجية الشكل ملقية . صفحاتها
اللبا لليمكية اللون يملوها تجزيع ابيض ، صفحاتها
السفل الى الخشار الباهت || ازهاره يدم طول
شهر نيسان .

١٤٥٤٠ - سَوَسَن جِرْمَانِي * ، كَف الصَّبَاغ Iris germanica (S).

Iris d'Allemagne, Flambe, Flamme, Iris des jardins, Iris arnes de France, Glaiet bleu (F). German Iris, Blue flower de Luca (S). Deutsche lisch, Blaue Iris, Schwertlilien (D). Iris germanica, Giglio celeste azzuro (I).

نبات جلمودي سروتي لاقياسي الشكل والانتظام يملو
من ٦٠ الى ١٠٠ سم . شرمان ازهاره قني اللون بنفسي
الرحاس . ازهاره كبيرة القند ، حطرية اللون . بتلاتها
الخارجية بنفسجية ، مرها اصفر . بتلاتها الداخلية
الى الزرقه الزاهية ، سلماتها مستطيلة ملونة || ازهاره يدم
طول شهر آب . جذامير ، طيبة . ازهاره صناعية
كالسوسن الابيض .

١٤٥٤١ - سَوَسَن عَشَاش Iris humilis (S).

Iris humile (F).

نبات جلمودي سروتي عديم الساق . وسيد الزمرة .
اوراقه صلبية الشكل ، ضيقة ، مستطيلة ، جامدة
النصل الباهت الخشار . زهره لليمكية اللون الزاهي .
بتلاتها الداخلية لسالية الشكل ، اما الخارجية فاعليجية .
ازهاره يستر من نيسان الى ايار .

١٤٥٤٢ - سَوَسَن عَمَّانِي العَرَف Iris sambucina (S).

Iris à odeur de sureau (F).

نبات جلمودي سروتي يملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .
ختار قناباته يبيع قبل ابتداء الزهر . ازهاره كبيرة القند
خاتية العرف القلوع ، بتلاتها الخارجية تملو نحو ٦ سم .
صفحاتها زرقاء اللون يملوها تجزيع ابيض واربعولي .
مرها اصفر . بتلاتها الداخلية جمدة السفنة ، صفراء
اللون ، يملوها تجزيع بنفسي ويملو اسفح || ازهاره
يستر من ايار الى حزيران .



سَوَسَن جِرْمَانِي



سَوَسَن سِيْبِرِي



سَوَسَن شَبْكِي

الآزيرية حديثة. يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه زياة التصل البحري اللون. أزهاره متوسطة القد، متعددة الألوان، بتلاتها ملوكة الشكل، حطية الحار، حادة المرق || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٤٥٧ - سَوَسَن هَتْنَن * قُصُوص

Iris foetidissima (S). *Iris foetida*, l. gigot, l. à l'ail, Xyrin plant (F). Gladdon, Gladwin, Stinkingiris, Roost-bent plant (E). Korallenschwertel, Stinkende Iris (D). *Iris foetida*, *Flamma foetida*, *Ricottaria* (I). نبات جلمودي سبروتي يربط في المواقع الظليلة. يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مفصلة. أوراقه متصلة الشكل، نصلها بأحد الخضار، متن الرائحة عند الفرك. أزهاره متوسطة القد حادة المرق. بتلاتها الخارجية خيفة الصفعة، زرقاء اللون. بتلاتها الداخلية إلى الصفار الموشح بالبنفسجي || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

١٤٥٨ - سَوَسَن مُهْدَب سَوَسَن

Iris japonica (S). *Iris frangé* (F). نبات جلمودي سبروتي مهد الصين واليابان. يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه خيفة الخضار الزاهي اللامع. أزهاره صغيرة القد، حادة الطرف والمرق. بتلاتها الخارجية مهدبة الحار، ليلكية اللون، موشة بالأبيض والأصفر. بتلاتها الداخلية موية اللون اليلكي الزاهي. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٤٥٩ - سَوَسَن مَوْشَح

Iris variegata (S). *Iris panaché* (F). نبات جلمودي سبروتي حديد القلوب الزراعية. يعلو من ٣٠ إلى ٦٥ سم. أزهاره حديثة متصلة القد، قناباتها خضراء اللون. بتلاتها الخارجية إلى الصفار المرق بالبنفسجي، مرقها حطية. بتلاتها الداخلية إلى الصفار. أزهاره يذوم طولك شهر أيار.

١٤٦٠ - سَوَسَن لَحْيَلِي الْوَرَقِ

Iris graminea (S). *Iris à feuilles de graminé*, l. *avoine* (F). نبات جلمودي سبروتي يعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه صفيحة الشكل، جامدة التصل، بحرية اللون، طولها من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره متوسطة القد. بتلاتها الخارجية والداخلية مستديرة الشكل، كبيرة الظلير لونها إلى البنفسجي الموشح بالأصفر || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٤٦١ - سَوَسِنَات

Iridaceae, *Iridées* (S). *Iridaceae*, *Iridées* (E). فصيلة نباتية من وصيدات الفللة. أجناسها وأزواؤها كثيرة الحد. أشهرها السوسن والزعفران والدالوث الخ.

١٤٦٢ - سَوَسِي

هو الترحمان الحزني، الطيب.

١٤٦٣ - سَوَسِنَات

Curculionidae (S). *Curculionidae*, *Rhynchophora*, *Charanopoda* (F). *Weevils* (E). *Rüsselkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة. عراوتها وأجناسها وأزواؤها الممودة حتى الآن زهاء ٥٠٠٠٠ جميعها صغيرة القد. رؤوسها عظمية الشكل لتتبي يمتلك قاضم ثقب. قرونها الاستشارية صولبانية أو مرقية. فواصلها تراوح من ١٠ إلى ١٢. أرباعها خنسية التكوين، رباعية الظلير || مكناها صغير الحجم، كروي الشكل تمتصه الانثى فوديا في ثقب تملصا

الخارجية والداخلية ودية اللون ملصاة الرخاض يعلوها تجرير وتندب أسره، ويتوسط الخارجية منها بتسج خيفة فصية السواد || أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٤٥٥ - سَوَسَن شَبِيقُ الْوَرَقِ

Iris stenophylla (S). *Iris à feuilles étroites* (F). نبات ديفسي جاح. مهد الشرق الأوسط. ساقه أثرية. أوراقه خيفة التصل. أزهاره كبيرة القد بنفسجية أو زرقاء اللون يعلوها حطية شديدة البسة || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

١٤٥٦ - سَوَسَن طَنْجَمَة

Iris tingitana (S). *Iris de Tanger* (F). نبات ديفسي جاح. مهد افريقية الشالية. ساقه رفيعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه صفيحة الشكل والتصل. أزهاره كبيرة القد، بتلاتها متساوية الحجم، بنفسجية اللون يعلوها في وسطها بقع صفر || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

١٤٥٧ - سَوَسَن عَكْرَبِي

Iris plantifolia (S). *Iris scorpion* (F). نبات ديفسي جاح. ضروبه الآزيرية حديثة، تتميزها يرتكز حل قد الشراخ ولين الزهرة || شاربعتها الزهرية تملو من ٨ إلى ١٥ سم. أزهارها كبيرة القد، فواصة الطرف البطر، بتلاتها ليلكية اللون الزاهي اللامع. امتثالها إلى الصفرة. أوراقها صفيحة الشكل، جامدة التسج، طولها نحو ٣٠ سم. || أزهاره يستمر من كانون الاوّل إلى آذار.

١٤٥٨ - سَوَسَن قَارِي

Iris persica (S). *Iris de Persa* (F). نبات ديفسي جاح. مهد بلاد فارس. ساقه أثرية. أوراقه صغيرة وقصيرة. أزهاره كبيرة القد، فواصة الطرف البنفسجي. البرويها طولها نحو ٦ سم. بتلاتها الخارجية ليلكية اللون، حطية الحار الأزرق. بتلاتها الداخلية صغيرة القد مستديرة اللون || أزهاره يذوم طولك شهر آذار.

١٤٥٩ - سَوَسَن لَقْم

Iris pumila (S). *Iris pygmaea* (F). نبات جلمودي سبروتي حديد القلوب الزراعية. يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه خيفة التصل البحري اللون. زهره وسيدة طولها نحو ٢٥ سم. قناباتها غالبا بنفسجية بتلاتها ملوكة تختلف مع الضروب. مرقها أزرق الجسم أصفر الطرف || أزهاره يستمر من آذار إلى أيار.

١٤٥٥ - سَوَسَن مُهْدَب

Iris aurea (S). *Iris doré* (F). نبات جلمودي سبروتي يربط في المناطق الجبلية. يعلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه زياة التصل لونها إلى الخضار الباحت. أزهاره كبيرة القد، شرابها أخضر، بتلاتها الخارجية يضيئة الشكل، خيفة الحار، ملحية اللون. بتلاتها الداخلية سائبة الصفعة، زاهية الصفار الاقل || أزهاره يذوم طولك شهر حزيران.

١٤٥٦ - سَوَسَن مَلُوكِي

Iris spatulata (S). *Iris en spatule* (F). نبات جلمودي سبروتي ميلد في المروج الرطبة ضروبه



سوسن منن

Pied du champignon (F). **سَوَلَع - سَوَلَع**

Tigel of mushrooms (E).
النسقة من الفطر والطراوت ما كان أسفل التكمة وقد يقوم مقام الساق في الثبات ويسرف أيضاً بالزروج.

Foire des bestiaux (F). **سَوَلَع المَرْكَبِي**
Cattle-fair (E).

سوق يجتمع فيها الناس في أيام عطية ليوم طرارة للماشية.

Aloté (S). **سَوَلَع**

Aloté (F), Aloas (E), Alon (D), Aloe (I).
جنس نباتات لحية ممررة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه عديدة بعضها عديم الساق. أوراقها لحية، مستطيلة، التصلب، غصية التجميع. أنوارها عنقودية يصهلها شراخ بسيط أو مشعب. يستخرج من أوراق بعض أنواعه مصارة طبية مرة الطعم، مذهبها الحلاوة تدعى سولن (Aloine) مشهورة الاستهلاك الطبي. أعرف وأشهر أنواعه ما يلي

Aloté africain (S). **سَوَلَع الإفريقي**

Aloté africain (F).
شجرة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها عديمة الأوراق. أوراقها طويل من ٤٥ إلى ٦٠ سم. تصلها بأمت الخضر، شاذك الحافة والمقصة. أنوارها عنقودية لينة طويل نحو ٣٠ سم. لها إلى الصفرة الزاهية. أنوارها يستمر من آذار إلى نيسان.

Aloté glauca (S). **سَوَلَع بحري البين**

Aloté glauca (F).
نبات عديم الساق. شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم. أنوارها عنقودية التجميع، وردية اللون، يطولها موج قريزي. أوراقها طويل نحو ٢٠ سم. تصلها بحري البين، ذلك الزماد الأخير، عديم الحشف، أسود اللثام القصير. أنوارها صبي.

Aloté reponaria (S). **سَوَلَع عريض الأوراق**

Aloté reponaria (F).
نبات عديم الساق. شراخه الزهري يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أنوارها حلقة التجميع كبيرة اللثة، جميلة الحشرة الزاهية. أوراقها مستطيلة، مسننة، تصلها بلعت الخضر يملو بحري البين، حلو طعم شاذك الحافة، مذهب الحلق لثام القدماء. أنوارها يستمر من أيار إلى حزيران.

Aloté arboreus (S). **سَوَلَع قرن الكيش**

Aloté arboreus (F).
شجرة تملو من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ سم. ساقها متسبة مشعبة القروص. أوراقها مستطيلة على الساق بدون انتظام. تصلها تحتين السنج، بحري الخضر، يملو من ٤٥ إلى ٦٠ سم. صفته محبة، حلو طعم اللثام على شكل قرن الكيش. أنوارها عنقودية لينة ليس إلى الحشرة المرابية. أنوارها يدم من كانون الأول إلى آذار.

Aloté brevifolia (S). **سَوَلَع قصير الأوراق**

Aloté brevifolia (F).
نبات عديم الساق يربغ في المراتق اللثة. أوراقها طويل من ٣٠ إلى ٤٠ سم. تصلها إلى الخضر الأزرق، أسيف الحافة، مذهب المقصة، مستطيل اللثام، شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم. أنوارها حمر طويل نحو ٤ سم. أنوارها صبي.



سولن



سولن بحري البين

لأحسانه. يرقطها حديد الأربل، مقصة، مدية الطرف. تفيض على غطفت الأعضاء والمواد النباتية والعضوية.

Flagelliforme (F). **سَوَلَعِي**

Flagelliform (E).

نمت تعريفي يطلق على ما كان كالسوط شكله ولثاته

Flagella (S). **سَوَلَعِيَات**

Flagellés (F), Flagella (E).

شعبة حيوانات دنيا وسيدات الخلية من صف النقبليات.

Enflagella (S). **سَوَلَعِيَات أصليّة**

Enflagellés (F), Enflagella (E).

رتبة حيوانات دنيا من السوليات.

Rhizoflagella (S). **سَوَلَعِيَات جذريّة**

Rhizoflagellés (F), Rhizoflagella (E).

رتبة حيوانات مجهرية من السوليات.

Cystoflagella (S). **سَوَلَعِيَات مكنيّة**

Cystoflagellés (F), Cystoflagella (E).

رتبة حيوانات دنيا من السوليات.

Choanoflagella (S). **سَوَلَعِيَات مُنقوكة**

Choanoflagellés (F), Choanoflagella (E).

رتبة حيوانات مجهرية من السوليات.

14570 - **سَوَلَعِي** و **كريبوميريا**

Cryptomeria (S), Cryptoméris, Sugi (F).
سولي هو الاسم الياباني، شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من الطحسويات. مذهبها الياباني. ساقها ترتفع نحو ٧٠ م. قشرها حطبة اللون ممرار اللؤلؤ. شوكها أبيض. غصنها أحر جديري. اتحادها لثقة الأوتكاز. أوراقها غزيرة طول من ٦٢ إلى ٢٥ م. لها إلى الخضر الأزرق. أنوارها وسيدة الشق والمسكن. أكرابها كروية، قطرها براون من ١٠ إلى ٣٠ م. جرافتها صافية الشكل مقررة. زوربا محبة، مستطيلة، مرباية السنج. وهي من الإلهام السبرية المتوسطة النور. أنوارها المناطق المعتدلة. تربف في الأرتبة الصيفية الدور المتوسطة الرطوبة. اغصانها صناعية جيدة الصنف.

Marché (F). **سَوَلَعِي**

Market, Market-place (E).

هو المكان الذي تباع فيه الحيوانات والخاصيل والمارك، فتقول سوق الخيل وأتمم والخضر والزهر...

14571 - **سَوَلَعِي**

Halle, Marché des légumes (F), Market-hall (E).

سوق تباع فيها البقول والخضراوات والفواكه.

Laburnum (S), Aubour (F). **سَوَلَعِي**

جنس شجيرات ونباتات برية وزييلية من فصيلة الزنبقيات القراشية. أنواعه عديدة جميعها سبرية. أوراقها عابلة، مركبة، ثلاثية الورديات. أنوارها حمرية لرائقة، عنقودية التجميع، طويلة اللثام، متدللة. أشهر أنواعه الحمر الشائع المعروف بالانوس الكاذب، أصلي.

Solena (S).

* ١٤٥٨٩ - سولن

Solén (F). Solena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وصفيلة السولنيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في
جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمه اسطواني الشكل
مستطيل تلحفه صفة بالقرب مشطوفة المؤخر المنفرج .
يمش مشتماً حديدًا في الرمال المفورة بالماء || لحمه جيه
الصنف مرغوب فيه .

Solenidae (S).

* ١٤٥٩٠ - سولنيدات

Solénidae (F). Solénidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وأواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ||
اجسامها مستطيلة || أرجلها اسطوانية ، أصلها شبه
غدية الشكل ، ثنائية المصارع المتساوية || أرواف
اجسامها وأشهرها السولن .

Fagaceae (S).

* ١٤٥٩١ - فوغيكيات

Fagaceae (F). Fagaceae (E).

هي فصيلة السندليات من ذوات الفلقتين العديمات
الاعمال . تشمل السنديان وإزان والكسنة .

Eurygaster integriceps.

* ١٤٥٩٢ - سولكة

E. maurus (S). Souné, Sen (F). Suna pest (E).

Austische Getreidewanze (D).

وتسمى أيضاً بقصة الزرع- حشرة خاد من فصيلة
القاسميات. طولها يراوح من ٨ الى ١٢ م. جسمها
مفلطح الشكل مسطح . ظهرها مجهز بنرس صفيحة درقية
الشكل لها الى الصفار الازرق تلوح خطوط مستطيلة قليلة
الوضوح ويكتسب جليتان عند انتشابه || موطنها بلاد
الشرق الأدنى . تركب الحشرة والشعر وتقع بها اشد
الاذى لانها تمص اللعج تصنع الاسبال وتفسد البذيل .
تظهر الحشرة الكاملة في أواخر نيسان ثم تتزاوج بعد
ظهورها بامبور . كويها يدوم بضع ساعات . وبعد كويها
باربعة أيام تمتع الانثى مكها الصغير ، الكروي الشكل ،
الاذير اللون ، حل صفحات المصص العليا ، لطفاً
متساوية يراوح عددها من ١٢ الى ١٤ وكل لفحة
تحتوي من ١٢ الى ١٤ مكة تنفخ ، بعد متنها بنحو
١٠ أيام ، عن يرقات دقيقة تبلغ طولها الحشري بعد
انقضاء أربعة أسابيع تكون غطلا قد مرت باربعة
انسلخات || والوسيلة شارة في جميع ادوارها لا سيما
في الدور الحشري . تكالغ لما يستأكل اسد الحوشر
الغذاء تفرغ على الزرع فيفشي عليها بكاملها . وأما
بحرقها بعد جمعها ضمن احباب خاصة تستعمل لهذه الغاية .
ومن الطرق الناجمة استبدال انواع الحشرة البليدة بالوارع
باكورية تمكن الزرع من الاسبال والمهيج قبل ان تستكن
من الحشرة .

* ١٤٥٩٣ - سوند الفصية * ، لغيريل الفصية

Colaspidea atrum (S). Négril de la luzerne, Colaspe, Colaspide, Babotte noire (F). Luzarna grub (E). Colaspide atrum (D).

حشرة من التفريل من فصيلة النصاريات جسمها بيضي
اللون ، محب التهر . طولها يراوح من ٤ الى ٦ م.
قوفا الى السواد اللامع . تمتع مكها حل الفصة فيتم
من يرقات تلثم الارواق || تظهر في نيسان وتستر
الى ايلول . تكالغ باستمال الرزيتون .

Aloë officinal

* ١٤٥٨٧ - سولك غزني

يسوف بالالوة ، اهلينا .

Aloë striata (S).

* ١٤٥٨٣ - سولك مخطط

Aloë strié (F).

نبات عديم الساق شراخه الزهري يعلو من ٤ الى ٦٠
سم . ازهاره مظلمة التجميع ، حمراء اللون . اوراقه قليل
من ٤ الى ٦٠ سم . نصلها ثخين اللسج ، عديم الحشف ،
عسلط الصلصة . عسلطها شائعة لها الى الجزيرة .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

Aloë plicatilis (S).

* ١٤٥٨٤ - سولك مروحي

Aloë éventail (F).

جنية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
ثنائية التجميع ، مروحية الهيئة ، نصلها يعلو من
٢ الى ٤٠ سم . لونه الى الخضرة البحرية . حذارة مسن
١٠ سم . اسنانه نجيلية ، بيضاء اللون . ازهاره رزقالية ||
متوسطة اللقد ، طولها يراوح من ٤ الى ٥ سم . || ازهاره
يستمر من ايار الى حزيران .

* ١٤٥٨٥ - سولك مستن

Aloë grandidentata (S).

Aloë à grandes dents (F).

نبات عديم الساق . شراخه الزهري يعلو من ٣٠ الى
٤٠ سم . ازهاره مستطيلة الشكل رزقالية اللون || اوراقه
تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم وتعرض نحو ٧ نصلها قليل
التصديق يتخرج انخسار الازرق ، مسن الحلفة ،
شاكلة الانسان الحادة المتعاقبة || ازهاره يستمر من
حزيران الى تموز .

Aloë ciliaris (S).

* ١٤٥٨٦ - سولك مهدب

Aloë cilé (F).

جنية مرصعة نجيلية الساق المستطيلة التي تعلو نحو ١٠
اسنار . اوراقها شبيهة كقصل الذي يعلو من ١٠ الى
١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . حذارة مهدب الحلفة حسنة
ابيض اللون || ازهاره عتيقبة التجميع لها الى الحيرة
الزاهية اللامعة || ازهاره يستمر من آذار الى حزيران .

Terakia (S).

* ١٤٥٨٧ - سولم

Térakie (F). Terakia (E).

جنس طير من طوالب الساق وصفيلة الزرقائيات . انواعه
المعروفة ثلاثة جميعها من الطيور القاطنات مشاعها البلاد
الحارة الاسيوية والافريقية ، مصيفها البلاد المعتدلة الحرارة
من آسيا الشمالية الى اوروبا || اروف انواعه وأشهرها
السولة الشهاب .

* ١٤٥٨٨ - سولمة شهباء

Terakia cinerea (S). Térakie grise (F).

طائر من السولم قريب الشبه من البريقفة السلطانية . جسمه
متوسط اللقد ، صغير الرأس ، مستطيل للطاق العنق
التقليل الانتعاش . رأسه وظهوره ورجلاه وذنبه الى الكهبة
الشهاب . زوره وصفته ورجسته وبطه وانتيكه الى الشهباء
البيضاء المراح . ذنبه غزوي الشكل ، قصير . ساقه
الى السرة المظلمة || قوة الاغصان واليزور والحشرات .
انتاه تفتن عنها في انموس تقيمه بين الاغصان النجيلية
المصلية القليلة الجعد من الماء . جسفتها اربع يضات .



سولع مخطط



سولة شهاب



سولن



سولة



سولمة الفصية

تتميز باستطاعة قلبك الاكمل التي يتبعها بطيء صلب ،
استطيل الجرم ، منبسط الطرف . وتتميز أيضاً بدرجة
انتفاخها التي تبلغ نحو ١٠٠ كيلومتر بالأسعة .

١٤٦٠٧ - سِيَاكِي * Par adrie (F).

١٤٦٠٨ - سِيَاكِي * Front series, Standardized (E).
هو في البرق الاقتصادي الانتاج الآلي بالأسعة .

١٤٦٠٩ - سِيَاكِي * Sil (F). Sil (E).

اسم اصطلاحي يطلق على القشرة الأرضية الجامعة للكتلة
بمستطوعها من محور سوية وبازنيتها ، تقدر سماكتها بنحو
٩٠ كيلومتر ، تلفظ القطع فيه المائع الذي يعطى منه .

١٤٦١٠ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١١ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٢ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٣ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٤ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٥ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٦ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٧ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٨ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦١٩ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦٢٠ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦٢١ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٦٢٢ - سِيَاكِي * Fascie, Liste en tôle (F).

السيلة والسيلة شبة مستطيلة الشكل كالقذعة .
ج سيلة .

١٤٥٩٤ - سُوَيْدَة

Albumen, Albumine, Endosperma, Périsperme (F).
Albumen, Albumin, Endosperm, Perisperm (E).
مادة نشوية أو دهنية أو آسية تكون في البزرة تحتل
مها للملحقة .

١٤٥٩٥ - سُوَيْدَة هي الدلوق ، اطية .

١٤٥٩٦ - سُوَيْدَة سُوَيْدَة Hypocotyle (F).

Hypocotyl (E).
هو الجزء السفلي من الجنين مركزه بين السنخ والقلبتين .

١٤٥٩٧ - سُوَيْدَة سُوَيْدَة Epicoctyle, Tigelle (F).

Epicoctyl (E).
هو الجزء الاكمل من الجنين مركزه فوق القلتين فوق

١٤٥٩٨ - سُوَيْدَة Phlebocoma (F).

هي السكيت نوع من البيض الصغير الباست .

١٤٥٩٩ - سُوَيْدَة Egal, Parall (F). Equal, Like (E).

السوي أو المتساوي .

١٤٦٠٠ - سِيَاكِي Hale (F). Hedge (E).

فاسل من الحجاز أو جنات حبة يفصل الحديقة أو
الحقل عن غيرها .

١٤٦٠١ - سِيَاكِي Plante (F). Planet (E).

السيارة أو الكوكب السيارة جرم فضائي كبير القدر
يدور حول الشمس ويسمى منها النور كالارض وضارده
والمرئخ والنشوي ...

١٤٦٠٢ - سِيَاكِي Ben (F).

هو البان ، اطية .

١٤٦٠٣ - سِيَاكِي هو سون المنافع ، اطية .

١٤٦٠٤ - سِيَاكِي Xiphias (S).

Espadon (F). Swordfish (E).
جس أسماك بحرية كبيرة القدر من فصيلة الاسقمريات .

أنواعه عديدة يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة .
تتميز باستطاعة حلق فكها الاكمل الذي يدور كالسيف .

١٤٦٠٥ - سِيَاكِي Xiphias (S).

Espadon (F). Swordfish (E).
جس أسماك بحرية كبيرة القدر من فصيلة الاسقمريات .

أنواعه عديدة يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة .
تتميز باستطاعة حلق فكها الاكمل الذي يدور كالسيف .

١٤٦٠٦ - سِيَاكِي Xiphias (S).

Espadon (F). Swordfish (E).
جس أسماك بحرية كبيرة القدر من فصيلة الاسقمريات .

أنواعه عديدة يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة .
تتميز باستطاعة حلق فكها الاكمل الذي يدور كالسيف .

١٤٦٠٧ - سِيَاكِي Xiphias (S).

Espadon (F). Swordfish (E).
جس أسماك بحرية كبيرة القدر من فصيلة الاسقمريات .

١٤٦٠٨ - سِيَاكِي Xiphias (S).

Espadon (F). Swordfish (E).
جس أسماك بحرية كبيرة القدر من فصيلة الاسقمريات .



سياف البحر المروء



سياف

الاحنة . وهي صورة ريبيل قائم على رجليه اليسرى وقد رفع رجله اليمنى ويده اليمنى فوق رأسه ويده اليسرى رأس غوط .
حده نحوها ٩٩ أشهرها ٩ المرقق ٩ و٥ رأس النمل ٩
و٥ عائق القريا ٩ .

Pommier (F).

١٤٦٢٤ - صَيْبُ

هو التفاح ، اطلبه .

١٤٦٢٥ - صَيْرْسُ الزَّرُوعِ *

Scythris temperatella (S).

فراشة صغيرة القند من فصيلة التاربات تورجا الى السمرة
الداكنة . اجنتها مهدبة الاطراف . زياتها عبيجان
مستطيلان . جيلها الحولي واحد . رقبها تدعى دودة
الزروع ، اطلبها .

١٤٦٢٦ - صَيْكُسْ هو الزان ، اطلبه .

١٤٦٢٧ - صَيْفُورْ * ، فُكْمَةُ مُتَوَجِّهَةٌ *

Cystophora (S). Cystophora, Phoque & capuchon (F). Hooded seal (E).

حيوان بحري لثوب من فصيلة الفقسيات . اصطاده مجاح
بحار البلاد الباردة من الزروع الى القطب والارض الجديدة ||
طوله نحو ثلاثة امتار . قوته الى السواد الارزق المروج
تطوق رقبته بيشاد . رأسه اطرافه سود . يمشي الذكر عذبة
فياجة تطوق الرأس فزيدة تجعا || الاتي تقصع جبراً واحداً
في الحلق ، ابيض اللون ثم يمسح مع العسر ويأخذ ثوبه
التهالي عند اكتمال ثلاث سنوات || قوته الاصمك والمقشرا ثوبه
والرغويث || يصاد من اجل فروته الفاخرة الصفت .
ينهم من اكل اللحم واستعمل الزيت والاملاء والطعام .

١٤٦٢٨ - صَيْفُكْسْ ، كُتَبُ الْبَحْرِ . Mustelus (S).

Emissole (F). Smooth hound, Prickly hound (E).
لا يمكن اعتداد اسم وكتب البحر لانه يطلق على اكثر
من عشرة انواع من الاصمك الكبيرة المقترسة || والسجل
جنس اصمك بحرية ولودة من فصيلة البنيكيات . انواعه
المعروفة قليلة . اصطناعها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة .
جميعها مقترسة بطاشة لا تطف من فيه . سرسجها الم تحفر
كاسم || اجسامها وشية الشكل . تطول من ٦٤٠ الى
٢٠٠ سم . ألونها تراوح بين الكحلة والبردة المخطوة
للمجات . رؤوسها مخروطية . اشدتها اسفل قصيرة
متأخرة . اسنانها صغيرة ، حادة ، متأسكة الرصف .
نوسها مجهزان بصادات ساذنة تتلعب وتنتقل عند الطلب .
قصيرة النسيم تتأخر مؤخرة العين || زمانها متباينة الترتيب
والاشكال . الليلية كبيرة . مستطيلة ، ثنائية التفرين
الاسفل || احرف انواعه واشهرها السجل المبلول والسجل
الاس .

١٤٦٢٩ - صَيْفُكْسْ أَمْلَسْ * Mustelus laevis (S).

Emissole laevis (F). Smooth hound (E).
نوع من السجل . سمكة بحرية ولودة . اصطناعها البحر الابيض
المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اعصها المخطوة
المعتدلة من جبل طارق الى كوناكري || جسمها وشية
الشكل يطول من ١٤٠ الى ١٦٠ سم . ثوبها الى البردة
المخطوة تزرق وتسر في الظهر وقدر ويتنفس في البطن .
مسكها مالى البشرة حاد التحبيب || لحمها كاعين
الصفت ، قل من يربض فيه . مسكها شائع الاستعمال
الصناعي . زيتها جيد الصفت .

المعروفة ٢٠ منبها المناطق الامريكية الحارة . اوراتها
عابلة متعاقبة بسيطة . انزعاجها خشية ، خسية التركيب
ملونة التيج . ثمارها جراء ثلاثية اللان || اشهر انواعه
ما يلي .

١٤٦٢٧ - سَيْبَاطُونُسْ أَمْرِيكِي Ceanothus

americanus (S). Céanothe d'Amérique (F).
جنية معمرة تطوق نحو ١٠٠ سم . اوراتها اهلجية ،
ذاقة ، عطية . تصلها نام القصيع ، ضمن الحلق ،
بحري الصفة العليا ، ازغب السفل ، الزاد حلقية
التجميع ، قمية البيلات بانصامت اللياف || ازهارها
يستر من حيران الى آب . يستخرج من جلور مواد
طبية كثيرة التبع تصلح في معالجة السفلس والزعار
وبعض الحيات .

١٤٦٢٨ - سَيْبَاطُونُسْ عَمَلِي Ceanothus

velutinus (S). Céanothe velouté (F).
جنية معمرة تطوق نحو ١٨٠ سم . اوراتها مستطيرة
القاعدة ، مستطيلة الصل الذان الحسل البشرة على صفحية .
ازهارها بيشاد اللون ، حشوكية التجميع ، صغيرة القند .
ازهاره يستر من حيران الى تموز .

١٤٦٢٩ - سَيْبَاطُونُسْ صَنْجَبِي Ceanothus

szurus (S). Céanothe szurú (F).
جنية معمرة جادة تطوق من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروصها
اسطوانية ، زياء اللحاء . اوراتها متباينة قليلة التستين .
تصلها مالى الصفة العليا ، حلي السفل الصلاء .
اللون . ازهارها كاسية التجميع ، سفلية الشكل ،
مستقيمة اللون || ازهارها يستر من ايار الى تموز .

١٤٦٣٠ - سَيْبَاطُونُسْ فَيْدَلِر Ceanothus

fendleri (S). Céanothe de Fendler (F).
جنية معمرة فراء شائكة ، تطوق من ١٠٠ الى ١٥٠ سم .
فروصها بحرية اللون . اوراتها بيشية ، صغيرة القند ،
حادة التستين . تصلها مالى الصفة العليا ، حلي السفل
القضية اللون . ازهارها عتقوية التجميع لونها الى اللياف
اليلكي || ازهارها يستر من حيران الى تموز .

١٤٦٣١ - سَيْبَاطُونُسْ قُثُورِي الزهر Ceanothus

thyrsiflorus (S). Céanothe on thyrses (F).
شجرة تطوق من ٣ الى ٦ امتار . فروصها سفلية مالة
اللحاء . اوراتها اهلجية ، حادة التستين . تصلها
ازغب العروق ، ياد الخضر . ازهارها قنوية التجميع ،
سفلية الشكل ، زرقاء اللون || ازهارها يستر من ايار
الى تموز .

١٤٦٣٢ - سَيْبَاطُونُسْ مُسْتَن Ceanothus

dentatus (S). Céanothe denté (F).
جنية بحرية معمرة تطوق من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم .
اوراتها اهلجية مسنة ، تصلها مالى الصفة العليا ،
مكتوف الحار السن ، حلي الصفة السفل للثراء
اللون || ازهارها غنية التجميع ، زرقاء اللون .
ازهارها يدوم طوال ايار .

١٤٦٣٣ - صَيْكُونُسْ ، فَيْرْسَكُونُسْ Persia (F).

Persous (E).
سايوس او فرسوس وتدعى ايضاً حليل رأس القمل ،
كوكبة نجوم شمالية المقي مركزها بين ذات الكرسى وسلك



سَيْرِسُ الزَّرُوعِ



سَيْطُرْ



سَيْلْ أَمْلَسْ

لونها الى الجوزة تركب قشور الابر قرب ادراكها بقتلها.
يكافح عند ظهورها باستمال احد الفواير التماسية
الحففة .



سجل مبدول

١٤٧٣٨ - سيجولوجية ، علم الخلايا

Cytologie (F). Cytology (E).
علم يبحث في ماعية وحية الخلايا من جميع النواحي ان
جسموية او كيميائية او خلافا .

١٤٧٣٩ - سيجورفولوجية

Cytomorphologie (F). Cytomorphologie (E).
الدرس القياسي (المورفولوجي) الخاص بالحيوية او الخلية .



سجلان الزرع

١٤٧٤٠ - سيجون

Stona (S). Stone (F).
جلس حشرات صغيرة القند مسكولة الجسم من فصيلة
المسيات . انولاه عديمة تقطيل من ٥ الى ١٦ م .
انولاه مختلفة الالوان السوية يكثر فيها الاطلس والخطي.
تركب غشيت نباتات الفصيلة القرنية . افراوها زبدية
لا تتجاوز طبع بعض الارواق .



سجلان زبدية

١٤٧٤١ - سيجون مخططة

Stona lineata (S). Sténo du pots (F). Stone lineata (E).
حشرة خاضعة داخية من فصيلة المسيات وذرية معدلات
الاجنية . خنافسها تعيش على لوراق القضايات البرية
والزراعية . يرقاتها تركب الجذور لتصلها || جسمها صغير
القند يعطيل من ٤ الى ٥ م . ثوبا الى الشبهة الخضراء تملوها
ماجة كستنية جزوية تتقلب مع انكاس البثور . راسها
مستعرض الجرم . حينها كبريات . زياتها رقيقان .



سجلان لمحة

متكها مشط الطول . ظهورها مستعرض الحولف اللامع .
عندما كيفت الخمل ، غشيتا التحزير القاطب . ارسافها
رباعية العقل الظاهرة || لها جليل راس في الحولف .
الحشرة الجملانة من نباتها الشوي في اوائل الربيع وتعيش
سبي الياض تموز . كسر في التبار . قشاة بمد ظهورها
باسبيون . تمتع المكان على فصل الارواق وني التربة .



سجلان

١٤٧٤٤ - سيجون مخططة

Cetonia (F). Cetin (E).
السجين مادة دعنية تستخرج من بعض انواع الحيات اعصها
السبر .



سجلان مخططة

١٤٧٤٥ - سيجون

Scarus sigeus (S).
سكة بحرية من نبات مصغار مأكولة طية العلم كان
لها شهرة في المصور التابرة .

١٤٧٤٦ - سيجون

Run off surface (E).
مقدار الماء الذي يسيل على مسلة معينة من الارض .

١٤٧٤٧ - سيجون

Fondre (F). To melt. To cast (E).
قاد او درج التي الى حالة اللاتية .

١٤٧٤٠ - سيجون مبدول

Mustelus vulgaris, Mustelus mustelus (S). Emissola communis, Moutella (F). Prickly bound (E).

نوع من السيل . سمكة بحرية ولح . اطالها فصيلة
الارياض تشعل معظم المناطق اخارة والمختلة الحرارة من
البحر الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || تعتبر من
الاسماك البنية . سرورها عرض البحر || جسمها وشي
الشكل يعطيل من ١٧٠ الى ٢١٠ سم . ثوبا الى الكلبة
تزره وتتم في الظهر وتير في البطن . سكهها مشر
التصيب والويل الصغيرة النسية الحيم || سكهها شائع
الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف . لحها كان
قل من يربط فيه .

١٤٧٤١ - سيجون

Cétone (F). Chafer (E).
جلس غشاش من فصيلة الحليبات الزواهد المربعة نحو
٢٠٠ جميعها حيلة الالوان الزاوية تعيش على رقيق
الانزاد وصل العصارة النباتية التي تمتصها سحيا استطاعت .
يرقاتها تعيش على المواد العضوية المتحللة . اشهر انواعها
ما لي .

١٤٧٤٢ - سيجون الزرع

Oxythres funesta (S). Cétone stictique (F).
نوع من السيجون طولها نحو ١٠ م . ثوبا الى السواد اللامع
تملوه رقيقة يضاء || تركب الزروع قبل الاسبال
تفتحي على القلايا . وتركب الانزاد على اعتلاف
انولاه وقد لا تمتن من زمام الكربة في ابلان الارواق .

١٤٧٤٣ - سيجون زباد

Epicomets hirsella (S). Cétone value (F). Blossom feeder (E).
نوع من السيجون طولها يراوح من ٨ الى ١١ م . جسمها
ازغب البشرة . ثوبا الى السرة المابقة تملوه رقيقة غليظة
من البياض . عندما مشوا يروح زفسي اسهم الحولف .
تركب انزاد الانجار المصرة تفتريها ولا تمتن من
الورود والانزاد الحقلية .

١٤٧٤٤ - سيجون مخططة

Cetonia aurata (S). Cétone dorée, Hanneon des roses (F). Flower beetle, Sap chafer, Green rose chafer (E). Goldrosenkäfer, Goldkäfer (D).
نوع من السيجون طولها يراوح من ١٤ الى ٢٠ م .
ثوبا الى الخشار التماسي تملوه ماجة ذهبية || تركب
الانزاد والابر الناضجة . يكثر وجودها على الورود والابران
والمرارة || رقاتها تعيش على المواد العضوية اعصها
جلود الصلفات المقطوعة .

١٤٧٤٥ - سيجون بلازوه

Cytoplasme (F). Cytoplasm, Cytoplasma (E).
هي المادة الاولى اي المادة البروتوبلازمية التي تحرك
بجولة الخلية النباتية .

١٤٧٤٦ - سيجون مبدول

Cytoposporia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة المصليات . يكتيها
فضية التجميع تحضها وقيمة درزية الشكل ناكثة . شغلها
اسطوانية . يوردها غليظة مستقيمة شاذة || انولاه
قليلة اعرفها النوع الذي يمتري البين الجيني .

١٤٧٤٧ - سيجون مبدول

Cytoposporia ceterpides (S).
فطر مجهرية يصيب ثمار البين الجيني قريطها . مشهور
الخارجي يقع مستوية منخفضة السطح طولها نحو ٧ م .

١٦٦٥٢ - **سيروس** هو الزجس البري ، اطليه .

١٦٦٥٣ - **سيراسيوم** Cerastium (S). Céraiste (F).
Starry grasswort (E). Hornkraut (D). Cerastio (I)
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . انواعه
عديدة مظهرها بري وبعضها زراعي رئيسي . سويها
وفرعها مزغبة القدم ، زيتها ابيض || اوراقها متعاقبة
نصلها شيق الصفحة ، انزاعها عديدة ، كبيرة القد ،
بيضاء اللون || تزرع حل حافة الممرات وفي المواق
الصخرية || اشهر انواعه مايلى .

١٦٦٥٤ - **سيراسيوم ابيض** Cerastium candidissimum (S). Céraiste blanc par (F).
يعلم من ١٢ الى ١٥ سم . فروعها عديدة متراكبة زيتها
كثيف التجميع ، ظفي اللون || اوراقه طويل نحو
٢ سم ، وتعرض نحو ٣ سم . انزاعه صغيرة القد شديدة
البياض الثلجي || انزاعه يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٦٥٥ - **سيراسيوم كبير الزهر** Cerastium grandiflorum (S). Céraiste à grandes
fleurs (F).
يعلم من ١٥ الى ٢٠ سم . زيتها افرق الالتشاب .
اوراقه غيطية طويل من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم .
انزاعه تده من ٧ الى ١٥ ، قطر الزهرة يراوح بين ٣ و ٢ سم .
انزاعه يستمر من نيسان الى تموز .

١٦٦٥٦ - **سيراسيوم مزغبير ، أذن الفأرة** Cerastium tomentosum (S). Céraiste tomentoux,
Argentine, Oreille de souris (F).
يعلم من ٢٠ الى ٣٠ سم . زيتها كثيف التجميع جمد .
اوراقه منتسبة طويل من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ٤
الى ٦ سم . انزاعه مستطيلة ، بتلاتها سنانية الشكل لونها
الى البياض الالابر || انزاعه يستمر من ايار الى
حزيران .

١٦٦٥٧ - **سيروك ، سيلة ، مظمورة** Silo
حفرة مستديرة خاصة آر بلاء موصوف اسطواني الشكل
ملسوط الانزاع تحفظ فيها ، بعض البوت ، الجوب
والجنود والسائل والكلاء الخ .

١٦٦٥٨ - **سيروكيس** Syris
هي بقعة النفل ، اطلبا .

١٦٦٥٩ - **سيروج ، حنجر** Huile de sésame (F).
Sesame oil (E).
هو دهن السمسم اي زيت يستخلص من زور السمسم
بعد تقعا بالماله وتصفيتها وتحميمها وطحنها لانتاج
الطعمية ثم ترسب الطعمية لفور السروج عن الكسب .

١٦٦٦٠ - **سيروس ، سيروس** Careus (S). Cierge (F). Hedge cactus, Fench thistle
(E). Kerzenkactus, Säulenkactus (D). Cero (I).
جنس نباتات برية وزينية من الصباريات الشولية .
انواعه زهاء ٣٠٠ تتميز بتلاتها الجسودوي اللاقنابي .
مظهرها من نباتات المناطق الحارة الارامية . انزاعها
جملة الشكل وكبيرة القد || اعرف انواعه واشهرها
ما يلي .

١٦٦٦١ - **سيدك** Sida (F).
هو الخورق جنس نباتات عشبية من الخياز يات .

١٦٦٦٢ - **سيدكوكية صكره** Cidaria fulvata (S).
Cidaria jaune (F). Cidaria fulvata (E).

حشرة من فصيلة الاثليات ودنية حشرغيات الاجنحة .
مرتبها يشعل بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط
والمناطق الكاخلية المتاخة . فراشها جارية قشرا رقيق
الانزاع . مرتبها خاضعة تعيش على اوراق المصغ
والسرين || جسمها صغير تقصيف طويل نحو ٩ سم .
بسطها نحو ٣١ سم . رأسها مستد الجرم اصفر اللون .
جناها صغيرتان . زياتها غيطيان . مرتبها متوسط الطول .
حوضها اصفر اللون ، اكلف المصغ . بطها اصفر اللون
افشع المصغ . وراشها ، عند الفقين ، الى الصفراء
الكبريتي تملو في الزوج الامامي ثلاث بقع برتقالية ||
لما جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح
من الصبر الى فصة الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو
سنة اسابيع وتتمتع المكن مبيدات على الصفحات السفلى
من نصال الاوراق || السرعة تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، ماس انتشار . ثوبها يمان
البينة التي تعيش فيها . ورايها البنية السلي ماصة ما
يعدو يمس الى القنوس والشب عند الانتقال || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الجلالة
ضمن صلجة معتدلة الحيلك .

١٦٦٦٣ - **سيدكاف ، سيدكاف** قبل فيه : حجر ذو ساق قوية تشبه حراق ورياح حريق
غشبه يبيض به فرك الكتان .

١٦٦٦٤ - **سيدو ، عسمر الفصاح** Cidre (F).
Cider (E).
خر تصنع من صير تفلح السير .

١٦٦٦٥ - **سيروك ، قيطير** Tegmen, Secondine (F).
Tegmen, Secundine (E).
هو الكشاش الثقات الباطي الذي يلفف البيضاء والبرزة .

١٦٦٦٦ - **سيروتوفريس** Ceratophrys (S).
Cératophrys (F).
جنس سدفاوج جامنة من فصيلة الكداديات . انواعه المعروفة
عشرة مبيدات مظهر بلاد امريكة الجنوبية || اجسامها كبيرة
القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . عند الذكور بين ٢٠ الى
٢٥ سم . عند الاناث . رؤوسها غلظية مستقيمة تملوها
تضومات عضوية مبيجة الشكل تكثت الرأس والحلق وقت
كالبجة عبر الظهر الى السير . حوضها كبيرة مستديرة
جاسنة . اجفانها متوجة بقرن مدية الاطراف عضوية
اللدة . فمكوكها السفلى حادة الاسنان . يلاوها الموائية
الصقية كبيرة القد ليموية الشكل والقدر . اصابع قوائمها
الامامية ملطقة . اصابع القوائم الخلفية نصفية الخطاب .
جلودها مثاق || انثيا متراكبة الالوان يكثر فيها الحظي
والاخضر والامر والابنق والصفار والاحمر || تعيش معظم
سباتها التي لا تقل عن ١٥ سنة في البر . تسرح في الليل
وبيت في النهار داخل انفاق سطحية تحفرها في التربة ||
قشرا الحشرات والقار والجربان والظاء والورغ والاساربع
والديدان .



سيدكوكية صكره



سيروتوفريس



سيراسيوم ابيض



سيراسيوم كبير الزهر

١٤٧٥٠ - سيلوري (F), Silurian (E).
تمت تعريفه بطلق من الحقبة الثانية من الأوج القديم .
يقال العصر السيلوري والأراضي السيلورية ، وهي
تتميز بأحجارها على الكثير من الأحماض المصنعة الرؤوس
أي على أول تقاربات .

١٤٧٥١ - سيلوفان
ملدن سيلويزي شفاف قابل للتلوين .

١٤٧٥٢ - سيليفيات
Scyllidae (S), Scyllidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مغطاة الأربيل
غلافات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة
قليلة العدد ، أسطوانات بجوار البلاد الحارة || اجناسها
حريضة ، حلالية ، مستطيلة ، رباعية الزوائد الجانبية
الشكل . رؤوسها صغيرة . ملابسها صفية || أعراف
اجناسها السلية والذئبة .

١٤٧٥٣ - سيليكس ، صوان
Silice (F), Silice, Flint (E).
جسم مركب من السيليوم والأكسجين وهو من أكثر
الاجسام ثمة وأهمها انتشاراً يوجد في الأرض اما على
سأله أو على شكل سيليكات .

١٤٧٥٤ - سيلسيوم ، سيلكون
Silicium
فلزات ثلاثي التكافؤ (س - ٣) ينصهر في ١٢٠٠
°سج . ويتحد مع الكبريت في ٦٠٠ °سج . ومع الأوزون
في ١٠٠٠ °سج . يستخرج من السيليس أو من
فلوسيليكات البوتاسيوم .

١٤٧٥٥ - سيليكات ، صوانات
Silicate
ملح يحصل من أمزاج الحامض الصواني بأحدى التوليد
كالبوتاس والكلس . يقال سيليكات البوتاس وسيليكات
الكلس .

١٤٧٥٦ - سيلينية حلالية
Selenia lunaria (S), Selenie lunale (F).
Selenia lunaria (E).

حشرة من فصيلة الأرابيات وربية حرشيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اربية . غراشها جارية
قوتها رقيق الزهار . مرشها غاصلة قوتها اوراق النباتات
البرية اعصها البروق || جسمها متوسط القد يطول نحو
١٤ م . مسطها نحو ٣٨ م . رأسها مستطيل الجرم . عيناها
كبيرتان . زلماتها مشطيان مزيجيان من الذكر ، غطيان
عند الانثى . جيشها ويطنها كبقيا الخمل ، حشلا الفئ ||
وراشها عند الفشتين ، الى الخمل الاصهب للولج تلمو
في الزوج الاسامي . جنة وسطى سمراء وسط مقوس يمر
وبقمة حمراء وتصلو في الزوج الخلفي جنة سمراء || لها
جبلان في الخمل . تظهر قرائة الجبل الاول في نهان
وتظهر قرائة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل .
تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتتممكن لطفاً
تطفها مادة غريبة تنبت على الصفحات السفلى من نيمال
الاراك || البرقة تطول من ٢٨ الى ٣٦ م . جسمها
اسطوانى الشكل يبدو كأنه قلعة من قصب مائل انتشار
تلمو ثلاثة أزواج من العمل المتعاقبة . ثوبها الى الكسني
الاشعث . ثوبها شديدة السمر . رأسها أسود . وراجها

البنيّة الوسطى ماصة ما يسطرها الى التفتير والشب عند
الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً
ينتفض نمس صلبة تحبها السرعة بين الارواق التي تبمسها
بجوط حزيرية .

١٤٧٥٧ - سيمباية
Simaba (S), Simaba (F).
جنس اثمار برية طيبة من فصيلة السورويات . أنواعها
المعروفة قليلة العدد منها بعض مناطق أمريكا الحارة ||
اثمارها ترتفع من ٦ الى ١٥ امتار . اوراقها متعاقبة
مركبة ، وقرية التجميع ، خاصة أو رباعية أو تساعية
الورديات السنية اتصال || اثمارها طرية الارتكاز ،
سالية التجميع ، ثمارها حبوب لوزية .
اشهر انواعها الحلية الثلاثة التالية :

١٤٧٥٨ - سيمباية حد يدية
Simaba ferruginea (S), Simaba ferruginea,
Cedron du Brésil, Calunga (F).
نوع من السياه . ثمرتها تلمو نحو عشرة امتار . منها
البرازيل وأخصها مقاطعة بايا || تستعمل في معالجة
الحشيات وشد الاسهال وصر الحفم .

١٤٧٥٩ - سيمباية صد ووية
Simaba cedron, Quassa cedron (S).
Simaba cedron, Cedron, Cedronelle (F).
Cedron ura (E).
نوع من السياه . ثمرتها تلمو نحو عشرة امتار . منها
البلاد الأمريكية الحارة والاستوائية || ثمارها شامسة
الاستعمال الطبي . يمايلها بها الكتك وبذغ الاناعي وبعض
الحشيات || مادتها القلابة تدعى سدوين (Cedrine)
مرة الملاك كالكتنا .

١٤٧٦٠ - سيمباية قلدية
Simaba valdivia, Picrotenis valdivia (S).
Simaba de Valdivia (F).
نوع من السياه . ثمرتها تلمو نحو ثمانية امتار . منها
مادة جمالية شديدة البقع تدعى للفلين (Valdivine)
٢ ملغرام من هذه المادة تقضي على الاربث || تستعمل
طياً في معالجة الحشيات الملوثة . مسحق قشور ثمارها
مقوة قبال .

١٤٧٦١ - سيمباية
Sémilogie (F).
Sémilogie (E).
فرع من الطب يختص بدراس طرار وأعراض الأمراض
واسئالاتها .

١٤٧٦٢ - سيمبنديس
Cymindis (S).
Cymindis (F), Cymindis (E).
جنس حشرات قاتصة من فصيلة البليات وربية غشيات
الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار
البلاد المنتدلة الحارة والباردة || اجسامها هائلة ، مستدلة
التيط ، قطول من ٨ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة .
عيناها صغيرة ، باردة . قوتها الاستيعادية خطية .
تأثيرها وتكونها وداستها قياسية . كولسلها ضمره .
يطنها مستطيلة . اثمارها لاسعة وبمسها شبه لاسع .
قوتها نشيطة . اثارها متباينة الاروان الجبلية الزائرة ||
الحشرة الجملانة قاتصة والبرقة ايضاً .



سيلية ملالقة



سياه

ساقها وفروعها منتصبة ، غمدة ، زباد ، الحاء منتفخة
الترشب . اوراقها احليجية مستطيلة منفلقة التصل .
ازهارها رقيقة صفراء اللون || اعرف انواعها ما يتبع .

١٤٧٧٣ - سِينُوكَان تَقَرِي *
Cephalaria tatarica (S). Cephalaire de Tartarie (F).

نوع من السيان للمصر مهد روية الشرقية . يملو من
٣٠٠ الى ٣٠٠ سم . يقال انه ارفع عشية منتصبة مرفوعة .
ازهاره عديمة اللد ، صفراء اللون تنجمها رؤيات
كبيرة ثلاثية او خاسية الشكل .

١٤٧٧٤ - سِينُوكَان سُورِي * ، طَرْدَكَن

Cephalaria syriaca (S). Cephalaire de Syrie (F).
نوع من السيان للمصر . مهد البلاد السورية . يكثر
بين الزروع . يملو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . || ازهاره
عكوكلي الشكل رؤياته خاسية او سباعية التجميع .
ازهاره صفر .

١٤٧٧٥ - سِينُوس *
Sicyos (S). Sicyos (F).

بجلة ممرعة عارفة من فصيلة القرقيات . منبها بض
النطاق الامريكية . ساقها تطلو نحو عشرة اثمار . حوافها
ثلاثية او خاسية للشعب . اوراقها قليلة خلية ، خاسية
القصص . ازهارها الى انفسار الاصفر . المتكية منها
عشوية التجميع ، المغنية خسية ، مستطيلة الحافيل .
ثمارها فضية تطلو نحو ١٠ سم . وقصر نحو ٧ سم .
لونها الى انفسار البصري الاربيد الملوخ ويملو سطحها
حصف ذوب قليل الصلابة . لوكال مطبوخة .

١٤٧٧٦ - سِينُولة ، مِينُ
Liquidité (F). Liquidity (E). صفة المواد البائلة للمائة .

١٤٧٧٧ - سِينُون *
Clonus (S). Clone (F).

جنس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة
جميعها صغيرة اللد تطلو من ٣ الى ٥ سم . انواعها مختلفة
الالوان يكثر فيها الخطي الاسمر الملوخ . الحامدة مدججة
وبزرقة وفيها الحامدة والمهدبة || ريفاتها مؤدية تركب
نباتات الفصيلة الخنازيرية فتضم الارواق وتقرضها .

١٤٧٧٨ - سِينُون المَرَان *
Clonus fraxini (S). Clonus fraxini (E).

حشرة غاشلة من فصيلة السويات روية مدمجات الاجنحة .
تألف البراري والزارعين . غشاشها وريفاتها تعيش حل
ارواق الزيتون والمران || جسمها صغير اللد يطلو من
٣ الى ٤ سم . ثوبا الى السمرة المتكسبة تملوها في طوارنها
طروس وتزاريق مختلفة . رأسها صغير الجرم ، مستطيل
الحك المسطح القاصم التقلب . عيناها صغيرتان . زباناها
مرفقتان صلبتان . طوارنها بيضي اللون . عظامها
متناحرة التميزر القاطب . ارسافها رباعية المقل الطاهرة ||
لها جيل واحد في الحلو . تخرج الحشرة الجسلانة من مكانها
في اوائل نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل ||
البرقة ، عند بلوغها الإدراك التام ، تطلو نحو ٥ سم .
جسمها احليجي الشكل ، مدب الرأس والطرف ، حنكي
اللون الاصفر الملوخ ، اسمر الرأس والشرج .

١٤٧٧٩ - سِينُة *
Sima (F). Sima (E).

اسم اصطلاحي يطلو حل القطع المفتوي شبه الملائق
الموجود في وسط الكرة الارضية بين الطبقة السطحية المعروفة
بالسيال وبين النواة المركزية . تقدر حرارة هذه الطبقة
اي السمة بنحو ١٥٠٠ درجة ستيفراد . يابس حزام
مشعل .

١٤٧٨٤ - سِينِيَا
Facht (F). حبة ارجح .

١٤٧٨٥ - سِينِيرِيس
Salnicle هو الكرزي ويكثر فرد من فصيلة السويات .

١٤٧٨٦ - سِينِيرَاكِيَا *
Cintractia (S).

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراغويات تتميز
بجهدا القار البارز الالتصاق ، الاذي الفكل .
انواعه قليلة العدد تصبب بعض الاسليات والسيدات
فتصلها .

١٤٧٨٧ - سِينُتَام * ، دُونُة مَزْدَوُجُة ، دُونُة
خَرَا

Syngma
جنس ديدان سليكة طفيلية تعيش حل جهاز تنفس بعض
الطيور اصحابا الجبل والبطروج || تمت بالفودة
المزودة لان الذكر منها يلاصق الانثى ولا يفترق منها .

١٤٧٨٨ - سِينُكُونُة
Quinquina هي لكنكتينا التي يستخرج منها الكينا ، اطليا .

١٤٧٨٩ - سِينُوسِيَت *
Cénocys (F).

اسم يطلق حل جميع الكائنات الضورية المركبة من حزام .

١٤٧٩٠ - سِينُونِيَس *
Cynomya (S).

Cynomya, Chien-rat, Chien des prairies,
Marmotte des prairies, Ecureuil l'appant (F).
Prairie dog (E). Prairiehund (D).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة السنجابات .
انواعه خسة جميعها امريكية . اجسامها ربة تطلو من
٢٧ الى ٣٥ سم . اذانها من ١٠ الى ١٢ سم . دروسها قليلة .
حيثا مستديرة . اذانها عريضة وقصيرة . جريزها قوية
اصابعها خلية ، اطرافها حادة . انواعها سوية اللون
يكثر فيها الرمادي الاصعب || ساقها جلابة . تألف
المضارب حيث تركب قراما التي يراوح عدد اجسادها
من ٥٠ الى ٣٠٠٠ سمرة قلنسية الشكل قطرها نحو
١٢٠ سم . وطولها ٦٠ تبعد القواسدة عن الاخرى من
٦ امتار . مدخلها وغاريها اتفاق مستقيمة عمقا
نحو ٣٠ سم || بيتها الفتوي يدوم ما دام الصقيع
والجليد . قويا الاعشاب والجلود والبرور والحبوب
والقار والجرذان .

١٤٧٩١ - سِينُكُك
التراب الذي تغيره الريح عن الارض .

١٤٧٩٢ - سِينُوكَان *
Cephalaria (S). Cephalaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الديليات .



سِينَام



سِينُون



سِينُون تَرِي



سِينُون سُورِي




سِينُون




سِينُون




سِينُون الزَان



- 1 اعطيطود 2 مقربوط 3 صبروط 4 كثار مابل 5 كثار لورب 6 صبروط 7 فوطك 8 موزة 9 دوكوت 10 فنتك 11 حارون بحري 12 حارون
 رشق، فوطك 13 حارون سبك 14 بولس 15 اشكك 16 حطك 17 لك 18 دوس 19 قوط 20 لولك 21 طلاء 22 كوكك 23 طلاء 24 شلر
 25 فوطك 26 كركيز 27 كركيز صوبر 28 صبروط 29 غاروط 30 بچك 31 فوطك صبروط 32 حطك 33 روتك سطرل 34 روتك حطك 35 شك 36 بول سطر
 37 بول سطرل 38 بول سطرل 39 بول سطرل 40 بول سطرل 41 بول سطرل 42 بول سطرل 43 بول سطرل 44 بول سطرل 45 بول سطرل 46 بول سطرل 47 بول سطرل
 48 دالغ 49 بول سطرل 50 صبروط 51 حطك 52 صبروط 53 كركوك 54 كركوك 55 حطك 56 حطك 57 حطك 58 حطك 59 حطك 60 حطك 61 حطك
 62 حطك 63 حطك 64 حطك 65 حطك 66 حطك 67 حطك 68 حطك 69 حطك 70 حطك 71 حطك 72 حطك
 73 حطك 74 حطك 75 حطك 76 حطك 77 حطك 78 حطك 79 حطك 80 حطك 81 حطك 82 حطك 83 حطك




١ قباب - ٢ فرخ - ٣ التماس - ٤ كبدية مائلة - ٥ كبدية - ٦ طرخ - ٧ مبداء - ٨ سمون - ٩ سمك - ١٠ جدانة - ١١ جناح - ١٢ وساجة - ١٣ قد
بحري - ١٤ شطارة مائلة - ١٥ نعال - ١٦ ديك البحر - ١٧ دلاغ - ١٨ صلف الماء - ١٩ شكة البحر - ٢٠ قري - ٢١ قسمة - ٢٢ حنوك - ٢٣ أبو طوق -
٢٤ عبل - ٢٥ طروق القرن - ٢٦ طريوح حجري - ٢٧ زبر بحري - ٢٨ زبر أبو شوكة - ٢٩ زمبر - ٣٠ لع - ٣١ أم قوس - ٣٢ لينة - ٣٣ بوس المتوسدة - ٣٤ تيرور - أبو منقار -
٣٥ طراغور - ٣٦ تود - ٣٧ ميف البحر - أبو سيف - ٣٨ شمر - ٣٩ دهانة - ٤٠ اندلس




1 ابروم - 2 شيرتوط - 3 دوح سني - 4 بيلس - 5 لعل - 6 سلون - 7 زنجور ، سمك الكراكي - 8 نيكال - 9 نيك - 10 كراخ ، ملجوم البحر - 11 ونكة - 12 ابر قبيط ،
ازوب البحر - 13 مكرور - 14 زركانة - 15 سمك البحر - 16 فطر ، نزل للاد - 17 ابر صغون - 18 ابر صغون اسفل - 19 جلكي - 20 جيرة - 21 ديب الموت - 22 النكة -
23 شش - 24 حويل - 25 خرا - 26 قرش - 27 وشادة - 28 حورية ، عقاب البحر - 29 مارفون



- 1 شابر - 2 صقر قزويني - 3 قطاب ذهبي - 4 قطاب نصري - 5 قطاب القليل - 6 بومة - 7 بومة - 8 قيقب - 9 بلنج - 10 ككتور ، نسر امريكي - 11 نسلج - 12 لودي - 13 نوبة - 14 المرونة - 15 حنجرية حمرية - 16 ككتور، حرد القنطرة - 17 ككتور، صردا القنطرة - 18 ككتور، ليدبر - 19 ككتور، وديك - 20 قمرينة - 21 بوم - 22 رطلية بوم - 23 رطلية بوم - 24 قنطرة صردا - 25 غرور - 26 بوم، صردا - 27 آيا صردا - 28 آيا حرد - 29 آيا بنفسجينة - 30 دفتاش ، ابر براتش - 31 سنكون - 32 بقات - 33 نلس - 34 ماس ، دج - 35 عقيق ازرق - 36 طوق - 37 طرزر - 38 قنجر كير - 39 قنجر موسي - 40 قنجر بوني - 41 سنطير ، عسلط - 42 بادرور - 43 بومانية - 44 مرق - 45 ام الحنجر - 46 دسكة - 47 عقالب - 48 شردو ابيض الجناح - 49 شردو احمر الجناح - 50 دسكة - 51 قنطر ازرق - 52 حرد ، دويك الجبل - 53 صر - 54 قنجر كير ، نقوة الصنوبر - 55 دودو احمر الجناح - 56 دودو اعظم الجناح - 57 بطوط - 58 تومس



- 1 غار العرويس الاسود - 2 رفاة سعادى - 3 طائر القردوس الاحمر - 4 طائر القردوس الكبير - 5 كيايه (الاسم المثلج) - 6 كلبه - 7 سكوده - 8 ربيع الفلوق الصغير - 9 ربيع الفلوق الاسود - 10 طائر النبال - 11 مران جهوري - 12 فراش غلوم كالكات - 13 فراش موز - 14 ريكاش - 15 ابو طير - 16 خترال - 17 زعفران - 18 ابو دوح - 19 نيم شعاع القدس - 20 نيم رايح - 21 نيم سوليا - 22 صليط احمر اللب - 23 صليط تانك - 24 صليط احمر القادر - 25 صليط جيل - 26 ابو دوش اسبح - 27 طرود - 28 شرة زرقاء الصعد - 29 قترية سكمتة - 30 طيكين - 31 مدلب فان - 32 مدلب سافر - 33 لاوروديه زرقاء المالح - 34 ام حرة - 35 لاديزيه صافقة - 36 صفر طويل اللب - 37 فلكي - 38 ام ربال - 39 نيرة جردان - 40 نيرة طيكلة - 41 قزاق ابو علة - 42 حليقت بونابر - 43 دريش دسك - 44 سكشور - 45 ابو ربال - 46 غريس احمر الرود - 47 طرفوس اردق - 48 حريس ابيض القيل - 49 خريس زيردي - 50 لغريس بهي - 51 لغريس طاردي - 52 لغريس مجرب - 53 لغريس شوق - 54 لغريس حوك - 55 نوك - 56 طلوان - 57 سول طويل القشار - 58 نيرة كليوب - 59 دمك



- 1 طاووس - 2 اردوس - 3 تاراج فالح - 4 تاراج ملح - 5 تاراج المهرست - 6 تاراج نقي - 7 تاراج البو - 8 تاراج سرخوف - 9 تاراج اوزك - 10 حريجل - 11 تاراج بودابو - 12 سيمه شمين - 13 سيمه مير - 14 تاراج ازن - 15 حنط - 16 كيتيط - 17 غرغر لسري - 18 كولوات - 19 حريفا - 20 ديك بري - 21 ديك سفالي - 22 ديك كوشني - 23 ديك ميروغ فارغه - 24 حبيكة داجنة - 25 حبيكة طماء - 26 حمام زاجيل - 27 حمام حركار - 28 حمام طركوك - 29 حمام كيشني - 30 حمام بيشقو - 31 حمام دورك - 32 حمام مارجاش - 33 حمام ماني - 34 بيا امل - 35 اكس شري - 36 افرزة - 37 تم ابيض - 38 تم اسود - 39 شيدول - 40 ايشنة - 41 بويط واط - 42 بويط ذرب اللاب - 43 حياق - 44 زاهي طركوك - 45 زاهي لاجام - 46 كنار - 47 توترو مياط - 48 توترو برتقال البصر - 49 توترو اكاب - 50 پتال لاجيل - 51 پتال اسر - 52 برور





ش

لاحت. قوائمها مستطيلة ، دقيقة || ثوبها الى السمرة السوداء باستثناء قاعدة الرأس والقوائم فانها زنجارية اللون || تعيش من قصتها على سطح المياه الراكدة وعلى الضفاف حيث تلمس بين النبات وبذات الرشاقة التي تظهرها على سطح الماء .

Aloes (S).

١٤٧٨٣ - شاكيل

Aloes (E). Allice shad (E).

جنس اسماك كبيرة القدر من فصيلة الصابونيات . انواعها قليلة العدد موطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها مفلطحة مستطيلة ، حنجر بطنها شائك الخرافش || اشهر انواعها الشايل البهلل والصابيرة .

Aloes vulgaris (S). * شاكيل مبدئي

Aloes commune (F). Common allice shad (E).

نوع من الشايل وهو سمكة كبيرة القدر تطفل من ٧٠ الى ١٠٠ سم . موطنها المتوسط والاطلسي . تمراً في الماء العذب وقد يتم ذلك في الربيع ثم تنبد الى البحر في اواخر الصيف || لحمها اللين اللحم . لكنها كثيرة الهلك .

Gros et gras (F). Stout and fat (E). شاكين

صغة الحيوان السمين الكائن .

١٤٧٨٦ - شاكين ، شُرْصُون

Imperméable à la lumière (F). Light-tight (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا يتغلل منها النور .

Arboretale (F).

١٤٧٨٧ - شاجير

Living in trees (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالاخجار او يعيش من الاجزاء وطبها .

١٤٧٧٩ - شاكيرات الماء

Hydrometriscidae (S). Hydrométrides (F). Hydrométrides, Water striders (E).

فصيلة حشرات من لفصليات الاجنحة . حشرات هلام طرلح الاربل تلمس فوق الماء كأنها تفرسه || ابتناسها وانواعها عديدة اشهرها الجورس وشابة الماء .

Hydrometra (S). * شاكيرة الماء

Hydromètre (F). Water strider (E).

جنس هلام من فصيلة شاكيرات الماء . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها نحيلة الاجسام ، دقيقة الاربل المستطيلة . تعيش من قصتها فوق المياه الراكدة . تلمس على سطح الماء بنفلة || موطنها جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة .

١٤٧٨١ - شاكيرة الماء الرمضاء

Hydrometra cinerea (S). Hydromètre gris (F).

حشرة من فصيلة شاكيرات الماء . جسمها صغير مستطيل بطول من ١١ الى ١٤ سم . || رأسها دقيق ، مكور الطرف . غطائها نحيل . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان ، فاشرتان . كسولها شبه برنسي الشكل . ظهراتها ضيق وقصير . قوائمها مستطيلة . اوصافها ثلاثية النعل || ثوبها الى الوردية البهراء يمتد في الرأس وفي كل حرقفة ويغور || تعيش من قصتها على سطح الماء حيث تلمس بهرمة منشفة .

١٤٧٨٢ - شاكيرة الماء التقيمية

Hydrometra stagnansum (S).

Hydromètre des étangs (F).

حشرة من فصيلة شاكيرات الماء . جسمها مستطيل الحجم بطول من ٩ الى ١٣ سم . رأسها دقيق مستطيل . غطائها قصير . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان كبيرتان . كسولها اسطواني الشكل ويطبها ايضاً . ظهراتها ضيق



فايرة الماء



شايل بهلل

١٤٨٠٤ - شاكري هو خائف المراقبة ، اطلبه .

١٤٨٠٥ - شاكيب ، شاكيف Malgre, Sec (F).
Mesgre, Dry (E).
المهزول من الحيوان شديراً او خائفاً لا مبرئاً .

١٤٨٠٦ - شاش الشافسي
هو البليس وهو الكاكج ، اطلبه .

١٤٨٠٧ - شاص ، شوتو Ralde (F). Stiff (E).

١٤٨٠٨ - شاصير Faon (F). Fawn (E).
الشاصر والشصر : ولد الطيبة .

١٤٨٠٩ - شاطيب Anomoure (F).
لنت تعريفي يطلق عل كل ذنب يشك شكله عن المألوف .

١٤٨١٠ - شاطيركة هي البطونيقا الطيبة ، اطلبه .

١٤٨١١ - شاطط Anomal (F). Anomalous (E).
شاذ ، غالف لواميس الطيبة او تولامدها .

١٤٨١٢ - شاطي Bord, Rivage (F).
Edge, Shore (E).
هو شط البحر او النهر .

١٤٨١٣ - شاقب ، شاقب Rameux (F).
Branching (E).
الشعر الكثير الفروع .

١٤٨١٤ - شاقب Sparsile (F). Sparsile (E).
الشاقب هو التيم المنظر في الغشاء . كل نجم لا يدخل
في جموعات الابرار او المجموعات الكوكبية يعتبر من
الشواقب .

١٤٨١٥ - شاقم Asymétrique, Inégal (F).
Asymmetrical, Unequal (E).
صفة الشيء اللاتناسق الاجزاء . م. شواو وشياه . ج
شراخ وشنو .

١٤٨١٦ - شاف Curatif (F). Curative (E).
صفة العلاج الذي يقضي عل المرض فيسبب الشفاء .

١٤٨١٧ - شاق Ulcère (F). Ulcer (E).
هي القفرة او القفرة الداملة .

١٤٨١٨ - شاكير هو الشفر ، اطلبه .

١٤٨١٩ - شافع Bôlier (F). Ram (E).
الشافع من الشفان كالتيس من الحزى .

١٤٨٢٠ - شاقول ، شاقول ، شاقول
Fil à plomb (F). Plumb-line (E).
جهاز مركب من قلمة من النحاس او الحديد عمودية
للشكل ، معلقة بخط قوي ، يستعمله البناء لقياس من صفة
عمودية اتجاه ما ينس .

١٤٨٢١ - شاكّة Acena (S).
Acéna, Acéne (F). Burr, Rosy spined bur (E). Wier-
derhaken, Acline (D). Acena (I).
جنس نباتات برية وزراعية تريبتين من فصيلة الورد يات.
انواعه قليلة جميعها صغيرة القند . بعضها وفروها شاكّة .

١٤٨٢٨ - شاكح Autotrophe (F).
Autotrophic (E).

شاح م. شاحية ج. شواح. نمت تعريفي يطلق عل جميع
النباتات التي تحصل مواد الغذاء من الطيبة فتصيرها وتطعمها
بواسطة الطاقة الشمسية .

١٤٨٢٩ - شاكبة ، شاكبة Déchaumouse (F).
Scrubble-plough (E).
عمرات الشب او الفلاح .

١٤٢٩٠ - شاحين
الشاحين من كلاب الصيد الذي يبعد الطريد ولا يصيده .
ج شواحين .

١٤٢٩١ - شاكبة ، كميثون Camion (F).
Dry (E).
سيارة مجهزة لنقل الاحمال .

١٤٢٩٢ - شاكول Mimécluc (F). Mimetic (E).
لنت يصنع تعريفي يدل عل نبات الذي ينسج شكلا
وليا مع البيئة التي يعيش فيها .

١٤٢٩٣ - شادين Faon (F). Fawn (E).
ولد الغلبة .

١٤٢٩٤ - شادج Hématite (F). Hématite (E).
هو حجر الدم ، اطلبه .

١٤٢٩٥ - شادوف Chadouf (F). Well-sweep (E).
الشادوف او الدالية آلة بسيطة قديمة المياه والاستعمال ،
تولمها دلو وثقال . كانت لا تزال تستخدم في رفع المياه
من مجاريها المنخفضة .

١٤٢٩٦ - شادي Carcopichèque de Sabe
هو هجرس ساء ، اطلبه .

١٤٢٩٧ - شاكّ Héteroçlita (F). Heterodita (E).
ما مخرج من قواعد المجانسة او من مألوف نومه .

١٤٢٩٨ - شاكّ ، شاكّ الموضع المليط الكثير المجازة .

١٤٢٩٩ - شاكّ Désoepercaler (F). To uncup (E).
شار واشتار الحسل : استخرجه من القوقية واجتناه فهو
مشهور .

١٤٨٠٠ - شاكود ، لرون Ion
الشوارد والايونات هي لنوات التحليل وتكون بلوروما لنوات
التحليل الكيماوي الناتج عن مرور التيار الكهربائي في
الجسم المقصود . رابع لرون .

١٤٨٠١ - شاكودي Ionique (F). Ionic (E).

١٤٨٠٢ - شاكولات الأجنحة Phalpenaes (F).
رتبة شحات نالفة من طبقة صصيات الجناح . فصائلها
ولجنتها كثيرة العدد . تتميز بروبوها السوداء . يتألفها
مستلة القند ، اجنتها مستطيلة ، تأكيدها مجهزة للنص .

١٤٨٠٣ - شاكولات الأسنان Acrodontes (F).
Acrodontes (E).

لنت تعريفي تصوف به النظام من فوات الانسان الشارة
المتركة في الحالة الخارضية من الفك الاعل . يقابلها
قابضات الانسان .



شارات الإجنحة

أوراقها مركبة . وريقاتها فضية تصل المسن الحلق .
أزهارها حلقة تتجمع صغيرة اللقد يندب لها الأصفر
والأحمر || أنزماردا صيني .

١٤٨٢٧ - شاكيس * Apogonius (F). Apogonius (E).

كل نبات يتكاثر بالبرعمة أو التعملة لأنه قد غاصت
التكاثر بالانصباط الطبيعي أي بتطويع الأزهار يدعى
شاكس .

١٤٨٢٨ - شاكس * Flanc (F). Flank (E).

هي الإحل والخاصرة . ج شواكل .

١٤٨٢٩ - شال *
Synodontis (S). Synodonta (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلوريات أنماه نحو ١٥
جميعها من اسماك مياه المناطق الاستوائية والحارة . أشهر
أنواعها شال النيل ورازقون والسبي والقرقرور . جميعها
ماكولة ، غريها متوسطة الحسنة .

١٤٨٣٠ - شاليم * Saiga (F). Ryo (E).

هو الشليم ، الحلبه .

١٤٨٣١ - شالوف * Cascade (F). Waterfall (E).

هو الشلال صخر حجه وارفع منحد .

١٤٨٣٢ - شامك *
Odor (F). Smell (E).

اسمى حواس الجسم الحاسة لاسيا عنه الحيوان الذي يعتمد
عليها في ذلك || حواس الشم هو الالف يلمس بالته الأمل
مذلف بفشا غاطلي يلمس الأصابع التي تظل الإحساسات
التياسة الى المراكز الخاصة بها في المخ .

١٤٨٣٣ - شامكة * Membre (F). Limb (E).

الشامة : قائمة أمانة . ج شوامت . ويقال لها الشاركة .

١٤٨٣٤ - شامك *
Thérillon (F).

جنس حناكب من فصيلة التناذيات . أنواعه عديدة جميعها
متوسطة القد أو صغيرة . أجسامها شبه يفسية الشكل ،
جوانبها دقيقة مستطيلة . تحبب نوسها حل النبات وفي
تجاريث الصنوبر والجندار والابنية المنجورة .

١٤٨٣٥ - شاميلات الكف * Totipalmes

بنية طيور من شكيات التتم فيها البجع والذئق وليمها .

١٤٨٣٦ - شان * Sutura du crâne (F). Sutura from the cranium (E).

هو درز التفتع وفرويشل الدرز الأكليل واسم ولأسم .

١٤٨٣٧ - شاكيبه * Fragata, Azagen (S). Fragata (F). Frigate-petrel (E).

جنس طير من كليات القدم وفصيلة البجيات . له نوام
مرفوفان : الشاكيبه المغايبة والشاكيبه الحذية || أعطانها
مجامع البلاد الحارة والاستوائية . تألف المواقى الصخرية
والصنوبر الشائرة حل البحر || أجسامها مستطيلة .
أذناها فائقة . متطابعا متدلة التجلط ، حذبة الملائط
التي الليرة . متفلفة الملائط السفلى . أوصافها قصيرة .
شانت أجسامها نصفية الكفاف . غاليها حذبة . ذرية ||
طيرانها شديدة السرعة . قوتها الإسمالك تنقص طليها من الأجواء
كأسهم وتخلصها من متفادى الجريج والأخيل والقرور ||

تتميز في صنوع شيف الصنوبر وفي ألقاها العام تلو
العام والشم قرب الشمس . شحبتا مؤلفة من يفتين لونها
الى البياض الأبيض تملو ماجة غضراء أو حمراء وبهش
التفتل الجفورية . القريش يستمر نحو أربعة أسابيع تقود
به الاثنى دون الذكر الذي يكون لها الفناء .

١٤٨٣٨ - شاكيبه علكيبه * Fragata marinus, Azagen aquilus (S). Fragata-Algie, F. marine, Grando frigate (F).

نوع من الشاكيبه . طائر كبير اللقد ، مستطيل الجسم ،
طوله نحو ١٠٠ سم . وبهش نحو ٢٢٠ سم . أما وزنه
فلا يتجاوز ١٥٠٠ غرام || ثوبه أسود اللون ، أغضر
المواج . زووه ومقاند الى الحفرة . حلقه عتة شديدة
السواد . رجلاه الى الجفوة || قوته الإسمالك يمتلأها من
البحر ويخلصها من متفادى طيور الماء || أعطانها مجامع
أفريقية الاستوائية والحارة أن حل المحيط الاطلسي أو حل
المحيط الهندي .

١٤٨٣٩ - شاكيبه هندية * Fragata minor, Azagen minor (S). Fragata indienne, Petite frigate (F).

نوع من الشاكيبه . طائر متوسط اللقد ، مستطيل الشكل ،
يطول نحو ٦٠ سم . ويبلغ بسطه نحو ١٢٠ سم . وزنه
لا يتجاوز ٧٥٠ غراما || أعطانها تفت من مجامع جزر
الترابج الى الهند والبحر الأحمر || ثوبه الى السواد الأزرق
المواج . مقدم عتقه الى البياض الأبيض . حلقه عتة
سكنية اللون . مقاند شديدة السرعة . رجلاه الى السرعة
يطولها مواج بحري || قوته الإسمالك يمتلأها كالشاكيبه
المغايبة ويدفن عتقا في صنوع الصنوبر وألقاها .

١٤٨٤٠ - شاه أسيرم رصي * Querrellet (F).

أطير خزامى بحرية .

١٤٨٤١ - شاه بكار * Autour commun (F). Goshawk (E).

هو البازي ، أطير .

١٤٨٤٢ - شاهبختج * Armée conys (F).

هو البرابون ، أطير .

١٤٨٤٣ - شاهبختوط * Châtignier (F).

هو لكسكنا ، أطير .

١٤٨٤٤ - شاهبختوط الحيسان * Marron d'Inde (F). Horse-chestnut (E).

قوة اللندلي الهندي ويقال لها أيضا قسطة الحسان
وقسطة مرة .

١٤٨٤٥ - شاهقرج * Fumaris (S). Fumeterra (F). Ramping fumitory (E). Erdrauch, Rankenerdrauch (D). Fumozerno, Fuma- ria di Bor bianca (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة التفتجريات . أوراقه
مستطيلة ، متطابقة ، مركبة . نصلها كبير القفريش ،
ياحت الأغصان البحري ، يفوح منه عتة اللقد مادة طيارة
تقتل قمل الخنثان تأخذ الآلاف وتدمع العين || أنزمار
لاقلمية التجميع ، صغيرة اللقد ، لونها الى البياض
الأخضر يملو مواج وردى .



شال



شالو



شاكيبه



شاهقرج

١٤٨٨٨ - شاكور * ، كُسر

Brayers anthelmintica, Hagenia abyssinica (S).
Couscousier, Couso, Kouso (F). Kuso, Tapeworm plant (E). Kesobum (D). Cuso (I).

عجوة برية طيبة من فصيلة الورديات منها بلاد الحبشة .
اوراقها مركبة متعاقبة ، ورقها سناينة النصل ، مجنحة الشكل .
اثمارها عشوية التجميع ، تاجية الارتكاز تستعمل في الطب وتقتل في مدة مستحضرات اعصها الادوية المعوية .

١٤٨٨٩ - شاكوي Aguardier (F).
هو السقاء الذي يوزع مياه اري على مستحقها .

١٤٨٩٠ - شاكع ، شفاع ، مشتوك Indivis (F).
Unidiv (E). هي الملكية الشاملة وهي حالة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره .

١٤٨٩١ - شاكك النجار Echinocarpus (F).
Echinocarpus (E). من النباتات ما كانت تقود ثماره محفوفة بالغلب الشاكك .

١٤٨٩٢ - شاكك الجناح Uncipenne (F).
من الطير ما كان جناحه مجهز ببعض الريش الشاكك الاطراف .

١٤٨٩٣ - شاكك الدكيب Echinure (F).
Echinurus (E). تمت تربيته يطلق على كل حيوان او دوية يملؤها في ذنبها حلب شاكك .

١٤٨٩٤ - شاكك القترام Echinipède (F).
Echiniped (E). تمت تربيته يطلق على كل دوية او شجرة يملؤها في قوائمها مناعس حادة كالشوك او حلب بجانب شاكك .

١٤٨٩٥ - شاككات الرأس Acanthocéphales (F).
Acanthocéphala (E). صنف من الديدان الطفيلية رؤوسها واعطائها مسلحة بالشوك .

١٤٨٩٦ - شاككات الزعاف Acanthoptera (S).
Acanthoptères, Acanthopterygians (F). Acanthopterygien (E). رتبة من الاسماك الطفيلية .
لصالحها واجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها بري || اشهرها البوري والثن والقاروس والمربان الخ .

١٤٨٩٧ - شاكيل الدليل Niqueté (F).
Nicking (E). الدرس الذي تلمت طفل ذنبه الخافضة لتسحق .

١٤٨٩٨ - شاي Thea (S).
Théier (F). Tea plant (E). جنس نباتات برية وزراعية صنافية من فصيلة الكاسيات .
مهل الصين . انواعه ١٦ جميعها متعاقبة الاوراق المنقطة ، تصلها شفرير القند ، مستطيل الشكل ، مسن الحافة .
اثماره ابوية الارتكاز ، فردية او ثنائية التجميع ، لونها يراوح بين الالبيص والاصفر .
عرفها غانت الرائحة المسكية || اشهر انواعه الزراعية الشاي الصيني ، اطليه .

١٤٨٩٩ - شاعترج معزني * ، بكلكة الملكة

Fumaria officinalis (S). Fumeterre officinale, Fiel de terre (F). Fumitory, Fumitarre (E). Echter Erdquich (D). Fumosterno officinale, Fiele di terra (I).

نبات عشبي حولي بري طلي من فصيلة الشاعترجيات .
اوراقه مرة العلم غزيرة المادة القلوية القمالة ويبيض الحولف الصغوية النانسة .
فركها يمرر مع محلول من مواد طيارة تبيح الالف وتوسع العين .

١٤٨٩٢ - شاعترجيات Fumariaceae (S).
Fumariacées (F). Fumariaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها نباتات عشبية .
اثمارها متدغاة الاراسات ، مزوجية الفسل ، رباعية البلات ، ثنائية الاسدية الجانبية الارتكاز الثلاثية الانقسام || ثمارها جرد ثنائية الكرايل .
يزودها اسية مزوية .

١٤٨٩٣ - شاكهد Témoin (F).
Witness (E). هو الذي يدل بالشهادة .
والشاهد قد يكون :

شاهد إثبات Témoin à charge (F).
Witness for the prosecution (E). شاهد زور Témoin faux (F).
Falsely witness (E). شاهد حل الشخصية Témoin certifié (F).
Certified witness (E). شاهد غير مباشر Témoin indirect, Médias (F).
Mediate witness (E). شاهد قابل العن Témoin reprochable (F).
Reproachable witness (E). شاهد في Témoin à décharge (F).
Witness for the defence (E).

١٤٨٩٤ - شاكسفرم - هو الحق الصغير ، اطليه .

١٤٨٩٥ - شاك صيني - هو التاميل ، اطليه .

١٤٨٩٦ - شاهين Falco peregrinus (S).
Falcon commun, F. pèlerin, F. voyageur (F). Peregrine falcon, Royal falcon, Shahn (E).

طائر من السنور فضيلة الصقريات .
عرفه مدينة مشهورة في معظم الاقطار الاسيوية والاوربية .
يعو كبير الحادة والسقط ، اسود الرأس ، طويل القوائم ، واسع العينين ، رجب الصدر الاخير المشرب ، قصير المتق الابيض ، نعل ، ازور ، جليلة الفطنين ، قصير الساقين .
ذنبه اسود مستطيل تعلو بعض الزرق || وهو اريد من الصقر واييس مزاجاً ولاجل ذلك تكون حركته من القمل الى السفلى شديدة الانخفاض ||
جمه شواحين وشياطين .
قال فيه عبد الله بن المبارك :

وقد يلتصق المرء حائوياً بجنحه
وقد قصمت لك الحانوت بالدين
بين الاساطين حانوت بلا غلق
تتباين بالعين اموال لساكين
صيرت دينك شاعياً قصيد به
وليس يفلح اصحاب الشواحين

١٤٨٩٧ - شاهين Alshahin
الشاهين نجم ثير من كوكبة العقاب .



شاعترج معزني



شاهين



شاي ، كسر



شاي المروج



شاي بسلقالية



شاي صيني



شَبَّ اللَّيْلِ

تزارح من ٣ الى ٤ اطار // اشتهر اوراقها يبدأ بند
القرن بثلاث سنوات واجود الاوراق ما تنج من الاذنان
القنية // اشتهر البلاد للنبذة القاني : الصين ، واليابان
والهند واثمة الصينية وجزر الزنج وسرنديب .

١٤٨٦٦ - شاكين *Théina (F)*
للادة القلوية الموجودة في ورق الشاي وهي مضطها من
البين .

١٤٨٦٧ - شَبَّ *Alun (F), Alumi (E)*
الشب او حجر الشب ، ملح معاني بلوري التركيب
ايضاً اللين حاسر الطم يتكون في الطبيعة من بعض
الكبريتات اخصها كبريتات الاوليوموم وكبريتاتسيوم .
يأوب في الماء ويصهر في حرارة ٩٢° س // يستعمل
في عدة صناعات اخصها الصبابة القطنية والصيفية حيث
يثبت الاالوان ويذكيها ، ويستعمل في ترويض المياه الملوحة
وفي سفل الجلود من الاصلح ... كما يستعمل في الشب .
وهو من القلويات التي توفى الزيف والرواح .

١٤٨٦٨ - شَبَّ اللَّيْلِ * ، نَوَّار اللَّيْلِ ، شَوَّاق ،
شَبَّ الظرف

Mirabilis (S), Nyctage, Belle-de-nuit (F), Four o'clock plant (E), Wunderblum (D), Balis di notte, Mervaglia, Gelcomino di notte (I)
جلس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النرجس . اوراقها
مديدة تتميز بطورها القنية الشكل ، اوراقها متعاقبة ،
السفلية منها مسقة اما العلوية فلاقة . ازهارها بزرقة
الشكل ، زامة الاالوان ، تتفتح في الليل واثلاجها يوم
من غروب الشمس الى سطور البجر // اشهر انواعه
الزينة ما يتبع .

١٤٨٦٩ - شَبَّ اللَّيْلِ الإثري ، شَوَّاق الإثري
Mirabilis dichotoma (S), Nyctage dichotome, Belle-de-nuit dichotome (F)
نوع من شَبَّ اللَّيْلِ وهو عشبة معمرة تملو من ٦٠ الى
١٢٠ سم . ساقها نحلة . اوراقها لائقة ، بيضية . ازهارها
صغيرة ، لائقة ، عطرية العرف ، يضاء اللون او حراء .
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٤٨٧٠ - شَبَّ اللَّيْلِ الجلسي ، شَوَّاق جليسي
Mirabilis jalapa (S), Nyctage faux-jalap, Belle-de-nuit faux-jalap, Mervilla du Pérou, Herbe triste (F)
نوع من شَبَّ اللَّيْلِ وهو عشبة معمرة تملو من ٥٠ الى
١٠٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ، نصلها اذنب الصفعة
السفل ، ذلق الزام الامير . ازهارها حادة العرف
تظل نحو ٣ سم . لونها زجاج من الالبيش الى الاحمر
والاصفر والمزيج // ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .
جنودها تستعمل في غش الجلب .

١٤٨٧١ - شَبَّ اللَّيْلِ المستطيل الزهر ، شَوَّاق
مستطيل الزهر
Mirabilis longiflora (S), Nyctage à longues fleurs, Belle-de-nuit odorante (F)

نوع من شَبَّ اللَّيْلِ وهو عشبة معمرة تملو من ٦٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها زينة النصل دقيقة . ازهارها مستطيلة
الانبيب ، خلية البصرة ، فولية العرف ، يضاء اللون ،
حراء القاعة الداخلية // ازهارها يستمر من تموز الى
ايلول .

١٤٨٥٩ - شاي *Thé (F), Tea (E)*
هو ورق جنبة الشاي يعني نيجع ويصف في الشمس .
ثم يلف ويحص في مجاف خاصة . ثم يند للاستفوك
يعد تحضيره ومزجه بلسب متفارة للقد بين شطفت
استاف الاوراق // عصوره العالي الحولي زنة ٥٠٠٠٠٠
طن // اما تركيبيه المتصري فهو :

ماء من ٨٥٠ الى ١٠٧٠ %
رمد من ٨٠ الى ٧٠ %
مواد ازوتية من ٢٣ الى ٢٥ %
مواد دهنية عطرية من ٣٨ الى ٧٨ %
حطان من ١٥ الى ٢٥ %
شاوين (بين) من ١٠ الى ٣٨ %
وبعض الحامض البضوية والاملاح المعدنية بلسب يراوح
مجموعها من ٣ الى ٧ %

١٤٨٩٠ - شاي العَرَب هو القات ، اطلبه .

١٤٨٦١ - شاي اللُّرُوج * ، قسوس
Ladum (S), Lédon, Romarin sauvage (F), Crystal-tea, Marsh cysus, Marsh rosemary (E), Sumpporat, Wilder rosemarin (D), Ledone, Ramerino di palude (I)

جلس نباتات معمرة ابيدة من فصيلة الخلنجيات . انواعه
قليلة بعضها بري وبعضها زينة . سويقها فرام تملو من
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة عطرية العرف .
ازهارها حذوكية التجميع ، تاجي الازنكار . ازهارها
خامسة البلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حربية
الرائحة // اوراقها حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال
الشاي // اشهر انواعه ما يتبع .

شاي المروج المنقضي
Ladum palustre (S), Lédon des marais (F)
شاي المروج العريض الورق
Ladum lasifolium (S), Lédon à feuilles larges (F)

١٤٨٦٢ - شاي المكشيك هو الزنج ، اطلبه .

١٤٨٦٣ - شاي بَرَاظوي هو جبهة الشاي ، اطلبه .

١٤٨٦٤ - شاي بسلقالية * ، مَوَرْدَه أَرْجَوَانِيَّة
Monarda purpurea, M. didyma (S), Monarde pourpre, Thé d'Oswego, T. de Pinaylania (F), Oswego tea, Mountain tea, (E), Oswego, Doppelblauenbaltan (D), Monarda crenalis, M. scabratia (I)

نوع من المورده . وهو نبات عشبي معمر من فصيلة
الفلويات . ساقه كثيرة الازاد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم .
اوراقه متعقة ، نصلها كامل الصفعة ، ساني الشكل .
ساقها الحافة ، اذنب البصرة ، عطري الرائحة . ازهاره
حذوكية التجميع ، مستطيلة اللقد ، ارجوانية اللون ،
فواسه العرف // ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .
اوراقه حمية نائمة تستعمل الشاي .

١٤٨٦٥ - شاي صيني *
Thea chinensis, T. viridis (S), Théier de Chine (F), Tea plant (E), Teosrauch (D), Té, Thé (I)

اشهر انواع الشاي واعبها واكثرها زامة واكثرها صروباً وايديها
انتاباً . وهو شجيرة معمرة تملو من مترين الى ستة اطار .
متوسط علوها نحو ٣٥ سم . ترطب في الغمام وفي الارابة
المروية القليلة الانتساج . تحضى بطرية القرية المستحكمة
ولا تتأثر بالبرد // تفرس كقتول في سطرها على ابعاد



شَبَّ النِّهَار

١٤٨٧٧ - شَبَّ النِّهَار * شَبَّاب مَعَكَّتْ الْأَلْوَان

Convolvulus tricolor (S). Belle de jour, Lisaron tricolor (F). Three coloured bindweed (E). Dreifarbiges Wind, Kriechwinde, Winde (D). Bella di giorno, Emarocalle (I).

نبات عشبي حولي ترابي من فصيلة البلياتات. لوراته اعليجية الشكل ، تصلها خلي البشرة . اثماره كبيرة القد ، زرقاء البوق بضاء الانبوب ، صفراء القاطعة . تنتشر في النهار وتعلق في الليل || فروبه التريينية مدينة جميعا زاية الالوان || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٤٨٧٣ - شَبَّاب حُر الطَّبْع ، اُطْبَا .

١٤٨٧٤ - شَبَّاب * *Coleophora, Espista* (S). *Coliophora, Espista* (F). *Cambesars* (E). *Festermotten, Seckmotten* (D).

جس فراش من المعطيات . انوعه مدينة اسطفا الاقاليم للمنتلة والباردة . جميعا نخيلة الجسم صغيرة القد ، بطنها تراوح من ١٦ الى ٢٢ مم . اجسامها حنطة . رولتها الانامية الى الصفرة تعلوها الزواشك المخططة الالوان . رولتها الخلفية الى البياض الاخير بطنها يختلف مداه ولبه مع الانواع . اطراف رولتها عريض التذهيب . تكثر فيه الالوان اللطيفة كالاحمر || رولتها تحمل قرابا لا يماسي الشكل والابن تليها الى كما تقفل الحلاتين . وهي عاصلة واثارة تركيب النباتات البرية والاشجار للشرية تفتحم الازواك والبارا .



شَبَّاب

١٤٨٧٥ - شَبَّابَة

النشابة : بالقرب سامة تولد . ويقل يقرب صفراء . فطول حة المقرب .

١٤٨٧٦ - شَبَّابُوس

هي الشباروس ممكة من السريوس ، اُطْبَا .

١٤٨٧٧ - شَبَّابُوس * شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس

Oreus antiquorum (S). *Oreus antiquus, Bugrana, Arrée-boud* (F). *Tall narrow-row* (E). *Söldliche Hasel* (D). *Bulimacola, Arrée-boud* (I).

نوع من البق وهو جنية متوسطة القد حليلة الجلود المستطيلة . الاقنية الاستعداد . لوراته مركبة ، عاقلة الخمار . انواره متقوية التسبيع جميلة الشكل صفراء اللون يعلوها ترخيش وردي || يقال انها من النباتات النلية نفع انوارها ينفع الصدر .

١٤٨٧٨ - شَبَّابُوس

Février (F). *February* (E). يعرف ايضا بـشباب و فبراير . الشهر الثاني من السنة الشمسية مركب بين كائون الثاني وآذار . وهو من استحداث الفريسي وكان معتم شهر الطهور وآخر ظهور السنة . ثم اسبح في ربهه الحالى منذ القرن الخامس قبل الميلاد . عدد ايامه ثمانية ومطرون يوا ١٥ في الستين الكيسية فهو تسعة ومطرون || في السابع منه تسقط الجيرة الاول ثم يجري الماء في البعد . وفي الرابع عشر تسقط الجيرة الثانية وفي الحادي والعشرين تسقط الجيرة الثالثة . ومنى سقوط الجيرات ان الناس كانوا يتصلون في قديم الزمان اغنية ثلاثة في الشتاء يحيط بضعها يبيض وكان انباء الاول ملى لنواجم الكبار كالحبال والابل والقر . والحاد الثاني لنواجم الصغار كالتمر وم كائون في الحاد الثالث . وكانوا يطلون جرات النار في كل غياه ويصطلون



شَبَّابُوس

الجمر للاصلاح . فلما كان السابع من شباط اجبروا دواجم الكبار الى الصحراء ويصلوا الصغار مكانها وم سكنوا مكان الصغار فتمت سقطت من الجيرات الثلاث جرة . فلذا مضى اسبوع آخر اجبروا البق ايضا الى الصحراء وم سكنوا مكانها فسقطت جرة اخرى . فلذا مضى اسبوع آخر اجبروا الى الصحراء وتركوا اشمال النار لقلعة البرد وطيح الهواء فسقطت الجيرة الثالثة || وفي السادس والعشرين من شباط اول ايام السجوز واسباس السجوز سمة : ثلاثة من شباط واربعة من آذار وهي لاخضر من البرد والرياح .

لقومعه الزواحي . احواله الزراعية مدينة . احصاها :

١ - في الزراعات العلة الموصية - توزيع الاسمدة الازوتية النيتراية على الزروع بمعدل ٢٠ كيلو لطن الواحد وذلك لتنشيط النمو الخضرى الذي يقرر جودة الاسبال ووفرة الانتاج . بلز التحول . الاعتناء بمشاكل البقول والتبوع وقايتها من تقلبات التبول الجوية من حيث الحشرات والاصام . المباشرة . عند اوامر الشهر ، بتوزيع الاسمدة الكيماوية للمركبة على الارثة لمدة لزراعة البقول والخضار .

٢ - في الاشجار الخضرية - متابعة فرس نصوب الاشجار المنترة على اختلاف انواعها . ومتابعة التشذيب والتقليم ثم قطع القلمة وسرقتها بكاملها . متابعة نضج الاشجار بالزيوت البيض الخفيفة وبالواكين القمالة .

٣ - في الحشويات - تهيئة وفرس مشاتل التارنج والليمون الحلو . تنظيف سوق وروع الاشجار من البعاد الصلقة والبقايا اليابسة والكشف على جلود الاشجار المعرصة للحاروت ونفسها بمطلي سلفات النحاس والكلس .

٤ - في الزيتون - اتمام جميع الاعمال الزراعية التي تمرر القيام بها في الشهر الماضي انصبا للتيسيد والحرق والتقليم والتقليم .

٥ - في الكفوة - حرق الكفوة وتقليمها ثم نفضها بمحلول سلفات النحاس . متابعة الفرس ان في المشاتل او في المستقر بعد مراعاة سيق التربة وفرونها الحكيمية وتقديرها الاندماجي .

٦ - في اللوز - المباشرة بفرس نصوب اللوز في الارثة الخفيفة الثقيلة الانساج . تسيد الزراعات القائمة بالاسمدة الكيماوية المركبة والانتباه الى اضافة الكلس حيث تدور الحاجة .

٧ - في الاشجار الحديقية والحرجية - متابعة فرس الاشجار النانضة والسرور والكرووريت والاراكليس النع .

٨ - في الخضار والبقول - متابعة زرع البقول التي صار تمدادها في الشهر المنصرم بضاف البها القريب والكميون والقرع . تسيد زراعات الباذنجان لتفحص على استمرار النمو والاشجار . المباشرة بزراعة الخيار والكوسى والقرع في الموائع الدافئة .

٩ - في الزهور - حرق التربة وتمشيتها ونثر الاسمدة الكيماوية المركبة . تقليم الورود والمباشرة بفرس الزهور الصيفية على اختلاف انواعها .

١٤٨٧٩ - شَبَّابَة

Carpiculture (F). *Carp-breeding* (E). الشبابة تربية الشبوط ، وقد تم ذلك في غدران فسيحة متوسطة الفود .

١٤٨٨٠ - شَبَّابُوس *Cordon & fixer* (F). *Fassen-string* (E). حيط يشد البني . لاستقراره في مكانه .



شباب



شيث الصلوات



شيث



شيث بري



شيطان



شيع

١٤٨٩٠ - شَيْتَالِيَّاتٌ * Geophilidae (S).

Geophilidae (F). Geophilidae (E).

فصيلة دويبات من الفخاريات الشفويات الاسك. اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها الشيطان .

١٤٨٩١ - شَيْتَالِيَّاتٌ * Demodicidae (S).

Demodicidae (F). Demodicidae (E).

فصيلة حشرات جلدية مجهرية من رتبة اقتراديات . لا ترى بالعين المجردة ، اجناسها مستطيلة ، ارجلها صغيرة . تعيش على غدد وبصيلات الشعر . تكاثر جميع الحيوانات الضخمية ولا تمتص من الانسان .

١٤٨٩٢ - شَيْتَعَةٌ * Buthus (S).

Scorpion jaune, Buthus (F). Yellow scorpion (E).

ج شياوع . جنس عقارب متوسطة القد او كبيرة ، سميكة اللون ، صفراء الخواج . تتميز بملامحها المزدوجة الانسان الداخلية . اصطناعها البلاد الحارة . تكثر في الارضية . مدمرها دجوي ، راجع عقرب .

١٤٨٩٣ - شَيْتَعٌ اصْفَرُّ Scorpion jaune (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب اصفر ، اظلم .

١٤٨٩٤ - شَيْتَعٌ خُطْمِيٌّ Scorpion brun (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب خطمي ، اظلم .

١٤٨٩٥ - شَيْتَعِيَّاتٌ * Scorpionidae (S).

Scorpionidae (F). Scorpionidae (E).

فصيلة دويبات ولد خيش من رتبة العقربيات . اجناسها وانواعها عديدة . اصطناعها البلاد الحارة . جميعها دجوية . تسمى في الابل وقسطنطين في القهار في غافق تألفها بين الحجازة وتحتا .

١٤٨٩٦ - شَيْتَعُوعٌ * Talitrus (S).

Talitrus (F). Talitrus (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات البليسا فضيلة الفخاريات . انواعها المهرولة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الباردة والمعتدلة الحارة . تعيش على السطوح الرملية . جميعها لاصقة وتتغذى في الليل بصره || اجسامها صغيرة . طولها من ٥ الى ٧ سم . ارجلها الى الشبهة القزواء يملؤها سراج مرجاني يتخللها الخشن حتى حدة حمار السمك || جميع انواعها مأكولة كالاربيان .

١٤٨٩٧ - شَيْتَعُورٌ Trifolium (F). Clover (E).

هو الثفل . وله جاء في لسان العرب : « ثبات شيبه بالرطبة الا انه اجل واعظم ورقة مغرب شيد بالقرنفة » .

١٤٨٩٨ - شَيْعُرٌ Empusa (F). Spoon (E).

الشعر المساة القويعة بين طرفي الابهام والخمصر عند كامل نحيها . متصلها ٢٢ سم .

١٤٨٩٩ - شَيْعُرَيْصُ Chameleon (F).

هو الجمل الصغير لا يزال يبيع له .

١٤٩٠٠ - شَيْعُرِيٌّ هو الشبارق ، اظلم .

١٤٩٠١ - شَيْرَكَةٌ Chiton (F). Cuckin (E).

انزهر سنبل قدي الشكل مشير الانزاهر القراكية المتأخرة .

١٤٨٩١ - شَيْكَمٌ * Skimmia (S). Skimmia (F).

جنس نباتات برية ريفية من فصيلة البشيات . انواعها قليلة العدد جميعها جنبات سريرية ترطب في المناطق المعتدلة المشربة نحو الحارة . سيقانها متضخمة فرياء . اوراقها عريضة متعقبة . نصلها جامد الصفحة الاطليجية توشم الغدد البقيقة الشفافة . انزهرها حشوكلي الشكل طرفي الارتكاز . انزهارها صغيرة قلقة ، كثيفة التجميع ، فواكه العرف المشحب . ثمارها عنية ، كرزوية الحجم ، حارة الين ، مأكولة .

١٤٨٩٢ - شَيْكَاكٌ هو البرونف ، اظلم . وقد تكتب ايضاً شاباك .

١٤٨٩٣ - شَيْبٌ Taureau (vieux) (F).

الشيب والشرب : السن من الثيران .

١٤٨٩٤ - شَيْبٌ Aneth (F).

هو الثيب ، اظلم .

١٤٨٩٥ - شَيْبٌ Demodex

جنس حشرات من الفيشيات الجلدية المجهرية . انواعها عديدة تعيش على غدد الشعر وبصيلاته . تتطفل على جميع الحيوانات الضخمية وقد تصيب الانسان فتصيب سقوط الشعر وما لا يطلق من الحكة .

١٤٨٩٦ - شَيْبُ الثَيْبِيَّاتِ * Demodex follicularum (S). Demodex follicularis (F).

نوع من الشيب المجهرية يركب الموائى اجسامها الاقار والاذنان وركب الكلاب والسانير ثفلت شعرا ويطويها ويضع بها لشد الاذى . وعندما يصيب الانسان يتركز عادة في وجهه .

١٤٨٩٧ - شَيْبٌ * Anethum graveolens (S). Anethum graveolens (F).

Aneth. Dill, Dill-seed (E). Gerandill, Dill fenchel (D). Aneto, Aneto odoroso, Neco (I).

نبات عشبي مسمر من فصيلة الخيميات . قريب لشبه من الثيار وله يستعمل استعماله في التوابل . اوراقه متعاقبة مركبة شطعية . يستخرج منها ومن البذور زيت طيار له استعماله الطبي || تنقع اوراقه وتجعلون عليه المدة والاماء ويعرفون بالغازات ويدعى الاصصاب .

١٤٨٩٨ - شَيْبٌ بَرِّيٌّ * Meum athamanticum (S). Aneth sauvage, Meum (F).

Meu, Bold-money, Spiguel (E). Wilder dillen, Feine Bärwurz (D). Mao, Mao barbuto, Finocchio (I).

نبات عشبي بري طلي مسمر من فصيلة الخيميات . تجلور وصاله واوراقه وبزوره قديم المدة وقوي القلب وتعرف الغازات وتؤخذ الفواكه . يستخرج من جميع اجزائه زيت طيار نافع له استعماله الطبي .

١٤٨٩٩ - شَيْكَاكٌ * Geophilus (S).

Geophilus (F). Geophilus (E). Erdläufer (D).

جنس دويبات مفرقة من فصيلة الشيطانيات . انواعها عديدة اجسامها مبطلة بيقة مستطيلة مركبة من ضراوات الخلفات . جرابها تد من ٤٢ الى ٧٣ زوجاً لكل حلقة زوج . اصطناعها العالم . تألف الارضية الرملية . تعيش تحت البيل والصلاب . تسرح في الليل . فواكهها فسفورية مسية . انثائها سطحية . قربها الخراطين والديدان . تعتبر من الدويبات الفاسدة لانها تنقسم الجزر والهداير .

14916 - **شَبَن** - Engraissement (F). Fattening (E).
حلف النواصير لتسمينها. وهي عملية اقتصادية ترتكز
على قواعد تقنية وريقة الارتباط بالنواصر الغذائية المختلفة
للمفاهيم التي تحموا الاكلات من الاعشاب الى الحبوب.

14917 - **شَبَنَم** & **كُزُور** - Casuarus (S).
Casuar (F). Casowary (E).

جنس طير من الشبنيات قريب الشبه من النعام. انواعه
٦ جميعها كبيرة الجثة. كناية الرأس ، جالسة المتأد ،
قصيرة العنق ، زغبية الريش. عملية الاطوار الزاوية
الاولان. ذكورها وانثاهما تتصل بالثوب نفسه بين ميزاتها
ان الذكر يحضن البيض دون الانثى || اصطناع بلاد
الهند وبورما. يأنف الثنايات الكثيفة وضفاف الأنهر
الدنلة. قوته الحشرات والمظاء والفصاغ.

14918 - **شَبَنِيَّات** - Casuaridae (S).
Casuaridae (F). Casuaridae (E).
فصيلة طيور من البرادي قريبة الشبه من النعام الا انها
اصغر حجماً وأقصر عنقاً وصفاً. تتميز بغطائها الكتانية،
بمناظيرها الجالسة ، بامتصاصها القصيرة ورياحها والوان
اللاصق. جميعها ضيقة الخلق تقور ومقوق.

14919 - **شَبَنَة** - Cuivre jeune (F). Brass (E).
هو النحاس الاصفر.

14920 - **شَبَة المعدن ، معدنيده ، فلزات** - Métalloïde (F). Metalloid (E).
اشياء المعادن مواد بسيطة تتميز بقلية اخصائيتها الحرارية
والكهروية ، كما تتوحد مع الاكسجين الحارص
والاكسيدات الاكتملة.

14921 - **شَبَة الشفاح ، الشفاح حكمي** - Quasi-usufruit (F).
صيغة فقهية مناهما الانضمام بالمستلزمات وعلى المستمع
الذي استهلكها او باعها فربما ان يرد امثالها وزناً وصفة
ومثلاً حين زوال الانتفاع.

14922 - **شَبَة حياكة ، حياكة حكمة** - Quasi-possession (F).
هي حيازة حق ارتفاق.

14923 - **شَبَة قَلَوِي** - Alcaloïde (F).
Alkaloid (E).

مادة عضوية ازوتية تستخرج غالباً من بعض النباتات
التامة لتناثبات الفلقة. راجع قلويد.

14924 - **شَبَهَان** - Laiton (F). Brass, Latton (E).
هو النحاس الاصفر.

14925 - **شَبَهَان ، صَمُور** - Pallurus (S).
Pallure (F).

جنس اجمار وبشيات شائعة من فصيلة البقيات.
انواعه عديدة تملو من مرتين الى ١٥ م. اغناسها كثيفة
مراكبة. اوراقها متصقة ، معقة ، بيضية النصل.
انزعاجها عنكولي التسجيع ، ابطي الانزكاك. انزعاجها
صنعة الله سفراء الون. ثمارها قيمة الشكل ، مرتفعة
الاطراف المحضة. يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية.
اشهر انواعه الشبان الشالك.

14926 - **شَبَرَقِي** - Amentiforme (F).
Amentiform (E).
ما كان شكله شكل الشبرقة.

14927 - **شَبَرَم** - Euphorbe ptyssa (F).
هو الشرب من النباتات الجحالية المؤذية ، اطلبه.

14928 - **شَبَرَمَة** - Vague hémipère (F).
حشرة مؤذية من ابلجات تنمى فلقوس ، اطلبه.

14929 - **شَبَرَة الطول** - Renouée des oiseaux (F).
هو ابطاط ، اطلبه.

14930 - **شَبَرَطَاط** - Persicaria indigotica (F).
هو ابطاط النيل ، اطلبه.

14931 - **شَبَرَة** - Polydesmus (S).
Polydesmus (F). Polydesmus (E).

جنس دويبات من فصيلة الشبريات. انواعه المروقة
خمس اجسامها مبطلة مستطيلة مركبة من ٢٠ حلقة
مضروبة الفواصل. طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم.
تألف الخدائق والياقل. تميش تحت اهيل مكررة كالحاتم.
قربها المولد البتانية. تسرح في الليل تقضم الجزر وماتر
البثيل الرنصة.

14932 - **شَبَرِيَّات** - Polydesmidae (S).
Polydesmidae (F). Polydesmidae (E).

فصيلة دويبات من الشبديات الشفويات الاربل ،
اجسامها وانواعها عديدة اشهرها الشبتر.

14933 - **شَبِي** - Nymphomania (F).
Nymphomania (E).

هو الانفلاق والقلعة يمد الى مهبان الشفر واستمرار حالة
الوثاق في الانثى.

14934 - **شَبِي** - Turgescence (F).
انتفاخ وتور في الاربعة يصلها ويزيدها حجماً.

14935 - **شَبَكَة** - Filet (F). String (E).
هي المبرقة تصاد بها الاسماك.

14936 - **شَبَكَة رِي** - Canalisation, Réseau de canaux (F).
مجسمة الانية في كثرن الري في مزرعة او منطقة او بلاد.

14937 - **شَبَكِيَّات الاجنحة** - Raphidiopères (F). Raphidiopara (E).

رتبة حشرات ناعمة من طبقة مصبات الاجنح. تشمل
فصيلة واحدة وبشيت الاجناس والانواع. اجسامها
متوسطة القد ، رؤوسها ناعمة ، بجانها مستطيلة. وهي
من الحشرات الاربعة للراحة في دورها البري والحشري.

14938 - **شَبَكِيَّة** - Rétine (F). Retina (E).
احدى طبقات العين الداخلية تأتي بعد القرنية والقرنية.
تتكون من وحدات مصية تبدو كالغشاء الرقيق ينفذ
سلح العين الباطني. مركزها وراء البصلة وهي تستقبل
الاشعة الضوئية فتنتقل عليها المزيقات التي تنقلها شبكة
الاصباب الى الشبكية البصرية بالمخ.

14939 - **شَبِيل** - Lionceau adulte (F).
Adult young lion (E).
ولد الامة اذا ادرك السيج اشبال وشبال.



شَبَرَم



شَبَرَم



شَبَهَان



شبهان شائك



شيرة سرطانية



شيرط



شيمة



شيط



شبكة

١٤٩٣٥ - شبهة * وتيلة الأبيسة

Segestria (S). Ségestrie. Araignée des caves (F). Cellar spider (E). Kellerkrippe (D).

دورية من العناكب الساعية القاصدة ثنائية الرايا مادية الشان من فصيلة الشيشيات || جسمها متوسط القد يصل نحو ١٦ م. عند الذكر نحو ٢٨ م. منه الأنثى صدرها مسطلي الشكل، اسر اللون، بنسجي الملوخ. عيناها زجاجيتان. شيفها ظليان خيلان. فكها عيوان. جرابها شطية، كتيبة الحلب. بطنها بيضي الشكل، اسود اللون، بنسجي الملوخ || تألف الكهوف والمغاور والأكبية والقنان والسكن الارضية. سرسها جديري. عذوها كعكة قرابية الشكل تسجها في الشقوق. قوتها الحشرات تسمى اليها بصره مدقة || لستها ملحة مؤذية تسبب حي غليظة تستمر نحو ثلاثة ايام.

١٤٩٣٦ - شبهة

Xanthium (S). Xanthium, Lampourde (F). جنس نباتات عشبية برية سولية من فصيلة المركبات انواعه || اوراقها متموجة، مدقة || مغرسة للتصل للنسج السفلى. ازهارها عذوكية النسيج، محورية الاذنكاز. منافسها الطبية عديدة تدخل في طب مستطورات وتراكيب لغير انواعها الحيتي والسلي.

١٤٩٣٧ - شبهة حيتي، كور السعيد

Xanthium abyssinicum (S). Xanthium abyssin, Lampourde d'Abyssinie (F). Burdock, Cockle-bur (E). Spitzklette (D). Lappola (I). نوع من الشيط. مهد بلاد الحيف. منافسها الطبية عديدة اعصها الامراض الجلدية.

١٤٩٣٨ - شبهة سيني

Xanthium strumarium (S). Lampourde des écrouelles, Petite bardane (F). Lesser burdock, Burrweed (E). Echte Spitzklette (D). Lappe, Lapolone, Xanto. Bardana minore (I). نوع من الشيط اللبلل مهد البلاد المعتلة الحرارة يكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة. يستعمل في معالجة داء الخنازير.

نوع من الشيط اللبلل مهد البلاد المعتلة الحرارة يكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة. يستعمل في معالجة داء الخنازير.

١٤٩٣٩ - شيط، صبر

Tuyas de pipe (F). هو قصبة الفلين من اي مادة كانت.

١٤٩٤٠ - شبهة

Amaryllis هو الاناريلس، اعطب.

١٤٩٤١ - شبهة

Nassa (S). Nassa (F). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفضلة الشيكيات. انواعها الماصرة المعروفة عديدة منتشرة في مظهر بحار العالم. جميعها شطية تعيش حل الكشعاف والرمال المصورة بالاء || اصداها شبهة بالسلال الشبكبة المتصلة للسبي. جميعها مغزلة الاغواق القدرية، متباينة المظهر الخارجي، منها المالسة والمخرزة واهدة والمخرزة || اجسامها كيرة. رؤوسها مسطحة، مسترسمة، ثنائية الياس المتصلة المعينة القواعد. اعطائها انبوية مسطحة. ارجلها قارئة ثنائية الاذينات الصغيرة الطرفية الاذنكاز.

١٤٩٣٦ - شبهان شائك، صغور شائك

Pallurus aculeatus, P. spina-Christi (S). Pallure épineux, Epine du Christ, Argolou, Porte-chapeau (F). Garland thorn, Christ's thorn, Jerusalem thorn (E). Söldlicher Stechdorn, Christdorn (D). Palluro, Spina di Christo, Porto capello (I).

نوع من الشبان الكثير الشوك المركب المسطلي الاعف. جنبته تملو نحو ٣ امار. يستعمل في السياجات. سياجه لا يشم. يمتد في جميع الارضية الزراعية ولا يخشى الرطوبة.

١٤٩٣٧ - شبهة

Adulte (F). Adult (E). هو من البقر والغلم والماعز ما تم نمو واكتست استاته. ويقال له شيب.

١٤٩٣٨ - شبهة

Chellifer (S). Chéllifère, Scorpion des livres (F). Chellifer (E). جنس حشرات نافعة من العنارب الكاذبة تعيش في البيوت وفي شقوق الاخشاب اليابسة قوتها الحشرات الصغيرة اعصها التي تفرس الاوراق والنبات.

١٤٩٣٩ - شبهة سرطانية

Chellifer caneroide (S). Chéllifère canéroide, Scorpion des livres (F). Book scorpion (E). Bücherskorpion (D).

نوع من الشيرة، دورية من فصيلة الكرنشيات وقية القربيات الكاذبة. موطنها جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتلة الحارة من العالم الاقدم || جسمها صغير القد يصل من ٤ الى ٦ م. قوتها الى السرة الخفية. صدرها مزولي. مقبها مسطليان شيتان علفطين كلفط المقارب. بطنها عادم اللذب. عيناها مركبتان صغرتان. جرابها دقيقة مسطلي || تألف الموالع المظلمة والبيوت الآلة والمخرزة. تعيش بين الاخشاب وفي شقوقها. قوتها الحشرات الصغيرة اعصها التي تفرس القباب والورق || تعتبر من النويبات النافعة اللامؤذية.

١٤٩٤٠ - شبهة، سبوت، سبوت

Cyprinus (S). Carpe (F). Carp (E). جنس اسماك مأكولة من فصيلة الشيطيات. انواعه عديدة مظهرها من اسماك المياه العذبة. جميعها كيرة القد طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. تتميز بفسخامة وسطها، وقله ذنبها وقصر رأسها ولين زانفها وروما فكها الاس. قوتها الاغشاب المائية. تعيش وتتكاثر في المساك البسيطة النور.

١٤٩٤١ - شبهة

Cyprinidae (S). Cyprinidae (F). Cyprinidae (E). فصيلة الشيايط من رتبة مفتوحات اللسان. تشمل عدة اجناس اشهرها الشيرط والبيس والمطوة.

١٤٩٤٢ - شبهة، شوقيات

Nyctaginaceae (S). Nyctaginaceae (F). Nyctaginaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجنتها وانواعها عديدة اشهرها شب الليل والبوتفيلية والابروية.

١٤٩٤٣ - شبهة

Scorpionex (F). Young scorpion (E). صغير الشيع والغرب.

١٤٩٤٤ - شبهة

شيرة الكثير، اعطب.

Calypso ١٩٥٢ - شجاعة ، كليبتوسبوره *
جنس شجر مجهرية من فصيلة الشصيات . انزاهه قليلة
تتميز بدعماطها الحليقة اللون ، المستطيلة الوترية ، الشفوية
الانقسام ، الثنائية أو الرباعية الاضية || اما دعماطها
فتتميز وتكثر على الخلايا الدامية اغصانها خلايا الوراق
والنواحي .

١٩٥٣ - شجاعة الشصام *

Calypso gaeppertiana, Acedium colum-
nare (S). Rouille de l'ailete (F).
شجر مجهرية يتطفل على النخيل فيسبب الوراق ويؤدي
النواحي . وهو من الفطور التي تقضي طورها الايدي
على النواحي وتتطفل بطورها النواحي على النخيل || ظهوره
الخارجي اصفرار في الوراق يفسه استجابة في النواحي
ثم جفاف في السماء وسلاية في الايات تؤدي الى اختلال
الانزاه النشوي تتسقط الوراق قبل زمن الاحمال وتبين
النواحي قبل اكمال دورتها الحولية || يكالغ باستعمال
مركبات النحاس .

Plant (F). Silp (E).

١٩٥٤ - شجاعة

هي كل نبت جديدة ستفاد الجلود يمكن نقلها وغرسها
في مستقرا . ج شتلي .

Hiémal, Nival (F).

١٩٥٥ - شتوي

Hiémal, Nival (E).
لست تعرني يطلق على كل نبات ينمو ويؤثر في الشتاء .

Plantule (F).

١٩٥٦ - شجاعة ، نيتية

Young slip (E).
كل شجرة في زمن النشوء الاول قبل ان يجرى اتلاصها .

١٩٥٧ - شت

لشت شجر مثل التخلع الصير . طيب الريح . مر العلم .
يدخل بوفرة وهو كوروك الخلاف . وله رمة مودة وسنة
صلحية فيها ثلاث حبات او اربع سوي مثل الشنيز يرماه
الحمام اذا انتثر . واحدة شة (السان) .

Abelle ouvrière (F).

١٩٥٨ - شت

Working bee (E).
هي النحلة العاملة . ج شحات .

١٩٥٩ - شجاعت هي السادة ، اطليا .

Arboriculteur (F).

١٩٦٠ - شجارت

Arboriculturiez (E).
النام المشتغل بالهث من احوال الشجر (ابن البطار) .

Dendrologie (F).

١٩٦١ - شجاعة

Dendrology (E).
علم يبحث في هوية الاشجار وتصنيفها وتقسيمها .

Echle carinata (S).

١٩٦٢ - شجاعت

هو الورد افس عظيمة ضمة الرأس دقيقة المتق رقاش
كوداء . اذا غشيت ولسان غلفها انفتحت . اصطناعها
البلاد الحارة تكثر في اواسط افريقية وفي الصحراء العربية
وفي اليمن .

l'Hydra femelle (F).

١٩٦٣ - شجاع اثني

Hydra (E).
الشجاع الاثني كوكبة نجوم جنوبية المخف مركبا تحت
الفراب والباطية والمنداس وفوق بروج السرطان والاسد

Nassidae (S).

١٩٤٢ - شجيكيات *

Nassidae (F). Nassidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الابريل .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من مستحبات
الاراضي المائية والبعض الآخر منتشر في سطح بحار
العالم || جميعها واجبة تعيش على جيف الحيوانات البحرية ||
اصداها مشابهة الاشكال ، يكثر فيها الشكل القلبي
المستطيل الطرف اللرب . جميعها ملونة ، بعضها مائل
الصفحة والبعض الآخر مسطح او محزوز او مخدود ||
اصناف اجناسها واشهرها الشبيكة .

Hiver (F). Winter (E).

١٩٤٣ - شجاعة

احد اصول السنة الاربعة يبدأ عصا تكوين الشمس في
ذروة بعدها من الست وهو يوم ٢١ كانون الاول في
نصف الكرة الشمالي ويمتد الى ٢١ آذار || وهو يتبع:
١- بقلة سقوط الامطار باستثناء مناطق حوض البحر
المعتدل . ٢- بقلة الفتر لا سيما عند الاتحاد من خط
الاستواء ومنه الارتفاع من سطح البحر . ٣- بكثرة الثلج
واستباب الجليد في المناطق الشالية . ٤- يسكن الطبيعة
واعمال الاجلار الشفوية وبيات الحيوانات والحشرات
لمستكنة وبهجرة الطيور القواطع الخ .

Hibernal

١٩٤٤ - شتالي

لست تعرني يطلق على ما هو مختص بقسط الشتاء .

Défectuosité, Malformation (F).

١٩٤٥ - شتور

Defect, Malformation (E).
يقال ثمار لا شتر فيها اي لا حبيب فيها .

Entropion (F).

١٩٤٦ - شتور داخلي

Entropion (E).
عارض قوامه تغير حالة البني واقتلابه من الخارج الى
الداخل .

Cetace (S). Cétacé (F).

١٩٤٧ - شتورائي

جنس نهلات سرخسية من فصيلة البساجيات . انزاهه
مدينة يكثر ويوجد في المراتج الرملية بين الصخور ومليا .
اشهر انزاهه الشترائي المغربي .

١٩٤٨ - شتورائي كعزني ، حقيقشة الذهب

Cetace officinarum (S). Cétacé officinal, Rus-
tard (F). Scale fern, Scaly spleenwort, Rusty-back
(E). Echter Volfarn (D). Cetace, Cetaceae, Erbe do-
rata (I).

نوع من الشترائي يعيش على الصخور والجدران . يستخرج
منه صباغ ذهبي اللون . يقال ان الثبات يكامله يقيد
السمال ويحل الصعد .

Palmure (F).

١٩٤٩ - شتور

الشترة والشترة والحطاب واحد . راجع حطاب .

Espace entre 2 doigts (F).

١٩٥٠ - شتور

التفريجة بين الاصابعين .

Carence (F). Deficiency (E).

١٩٥١ - شتقع

الشتع هو انقصار الجسم النباتي الى عنصر من عناصر الغذاء
الرئيسية او الثانوية .



شتراي مخزني



شقة النعام

والبلداء || عدد نجيلها ٦٠ والرب تسمى التي تلبى على آخر المتق والقرد ، لا تفترده من اشباهه . ولها ثمر آخر من الرتبة الثانية يسمى « قلب الشجاع » .

١٤٩٦٤ - شجاع ذكر Hydrea melle (F). Hydrus (E).

الشجاع الذكر كوكبة نجوم اقرب الى الجنوب من الشجاع الاثني . مركزها بين الطلوان والشبكة والحرياء والثن || عدد نجومها ٢٩ جميعها من المرتبة الرابعة ودونها .

١٤٩٦٥ - شجيرة Arbre (F). Tree (E).
تجمع كل الشجر والاشجار والشجرات . والشجر من النبات ما قام على ساق وما سما بنفسه دق او جل . يتميز بجلوره المنعق في باطن التربة بطولها ولوح غشية التركيب تستقر عليها الاضغان والاثناد الترابية || يقال في تصغيرها شجرة وشيرة . اما الشجر فثبت الشجر . والشجرة ارض تثبت الشجر الكثير . وهذا المكان اجبر من هذا اي اكثر شجرا ويقال واد شجير ولا يقال اجبر .

١٤٩٦٦ - شجيرة إلهام Gettiller common (F).
في الارادة جنبه طيبة ممتدة .

١٤٩٦٧ - شجيرة الاهداء Mamme (F).
في الجباس ، اطلية .

١٤٩٦٨ - شجيرة الاشقي Dorken (F).
في اللوروم ، اطلية .

١٤٩٦٩ - شجيرة البتشت Clérodendro (F).
في البستية ، اطلية .

١٤٩٧٠ - شجيرة البركاز Stercular (F).
في البرازية ، اطلية .

١٤٩٧١ - شجيرة البق Orme (F).
في البرقما ، اطلية .

١٤٩٧٢ - شجيرة البهاء Calodendron (F).
في الكالودندرون ، اطلية .

١٤٩٧٣ - شجيرة التوكيب* Liroidendron tulipifera (S). Tulipier (F). Tulip tree, Lyre tree, Saddle tree (E). Echter tulpenbaum (D). Liroidendron, Tulpifera (I).
شجرة مردنية الشكل من فصيلة الفلنليات . مهدا امريكة الشمالية . تلور من ٢٠ الى ٣٥ م . اورقها معتقة كبيرة

التصل الرباعي او الساسي التضميص . ازهارها عريضة قرادقة كبيرة القذبة تشبه التوليب ، لونها الى الصفار الاخضر . غشيا لثام الرقة ، خفيف الوزن ، تبي اللون ، مرفوف له || ازهارها ينسدر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

١٤٩٧٤ - شجيرة التيسين في الهيرطاريون المنن ، اطلية .

١٤٩٧٥ - شجيرة التلج في زهرة اللبيك ، اطلية .

١٤٩٧٦ - شجيرة الجرداد في الرويدية السخنة ، اطلية .

١٤٩٧٧ - شجيرة الجرج في اللبس ، اطلية .

١٤٩٧٨ - شجيرة الجيخال في غافور الجبال ، اطلية .

١٤٩٧٩ - شجيرة الجين* في ارض حليا ، اطلية .

١٤٩٨٠ - شجيرة الحبرو في الصقلاب السوري ، اطلية .

١٤٩٨١ - شجيرة الحليثيت في الانجلان ، اطلية .

١٤٩٨٢ - شجيرة الحشاه* Oxydendron arboresum, Andromeda arbores (S). Oxydendron in arbre, Arbre à Foselle (F). Sorrel tree, Sour-wood (E). Sauerampferbaum (D). Albero ossalide (I).

شجرة سربية وزينية من فصيلة الخلنجيات . مهدا امريكة الشمالية . تلور من ١٥ الى ٢٠ م . اورقها حاشية العلم ، عابطة ، متعاقبة . نصلها ايليبي للشكل ، مسن الحلقة ، جميل الخضار اللامع . ازهارها ملوحي التجميع ، تاجي الازركاز . ازهارها جلجلية ، مستطيلة ، تحلة البشرة ، يضاء اللون || ثمرورها واروقها غشائية ، صلبها اسود .

١٤٩٨٣ - شجيرة الحمص في المشران الكبير ، اطلية .

١٤٩٨٤ - شجيرة الحنيكة في ليريا الشرقية ، اطلية .

١٤٩٨٥ - شجيرة الخبزل في الجاكا ، اطلية .

١٤٩٨٦ - شجيرة الدكن في البلق للسول ، اطلية .

١٤٩٨٧ - شجيرة الرهبان في البغية ، اطلية .

١٤٩٨٨ - شجيرة الريندة في بامية السن ، اطلية .

١٤٩٨٩ - شجيرة الزنبق Liroidendron
في شجرة التوليب ، اطلية .

١٤٩٩٠ - شجيرة الساعو في الساغية ، اطلية .

١٤٩٩١ - شجيرة السباء في الانطس ، اطلية .

١٤٩٩٢ - شجيرة السمين في شيراء الحاملين ، اطلية .

١٤٩٩٣ - شجيرة السيوكا في الازك ، اطلية .

١٤٩٩٤ - شجيرة السيوس في اللبس ، اطلية .

١٤٩٩٥ - شجيرة الشحم* Stillinga sebifera, Sapium sebiferum (S). Scillingia, Arbre à suif (F). Chinese tallow tree, Vegetable tallow (E). Chinesischer Talgbaum (D). Albero del sago, Sapo vegetale (I).

شجرة صناعية من فصيلة التريجات تكثر زراعتها في بعض المناطق الشرقية والامريكية . يستخرج منها شحم نباتي مأكول يحفظ بعض الزيت لانه لا يتأكسد بسرعة .

١٤٩٩٦ - شجيرة الشمع في الشمية ، اطلية .

١٤٩٩٧ - شجيرة السابون في الرينة ، اطلية .

١٤٩٩٨ - شجيرة الصنغ الاناثو في البكسا ، اطلية .

١٤٩٩٩ - شجيرة القرب في القيق الحقل ، اطلية .



شجرة التوليب



شجرة الحامض



شجرة الشم

١٥٠١٩ - شُجَيْرَة *Arbuste (F). Bush, Shrub (E).*
هي من النبات كل شجرة صغيرة لقد تملو الجنبه ولا تترك
الشجرة .

١٥٠٢٠ - شُحَاك ، شَحِيح *Braiment (F).*
صوت البتل والحمار . *Bray of an ass (E).*

١٥٠٢١ - شُحَاك *Onagre (F).*
حار الوحش . *اطله .*

١٥٠٢٢ - شُحَاك *Etiage (F).*
هو البروق ، *اطله .*

١٥٠٢٣ - شُحَاكِيَّات ، شُحْرِيَّات
فصيلة نباتية تعرف بالسحليات ، *اطلها .*

١٥٠٢٤ - شُحْب ، فُحَاك *Déchaumage (F).*
الحراقة السطحية التي تعقب الحصاد القاية منها هجرة
القرية واقتلاع الجدام وطمره . *Digging up the stubble (E).*

١٥٠٢٥ - شُحْر
الشجر والشمرة : الشط الصيق ويجري للماء في بطن الوادي .

١٥٠٢٦ - شُحْرُور *Turdus (S).*
Merle (F). Black bird (E).

جنس طير من القواطع وخصية الشحور هو ، أنواعه
عديدة تتميز بأصواتها الخرجة التعريف ، بعضها المستدرة
وبأصواتها البقية المستطيلة التي تتكلمها من الانتقال
على الأرض بسهولة كلية || فويتا الحشرات والتبدان
والبار . تألف الحدائق والسيارات والأحبال وأحراج الصنوبر
والسنديان . تكثر في الأشجار . أنثاها تبيض من ٤ إلى
٦ بيضات تحضنها بمناولة الذكور نحو أسبوعين . أشهر
أنواعه ما يلي .

١٥٠٢٧ - شُحْرُور أَسْوَد * *Turdus merula (S).*
Merle noir, M. vulgaire (F). Common black bird (E).
Amel, Schwarzdrossel (D).

نوع من الشحور وهو طائر غريد له شتاء وصيفه
دع أن يكتم من القواطع التي تجرب البلاد . طوله نحو
٢٦ سم . ذكره أسود القرب ، جروني المقار وسوايب
العين . أثناء فصية الظهر ، فضاء البطن الموش بالأسود
والأصعب . مقارنا أسمر || قوته الحشرات والديدان
والحززون والآل . يألف الحدائق والنباتات . ينش عشه في
الأدغال القليلة الارتفاع .

١٥٠٢٨ - شُحْرُور مَذْهَب *Turdus aureus (S).*
Merle doré (F). Gilded black bird (E).

نوع من الشحور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه
إلى الصفار الذهبي تلوو رشفة سوداء || يألف الأسراج
والنباتات الكثيفة . ينش عشه في سَم الأشجار .

١٥٠٢٩ - شُحْرُور مَطُوق *Turdus torquatus (S). Merle à plastron (F). Ring-*
ouzel (E).

نوع من الشحور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه إلى
البردة الفصية الملوح . زوده أبيض اللون || يألف
الحدائق وأحراج الصنوبر والسنديان . ينش عشه في الأشجار
القليلة الارتفاع .

١٥٠٠٠ - شُجَيْرَة التَّكَلِيل هي قرلة الغويان ، *اطلها .*

١٥٠٠١ - شُجَيْرَة التَّلْفُلُ الكُذَّاب *في التكنيس ، اطله .*

١٥٠٠٢ - شُجَيْرَة التَّمَس *في اسطرافليس نوليس ، اطله .*

١٥٠٠٣ - شُجَيْرَة الكَيْد ، بُلْدُم *Boldoa fragrans, Peumus boldus (S). Boldo, Boldu (F).*

Boldo, Wood tree (E). Chilensischer Boldobaum (D).
Boldo (I).

شجرة من فصيلة الثديات مهدا بلاد الشيلي . أوراقها
مروية ، طرية البرق ، طيبة ، تستعمل في علاجات
الكبد ويستخرج منها مادة صالحة لتكفي بولدين
(Boldine) تستعمل كخشفة وقوية وعاضة . ثمارها سكرية الطم
مأكولة وهي كالتزهر كذا يشكلا .

١٥٠٠٤ - شُجَيْرَة الكَلْب *في الألبس اللحي ، اطله .*

١٥٠٠٥ - شُجَيْرَة اللَّبَن *Brosimum galactodendron (S). Brosima, Galacto-*

dendron utile, Arbre à lait, Piratinéra (F). Cow tree,
Milk tree (E). Milchbaum, Kuhbaum (D). Palo di
vacca, Albero del latte (I).

شجرة من فصيلة القرصيات . مهدا أمريكا الاستوائية .
منبتها الأماكن الغامضة . تملو من ١٥ إلى ٢٠ م . أوراقها
مستطبة مضاعفة ، كبيرة النصل . أزهارها ثنائية المسكن ،
كثيرة النصل ، ثمارها جراء جلدية القشور ، مأكولة
البروز . يستخرج من ساقها باخر صالحة لبلية تشبه
الكثاء شكلا وتركيبا ، تكون ملائجة ويصنع منها شيء
كالبن .

١٥٠٠٦ - شُجَيْرَة الله *في الألبلس ، اطله .*

١٥٠٠٧ - شُجَيْرَة المَسَاوِر *في القوتلا ، اطله .*

١٥٠٠٨ - شُجَيْرَة المَطَاط *في الحيفية ، اطله .*

١٥٠٠٩ - شُجَيْرَة المَعْبِد *في الجينكو ، اطله .*

١٥٠١٠ - شُجَيْرَة المَلُك *في النوم ، اطله .*

١٥٠١١ - شُجَيْرَة المَيْحَة *Liquidambar à styrax (F).*
في النبر السماع الأمريكي ، اطله .

١٥٠١٢ - شُجَيْرَة النَبَق *في السدر ، اطله .*

١٥٠١٣ - شُجَيْرَة الرُّوك *في ايرتليون ، اطله .*

١٥٠١٤ - شُجَيْرَة غُيْرُ المَرُود *في البوباب .*

١٥٠١٥ - شُجَيْرَة لِسَان المَصْفُور *في المرنان ، اطله .*

١٥٠١٦ - شُجَيْرَة هَوْر *في الأزدست ، اطله .*

١٥٠١٧ - شُجَيْرَة مَرَم *في قيصان نباتات ، اطله .*

١٥٠١٨ - شُجَيْرَة *Ramification (F).*
يجمل عروق الشجر من انغصان وفناد وانغان وخرايب .



شحور اسود

لورقة تطول نحو ٥ سم. وترعرض ٨ سم. نصلها جيل الحصار الجرم. ثماره صغيرة القذ سوداء اللون || أنثراره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٥٠٣٧ - شعشع قريش الورقي

Phillyrea latifolia (S). *Filaria à larges feuilles*, *Phillyrea à larges feuilles* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من ٦ إلى ٨ أمتار. لورقة قلبية الشكل نصلها مستعرض للناخلة، سنن الحافة، ثنائكة. ثماره عنية الشكل ولادة، مقبولة القبة، غمدة الطرف. لونها إلى السرة السوداء || أنثراره يستمر طوال شهر أيار.



شعشع

١٥٠٣٨ - شعشع متوسط الورقي

Phillyrea media (S). *Filaria intermédiaire*, *Phillyrea intermédiaire* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. لورقة اطيحية الشكل نصلها سنن الحافة عريضة نحو ٢ سم. ثماره عنية الشكل ولادة، جبروة اللؤلؤ || أنثراره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٥٠٣٩ - شعشع صيكان

Phillyrea decora (S). *Filaria décoratif*, *Phillyrea décorative* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. لورقة تطول نحو ١٥ سم. وترعرض ٥ سم. نصلها جلدي التسج الباهت الحصار. ثماره يضية الشكل. لونها إلى البشقي اللامع || أنثراره يستمر طوال شهر أيار.



شعشع

١٥٠٤٠ - شحط

Pianta (F). *Dung* (E).

الشحط : ذرق الماء.

١٥٠٤١ - شيفطار

Cyclopterus (S). *Cycloptera* (F). *Cyclopterus* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشيفطاريات ثنائكات الزوائف. أنواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق المعتدلة الحارة والصحرة نحو الباردة || اجسامها مستطبة الحجم، كروية الشكل، تطول من ٣٠ إلى ٩٠ سم. سوكها بحجمية وبشكلة. رؤوسها مستديرة، قصيرة الاضطام، رفيعة العين، صغيرة الاضطام || ألوانها تختلف مع الأنواع، تكثر فيها الوردية السراة. زناقلها معددة التسج. تسجل في مقعد بطما بحجمية لمباية مستديرة مؤلفة من الزعنفتين الحويصيتين المتصقتين، تمكثها من التمسك بالأسل الصخري حيث تكمن راسدة قدم فرانسها || اعرف أنواعه وأشهرها الشيفطارة المبلولة.

١٥٠٤٢ - شيفطارة مبدولة

Cyclopterus communis, *C. lumpus* (S).

Cyclopterus communis, *Lump*, *Lompe*, *Livre de mer* (F). *Lump-fish*, *Sea-owl*, *Cock-padd*, *Hall-padd* (E).

نوع من الشيفطار. سمكة بحرية بيضاء. اطرافها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والخليج الاطلسي || جسمها يضيء الشكل، مستطال التسطيط، بطول نحو ٥٠ سم. ويملحو من الرأس إلى الذنب سبعة صفوف من الصل المتناوبة الاحجام. نوبها إلى الوردية يعلوها تسج أزرق يسر في الظهر ويغير في الجانبين ويصفر في البطن || رأسها مستطال الحجم، مستعرض الشكل، قصير الخلف، صغير الشفق



شيفطارة مبدولة

١٥٠٣٠ - شعوريات

Turdidae (S). *Turdidae* (F). *Turdidae* (E).

فصيلة طيور من الجوارم المشروبات التأثير منها للشعور والسنه.

١٥٠٣١ - شعوريات في السليات، الحلبا.

١٥٠٣٢ - شعشعورة

Mantissa (S). *Mantissa* (F). *Mantissa* (E).

جنس حشرات مقترنة من فصيلة الشعشعوريات وربة شارات الاجنحة. أنوعها المرفوعة نحو ٥٠ مستديرة || معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جسمها صغير نحيل مستطيل يضيء بشكله شكل السرمية. رأسها صغير. عضها عريضي. منابعا بارزتان. زناقلها دقيقان. كولها فيه انبوي مستطيل. اجنتها اربعة. جميعها شفاقة كثيرة المرفوق والاصاب. جرازها ثلاثة ازواج منها زوج امامي مخصص للقبض أو القنص وهو كبير القد، ضليع القنوب للمشاري الحافة الداعلية || مكين الرسع السنن الحصار ولذي يتطوق حل مشاقر القنوب انصباك الملقط || الاثني اكبر قدماً من الذكر. والبرقة مفرقة كالخثرة الجملة. يقال ان الاثني تنجح المكن في مكاديب الناكب وانصباها الحثرك.

اعرف أنواعها والاهرها :

Mantissa pagana (S).

Mantissa palena (F).

التي يكثر ويدها في معظم مناطق البوصلة الحثرك.

١٥٠٣٣ - شعشعوريات

Mantispidae (S). *Mantispidae* (F). *Mantispidae* (E).

فصيلة حشرات من صيبات الاجنحة وربة شارات الاجنحة. إجناسها وأنوعها عديدة اطرافها بعض اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || تتميز باجسامها النحيلة المستطيلة وبجرازها الامامية الكبيرة المهيمة للقنص. اجنتها شفاقة كثيرة المرفوق. الزوايا تختلف مع الاجناس والالوان || انثا اكبر قدماً من ذكورها. بعض أنواعها يهرى نحو ٨٠٠٠ مكنة. مكنها اطيحي الشكل مذنب || أشهر اجناسها الشعشعورة

١٥٠٣٤ - شعشع، شعشع

والشمامة والشمامة والشمامة : شاة ذهب لونها كله. وقيل السنية. وقيل التي لاجل بها. وقيل التي لم ينز عليها قنص. ج أحاس وأحس وشماس.

١٥٠٣٥ - شعشع

Phillyrea (S).

Filaria, *Alavert*, *Aourat*, *Phillyrea* (F). *Mock privet* (E). *Feinlitzige Lorbeerlinde* (D). *Filaria* (I).

جنس شجيرات برية ورتيوية من فصيلة القريزيات. قريبة القبة بالثم اوراثها ابيدة. صغيرة النصل، متقابلة. انهارها صغيرة، عوروية اوراثها ابيدة. ثنائية للسكن، رباعية النصل والريالات، ثنائية للسدة. ثمارها عنية صمينة لونها إلى البشقي الاسود || اجناسها شديدة الصلابة تستعمل في بعض الصناعات || أشهر أنواعها ما يلي.

١٥٠٣٦ - شعشع شبيق الورقي

Phillyrea angustifolia (S). *Filaria à feuilles étroites*, *Phillyrea à feuilles étroites* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من مترين إلى أربعة أمتار

طولاً نحو ٤ سم. تتميز بجسمها القوي الشكل، زعنفتها الشريفة الفارقة وبسيفها الرقيق الكبير .

١٥٠٧٦ - شعاب

الشعير من أصوات الليل . قال الاصمعي : الشعير من القم والشعير من الشعرين والكرير من الصادر .

Discordant

١٥٠٧٧ - شعيب

صفة الشيء لتجهيم المدام الانجم .

١٥٠٧٨ - شعيل

Diethermans (F).

Diathermic, Diathermanous (E).

نمت شريفي يطلق على كل مادة تطفئ الحرارة دين أن تستمر منها .

١٥٠٧٩ - شدة ، قرون ، رطب

Atzel (F).

To put horses etc... (E).

رطب القواب بالمحروور .

١٥٠٨٠ - شذاعة الأزهر

Salicis floricola, Sticis floricola (S).

Salicis floricola (F). Salicis floricola (E).

دورية من المتناكب السابعة القانصة ثنائية الرواية سداسية المشانق من فصيلة الشذافات || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٨ سم. الأجنحة أكبر كلاً من الذكر . صدورها اسود اللون، أحر الخلف الكثيف . صناعها زعنجان . شمسها صفيان عريان . فكها صليانيان . جرمها مسطحة . بطنها بيضي الشكل، أصفر اللون ، أبيض الزعنجان والزعنجان || تألف الخلف ويجاري الماء حيث تكثر الأزهار . تسرح في النهار تسمى وراء قصتها وكذاً وكذاً . قوتها الحشرات الأغصان التي تنبت في فوات الجنائن تترس ما قرب الأزهار || مكنتها بيض في القرة تحفر تحت الحجارة || تعتبر من المتناكب المفيدة .

١٥٠٨١ - شذاعة تسليط

Salicis formicarius (S). Salicis fourmi,

Myrmarchae fourmi (F).

دورية من المتناكب السابعة القانصة من فصيلة الشذافات، جسمها مستدلل القد يطول من ١٢ الى ١٨ سم. الذكر أصفر كلاً من الأنثى . صدورها اسود اللون وباهي الخلف الأبيض . صناعها زعنجان . شمسها صليانيان . فكها مقوسان . جرمها مسطحة . بطنها بيضي الشكل، أصفر اللون ، أبيض الزعنجان والزعنجان || تألف الزوج والمزاري . تسرح في النهار . سمها قريب الشيء يعني أنثى ما دعى ال وصفها به || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحمام . صكبتها بيض في القرة تحفر تحت الحجارة || ملجئها الجنائي كلبين سائر المتناكب . بيئاتها القشري لا يتجاوز ١٨ أسبوعاً || تعتبر من المتناكب النافعة .

١٥٠٨٢ - شذاحيات

Salicidae (S).

Salicidae (S). Salicidae (E).

فصيلة متناكب من رتبة الزيتونات . أجناسها وأزواجها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم أقطار العالم أخصها الظفار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مقترنة صغيرة القد زائفة الألوان البراقة تسرح في النهار وتحت أنثى الشمس . تسمى وراء قصتها وكذاً وكذاً في أشهر أنواعها الشذاعة .

١٥٠١٤ - شعاب هو الحليب ، اطبله .

١٥٠٦٥ - شعابيد

Chrysididae (S).

Chrysididae (F).

فصيلة حشرات من شعابيات الاجنحة المنصودة . أجناسها وأزواجها كثيرة العدد ، متصلة الجسم أو صغيرة . ألوانها زائفة الألوان الالامدة الموج . رؤوسها صغيرة . جواشها غليظة . بطنها مركبة من أربع حلقات ورجلات، حناها مسن الحافة . شوارها تتناسل ثلاثي الحلقات ، مدب الاشارة || أنثى تتسلل على غلابا التسلل والزناير وله تحت مكان في جوف الخنابير فيقتف من رقات قفوس الدجبة وتلق الشهه .

١٥٠٦٦ - شعابكة ، هي شعابكة

Tetracosus quadricornis (S).

Tétracore, Aetiole echilars (F).

حويون لوبن حيت من الغطاء وحيد الجني والزوج ، موته الحنة || يتميز بصفر جسمه وبقروله الزوية ، الثان صغيران يطولان العينين وثلاثان متوسلان يطولان الرأس .

Diethermanidés (F).

Diethermancy (E).

الشذاعة عامة انقاذ الحرارة المشعة .

١٥٠٦٨ - شفت

Fagot (F). Faggot (E).

هو الجزأ حطب دليق .

١٥٠٦٩ - شذدب أزرق

Setibem (S).

Setibe (F).

جنس حشرات من فصيلة الشخاد . اناوه قليلة تشبه الزناير . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٨ سم . لونها الازرق الغفرار الموج . يكثر ويوجد ما ابار الى حموز .

١٥٠٧٠ - شذدب لاهيه

Chrysis ignita (S).

Chrysis enflammé (F).

حشرة من الشخاد صغيرة القد طولها نحو ١٢ سم . رأسها وبسها الال خضرة الزرقاء . بطنها ذهبي اللون يطول موج اعشر . يكثر ويوجد ما قرب مجاري الماء وفي جوار التسلل والزناير .

١٥٠٧١ - شخفر

Etanponner (F).

To stay, to shore (E).

سنة الاضخان المثرة لثلا تنكسر .

١٥٠٧٢ - شخفرم

Pristipoma (S). Pristipome (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات ، انواعه عديدة معظمها من اسماك البحار الحارة || له لومان منمها المتوسط : التكروري والقرقور .

١٥٠٧٣ - شخس

هي ثنات اليربع اي الحجارة الكلسية الرخيمة (ابن القطار).

١٥٠٧٤ - شخسل

Filter (F). To filter (E).

نخل الشراب : صفة .

١٥٠٧٥ - شخسوزة

Caranx rhonchus (S).

Caranx rousé (F).

نوع من السم وهي سمكة مأكولة توجد في المتوسط يبلغ



شذرة



شذب ازرق



شذب لاهب



شخورة



شكاة الزمار

الحِثَار الحَاخِصِي بِالْفَحْصِي أَوْ بِالْأَزْرَقِ || حُومِيَا مُتَوَسِّطَة
الصَّنْف : مَأْكُولَة .

Tirant (F). Tie (E).

١٥٠٨٣ - شَدَاد

خَشْبَة أَوْ مَرْزِيَّة شَدَدَ بِهَا الْبَنَاء .

١٥٠٩٧ - شَدَقِيل مَرْقُوش *
Schedophilus punctatus (S). Schédophile tacheté (F).
Schedophilus punctatus (E).

نوع من الشفيل . يمكن بحرية يبيض . أصلها بحار
البلاد الحارة اغصنها البسر الأحمر وبعض مناطق البسر
الابيض المتوسط || جسمها شبه يبيضي الشكل ، معتدل
التخطيط يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم . ثوبها إلى الطحلة
الفضية تعلوها رقعة زرقاء تمتد إلى الزعنفة الذيلية . ظهرها
أخضر خضاباً من جانبيها وبطنها . زعانفها الظهرية
والشرجية غضبية الحِثَار الحَاخِصِي بِالْأَزْرَقِ || رأسها صغير
الحجم ، مخروطي الشكل ، قصير الخطم . فيها عمودي
الشفيل المعتدل الانفراج . ذكها الأمل يتقدم الأسفل
بعض الشيء . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ||
مسرهما معاشب الثغاف للقرية الغور || لحمها متوسط
الصنف ، مأكول .

١٥٠٩٣ - شَدَن

شَدَن الطَّيْر وَجَمِيع وَلَد ذَوَات الظَّلْف وَالْعُف : قَوِي
وَرَحِيع وَأَسْفَى مِنْ أَمِهِ .

١٥٠٩٤ - شَدَن
Cervus (S). Céruane, Cervuane (F). Cervus (E). Carun-
blume (D). Ceruana (I).

جنس نباتات عشبية برية عفاية من فصيلة المركبات .
انزاعها قليلة البدن منبهاً الجزيرة وبعض المناطق المصرية
والأفريقية . سيقانها وفروعها منتصبه متفرعة ، نورها
كالياسمين .

١٥٠٩٥ - شَدِيْقَة *
Scaevola (S). Scévole (F). Scaevola (E).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة اليبوليات . مهدبا
استراليا . سيقانها منتصبه صلبة تعلو من ٥٠ إلى ٧٠ سم .
اوراقها متعاقبة منتفخة . ازهارها بياض اللون . كورسها
وتوتيجاتها غاسية اللؤل المشقوقه من جهة واحدة تدنو
كأنها شذاه || أنواعها المعروفة قليلة البدن ، اشهرها
التالية :

١٥٠٩٦ - شَدِيْقَة صَغِيرَة الْوَرَقِ *

Scaevola attenuata (S). Scévole à feuilles atténuées (F).

نوع من الشدية . ساقها تعلو من ٥٠ إلى ٧٠ سم .
اوراقها سنالية تطول من ٥ إلى ٨ سم . نصالحا مسنة
الحار . ازهارها بياض اللون تطول نحو ٢ سم . كورسها
شارقة مستعرضة للقلق || تنويرها يستمر طوال شهر
سبيران .

١٥٠٩٧ - شَدِيْقَة عَظْرِيَة *

Scaevola suaeuolens (S). Scévole odorante (F).

نوع من الشدية . ساقها تعلو نحو ٩٠ سم . اوراقها
أطليجية الشكل تطول نحو ٨ سم . نصالحا سمك الصنفعة ،
متعادلتين الحار . ازهارها بياض اللون ، طويلا
نحو ٢ سم . قطرهما نحو ٣ سم . طرية اللفر المنتصب ||
تنويرها يستمر طوال شهر آب .

١٥٠٨٤ - شَدَقِيَّات *
Membracidae (S).

Membracidae (F). Treehoppers (E).
Buckelszirpen, Buckelszikaden (D).

فصيلة حشرات من فصليات الاجنحة المتجانسة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة البدن أصلها من مناطق البلاد
الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، يتكرر لها الشكل
العمودي . رؤوسها وكوابلها مستعرضة . حوزها ناشرة .
اجنحتها جلوية الاسترمان ، لاحفة ، شفافة أو صفراء
اللون || اقرباها واجنحتها تمتاز للمواقع الموحدة فيها .

١٥٠٨٥ - شَدَان *
Raphicurus (S).

Raphicurus, Rhaiphicurus (F).
جنس حورانات عاشبة مجترمة من الظباء . انواعها المعروفة
قليلة البدن . أصلها اقارة الأفريقية اجسامها المناطق
الجنوبية || اجسامها متوسطة القد ، عفاة . أناتها جماد
الروس ، ثنائية الاعلاف . ذكورها جالسة القرن
الصغيرة القصيرة . اقرباها إلى الصبية الخطية تقيم مع
اقرباها من الظهر وتقرع عند البطن .

اعرف انواعها :

شَدَان الرِّيف Raphicurus champêtre (F).

Scenbok (E).

شَدَان أَسْوَد الْأَذَن Raphicurus à oreilles noires (F).
Gryabok (E).

١٥٠٨٦ - شَدَخ * ، حَمَادِيَّة الْمَاء

Hydrocotyle (S). Hydrocotyle (E).

منسج يسير . الماء ويوجد غذاء . الماء ينشط شماغ النبات
وازدحام حجم الخلايا فيسبب احديداً في التسع التي تنجم
وتقيرا في التسع الماكسة ينجم عن اصعاج شمني .

١٥٠٨٧ - شَدَخ هو القطيفة ، اطليا .

١٥٠٨٨ - شَدَخ هندي

هو القطيفة الخضراء ، اطليا .

١٥٠٨٩ - شَدَقَة Segment (F). Segment (E).

هي السكة ، اطليا .

١٥٠٩٠ - شَدَقِي Entomozoa (F).

Entomozoon (E).

نمت ترميفي يطلق حل كل حيوان من ذوات الاجسام
الشديدة .

١٥٠٩١ - شَدَقِيل *
Schodophilus (S).

Schédophile (F). Schodophilus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الاسقمريات شالكانت
الزعانف . انواعها المعروفة قليلة البدن أصلها بحار البلاد
الحارة وبعض مناطق المتوسط || اجسامها صغيرة القد ،
أطليجية الشكل ، تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . رؤوسها
مخروطية ، قصيرة الاعظام ، معتدلة الاشكال . عوزها
كبيرة ، مستديرة ، ناشرة || اقرباها إلى الرينة أو الطحلة
الفضية المولج يعلوها تبيج عسفي أو رقعة زرقاء تمتد إلى
الزعنفة الذيلية البارزة . ظهورها أعين خضاباً من جوانبها
وبطنها || زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة القد غضبية



شَدَان



شَدَقِيل مَرْقُوش

١٥٠٩٨ - شديم * ، قرود الغرب

Pithecia Inuus (S). *Magot* (F).
قرود وسيد الجلس والنوع من فصيلة الميمريسيات. موطنه بلاد المغرب. جسمه قصوري الشكل بطول نحو ٧٠ سم. ويرتفع من ٤٠ إلى ٥٠. ثوبه إلى البصرة الصفراء الملوحة. رأسه وعصره إلى البصرة المابتقة. بطنه إلى البياض اللامع. ذنبه جملة || يعيش على الأشجار وبين الصخور. قوته الاعشاب والجلود والثمار.

١٥٠٩٩ - شدكة

Glossina (S). *Glossina* (F). *Glossina* (F). *Glossina* (F).
جلس حشرات من فصيلة الذباب تنقل إلى الحيوان الذي تسلمه طائفة من الأمراض الطفيلية الخبيثة المؤذية. أنوعها عديدة ، موطنها المناطق الاستوائية وجنوبها.

١٥١٠٠ - شدكة لاصعة * ، زُمب ، دُيْبَكَة

Glossina moritani (S). *Glossina moritani* (F). *Glossina moritani* (F). *Glossina moritani* (F).
تسمى لاصعة. *Glossina moritani* (F). *Glossina moritani* (F). *Glossina moritani* (F).
أحدث أنواع الشدة وأكثرها انتشاراً تلصق الإنسان وتسبب له مرض النوم وتلصق الخيل والأبل والبقر فتلكها. موطنها مستنقعات افريقية الاستوائية والوسطى.

١٥١٠١ - شدكام

Dard (F). *Scing* (E).
حمة المغرب والجزير والجملة الخ.

Smoris (S). *Picarel* (F). *Smoris* (S). *Picarel* (F).
جلس اسماء بحرية من فصيلة اللعنليات ، أولاه حديدية اصطناعها بحار البلاد الحارة والمتحدة. اجسامها اطيحية الشكل. اعطائها غروبية مستطبة الأطراف. فتكرها عادمة السنين. زعانفها البهريّة وسيدة مستطبة. زعانفها الشريجة مازقة || أشهر أنواعها الشدامة الليلية ، اطليا.

Smoris vulgaris (S). *Picarel commun*, *Jaret*, *Garrat* (F).
نوع من الشدوم وهي سمكة مبالوة في المتوسط. طولها يراوح من ٢٤ إلى ٢٦ سم. توجب لفي الذئب حتى التجزيع والتشويح يسر ويمنع مع اقترابه من ليج الظهر. سرها يسير على شكل مروحة. لحمها متوسط الصنف.

Paillettes d'or (F). *Grain of gold-dust* (E).
الشد: قطع من الذهب الطبيعي لا تزال على حالتها البدائية || والشد: اللؤلؤ الصغير. النواصة شدة ج شلوات وشلور.

Anomalie (F). *Anomaly* (E).
هو الاضداد من السلك النظامي المأثور.

١٥١٠٦ - شركة

هو الابتاع ، اطليا.

١٥١٠٧ - شراب

كل صير سكري العظم يستحب العرب.

Nemopanthos (S). *Nemopanthos* (F). *Nemopanthos* (F). *Nemopanthos* (F).
١٥١٠٨ - شرابية الرامي
Nemopanthos (F). *Nemopanthos* (F). *Nemopanthos* (F). *Nemopanthos* (F).
جلس نباتات برية وتربيتية من فصيلة البهشيات : منها امريكة الشالية. انواعها قليلة جميعها جنات وشجيرات تطلع من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. فروصها دقيقة مضلعة.

اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مستطبة. تصلها اطيحية الشكل مسنن الحافة. انزهارها ابيطة الاكثر ، فردية التجميع ، طويلة الزناد ، رباعية او خماسية البتلات البياض. ثمارها عنبة الشكل حراء اللون ، قطرها نحو ٧ مم.

١٥١٠٩ - شرخج

هو اللقي السنة ، اطليا.

١٥١١٠ - شركوكة

Etinoelle (F). *Spark* (E).
ما يتطاير من النار. ج شرار وشرور.

١٥١١١ - شيركس

Dextrine
هو الكستين ، اطليا.

١٥١١٢ - شيركسة

Rhizographie, *Rhizologie* (F). *Rhizology* (E).
الشرافة علم يبحث في تركيب جلود النبات وفي تحليلها وظائفها.

١٥١١٣ - شيركسي

Velliforme (F). *Velliforme* (E).
لمت تعريفي يطلق ، في علم التاريخ الجيحي ، على ما هو شكله كالشراع.

١٥١١٤ - شركة ، مشرككة

Collectivité (F). *Collectivity* (E).
صفة ما هو مشترك. يطلق على الجماعات والفتات.

١٥١١٥ - شران

حرام كالبيض تكثر قرب الماء ، تنشئ وجه الانسان ولا تمس. الواصلة شرانة.

١٥١١٦ - شرايف

سلع الحية اذا قتلت.

١٥١١٧ - شربة

Plinche basse (F). *Low between* (E).
هي السبكة المنخفضة التي يتم فيها بناء الجبر. ج شرب وشربات.

١٥١١٨ - شربة

هي الدواء المسهل الذي يطلق البطن. أشهر الشربات البطرية : سلفات الصوديوم وسلفات المغنيزيا وزيت الخروع.

١٥١١٩ - شيريس

Cirrhitbarbis (S). *Cirrhitbarbis* (F).
جلس اسماء بحرية من شالكات الزعانف وعضلة القرويينات. انواعها المبرقة قليلة العدد اصطناعها بحار الجنوب الافريقي || اجسامها مستطبة الشكل ، مستطبة الطول. رؤوسها غروبية ، صغيرة ، اثنائها العليا والسفل مجهزة بولوس دقيقة. حيزها ناشرة. زعانفها الظهرية قاطبة. الصدرية والخرجية صغيرة. الشريجة مستطبة. الذيلية شبه مستطبة. اقلها وردية اللون نضية اللون || لحمها مأكولة ، متوسط الصنف.

١٥١٢٠ - شريليل

Kleinia (S). *Kleinia* (F).
جلس نباتات عشبية او غشوية من فصيلة المريكبات انواعها عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم. اوراقها لحمية النصل ، سنائية الشكل ، متعاقبة. ورواسها الزهرية حادة اللبدينات والكميات يطولها سف من القنابات. بذورها مجهزة بقنابات خفيفة || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.



شديم



شدة لاصعة



شدة مبالوة



شرابة الرامي



شيريس

١٥١٣٩ - شُرْبَات حَمَلَا

Chourta Mnasayensis (S).
Chourta de l'Himalaya (F).

طائر من الشرق. موطنه يمتد من جبال حملانا إلى الهند وإيران. يألف البراري والأحراج على السواء. قوته يمدّ من ٢٠ إلى ٤٠ زويًا. قوته الجرب والقرور والجنادب ونسها وقتل وبارنا. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٥ سم. قوته إلى السواد الأخضر المالح. زوره ومثته إلى الوردية يطول طوق أسود يمتد حتى الحشر والين. صدره إلى الوردية المنشرة بالأسود. جناحه لاسحان. قوته إلى الوردية. ذنبه صغير، مقطوع الطرف. يمشي عث في الفصوص يقيه بين الأشجار الكثيفة. الأني تحسن من ٨ إلى ١٢ بيضة. قرعها يستمر نحو ٣ أسابيع تقود به الأني دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء.

١٥١٤٠ - شُرْبَات

Engelure (F). Chilblain (E).
عارض يصيب الأشجار في غثث فروعها من جراء الصقيع فيسبب للحاء وهيب جفله. وهو في الحيوان تصعب الأطراف ويصير أخضر.

Rectum

١٥١٤١ - شُرْبَات
هو الجزء الأسفل من الأمعاء ينتهي عند الاست حيث يخرج البراز.

١٥١٤٢ - شُرْبَاتَان ، شُرْبَاتَان

Castrum (F).
هو الشُرْبَات ، الحلبه .

١٥١٤٣ - شُرْبَاتِيَّات

Castrineae (F).
هي الشُرْبَاتِيَّات سبط من الفصيلة الباذنجانية .

Anal

١٥١٤٤ - شُرْبَاتِيَّ
نبت تعرني يطلق على كل ما له صلة بخرج الحيوان .

١٥١٤٥ - شُرْبَات

Galaxie (F). Galaxy (E).
الشرج ، حسب التعريف الفلكي الحديث ، هي أولاً الكرة المرفوعة يدرب التنبأ والطريق التي. وهي بالتالي وحل وجه الشموس ، كل مجموعة سمن في الفضاء . لذلك فهي مشابهة الاكوال والحجوم . أسفرها حصباً بقدر طولها بمئات الالف السنين الضوئية .

١٥١٤٦ - شُرْبَات

Canine du chameau (F).
Canine tooth of the camel (E).
ناب البعير .

١٥١٤٧ - شُرْبَات فَهْلَك

Grenadille (F).
جبنه حارفة شمرة تدعى آلامية مأكولة ، الحلبه .

١٥١٤٨ - شُرْبَات ، شُرْبَاتَان

Castrum (S).
Castrum, Galant (F). Night blooming Jasmine (E).
Hammerstrach (D). Castrone (I).

جس جنات ونجيرات برية وزراعية من سبط الشُرْبَاتِيَّات وطبيعة الباذنجانيات . أنواعه نحو ٦٠ معظمها من نباتات للناطق الحارة بعضها يزرع للزينة ومنها أنواع كروية الرائحة لا تخلو من العناصر الجمالية القليلة. في بعضها تلو من ١٠٠ إلى ٣٥٠ سم. أوراقها كالماء صفحية. نسلها عابث الحفرة ، مائل الصفحة العليا ، خالئ. ازدهارها متوسط القد ، مستطيلة الأنيوب . ثمارها جوزية الشكل والحجم ، مختلفة الألوان .

الانثوية لونها إلى الزرقة البنفسجية يطولها ملح أصفر يتخلله ثوب من الوردي. إكازنها غروبية الشكل، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٦ م.

١٥١٣٩ - شُرْبِين نُسُونِيَّة

Chamaecyparis lawsoniana, C. boursierii (S). Cypress de Lawson (F). Port Orford cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية ، كبيرة القد ، سريعة النمو، موطنها أمريكا الشمالية تملو نحو ٦٠ م. لحاء ساقها إلى الوردية الحمر. بناتها موقفة لونها إلى الأخضر البحري الأسفل المالح. ازدهارها الذكرية قرمزية اللون بنفسجية التوشيح. ازدهارها الانثوية إلى الوردية الوردية المالح. إكازنها صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. زراعها شاملة ، يكثر استعمالها في صد الرياح .

١٥١٣٥ - شُرْبِين مَنَقِيَّة

Chamaecyparis thyoides, C. sphaeroides (S). Cypress faux-thuya (F). White cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية متوسطة القد ترفع في الأراضي المنخفضة. تملو نحو ٢٥ م. لحاء ساقها إلى الوردية الحمر. بناتها متعصبة. أوراقها دقيقة. ازدهارها الذكرية بنفسجية اللون، قرمزية التوشيح. ازدهارها الانثوية لسنتية الأساس ، وردية المالح. إكازنها سداسية الجراحات ، قطرها نحو ٦ م.

١٥١٣٦ - شُرْبِين نُسْكَ ، نُسْكَ

Chamaecyparis nortkensis, C. nootkatensis (S). Cypress de Nootka, Nootka (F). Nootka sound cypress, Yellow cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة جدسة كبيرة القد ، أجالية الشكل ، موطنها أمريكا الشمالية . ترفع في المالح الربط، تملو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوزية الحمر. بناتها متدلية الأطراف ، شبيهة الأخضر الباهت ، عذمة المالح الغني. إكازنها رباعية أو سداسية الجراحات ، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ م.

١٥١٣٧ - شُرْبِين هِينُوكِي

Chamaecyparis obtusa, C. breweriana (S). Cypress hinoki (F). Hinoki cypress (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة القد ، مردلية الشكل. موطنها أواسط ويتوب اليابان. تملو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوزية الحمر، بناتها موقفة، مزدوجة التصليف ، عذمة . ازدهارها الذكرية بنفسجية اللون يطول توشيح وردي وأصفر . ازدهارها الانثوية إلى الوردية الخضراء تملوها شمسة وردية ومابة زرقاء. إكازنها غروبية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م.

١٥١٣٨ - شُرْبَات

Chourta (S).
Chourta (F). Chourta (E).

جنس طير من فصيلة الطيوريات ودية العاجيات. أنواعه المعروفة نحو ٦ أصنافا تمتد من الهند إلى جبال سيدي . تألف البراري والأحراج . قوتها الجرب والقرور البرية وبعض الحشرات ويكثها وأعصها الجنادب وقتل إلى أجسامها ربة ، تطول من ٣٤ إلى ٢٨ م. رقبها متوسطة الحجم . اعتاقها قصيرة . متاقها صغيرة . اجنتها لاسحة . أذناها قصيرة ، مقطوعة الأطراف . أذنها متباعدة الألوان ، جميعها مقطوعة الزور والصدر. ملونها الحياتي جاحي إلا في زمن التكاثر والحضانة ألوانها تعد من عشرة أزواج إلى خمسين زويًا. إكازنها وأشهرها شُرْبَات حَمَلَا .



شُرْبَات حَمَلَا

١٥١٥٧ - شِرْشُوحَاتُ مُسْتَحَبَّةٌ *

Saurus fasciatus (S). *Saure rayé*, Lambert (F).
Saurus fasciatus (E).

سَمَكَةٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ ، أَصْلَانِهَا مِثْلُ أَقَالِمِ الْبَحْرِ الْاَبْيَضِ الْاَوْسَطِ . جِسْمُهَا وَشَعْيُ الشَّكْلِ يَطُولُ مِنْ ٢٥ إِلَى ٣٥ سَم. تَوَجُّهُهَا إِلَى الرِّبْدَةِ الْفَضِيَّةِ يَتَّبِعُ عِنْدَ الظُّهْرِ وَيُزِيدُ عِنْدَ الْبَطْنِ . جَانِبَاهَا مَسْتَوِيَانِ بِتَلَاخَةٍ عَطِيطَةٍ قَاعِلَةٌ زُرْقَاءُ الْاَبْنِ . زَعْنِفَتَاهَا الْاَلْيَافِيَّةُ مُفَصَّلَةٌ بِالْأَزْرَقِ ۥ رَأْسُهَا غَرِيزِي الشَّكْلِ ، كَبِيرُ الْاَنفِ ، وَاسِعُ الشَّدَقِ الرَّحْبِ . أَسْنَانُهَا كَثِيرَةٌ اَلْعَدَدُ ، ثَلَاثِيَّةُ الصَّفُوفِ فِي الْفَكِّينِ . صِنَاغُهَا صَفِيرَتَانِ ، مَسْتَوِيَتَانِ ، مَامِخَتَانِ ۥ زَعْنِفَتَاهَا لَيِّنَةٌ الْاَضْكَالُ الْاَحْجَامُ . الظُّهْرِيَّةُ الْاُولَى شَرَامِيَّةٌ ۥ الظُّهْرِيَّةُ الثَّانِيَّةُ جَدْعَةٌ . الصَّدْرِيَّةُ صَفِيرَةٌ . الْخَوِصِيَّةُ كَبِيرَةٌ ۥ عِلْمُهَا جَيِّدٌ الصَّنْفُ لَكِنَّهُ كَثِيرُ الْحَسَكِ الْاَتَقِيقِ .

١٥١٥٨ - شِرْشُوحَاتُ *

Fillicinas (F).
Fillicinas (E).

شُعْبَةٌ مِنَ مَسْفُورَاتِ الزُّهْرِ الْوَسَائِيَةِ . لِفْصَالُهَا وَاجْتِمَاعُهَا وَأَنْوَاغُهَا كَثِيرَةٌ الْعَدَدُ ، مَعْظَمُهَا مِنْ أَجْزَائِهِ الْاِزْنَةُ الْخَامِرَةُ اَلْعَصَا الْخَلْقِيَّةُ الْاَلْيَافِيَّةُ ۥ بِلَاتَانِيَّةٌ صَبِيغِيَّةٌ التَّرَكِيبُ الْحَبِيبُ مِنْهَا الْمَشْيُوعُ وَالْيَابِيَّةُ وَالْمَشْيُوعَةُ . جَمِيعُهَا مَجْهَرَةٌ بِزَوَاكِهِ وَرِيْقَةٍ تَقْدُسُ مَرَامِجِ .

١٥١٥٩ - شِرْشُوحَاتُ *

Epigastro (F) *Epigastrium* (E). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

Cherains (S). *Cheraine* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (F).

جَنْسٌ مَخْلُوفٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّلَفِيَّاتِ . أَنْوَاغُهُ عَدِيدَةٌ . مَعْدُهَا الْبِلَادُ الْخَارِجَةُ ، جَمِيعُهَا أَرْضِيَّةُ الْمَرْحِ خَاصَّةً . ذَلِيلُهَا شَدِيدُ الْاِسْتِدْبَابِ وَالْعَصَالِيَّةُ لَوْهٌ إِلَى السَّرْعَةِ يَمْلُؤُ تَبْيِيجًا أَصْفَبَ . طَوْنُ أَجْسَادِهَا بِمَرَاوِجٍ مِنْ ٢٠ إِلَى ٦٠ سَم. بِلَاتَانِيَّةٌ الشَّوْرِيَّةُ يَدُومُ لَحْمٌ أَشْوَرُ .

١٥١٦٠ - شِرْشُوحَاتُ *

Cherains (S). *Cheraine* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (F).

جَنْسٌ مَخْلُوفٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّلَفِيَّاتِ . أَنْوَاغُهُ عَدِيدَةٌ . مَعْدُهَا الْبِلَادُ الْخَارِجَةُ ، جَمِيعُهَا أَرْضِيَّةُ الْمَرْحِ خَاصَّةً . ذَلِيلُهَا شَدِيدُ الْاِسْتِدْبَابِ وَالْعَصَالِيَّةُ لَوْهٌ إِلَى السَّرْعَةِ يَمْلُؤُ تَبْيِيجًا أَصْفَبَ . طَوْنُ أَجْسَادِهَا بِمَرَاوِجٍ مِنْ ٢٠ إِلَى ٦٠ سَم. بِلَاتَانِيَّةٌ الشَّوْرِيَّةُ يَدُومُ لَحْمٌ أَشْوَرُ .

١٥١٦١ - شِرْشُوحَاتُ *

Cherains (S). *Cheraine* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (F).

جَنْسٌ مَخْلُوفٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّلَفِيَّاتِ . أَنْوَاغُهُ عَدِيدَةٌ . مَعْدُهَا الْبِلَادُ الْخَارِجَةُ ، جَمِيعُهَا أَرْضِيَّةُ الْمَرْحِ خَاصَّةً . ذَلِيلُهَا شَدِيدُ الْاِسْتِدْبَابِ وَالْعَصَالِيَّةُ لَوْهٌ إِلَى السَّرْعَةِ يَمْلُؤُ تَبْيِيجًا أَصْفَبَ . طَوْنُ أَجْسَادِهَا بِمَرَاوِجٍ مِنْ ٢٠ إِلَى ٦٠ سَم. بِلَاتَانِيَّةٌ الشَّوْرِيَّةُ يَدُومُ لَحْمٌ أَشْوَرُ .

١٥١٦٢ - شِرْشُوحَاتُ *

Cherains (S). *Cheraine* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (F).

١٥١٦٣ - شِرْشُوحَاتُ اللَّيْلِ ، يَكْسَمِينُ اللَّيْلِ

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .

١٥١٦٤ - شِرْشُوحَاتُ مُسْتَحَبَّةٌ *

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .

١٥١٦٥ - شِرْشُوحَاتُ *

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .

١٥١٦٦ - شِرْشُوحَاتُ *

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .

١٥١٦٧ - شِرْشُوحَاتُ *

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .

١٥١٦٨ - شِرْشُوحَاتُ *

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .

١٥١٦٩ - شِرْشُوحَاتُ *

Cestrum nocturnum (S). *Cestrum nocturnum*, Gaillardet (F). *Night jasmine* (E). *Nachtstrauch* (D). *Galante de nuit* (I).

نَوْعٌ مِنَ الشَّرْشُوحَاتِ يَزْرَعُ الْفَرَنْسِيَّةُ ، يَطُولُ مِنْ ٢٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم. أَوْرَاقُهُ اَلْعَلْيَابِيَّةُ عَائِقَةٌ الْخُضْرَاءُ الْاَتَمَّةُ . اَنْزَاهُهَا جَوْلَةُ الشَّكْلِ ، اَبْرِيَوِيَّةُ الْاَبْنِ ، عَرِفُهَا دَجْوِيَّةُ الْفَرْحِ فِي الْبَلَدِ وَبِغْيَتُهَا فِي الْبَلَدِ ۥ وَهِيَ مِنَ الْبَلَدَاتِ الْاَبْرِيَوِيَّةِ الْمَسْرُوعَةِ اَلْقِيَّتُ تَتَبَعُ وَتَتَبَعُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَرْضِ .



شِرْشُوحَاتُ مُسْتَحَبَّةٌ



شِرْشُوحَاتُ

الى • يضاف تحفظها بتأدية الذكور || أشهر ازواجه
الشرشور الفائع والجبلي والألاني .

١٥١٦٧ - شُرُوطُ جَبَلِي
Pinson d'Ardennes, Pinson de montagne (F). Brambling, Mountain finch (E).
يرن بالزغاري ، اطلبه .

١٥١٦٨ - شُرُوطُ شَكْبَع *
Fringilla coelebs (S).
Pinsons communs (F). Chaffinch (E). Buchink (D).
نوع من الشرشور طوله من ١٦ الى ١٧ سم . جميعه
سواء الرئس . راسه وقفته ويمتد الى الزينة الربادية الموج .
ظهره اسمر اللون تلوين مابة زيتية . زيمكاه الى الخصرة .
مستطاه بلون ظهره يمتد فيها خطان عاجيان . صدره الى
الجلوة الغمرية ، يك يتصرف الى الصبغة ويتهي بالايض .
الاني اسمر قدام من الذاكر واهت ثوباً .

١٥١٦٩ - شُرُوطِيَّات
Fringillidae (S). Fringillidae (E).
نميلة طير من الجوائم المحرطيات المتانتير . منها الشرشور
والسحون والتمار والكتنار .

١٥١٧٠ - شُرُوبِ
Sercalis (F).
هو الخلد ، اطله .

١٥١٧١ - شُرُوبِي شَقَوِي
Sercalis d'iver (F).
هو الخلد الشتوي من طيور الماء ، اطله .

١٥١٧٢ - شُرُوبِي صَيَّي
Sercalis d'été (F).
هو الخلد الصيفي من طيور الماء ، اطله .

١٥١٧٣ - شُرُوبِ
هو الصديق ، اطله . ج حراس وحرصه .

١٥١٧٤ - شُرُوبِي
Imperdable à la lumière (F).
هو ما كان لا ينفذ النور . راجع شان .

١٥١٧٥ - شُرُوبِ
Clause
هو كل نص خاص يرتبط عملاً قانونياً .

١٥١٧٦ - شُرُوبِ ، شُرُوبِيَّة
Condition
هو تمثيل لنفاذ عقد قانوني على حدوث حدث في المستقبل
مشكوك في حدوثه . وقد يكون الشرط :

شُرُوبِ اسْتِطَالِ ، محصل
Condition casuelle (F).
Casual C. (E).

شُرُوبِ اِدَارِي
Condition processative (F).
Protector C. (E).

شُرُوبِ تَوْقِي ، ملحق
Condition suspensive (F).
Suspensive C. (E).

شُرُوبِ فاسخ
Condition résolutoire (F).
Abrogating C. (E).

شُرُوبِ محظور ، غير جائز
Condition illcita (F).
Illicit C. (E).

شُرُوبِ غفوق
Condition défallite (F).
Falling C. (E).

شُرُوبِ مستحيل
Condition impossible (F).
Impossible C. (E).

شُرُوبِ رافث ، منافي للاخلاق
Condition immorale (F).
Immoral C. (E).

١٥١٧٧ - شُرُوطُ اسْتِثْنَاءِ الاختصاص

Clause attributive de juridiction (F). Attributive clause of jurisdiction (E).

شرط استثنائي يقتضي بطرح المنازعة التي قد تلتصق من العقد
على محكمة معينة .

١٥١٧٨ - شُرُوطُ الاختصاص ، مَعْطَاة

Compromis (F). Compromis, Mutual agreement (E).

المشايعة هي اتفاق يبرمه كتاباً من بياض يبرم زواج ،
على ان يتحكما في فضله شخصاً يتراضون عليه بقصد حكماء .
ويختار للمطالبة حكماً من عقود التراضي وهو لا يصح الا
من له اهلية الاداء المطلقة .

١٥١٧٩ - شُرُوطُ الأمر ، شُرُوطُ الاذن

Clause à ordre (F).

هو شرط يقتضي حتماً نص صيغة « لأمر وبأذن » وبذلك
يمكن تحويل الدين بالتظهير . اما صيغة التظهير فهي :
« اذنوا لاسم فلان ... »

١٥١٨٠ - شُرُوطُ التفضيل

Pacte de préférence (F). Preference clause (E).

اتفاق يلتزم المرء بمقتضاه اذا احتزم تحرير عقد معين
ان يفضل الموجود به بنفس الشروط التي يبرمها الغير .

١٥١٨١ - شُرُوطُ الضمان

Clause de garantie (F). Garantie clause (E).

شرط يلتزم الكفيل او الضامن على دفع ثمن المشتري الى
البائع اذا تأخر الشاوي من ذلك .

١٥١٨٢ - شُرُوطُ الحراسة

Clause de sauvegarde (F). Safe-guard clause (E).

شرط يربط الى عهد الالتزامات المالية بعضها بعض
فيصح تنفيذ بعضها سلفاً على تنبيه البعض الآخر .

١٥١٨٣ - شُرُوطُ تَهْدِيءِي

Clause comminatoire (F). Comminatory clause (E).

شرط خاص يدرج في عقد المتبرع يتم القيام بعمل معين
ما ويصنع على اقتطاع مقدار معين ثباً اذا امتنع المتبرع
له من القيام بالعمل المطلوب .

١٥١٨٤ - شُرُوطُ جزائي

Clause pénale, Pénalité (F). Penal clause, Penalty (E).

شرط يعلق المتعاقدون بمقتضاه على تقديم مبلغ جزائي
للمتبرع الذي يجب على المدين اذا لم ينفذ أو اذا اضر
تنفيذ التزامه .

١٥١٨٥ - شُرُوطُ حصّة الاسد ، شُرُوطُ عَشْبَتِي

راجع اشتراط حصّة الاسد .

١٥١٨٦ - شُرُوطُ رَفْعِ المسؤولية

Clause de non-responsabilité (F). No responsibility clause (E).

شرط يعلق المتعاقدون بمقتضاه على نفي المسؤولية عن المدين
اذا تأخر في تنفيذ التزامه . وهو من الشرط المحظورة
في عقد النقل .

١٥١٨٧ - شُرُوطُ غُلُقِ الرِّهْنِ

Pacte commissaire (F). Binding on pain of clause (E).

هو اتفاق في التمديد للمدة الطرفين ينص فيه على انه في
حالة عدم تنفيذ أحد الطرفين الالتزام الذي انشده عليه
العقد فسخ العقد بقدر القانون دون ان ترتفع بشأنه دعوى



شرشور فائع

١٥١٩٦ - شُرعية أنيكة، بيئرية أنيكة

Baeria gracilis (S). *Baeria graciosa* (F).
نوع من الشُرعية عشبها زينة حولية . ساقها فراء تملو .
١٥ سم إلى ٣٠ سم . أوراقها كاملة سنانية التصل .
رويساتها الزهرية عديدة للسينات أيضا إلى الاسفر
الجميل || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٧ - شُرعية مدّعية، بيئرية مدّعية

Baeria chrysotoma (S). *Baeria dorae* (F).
نوع من الشُرعية عشبها زينة حولية . ساقها فراء
تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها كاملة سنانية التصل .
رويساتها الزهرية عديدة للسينات الكبيرة المستطيلة، أيضا
إلى الصغار اللهب || تنورها يستمر طوال فصل
الصيف .

١٥١٩٨ - شُرطين

الشُرطين منزل من منازل القمر اشابة ينزل القمر في
الليلة الأولى . ويقال لها قرنا الحبل والنطح . وها مترضان
من التلال إلى الجنوب . وإلى جانب التلال منها كوكب
صغير || ولب الشُرطين يسمى الثفر .

١٥١٩٩ - شُرغال ، شُرغان
Spathe
قناة ظلمة للتصل وما أشبه . وهو الكانور .

١٥٢٠٠ - شُرعطط
Phellandrium (S).
Phellandria (F).

جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة الخبيات .
انواعها قليلة البلد منها المناطق المتدلة، جميعها ترهب
في الموانئ الرطبة . أوراقها متعاقبة مركبة قريبة البنية من
الشوكران || أعرف انواعها وأشهرها الشُرعطط المنقي .

١٥٢٠١ - شُرعطط منقي، شُرغال الماء

Phellandrium aquaticum, *Cenanch phellandrium*
(S). *Phellandria aquatica*, *Fenouli d'eau* (F). *Water*
drop-wort, *Water hemlock* (E). *Wasser Pilsendal*,
Wasser Piersast (D). *Felandrio*, *Finochio*
acquatico (I).

نوع من الشُرعطط وهو نبات عشبي بري صعب يكثر في
المنطق والأراضي الرطبة . يعتبر من النباتات السامة التي
تؤذي للماشية || استنبط ازهاره الغليظة بالماء فيفيد الربو
ويستخرج من بزور مادة قوية جسمية لها استعمالها
الطبي .

١٥٢٠٢ - شُرغف
Etèter (F). *To pollard* (E).
شُرغف القصب : قطع رأسه الثاني . والشُرغف : قطع
الرؤوس الثانية في النبات .

١٥٢٠٣ - شُرغفة
Démagogie (F).
Demagogy (E).
الشُرغفة حالة اجتاعية تسود فيها فوضى آراء الذين يدعون
مناصرة الجماعات أو الشعب .

١٥٢٠٤ - شُرغفي
Démagogique (F).
Demagogic (E).

نعت شُرغفي يطلق على كل ما من شأنه تحريض أهواء
الجماهير وشهواتها الانطاظية .

١٥٢٠٥ - شُرغيفي
Démagogisme (F).
Demagogism (E).

الشُرغيفي حُلب الذين يثرون بالشُرغفة .

النفع . وهو أيضا اتفاق يبيع به أراضين للمزبن الحاضر
الزمن ، الاستيلاء على الزمن في ساعة عدم فناء الزمن عند
حلول أجله وهذا الشُرط عطلور قانوني .

١٥١٨٨ - شُرط مألوف
Clause de style (E).
Style clause (E).

هو من الشُرط التي كترج في جميع العقود للتشابهة
بطبيعتها : مثال ذلك ما يرد في عقود الإيجار بأن المستاجر
قد ملأ الأرض المؤجرة مائة تنني دعوى الجهالة شُرما .

١٥١٨٩ - شُرط معدن، شُرط مخالف

Clause derogatoire (F). *Derogatory clause* (E).
هو كل نص يدخل بمقتضا تعديل على الاتفاق المقيد
أو يصرح به عنه .

١٥١٩٠ - شُرط مكتسمة للتنازع له

Pacta de quota litis (F). *Quota litis clause* (E).
شُرط يتخذ بين الخصم والمتنازع من أن التنازع التقاضي
تكون جزءاً من كسبه وهو عطلور في اللوائح المهنية .

١٥١٩١ - شُرعية
Shortia (S).
Shortia (F). *Shortia* (E).

جنس نباتات عشية ركوبة معمرة من فصيلة القرنيات
الفرارية معقودة التبريد على اسم العلامة وشُرطه . وكبها
مستطيلة . أوراقها جلدية اللتلاشب مستديرة الشكل أو
كلوية ، جلدية التصل . أزهارها ملونة خالصة أبيضات
والأسيدي الخسبة ، خالصة الأسدية المعقبة . أنواعها
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

١٥١٩٢ - شُرعية كبيرة الأزهر

Shortia grandiflora (S).
Shortia à grandes fleurs (F).

نوع من الشُرعية الزينية . مهدا بعض مناطق أمريكا
التيالية . أوراقها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ،
قلبية التاعدة ، مسنة الحمار . أزهارها بيضاء اللون ،
خالصة العرف . قطرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من
أيار إلى حزيران .

١٥١٩٣ - شُرعية وحيدة الأزهر

Shortia uniflora (S). *Shortia uniflora* (F).

نوع من الشُرعية الزينية . مهدا اليابان . أوراقها كبيرة،
كلوية الشكل ، مسنة الحمار المفرحس . زهرتها وحيدة ،
وردية اللون ، خالصة العرف . قطرها نحو ٥ سم . ||
تنورها يستمر نحو أربعة أسابيع ابتداء من أواخر نيسان .

١٥١٩٤ - شُرطية، بيئرية
Baeria (S). *Baeria* (F).

جنس نباتات برية وزينية من فصيلة المركبات . أنواعها
عديدة معظمها أمريكي المهد . ساقها فراء . أوراقها
متعاقبة . أزهارها وركبي التجميع ، قناباتها عديدة الفصل
فردية الصف . تخننبا غبروية الشكل . بزورها مجنسة
مستطيلة قليلة العرض || أعرف انواعها وأشهرها ما يتبع .

١٥١٩٥ - شُرطية إكليلية، بيئرية إكليلية

Baeria coronaria (S). *Baeria coronale* (F).

نوع من الشُرطية الزينية المحلية قليلة العرض المستحب .
ساقها زباد البشرة فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها
مفرسة غليظة التشرح . رويساتها الزهرية كبيرة التقد
عديدة للسينات المتوسطة الطول لويا إلى الترقال . بزورها
مجنسة كبيرة الحسك || تنورها يستمر طوال فصل
الصيف .



شُرعية كبيرة الزهر



شُرطط منقي

كروية الشكل قدروا يراوح من حجم البقلة الى الجوزة الصغيرة || اشهر انواعه وانواعها الشروب الاسفر .

١٥٢١٣ - شُرُوبٌ اخضر * *Hyla arborea* (S). *Rainetta verta* (F). *Green Tree-frog* (E).



شروب حقل

نوع من الشروب . اصله من الهند . اليابان الى الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والوسطى وافريقية وافريقية الشمالية || جسمه صغير الحجم ، يطول منه الذكر من ٤ الى ٥ سم . ويصلح عند الانثى من ٦ الى ٧ سم . جلده مائل القشور ، مدام التسلق . جبهة نازلتان ، جاحشتان . خلفه مستعرض الشكل . ذكك السفل مدام الاستان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية طليقة اما اطرافها لجهزة بظباب محببة تمكئها من السير على السطوح المائية || ثوبه الى الخضار الزاهي ولكنه يمتلئ البقعة التي يمش فيها لذلك فهو عديد المالحات || يعيش معظم حياته متخفيا بين الاشجار والنباتات القريبة من الماء . يسرع في التبار ويبيت في الليل غشياً بين الاوراق . قوته الحشرات والحمام || الانثى تترأ نحو ٨٠٠ دملة في شلة متعينة المحيطة بقلدق جا في الماء فتلقح بيض الباتات او القصبان المغمورة . لتفت يتم غالباً ، بعد التسلق ياسمين وبلاطيل تبقى في الماء نحو ثلاثة اشهر ريثما يتم تطورها .



شروب غزني

١٥٢١٤ - شُرُوبِيَّات *Hyliidae* (S).

Hyliidae (F). *Hyliidae* (E).

يتم من سماعا صفادع الشجر . فصيلة حيوانات من آلة القبيات وبرتية السنيات ورتية التبروات . انواعها المرفوعة نحو ٢٠٠ متفرقة في معظم اقطار العالم || جميع انواعها صغيرة القدة ، درداء تحمل الانسان في ذكوكها السان . السنيها خفيفة ، مستطيلة . اطراف اصابعها مجهزة بظباب محببة تمكئها من تسلق السطوح المائية . قلدقها الامامية عادمة الاصلاح . اما السني العلوي الذي يترقى فقرة المعيز وعلوها ويتجزأ من البين واليسار فين التند || اشهر اجناسها الشروب والشفدع والحجاة .



شرخال



شروب اسفر

١٥٢١٥ - شَرْف ، شَرْف ، شَرْف

الشرف : بيت اخر تصبغ به الشباب (ابن الاعراب) .

١٥٢١٦ - شَرْقَتْ * ، قَعْرُ الثَّلُوج ، شِرْدُونَكِه

Chionodoxa (S). *Chionodoxa*, *Gloire des neiges* (F). *Gloria of the snow* (E). *Schneestob* (D). *Gloria di neve* (I).

جس نباتات حروفية من فصيلة الزنبقيات انواعها المرفوعة نحو ٨ مبعها القرق الابن ، ترب في المنطق المثلثة المنعرة نحو الجادة . جميعها صغيرة القدة تلون من ١٠ الى ٢٥ سم . وهي قرية للعين من الاطفال . انماها انبوية الشكل بطلانها سدحة الزلاين الاول والثاني طليقة الثالث والرابع ؛ اسديها سانية الشكل . الوشها عديدة فيها الالبيض والازرق والوردي والبيضي .



شرف

١٥٢١٧ - شَرْقِي * ، حَكْرُ القَرْقَال ، تَوْغْدِي

Falco chioquera (S). *Falcon chioquera* (F). *Falcon cherrug* (E).

طائر من فصيلة الصقريات طوله نحو ٤٠ سم . ويصغ ١٥٠ سم . وهو اجل الصقور ثوباً واحسنها توشجاً واسلمها تنيراً ولها مواجاً ورسها اقلاماً وانبيداً . موطنه فسح الارباع يمتد من الهند الى الشرق الاقد وافريقية الشرقية والشمالية . يألف السران ويصعد من القفر المرش .



شرق

١٥٢٠٦ - شُرُوب *Tordylium* (S). *Tordyle* (F).

جس نباتات عشبية ربية حولية سوية من فصيلة الخبيات . انواعها المرفوعة خسة ؛ اوراقها متعاقبة ، معتقة ، لاطقة الاذينات ، كثيرة التفريش . ازهارها صغيرة القدة ، بيضاء اللون || اشهر انواعها الشروب الغزني والشروب الخلي .

١٥٢٠٧ - شُرُوبٌ حَكَلِي * ، مُرُ الجَبَل *Tordylium suaveolens* (S). *Tordyle suave* (F). *Hodge parley* (E). *Zirmet* (D). *Tordillo* (I).

نوع من الشروب الخولي البري يكثر في الحقل المزدقة . اوراقه وازهاره مستقيمة المرف المتش . ازهاره بيضاء اللون . جلوره طيبة يقال انها تقيده الصرع وتسكن الوساخ والوساخ .

١٥٢٠٨ - شُرُوبٌ حَكْرِي * ، حَكَلِي * ، سَكَلِي * ، سِيَسْتِيَس * ، بَكَلُ الفُطَا *Tordylium officinale* (S). *Tordyle officinale*, *Sésali de Crète* (F). *Small hawwort* (E). *Kretischer Sésali* (D). *Tordillo*, *Sésali de Crète* (I).

نوع من الشروب البري الخلي . اوراقه معتقة ، متعاقبة . لصلها كثير التفريش والتش . ازهاره الى الالبيض الوردى || ينبت في الاربة الجبلية التحوطة الانساج والروطية . جلوره طيبة تقيده الصرع يذو التفتة .

١٥٢٠٩ - شُرُوبِي * ، قَهَنِي *Juridique* (F).

Juridical (E).

لعت ترمي يظل حل ما كان مطابقاً لمقتضيات الشرع .

١٥٢١٠ - شَرْع ، شُرُوف ، شُرُوع *Téard* (F). *Tadpole* (E).

هو صغير الصفادع . رقه يطول ، تسمياً ، حل الصفادع في دورها البوسلي القائم بين نصف الليل وكال الشكل البالي .

١٥٢١١ - شِرْهَال * *Chirogalus* (S).

Chirogalus (F). *Chirogalus* (E).

جس حيوانات لبونة من البومويات . انواعها المرفوعة خسة موطنها جزيرة مدفسر . تألف الثبات والاحراج . ملجئها الخيالي جماعي . جماعتها قليلة العدد || اجسامها ويرة ، رقيقة ، صغيرة ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . بما فيه الاذنان التي يراوح طولها من ١٠ الى ١٥ سم . رؤوسها يرمية الشكل . اذانها صغيرة مستديرة كاسية . ميونها كبيرة مستديرة ناعمة . اذواها تروح بين السرة العائقة والسرة الخنطية || غشها الثار والحروب والبلور والصل والصلابير والخشرات الكبيرة . بيئاتها الشوي حيث تستكن في غيوبه تامة يستمر من ١٠٠ الى ١١٠ أيام .

١٥٢١٢ - شُرُوب *Hyla* (S).

Rainetta (F). *Tree-frog* (E).

جس صفادع من فصيلة الشروبقيات . انواعها المرفوعة نحو ١٣٢ متفرقة في معظم اقطار العالم القديم ، من اليابان الى اطراف اروبة وافريقية الشمالية باستثناء الهند واروبة الشمالية || اجسامها صغيرة القدة تطول من ٣ الى ٧ سم . اذواها الى الخضار المنفوت المالحات والزلاين تعيش حياتها التي تطول نحو عشر سنوت في البر تملو الاشجار وتقيم عليها || ذكورها مجهزة بقلعة صوية

١٥٢٢٧ - شُرْم قَلْبِي الْوَرَك

Carpinus cordata (S). Charme à feuilles en cœur (F). نوع من الشرم مهدد اليابان . شجرته سرقية تجرد في جميع المواقع والأماكن . تملو من ١٢ إلى ١٨ م . أوراقها تقوّل نحو ٨ سم . نصلها ينحني الشكل ، قلبية الشكل ، مدبب الطرف . غشبا جامد الرقعة ، شديد الصلابة ، شائع الاستعمال الصناعي .

١٥٢٢٨ - شُرْم كَرْوَيْتَة

Carpinus americana (S). Charme de la Carolines (F). نوع من الشرم جبل الشكل . مهدد البلاد الأمريكية . يملو من ٦ إلى ١٠ أمتار . يتميز ببراعم الغلظة القصيرة . أوراقه تحمر في أواخر الصيف وتبقى على أحمر إلى الإحلال الذي يتم في أواخر الخريف || يعتبر من الأنواع الجالبة التي لا تجرد في أي موقع كان .

١٥٢٢٩ - شُرْم . *Fendu* (F). *Clef, Split* (E). صفة ما كان مشقوق أو مفكوك أو مصدح .

١٥٢٣٠ - شُرْمَلَف ، عَصَمَكَة . *Pampe* (F). *Blade* (E). ورقة الحنطة والشعير وسطم النباتات الجنبية .

١٥٢٣١ - شُرْمَب ، شُجْرَم ، بَوَاقِ رِوَح

Euphorbia pithyusa, *Tithymalus cutifolius* (S). *Euphorbia ptyusa* (F). *Wild pesty spurge* (E). *Tanfelmilch* (D). *Pitusa*, *Scabram* (I). نوع من الثريبيون وهو نبات عشبي بري مسمر ينكسر في الأتربة الرملية الرطبة . لا شأن له في الزراعة إلا أنه من النباتات السامة الشديدة الضرر . كان يستعمل في الماضي البعيد كسول جارف . وقد جاء من ابن البطار قوله : « وقد قتل به الجبال الطوائف خلقت من الناس » . عشية فرحاه تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . ساقه لينة انضغاطا . أوراقه متقابلة ، سنائية الشكل ، نصلها يطول نحو ١٠ سم . وهو وحيد الفلج ، عادم المرقق والشرايين ، لونه إلى الخضار الداكن . انزهاره سنبل التجميع تاجي الارتكاز ، انزهار صغيرة لثقة زرقاء اللون || ساقه ووروه متينة لثقة تستعمل في صناعة السلال .

١٥٢٣٢ - شُرْمَبِيَّات * *Androsace* (S). *Androsace* (E). فصيلة من الطحالب تنتمي إلى رتبة السفانث .

١٥٢٣٣ - شُرْمَكِي *Falcinellus* (S). *Falcinelle* (F). *Falcinellus* (E).

جنس طير من طوالب الساق وفضيلة التنظليات . أنوعه المعروفة أربعة ، ثلاثة منها أمريكية الموطن وواحد مهدد العالم القديم || أبسماها كبيرة . أعتاقها وصوبها مستطيلة . مناقبها حقيرة . ألوانها مختلفة الألوان السبعاء المواج || جميعها من القواطع . تألف الحياة الجماعية . مربيها عنه الرشي لا يقل من ألف زوج . تسير سطوط متناوبة متتابة لا تتصرف إلا عند الهبوط حيث تأخذ شكل الأقواس المتتالية || قوتها التهيدان والخبرات المائية والفتريات || اعرف أنوعه وأشهرها الشرقي البهي .

١٥٢٣٤ - شُرْمَكِي بَهِيمِي * *Falcinellus igneus* (S). *Falcinelle éclatant* (F).

طائر من الشرقي أطلق عليه العالم يوفون ، ليا مضي ، اسم كروان إيطاليا (Courlis d'Italie) . أعضانه تشمل بعض المناطق الاسيوية والشرقي الأوسط وأوروبا الجنوبية الشرقية

يصيد القوافض والصائير . يذئن في أصالي الأشجار البلسنة . أعتاقه تسع أربع وفئات تحضنها وحلها .

١٥٢١٨ - شُرْمَقِي *Rollier* هو الشراق ، الحلب .

١٥٢١٩ - شِرْمَكَة *Société, Compagnie* (F). *Society, Company* (E).

مقد بين شخصين أو أكثر يتفقون به على أن يقدم كل منهم شيئا للمل به واتساق أرباحه .

١٥٢٢٠ - شِرْمَكَة اِلْتِقَابِيَة *Tontine* شركة يؤلفها أشخاص متقاربين في السن عادة يقدمون فيها دوروس أموال ويشترطون توزيعها على الأحياء منهم بعد زمن معين .

١٥٢٢١ - شِرْمَكَة اَلْبَنَان *Fruitière* (F). *Fruiterer* (E). شركة أو جمعية تعاونية تجمع الحليب وتعتقه .

١٥٢٢٢ - شِرْمَكَة مَخَامَة *Société en participation* (F). *Profit-sharing society* (E).

شركة تجارية مسترة وجوبا فعملها أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقتسبا بنسبة معلومة ما تنتج بعض الأعمال التجارية التي يقوم بها أحد أو بعض الشركاء أو ما يدره استغلال تجاري تمتد للأجل يقدم به الشركاء جميعا بهمهم .

١٥٢٢٣ - شُرْم * ، عَرَبِيَّيْنَس ، لِيْرَبَة

Carpinus (S). *Charme* (F). *Horn beach, Yoke elm, Hornbeam* (E). *Hagebuche, Hainbuche, Hornbaum* (D). *Carpine, Carpeno* (I). جنس اشجار حرجية من فصيلة البتوليات رطب في الأراضي الرطبة . اغشبا صلبة صلبة الكسر تستعمل في صناعات عديدة اغشبا الاثيار لها شبه || سوقها متصلة . قفروها ملي . أوراقها نافذة ، متعالية ، متقنة . انزهارا وحيدة المسكن . شاربها الكبرية تأخر من حرارتها الاثوية أكثر من اسبوع || لشهر أنوعه الخمسة التالية .

١٥٢٢٤ - شُرْم الشَّرْقِي *Carpinus orientalis* (S). *Charme d'Orient* (F).

نوع من الشرم مهدد الشرق الأوسط . شجرته صغيرة لثقة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار . ساقها متراكبة الاضخان ، معزاة اللحاء . أوراقها صغيرة لثقة . نصلها قلبية الشكل ، مسن الحافة || غشبا شديد الصلابة ، حنلي اللون .

١٥٢٢٥ - شُرْم اَلْيَابَان *Carpinus japonica* (S). *Charme du Japon* (F).

نوع من الشرم مهدد اليابان . شجرته شبه هرمية الشكل تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها تقوّل نحو ١٢ سم . نصلها مستدير الشكل ، ذات الطرف متباعدة التسنين . متجعج الصفة || يعتبر من الأنواع الجالبة التي تتطلب بعض المواقف الخاصة .

١٥٢٢٦ - شُرْم بَتُولِي ، شُرْم مَبْدُول *Carpinus betulus* (S). *Charme commun, Charmille* (F).

نوع من الشرم السبروتي الحربي الشكل ، يملو من ٦ إلى ١٨ م . أوراقه مجعدة التصل ، مسنة الحافة ، صفحتها تقوّل نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ عرقها متناوبة الالتشاب مدحها يراوح من ٧ إلى ١٥ زويبا .



شُرْم



شُرْمَب



شُرْمَكِي بَهِيمِي

١٥٢٤١ - شَرَفَت * ، غُلُوطُون ، غُلُوطُون

Gulo luscus (S). Glouton, Goulu, Carcajou (F). Gluton, Wolverine (E).



شَرَفَت حمراء

حيوانٌ وسيد الجنس والنوع من السحليات اللوامح . جسمه مستطيل الشكل طويلاً الكامل يراوح من ١١٠ الى ١٣٠ سم . رأسه كبير لثته غروبي الشكل . اذناه مستديرتان . قوائمها قصيرة ، خالصة البرشاش الحادة . ذنبه جطل الصوف . بطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروته لينة ناعمة لونها الى الصبغة الخفيفة اللامعة الموحج . موطنه البلاد الشمالية الاسيوية والامريكية . انتاده تقع اربعة جيرة تربتها نحو الحبل .

١٥٢٤٢ - شَرَهَائِيَّات * Acrasiae (S).

Acrasidae (F). Acrasinae (E).

فصيلة من القنطور الخاطئة . اجناسها وانواعها عديدة تعيش على بعض المواد القلبية اغصها خيرة كبيرة الرطبة وبراز الحيوانات العاشية كبروت الدواب وضلع البقر || جهازها البشري منطوف بمادة حلالية يخلط فيها الشكل والحجم واللون مع اختلاف الاجناس .

١٥٢٤٣ - شَرَهَائِيَّات * Melandrya (S).

Melandryidae (F). Melandrya (E).

جنس حشرات من فصيلة الشرفيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المبروة عشرة منتشرة في معظم سراج السويليات في العالم || اجسامها مستطيلة الشكل ، مستعدة القليط ، بطول من ١٠ الى ١٦ مم . وروصها صفيرة ، مستعرة ، قليلة التشويز . حيثها بارزة . كثرها مستعدة الجرم . ملاحها الفكية كبيرة . قرونها الاستشارية قلابية ، كاسلها محبة مقلية . بطيها مستطيلة ، مدنية المؤصر . اتحادها ملتحف كامل كليل باستثناء الطرف للملعب . قوائمها خفيفة . اواطها وسيدة اللون منها البانجاني والازرق الاسود المالح والجوزي والاصفر والبندي || قوائمها تالفة الاجنحة تنتشر من مختلف انواع السويليات . ممرهاا دجوي . طرقاتها مربع الحركة . قوتها اوراق النبات والمواد النباتية المنطية . يرقاتها فائجة ومباردة .

١٥٢٤٤ - شَرَهَائِيَّات * Melandryidae (S).

Melandryidae (F). Melandryidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المبروة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المختلفة الحرارة || اجسامها متقلبة الجرم ، يتكرر لها الشكل المستطيل . اطولها تراوح من ٤ الى ١٦ مم . وروصها صفيرة . حيثها بارزة . ملاحها الفكية كبيرة ، مدنية . قرونها الاستشارية غليظة او صولجانية او قلابية او مدية فصلها ١٠ او ١١ . كاسلها مستعرة . اتحادها لائحة . قوائمها خفيفة . اصنافها رباعية العقل في الزوج الخلفي ، خاسيتها في الزوجين الاباسي والاصط . اواطها ملوية || جميعها غاشلة ودائمة تعيش على مختلف انواع النبات وعلى الاشعاب النشرة والقنطور وتحت اللحاء . يرقاتها غاشية او فائجة او شكاركة || اشهر اجناسها الشرعوية والدراسة والسماقة .

١٥٢٤٥ - شَرَهَائِيَّات * Leptosperma (F).

جنس الجمار ويصنات من الشرفيات وفصيلة الاسيات . انواعها عديدة ، نحو ٣٠ . اوراقها صيرية متقلبة سطرية . ازهارها فردية تتجمع بحورية الازنكار . غمارها كمبورية كثيرة البزور النقيقة || اوراقها واتوامها غليظة تستعمل في عدة علاجات مقوية .

وافريقية الشمالية || جسمه كبير لثته بطول نحو ٧٠ سم . لونه الى الصبغة الورداء السغماء اللوامح . رأسه عايق اللون . ظهوره ورجلاه غبر اللوامح . صدقه ويصنعه ويملته الى السمرة الخطيئة . مقادفه وسطقة عنه الى السمرة الكستنية . رجلاه الى الخضار البصري المايق || يأنف الملتصق والاصوار والاهوار وضلعان مجاري المياه القليلة الانسياب . قوته البندان والغشرات المائية واللباطيح ولقشريات || يفتن الى الانجار والشجيرات اللامالية على ارتفاع متر او اقل من سطح الماء . على مجموعة من البندان والقضبان والجذور والقش . انتاده تنقسم من ٢ الى ٤ يضبات لونها الى الخضار الازرق المادم القويش تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

١٥٢٤٥ - شَرَفَت Eflaner, Eflaumer (F).

To strip of leaves (E).

فلق رؤوس الصف .

١٥٢٤٦ - شَرَفَت Eflange (F). Stripping (E).

انتطاع رؤوس صف الزرع عند افراط النمو وقد يتم ذلك قبل الاسباب .

١٥٢٤٧ - شَرَفَت Cocon

في الصلابة ، الطلج . ج شرائق .

١٥٢٤٨ - شَرَفَت هو الشرغ ، اطلية .

١٥٢٤٩ - شَرَهَائِيَّات * Pyrochroa coccinea (S). Pyrochre rouge (F).

Pyrochroa coccinea (E).

حشرة وائمة غاشلة دائمة وانجبة من فصيلة الشرفيات ورتبة غديات الاجنحة . تأنف الاجراج والبراري . غاشفها تميش على بنبات الازهار وعلى اوراق النبات . يرقاتها في اول مهادها تمش على المواد النباتية والغشوية ثم على ما تقتضيه من اساريع الحشرات الخاطئة || جسمها متوسط لثته بطول من ١٢ الى ١٥ مم . ثوبا احمر الكفان اسود الرأس والبرامز . رأسها مستدير الجرم . قوائمها سليمانية . زباناتها مستطيلة ، مشطيان عند الذكر ، مشطيان عند الانثى . حيثها بارزتتان . ظهرها مستدير الطرف الاصح ، كليل الحمل ، عادم التحزيز || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان ويبقى حتى تموز . تسرح في التبار . لسافه في ايار . تنجح الممكن ميحاديها تحت لاه الانجار وقشورها || البرقة عند بلوغها الكلال الميسوري تظل نحو ٣٤ مم . جسمها مستطيل الشكل مبطل الجرم ، اجير اللون ، مستطيل الرأس البني ، ضلع التآكيد الفكية ، سداسي الرواجب السمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .

١٥٢٥٠ - شَرَهَائِيَّات * Pyrochroidae (S).

Pyrochroidae (F). Pyrochroidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تأنف الخيوس والنباتات التريينية وازهار النباتات المصومة والزراعية || جميعها صيرة من مبطة الاجسام المستعرة المؤصر . زباناتها مركبة من ١١ لصلة وهي مشطية الشكل عند الذكور ، منشارية الشكل عند الاناث . اصنافها خالصة العقل باستثناء الزوج الخلفي هاته رباعية || يرقاتها مبطة الجسم تميش تحت غلاء الانجار وقشورها الصلغة صامية وراء يرقات الحشرات الخاشية لقتضاء عليها || اشهر اجناسها الشرعوية .



شَرَفَت



شَرَفَت



شَرَفَت

Senecio argenteus (S). شَرَوْنَةُ فِصْبِيَّة
Séneçon argenté (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها سمكة التصل المفصص والمسنن، خلية البشرة، فضية اللون. أزهارها الى الصفرة الباهتة. ازهارها يستمر من آب الى الجلول.

Senecio doria (S). شَرَوْنَةُ مَدْبِيَّة
Séneçon Doria, Herbe dorée (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها اطيالية الشكل، لمبة التصل، بحرية اللون، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٠ أزهارها متوسطة القد، فاشرة البلق، لونها الى الصفار المذهب. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

Senecio flammula (S). شَرَوْنَةُ نَارِيَّة
Séneçon rouge-feu (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها الجلمية مسطحة المتق، سنانية التصل للسنة الحلق. أوراقها السفلى فضية اللون، وبضبة الشكل، عادمة التسنين. ازهارها ناروية اللون، حراء للمرج، حلقية التجميع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

Sénéclonées (F). شَرَوْنِيَّات
 سبط من فصيلة المركبات نباتاته عدة مئات مختلفة الاشكال والاحجام. اشهرها الشروة.

Truffe gâtée (F). شَرَفَاخ
Tainted truffle (F).
 الكساة الفاسدة التي قد استرحت (الفساد).

Cepola (S). Cápote (F). شَرَفَاط ٥٥
 جنس اسماك بحرية من فصيلة المنجيبات. ازراة المرفقة قليلة، اسطاتها المتوسط وبحار البلاد الحارة. اجسامها سوية الشكل حراء اللون. رؤوسها غليظة مقطوعة الاطعام. زعانفها الظهرية والبطنية تمتد من القراس الى القلب. زعانفها الشرجية غريزية الشكل. لحمها جادي الصنف قل من يربط فيه.

Cepolidae (S). شَرَفَاطِيَّات ٥
Cápolidés (F). Cepolidae (E).
 فصيلة اسماك بحرية من الطشيات شالكتات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك اساطم الثقات. اسطاتها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش بين المشريات وفي الاساطل. اجسامها سوية الشكل تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. انوثها متباينة اللون. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة. رؤوسها فضية، غليظة. اشدافها رحبة. بيوتها كبيرة. لحمها كاسنة الصنف، قل من يربط فيها.

Arère (F). Artary (E). شَرَاك
 هو الحراء الذي يحمل الدم من القلب الى سائر اجزاء الجسم يقابله القوريد الذي يبعد الدم من اجزاء الجسم الى القلب. اما اتصال بالوريدان فيتم بواسطة الاوعية الشعرية التي توصل نهاية القريان بداية القوريد. تتقيم الشرايين في الجسم الحيواني الى اربعة اقسام رئيسية: اولى القريان الاخر (الاورطي) الذي ينبع من البطن

Leptospermées شَرَهِيَّات، شَرَهِيَّة
 سبط من فصيلة الآسيات، اشهر انواعه الشري.

Miel (F). شَرُو
 هو السمل، اطلبه.

Mutation شَرُو
 هو الانتحاء، اي التبدل الجفائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع اور ضرب من الاحياء.

Senecio (S). شَرَوْنَةُ
Séneçon (F). Groundsel (E). Grahskraut, Kreuzflusse (D). Senecio, Senecione (I).
 جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ١٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. مسطها بري وبضها ترابي. منها الاصباق والجنبات والشجيرات المايينة الاشكال والالوان. احرف انواعه واشهرها ما يلي.

Senecio elegans (S). شَرَوْنَةُ الْفَرِيَّة
Séneçon d'Afrique, S. des Indes (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة حولية ومعمرة تملو ٣٠ الى ٦٠ سم. أوراقها سنانية التصل، زهاء البشرة. ازهارها وريدية او ليلية البتلات. اقوامها الى الصفرة، قنابها موشحة بالاصيد. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

Senecio aurantiacus (S). Séneçon orangé (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة ريفية معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها قليلة الحسل والزغب، بيضية اللون، لمبة المقعدة. ازهارها برتقالية اللون، عمراء القرمص، صفيرة اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

Senecio sagittifolius (S). شَرَوْنَةُ سَهْمِيَّة
Séneçon à feuilles sagittées (F).
 نوع من الشروة وهي جنبة جادة معمرة تملو نحو ثلاثة اقطار. أوراقها سهمية الشكل والسفل منها كبيرة فاشرة تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٤٠. ازهارها كبيرة القد، كثيرة العدد، حلقية التجميع، ثابته الازتكاز. قنابها تينة اللون، لسناها حلقية. ازهارها يستمر طوال الخريف.

Senecio vulgaris (S). Séneçon commun (F). Common groundsel (E).
 نوع من الشروة وهي عشبة برية حولية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها سنانية التصل، شترية الحافة، زهاء البشرة على صفحتها السفلى. ازهارها صفراء اللون، عابطة القرمص. يكثر ويوجد في الاراضي المزدرة. تأنفها المائتة لحسونة أوراقها ورواها. يتحولون لها طية تنظم الحسل وتقويه.

Senecio scandens (S). شَرَوْنَةُ عَوَكُوش
Séneçon grim pant (F).
 نوع من الشروة وهي جنبة سريرية معمرة تملو نحو ٥ اقطار. فروجها متراكبة نداء. أوراقها اطيالية مسطحة الزام الاخير، تسلمها خلي البشرة على صفحتها رؤوسها الشرجية ثمانية القريب، حلقية التجميع، ثابته الازتكاز. ازهارها يستمر طوال الخريف.



شروة شائعة



شراط

Dessiccation totale (F).
Total desiccation (E).

١٥٢٧٥ - شُرَاكَزَة

شُرَاكِيَّة شُرَاكَة : كان يابساً جداً .

Encyrtus (S).
Encyrtus (F). Encyrtus (E).

١٥٢٧٦ - شُرَاك

الواحدة شُرَاكَة . جنس حشرات نافعة من فصيلة الخنثريات.
أنواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المحمية
الحرارة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الخنافس
والمنكيات . أجسامها صغيرة ، أسطوانية الشكل ، تعلل
نحو ٢ م . اجتمعتها خشائية ، شفافة ، كبيرة عند الشقين .
ألوانها سوية الألوان القمامة .

Schizogonia (F).
Schizogony (E).

١٥٢٧٧ - شُرَاكَلَة

الشُرَاكَة ملودج تكاثري عامس تسلكه البرويات الاثنية
حيث ان البويضات لا تنجوا الى قد قددها يطهي عند
الجبيلات .

Encyrtidae (S).
Encyrtidae (F). Encyrtidae (E).

١٥٢٧٨ - شُرَاكَلِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة خشائيات الاجنحة المقصورة .
اجسامها وانواعها المرفوعة كثيرة العدد . جميعها نافعة
تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين ومرششات
الاجنحة . اسطواناتها معظم اقطار العالم باستثناء المناطق
الباردة والاسوائية . حشراتنا صغيرة القدر قليل نحو
ملليمتر واحد . اجسامها وقرونها الاستشعارية متناهية
الاشكال . رؤوسها مستديرة . جوفها اكبر من بطونها .
مرفعاتها صغيرة مستديرة . انايبها مختلفة . وحيدة اللون ،
وتلعب فيها المزاج الاسمح . اظهر اجسامها القدار
واللونين والبرقة والخشابة .

Schizocodon (S).
Schizocodon (F). Schizocodon (E).

١٥٢٧٩ - شُرَاكُودَة

نبات عشبي من مصر من فصيلة الخنثريات . منه الجبال
في المناطق المعتدلة الحرارة . ساقه جذمة . اوراقه ابيدة
قرصية الانتساب ، شبه قلبية الشكل ، مستطيلة المالحق .
فصلها جلدية مسنة الحمار ، لونها الى الخضار الاسمح
المزاج يطبق حاشى اخر . افران وريدية اللون ، قطرها
نحو ٣ سم . تنمو ينمو من آذار الى نيسان .

Flanc abrupt (F). Abrupt flank (E). شُرُون .

جنب البرادي الوبير الحادوي .

Ossilet (F). Knechte-bone (E). شُرُونَكَة

كل طوية من اطراف القوائم تدعى شُرُونَكَة ج شُرُون وشُرُون .

١٥٢٨٢ - شُرُونِب

الغصيب من الشجر قيل ان يصلح . ج شُرُونِب .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). شُسْ .

اسم شامل يطلق على الصخور المنظمة التركيب التي
تنقسم الى صفائح . ج شُسْ .

Olpidium (S). شُسْ .

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحريات . تكاثرها
لاشي ، تتميز بحلقها البوقية المستديرة . ينفجها كروي
الشكل يحمل حبة غليظة دقيقة . معظم فطور

الاسمر لطوق جلع الرثة اليسرى ثم ينحدر نحو الصدر
حيث ينفرج وينقسم . ثانياً للشران السباتي وهو
يقسم الى قسمين : الظاهري الذي يغطي ظاهراً الرأس
والوجه وسطاً القدم ، والباطني الذي يغطي معظم باطن
الجسم . ثالثاً شرانين الاطراف العليا والسفلى وهي
الشرانين الايطي والمعدني والحرفي . رابعاً الشرانين
السطحية التي تسير تحت الجلد . انهما الكبري والمعدني .

١٥٢٦٣ - شُرِيَّان ، عَصَبَة

Nervure cordaire (F).
Tertiary nerve (E).

هو في نمل الاوراق النباتية ، الغري السني الذي ينفرج
من البرق .

١٥٢٦٤ - شُرِيَّان صَبْكَاي هو الرباع ، اظله .

Sauvageon, Franc (F). شُرِيَّكَة

Wild stock, Ungrafted (E).
النبته الحاصلة من برة ولم تطفم ، ج شُرِيَّكَة .

١٥٢٦٦ - شُرِيَّش

هو الجذر ، اظله .

١٥٢٦٧ - شُرِيَّش المَاء

Sparganium ramosum, S. erectum (S). Sparganier
rigide, Rubanier, Ruben d'eau (F). Common burd-
reed, Knop sedge (E). Astiger igalkolben (D). Biode
Chlodo di Dio (I).

نوع من السافرة وهو عشب مائية ممرعة من فصيلة البرويات.
اوراقه متناحبة ، حاضنة ، صلبة الشكل ، جامدة لتصل ،
سادة الاطراف . اوراقه ابطية وماعية ، كروية الشكل ،
متناحبة . يوجد في مياه البلاد المعتدلة الحرارة .

١٥٢٦٨ - شُرِيَّطِيَّات ، رِيَّطِيَّات

Taenias (S). Taenias (F). Taenias (E).

لفصيلة ديد من المنقبات اجسامها وانواعها محددة تتطفل
على مختلف الحيوان .

١٥٢٦٩ - شُرِيَّط عَصْفَرِي

هو البذ الخضراري ، اظله .

١٥٢٧٠ - شُرِيَّكَة هي شكاكة لثة ، اظله .

١٥٢٧١ - شُرِيَّك

Amocé (F). Associocé (E).
هو كل عضو في شركة او جماعة منتظمة .

١٥٢٧٢ - شُرِيَّك في الانثيم

Cochligé (F).
Cochligent (E).

هو من كان مريضاً بمعنى التفاهة او القانين ان يشترك
في دلع دين بالتفاهة مع غيره .

١٥٢٧٣ - شُرِيَّكَة

Schusurella (S).
Schusurella (F). Schusurella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مغطيات الاوتل
وفصيلة القبابيات . انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم . اصنافها صغيرة ، بيضاء ، شفافة ،
مشرقة الحمار القاعدي الحادوي الرأس . اجسامها شفة
مستطيلة ، صلبة الرؤوس ، مسامية الواس الهذبة .

١٥٢٧٤ - شُرِيَّان هو الكشوث البري ، اظله .



شُرِيَّش المَاء



شُرِيَّكَة



شُرُونَكَة

١٥٢٩٣ - شَسَّ شَعْرَكَاه * ، نَقَارُ أَحْمَرٍ
Gecinua viridis (S). Gécine vert, Pic vert, Pivert (F).
Green woodpecker (E).

طائر من الشَّن موطَّه فِجَح الأرباب يمتد من الهند الصينية إلى المرات أوروبية || جسده بطول نحو ٣٣ سم. ثوبه جميل الألوان الزاكية، متناقل الأخضر والاحمر والاصفر والاسود والابيض. رأسه احر اللون. ظهوره الى الاصفر الاصفر الماروج. اذنيه اصف. بطنه الى الاصفر الفاتح الزاهي. عجمه الى السواد اللامع يرتكز على خط احر يمتد من قاعدة المنار الى اعلى المق. جناحه يجلعدن بالاسود والابيض والاصفر. منقاره صخلى اللون اسود الفيج || يألف الاسراج والمقايات والرياس القريبة من مجاري الماء. تربي الحشرات واساريمها ويرقاتها ويكسها يلقها بسمرة البرق يمكنه عليها لسانه المنطق الاخاذ. يمتد منه في تجاويف الاشجار. اثناء تصنع من ٥ الى ٨ بيضات تحضنها بمناورة الذكر من ١٥ الى ١٨ يوما.

١٥٢٩٤ - شَسَّ *
Schistocera (F). Schistocera (E).

ما كان مضد التركيب كالشس.
١٥٢٩٥ - شَسَّيَّة *
Curvuleria (S).

جس طيور مجهرية من الريديات وصلبة الطليعات.

انواعها قليلة العدد جميعها ربة قليلة الاذى تعيش على الانحاء النباتية الدالية || اعراف انواعها شسفة انحزوع (Cur. humata) التي تعيش على اللحاء البائرة نحو الياس في انحزوع والنتا وبفس الحفصيات.

١٥٢٩٦ - شَسَّيْدُكُو
Tunier (F).

هو القلارئين ، اطلبه.

١٥٢٩٧ - شَسَّيْدُكُو
قال داود الانطاكي: «لبيت يميل الى صفرة واصلو الى الحسرة تته القلم فيه حدة بصرية واجوده المجلوب من دير النوبا. وهو ينفع من الاستقاء والجنين وحسر التنفس ويحل القلم ويهدد اليك ويهدد الريح».

١٥٢٩٨ - شَسَّ * ، حَتَّيْن الدِيك، عَصْبَةُ السُّوس

Abrus pectorius (S). Abre à régisse, Liane à régisse, Arbre à chapelet, Pois d'Amérique (F). Bond tree, Wild liquorice, Rosary pea (E). Paternosterkraut (D). Falso liquorizia, Liane regolizia d'America (I).

نوع من الابروس وهو جنبة زراعية حارثة. جلورها صناعية تستعمل استعمال الكود. زهرها مستديرة الشكل. قشورها جامدة ، صلبة ، جلورية اللون ، سوداء النطقة. تستعمل في صناعة النسجات والقلاية. لهاها دعي يهدد الاسم ويهدد من استخرج منه مادة الابرين.

١٥٢٩٩ - شَسَّيْدُكُو هي الانبوج والنبوية.

١٥٣٠٠ - شَسَّ *
Elleuchus (S).

جس حشرات من عذبات الاجنحة وصلبة السويات. انواعها المعروفة مشرة منتشرة في معظم اقطار البلاد الممتدة الحرارة. منظومة دامن يعيش على المواد النباتية المنحلة وبعضها يعيش على ثبات الحور والصفصاف || اجسامها صغيرة الملمعية الشكل. كوكليا عذبة نائقة ازرقا. الماحدا لاسنة مخدة ، منها انواع ثنائية الفيج وغيرها رباعية. قرونها الاستشارية صلبة الشكل. قواهم نشطة مستعدة القد. انوارها تراور من النشقة الى السرة يطوا على صناعي. يقبها الى السرة القديمة.

حار يتصل على النباتات الزراعية. اشهرها واضرها شس التبوغ واللغوف واقل.

١٥٢٨٥ - شَسَّ التَّبَوُّغ *

Oplidium nicotianae (S).

نوع من الشس يسبب سنج الشتل الفنية ، مركب اليها الكاشفة وغلادها فيلوجا ويقضي عليها || يكاتج بتطير التربة قبل الجرد او باستعمال احد القواطين التنسية المنقطة عنه ظهور اليوم.

١٥٢٨٦ - شَسَّ المَلْفُوف *

Oplidium brassicae, Chytridium brassicae (S).

نوع من الشس مركب سنج الملفوف يند يكثر في الشاتل الربوية فيحطب سرق الشتل عنه سطح الارية وبسبب يدها الجزئي ثم انطاسها فوق بعضها ويرياها ويوتا.

١٥٢٨٧ - شَسَّ التَّنَكَل *

Oplidium trifolii (S).

نوع من الشس مركب التفل فيلوجا وبسبب يكاتج باستعمال احد القواطين التنسية بذلك يند حتى التفل عنه وبسرة لا تتعدى ٢٤ ساعة.

١٥٢٨٨ - شَسَّي * ، حَتَّارِي * ، حَتَّارِي *
Marginal (F). Marginal (E).

لست تعريفي يطلق على ما هو في الحار او ما جاءه من الحاش.

١٥٢٨٩ - شَسَّيَّة *

Marginalisme (F). Marginalism (E).

الشسبة نظرية اقتصادية تقول بان تعهد كمية الشيء منوط بدمال الحاجة اليه.

١٥٢٩٠ - شَسَّ

الشس : قيسر الذي يشق ويحطب.

١٥٢٩١ - شَسَّس *

Chesax (S). Chesax (F). Chesax (E).

جس حوالات بحرية من الرخويات معلبات الاثيل وصليعة التيجنيات. انوارها الماصرة المعروفة قليلة البد اطلها بعض مناطق المحيط الاطلسي || اصداها صغيرة اللون ، مرصاة الشكل ، ملونة وبزرة. قواها بفسية مسطيلة ، مالة الارويسة العادة المنصين || اعراف انوارها شسكس مديرا (C. maderensis) الذي يكثر ويوجد على شواطئ جزيرة مديرا.

١٥٢٩٢ - شَسَّ *

Gecinua (S). Gécine, Chloropic (F).

جس طير من فصيلة القناريات يتلقى جلوع الاشجار وينتج قشورها وشكورها في طلب الحشرات واساريمها. انوارها المعروفة قليلة البد. راحته شس || اجسامها طول من ٣٠ الى ٣٣ سم. انوارها متناقلة الالوان الجسيلة يتقلب فيها الاخضر. متناقعا غروطية ، مسطيلة ، مخدة. اجسامها متوسطة الحجم والانتزاج. اذنانها رتاجية ابريش. ارباشها قصيرة. اصابعها قوية. غالبا مستعدة الاطراف المجدبة الحادة || اشهر انواعها الشس الخضراء.



شس التبوغ



شس الملفوف



شس التفل



شس غفراء



شس



شس

١٥٣٠٩ - شَعْبُ الْكِثَانِ * (S). *Melampora lini*

Rouille du lin (F).

فطر مجهرى يتطفل على جميع انواع ضرير الكتان من برية وزراعية فيطبع الأوراق ويظهر بالانتاج . يتطفل أولاً بشكله الاثيدي في اوائل الربيع حيث يركب نصل الأوراق على صفحته . يظهر الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب لها الى الصفرة البرتقالية . ويته اكثال طوره الاثيدي تملأ خاشته في طوره الدماغي فطمر البشرة من بورخ كالحباب لونه الى الجوزة الزاهية . يكافح وقتاً أولاً باجتباب الموقع الرطبة . ثانياً باجتباب الارربة القوية الاندماج . ثالثاً باجتباب الاكثار من الاسمدة الفسفافية . رابعاً باستهلاك اليورق بملء او كيلو الدم الواحد .

١٥٣١٠ - شَعْبُ الْمُفَاضِ * (S). *Melampora evonymi-capreaeum*

Rouille du fusain (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وتواقي للمفاض فيرتبض بهنور الاثيدي الكثيفة التسجيع التي تهر صفراء اللون على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى دمايل من الدمايل ، لها الى الجوزة تطبع انسجة الاوراق وتسبب يسلها .

١٥٣١١ - شَعْبِيَّات * (S). *Melamporaceae*

Mélamporacées (F). *Melamporacées* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الشعبيات تتميز بتكوين اعضائها انتشارية (النمائل) تحت البشرة او تحت القاعدية الاثيدي . اثيراتها فارقة طليقة . دمايلها صلبة تهر منطفة ثم تنفلق من بويئات فردية الكثوة كثيفة التسجيع . اجناسها عديدة ، اشهرها واعرفها من الوجهة الاقتصادية الفئة التالية : الشعب والشعاب والشعيب والزليشة والسلاج والشفة .

١٥٣١٢ - شَعْدَقِي الرَّيح * (F). *Rose des vents*

Compass-card (E).

هو الصنم المشرق به حالياً لبيان مصادر هبوب الرياح . يمل ١٦ اتجاهاً منها اربعة زونية وهي الشمال اي الجنوب

١٥٣٠١ - يَحْيَى ، مِينَكَا * (F). *Hameçon*

Fish-hook (E).

خضائن او كلاب صير من فولاذ يثبت في خيط والحيط في صفا طرية . يستعمل لصيد السمك .

١٥٣٠٢ - شَعَاب * (S). *Melamporidium*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشعبيات يتميز بملامحه الباعدة النكات وبدماماته الخيطية الجليل والشفة . اثيراته تركب الاوراق على صفحتها السفلى . يظهر الخارجي بهنور صليبية برتقالية اللون مبرزة بدون ترتيب الى ان تدخل في طوره الدماغي حيث تأخذ اللون الخليل ثم تنفلق الى انواعه قليلة اعرضا شعاب البتلا وشعاب الثرم .

١٥٣٠٣ - شَعَابِ الْبَتْلَا * (S). *Melamporidium betulinum*

Rouille des feuilles de bouleau (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق البتلا فيذبلها ويسبب سقوطها الباكر الى ظهور الخارجي ، في طوره الدماغي ، يقع فضلة مبرزة لونها الى الصفرة تهر على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى بهنور مكثبة من الخلائج الدماجية الخيطية اللون الى اشراره زهيدة لا تسبب المكثبة .

١٥٣٠٤ - شَعَابِ الثَّرْمِ * (S). *Melamporidium carpini*

Rouille des feuilles de charme (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الثرم فيؤذيها الى ظهور الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب تركب النصل على صفحته السفلى . تهر صفراء اللون ثم تتعرف الى الخليل تطبع لسج الخلل وتسبب الاجبال الباكر . لا يستوجب المكثبة .

١٥٣٠٥ - شَعْب * (F). *Sécheresse des plantes*

Stearility of plants (E).

هو عدم اثمار النبات سببه عارض جوسمورى يمنع النبات من التثير او يتحول الاندثار الى اوراق من فوط السو .

١٥٣٠٦ - شَعْب * (S). *Melampora*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشعبيات يتميز بملامحه المبرزة بتكاثر دوسية . دمايلها مبرزة ، وشية الاركاز لا وثيرة الى انواعه عديدة لا تقل عن ٢٠ لشهرها ما يتبع .

١٥٣٠٧ - شَعْبِ الْحَرَوِ * (S). *Melampora rostrupii*

Caoma mercurialis (S). Rouille du peuplier (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الاثيدي على الحور فيركب الاوراق والسوق . وهو على الاوراق يقع صيرة عديدة مبرزة يعلو انتظام تكثر منه الحرات النصل وفي زامه الاشر فتطبع وتسبب سقوط الاوراق ويضعف الانجار .

١٥٣٠٨ - شَعْبِ الصَّنَوْبَرِ * (S). *Melampora pinitorqua*

Caoma pinitorquum (S). Rouille tordeuse des rameaux de pins (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الاثيدي على غرايمى وتواقي الصنوبر كما يركب بشكله الدماغي اوراق الحور . يظهر الخارجي على تواقي الصنوبر بقع صفراء يضيئة الشكل طولها نحو ١٢ م ومعرضها ١٠ يعلو قصبات صيرة تشطرية تقرح اللحاء وتطرح بالبشرة قصب تحبين النامية ان لم تقص عليها .



شعاب الثرم




شعاب الحور



شعاب الصنوبر



شعاب الكتان



مستقة، نصلها مالم البشرة شديد الخضار. تزوع لثريا
الفرطية للشكل، الشديدة الحرارة واللينة يمسف الثقبانينات
الزليسية انحصا الثقبانين « ث » .

Partager en 2 parties égales (F). **شَطَر** ١٥٣٢٢
To share in equal division (E).

قسم الشيء الى جزئين متساويين .

١٥٣٢٣ - **شَطَطَلَا كَتِي** *

Sarcidornis melanotos (S).

Sarcidornis noiretre (F).

طائر من فصيلة البيليات . اصالته تمتد من الرقبة
الاستوائية الى برناميه في الهند لا جسمه كبير القد
مستطيل المتق يعمل في الصفحة العليا من متفاده لخصه
لحمية جارية اللون . جناحه كبيران لا طافان . ذنبه
جذمة . لونه متراكب الاسمر والبنيجي والاسود .
مؤخر عنقه وصدره وبطنه الى الياض الاخضر .

Excédent (F). Exceeding (E). **شَطَطَلَا** ١٥٣٢٤

هو ما زاد او تبقى او فاض . يقال لا وكس ولا شطط
اي لا نقصان ولا زيادة .

١٥٣٢٥ - **شَطَط السُلْطَة** ، **تَجَاوَز السُلْطَة**

Excès de pouvoir (F). Excess power (E).

هو ان يتجاوز احد القضاة او المأمورين الاديون
حدود سلطه .

١٥٣٢٦ - **شَطَب** *

Discope
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات ورتبة شالكات
الزحائف . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد . جملة المنظر ،
ماكية ، ليلجة اللحم . طولا يراوح من ٤٠ الى ١٢٠ سم .
اشهرها من اسماك المحيط الهندي وبعضها يعيش في
البحر الاحمر || من انواعه المشهورة البهار والشفل
والشفط الوردي والشطف الاسمر والمبر .

Discope nigra **شَطَب اسمر** ١٥٣٢٧

سمكة من الشطف ، كبيرة القد طولها نحو ٩٠ سم . ثوبها
الى الطحلة السمر . مرتبها يمتد من البحر الاحمر الى
الخليج الفارسي والهند وسريلنك .

Discope sebae **شَطَب زَوْدِي** ١٥٣٢٨

سمكة من الشطف كبيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم . لونها
البردي الذهب المالح يطولو تخطيط احمر قاطب يمتد
من الراس الى الفرج . لحمها اللين الطعم مرغوب فيه .
تكثر في المياه الحارة والاسترايلة .

Chaetomys (S). **شَطْمُوس** * ١٥٣٢٩

Chétozmys (F). Chaetomys (E).

حيوان لبون قاتم وردي الجلس والذوق من فصيلة الشحيمات
موسكة البرازيل . طوله نحو ٥٠ سم وذنبه ٢٥ . راسه
غليظ مفلطح . ذقنيه غطوم . خناجره مقروشتان عينا
واذناه صغير . جرابه مستدلة القد . اطرافه قوية حادة .
ذنبه كاسي القامة . حشيشه الباني ، لا اخاذ . شعره
جلي حدي فخر يخطله شوك قصير كالسلك ينفض عنه
الدفاع من اللس || ياتف الثبايات والاحراج والمراعي
والحقول . يسرح في الليل . يتسلق الاجمار . قبه المواد
النباتية على اختلافها .

والجنوب اي لقليلة والشرق اي السبا والغرب اي القبور .
واربعة ثمانية وهي الشال الشرقي اي الحيف والشال الغربي
اي الجرياء والجنوب الشرقي اي الازيب والجنوب الغربي
اي الصاية . وثمانية ثالثة وهي الشال الشمال الشرقي اي
ميت الشال . والشرق الشرق الشمال اي حيد السبا
والشرق الشرق الجنوبي اي ازيب قصبا . والجنوب الجنوبي
الشرقي اي ازيب الجنوب . والجنوب الجنوب الغربي اي
صابت الجنوب . والغرب الغرب الجنوبي اي صابت الغرب
والغرب الغرب الشمال اي جرياء الغرب . والشال الشمال
الغربي اي جرياء الشمال .

Petit de la gazelle (F). **شَوَمَر** ١٥٣١٣
Young gazelle (E).

هو صغير الغزال وينسج جدية . ج اشعار وشمار .

Mauvais laktère (F). **شَمُوس** ١٥٣١٤

Bad milk (E).

انثى البائم القليلة الدر . ج شمس وشماس .

Melampoirella **شَمْبِي** * ١٥٣١٥

جنس تطور مجهرية من فصيلة الشصيات . ينسج بلداقته
البدية الشكات وبعلماته الشفافة الجلي وانشاء . طوره
الانثي يصل بمسقلان شارب || انواعه قليلة امرتها
شصية التوب .

١٥٣١٦ - **شَمْبِي التَّوْب** *

Melampoirella caryophyllacearum, Melampoires
cerastii, Acidium elatium (S). Rouille vasculaire
du sapin. Balai de sorcière des rameaux de sapin (F).
فلر مجهرية يتصل على التوب لؤلؤه ويؤده الى السكة
(نكتة السامرة) . ظهوره الاخضرية بقدر صغيرة غطية
التيصم والقرنبي لا لياسية الشكل والحجم تركيب النصل
على صلحة السطيل بمؤازة النصل تنصب الاحادب والذواي
وتسبب السكة الذي يشو الاجمار ويؤثر نجما .
يكافح بالتصاع يسرق الاتحاد المكونة .

١٥٣١٧ - **شَق** هو الشاطي . ج شطوط وشطان .

Tallo (F). Sucker (E). **شَقَّة** ، **مُشَقَّة** ١٥٣١٨

الشفط ج شفوط وشفطه اي فراخ الفروع . يقال شقا وشفا
الفروع فهو مشط .

Tristocum (S). **شَطَس** ١٥٣١٩

Tristole (F). Tristocum (E).

جنس نباتات عشبية ، برقة ، سولية من فصيلة النجيليات .
انواعه المبرقة قليلة البلد منها جبال حوض البحر
الابيض المتوسط || شكلها قريب للشف من الخرفال .
بعض انواعها شقي . صفها مستطيل ، ياتف الخضار .
ازهارها منفرد تتجاذب السبيلات .

Radiation (F). **شَطَب** ١٥٣٢٠

عمر من جدول او تليل .

Capiscum concinnum (S). **شَطَلَا** * ١٥٣٢١

Piment à bouquet rouge (F). Cone pepper (E).
Kleine Beisbatsra (D). Pape d'Ape, Pape
rosso piccolo (I).

لوع من القليلية وهي بقلة عشبية سولية من الفصيلة
الباذنجانية . تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سهمية



شعيب التوب



شقة



شطط كتي



شطط



شطوس

Toile d'araignée (F). Cobweb (E). **شُعَب** ١٥٣٤١ -

هو بيت الشبكات الموشى بالنس.

Andouiller (F). Tine (E). **شُعَاب** ١٥٣٤٢ -

هو الاشعاب الخشبي الذي يحصل في قرون الاكل والاريل واليسور. ومن هذه الشعاب يمكن تحييد عمر الحيوان.

Endroit boisé (F). **شُعَاوَر** ١٥٣٤٣ -

Wooded side (E).

الشعاب: مكان ذو شجر. وهو الشجر اللطيف او ما كان من الشجر في اين ولاء من الارض.

Rayon de lumière (F). **شُعَاع** ١٥٣٤٤ -

Ray of light (E).

شعاع الشمس المنسكب الذي تراه مشتركا كالجبال.

Barbes (F). **شُعَاع** ، **شُعَاع** ، **شُعَاع** ١٥٣٤٥ -

Beard, Bristles (E).

هو سنا السنبل اذا ليس وما زال على السبله || يقال اشع القزح اذا اخرج شعاعه.

Actinomeris (S). Actinomère (F). **شُعَاع** ١٥٣٤٦ -

جس شعاعيات حشوية ممتدة من فصيلة المركبات. انواعه قليلة. اوراقها فتحة الشكل، السفلى منها متعاقبة واعليا متعاقبة. ازهارها صفراء. ثمرتها كروي الشكل اسفوف. يزورها ملقطة مجنسة ثنائية المسك || تظهر انواعه الشعاع الخبي وشعاع سكرودا.

Rayon Incident (F). **شُعَاع ساقط** ١٥٣٤٧ -

Incidental ray (E).

١٥٣٤٨ - **شُعَاع سكرودا**

Actinomeris squarrosa, A. alternifolia (S). Actinomère à feuilles alternes (F).

نوع من الشعاع وهو نبات حشوي معمر يصل من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه متعاقبة، مسطحة، مدببة، لائفة، جلدية النصل، مسنة الحافة. ازهاره رؤسية عديدة، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || ازهاره مخزني.

١٥٣٤٩ - **شُعَاع طبي، حشوية السكرية**

Actinomeris helleboroides (S). Actinomère-Soleil, Herbe au diabète (F). Diabète weed (E). Strahlkraut (D). Erbe du diabète (I).

نوع من الشعاع وهو نبات حشوي معمر يصل نحو المتر. اوراقه بيضية لينة لائفة، لها اذن زغب المسنة السفلى. ازهاره رؤسية قطرها من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الصفار الشمسي || ازهاره يثمر من نحو الى الجبل. يقال انه يلبس السكرية.

١٥٣٥٠ - **شُعَاع ما وراء البنفسجي**

Rayon ultra-violet (F). Ultra-violet ray (E).

١٥٣٥١ - **شُعَاع كاثودية**

Rayon cathodique (F). Cathodic ray (E).

١٥٣٥٢ - **شُعَاع**

Radiateur (F). Radiator (E).

جهاز كهربائي يزيد مساحة الاشعاع.

١٥٣٥٣ - **شُعَاعَة**

Actinisme (F). Actinism (E).

الشعاعية تأثير الاشعاع ان ضيائي او حراري على نوع النبات.

١٥٣٣٠ - **شُعَبَن**

Diformisme (F). Deformism (E). هو اليبب التناسبي او الخلل من التناسق للمأثور والانسجام للمقول او الخلق.

١٥٣٣١ - **شُعَبِي**

Cespitieux (F). Cespitose (E). تمت تربت به النباتات الكثيرة الاشطاء اعصاب النباتات النجيلية.

١٥٣٣٢ - **شُعَبُوس**

Dissident (F). Dissident (E). الشطرون من خالف او ناقض الغير.

١٥٣٣٣ - **شُعَبُوس**

Squalius (S).

Chevaine, Chevesne, Chevenne (F). Chub (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم. انواعه عديدة منتشرة في معظم بحيرات وانهر البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها وشمية الشكل. زعانفها الظهرية فردية، متوسطة الحجم تقابل الزعانف الصدرية المنقسمة الى شطرين || ألوانها خائبة الالوان الخفلة تكثر فيها الاربدة والازرق البنفسجية. جوفها وبطنها فضية اللون. زعانفها الى الصفار الاصفر المالح او الى الحمره السمراء اعرف انواعه واشهرها الشبوط الملهوطة وشبوطه سوني.

١٥٣٣٤ - **شُعَبُوسَة سُونِي**

Squalius souffi (S).

Chevaine souffi (F). Bull-head (E).

سمكة نهريه يعيش من الشطوط. اعطانها ارفاد والاهار الجراف السريعة التيار || جسمها صغير لكنه يطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الزرقه البنفسجية. جانباها وبطنها الى الفضي. زعانفها الى الخضار الاصفر المالح || لجها كائن الصفه، قل من يررب فيه.

١٥٣٣٥ - **شُعَبُوسَة مَبْدُونَة**

Squalius caphalus (S). Chevaine commun,

Munier (F). Miller's-thumb, Bull-head (E).

سمكة نهريه يعيش من الشطوط. اعطانها سطح انهريه وبحيرات البلاد المعتدلة الحارة || جسمها كبير لكنه طويلا نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الاربدة الزرقية. ظهرها اصفر من بطها. زعانفها الى الخضار الاصفر المالح || الاذن تسرا من نيسان الى ايار || لجها متوسط الصفه، ما كويل.

١٥٣٣٦ - **شُعَبُوسَة**

Allosome (F). Allosome (E).

اسم يطلق على كل ندية فردية كانت ام اكثر موجبة في جيلة الفلانة انما تختلف شكلا وقدما من الشعب المدية. وقد يبرى فيها التبايز الشقي.

١٥٣٣٧ - **شُعَبُوسَة**

Secille (F).

نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل الانقسام.

١٥٣٣٨ - **شُعَبُوسَة**

Biscourrage (F).

Castration by torsion (E).

حرم خصية الكباش بين حدين وشدها بقبب حتى تذبل.

١٥٣٣٩ - **شُعَبُوسَة**

Péroné (F). Fibula (E).

قصبه الساق السفرى.

١٥٣٤٠ - **شُعَبُوسَة**

Racorni (F). Herden (E).

الشطون من اشجر: ما لم يجد ربه صلب من غير ان تلعب نومه.



شطوطه مدببة

الى السرة الخفيفة بالاسفر. تركب الأيل والاريل والحيور والفر.

١٥٣٧٧ - شُعْرَانِيَّة الْبَشُون

Ornithes metalica (S). *Ornithes du héron* (F).
نوع من الشعراء خفيفة الجثة ، قصيرتها ، طولها نحو ٤ سم. رأسها مستعرض الشكل ، هوائياتها كبيرة ، عظمها حلي الخنجر. ثوبها الى الخلف اسفح الموج. تركب البشون والقيق.

١٥٣٧٨ - شُعْرَانِيَّة الْحَتَام

Pseudolynchia maura (S). *Mouche du pigeon* (F).
نوع من الشعراء جثتها مستعرضة مضمورة ، طولها من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة ، هوائياتها كالحلقة. تركب الحام على اعطاف النواهل.

١٥٣٧٩ - شُعْرَانِيَّة انْفُطَف

Craetichina pallida (S). *Anapéro pâle* (F).
نوع من الشعراء. طولها نحو ٦ سم. ثوبها حلي اللون ، اغبر الموج. جناحها مردنية الشكل ، صغيرة القد ، بطنها غليظ المؤخر فارق الطرف. تركب انطفت.

١٥٣٨٠ - شُعْرَانِيَّة انْفُطَف

Hippobosca equina (S). *Hippobosque du cheval* (F).
نوع من الشعراء جثتها خفيفة الشكل مضمورة ، طولها من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصهبة السراء. جناحها مستطيل شفاف. بطنها مستعرض الشكل مذهب الطرف. تركب الخيل والابقار والكلاب.

١٥٣٨١ - شُعْرَانِيَّة السُّنُور

Stenapteryx hirundinis (S). *Mouche de l'hirondelle* (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة العابقة جناحها مستطيل ضيق. بطنها فارق الطرف ، تركب السنور وقد تصيب الانسان فتله.

١٥٣٨٢ - شُعْرَانِيَّة الْعُيُور

Ornithomyia avicularia (S). *Ornithomyia aviculaire* (F).
نوع من الشعراء خفيفة الصدر ، نحيلة البطن ، طولها نحو ٦ سم. ثوبها الى الريدة السراء. تركب الخيل على اعطاف فصائله وأنواعه من الكواسر الى الجوامم والمواجن.

١٥٣٨٣ - شُعْرَانِيَّة الْغَنَم

Melophagus ovinus (S). *Mélophe du mouton* (F).
نوع من الشعراء العادة الاجنحة. طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة النبراء الموج. رأسها صغير القد ، مقطوع الشكل ، غائر في الصدر ، عظمها دقيق مستطيل ، بطنها وسيد القرجة المستدرة عديم التضيز. ثوبها زبد الجسم ، سادة الخالب. تركب الغنم فتؤذيها.

١٥٣٨٤ - شُعْرَانِيَّة الْكَلَاب

Hippobosca capensis (S). *Hippobosque des chiens* (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٨ سم. ثوبها الى الطلعة الكبراء يصلوها موج اسفح. جثتها مستطيلة ، جناحها متوسط الطول ، هوائياتها بلون المناب ، تركب الكلاب والذئاب والكلاب.

١٥٣٨٥ - شُعْرَانِيَّة الْكَلَاب

عشب اعصر يقرب الى الثيرة (ابو حنبله).

١٥٣٨٦ - شُعْرَانِيَّة الْكَلَاب

هي الثير ، اطليه.

Radié (F). *Radiant, Radiata* (E). **شُعَاعِيَّة**
نمت تعريفي تصوف به الاثمار والحيوانات الدنيا الشاعية الشكل.

Radiare (F). *Radiate* (E). **شُعَاعِيَّة**
ما كان تنظيمه او ترتيبه او تجهيزه شعاعي الشكل.

Radiolaires (F). **شُعَاعِيَّات**
Radiolarian (E).
رقة كائنات حيوانية دفا من الخفريات.

Radiées (F). **شُعَاعِيَّة**
Radiant, Radiata (E).
سبط من فصيلة المركبات منه الاسطر والاقصون البهار وحشيفة السمال.

Section **شُعْبَة**
الثبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الطائفة ويقل الطبقة.

Section **شُعْبَة**
هو ابن اوى الهندي ، اطليه.

Plasmode (F). *Plasmodium* (E). **شُعْبَة**
ركبة في السج النباتية الحية يسببها تجميع بعض الفطور الدنيا.

Pelage (F). *Coat* (E). **شُعْر**
هو الثوب الذي يطلى به الحيوان الثديي وقد يكون من الثمر او الصوف او الور.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينبت بالصلة ثانيا غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة انما تعني الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.



شعراء الأيل



شعراء الحام



شعراء الخيل



شعراء الطير



شعراء الغنم



شعراء الكلاب

١٥٣٨٢ - شَعْرَائِيَّات

هي التبريات فصيلة خشرات من ذوات الجناسين، اطبا.

١٥٣٨٣ - شَعْرَائِيَّات

Hippoboscidae (S). Hippoboscidae (F).
فصيلة خشرات ذبابة من رتبة ذوات الجناسين، اجنحتها وانواعها زهاء ١٠٠ اجناسها صلبة. اجنحتها، عند وجودها، مستطيلة. رؤوسها صغيرة مفلطحة. اعطالها ثاقبة ماصة. قرونها الامتصاصية اسطوانية الفاصلة، دقيقة، غائرة. صدورها غليظة. بطنها مبطنة. غلافها سادة. مكها ينقف في جيب الزكة تحته الاثرى او بالاسرى تنصه يرقاق كاملة تخرج بعد وضعها بساعة ثم تنحول الى طاردي بعد بضعة ساعات || تنوش طليقة ما لا تحصى من دم الطير والثدييات.

١٥٣٨٤ - شَعْرُور

هو القريون الخزني، اطبا.

١٥٣٨٥ - شَعْرُورَة

ثمرة القفا الصغيرة القدة.

١٥٣٨٦ - شَعْرُورِي شَامِيَّة، شَعْرُورِي شَمِيَّة

Procyon (F). Procyon (E).
ثلاثة اسماء لنم نير من كوكبة الكلب الاصفر يمد من الارض نحو حشر سنوات خفيفة. وهو من منازل القمر. راجع فضياء.

١٥٣٨٧ - شَعْرُورِي بِمَالِيَّة، شَعْرُورِي هَبْرَة

أَبْرَق

Canticula, Sirius (F). Canticula, Sirius (E).

الشعري الباقية والشعري البور والأبرق ثلاثة اسماء لنم واحد من كوكبة الكلب الاكبر يعتبر الم نجم في الفناء || من اسماعيل الاقدمين ان سهيل اقبل من ناحية اليمن واقلت الشعران، الباقية والشامية، من ناحية الشام حتى انتهى السير الى اخيرة. فوقف كل من الفريقين على شاطئ الجرة وضغطها سهيل فاجابته على الزواج وصيرت اليه الباقية منها فليل لها الشعري البور. ولم تسقط الشامية ان تير فوقف تكي وتقول السمو الحارة من حينها الفاضلين فليل لها الشعري المبيضاء.

١٥٣٨٨ - شَعْرُورِي

Capillare (F). Capillary (E).
نمت وصني وتسمى يلقب على ما له علاقة بالشعر ويل ما يشبه الشعر كالانابيب الشعرية والقرايين الشعرية الخ.

١٥٣٨٩ - شَعْرُورَة

Caryota urens (S). Caryota babilana (F).
نوع من نخل الكريه منه الهند والبنغال والكوشئين وبزر التراب. ساقه متضعبة اسطوانية تملو نحو ٢٠ م. قطرها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. سفلها ثنائي التركيب، مؤسسي الشكل، غليظ الكرب، يطول نحو ٤ اشر ويبرس من ٣ الى ٤ || تنامر ما كولة لكنها حريفة الثغور يستخرج منها حن الكريه || وقد يزرع للزئين وهو من النباتات البليقة النمو الجنبيلة الخشار السفتي.

١٥٣٩٠ - شَعْرُور

Cocotier commun (F).
هو الجوز الهندي، اطبا نارجيل مروف.

١٥٣٩١ - شَعْف

هو قشر الناف.

١٥٣٩٢ - شَعْفَة

Calson (F). Calson (E).
الشفة من كل شيء اعلاه ومن الكساء رأسها ومن الجبل رأسه. ج. شفت وشيف وشفط وشفات.

١٥٣٩٣ - شَعْفَة، نَعْفَة، قَطْرَة

Goutte (F).
قطرة الواحدة من المطر او من اي سائل كان. ج. شفت.

١٥٣٩٤ - شَعْل

يئاس في ناحية الفرس او ذبه وقد يكون في الفذل.

١٥٣٩٥ - شَعْن

Fane (F). Hauler, Dead land (E).
ما تآثر من ورق المشب ويخطف النبات بعد ذبوله.

١٥٣٩٦ - شَعْبَر

هو ابن كوى الصحراء، اطبا.

١٥٣٩٧ - شَعُور مَكَة

Pois absorbants (F).
شور دقيقة في اطراف الجذرات تحس بالتحال الباعلي اللواد المنفنية اللابية في ماء القرة فتمتلها وتصيرها اتسغ البابل اي اللعج الصاعد.

١٥٣٩٨ - شَعْبَات

Bronchies (F). Bronchia (E).
اضاء التنفس في الحشرات تقوم مقام الرقة في الحويان.

١٥٣٩٩ - شَعِير، شَعِيرُور

Hordeum (S). Orge (F). Barley (E). Gersta (D). Orzo (I).

جنس نباتات عشية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. ينبت من القمم النباتات الزراعية ورأسها انتشاراً نظراً لقدرته على احتياك الماخات المنطوقة فهو يزرع وينتج في البائرة القطبية الشمالية كما يزرع وينتج في بطن الصحراء || انتاعه ١٢ منقطة في جميع اسطاع العالم. منها نوع زراعي هو الشعير المعروف بأخر زراعي ينس الشعير الاخر وطرة أنواع برية اعرفها ما ينبت.

١٥٤٠٠ - شَعِير لَيْلِس

H. murinum (S).
شعير القفار

١٥٤٠١ - شَعِير أَعْقَر

H. secalinum (S).
شعير المروج.

١٥٤٠٢ - شَعِير لَيْلِس

Egipso (F).
هو النورج، نبات عشبي بري من النجيليات.

١٥٤٠٣ - شَعِير أَعْقَر

Hordeum jubatum (S).
نوع من الشعير البري الحولي يزرع للزئين وهو كثير الانتاع يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستطيلة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، تحيل القدة، وردى اللون || اسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٤ - شَعِير الْكُتْبَان، أَيْمُوس الرمال

Elymus arenarius (S). Elyme des sables (F). Lyme grass, Mac-grass (E). Sandhargras, Serandhafer (D). Elymo delle sabbie (I).

نوع من الايبوس وهو نبات عشبي جشمودي مصر من فصيلة النجيليات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لاستقرارها وتثبيتها.

١٥٤٠٥ - شَعِير هَعْرُوف

Hordeum vulgare (S).
شعير مروف

Orge commun (F). Common barley (E). Saatgersta, Gersta (D). Orzo comune (I).

النوع الزراعي من الشعير. وهو نبات حولي عائد



شعاع



شعير الكلبان



شعير مروف

1٥٤٠٦ - شَعَاكِر (E). *Désérénce* (F). *Escheat* (E).
هي صفة الميراث التي لا يرث فيها أحد خذوا آل بيت
الآل أو الحكوة .

1٥٤٠٧ - شَعَاكِرَة (E). *Silex* (F). *Silex*, *Flint* (E).
حجر من الكفر قسده يوك شرارة .

1٥٤٠٨ - شَعْرُور (F). *Cyrtandrus* (S). *Cyrtandra* (F).
جنس نباتات شحية وجنية من فصيلة الشفروريات .
أنواع المروضة نحو ٦٥ منظمها بري وبعضها زراعي .
يزين ، مهدا المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية .

1٥٤٠٩ - شَعْرُورِيَات (F). *Cyrtandraceae* (S).
Cyrtandraceae (F). *Cyrtandraceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة النعالة . اجناسها
وأولمها كثيرة البلد تجمعها حبة اذوات . جميعها من
نباتات المناطق الحارة والاسيوية || أرواقها كاملة
منقطة لا قياسا للترتيب ، فأمرها حقيقة الشكل .

1٥٤١٠ - شَعْف ، شَعْلَاك ، شَعْلُور ، شَعْبُ
غلاف القلب . *Péricardium* (E). *Péricard* (F).

1٥٤١١ - شَعْنُب ، شَعْنُوبِيَة (F). *Pousse anticipée* (F).
هو الفصن الربط النضر الحولي العمر . ج شغاب
وشغابيه .

1٥٤١٢ - شَعْوَاك (E). *Aigle* (F). *Eagle* (E).
هي العقاب سميت بذلك للضل منقارها الاكل على الاسفل .

1٥٤١٣ - شَعْبِرَة (F). *Aiguille à enfiler* (F).
مير جهاني مستطيل ، مبط التصل الحاد ، مدبب
الطرف ، يستعمل في شك اذواك التبع .

1٥٤١٤ - شَعَاكِرَة الْمُتَوَسَّطَة
Chellinus mediterraneus (S).
Chelline de la Méditerranée (F).
Chellinus mediterraneus (E).

سكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدسيات شاككات الزمانف .
اصطانتها منظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || سرسها
المباح وبماضب النشاف . قنبا النباتات البحرية والبدان
والمداد الضوية || جسمها اعطيليي الشكل ، مستدل
التيطوط ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . حرافها كبيرة .
نورها الى الزرقة السراء وملوحا مولوج آخر يقب في الرأس
والظهر وبدر وببيض في البطن . زانفها الى الاربعة البحرية
ملوحا لمجلىع متفرش آخر في الظهرية والشرجية والذيلية ||
رأسها مخروطي الشكل ، غليظ الشفة العليا المستعلة .
شغلها مستدل الانفراج . استانتها قاطعة مثلبة الحدة . حينها
صنيرتان ، مستديرتان ، ماصحتان . زانفها الظهرية
والخوضية والشرجية تحوي بعض المناسخ الحادة . زانفها
الذيلية محاذية الطرف || لها جبد الصف ، مرفوب فيه .

1٥٤١٥ - شَعَاكِرِي *
Dipus gerboe (S).
Gerboe gerboe (F).
نوع من البرابيع الافريقية . يقال لها شأن البرابيع وزفول
القبيل وهي اسمها وافضلها : يكون في اذنانها طول وصلها
بعض الحب . اجسامها ربة الجفة تطول نحو ٢٠ سم .
اما اذنانها فتطول نحو ٢٢ سم . اوتواها الى الصبهة
الربداء وملوحا مولوج اسمر .

القروب والاصرام ، شائع الزراعة ، مستدل الانتاج حيه
يحوى ٩٠ ٪ من النشا يستعمل في غذاء الانسان والحيوان
وفي صناعة الجمه (كبير) ويوفرها من المستامات الكسولة .
ينبت في جميع اقاليم الحفنة ويفرطها قدرة على مقاومة
الحر والبرد . يرغب في الاربة التي لا تقتصر الى الكلس
ودو في الاربة المتوسطة الاندماج ، السيقه التور ،
أمر انتاجيا واحسن صفتا . وفي حالة امتداد التور
الزراعية يحد حطب الحفنة والبطاطا والشمندر والقمطن
وعنفل التفتايات . ومن خصائصه انه لا يكثر من تعيل
النقل الا في فترتين من دورته الحياتية . الفترة الاول
تستمر من الاندماج الى الاسبال والفترة الثانية من الانزهار
الى النضج || ساقه جوفاء مستطيلة السلايات . اوراقه
صغيرة الشكل ، اذنية الهند . مستطيلة التصل . سلبته
متصلة القذ ، ثلاثية الصف والسيلايات . زهره ثلاثية
الاصمية . رباعية الصفات المقسوة الى جدلتين
وبشرتين || غروبها كثيرة البلد تقسم الى ثلاثة اقسام :
- قسم الشعير السداسي الحب وهو الذي تطفح جميع
ازهاره فيكون صف سيلياته من ثلاث حبات يقابله
صف مائل من ثلاث حبات .

- قسم الشعير الرباعي الحب وهو الذي تقطع فيه الزهرة
الوسطى فيكون صف سيلياته من سبتين يقابله صف
مائل من حبتين .

- قسم الشعير الثنائي الحب وهو الذي تطفح وتضرب
فيه الزهرة الوسطى دون غيرها فيكون صف سيلياته من
حبة واحدة يقابله صف مائل وسيد الحبة .
اشهر غروبها واعما زراعة ما يتبع .

الشعير الاجرد ، شعير سموي *Hordeum coeleste* (S).
Orge céleste, *O. nue* (F).
سداسي الصف ، اجرد الحبة يرغب في الاربة الفتية
والاقالم الرطبة .

الشعير الاسود *Hordeum nigrum* (S). *Orge noire* (F).
رباعي الصف . كبير الحبة ، اسود الحسكة ، يجد في
جميع الاربة المستعلة الحصب . وهو من الانواع الوفرة
الانتاج .

الشعير المنحوس ، شعيرة * *Hordeum hexastichum* (S).
Orge hexagonale, *O. à six rangs* (F).
سداسي الصف ، حديد الاصرام جميعها وافر الانتاج
يرغب في الاربة الخسبة التي لا تقتضها الرطوبة الزائدة .

الشعير المروحي *Hordeum macrotum* (S).
Orge en éventail (F).
رباعي الصف ، كبير الحبة ، منظم الانتاج في الاراضي
المروية يمدد في الزراعات المحلية ، لكنه يرغب في الاربة
الخسبة الصميقة التور .

الشعير النحوي *Hordeum tetrastichum* (S).
Orge à quatre rangs (F).
رباعي الصف ، متوسط الحبة ، مستدل الانتاج يحد
في جميع الاربة المحلية ومنها الخفيفة والقليلة التور .

1٥٤١٤ - شَعْمِرَاكِر ، شَعْمِلَاكِر
Amytase
خبرة منقلة تربد في الرضاب وفي النبات ولذا تدعى خيرة
الشعير التاتس ، تذيب في الماء حين الحبوب وتستعمل في
تحويل النشا الى ملنوز .

1٥٤١٥ - شَعَاكِرَة
Asymétrie (F). *Asymmetry* (E).
هو عدم التناظر أو التامدل .



شَعَاكِرَة لَمُتَوَسَّطَة



شَقَارِي

١٥٤٢٧ - شَفِيرْد فِشِي ^٥
Shephardia argentea (S). Shépherdie argentea (F).
Silver shephardia (E).
نوع من الشفريد ، شيفرته تملو نحو ٥ امتار. اغصانها
شائكة. اوراقها ضيقة ، سائبة ، مستطيلة ، نصلها
حورني البشرة النضية حل صفحتيه . ثمارها حلزونة مأكولة.
تزرع القزوين .

١٥٤٢٨ - شَفِيرْد كَنْدَا ^٥
Shephardia canadensis (S). Shépherdie du
Canada (F).
نوع من الشفريد ، جنبته تملو من متر الى ثلاثة امتار.
اغصانها سرسة. اوراقها بيضية الشكل . نصلها اخضر
الصفحة العليا ابيض السفلى بشرتها حورانية خلية. ثمارها
تقنه . تزرع القزوين .

١٥٤٢٩ - شَشَف ^٥
Umbra
جنس اسمك نخرية تفرق بالفلاذ ، اطليها .
١٥٤٣٠ - شَشَف ^٥
Umbra (S). Ombrine (F).
جنس اسمك بحرية من فصيلة البهاريات . انواعه المعروفة
ثلاثة ، اقلها يمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر
فالتوسط فالبحر الاطلسي الجنوبي || أشهر انواعه
واعماها الشغشف الملبل .

١٥٤٣١ - شَشَف صِدْلِي ^٥ ، كَرَبَل ^٥
Umbra cirrhoa (S). Ombrine commune (F).
نوع من الشغشف بحر سمكة مأكولة كبيرة الله ، اطليجية
للشكل ، ودية لذلك الاسفل . مستطيلة الزعنفة الظهرية .
ظهورها اصفر اللون ، لثوق التشعيع ، يميل الى الرودة
الفضية . مرتها حل حديد المياه الاقلية . يقترب من
المباحث والشرطى في فصل الشتاء والربيع .
١٥٤٣٢ - شَشَفُوف هو الضمير . اطله .

١٥٤٣٣ - شَفَع ^٥
Pair (F). Even (E).
ازواج من العدد . شفه وقر .
١٥٤٣٤ - شَفَعَكَة ^٥
Prémption (F). Preamption (E).
حق ينزله القاتل في شراء مال معين . راجع حق الشفعة.
١٥٤٣٥ - شَفَعِيَة التَرْكِيب ^٥
Paripennae (F).
Paripinnate (E).
نمت وصفي يطلق حل الاوراق المركبة المتنبية بوراتين
متقابلتين .

١٥٤٣٦ - شَكَلِي ^٥
Crépuscule (F). Twilight (E).
هو الضوء الذي يشاهد بعد الغروب نتيجة لانكسار
ضوء الشمس على تحت الاقار على السحب او ذرات الغبار
المنتشرة في الجو . وقد تختلف فترة الشفق مع المكان فنبينا
هي قصيرة جداً عند خط الاستواء اذ هنا تمتد بضع
ساعات عند القطبين .

١٥٤٣٧ - شَكَلِي ، شَكِي ^٥
Crépusculaire (F).
Crépuscular (E).
نعت يطلق على ما هو متعلق بالشفق كتركيب القصور الشفقي
وشفرة شفقية المرتع أي انها ترتفع في ذن الشفق .

١٥٤٣٨ - شَكَل ، مِشَقَلَة ^٥
جنس اسمك نخرية تفرق بالفلاذ ، اطليها .

١٥٤١٦ - شَفَاف ^٥
Hyalin (F). Hyaline (E).
ما كانت ظواهره كالتزجاج .

١٥٤١٧ - شَفَاف ^٥
Coquette (F).
سمكة بحرية تدعى كيدمة ملونة ، اطليها .

١٥٤١٨ - شَفَان ^٥
Vent froid (F). Cold wind (E).
الريح الباردة مهما كان مهجا .

١٥٤١٩ - شَكَا ، شَكَا ^٥
Labium, Labre, Lèvre
الشفة من الحيوان والخرقة : طبق له . وما شفتان مليا
وسفل تستران الفم وما فيه .

١٥٤٢٠ - شَكَنَسَكَة ^٥
Syngénésie (F). Syngenesia (E).
هي التتصام الاسمية بواسطة المآبر .

١٥٤٢١ - شَكَنَدَع ^٥
Rahotte
هو الشرغوف .

١٥٤٢٢ - شَكُر ^٥
Lèvre de la vulve (F).
Lip of vulva (E).
سرف الفرج من ناحية انثوية وما شفران .

١٥٤٢٣ - شَفِيرْد ^٥
Stacholins (S). Stachéline (F).
جنس شيفيرات ونباتات مسمرة من فصيلة المركبات .
انواعه المعروفة قليلة العدد منهاها بعض متماثل حوض
البحر الابيض المتوسط || سطها متصبية ترتفع من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقها عابطة ، متعاقبة ، مضطعة ، سنائية
التصال الخلية البذرة ، الفضية الصفحات السفلى .
انزهارها حثكولي التجميع . انزهارها صغيرة الله ، متباينة
الالوان منها البنفسجي الوردى المزاج ومنها الازرقاني ||
انزهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٥٤٢٤ - شَفُرُوسِ اصْفَر ^٥
Ursinia lutea (S).
Sphéogynae jaune (F).
عشبة تزدينية حولية ، من فصيلة المركبات . مهدها
افريقية الجنوبية || ساقها فرعاء تملو نحو ٦٠ سم .
اوراقها متعاقبة مفرسة وسنة . رؤوسها الزهرية الى
الصغار الكثيرة الزاهي . جليها ارجواني || انزهارها يستمر
من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٥ - شَفُرُوسِ اَبْيَض ^٥
Ursinia pulchra (S).
Sphéogynae élégante (F).
عشبة تزدينية حولية من فصيلة المركبات . ساقها فرعاء
تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة مفرسة شبيهة
بارواق البانينج . انزهارها طرفي . انزهارها رؤسية .
رؤوسها برتقالية اللبانت ، صفراء الطباب ، مطوقة
بالاسود || انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٦ - شَفِيرْد ^٥
Shephardia (S).
Shépherdie (F).
جنس شيفيرات حرجية وزدينية من فصيلة الملاليات .
انواعه المعروفة اربعة . تملو من متر الى ستة امتار .
اوراقها كاملة ، مضطعة ، متعاقبة ، حابطة . انزهارها
سنبل او مخنوقية التجميع . انزهارها ثنائية المسكن ، صفراء
اللون . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية اللون ، قشرها
من ٤ الى ٨ سم . || أشهر انواعها ما يلي .



شفشف ملبل

Aclaste (F). Aclast (E). ١٥٤٤٦ - **شَقْرُف** *
نمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تحفرها او تنفذ منها اشنة الثور دون ان تنكسر .
Labial ١٥٤٤٧ - **شَقْرِيَّ**
ما كان له صلة بالشفة .

Labiatee (S). ١٥٤٤٨ - **شَقْرِيَات**
Labiales (F). Labiatos (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٢٦٠٠ تنتمي الى ١٤٠ جنساً تجسدها ستة اسباط . معظمها نباتات عشبية وبضها جنبات مفصلة السوق . اوراقها زياه ، كاملة ، متقابلة . جميعها عطري ومنظمها طلي .

Chilognathes (F). ١٥٤٤٩ - **شَقْرِيَّةُ الْأَحْشَاك**
رَبِيَّة دوبيات من كثريرات الارجل تشمل خمس فصائل . جميعها اسطوانية الشكل ، مستطيلة . معظمها من الربويات القليلة الغمر العادة السم .

Chilopoda (S). ١٥٤٥٠ - **شَقْرِيَّةُ الْأَرْجُل**
Chilopodes (F). Hundred-legged worms, Centipedes (E). Hundertfüßler (D).
رَبِيَّة دوبيات من كثريرات الارجل تشمل اربع فصائل ، جميع دوبياتها من الحشرات السامة المؤذية وقد يبلغ طول بعض اجناسها نحو ٢٠ سم .

Scérigmate (F). Scérigmate (E). ١٥٤٥١ - **شَقْرِيَّة**
زائفة قرنية التركيب تلتف الطوار لحايطه في بعض الحشرات .

١٥٤٥٢ - شَقْرِيَّةُ صَهْبَاء * ، **شَقْرِيَّة** * ، **شَقْرِيَّة** *
Omphalia flavida, Stilbella flavida (S). Mancha, Viruela (F).
فطر من الفاريفريات يتطفل في طوره الكندي على اوراق وقمار ولواحي البين فليزيا لا يظهر على الاوراق بقع نسيجة لا تقياسية الشكل والحجم تسبب جفاف النصل وذبوله الباكر . وهو على الجار يقع مستديرة منخفضة مدنية الاطراف الاجر . ويكون على التوالي رروح مستطيلة تسبب جفاف النصل وانفلاته ويدها لا يكلف باقتناص وجمع وعرق الاضداد المصابة وينضج الاشجار بعد اصحابها بالسوائل التحامية .

١٥٤٥٣ - شَقْرِيَّ
مطر يتخلله خشف او ينمر مع الخشف .

Labelle (F). ١٥٤٥٤ - **شَقْرِيَّة** * ، **شَقْرِيَّة** *
Labelium (E).
هي البتلة العليا من توزيع السطحيات وافياها . وهي ايضا الطرف القلوب في الاصداغ .

١٥٤٥٥ - شَقْرِيَّة *
Chavica (S). Chavique (F).
جنس نباتات طيبة من فصيلة الفلغلديات . انواعها مدنية جميعها عارضة معمرة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، سنائية الشكل تنصبه النصل . ازهارها قهية التجميع ، ليد التركيب . ابلي الاركاناز . ثمارها حنية ، يضيئ الشكل عطرية العرف لا يتكاثر بالتفصيل يرغب في الارربة القليلة الاندماج الربطة .

Section angulosa (F). ١٥٤٤٩ - **شَقْلَح**
Angulous section (E).
نمت تعريفي توصف به مقاطع سوق النباتات المفصلة . وقد شاع استاده الى السوق الريامية الاسرف .
١٥٤٤٠ - شَقْلَح
هو الكرتة ، اطلها .

Pousse nouvelle (F). ١٥٤٤١ - **شَقْلَح**
New growth (E).
هي الفصن الجديد الرطب قبل بلوغه الحول . ج شفن .

١٥٤٤٢ - شَقْلَحِيَّ *
Nicobar
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . حجمه شفافين . وهو مربوع الجثة : قوي المنقار ، متدل الساق . مستطيل الجناح . قصير الذنب المستدير ، رطل الريش الكثيف ا طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه الى الخضار الزاهي ولها رطل يدلو موج اسف . عنقه ملتصق ببعض الريش الطويل الذهبي اللون . اذنيكه ابيض . سقاره اسود . ميناه واقمتاه بلون العقيق لا يمشي على الارض كالحجل بل يرمي اسطالة جنبانه . طيرانه بطي وتقل . يسبح في الماء . قوته الجيوب . يدق عشه في العوص بين الاشجار او في الاغصان الكثيفة . انشاء تصع يضيق تحضنها بجناوية الذكر نحو ١٧ يوما .

Raja (S). ١٥٤٤٣ - **شَقْلَحِيَّ بَحْرِيَّ** *
Rale (F). Ray, Skate (E).
جنس اسماء بحرية غسرفية من مرتبة السفنجيات وفصيلة السفنجيات البحرية . انواعها المعروفة ٤٠ جميعها كبيرة لثة مفصلة للمربع المربع الزوايا الذي يشمل الرأس والصدر . اطرافها تراوح من ٦٥ الى ٢٢٠ سم اقلها تحفظ باختلاف الانواع . مرتها العادي في قاع الماء تلتصق الرجل بانتشار ما تقترسه من القشريات والاسماك . وهي على سطح الماء سرية الحركة لتقتل بضعة الطير . لحومها مأكلة لكنها لا تخلو من طعم خاص يشبه الاسماك ا اعراف انواعها واشهرها ما يتبع .

Raja clavata (S). ١٥٤٤٤ - **شَقْلَحِيَّ** *
Rale bouclée (F). Thornback (E).
R. alba (S). Rale blanche (F). شَقْلَحِيَّ ابيض
R. oxyrinchus (S). شَقْلَحِيَّ السمك
Rale à bec pointu, Aîlène (F).
R. torpeda (S). شَقْلَحِيَّ رصاة
Rale torpille (F). Torpedo ray (E).
R. marginata (S). شَقْلَحِيَّ ساطع
Rale mirayes, Fumat (F).
R. chagrine (S). شَقْلَحِيَّ حيموز ، فرش
Rale chagrinée, Flossade (F).
R. circularis (S). Rale ronde (F). شَقْلَحِيَّ مستدير
شَقْلَحِيَّ معروف ، شَقْلَحِيَّ شام ، كركك
R. betis (S). Rale commune, R. candrée, Colliart (F). Common ray (E).
شَقْلَحِيَّ فصر ، رهرمة
radata (S). Rale radée (F).

١٥٤٤٤ - شَقْلَحِيَّاتٌ بَحْرِيَّة
Rajidae (F).
فصيلة اسماء من مرتبة السفنجيات ورَبِيَّة الاشلاق . تشمل السفنجين البحري والمودنه وغيرها .

١٥٤٤٥ - شَقْرُوف
Gelpe orientale (F).
الشقور الزبور الشرقي . ج شفافين .



شَقْلَحِيَّ



شَقْلَحِيَّ بَحْرِيَّ



شَقْرِيَّة صَهْبَاء



شَقْلَح

flower (E). Gartsanemone, Krönenwindröschen (D). *Anemone coronaria*, *Anemone scapulo* (I).
نوع من الشقار عديد الشروب والاصرام . يملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوردته سواد اللون . ساقه نفاه . لوراته ندية التفريص . ازهاره كبيرة القند ، مسطرة البتلات
نفاها الابيض والاخر الازرق والبنفسجي والوردي والبنفسج .
انزهاره يدوم طوال الربيع .



شَقَاة

١٥٤٦٦ - شَقَار المَهْدُ كَلِي *
Anémone des ruisseaux (F).
نوع من الشقار يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جلده جني الشكل . اوردته لاسقة . ازهاره خاسية البتلات الزرقاء اللون ، الصفراء الاسدية ، منته صفاف الانهر والجداول .
انزهاره يدوم طوال شهر نيسان .



شَقَار اكِيلِي

١٥٤٦٧ - شَقَار الغَلَب *
Anemone nemorosa (S). *Anémone des bois*, *Fleur du Vendredi-Saint*, *Sylvie* (F).
نوع من الشقار يملو نحو ٢٥ سم . ساقه مدادة . لوراته معتقة . ازهاره سداسية البتلات ، يضاء اللون او حمراء وبه شروب زرقاء اللون زاهية || انزهاره يستمر من اذار الى نيسان .

١٥٤٦٨ - شَقَار المَصْح

هو شقيق النبان الملهل ، اطله .



شَقَار الغَلَب

١٥٤٦٩ - شَقَار اليابَان *
Anémone du Japon (F).
نوع من الشقار للكبس يملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . لوراته مركبة ، نسيقة القصوص المسننة الحافة . ازهاره مكسبة ، كبيرة القند ، كثيرة البتلات التي يراوح حدها من ١٨ الى ٢٤ سم . نفاها الالبيس الثلجي او الالبيس الوردي للملج || انزهاره يستمر من آب الى تشرين .

١٥٤٧٠ - شَقَار بَمَرِي *
Anémone sylvestris (S).
Anémone sauvage, *A. sylvestris* (F). *Snowdrop anemone* (E). *Grosses windröschen* (D). *Anemone silvestro* (I).
نوع من الشقار يربط في الاثرية الكنسية وهو من نباتاتها الحولية . يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقه فردية منتصبة وسيدة الزمرة . اوردته معتقة . ازهاره كبيرة القند ، يضاء اللون او وردية ، خلية البثرة . زياه الكرابل التي تيمو كنف القطن || انزهاره يستمر من نيسان الى ايار .



شَقَار اليابَان

١٥٤٧١ - شَقَار كَرَمِي هَوَرَق (S)
Anémone à feuilles de vigne (F).
نوع من الشقار يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم . ساقه نفاه . لوراته ثلثية الشكل ، خاسية التفريص ، نصلها مفاري الحافة ، خلي الصفصفا السفلي . ازهاره كبيرة القند ، ثمانية البتلات البيضا شكلًا ولونًا || انزهاره يدوم طوال شهر ايلول .



شَقَار بَرِي

١٥٤٧٢ - شَقَار كَوَكَبِي (S)
Anémone des jardins, *A. étolée*, *A. oeil de paon* (F). *Garden anemone*, *Stir anemone* (E). *Sternwindröschen* (D). *Anemone stellato* (I).
نوع من الشقار عديد الشروب والاصرام . يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوردته ثلاثية او خاسية التفريص ، مسنة الحافة . ازهاره نجمية الشكل ، شبيكة البتلات انفاضة المختلفة الالوان السود الاسدية || انزهاره يستمر من ايار الى سوزان .

Cheliot

١٥٤٧٦ - شَفَوْت

سلالة شقان مهددا البلاد البريطانية تتميز بنزارة سوطها وبيضة سنفه .

١٥٤٧٧ - شَقِي *

هو جلة الصفات الخلقية التي تكمن للذكر او للانثى . وهو ايضا مجموعة الافراد من ذوات الاعضاء التناسلية المائلة .

١٥٤٨٨ - شَقَاة هو الكبير ، اطله .

Pigment

١٥٤٩٩ - شَقَاة ٥٠ عَضَاب

كل مادة صبغية عضوية تلوّن اللصج . ج شقاقات وغشابات وطلائع وشواسب .

١٥٤٩٠ - شَقَاة ٥٠ *
Pteropus (S). *Rousette* (F).

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انزواه نحو ٦٠ جمها ثامرة ، بقره ، كبيرة القند ، مستطيلة القرطومة اللافة المدية . ازهارها تختلط مع الانواع لكنها سوية الالوان وظهورها ابيض من اكناتها واعتاقها || اقليمها الهند وافريقية الشرقية وجزر المحيط الهادي حتى استراليا . اشهر انزواها ما يتبع .

١٥٤٩١ - شَقَاة الهند ٥٠ *
Pteropus medius (S). *Rousette de l'Inde* (F).

نوع من الشقاقات ، طولها نحو ٢٣ سم . رأسها الى الجوزة . جسمها مثني اسير يملو ملج . جفوي يخفف السرة او زكيا || موطنها فصح الارض بينه من الهند الى شرق العرب ومن الهند الى سرينيب وبلقعه وانام . تعيش جماعات كبيرة يراوح حدها من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ . تألف اسراج الخمر وغابات الخيزران تملك بقضبانها ورافدها طول البهار . تسرح في طلب قوتها من الثروب الى الثروب . قوتها البهار على اختلاف اجناسها وانزواها ما دعا البرتقال .

١٥٤٩٢ - شَقَاة مأكولة ٥٠ *
Pteropus edulis (S). *Rousette comestible* (F).

شقاة كبيرة القند طولها نحو ٤٥ سم . وبسطنها نحو ١٦٠ جلدها شقن اللمس . قرطوها اسني الشكل . اذنها مستطيلة ذائفة . لونها الى الحنطلي الاسمر ، حايق الظهر والراس ، زامر البق والصدر والابطن || موطنها الهند وسومرا وبنار وبلقعه . تعيش جماعات متفرقة يراوح حدها من ٥٠ الى ٢٠٠ . تألف الاسراج الثليلية . مسرعا من الفسق الى الفجر . قوتها البهار وبيض الحبوب . لا تقرب البرتقال . جسمها مأكول يفاعرون به .

١٥٤٩٣ - شَقَار

هو البهار ، مسكة طويلة السنام من الشطط .

١٥٤٩٤ - شَقَار ، شَقَارِي ، شَقَر ، اليمون

Anémone (F). *Anemone* (S).

جنس نباتات عشبية ، سبروتية ، معمرة من سبط الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انزواه عديدة مظهرها بري وبسطها زراعي زديني جميل الازهار المتعدة الالوان || اشهر انزواه ما يتبع .

١٥٤٩٥ - شَقَار إكيلي ٥٠

Anémone coronaria (S). *Anémone des fleuristes*, *A. à couronne* (F). *Crown anemone*, *Poppy wind-*

هامة ، متكونة التجميع ، مستطيلة المائل || يقال انه مروج الرتبة الجسدية لانه يثير المراكز التنفسية المهمة بها . وهو مدر للثقل وقد يسقط في الحبل في الرتبة عليه . ويقال ان كثرة استعماله تسبب ردة فعل ناكسة ، مظهرها وزن شامل يعطو حصى مشتك .

١٥٤٨٢ - شَكَل * شَوَلَك

Prasium (S), Prasion (F), Great hedge nettle (E), Klippenlippe (D), Prasinne, Prasion (I).

جنس نباتات جنية برية من فصيلة الشفويات . انواعه قليلة . سيقانها مرعاه . أوراقها متعاقلة ، مستطلة ، نصلها قلبي للشكل ، مسن الحافة ، حطري الرائحة . أزهارها حطرية العرف ، تنجبه الاوتكاز . قالوا انها لا تنمو من للناضج الكلية دون ان يحدها .

١٥٤٨٣ - شَكَاكِي الشَّحَان

هو الحيطان الاسويدي ، اطبه .

١٥٤٨٤ - شَكَب

وهو جنة كالكب ، واحدة شقية . وهو شجر له خضرة وورق . ينبت كالبرمان وورقه كورق السدر وينتاته كالكب وفيه ثوبى . (ابو حنيفة) .

١٥٤٨٥ - شَكَب

مهواة ما بين كل جبلين . يقل مدح في كهوف الجبال ويصوبها الشارقة على الاودية يورق فيه العلي . ج شقاب وشقوب .

١٥٤٨٦ - شَكَبَان *

Mégapode (F).

Megapod, Mound-bird (E).

جنس طير من فصيلة الشقبات . انواعه عديدة جميعها كبيرة الجثة طويلا من ٦٠ الى ٩٠ سم . وريشها وأصنافها صلعاء مظهر . اجنتها مستديرة ضيقة . ارساغها وخالبها قوية . اقلها الى السرة السوية المتطرفة المراج || تأتف الاحراج القريبة من الشواطئ . تعيش ذكرا وأنثى كالحمام . ارساغها كثيرة البند . قوتها النار والحبوب والبهان والحشرات || انثاها لا تحسن البيض بل ترصفه في حفن خاص من الرمل والفض والورق تقيمه قرب الشاطئ على حديد مرمى الله . شكله كالقنصوة الكبيرة علو نحو ٤ اشارة وطوله من ٤٠ الى ٤٥ م . || والانثى تبني في موضعها من ١٢ الى ١٥ يضة بين الواحدة والاخرى ١٣ او ١٤ بيضا || اما البيضاء فتنتفخ بعد وضعها باسبوعين من فرخ نشيط كاسي . فريش يدر امر نفسه يلدن عناء مستغنيا عن امه التي يجهلها .

Megapodidae (S).

١٥٤٨٧ - شَكَبَاتِيَات

Mégapodidae (F). Megapodidae (E).

فصيلة طير من رتبة التيجانيات اجناسها اربعة . طيورها متوسطة القد او كبيرة . قوية النجار الاحسن . غالبها مستطيلة . اجنتها الشقبات والبطاب والبن واليترش . المابقة || اجنتها الشقبات والبطاب والبن واليترش . طيورها تتميز بدم حنينا البيض وبالخاص التي تقيها .

Quartier (F). Quarter (E).

١٥٤٨٨ - شَقَه

ربع الحيطان اللابوح .

١٥٤٨٩ - شَقَح شَقَح المجوزة : استخرج ما فيها .

١٥٤٧٣ - شَقَار تَرْجَمِي * ، شَقَار صِيَالِي

Anemone narcissiflora (S). Anémone à fleur de narciss. A. en ombelle (F). Narcissus flowered anemone (E). Bergwindröschen, Narzissen-Anemone (D). Anemolo narciss (I).

نوع من الشقار يلو نحو ٤٠ سم . اوراقه ثلاثية او خماسية للتفرغ ، نصلها خلي البشرة حل مسطحة . ازهاره صيالية التجميع ، مستطيلة الامن ، يضاء اللون ، وردية الصفة الخارجية || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٥٤٧٤ - شَقَارِي هو الشقار ، راجحه .

١٥٤٧٥ - شَقَارِي * Psammophis schokari (S).

Couleuvre schokari, Schokari (F).

Schokari sand snake (E).

الاسم النوبي العلمي والفرنسي والانكليزي مأخوذ من العربي . حية بوض من البرافيات وفضيلة الحشرات خليات الاغذية || جسمها مستطيل الجسم يطول نحو ٦٥ سم . ثوبها الى الزبد الحنطية يطوها اربعة عطوط يفس جانبية ما يحيل مانتها تصرف بالنسبة الى النور من الشقرة الصافية الى الحنطية . مدها غير اسر . رأسها لوزي الشكل . عينها صديرتان فرتان . زاوية خلفها متوسطة الانتراج . عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى من اصلها اربعة عتاف ثابتة غلظية الاوتكاز || تأتف اقبال والبراري . قوتها كل ما دب وتمكت منه . تعيش من الثباين المؤدية .

١٥٤٧٦ - شَقَارِيَات

Anémone (F). سبط من فصيلة الشفويات ، اشهر اجناته الشقار .

١٥٤٧٧ - شَقَارِين Anémone (F). Anemone (E).

مادة جصائية صالحة ، يضاء اللون ، لا عرف لها ، تستخرج من اوراق الشقار . وهي قليلة الاويان في الماء والوتكاز والايان . ثلوث وتشتل في السوائل القلوية فيتم صبا الحامض الشقاري .

١٥٤٧٨ - شَقَاكَاة Parubilité (F). Partibility (E).

قابلية الانقسام .

١٥٤٧٩ - شَقَاكِي Javert (F). Ulcer on postern (E).

نخر في اللجج الكلية والندرسوية من الاجزاء السفلى في قوائم الخيل . والشقاق قد يكون :

Javert cutané (F).

شقاق جلدي

Javert cartilagineux (F).

شقاق غضروفي

Javert tendineux (F).

شقاق وتري

١٥٤٨٠ - شَقَاكِي Ranchage (F). Dressing (E).

الشقاق او الفتح هو حوث الارض سراحة متباعدة الاكلام .

١٥٤٨١ - شَقَاكَل * ، سِيَسَاكَلِيَن حِيَشَقَاكَل ، جَوَزُ اللَّيْطِي ، حَرْمُصُ اللَّيْلِ

Pastinaca schekakul (S). Sécacul (F). Rough parsnip, Secacul (E). Schekakul (D). Pastinaca (I).

نوع من السياربون البري وهو نبات طبي مشي مدور غليظ الجذر . ساقه اسطوانية فروع تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة ، متعاقبة ، لائحة الصلع . ازهاره



شَقَار جَرَجِي



شَقَارِي



شَقَال



شَقَال



شَقَال

من القوامح تجوب مناطق البلاد الحارة . وهي دومة الجنة ، قوية التأثير ، مستلة الاجنحة الذلقة الاطراف . اذناها مركبة من ١٢ رفة متساوية . الزوايا شاذية الاالوان الزاوية || قوتها الحشرات والطفلة وفوروز والصفادع . تنش في تجريف الانجرار واوقاب المسخور . انائها تنص نحو ه يمشأ تحضها بتأولة الذكور || اشهر انواعها ما يلي .

١٥٥٠٠ - شُرُقَاقِ اُرُوقِ * ، شُرُقَاقِ شَالَعِ ، شُرُقَاقِ

Coracias garrula (S). Rollier
vulgaire, Rollier bleu (F). Common roller (E).
نوع من الشقراق ، موطنه الشرق الاوسط واروپة الشرقية والجنوبية وبلاد مصر . يحجب مناطق حوض البحر المتوسط مرة في العام . طوله نحو ٣٣ سم . ثوبه عركب الالوان المتناظرة الزاوية الجميلة . يلب فيها الاصفر والازرق . منظره اسود ، عيانه كستينان ، قاتمتا الى الصفرة الخفيفة اللامع .



شُقراق اُرُوق

١٥٥٠١ - شُرُقَاقِ بَنَغَالِي * ، شُرُوقِ الهند

Coracias benghalensis, *C. Indicus* (S). Rollier du Bengale (F). Indian roller (E).
نوع من الشقراق ، موطنه الهند والشرق وجوب الجزيرة والرفيقية الشرقية والشرق الاوسط . طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاوية يلب فيها الازرق والبنيغسي والاصفر والاصفر اللثاني . وهو قصير المنار والذنب ، مستطيل الجناح . يألف القباب ويجاري الله . مره يد من ٣ الى ٥ اذواج .

١٥٥٠٢ - شُرُقَاقِ حَبَشِي ، أُعْبِل

Coracias abyssinicus (S). Rollier abyssin (F). Abyssinian roller (E).
نوع من الشقراق ، موطنه الحبشة والسودان واين . طوله نحو ٢٧ سم . ثوبه متراكب الالوان مشع الزرة الزاوية . يتزين بريشتين مستطيلتين تكتنفان جانبي الذنب .



شُقراق بنغالي

١٥٥٠٣ - شُرُقَاقِيَاتِ

Coraciidae (S). *Coraciidae* (E).
فصيلة طير من الجولام تشمل عدة اجناس وانواع تتميز باجسامها الربية والزوايا المركبة الالوان الزاوية . منانهاها جالسة ، قوية ، حجة البهرة ، اجنحتها اذناها حوضه الطول ، ارسافها قصيرة || موطنها يشل جميع البلاد الحارة والاسرارية . قوتها الحشرات حل اختلافها والرسافات وصغار الثدييات || تنش اولكانها في تجريف الانجرار ولؤايب المسخور . انائها تنص من ٤ الى ٥ يمشات تحضها بتأولة الذكور .

١٥٥٠٤ - شُرُقَاقِ اسود ، شُحُوة

Anthracoidea, *Charbon*, *Rouille noire* (F). *Anthracoidea*, *Smutz*, *Stem rust* (E).
اسم شامل الملقوق حل بعض الامراض الفطرية من غثت الاجناس والانواع اخصها اللدحة والذئار والذبول والسببة والنتينة واللثف واللصف والصف والنتينة .

١٥٥٠٥ - شُرُقَاقِيَاتِ

Urédinées (F).
فصيلة فلور من اللدمايات منظر اجناسها وانواعها ، بحسب الترتيب الحديث ، لا علاقه له بالاقتصاد الزراعي .

١٥٥٠٦ - شُرُقَاقِ

All sauvage (F).
هو القوم البري ، اطلقه .

١٥٤٩٠ - شُغَق

شُغَق واشتق البسر : تلون . وقد بني من يمه قبل ان يشُغَق || وشُغَق التلن : ازمى .

١٥٤٩١ - شُغَقَة

الشُغَقَة : طلبة الكلية قبل مسلك القسبب من طيبتها . قال القراء : يقال لحياه الكلية طلبة وشُغَقَة ولذوات الحافر وطيبة .

١٥٤٩٢ - شُغَقَطِب

Bâlier à 4 cornes
الكيش الذي له اربعة قرون . ج شُغَقَطِب وشُغَقَطِب .

١٥٤٩٣ - شُغَقَة

Gomphocarpus (S).
Gomphocarpae, *Faux cotonnier* (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الصفليات . انواعها قليلة العدد جميعها جنات متصبية تنل من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروصها دقيقة زغبية اللحاء . اوراقها متطابقة ، سنائية ، خشية . نصلها اخضر اللون ، ماس البصرة على صفحتها . ازهارها خيسية التجميع صوبلها يد من ٨ الى ١٢ زهرة لونها الالباس اللثاني . وهي من النباتات الكبيرة الامالة والثلث || ازهارها يشمر من حزيران الى ايلول .

١٥٤٩٤ - شُغَقُغ

Grenouille (pectus) (F).
Frog (small) (E).
ضفدع صغير .

١٥٤٩٥ - شُغَقُغِيَاتِ

Microhylidae (S). *Microhylidae* (F). *Microhylidae* (E).
فصيلة حيوانات دراه قازية من لة الحديديات وربية العشرييات وربية البرناتات اي حدييات الذنب || انواعها المعروفة كثيرة العدد لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جنوبي شرقي آسية وفي افريقية واسريكة الشمالية والجنوبية || جميعها من الضفادع الصغيرة القد . تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلافيها ويصعد التنويات المنطية الجانبية في قرة العبير || رؤوسها صغيرة مستطبة الاضطام . نكوكها العليا مستنة . اصابع قوائمها الامامية طليقة اما الخلفية فلحياصة القيد الحظاي || جلوسها متفانية الاشكال وتأنل لة نظامية التسلل . اذناها متباينة الالوان تكرر فيها البسرة الداكنة والخضار الالوان والرفقة والرسنية || منظر انواعها يمش حل النباتات والانجرار القريبة من اللدنار والشتاق ويجاري الله || انائها ، باكرتها الباسقة ، تسرا في الله الفصل . بلاصطها مائدة اعظم القرن والاسنان الشفوية .

١٥٤٩٦ - شُغَقُغ

Taphius (S). *Taphin* (F).
١٥٤٩٧ - شُغَقُغ
جنس غفائش من عارة الاراسات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد . رؤوسها مسطرفة ، فراطيسها ذاق . شغلها العليا مشرفة وجعدة || موطنها الهند الصينية . تنش جوانات قليلة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات حل اختلافها . تألف الانجرار الحرجية لا تنش الاطوار واحده شُغَقُغ .

١٥٤٩٨ - شُغَر

هو اللذار ، اطلقه .

١٥٤٩٩ - شُرُقَاقِ ، شُرُقَاقِ ، شُرُقَاقِ ، شُرُقَاقِ

Coracias (S).
Rollier (F). *Rollier* (E).
جنس طير من فصيلة الشقراقيات . انواعها ١٥ جميعها

1٥٥٢١ - شُقِيص Copropriétaire (F).
Joint-proprietor (E).
شريك في ملك العقار . يقال هو شُقِيص في العقار .

1٥٥٢٢ - شُقِيصَة Rose des vents (F).
في الفصنق ، اطلبه .

1٥٥٢٣ - شُقِيص أَخَر Pulsatilla (F).
هو الخشخاش للموت ، اطلبه .

1٥٥٢٤ - شُقِيص الجبل Pulsatilla (F).
هو الحوذان الثني ، اطلبه .

1٥٥٢٥ - شُقِيص التَّحَنان ، هوكية Pulsatilla (S).
Pulsatilla (F). Pulsatilla, Pasque-flower (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الفقاريات وعضيلة الشقريتين . أنواره قليلة البند جميعها جميلة المادة اللطيفة . سيروية ، تمش في جميع الموائل والأرتبة . جلورها حنايية خليقة . أوراقها جلورية الالتشاب . أشهر أنواره الثلاثة التالية .

1٥٥٢٦ - شُقِيص التَّحَنان الجبلي Pulsatilla alpina (S). Pulsatilla alpine (F). Mountain pulsatilla (E).

نوع من شقيق التمان ، يعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . ينمو في الأرتبة الربلية الجبلية ، أنواره كبيرة القدة ، يضاء اللون ، زرقاء الموالج حل صفحتها الخاربية . أنواره يستمر من أيار إلى تموز .

1٥٥٢٧ - شُقِيص التَّحَنان الربيعي Pulsatilla vernalis, Anemone vernalis (S). Pulsatilla printanière (F).

نوع من شقيق التمان ، يعلو من ٢٠ إلى ٣٥ سم . مهد جبال البلاد المعتدلة . أوراقها أبيض ، لينة ، لينة ، أنواره متوسطة القدة ، يضاء اللون حل صفحتها الداخلية ، لينة الصفحات الخاربية || أنواره يستمر من نيسان إلى تموز .

1٥٥٢٨ - شُقِيص التَّحَنان المبكّل ، شُقار البصع Pulsatilla vulgaris, Anemone pulsatilla (S). Pulsatilla commune, Fleur de Pâques, Herbe au vent (F). Pasque flower, Pass flower, Blue money (E). Echte kuh-schelle, Küchenschnelle (D). Pulsatilla comune, Fiore di vento, Erba del vento (I).

نوع من شقيق التمان ، يعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم . ينمو بين الزروع وفي الأراضي البور . أوراقها ناعمة تنمو بعد الإزهار وتصل في أواخر الخريف . أنواره كبيرة القدة ، قمرية اللون ، يتسجد الموالج ، فضية الزغب || أنواره يستمر من آذار إلى أيار .

1٥٥٢٩ - شُقِيص النُورُوط Pulsatilla (F).
هو الحوذان الخريف ، اطلبه .

1٥٥٣٠ - شُقِيص حَكَلِي هو الحوذان الحقل ، اطلبه .

1٥٥٣١ - شُقِيص مَائِي هو الحوذان المائي ، اطلبه .

1٥٥٣٢ - شُقِيَّات Ranunculaceae (S).
Ranunculacées, Ranunculacées (F).
Ranunculaceae (E).
عضيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أنواعها المعروفة زهاء ١٢٠٠ . اجناسها ٣٠ تنقسمها صفة أسباط أشهرها

1٥٥٠٧ - شُقُرُق هو الشقراق ، اطلبه .

1٥٥٠٨ - شُقِيَّات هي مادة البير وهي شيء كالبلسنة العظيمة المراكبة الجيوب يحترق البير من فيه إذا هاج .

1٥٥٠٩ - شُقِيص Part, Portion (F).
Share, Allowance (E).
النسب : النصيب والنهم ولقطة من الأرض .

1٥٥١٠ - شُقِيص هو الاقتنا الحية ، اطلبه .

1٥٥١١ - شُقِيَّات Pot, Vase (F).
هي الايص أو المرنك أنه من خرف أو فخار أو غير ذلك يستعمل لزراعة النباتات التزيينية البيتية .

1٥٥١٢ - شُقُل Pesée (F). Weighing (E).
الشقل الوزنة والوزن . يقال اشقل في هذا البندار أي تته .

1٥٥١٣ - شُقِيل ، أصابع هَرَمِس ، حاكير المهر Hermodactylus tuberosus, Iris tuberosa (S). Hermodactyle tubéreux (F). Finger of Hermes (E). Hermodactyl (D). Hermodactylus, Iris vultuata (I).

نبات عشبي صفوي يري وزراعي من فصيلة السوسنيات . ينمو في الموائل الرطبة . صقله طية تستعمل استعمال السوسنيان ويستخرج منها سادة المربطين . ساقه خضراء مبرقة تنمو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . تكتفي زهرة واحدة عطرية الرائحة ، كبيرة القدة ، لها إلى الصفار الحلي يعلو موالج يتسجد . يتلونها الخاربية اعلمجية الشقل مستديرة الطرف . يتلونها الداخلية نسيقة النسل الدلق المنسوب ، ساقها جلولة ، خضراء اللون || أنواره يدم من آذار إلى نيسان .

1٥٥١٤ - شُقَمَكَة Papion chama (F).
هو القردوح الخزيري ، اطلبه .

1٥٥١٥ - شُقَن Herzer (F). To harrow (E).
شقن القرية : سلفها وبسطها .

1٥٥١٦ - شُقَوَاص هو اللذن الإسباني ، اطلبه .

1٥٥١٧ - شُقِي Sexué (F). Sexuality (E).
كل ما هو ذات شق يمكنه من التسلل أن ذكرًا أو أنثى .

1٥٥١٨ - شُقِيَّة ، جُنِيَّة Sexualité (F).
Sexuality (E).
مجموعة التماسر والفرق الجنسية التكاثية الخاصة بالذكور والاناث .

1٥٥١٩ - شُقِيص Difforme (F). Deformed (E).
نمت وصني يطلق على الحيوان القبيح الشكل .

1٥٥٢٠ - شُقِيَّكَة Chromatophore (F).
Chromatophore (E).

الشقيقة خلية ملونة محيطيات من الفساح عديدة الألوان ، انتشارها أو انتشارها منوط بالحرفين . للكل يفيض الرغويات تمام الحق الموجودة فيه بمرقة فائقة لانه يحوي بعض هذه الخلايا .



شُقِيل



شقيق التمان الربيعي



شقيق التمان المبكّل

Polymorphisme (F). ١٥٥٤١ - شَكَاكَة

Polymorphism (E).

تعدد الأشكال في مادة واحدة ، أو تعدد أشكال مادة وحدة تركيبتها الجزيئي لا تتبدل .



شَكَاكَة

١٥٥٤٥ - شَكْب ، شَكْبَة ، بَكْسَين

Bécassine (F). Snipe (E).

جنس طير من دجاج الارض . انواعه ستة جميعها من القواطع . تتميز بأجسامها الصغيرة اللثة الهضبة الشكل . أثوابها إلى السرة الخفيفة المرطبة المرطبة . منقوشة مسطحة دقيقة . أرياسها حبيبية الجهة الامامية ، سرديّة الخلفية . اصرت انواعها وأشهرها الشكبة الصغيرة والكبيرة والميلولة ، الطليحة .



شَكْب البَحر

Centricus (S).

١٥٥٤٦ - شَكْب البَحر * Centricus, Bécasse de mer, Poisson trompette (F). Trumpet-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شاكبات البحر . انواعه قليلة مرتفعها مياه البحر المتوسط . جميعها صغيرة اللثة طويلا برأوس من ١٠ الى ١٥ سم . تتميز بشكاتها المستعربة وبأعظامها الانبويية البنية الاطراف . أثوابها وردية اللون ، ظهورها ملحية اللون ، جوانبها صفحية ، بطونها فضية .

١٥٥٤٧ - شَكْبَة البَحر المِجَنَّبَة

Centricus scolopax (S).

Centricus bécasse, Bécasse de mer, Trompette de mer (F). Bellows-fish, Trumpet-fish (E).

سمكة بحرية بيضاء من فصيلة شاكبات البحر وردية شاكبات الزمائف . اصطلحها معظم الآباء الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك الغنق المتوسطة القنور . جسمها قريب الشبه بالشكبة ١٢ جميعها برية مهدمة حوض البحر المتوسط . اوراقها مستطيلة ، مستقيمة ، اذنيّة الزناد المستطيل . نصلا ثلاثي القصص ، ذات الطرف ، حادّ القنور . اجزاؤها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خاصة البطولات ، لونها مختلف باختلاف الانواع ، لها الاخر وبشقائه ثم البنفسجي ثم الاسفر .



شَكْبَة صغيرة



شَكْبَة كبيرة

١٥٥٤٨ - شَكْبَة صَغِيرَة *

Gallinago gallinula (S). Bécassine sourde, Focine bécassine, Bécot, Jaquet (F). Jack snipe (E).

طائر من الشكب صغير اللثة طوله نحو ١٧ سم . قوته يشبه ثوب الشكبة المبلولة . يحوم بلاد حوض البحر المتوسط ويتقدم شرقاً حتى القفصا وروسيا .

١٥٥٤٩ - شَكْبَة كَبِيرَة *

Gallinago major (S). Bécassine double, Grande bécassine (F). Great snipe, Solitary snipe (E).

طائر من الشكب طوله نحو ٣٢ سم . قوته الى الصهبة الخفيفة يعلوها موج اسود وخطه يضاء . شتاته مناطق وفضاف بحيرات وأهوار البلاد الحارة . صفه يمتد من سوريه الى اوروبا الشمالية .

١٥٥٥٠ - شَكْبَة مَبْدُولَة *

Gallinago scolopacina (S). Bécassine ordinaire (F). Common snipe (E).

طائر من الشكب طوله نحو ٢٥ سم . قوته متواكب



شَكْبَة مَبْدُولَة

الحذائيات والخريقات والشقاريات والملمويات . جميعها نباتات حفية أو شبه ليفية ، منتشرة في معظم اسماق العالم . منها نباتات جمالية وأخرى طبية وبعضها زراعي تربي .

١٥٥٣٣ - شَكْ

Prise (F). Setting (E).

الشك هو مقدار سرعة تماسك جبلة الامت . فهو سريع اذا تماسك بين ١٥ و ٣٠ دقيقة . وهو متوسط اذا تماسك بين ٣٠ دقيقة وساعتين . وهو بطيء اذا تماسك بين ساعتين وسبع ساعات .

١٥٥٣٤ - شَكْ

Enfilas, Enguirlander (F).

To string, To engarland (F).

نقب نصال التبع بصلوصها وقد يتم ذلك بواسطة الشفرة التي تخترق الفصّل لتسهيل مرور الخيط .

١٥٥٣٥ - شَكَاكَة *

Diététique (F).

Dietetics (E).

علم يبحث في قيمة المواد الغذائية والعامل الناتجة من سوء الاندفاع مع تحديد الاشكاد الثلاثة لكل مستهلك من حيوان أو نبات .

١٥٥٣٦ - شَكَار

Lignivore (F).

Lignivorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو شجرة قوتها الشكر والخشب .

١٥٥٣٧ - شَكَاكَة

كل قسم من ارض المزرعة خصص لزراعة معينة . يقال شكاكة ليع وشكاكة فوق ليع ... ج شكاكر .

١٥٥٣٨ - شَكَاكَة *

Fagonia (S). Fagonie (F).

جنس نباتات حفية معمرة من فصيلة الباذليات . انواعها ١٢ جميعها برية مهدمة حوض البحر المتوسط . اوراقها مستطيلة ، مستقيمة ، اذنيّة الزناد المستطيل . نصلا ثلاثي القصص ، ذات الطرف ، حادّ القنور . اجزاؤها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خاصة البطولات ، لونها مختلف باختلاف الانواع ، لها الاخر وبشقائه ثم البنفسجي ثم الاسفر .

١٥٥٣٩ - شَكَاكَة [كُرْبِيَّة] ، شَكَاكَة صَغِيرَة *

شُرْكَان ، عَقْلُون الغَزَال

Fagonia arabica, F. cretica (S). Fagonie de Crète, Trèfle épineux de Candie (F).

نوع من الشكاكة منبها حوض البحر المتوسط . اوراقها قرزية اللون . قالوا انها طيبة دون ذكر منافها .

١٥٥٤٠ - شَكَاكَة كَبِيرَة ، شُرْبِيَّة

Fagonia sinatica (S). Fagonie de Sinat (F).

نوع من الشكاكة منبها حوض البحر المتوسط . اوراقها وردية اللون . يقال انها طيبة .

١٥٥٤١ - شَكَاكَة

Onoporde, Onopordon (F).

هي الاسون من النباتات الطبية ، الطله .

١٥٥٤٢ - شَكَاكَة

Enguirlander (F).

Engarland (E).

هي عملية شك اوراق التبع بنظام وترتيب .

١٥٥٤٣ - شَكَاك

Aboc, Entrave (F).

Clog, Hobbie, Shack (E).

وثاق تربط به يدا الفرس أو اسدي يدعى بأكس ورجليه .

1٥٥٦٢ - شكوي، مُطالبَة
Réclamation (F).
Claim (E).
هي مطالبة المُرء الاعتراف بحق مجيئه له . او اقرار
حقه في حالة كائن يجب ان تكون له .

1٥٥٦٣ - شكير
Aubier (F).
Alburnum, Sap-Wood (E).
هو القسم من الهيكل الخشبي الكائن بين اللحاء والخشب
الصلب .

1٥٥٦٤ - شكل ٥
Polymorphe (F).
Polymorphic (E).
متعدد الاشكال .

1٥٥٦٥ - شكمة
Mors (F). Bit (E).
حذبة اللجام المخرقة الفم .

1٥٥٦٦ - شكتيوس* ، شجرة اللفلل الكاذب
Schinus (S). Schine, Faux pölvrier (F). Pepper tree.
Mastic tree (E). Mastixbaum (D). Aibero da pepe (I).
جس اشجار وشجيرات برية وتربيتية من فصيلة البطيانيات.
اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريشة . وريقاتها بيضيه
الشكل ، نصلها سميك الصفحه . جبل الخفسار الاسمر
المايق ، ازهارها عصفودية التجميع ، حراء اللون او يضاء .
ثمراها غنية الشكل ، حصى اللد تبدو حراء اللون ثم
تسمر || اوراقها وازهارها تتصل برامحه اللفلل . يستخرج
من اوراقها عطر شامع الاستعمال يدخل في عدة تركيب
وستحضرات || انواعه المعروفة اثنان .

1٥٥٦٧ - شكتيوس بُطيني* القزقي
Schinus terebinthifolia (S). Faux pölvrier du Brésil
(F). Brazilian pepper tree (E). Brasilianische Pfeffer-
baum (D). Pepe del Brasile (I).
نوع من الشكتيوس شجيره تملو من ٣ الى ٤ امتار .
يزرع القززين ويستحضر من اوراقه عطر اللفلل .
يستخرج من ساقه صمغ راتنجي يدخل في بعض المركبات .
ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٦٨ - شكتيوس رليبع
Schinus molle (S).
Faux pölvrier molle, Pölvrier du Pérou (F). False
pepper, Weeping pepper tree (E). Mollebaum,
Amerikanische Pfefferbaum (D). Pepe del Peró,
Falso pepe, Mole (I).
نوع من الشكتيوس ، شجيره تملو من ٧ الى ١٠ امتار .
وريفات وثرية التجميع حدها يراوح من ١٥ الى ٢٧ .
نصلها ستاني الشكل سنن الحافة . ازهاره محورية الايتكانز
يضاء اللون . ثمار حصى الشكل واللذ ، حراء اللون
تبقى عاتقة الى الشتاء || يستحضر من اوراقه عطر
اللفلل ويستخرج من ساقه صمغ راتنجي مضه يسول
للمعدة || ازهاره يستمر من اواخر تموز الى اواخر آب .

1٥٥٦٩ - شيل
Docynia (F).
هو اللوسيني شجرة مشرة ، اطليا .

1٥٥٧٠ - شلاب ٥
Leersia (S). Léersie (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، سولية ، مرغوبة من نصلية
التنجليات . انواعها المعروفة ثمة متنبها بعض مناطق
البلاد الحارة من الشرق والغرب || سوقها شطاف فراء .
صفتها خفيف مستطيل . ازهارها متبلي التجميع . سبيلاتها
متراسة . ازهارها خشوية .

النسبة والسرعة الحظية المرفقة بالايض ، يسر ويميق
في الظهور ، ينصرف الى الصبغة الشفراء في الصدر . عتقه
يربطه الى البياض الاثير ، متقار مستطيل اسمر || اثناء
تحليل الثوب عتق . يألف اللثاغ والمراعي والاراضي الرطبة .
قوته للنبات والحشرات والرخويات . يدن اضمومه فوق
القول الناشف بين الاعشاب المتعقة . الاثني تيش من
٤ الى ٥ يضاء تخضفها رجحا من ١٥ الى ١٧ يوا .

1٥٥٥١ - شكليات البحر
Centricidae (S). Centricidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شكليات الزعانف . اجنلها
وانواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة || اعطتها
منظم بحار البلاد الحارة ويصف بحار البلاد المعتدة الحارة .
سرحها الاغواط والعتاف || تتميز باجسامها الربعة التي
تطول من ١٠ الى ٣٠ سم . وباعظامها القروطية الاثيوبية
الالافار ، واذنلها ومجنتها الظهريه الصلبة ،
وبالمناسخ القوية الحادة التي تتقدم الزعانف الظهرية ،
وزعانفها الحويطية المتناسقة || الوأيا تراوح من الرودي
الى المرجاني الاسف ومن اللفي الى اللحيي || لشهر
اجنلها شكب البحر .

1٥٥٥٢ - شكدة
Ration quotidienne (F).
Daily allowance (E).
ما يكتفي القادة يوا كاسا من الملف . حج اشكاد .

1٥٥٥٣ - شكدة الصيانية ، شكدة العيش
Ration d'entretien (F). Maintenance allowance (E).
العلف الذي يكتفي الحيوان يوا اللوش بلا عمل .

1٥٥٥٤ - شكدة الصمل ، شكدة الانتاج
Ration de production (F). Production allowance (E).
العلف القسروي لحيوان الصمل او الذي يمسن او
يدر الحليب .

1٥٥٥٥ - شكدة النشوء
Ration de croissance (F).
Growth allowance (E).
العلف الذي يكتفي الحيوان القشوء والنشوء .

1٥٥٥٦ - شكدي*
Diéetique (F).
Dietetic (E).
نمت تمرطفي يوصف به ملجن الحمية او طريقة التشكيد .


1٥٥٥٧ - شكدة
الشكدة : اثناء الفرع من الحليب .

1٥٥٥٨ - شكع
شكع الزرع : كثر حبه فهو شاكع وشكع وشكوع .

1٥٥٥٩ - شكل
Forme (F). Form, Shape (E).
الهيئة الخارجية .

1٥٥٦٠ - شكمة ، بؤمة ، علكة
Ration (F). علكة
جزء من الشكدة وهو الغضة الواحدة من الملف البيوي
المترجج لحيوان .

1٥٥٦١ - شكوة* ، محي ، صلام
Baratte (F).
Churn (E).
وهاء مخضف فيه الكافة لاستخراج الزبدة .



شكوة



شكتيوس



شُكَل



شُكَل



شُكَل

Chalote (F). Chalze (E).

١٥٥٨٧ - شُكَل

عقوب سرقة البيرة .

Stillation, Egouttement (F).
Dripping (E).

١٥٥٨٤ - شُكَل

التقط نقطة قطرة .

Prangos (S).

١٥٥٨٥ - شُكَل

Prangos, Foin du Thibet (F). Prangos, Hay plant (E). Tibetanisches Heu (D) Prangos (I).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية مسرة من فصيلة الخبيثات . جلوسها عريضة ، سبها نخيلة قليلة القروء . اوراقها نازقة ، كبيرة القند وبيضة . انماها صفراء اللون صفيرة || انماها المرفوعة قليلة اشهرها ما يلي .

١٥٥٨٦ - شُكَل الحَرَمُون

Prangos harmonis (S).

Prangos de l'Hermon (F).

نوع من الشكلة منبها جبل الشيخ والحرمون . اوراقها صفيرة القند ، غيقة التصل . تستلها اللحية ويسم عليها الحليب .

١٥٥٨٧ - شُكَل عَشْبِيَّة ، قُرْش الضَّبَع

Prangos asperula (S). Prangos aspre (F).

نوع من الشكلة منبها الجبال اللبنانية السورية المعتلة الانقطاع . اوراقها كبيرة ، مسطرة ، صميكة الصلصة الخشنة . لونها ابيض الفخار البحري الباهت .

١٥٥٨٨ - شُكَل ، غُرْلُوم

Graphium جنس فطور مجهرية من عصارة المديانات وفصيلة الكحيبيات . انماها قليلة العدد ملونة الكرميات . منها القوية التي تنيش على بعض الاجبال الحربية اعصها الفراار ومنها الضعيفة التي تركب التار الخفية كالتلحاح والاجاص اذا واقفها ونشلتها عوامل البيئة .

١٥٥٨٩ - شُكَل ، شُكَلِيَّة ، اَشْطَاق

Sélaçene (F). Selachil (E).

رتبة اسماك غضروفية الزمانات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد جميعها متوسطة وكبيرة القند . اشهر اجناسها القروش والكوجج والمشار والياض والرمادة ، الخ .

١٥٥٩٠ - شُكَل ، شُكَلِيَّة

Ceufs de lézard (F).

Eggs of the lizard (E).

بيض النمل واشبالها .

١٥٥٩١ - شُكَل

Anguille (F). Eel (E).

الشكك وسك الشكك والزلز هو الانقليس ، اطله .

١٥٥٩٢ - شُكَل ، قَالِج

Paralyse (F).

Paralytic (E).

مرض يسبب التهاب اللسان او اللسان القوي فينجم عنه الشلل .

١٥٥٩٣ - شُكَل وَرْدِي ، مُسْكَرْدِيْن

Muscardin (E).

مرض خبيث منه لا علاج له يسبب دود القز منه فطر مجهرى من الطلوسيات يدعى طلوسية بلسانا (Botrytis) غيراته ذرية تغلفها الربيع وتسلل جسم العود عن طريق الاكل تخلفني على الدم بعد أن تحوله الى سواض صفوية || مظهره الخارجي لمان في بشره الجلد يحميه اصفرار وردي ثم ارتقاء في الجسم زياد حتى الموت عند ذلك يصبغ الجسم ويسمر ثم تلوه ماجة صفراء اذا كان

١٥٥٧١ - شُكَل

نبات يعرف بحقيقة البركة ، اطلها .

١٥٥٧٢ - شُكَل

Spharites (S).

Spharites (F). Sphaerites (E).

جنس حشرات من فصيلة الشلاطيات ورتبة خدييات الاجنحة . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في معظم اقاليم البلاد المعتلة الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٦ الى ٧ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صفيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تأشيرها وفكوكها غليظة . ملاسها كبيرة ، سمنة الحافة الداخلية . كواسها مستعرة ، حادة الاطراف الجانبية والاسامية . الحادها لائحة . قوائمها شديدة اللط . اثارها سوية الاولان ، تكثر فيها الجوزة السوداء المزاج || تعيش على البراز والمواد العضوية الخضر والصلصة .

١٥٥٧٣ - شُكَلِيَّة

Sphaeritidae (S).

Spharitidae (F). Sphaeritidae (E).

فصيلة حشرات من خدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتلة الحارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل . تطول من ٥ الى ٩ م . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها لائحية . ملاسها الفكية كبيرة وصلوية . قرونها الاستشعارية صولجانية . مركبة من ١١ فصلة . كواسها مستعرة ، حادة الاطراف . الحادها لائحة . قوائمها نشطة . ارباعها خمسية المقل || تعيش على البراز والمواد العضوية والنباتية المعتلة || اشهر اجناسها الشلاط .

١٥٥٧٤ - شُكَل

Cataracta, Chute d'eau (F).

Cataract, Waterfall (E).

منحد مائي يتعرض بحرى البحر .

١٥٥٧٥ - شُكَل

Paddy حسب الرز غير المشور وبى زمت حه جداته فهو الرز . واسمته شُكَل .

١٥٥٧٦ - شُكَلِيَّة

Schilbe (S). Schilbä (F).

جنس اسماك ثيرية مأكولة من مفتوحات اللسانة وفصيلة السلوريات . انماها عذينة جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة والاستوائية . اجسامها صغيرة القند ، جلوسها ماصة . رؤوسها مستدقة . ونها قصير ، الوها الى الرتبة الكبراء يملوا تنجوع اسد || تصنيف فويها يأتي دون الوسط .

١٥٥٧٧ - شُكَلِيَّة حَرَبِيَّة

هي الزريقة ، اطلها .

١٥٥٧٨ - شُكَلِيَّة

هو السليم ، اطله .

١٥٥٧٩ - شُكَلِيَّة يَرِي

هو الاشخاص ، اطله .

١٥٥٨٠ - شُكَلِيَّة

Sperme animal (F).

Animal sperm (E).

هو افراز اللند التناسلية الذكورية عند الحيوان .

١٥٥٨١ - شُكَلِيَّة

Spermatologie (F).

Spermatology (E).

للشخصية بسبب الفلج اي المتي .

١٥٥٨٢ - شُكَل

هو جلهم الحقنة ، اطله .

انواعها المعروفة قليلة أعطانها الشرق الأوسط . سيقها فراء .
اوراقها السفلى قشائرية التصل وألمليا صغيرة مفردة أو
مستتة . زياتها صفراء اللون ، أرجوانية اللون . ثمارها
خمرية . يزورها فردية . أحرف أنواعها ما يلي .

- E. tyrazus (S). شلوة قشائرية ، أبو قرن
E. pterocarpus (S). شلوة جنية الثمر
E. strangulatus (S). شلوة غنقة
E. arcustus (S). شلوة مقرة

١٥٥٩٩ - شَلَوُف
هي البرعمة النامية حل الساق الأرضية في الحليون والعليق
وما كان حل شكلها من النبات .

١٥٦٠٠ - شَلَوُف ، شَمُوم
رعي لاهية مضيئة منها أزهر الجنوب .

١٥٦٠١ - شَكُونَك
هي المواد القليلة الموجودة في نسج الحيوانات الحية ،
راسدتها شلوة .

١٥٦٠٢ - شَم راجع شامة .

١٥٦٠٣ - شِمَام ، شَمِيع
استمرار تقدم لنمو التنديمي في غطاء أعضاء النبات .

١٥٦٠٤ - شَمَاذ هو الشاهد ، راجع .

١٥٦٠٥ - شَمَاذِيَّات
Theridiidae (S).
Théridiidae (F). Theridiidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة التريلاترات . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة
الحارة . جميعها مفردة . منها الصغيرة الحجم والمتوسطة
والكبيرة . تتميز بطولها المتضخمة المؤنثة وبجوانها
المستطلة الأطراف || شعما دقيقة الحبلك تتسببها حل
النبات وبين الحمايرة وفي شقوق الصخور || أشهر
اجناسها الثياذ والنداسجة .

١٥٦٠٦ - شَمَار ، شَمَرَك ، شُومَار ، زَايَلَج
Feniculum (S). Fenouil (F). Fenel (E). Fenekel (D).
Finocchio (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الخيميات .
انواعه عديدة . سيقها كثيرة الفروع خضراء اللون .
اوراقها مركبة شديدة الخضار الباق ، كثيفة الشام
وأندد النطرية ، فواصة العرف الذي || أشهر انواعه
الشار الحلو .

١٥٦٠٧ - شَمَار المَاء
Phellandria aquatique (F). هو الشرطوط المنقي ، اطبخ .

١٥٦٠٨ - شَمَار حَلَو
Feniculum officinale (S). Fenouil officinal, Aneth
doux (F). Common fennel (E). Echter Fenchel (D).
Finocchio officinale (I).

نوع من الشوارد وهو من البقول المأكولة الأرواق .
خواصه الصحية والطبية جزيلة الفتح توجد في جثوره
وأوراقه . وهو منه معوي يعرف أنمازات ، يدر البول
ويكسب للتشنج . أدمان شره يثبه التندد الجنسية .

الحل جافاً ، أو خلة يضاء كالنكس اذا كان الحل
ربطاً || القاية منه تنحصر بالتطهير بالفمبول وبجرق
القدان الرطبة فور أصابها .

١٥٥٩٤ - شَكَم ، فَلَاش
Fisch
ويش نور مويوت يستعمل للتصور في الظلام .

١٥٥٩٥ - شِلُونُوس مَشْكُوس
Chlaenius spoliatus (S). Chlaenle spoliatur (F).
Chlaenius spoliatus (E).

حشرة راجحة قانصة من فصيلة القليسيات ودية غمديات
الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وصفات مجاري للماء .
غناصها ويزيقاتها تمش على المواد الصلبة وحل ما تستطيع
اقتراضه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد يطول
من ١٤ إلى ١٦ م . ثوبها الى الخضار الجليل اللامع
يكتنه خط عايشي أصفر يطوق الظهران . رأسها متوسط
الجم . زياتها عطيان مستطيلان . عيناها صغيرتان
ناثرتان . ظهراتها مستدير الطرف للالاف ، تسامي
الاعايدة القندية القاطبة . ارساغها خالية العقل || الاث
أصفر قدام من الذكر وأفتح ثوباً منه وقصر زياتاً || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في مطلع
حزيران وتعيش حتى اوائل ايلول . تسرح في النهار وتبيت
في الليل || البرقة مردنية الشكل ، تطول عند تمام ادراكها
نحو ٢٤ م . جسمها أخير اللون ، اسر الرأس والشرج
والمدب || طرز الاكمال يشتر نحو ٣٥ يماً .

١٥٥٩٦ - شِلُونُوس مَذْهَب الرَأْس

Chlaenius chrysocephalus (S).
Chlaenle à tête dorée (F).
Chlaenius chrysocephalus (E).

حشرة راجحة قانصة من فصيلة القليسيات ودية غمديات
الاجنحة . تألف يساقين السواحل . ثوبها المواد الصلبة
وما تستطيع اقتراضه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير
القد يطول من ٧ الى ١٠ م . ثوبها ثنائي اللون ، رأسها
وكولها الى الحمرة النعاسية لللمعة المالح ، فعدا الى
الزقة السمر الخضراء المالح . زياتها عطيان دقيقان .
عيناها صغيرتان بارزتان . ظهراتها مستدير الطرف للالاف
تسامي الاعايدة القندية القاطبة المتوازية الابعاد . ارساغها
خالية العقل || الاث أصفر قدام من الذكر وأفتح ثوباً
منه وقصر زياتاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجملدة في أواخر آذار وتعيش حتى أواخر حزيران .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها
تطول نحو ١٣ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسر
الرأس والشرج ، أخير المدب .

١٥٥٩٧ - شِلُونُوس
Anisochilus (S).
Anisochèle, Anisochile (F). Anisochilus (E).

جنس نباتات طيبة برية حولية ومعمرة من فصيلة الشقيويات .
انواع المعروفة قليلة العدد أعطانها الهند || الحولية منها
عشبية اما المعمرة فخشبية متسببة . اوراقها متفحة .
متقابلة ، ثلاثية . فصلاها يضيء الشكل ، خضراء الخضار .
أزهارها سبلي التجميع ، اسطواني الشكل ، طري الارتفاع
انواعها صغيرة حمراء اللون || حصر اوراقها وزياتها
شائع الاستعمال في معالجة النزلة الصدرية عند الأولاد .

١٥٥٩٨ - شِلُونُوك
Enarthrocarpus (S).
Enarthrocarpe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .



شلوس غنلى



شلوس مذهب الرأس



شلبس



شمار حلو

١٥٦٠٩ - شِمَاط

Pygargues (F). Osprey (E).

جنس طير من العقبان وفصيلة البعريات. انواعه عديدة اشهرها الشيمطة الشائعة وشيمطة الانهر والرخاء والسهوج . تتميز ببارسائها الكاسية حتى نصفها الاعلى . منسلها من القواطع ، تأتلف الشطوط البحرية وشفان الانهار والبيمرات. قوتها الاكمام والطيور المائية والبرمائيات الصغيرة.

١٥٦١٠ - شِمَاطَة

Chaetostroma

جنس فطر مجهرية من عارة الطحالبات وفصيلة الكنكيات . يذيته مجية الشكل ، حلبي السطح ، لها دقن كثيف اسمر اللون . جربه الكينية متقبة متراصة ، كئانه طرية الارتكاز بيضة او مريونة الشكل . انواعه قليلة جميعها ربة تركب المواد العضوية المنحلة .

١٥٦١١ - شِمَال ، شِمَال

Vent du Nord (F). North-wind (E).

هي الخنوء : الريح التي تهب من قبل البحر بين مطلع الشمس وبنات نضج ويقل من مطلع الشمس الى سقط الترس . ويكون اسما وصفة يقال حيث الشمال وريح شمال .

١٥٦١٢ - شِمَالِي

Septentrional (F). Northern (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو من الشمال او مركز الشمال .

١٥٦١٣ - شِمَالِي

Boréal (F). Boreal (E).

نعت وصفي يطلق على ما هو خاص بالشمال القطبي .

١٥٦١٤ - شِمَام

Cucumis melo (S).

Melon commun (F). Melon, Musk-melon (E). Melone (D). Melone, Popone (I).

ويدهي ايضا البطيخ الاصفر. نبات حليبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه واصرامه عديدة . ساقه اسطوانية مدادة زهاب البثرة خشة الخلس . اولوه زنادية مختلفة الاشكال منها المستديرة والكلوية والمضغصة . نصلها مزهر الصفقة الخشقة ، ياهت الخضار البحري . ازهاره وحيدة المسكن ، الذكري تظهر قبل الانثوية بهشة ايام . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها المستديرة والبيضة والاحليلجية والكبيرة والصغيرة ، قشورها ناعمة الخلس ، صفراء اللون ، فضلة . لهاها سبك السيق ، جانبه المكسر ، اصفر اللون ، سكري اللحم ، ذي العرن . يزده مستطيلة الشكل ، تبينة اللون ، كثيرة العدد || يحد في جميع الاثرية الفنية بالمواد العضوية والناسر المدنية بطور ان لا تكون شديدة الانساج . يزرع على مسافات تراوح ابعادها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تترصف ساقه الرئيسية (الام) على وحين . وتترصف ساقه الثانوية على ثلاث اوراق ثم تترصف ساقه الثانية على خمس اوراق . كما وتعيشه ضروريان ، اما الاكثار من ربه فضر .

١٥٦١٥ - شِمَام اخضر ، شِمَام كَتَلُور

Cucumis melo cantalupensis (S). Cantaloup, Melon galeux (F). Cantaloupe melon (E). Cantaloupe, Beulen-melons, Rippen-Melons (D). Cantalupo, Melone cantalupo (I).

نوع من الثيام الزراعي المأكول ، اسرامه عديدة مختلفة الاحجام والاشكال تلب فيها الاستدارة . قشوره مضغطة مبرقة بجمرة اللون حطية التاليل . لهاها سبك السيق ، لذية اللحم ، مسطحة الحلاوة ، ذي العرن ، لونه الى الخضار الامثل || مصلته زراعية لا تختلط من معالجة الثيام .

١٥٦١٦ - شِمَام عَجَمِي

Cucumis melo dudaim (S). Concombre dudaim (F). Apple cucumber, Queen Anne's melon (E). Apfel-melone (D). Cocomero melo (I).

نوع من الثيام الزراعي الرئيسي ، ثماره خضبة اللون ، مسطرة الله ، حسيها حجم البرتقالة وهي نواحة الرائحة الذكية . قشورها ملدة البثرة ، عادمة التضلع ، لهاها قليل البسكة كثير الاليات القروية || يزرع للزين .

١٥٦١٧ - شِمَام مصري

Cucumis odoratissimus (S). Melon égyptien (F). Sweet melon (E). Agyptische melone (D). Popone, Poponcino d'Egitto (I).

نوع من الثيام الاصفر المستطيل الشكل ، مهدد البلاد المصرية وقد اشتهر بكنهته ولذة طعمه وقوة رائحته الذكية المسكية || يزرع ويصل كثير من الثيام وهو اجد صنفًا في الاثرية غير القروية .

١٥٦١٨ - شِمَاطِي

Chimpanzé (F).

هو الجملة ، جنس قرود كبيرة الله من فصيلة اشباه الانسان ، راسع بامة .

١٥٦١٩ - شِمَاطِيَا

نوع من الحور القوالة الفاعرة . راسع غر شيماني .

١٥٦٢٠ - شِمَاطِي

Michelia champaca (S). Michélie champac, Champac, Sompac (F). Champaca, Champ wood (E). Schampakbaum (D). Champacs (I).

نوع من الخشاليه من فصيلة المنيليات . وهو شجرة يرة طيبة مهدد اللثة الصلبة ، تحوي بعض الاصول المرة والطرية ، تدخل في عدة تركيبات وقويات مغذية ويستخرج منها عطر الشمين المشهور .

١٥٦٢١ - شِمَاط

راسع شلخ .

١٥٦٢٢ - شِمَد

الشدة : رفع اللب فهو شامد في شامد .

١٥٦٢٣ - شِمَدَكَة

شجرة تقرر وتنس الى الكربة لترتفع عليها .

١٥٦٢٤ - شِمَر الجَمَل

Tordyle suave (F).

هو الشرهب الجمل ، اطليه .

١٥٦٢٥ - شِمَر اخضر

Pseudodane (F).

هو بنور الاكراد ، اطليه .

١٥٦٢٦ - شِمَر الكَتَب

هو الجابنيق البن ، اطليه .

١٥٦٢٧ - شِمَرَاخ

Hampe (F).

Stem, Flower-stalk (E).

عضو باقي قروسي الانتساب متعب الجالوس يحمل الازهار وقد يتوب من الساق في بعض النبات .

١٥٦٢٨ - شِمَارِيحِي

Scapigère (F).

Scapigerous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه كالمشراع او الزناد .

١٥٦٢٩ - شِمَارِيحِي الزَّهَر

Scapiflore (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره شمراعية الارتكاز .



شام



شام اخضر



شام حسي



شام مصري



شبن

١٥٩٣٠ - شِمْرَاقِيَّةُ الشَّكْلِ Scaptiform (F).
Scaptiform (E).

تمت تعريفه يطلق على كل ساق نباتية شكلها كالشمر
أو الزناد .

١٥٩٣١ - شِمْرَاقِيَّةٌ هِيَ الشَّيْبَار ، اطلب .

١٥٩٣٢ - شِمْرَاقِيَّةٌ بِحَرِيَّةٍ * Crithmeum (S).
Crithme, Fenouil marin, Perce-pierre, Pense-pierre (F). Samphire, Sea fennel, Peter's cress (E).
Seebadikraut, Meerfenchel (D). Erba corda, Finocchio marino, Badiglia (I).

نبات حشيشي . يري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الحميات ينبت على ضفوف الشواطئ البحرية . أوراقه
سنائية لحية شبيهة بالصل البحرى الذين تغل وتتمتع
كثير المحلات .

١٥٩٣٣ - شِمْرَاقِيَّةٌ هَرْدَ * Thlaspi arvense (S). Thlaspi

des champs, Herbe aux écus, Térapic amer, Monnyoya, Tabouret (F).
Mithridate mustard, Penny-cress, Wild-cress, Feldpfennigkraut (D). Thlaspi, Erba sterna, Mile
fle (I).

نوع من الاندلسية من فصيلة الصليبيات ، وهي من
النباتات المشيئة البرية التي تكثر في البرود وتوجد في
في الحقول المزروعة . أوراقها لحية النصل الكامل . أزهارها
ملحقة التجميع ، تاجية الارتكاز ، ودية اللون . يقال أنها
لا تغل من بعض المناطق الحلية .

١٥٩٣٤ - شِمْرَاقِيَّةٌ Meroisideros (S).

Meroisideros (F).
جنس نباتات حشيشية برية معمرة من فصيلة الآسيات .
أزهارها المرفوعة مدنية ، مهدبا عند من لحد إلى جزر
الزجاج || سطوها متصبية ، فراءه . أوراقها متناحقة ،
معتقة ، يهيبة النصال الصغيرة الجامدة . أزهارها لاقائية
التجميع ، محورية أو أبولية الانتشاب ، طويلة الاصلان
خامسة البتلات الصفرة ، مستطيلة الاسدية ، مستببة
المرق .

١٥٩٣٥ - شِمْرَاقِيَّةٌ Hymenocarpus circinatus (S). Hymenocarpa (F).

Hymenocarpus, Circular Medick (E).
نبات حشيشي ، برقي ، حولي ، وحيد الجنس والنوع من
فصيلة القرقيات الفرائشية . منه بعض اصناف سواحل
البحر الابيض المتوسط اغصها الممتدة من انطاكية الى
غزة || ساقها فراءه زباد تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها
خالية النصال ، السفلى كاملة ، ملحقة الشكل ، قروصية
التجميع ، اما العليا فمركبة ، وقرية ، خامسة الورديقات
أو تساعية . الورديقة الانتهائية دائما اكبر من رفيقاتها ||
أزهارها أبولية الارتكاز ، مستطيلة المالحق ، صفراء
اللون || تنويرها يستمر من آذار الى ايار .

١٥٩٣٦ - شِمْرَاقِيَّةٌ طُرْثَالِيَّةٌ Tornalia (S).

Tornalia (F).
جنس نباتات سريعة مدادة معمرة من فصيلة التلقاسيات .
انواعه المرفوعة ١٢ ، سطوها اسطوانية متناهية السلايات
القصرية ، الممتدة ، الجارية المقه . أوراقها مستطيلة
الزناد ، كبيرة النصل الفارز المزروع والتصنيف والتتابع
التشريح . ثمادها اكرار عفرها اللون ، وغروقة الشكل ،
مستطيلة ، ترتكز على مالحق أبولية الانتشاب غليظة .



شوة بحرية



شوة مرة



شرس لديد



شمر



شروق بنيس

١٥٩٣٧ - شِمْرَاقِيَّةٌ لَدِيدَةٌ * Tornalia deliciosa (S). Tornalia delicieuse (F).

نوع من الشمر الساطع الاستعمال الزراعي المركزي .
سلفه مدادة تطلو من ٦ الى ٨ امتار . أوراقه شبه قلبية
الشكل عميقة التشريح وللشمر ، مستطيلة الزناد .
نصلها مائل لبشرة ، جامد التشريح ، شديد الخضار .
ثمادها اكرار غروقية طويلا نحو ٢٠ سم . وقطرها ٤
بمير عفرها اللون ثم تنحرف مع الادراك الى الاصغر
فالاخضر . وهي سكرية المذاق للنبلة الطعم فواحة العرف
الطري المستحب .

١٥٩٣٨ - شِمْرَاقِيَّةٌ Marsdenia (S).
Marsdenia (F).

حشيشية معمرة جاحدة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها
متصبية فراءه . أوراقها معتقة ، متناحقة ، يهيبة الشكل ،
مقطوعة القاعدية ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جبل الخضار
اللامع . أزهارها خمسة التجميع ، عابية اللون ، عطرية
المرق الفواح المستحب || أزهارها يستمر من ايار
الى تموز .

١٥٩٣٩ - شِمْرَاقِيَّةٌ الْكَنْدُورُ Marsdenia condurango, Gonolobus condurango (S).

Marsdenia du condor, Gonoloba du condor (F).
نوع من الشمرافس . حشيشية معمرة طيبة من فصيلة
الصفليات . منهيا بعض مناطق أمريكا الجنوبية المتاخمة
لحط الاستواء . يتكرر وجودها في البرود وجبال الكونديليار
على ارتفاع يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ م . من سطح
البحر || ساقها سريعة مدادة ومعتقة تطلو نحو أربعة
امتار . أوراقها متناحقة ، معتقة ، قصيرة الانحاف .
نصلها احليجية الشكل ، مدبية الاطراف . أزهارها
نوردية التجميع ، ابلي الارتكاز . أزهارها صفيرة ،
معتقة ، خامسة البتلات ، ودية اللون . مستببة المرق
الفواح يستخرج من لحاء جلودها مواد مقوية مرة
المذاق تسمى كنكوريت وكنكورينج تستعمل في معالجة
العلل السرطانية .

١٥٩٤٠ - شِمْرَاقِيَّةٌ * Drymoxa (S).

Drymoxa (F), Drymoxa (E).
جنس طير من الجوارم سفيات المنابر ينتمي الى فصيلة
الديفكيات . انواعه المرفوعة نحو ٧٠ اصنافا تمتد من
افريقية الشرقية الى الجزيرة العربية والشرق الاوسط واروبة
الجنوبية . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قروية
القش بالمشعل . انوايا ثنائية اللون . ظهورها الى الكهبة
أو القروية القروية المولج . بطونها الى الصفرة أو البياض
التي || مستطحة من الطيور المرفوعة الصفارية . تكثر في
الاجنار القروية وبين الصخور النافقة . مشاشها قدسية
الشكل ، معتقة الرباط . انوايا تقع من ٤ الى ٥ بيضات
تحضنها نحو ١٥ يوما بمثابة الذكور .

١٥٩٤١ - شِمْرَاقِيَّةٌ كَبِيسُ * Thyatira bacis (S).
Thyatira bacis (F). Thyatira bacis (E).

حشرة من فصيلة الشمرقيات ودية صفريات الاجنحة .
سوقها الاقاليم المتعددة الحرارة من العالم القديم . فراشها
جارية قبتها رقيق الازهار . سرقها خاضعة تموش على
أوراق الموج والسريرين || جسمها معتقة الشكل ،
١٧ م . يستلها نحو ٣٨ م . رأسها معتدل الجرم . عيناها

١٥٦٥٠ - شَمِيشُ رَوَّاحٍ *

Troglodytes riparius (S). *Troglodytes rufus* (F).
Troglodytes riparius (E).

حشرة نائلة قافصة من فصيلة الدفريات رتبة حشرات الاجنحة. تألف شلاف مجري الماء. قوتها المواد الصغوية والبيداتان جسمها صغير القدر طول من ٥ إلى ٦ م. ثوبها اسود يستند الطولان والجرايزان واثنان قانها جفوية. رأسها صغير الجسم قصير الخط. زباناها عظيمان. عينها كيرتان جاسطتان. فمها صغير القدر لا يلبس أكثر من حسي البطن. ابراسها خمسة السفل || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملدة في نيسان وتمشي حتى آب. تسرح في التبار. تناف بعد ظهورها بنمو درواجاها اسابع. تمتع المكان في القرية تحت الجملدة والصيل || البرقة عند بلوغها الكمال الجسدي تطول من ٨ إلى ١٠ م. جسمها حدي التركيبة شبه اسطواني الشكل، حلي اللين، اسمر اللون، اسود الفرس والرواجب، نشيط للتأثير || الطول الاكمال يسير نحو ستة اسابع ويتنقي في القرية ضمن جراب من اللين والمواد الصغوية.



شميش رَوَّاح

١٥٦٥١ - شَمِيط
Coupage (F). *Diluting* (E).

خلط بعض الحنود ببشما لغرض ما.

١٥٦٥٢ - شَمِيعُ حَسَكِيٍّ عَسُو
Cire (F).
Beeswax (E).

هو موم السمل مادة شمعية يفرزها النحل لبناء مخارجه.

١٥٦٥٣ - شَمِيعَةُ كَانٍ ، مَالِكَةٍ
Candellabre (F).
Candelabrum (E).

شكل من اشكال التشذيب خاص بالانجار المسند.

١٥٦٥٤ - شَمِيعَتُكَ هِي الْخَرَابُ ، اطليه.

١٥٦٥٥ - شَمِيعَاتُ
Myricaceae (S).
Myricacées, Myricacées (F). *Myricaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. انواعها نحو ٣٠ ، جميعها ينسب واحد. نباتاتها اثمار ومجبريات فراء السوق. اوراقها صغيرة القدر ، جامدة القصل ؛ تفرز مادة شمعية تستخرج بقل الاوراق في الماء.

١٥٦٥٦ - شَمِيعِيَّةٌ ، شَجَرَةُ الفَسَحِ

Myrica (S). *Myrica, Cistrea, Arbre à la cire* (F). *Bayberry, Candle berry myrica* (E). *Wachsgel, Wachmyrta* (D). *Mirica, Albero della cera* (I).

جنس الاجمار ومجبريات من فصيلة الشمقيات. انواعها المعروفة ٣٠ ، جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. اوراقها ابيدة ، متناحية ، مستطيلة الشكل ، صغرية القدر. تصلها جامد السنج ، كثيف السام الشمعي. اثمارها سنبل التجميع ، متراكب السفيولات. اثمارها صغرية القدر خضراء اللون. ثمارها نووية لحية صغرية المسمة. اثمارها صغرية القدر تنسج في الاراضي الرطبة وتستعمل في اصلاح مناطق المنافع || اشهر انواعها الشمعية الثالثة والسينية والعلوة واقلية القوق.

١٥٦٥٧ - شَمِيعِيَّةٌ هِي لَبِدةُ اللّين ، اطلبها.

١٥٦٥٨ - شَمِيعَةُ الحُمْفِيَّاتِ

هي لبودة الحفصيات الصغية ، اطلبها.

كيرتان. زباناها عظيمان. مزلها ملتصق مستطيل. جوشها وبها الى الحظي ويملأ بها خط نجسي بني || ورشها الاناسيان ، عند الشقين ، الى البني الاكث يملأ خمس بلج ودية يتوسطها الحظي. ورشها الخلفيان الى الحظي الاخير تملأ مسحة شفاء || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تسرح في الليل. تماطل بعد ظهورها بنمو اربعة اسابع وتمتد للمكان لطعاً مستطيلة تتلفها مادة غروية تلتصقها بالصمغات السفل من نصال الاوراق || السرة تطول من ٣٥ الى ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، ماس الفشار. ثوبها الى البطة السوداء تملأها سمة عسوط متفرقة جانبية جفوية. رأسها الى الجفوة. مدنها درواجاها الى السرة || طول الاكمال الذي يسير نحو ١٥ يوماً يتنقي بين وقتين تصبها السرعة وتربطها بجيوب حرارية.

١٥٦٥٩ - شُرُوبِيَّاتُ *

Thystridae, Cymatophoridae (S).
Thystridae, Cymatophoridae (F). *Thystridae, Cymatophoridae* (E).

فصيلة حشرات فراشية من حرشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠ مستطيلة من حشرات الاثام المعتدلة الحرارة المنتشرة نحو البادية || اجسامها وشية متوسطة القدر او صغرية. رؤوسها صغرية. عيونها زيمية جرداء. قرونها الانشعابية خيطية او مشطية. ملاسها صغرية مرطبة الاطراف. مراضها مستطيلة. بطونها كثيفة الخلد والظب. حلقاتها جانبية الاثام تلتصق عند قاعدة البطن. ورائها الاناسية الحول من الخلفية واقل امتدادة منها واكثر بقبجها وزركشة. جرائها وباجية المناس. مكنها مذكور. اسارها عريضة. خادراتها تلتصق بنصال الاوراق التي تجمعها الى بعضها البيض يتحول صغرية || اشهر اجناسها الشروق والروش والقيل والهرسين.

١٥٦٦٣ - شَمْسُ
Soleil (F). *Sun* (E).

الشمس جرم سماوي تدور الارض في فلكه حل بعد ١٧١٢١٠٠٠٠ كيلومتر. والشمس التي تعتبر مصدر الحياة على الارض بما تبته من حرارة وضوء هي جسم ناري يقدر قطره بنحو ١٧١٠٠٠٠٠ كيلومتر وتقدر حرارته البالغة بنحو اربعين مليون درجة وحرارته الحقيقية بنحو سبعة الاف درجة || ويتخذ بعض الفلكيين ان مصدر هذه الحرارة الراجحة الكافحة هو الطاقة الحرارية الناشئة من تحطم جزيمات المناس التي تتكون منها والتي توف بالكهارب || اما مدة دورة الشمس حول محورها من الغرب الى الشرق فتتم في ٢٥ يوماً.

١٥٦٦٤ - شَمِيسَاتُ

رتبة كانتات حيوانية مجهرية من الجفريات.

١٥٦٦٥ - شَمِيعَتُكَ هُوَ البَقْسُ ، اطلبه.

١٥٦٦٦ - شَمِيعَةُ الحُمْفَرِ

هو البقس الدائم الخضرة ، اطلبه.

١٥٦٦٧ - شَمِيشُ هُوَ الفيل ، اطلبه.

١٥٦٦٨ - شَمِيشُ هُوَ المنثور البري ، اطلبه.

١٥٦٦٩ - شَمِيشُ هُوَ البقس الدائم الخضرة ، اطلبه.

١٥٦٥٩ - شَمِيَّة شَامَّة *

Myrica communis (S). *Cirier commun*, *Myrica commun* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. ثمارها نورية صغيرة القند ، بإذخانية اللون ، شمية الغشاء ، أرواقها عارية تستعمل في صناعة الحبر الأسود. أما ثمرها فيستعمل كالشمع ويدخل في صناعة الصابون. يقال إن جلودها لا تغلظ من المنافع الطبية.



شمية شامة

Myrica edulis (S). * شَمِيَّة صِينِيَّة *
Myrica comestible, *Cirier comestible* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. مهدا البلاد الصينية ، ترطب في اللواتم المشتعلة الرطوية. ثمارها مأكولة مشبعة الطعم ، صفراء اللون أو صفراوات.



شمية صينية

Myrica gale (S). * شَمِيَّة عَطْرَة *
Galé, *Piment royal*, *P. aquatique*, *Myrica bétard* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية كبرية القند تملو نحو عشرة أمتار. أرواقها صارية تستعمل في غسيل الثياب ولغظ الأثمة من حيث يفض الحشرات كالعث.



شمار

Myrica cordifolia (S). *Myrica à feuilles en coeur* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة شوية القند تملو نحو ٨ أمتار. أرواقها قليلة الشكل ، يستخلص منها شمع أحمر اللون يستعمل كالشمع المادي ويدخل في صناعة الصابون.

Biophytaxia (F). * شَقِي *
Biophytaxy (F).

الشمق بيولوجيا مجموع وسائل المقاومة الممكنة إن جهزها الجسم لفيضان مائي ونشاطه.



شندر بري

١٥٦٦٤ - شَمِيل *
ما ينبت في الغنجل بعد قتله. ج. شاميل. وإثقاله هي طوق النمل البالية.

Paléarctique (F). * شِمَاكِي *
Palearctic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالمنطقة الشمالية من العالم القديم ، أي من آسيا وأوروبا.

١٥٦٦٦ - شَمْدَر *، شَوَكْدَر، بَشَجَر، صَوَطَلَة *
Beta vulgaris rapa, *B. rapa* (S). *Betterave* (F). *Bent-root* (E). *Echter Mangold*, *Rübe* (D). *Barbabetola* (I).



شمولة

لغات شبي زراعي يحول من فصيلة السرميات. خضوبه وأصفره كثيرة العدد تقسم إلى ثلاث فئات. فئة الخضوب البقية التي تستعمل للأكل والخلالات وفئة الخضوب السكرية التي تستعمل لاستخراج السكر وإكثا وفئة الخضوب الملحية التي تستعمل لنداء الماشية || جلودها خضرة لياينة مختلفة الأشكال والأحجام ، ساقه ليفية فروع تملو نحو ١٠٠ سم. أرواقها الجلدية قرصية الانتساب كبيرة النصل ، غليظة الصلح المسراء ، متعجبة التسبيج ، مائة البشرة ، عابطة الخضار. أنوارها خضوية خاصة التركيب. ثمارها صوب مرققة ، جافة ، شاذكة ، تغلف بعض البزور الصغيرة. القند ، الكلولية الشكل ، المسراء اللون. والثؤنذر رطب في الأثرية المتوسطة الانتساج والرطوبة الصيقة الفود وهو ينشئ الأثرية الجسية والصلصالية للتعجبة وكل تربة جافة عادمة الاحتفاظ بالرطوبة. يزرع عادة في أول النورة الزراعية مها كان قوامها



شميلة

إن ثالثة أو ثالثة أو رباعية. وهو في الزراعات الكبيرة ينمو مباشرة في التربة على خطوط متساوية الإبعاد. أما في الزراعات البستانية فينمو في شتات خاصة ثم ينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاع شتله (بوارشه) نحو ١٥ سم. أما ماملته الخاصة في الفترة الثامنة بين الفرس وبشي الحصيل فيملأها حرق وتعشيب وري.

١٥٦٦٧ - شَمْدَر بَرِي *، شَوَكْدَر بَرِي *
Beta silvestris (S). *Betterave sauvage* (F). *Wild beet* (E). *Wildier mangold* (D). *Bietola selvatica* (I).

هو الشندر البري الذي ينمو في المناطق والأراضي الرطبة. وهو من النباتات الحولية، جلودها صغيرة دقيقة تكاد تكون متفرقة. أرواقه القرصية خضرة النصل المستطيل. ساقه منتسبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم.

Laminor (F). * شَمِيدَاد *
Flattening-mill, *Rolling-mill* (E).

الشهادة آلة لتصفيح المعدن وتقليده.

Laminage (F). * شَمِيدَاك *
Laminating, *Flattening* (E).

الشهادة تطبيق المعدن لتصفيحه أو تحميده.

١٥٦٧٠ - شَمُولَا *، قَدَر، قَادَر *
Rupicapra tragus (S). *Chamois* (F). *Chamois* (E).

حيوان من الغنم الحرة ، وسيد الجنس والفروع شبيه بالمر والأروية يتميز بقرنيه المجولين الأصفرين. أذناه متضبتان. عتقه مستطيل. جرمه خضرة قوية. ذنبه شديد القصر. أثناء ثالثة الخلف. ثوبه يتغير مع فصول السنة والسنة إلا بطة الثائم البيضاء || موطنه جبال أوروبا وآسيا الصغرى. يألف الأماكن الباردة ، يعيش على جلود التاج. أثناء قطع جليداً واحداً يرضعه ٣ أشهر ويخصه حولاً كاملاً.

Diamant (F). *Diamond* (E). * شَمُور *
هو الماس ، أطله.

١٥٦٧٢ - شَمُول *
Mûre (F). *Mulberry* (E).

هو ثمرة الثوت وما شاكلها من الثمار كاشليك ... أما ثمرة العليق وأتباعه فتسمى مصمة.

١٥٦٧٣ - شَمِيدَكَة *، أَلُفِيل *
Allophyllus, *Schmidella* (S).

Allophylla, *Schmidella* (F). *Allophyllus* (E).
جنس نباتات شجيرة معمرة من فصيلة السابنديات. أنوعها المعروفة خمسة أصنافها البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد. جميعها أشجار صغيرة الحجم ، مظلة الشكل. أرواقها متضابة مركبة ثالثة ثلاثية الوريقات. وريقاتها فضية النصل المسن الحافة. أنوارها أبيض الأزتكاز ، سبلي التجميع. ثمارها كروية الشكل والقند ، مستعينة الطعم ، سكرية المذاق || أشهر أنواعها الزراعية الثلاثة التالية:

١٥٦٧٤ - شَمِيدَلَة أُسُوبِيَّة *، أَلُفِيل *
أُسُوبِيَّة *

Allophyllus cobbe, *Schmidella serrata* (S).

مهدا البلاد الآسيوية الحارة. ثمارها برتقالية اللون ، مأكولة.

على غصن الأبر والبرجوات. يشن وكه الذي يبلغ قطره نحو ٢٠٠ سم. على القرية وصل المسخور وفي ثم الإبحار البسقة. انتداء تبين من الرتينين إلى الثلاث رفقات تحفينا بسدا نحو ٥ أسياع.



شبة البحر

١٥٦٨٢ - شين^٥ Chen (S). Chen (F).
جنس طير من كليات القمم فضيلة الوريات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها المناطق القطبية تجوما كل عام وقد تقرب من المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة لكنها لا تقيم فيها اكثر من اسبوعين ثم تفلو || اجسامها كبيرة لثقة ارساها اطول من ارساخ قورق العبادي. مناقبها بيضاء الاطراف المحددة هرا. اثوابها سوية اللون الابيض تلموه بعض الزخارف التي تختلف باختلاف الاطوار || تدفن في اجاميس تحطرها بين مسخور الجاحش. الانثى تضع في ١٠ الى ١٢ بيضة تحفينا بمنجوبة للذكر نحو ٣٠ يوما. اشهر انواعه شن الشمال الاقصى.



شيفة شالمة

١٥٦٨٣ - شن الشمال الاقصى^٥، ورقة

الذهبيك^٥ Chen hyperboreus (S).
Chen hyperboreus, Oie des neiges (F).
Snow goose (E).

نوع من الشن فضيلة الوريات. اصنافه معظم مناطق القطب الشمالي. ملعبه الحيواني جامعي || جسمه كبير لثقة، ابيض الثوب، اسود اطراف القوائم، انهب الجبهة، احمر الالك الملوي من المنقاد، ابيض السمل، ازرقة اللطخ اي الطرف. احمر الجفون. كسني الخدقة. اصفر الرقوع والقدم.

١٥٦٨٤ - شنل^٥ Bartsvalle, Perdrix bartsvalle
هو الجبل الرصي، الجلبه.



شنل الشمال الاقصى

١٥٦٨٥ - شنل^٥، موكليدي

Naturaliste (F). Naturalist (E).
الشنل العالم بالطبيعات او التاريخ الطبيعي او علم المولايه.

١٥٦٨٦ - شينال^٥ Polymérisation (F).
Polymerization (E).
في انقسام او استراج ذرات متحدة في مركب تتج مع خواص طبيعية وكياوية مختلفة.

١٥٦٨٧ - شينال^٥ Fleurs (F). Tears (E).
البنغ الذي يقطر من الشجرة مع حز ساقها او تقليم اعضائها وقطبها. ويهي ايضا للحداد.

١٥٦٨٨ - شينال^٥
والرانة الامليسية ليس لها نوى وانما هي ماء في قشر على خلقة الحب من غير حجم^٥. (السان).



شتوت أسود الرأس

١٥٦٨٩ - شينال^٥ Fleurs de colchique (F).
Flowers of colchicum (E).
هو زهر السورتيان

١٥٦٩٠ - شينوت أسود الرأس^٥ Amphimallus ater (S).
Amphimallus ater (E).

حشرة غاصلة صغيرة المسرح من فصيلة الجمليات وريقة مشملات الاجنة. موطنها معظم انحاء البلاد المعتدلة

١٥٦٩٥ - شينوت أفريقية^٥، أفريقي^٥

Allophylus zeylanicus, Schmidelia africana (S).
يهدها أفريقية الشرقية وسردبيل ولهند. ثمارها ارضوانية اللون مشتبعة السلم.

١٥٦٩٦ - شينوت مأكولة^٥، أفريقي^٥

Allophylus edulis, Schmidelia edulis (S).
يهدها البرازيل. ثمارها حراء اللون لثينة السلم.

١٥٦٩٧ - شينوت^٥، ميكروميريا^٥

Micromeria (S). Micromérie (F). Micromeria (E).
Barcaurel (D). Micromeria (I).
جنس نباتات عشبية برية وزيدينية من فصيلة الشفويات. انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. اورثاها صغيرة لثقة متعاقبة. ازهارها معتدلة التجميع. ابلي الاركاناز. ازهارها صغيرة الحجم، قصيرة المائل، دقيقة الامن. فيها الابيض والاخر والازرق والمزرق. اشهر انواعه التريدينية ما يلي.

١٥٦٩٨ - شينوت الوعر^٥

Micromeria rupestris (S). Micromérie rupestris (F).
لوع من الشينوت المصرة تلمو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها قرمها صغيرة. اورثاها بيضية التصل المقرق المتعاقبة تلمو نحو ٨ سم. ازهارها الى الابيض المقرق بالازرق. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز وهي من كليات التي ترضب في الاراضي البويرة تعيش بين الحجازة والصخور. وفي جميع الاماكن المعرضة للشمس.

١٥٦٩٩ - شينوت كرواتي^٥

Micromeria croatica (S). Micromérie de Croatie (F).
لوع من الشينوت المصرة تلمو نحو ٢٠ سم. ساقها قرمها زبد. اورثاها قليلة الشكل، لثة البت، تلمو نحو ١٠ سم. ازهارها حراء اللون او وردية، مستطيلة الامن العتيقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٦٩٠ - شينوت الأثبر^٥

Pygargus leucorhynchus (S). Pygargue leucorhynchus (F).
Sea eagle (E).
طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. موطن الشرق يجوبه من تركيا الى الصين ومن الهند الى سيبيريا. طوله نحو المتر. الانثى اكبر حجما من الذكر. ثوبه الى السدرة البيضاء، رأسه وذنبه الى البياض المالح، بطة متشنش الريش بالابيض || يأنث غصاف الاجبر والبرجوات. يشن منه ثم في امحجار البسقة.

١٥٦٩١ - شينوت شالمة^٥، غلب الشن^٥
Haliastur albicilla (S). Pygargue vulgaire, P. à queue blanche (F). White tailed eagle (E).

طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. طوله نحو المتر. ثوبه يختلف مع البسر يرتكز على السدرة. بطة متشنش بالابيض ونسبة البياض في الريش تزداد حولا بعد كل تحير. رأسه وبقعه الى السدرة الباردة. ذنبه ابيض، مقاربه وغالبه سفر || موطنه فسح الاجراء محب البلاد الاسيوية والاروية والافريقية الشمالية والاسريكية. يألف المسخور البحرية والاصراج القائمة

مهددا روائي حوض البحر المتوسط . توجد في الاراضي المخصبة . جذورها خضائية يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال البيولوجي والصناعي .

١٥٦٩٧ - شنبجار مَثَلَتُ الاُكُرُون

Onosma albo-rosan (S). *Oranetta tricolor* (F).
نوع من الشنبجار التريزي الممرس يعلو نحو ٢٠ سم. اوراقه اعليجية الشكل، نصلها مغطوم القاعده اخضر اللون. ازهاره كبيرة لثقة تطول نحو ٥ سم. تبدو يضاء اللون. ثم تتحول الى الاحمر القوي وتشتفر حل الازرق . انفران يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٨ - شنبجار لَحْجَمِي

Onosma stellulatum (S). *Oranetta étoilée* (F).
نوع من الشنبجار التريزي الممرس . ساقه فراءه تطو نحو ٢٠ سم. اوراقه اعليجية ، مستطيلة ، ملتفة اختار . نصلها الى اخضر البشري الباهت تملو بقع من الزغب كالحلب نجمة الشكل . ازهاره الى الصفرة الكبريتية عليها مزج اخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٦٩٩ - شنبجار هَرَمِي

Onosma pyramidale (S). *Oranetta pyramidalis* (F).
نوع من الشنبجار التريزي الممرس . هرمي الشكل ، فصي اللون ، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ساقه فراءه زباد اللحاء . اوراقه الجذعية سنائية التصل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٢٥ سم. ازهاره خلية البشرة تبدو ارجوانية اللون ثم تتحول الى اليلك || ازهاره يستمر شهراً واحداً ينتهي في اوائل تشرين الاول .

١٥٧٠٠ - شنبجار اَنْجِيَا

Lithospermum (S). *Grémil* (F).
جلس نباتات عشبية برية وريضية مصرحة من فصيلة الحمسيات . انولمه ٣٠ سمها اشعاب فراءه السوق . اوراقها متعاقبة صغيرة لثقة ، شبيكة التصل . ازهارها مقنودة التجميع ، محورية وطريقة الارتكاز ، مختلفة الالوان . جذورها صلبة ، فراءه اللون ، لامة كالزلف . اشهر انولمه ما يتبع .

١٥٧٠١ - شنبجار اَبْيَسْ

Lithospermum canescens (S). *Grémil blanchâtre* (F).
نوع من الشنبجار التريزي . ساقه فراءه زباد اللحاء . تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوراقه لائقة خيطية مستطيلة . ازهاره الى الصغار التي . ثماره بيض || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٧٠٢ - شنبجار اَحْمَلْجَلْ ، حَمَمَة

Lithospermum arvense (S). *Grémil des champs*, *Lithosperme* (F). *Corn-gromwell*, *Bizard alkanet* (E). *Ackersteinsame*, *Korngift* (D). *Lithospermo*, *L. del campi*, *Strigolo selvatico* (I).
نوع من الشنبجار البري يعلو نحو ٥٠ سم. اوراقه لائقة شبيكة ومستطيلة . ازهاره حمراء اللون . جذوره طيبة . جلوره خضائية ، صباغها احمر اللون .

١٥٧٠٣ - شنبجار مخزني * ، حَبَّ السَّلْب ، كَأْسَر الحَجَر ، حَالُوم

Lithospermum officinale (S). *Grémil officinal*, *Herbe aux paries* (F). *Common gromwell*, *Pear Plant* (E). *Echter steinsame*, *Perlenkraut* (D). *Lithospermo officinale*, *Erbe della parie* (I).
نوع من الشنبجار البري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه شبيكة التصل المزهر الصفحة . ازهاره ودية اللون ، خلية البشرة . جذوره لؤلؤية طيبة قدر اليل .

الخامرة من الشرق الاوسط واروبية . تألت الحشاب والاراضي المخصصة التي يطغى عليها عنصر الجص . خنافسها تمش على اوراق الاعشاب . يرقاتها تقضم جلور النجيليات ويغريها من النباتات العشبية || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها ثنائي اللون اسود الرأس والكوسل وايلين ، بني الظهران والجرايز . راسها صغير الجرم ، زباناها مرقية التركيب ، شاربها الفصص ، وبقيا الاطراف . كوسلها خلية الصفحة . اسافها خالصة العقل ، صمته الخالب || الاثنى اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واضمح بقاءً واطول سراً || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند تمام نموها قريبة الشبه بالقومعة البيضاء . جسمها مقوس الشكل ، مستطيل الرأس الباهت ، مستضخم الطرف ، ابيض اللون ، اخضر المزج ، صلح الكنك ، احمر الروابج الملهدة الاطراف || طور الاكمال يستمر نحو ثمانية اسابيع .

١٥٦٩١ - شَنْبَجَرَة ، شَنْبَجَرَة

Palmure (F). *Web-footed* (E).
هي الخياط مادة جلدية او غشوية تجمع ما بين اصابع الطير وبشره من الحيوان . ج شتار .

١٥٦٩٢ - شَنْبَجَر

Onosma (S). *Oranetta*, *Oranetta* (F). *Oranet* (E). *Oranetta* (D). *Organetta* (I).
جلس نباتات برية وريضية من فصيلة الحمسيات . انولمه ٣٠ سم. ساقه فراءه مهدية اللحاء . اوراقها متعاقبة نصلها خلية البشرة او نجمة الزغب . ازهارها خلية الترويعات مختلفة الالوان فيها الالبض والاحمر والودي والازرق . اشهر انولمه المرفوعة ما يلي .

١٥٦٩٣ - شنبجار اَلْمُسِي

Onosma bourgeai (S). *Oranetta d'Arménie* (F).
نوع من الشنبجار التريزي السروتي . منه اوبونية يعلو نحو ٣٠ سم. ساقه فراءه . اوراقه سنائية الشكل نصلها مغطوم القاعده ذات الطرف . ازهاره مدلاية يضاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٤ - شنبجار البَرّ

Alkanna tinctoria (F).
هو الكتان الصبائي ، اطليه .

١٥٦٩٥ - شنبجار حَرَبَرِي

Onosma sericeum (S). *Oranetta soyeuse* (F).
نوع من الشنبجار البري الممرس . ساقه مسطحة تطول نحو ٣٠ سم. اوراقه اعليجية الشكل ، زباد لتصل . ازهاره حمراء اللون ، خلية البشرة في جميع اعضائها || موطنه حضاب وسبال الشرق الاوسط ، يمتد من الاناضول الى جبال ايران || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٦٩٦ - شنبجار صِبَايَة * ، اَنْثُوْرَة صِبَايَة ، يَطْلَعُ الصَّبَاغِيْن ، حَبَّ الفُزْلِ ، كَحْمَلَة

Onosma achioides, *O. tinctoria* (S). *Oranetta vipérine*, *O. tinctoriale*, *O. de Provence* (F). *Dyer's bugloss*, *Dyer's orcanet* (E). *Färberechenszunge* (D). *Organetta tinctoria* (I).
نوع من الشنبجار البري والزراعي الممرس . جلوره ليفية عشوية لها الى الجلوية . ساقه فراءه تملو نحو ٤٠ سم. اوراقه مسطحة ، لسة ، مقنودة القاعده . ازهاره حمرة ابلية وتنائية الارتكاز يعلب فيها الاصفر الالبض المزج .



شنجار صباي



شنجار مخزني

١٥٧١٢ - شُتْدَكَب جَبَلَر

Eryngium giganteum (S). Panicauc géant, Grand chardon (F).

نوع من الشنتاب، يصل نحو ٢٠٠ سم. ساقه حمراء منتخبة. أوراقه منفصلة وبغرضة. نصلها جامد المصنة، متبادع التسنين، قوي الشوك. أزهار كبيرة لينة، ورؤسها قليلة التجميع، لونها إلى الأزرق الزاهية || أثماره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٧١٣ - شُتْدَكَب جَمْسَمِي، شَوْكَة زَرْكاه

Eryngium amethystinum (S). Panicauc amethyste (F). نوع من الشنتاب، يصل نحو ١٠٠ سم. أوراقه خامة التفريش، جامدة التصل البحري اللون، حادو متبادع التسنين مستطيل الشوك. أزهار ويبلغ أوراقه إلى الزرقه الجلسية || أثماره يستمر من تموز إلى آب.



شنتاب

١٥٧١٤ - شُتْدَكَب عَجَجي

Eryngium eburneum (S). Panicauc ivoirine (F). نوع من الشنتاب، يصل من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه تطلو نحو ١٠٠ سم. صفيحاتها العليا خلية لينة، طاجية اللون. أزهاره صغيرة الرؤوسات، كثيرة العدد، بيضاء اللون || أثماره يستمر طويلاً الصيف.

١٥٧١٥ - شُتْدَكَب مَنَبَسَط الزُوك

Eryngium planum (S). Panicauc à feuilles planes (F). نوع من الشنتاب، يصل من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه يشبه الشكل جامدة التصل المنبسط الصلبة يطلو نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٧ حادو لاقيها التسنين، استانه صغيرة المذهب الشالك. أثماره إلى الزرقه الزاهية. أثماره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٧١٦ - شُتْدَكَب مَتَقَعِي، شُتْدَكَب مَائِي

Eryngium aquaticum (S). Panicauc aquatique (F). نوع من الشنتاب، يربط في الملتاق والمواقع الرطبة. يصل من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه شرفالية مستطيلة القاعدية والطرف تطلو نحو ٧٥ سم. وترس نحو ٣. نصلها جامد الصفة، عايق الخضر البحري، شالك الحمار المذهب. أثماره بيضاء اللون يملوها ملبج أخضر || أثماره يستمر من تموز إلى أيلول.

١٥٧١٧ - شُتْدُلْ

Locustella (S). Locustelle (F). جنس طير من فصيلة اللخليات. ألوانه المروقة ثمانية موطنا القرق الاقد وأروبه. أجسامها صغيرة اللينة متاقها غرضية الشكل. اجنتها واذناتها متوسطة الطول. تألف المرامي واللتاق وضفاف الأجار. قوتها الحوام واليزود البرية. تنش في الاذغال وفي الانجار للندوة. انثاها تقص من ٤ إلى ٥ فيضات تحضنها بتناوب الكور: أعرف ألوانه ولونها الشد الامر.

١٥٧١٨ - شُتْدُلْ أَمْر * *Locustella naevia* (S).

Locustella tachteta (F). Grasshopper warbler (E). نوع من الشدلل. طوله نحو ١٤ سم. ثوبه متناوب الألوان. رأسه وظهوره وبنجاحه وذنيه إلى الطحة الخطية الزرقية الملبج تملوها رشفة سوداء. زود وصدوره إلى الصفار المخلع. يلمه ولذنيكه إلى الصفار الباهت الاخير الملبج || تألف ضفاف الانهار والحدائق والجائث والمراج. يثن عشه في الاذغال. انثا تقص اربع فيضات تحضنها بتناوب الذكر من ١٤ إلى ١٥ يما.

١٥٧٠٤ - شُجَيْرَا مُسَطَّح

Lithospermum prostratum, L. diffusum (S). Grémil couché (F).

نوع من الشجيرات الارضية البروتي المعمر. يصل من ١٠ إلى ٥٠ سم. ساقه خشبية، مسطحة، صمجة. أوراقه ضيقة، نصلها يمرض من ٢ إلى ٤ سم. أثماره خلية المصنة المخاربية، لونها إلى الزرقه البنفسجية. أثماره يستمر من ايار إلى تموز.

١٥٧٠٥ - شُجَيْرَا مَلُون

Lithospermum purpureo-coeruleum (S). Grémil pourpre et bleu, Thé d'Europe, T. des bois (F).

نوع من الشجيرات الارضية البروتي المعمر. يصل من ٣٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه ضيقة التصل تطلو من ٤ إلى ٨ سم. وترس من ١٠ إلى ١٥ سم. أثماره تبدو قرمزية اللون ثم تتحول إلى الباهتوي المايق. أوراقه تستعمل استعمال الشاي وهي مودة للبلل || يثن في جميع الارية وقد يجود في المروج المعتدلة بالتعرض للشمس || أثماره يستمر من نيسان إلى حزيران.

١٥٧٠٦ - شُتْعُوب

فقرة ظهر البير. Vertèbre dorsal du dromadaire.

١٥٧٠٧ - شُتْدَكَب * *Eryngium* (S). Panicauc.

Eryng. Eryngion, Chardon Roland (F). *Eryngo* (E). *Manstreu* (D). *Eringo, Cardo stellaris, Socera* (I). جنس نباتات عشية شائكة معمرة من فصيلة الخسيات. ألوانها كثيرة العدد. موطنا غرام منتخبة. أوراقها مفرقة شائكة شديدة الخضر. أثمارها رؤسية التجميع عطفة الاالوان فيها الازرق والايضا والاخضر || أعرف ألوانه واشهرها ما لي.

١٥٧٠٨ - شُتْدَكَب اِكْرِي، Panicauc de Crée (F).

هو القرمصة، اطلها.

١٥٧٠٩ - شُتْدَكَب اَلْبِي، *Eryngium alpinum* (S).

Panicauc des Alpes (F). نوع من الشنتاب، يصل من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه قليلة الشكل تطلو نحو ٢٥ سم. وترس ٢٠ سم. نصلها عايق الخضر، ازرق الملبج، اشرالك حصار دقيقة متبادعة. أثماره قليلة العدد زرقاء اللون || أثماره يستمر من تموز إلى أيلول.

١٥٧١٠ - شُتْدَكَب اَتَنَسِي الزُوك

Eryngium bromeliaceifolium (S). Panicauc à feuilles de broméliacées (F).

نوع من الشنتاب، يصل من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقه غليظة ريامية الانتصاب. أوراقه انناسية الشكل ولونين تطلو نحو ٥٠ سم. أثماره إلى البياض الاخير يملوها ملبج أخضر || أثماره يدم طول شهر تموز.

١٥٧١١ - شُتْدَكَب يَمَحْرِي، غِيَّة العَمْر

Eryngium maritimum (S). *Panicauc maritime* (F). نوع من الشنتاب، يمش على الشرايط البحرية، يصل من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه منقطة، عريضة التفريش، جامدة التصل المنش الشالك. لونه إلى الخضر البحري الازرق الملبج || أثماره إلى الزرقه الباهتية الباهة. أثماره يستمر من حزيران إلى أيلول.



شدل امر

انفادها مزيلة ، محببة ، خلية الباء ، يطولها بعض الحنف
الثالث . أوراقه سنانية الشكل ، نصلها مسنة الحنار ،
خلية البشرة . أزهاره وردية اللون متقلبة بالاصفر ||
تتويرة يستمر من حزيران إلى آب .

١٥٧٧٧ - شسنتوم كحافي الزرك

Chaenostoma linifolium (S).

Chénostome à feuilles de lin (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم .
أوراقه قرنية لكشبه باوراق الكتان . أزهاره جريسية
الشكل ، بيضاء اللون أو صفراء || تتويرة يستمر من
الصيف إلى الخريف .

١٥٧٧٨ - شسنتوم كثير الزهر

Chaenostoma polyanthum (S).

Chénostome multiflora (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو نحو ٣٠ سم .
أوراقه مسوالية الشكل . نصلها بجراد الصفحات العليا ، خلية
البطل . أزهارها متقوية التجميع . عتالها تطلو من
١٥ إلى ٢٠ سم . أزهارها إلى اليافس الوردى الموالج ||
تتويرة يستمر من حزيران إلى ايلول .

١٥٧٧٩ - شسروخ

Passerina (S).

Passerine (F). Sparrow-wort (E). Spatzenzunge (D).
Passerina (I).

جنس نباتات جنبية معمرة برية ودرتينية من فصيلة
المازويديات . أنواعه قليلة منها افريقية الجنوبية ،
حيثما تشبه الخننج . أوراقها صغيرة متقلبة . أزهارها
سنبل التجميع ، تاني الازتكاز . أزهارها صغيرة القد
جيلة الشكل مختلفة الألوان ، يلقب فيها الازرق .

١٥٧٨٠ - ششلية

Chinchilla

جنس حيوانات كبدية قاضية من فصيلة الششليات .
موطنها الاربعين وكشبل وويلية والبيرو . أجسامها
متوسطة القد يراوح طولها من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وأذناها
من ١٢ إلى ١٥ سم . وذيها مخروطية الشكل . سبالها
متمرة الحلب الاسبح . حيثما مكحلة مستطيلة . أذناها
كبيرة وحريفة . جرائها الانامية قصيرة خلية الاسابع .
اما الخلفية فسطيلة ودرباعية الاسابع . براتها قرنية
سادة . فرونها قصيرة الور شديدة التنبوة فاخرة الصنف .
الزها إلى الصبهة اللؤلؤية يطولها مولج فضي تبق مع
أزهارها من ثنج الظفر وزهو وتميل إلى اليافس مند البطن .
قوتها الاثشاب والجذور والطالب . انثاها تحمل ٨
اطباء وتقع من ٤ إلى ٦ ادراس على ثلاث مرات في
السنة || وهي نوان :

ششلية سمكة *Ch. lanigera* (S). *Ch. lanigère* (F).

ششلية قصيرة الذنب *Ch. brevicauda* (S).

Ch. brevicauda (F).

١٥٧٨١ - ششليات

Chinchillidae (S).

Chinchillidés (F). *Chinchillidae* (E).

فصيلة حيوانات لينة قاضية من مرتبة ششليات الثورب
وردية القواضم . أجسامها لثالة وألوانها خسة . جميعها
قرنية الشيه من الالطب بفراتها الناعمة الحمرية
وبأذناها المستطيلة الجلفة || موطنها امريكا الجنوبية .
تميش جماعات كبيرة البند ، أغلبها المناطق المرتفعة
اجسرتها رداء عديدة الانفاق والتعايز المتشعبة تخلفها

Nérine (F). *Nerine* (E).

جنس نباتات حشبية حوفسية من فصيلة التريسيات .
أنواعه عديدة ، أوراقها شبة مستطيلة . أزهارها بجلة
الشكل مسوالية التجميع تركز على شراخ مستط . شسل.
اشهر أنواعه ما يلي .

Nerine undulata (S).

Nérine ondulée (F).

نوع من الشس ، أوراقه دقيقة تطلو نحو ٤٠ سم .
وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها إلى الحنار الزامي .
أزهارها لا تقياسية الشكل ، يثلاثها مكبرة عمدة . أسفها
والقلاها شجة . لونها إلى الوردى الزامي . قدت من ٨
إلى ١٢ زهرة يجمعها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم .
أزهاره غريبي .

Nerine humilis (S).

Nérine humble (F).

نوع من الشس . أوراقه تأسر من أزهاره وهي شبة
التسل التثالي الانشاف ، الحبل الحنار الزامي . طولها
يراوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وعرضه نحو ١٠ سم . صولها
الزهرى يقد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة يجمعها شراخ يملو من
٣٠ إلى ٥٠ سم . لونها إلى الحمرية الوردية يطولها مولج
احمر || أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين الأول .

Nerine podica (S).

Nérine podique (F).

نوع من الشس . أوراقه تسبق أزهاره وهي غليظة الشكل
نصلها حاني الحنار يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو
٦ سم . صولها الزهرى يقد من ٤ إلى ٦ أزهار يجمعها
شراخ يملو نحو ٣٠ سم . لونها إلى اليافس الناصع يملو
مخيط مسطو لاجر || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين .

١٥٧٨٢ - شس ضجن الزرك

Nerine curvifolia (S). *Nérine à feuilles arquées* (F).

نوع من الشس . أوراقه مستطيلة محبة لتصل البحر
اللون . أزهاره ارجوانية قدت من ٨ إلى ١٢ || أوان
ويعيد إلى جيع الازرية الخوازة الكنية بالمواد المنسوبة .

Nerine flexuosa (S).

Nérine flexueuse (F).

نوع من الشس . أوراقه تظهر مع أزهاره وهي شبة
لتصل تطلو نحو ٣٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ٢٠ سم .
ضروبها واصرامه عديدة ، صولها الزهرى يقد من ١٠
إلى ٢٠ زهرة ارجوانية أو قرزية أو موشية يجمعها شراخ
يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . || أزهاره يستمر من ايلول
إلى تشرين .

Chaenostoma (S).

Chénostome (F). *Chaenostoma* (E).

جنس نباتات حشبية وعشوية معمرة من فصيلة المازويديات .
منها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . سقها
تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوراقها متقلبة ، مسنة الحنار .
أزهارها ملونة ، خامية القلق المساوية || أنواعها المروقة
قليلة البند ، اشهرها التالية :

Chaenostoma hispidum (S).

Chénostome hispide (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم .



شسروخ



ششلية

والاحجام . جميعها مستطيلة الفؤاد القلبية الشكل ||
أعرف اجناسها واشهرها الشك وهو من الاصداف المقدسة
عند بعض جامعات الهند .

على اعماق تراوح بين ٥٠ و ١٠٠ سم . || قوتها الاغصان
والجلود . اما اجناسها الثلاثة فهي الشنيلة والبيديوم
واللفسوم .

١٥٧١٢ - شَنَكِس * ، طَلُوسُ التَّيْتِ

Polypetron chiniqui (S). Chiniqui, Peon du Tibet (F).

طائر وحيد الجنس ولقرون من فصيلة الطيريات . موطنه
التبت . قريب الشبه بالطالوس والفرنج لكنه اصغر حجماً
واقل روعة وجمالاً . لونه مراكب الالوان المزركشة
الزلفية . ذيله غليظ التيشم .



شغل

١٥٧١٣ - شَنَم * ،

Polypetron (S). *Polypetron* (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشنيتات . انواعه قليلة
العدد جميعها من اسماك البحر الابيض المتوسط . اجناسها
مستطيلة اللد ، اسطوانية الشكل ، متجانسة الزخارف الظرفية
المفرسة للشنار . تعيش في غث وخالج البحر . دفعها
تجوي كغص الحيات .



شك

١٥٧١٤ - شَنَمُول * ،

Chaenomele (F).

جنس شجيرات مشرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة
العدد فيها السرة والفاكهة . سوطها قصيرة الجلع . اوراقها
بسطة متعاقبة ، قصيرة الساق . ثمرها كروية تشبه
الفبرجل . لباها جامد الكسر سلس العلم || اشهر
انواعه الزراعية ما يلي .



شكنس

١٥٧١٥ - شَنَمُولُ الصَّيْنِ * ، سَكْرَجَلُ الصَّيْنِ

Chaenomeles sinensis (S). *Chaenomele de China*, *Cognassier du Chine* (F).

نوع من الشننول مجرته تملو من ٤ الى ٥ م . ساقها
سرة . اوراقها اطليجية الشكل ، قليلة القائمة تطويل
من ٥ الى ٩ سم . وتقرض من ٣ الى ٦ سم . ثمارها ازغب
الصفحة السفلى ، مثلثي الحافة . اثمارها فردية ، كبيرة
القد ، وردية اللون ، فليسة البر . ثمارها كروية ،
قطرها نحو ١١ سم . لباها متوسط الصلابة طاهر الصفوة ،
حازم الطعم .



شمن

١٥٧١٦ - شَنَمُولُ اليابَان * ، سَكْرَجَلُ اليابَان

Chaenomeles japonica (S). *Chaenomele du Japon*, *Cognassier du Japon* (F).

نوع من الشننول مجرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم .
ساقه واغصانه شاككة . اوراقه سنائية الشكل تطويل من
٧ الى ١١ سم . وتقرض من ٢ الى ٤ سم . ثمارها مثلثي
الحافة ، غلي البشرة على الصفحة السفلى . اثمارها لوزية ،
شلمية التجميع ، خضرة اللد ، لونها الى الازرقاني || ثمارها
كروية ، صغيرة اللد ، قطرها نحو ٥ سم . لباها الى
الخضار الاصفر . لباها جامد الكسر ، متوسط الصلابة ،
طاهر الصفوة وسامز الطعم .



شننول الصين

١٥٧١٧ - شَنَمِيَّات

Polypetridae (S).

Polypetridae (F). *Polypetridae* (E).

فصيلة اسماك من اللوامات كثيرات الزخارف . اجناسها
واثراها عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في
البحر والاسماك .

١٥٧١٨ - شَنُوص ، قَنُوص

Lutodra salmonus (S). *Chanos salmon* (F).

سمكة بحرية من فصوات الحثايات فضيلة البيديوم .
اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي

Ratel de l'Inde (F).

هو الراتل ابر كيم . حيوان راسي بشمار قريب الشبه
بالتريزيب . يتخذ لنفسه نفقاً في الارض يخرج منه ، في
طلب القوت ، بعد الغروب ويودع اليه في الصباح الباكر .

Bruyère (F). Heath (E).

١٥٧٣٣ - شَنَطَق

هو الخلع ، اطليه .

١٥٧٣٤ - شَنُغُوب ، شَنُغُوف

ما ياتي على الساق من الفصن بعد قلعها .

١٥٧٣٥ - شَنُفُ الدَلِك

هي دلبيجة شنف الدليك ، فجرة حرجية شغبها احر
اللون فاسر الصف ، اطليه .

١٥٧٣٦ - شَنُغُب هو الشك ، اطليه .

١٥٧٣٧ - شَنُغَار ، شَنُغُور هو السفر ، اطليه .

١٥٧٣٨ - شَنُفُل * ،

Hydrobatas asiatica (S). *Cincla de Pallas* (F). *Asiatic water-ouzel* (E).

طائر من بداج الماء وفصيلة الشفليات . يعيش قرب
المياه العذبة يسبح ويلبوس ويمسك الحشرات والارواح .

١٥٧٣٩ - شَنُك * ،

Turbineles (S). *Turbineles*, *Schanck* (F). *Shanck* (E).

جنس اصداف حلزونية كبيرة القد من الرغويات
المعديات . انواعه كثيرة اللد تعيش في مجار الاقاليم
الحارة . اشهرها الشك الهندي المعروف بصفت الحثوس
المقدس .

١٥٧٤٠ - شَنُكُول * ،

Triblidium (S). *Triblidium* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارليل
اماميات الخياشيم وفصيلة القصبليات . انواعها المعروفة
عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد الحارة والارواح واغصانها
المنحط الهادي . تعيش على منور المجادح والشطوط ||
اصداؤها حبيبة المنساري ، عديدة السطح ، نائفة اللون ،
متجانسة الاشكال يكثر فيها التقرن الحثاري ووحاية
الاصولج . اغشيها الداخلية لؤلؤية . قشورها الخاوي
كلبي للمادة || اجناسها رجة الارادية التي يراوح قطرها
من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، ثنائية القواسم افريقية
الشكل ، المعززة بقواعد الخارجية . غشائيتها اريم
مجموعات متعاقبة تطوق الجسم ومجموعة خاصة مستطيلة
الشكل مركزها قرب الرأس ومن يمينه || جميع انواعها
ماكولة مرغوب لها .

١٥٧٤١ - شَنُكِيَّات * ،

Turbineles (S). *Turbineles* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارليل
اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة اللد
منتشرة في بعض مجار المناطق الاستوائية ومنها الهند ||
اصداؤها عتيقة الشكل ابر ريمية ، متغلوة الباك

١٥٧٥٧ - شَهَادَةُ التَّسْجِيلِ

Certificat de transcription (F). Certificate of transcription (E).

شهادة القيد التي يمررها أمين المكتب العقاري موضحاً فيها تاريخ تسجيل المند ورقه البيع.

١٥٧٥٨ - شَهَادَةُ التَّكْرِيمِ

Certificat de décharge (F). Unloading certificate (E).

هي الشهادة التي تمنح لآليات ووسائل البضائع وتفرديتها .

Parère (F). Opinion (E). - شَهَادَةُ الْعَادَةِ

شهادة تدفعها الذرة التجارية لآليات عادة تجارية معينة .

١٥٧٦٠ - شَهَادَةُ الْعَمَلِ

Certificat de travail (F). Labour certificate (E).

هي الشهادة التي يبرز للمال أن مطالب باصطافها له حين انقطاع العمل عنه . فلا يثبت فيها إلا نوع العمل الذي كان يقوم به وتاريخ دخوله وانفصاله .

١٥٧٦١ - شَهَادَةُ الْكَفَاةِ

Brevet de capacité (F). Capacity brevet (E).

رأبج . برامه .

١٥٧٦٢ - شَهَادَةُ الْمَصْدَرِ

Certificat d'origine (F). Certificate of origin (E).

شهادة يمررها المصدر وتثبت السلطة مصحتها تفيد عن منشأ البضاعة موضوع الشهادة .

Script - شَهَادَةُ رَحِيدِ

تحرير يقدمه المسافر والشركات إلى أحد الدائنين أو أحد طلة التستاد الذي لم يقبض كل الفوائد أو رأس المال المسدد والمستحق له وبهذه الشهادة يقدم مستندة ليقبض باقي المستحق له .

١٥٧٦٤ - شَهَادَةُ عَقْدَانِيَّةِ

Certificat hypothécaire (F). Mortgage certificate (E).

هي التي يمررها أمين المكتب العقاري ليثبت وجود أو عدم وجود دين أو حق عيني آخر على مقرر معين .

١٥٧٦٥ - شَهَادَةُ قَيْدِ

Certificat d'inscription (F). Certificate of inscription (E).

شهادة تثبت فيها السلطة المختصة كل ما سجل على الصيغة العقارية .

١٥٧٦٦ - شَهَادَةُ مَحَوِّ الرَّهْنِ

Certificat de radiation (F). Irradiation certificate (E).

هي الشهادة المفروضة للدلالة على محو قيد الرهن كله أو ببشه .

Orang-Outan - شَهَادَةُ

هو السلالة ، الجليما .

Clivia (S). Clivia (F). Caffre illy, * - شَهَابَانْ

Natal illy (E). Riesenblatt (D). Clivia (I).

جلس نباتات عشبية مسدرة ابيدة بجمهورية لا بصلية من فصيلة التريسيات . انواحه المعروفة قليلة . اوراقها متعاقبة قديمة ، مستطيلة ، ثنائية التصفيف تصلها عايق الخلفار اللامع . ازهارها كبيرة القند حواء اللون أو برتقالية ؛ صيوانية الاوتكار يحبسها شراخ منقصب مستطيل . ثمارها كروية الشكل قرزية اللون || ازهارها يستمر من ايار إلى ايلول .

الشكل . يطلع نحو ٣٦ سم . رأسها صغير الجرم . عيناها كيرتان ، ماصتان . خطمها صغير الشفق . فكها عادم الاسنان . زعنفتها الظهرية شراعية الشكل تقابل الحظية . زعنفتها الذيلية قريتان متقابلتان كالكلاية . قريبا إلى الرعدة النفسية يقيم في الرأس والظهر || لهما جيب الصفء ، مرفوف فيه .

١٥٧٤٩ - شَيْطِمْ

Polymère (F). Polymer (E). متضمن جلة اصول . اصطلاح يطلق على كل مركب كيميائي تكمل ظهوره على الشظافة .

١٥٧٥٠ - شَيْطِمْ

Cuilleron (F). Winglet (E). صفيحة قرنية صغيرة اللدة ، نصف دائرية الشكل ، توجد عند قاعدة الرزان في الحشرات من ذوات الجناحين .

١٥٧٥١ - شَيْطِمْ

Sphaceloma (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات . انواحه المؤدية قليلة تركب الاوراق والانتان والجبار فتطليا || يتميز بمرطوبته التي تنشأ خضونة في الطبقة الامامية ثم ترقى حتى البشرة فتصدها وتثرتها . جرابه الكتيدي قصير اللدة ، يسيل التركيب . كئالده يفسية الشكل شلابة || اعراف انواحه وأشهرها شئمة الوردة .

١٥٧٥٢ - شَيْطِمْ الْوَرْدِ

Sphaceloma rosarum (S). Anthracnose du rosier (F). فطر مجهرية يصيب الوردي في اوراقه وتضنيه || مظهره الخارجي ؛ على الاوراق ، يقع مستطيرة أو مستطيلة تركب التصل لبيد لونها إلى الليرة ثم ينشرف إلى الجفوة يطول مولج رصاصي ، يقضي على التسج للتحارة فيذيلها ويثما || وهو على التضيين لطف قرنية مستطيرة قطرها نحو ٢ سم . تسلب اللحاء ويتورق فيها حتى الشكر || يكافح باستعمال المركبات المركزة على الكبريت والنحاس .

١٥٧٥٣ - شَيْطِمْ

Chenium (S). Chenium (F). Chenium (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسلافيات ورتبة عمديات الاجتماعية . انواعه المعروفة سبعة اصطناعها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، تطول نحو ٢ سم . رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . كثرها وتكونها قياسية . ملابسها مستطيلة ، كؤاسها خفيفة . بطونها مستعرضة مدلطة . اعمادها عددة ، قصيرة ، تلتصق نصف البطن . قوائمها خفيفة . القوائم وحيدة اللون يكثر فيها الجفوي والاسود اللصبي || سرعتها دجوي . تعيش في الجحالة وفي قري النمل . قوتها ما تستطيع تنصه او ما يتور لها من مواد عضوية .

١٥٧٥٤ - شَهْ

لته : طائر يشبه الشاهين بأعلى الحام (الأسان) .

١٥٧٥٥ - شَهَادَةُ

رأبج اشهاد .

١٥٧٥٦ - شَهَادَةُ

Certificat (F). Certificate (E). عبارة اقراء يمررها أحد الاقراء أو المؤسسات يثبت فيها أمراً معلوماً عنه .



شئمة الوردة



شيطم



شهبان

١٥٧٨٦ - شوكوب عتطر هو القزم البري ، الحلب .

١٥٧٨٣ - شوكس * Pavetta (S). Pavetta.

Baconia (F). Pavetta (E). Pavetta (D). Pavetta (I).

جلس نباتات جيتية مسرة من فصيلة القيويت . اوراقها عطرية . نضجها بري ويضجها زيتي . اوراقها متعكبة متعكبة . نضجها جامد الصلصة ، لام القشرة الزلغالية الخضر . انزعارها عطريه التجميع ، ابطي وتساوي الايتكاز . انزعارها رديعية البلات والاصدية ، مسطحة الياس ، يضاء اللون او غصراء ، نفاحة القرون الطري || اشهر انواعه الثولس المحتدي الذي الرافضة الطرية . يزرع للزينة وهو من النباتات الحلية اوراقه مدرة قليل .



شهرمان

١٥٧٨٤ - شوكسيات Erubidae (F).

سبط من القيويت اجناسه تقارب للث واوراه زعاء الف .

١٥٧٨٥ - شواطيب Anomours (F).

الشواطيب مرتبة دويات من القشرية عشايات الاربل . كثير يتكوى بعض اعضاء اجسامها من الحافة المثل الى حالة ادق .



شواس

١٥٧٨٦ - شواطة ٥ ، فلويس Phlox (S). Phlox (F).

Phlox (E). Flammenblume (D). Phlox, Flamma (I).

جلس نباتات عشبية حولية او مسرة من فصيلة القيويت انزعارها عطرية متعكبة زيتي . اوراقها كثة . انزعارها طرية الايتكاز ، متكوية التجميع او طرية || اشهر انواعه ما يلي .

١٥٧٨٧ - شواطة بيشية الوريك ٥ Phlox ovata (S). Phlox à feuilles ovales (F).

نوع من الشواطة وهي عشبية زينة مسرة تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل . انزعارها رديعية اللون متعكبة البلات مسرة الفصل || انزعارها يستر من حيزان الى آب وهو متكوي التجميع ، يستر الزينات القليلة .



شواطة مسرة

١٥٧٨٨ - شواطة درومند ٥ Phlox Drummondii (S). Phlox de Drummond (F).

نوع من الشواطة وهي عشبية سبردية زينة حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساهيا متعكبة فراء زينة السماء . اوراقها لائقة متعكبة . نضجها قلب الشكل ، خلي الصلصة السفلي . انزعارها تختلف باختلاف القرب منها العادية والكنية بينها الحمر والبيضاء والوردية والاريجانية والصفراء . انزعارها يستر طوال الصيف والخريف .

١٥٧٨٩ - شواطة مسرة ٥ Phlox glaberrima (S). Phlox glabra (F).

نوع من الشواطة وهي عشبية سبردية زينة مسرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متعكبة ذلقة طول نحو ١٢ سم . نضجها خلي البشرة . انزعارها حولي اللون او رديعية ، نضجها شقة ويضجها || انزعارها متكوي التجميع قليل الكثرة ، يستر من حيزان الى آب .



شواطة متكوية

١٥٧٩٠ - شواطة عكوكية ٥ Phlox paniculata (S). Phlox paniculé (F).

نوع عطري القرب والاصرام جميعها مسرة زينة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة ، متعكبة ، سنانية

Grise, Erinose

وسم يصيب بعض النباتات سببه حشرة تدعى اريوزو ، راجع اريوزو .

١٥٧٧٠ - شهيد ، شهيد Rayon de miel (F).

Honeycomb (E).

هو الس لا يزال في تخاروب اقراصه .

١٥٧٧١ - شهيد الخ ، قنبر Chênevis (F).

Hemp-seed (E).

هو بذر القنب .

١٥٧٧٢ - شهيرة التجمر Achalandage (F).

Custom (E).

هي اشجار سمة التجمر بين الحرفاء والزرايين .

١٥٧٧٣ - شهيرمان * Tadmors (S).

Tadmors (F). Shaldrake (E).

جلس طير من فصيلة البليات ، انواعه قليلة العدد جميعا من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . اجسامها ريشة القوام . اثوابا متراكبة الالوان الجميلة العابقة . رؤوسها سيد او خضر . غاطها قصيرة ، مبطلة ، جهورية اللون || تألت الحشرات والشرط البحرية مثل مصبات الانهر . قوتها الاغصان المائية والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة || تنن اناصمها في الاجمار والابرة المهورية . انثا تنع من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناورة الذكور نحو ٤ اسابيع .

١٥٧٧٤ - شهيرة الطين Plo, Pige (F).

زيفان في اللوق يقيد بعض الحيرانات كالدج كاتيل والبقر والغنم الى اكل التراب والسمود والجلود والريش وما اشبه . سببه المقدر نقص في الجسم وانتقاره الى بعض المواد الغذائية الكافية .

١٥٧٧٥ - شويقي Inspiration (F). Inhaling (E).

حركة من حركتي التنفس قولها ادخال الهواء الى الرئتين . وقد يحدث ذلك بانساع تجويف الصدر من اهل الى اسفل ومن افواه الى الامام لتتسد الرئتان وتغلق بالهواء حتى يصل الى الحويصلات الرئوية فتدخل منه الاكسجين وتنتقل من ثاني اكسيد الكربون .

١٥٧٧٦ - شواكة ، شوي Périrène (F).

Pericranium (E).

خلاف الشحم اي مصلح الجسمة .

١٥٧٧٧ - شواكين ٥ Intempéries (F).

Indemancy (E).

تختلف العوامل الجوية غير المألوفة او غير العادية .

١٥٧٧٨ - شواكر Entraîneur (F). Trainer (E).

من تعامل ترويض خيل السباق .

١٥٧٧٩ - شواكر أنثوي Organe femelle (F).

Female organ (E).

هي الاعضاء التناسلية الانثوية في الحشرة .

١٥٧٨٠ - شواكر ذكري Organe mâle (F).

Male organ (E).

هي الاعضاء التناسلية الذكرية في الحشرة .

١٥٧٨١ - شواكر الطع هو الجلبان اللانق ، الحلب .

١٥٧٩٦ - شَوَاعِيَّات ٥

Eresidae (S).

Eresidae (F). Eresidae (E).

قصيلة حناكب من رتبة الزبيلات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اصطلحوا البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من المالين القديم والجديد || اجناسها متباينة القد ذكورها اصغر من انثاها بما لا يقل عن ثلاثة اجناس || جميعها رباعية الرايا والمشتان تتميز بخلو بطونها من الصفائح البيضاء التي تشغل المشتان || الواجس مخلفه الاكوان والزراكن. تعيش تحت الحجارة وعلى الادغال والجنات البرية. عكادب الاجناس الارضية ابيض تحتضر في التربة تحت الحجارة وتبطنها بفلاف من التماس انبوي الشكل. عكادب الاجناس الشجرة صليبية الشكل. تتسجها بين قضبان النبات || اشهر اجناسها الشواع.

١٥٧٩٧ - شَوَاقِي

Nytege (F).

هو شب الليل، نبات حشي ترابي، معمر، اطبله.

١٥٧٩٨ - شَوَاقِيَّات

هي الشيات لقصيلة لباتية من ذوات الفلقتين.

١٥٧٩٩ - شَوَاقِي

Pitcho

طائر من الدخائل، اطبل دجلة شواله.

١٥٨٠٠ - شَوَان

Grainier (F). Seedsman (E).

خازن القلة وياتها.

١٥٨٠١ - شَوَت ٥

Schotie (F).

شجرة بيرة وزيتينة من القرنيات المتدمات. مهدا افريقية الجنوبية. ساقها بطينة النمو فراء. فروعها صلبة الايات والخشب. اوراقها مركبة وريشة وتري التجميع. وريقاتها بيضية الشكل، مبنحة التصل الجليل الخصار اللامس. ازهارها ضمية حراء اللون تنشب في الفروع القديمة التي يبقو عمرها الجلي. ثمارها متابل مبطلة متوسطة الطول كستية اللون. يزورها احادية الصف، كلولية الشكل سراء اللون.

١٥٨٠٢ - شَوُح

هو الشوب الاناضولي، اطبله.

١٥٨٠٣ - شَوْحَة

هي الرصة، اطبله.

١٥٨٠٤ - شَوْحَط

الشوط، شجر تنمذ منه القسي وقيل نوع من النبع وقيل هما والشراب واحد ويختلف الاسم بحسب كرم منابها فا كان في قلة الجبل فنبع وفي سفح فشراب وفي الخضيف فشوط. واسمته شوشة (اللسان).

١٥٨٠٥ - شَوْحَلَة فَرْقَاء الذَّب ٥

Carura furcula, Harpyia furcula (S).

Harpyie fourche, Petite queue fourche (F).

Carura furcula (E).

حشرة من قصيلة الشوطيات ورتبة حشرقيات الاجنسة. موطنها سطر الاصفاة المعتدلة الحارة من العالم القديم. فراشتها جابسة قوتها رقيق الازهار. سرقتها تعيش على اوراق الخور والصفاة || جميعها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم. يسطها نحو ٣٥ سم. رأسها معتدل الجسم. عينها كبرتان. زناطها شطبان من الاثني، مشطبان مزدوجان من الذكر. جوشها الى الردة تتوسط بقعة

الشكل، مزينة الصل. ازهارها عديدة الاكوان مستطيلة القصل المدبة الاطراف || ازهارها حشولي التجميع كبير القد يستمر من آب الى ايلول.

١٥٧٩١ - شَوَاقِي لَيْفِيَّة ٥

Phlox amana (S).

Phlox gracieux (F).

نوع من الشواقية وهي بجلة سبروتية تربيتية معمرة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها امليبية تطلو من ٢ الى ٦ سم. السفل منها مقنونة اما البليا بذاقة. ازهارها وردية او بيضاء للآين. فصلها مهدية تغلفية الشكل || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف.

١٥٧٩٢ - شَوَاقِي مَدَاكَة ٥

Phlox reptans (S).

Phlox rampant (F).

نوع من الشواقية وهي عشية زركوية مدادة معمرة. اوراقها امليبية مقنونة الطرف. ازهارها حراء اللون او وردية او بنفسجية. بتلاتها بيضية الشكل. فصلها خروطية مدبة الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٥٧٩٣ - شَوَاقِي مَرْفُحِيَّة ٥

Phlox pilosa (S).

Phlox polu (F).

نوع من الشواقية وهي بجلة سبروتية تربيتية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها وريوحها مزينة. اوراقها ضمية التصل تطلو من ٣ الى ٨ سم. وتقرض من ٣ الى ٨ سم. ازهارها بيضاء اللون او حراء او وردية. بتلاتها خلية البشرة ديقة. فصلها غرزوية الشكل || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٧٩٤ - شَوَاقِي مَطْمَحَة ٥

Phlox maculata (S).

Phlox macul (F).

نوع من الشواقية وهي عشية سبروتية تربيتية معمرة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متعاقبة سنائية الشكل. فصلها ماس الصفحة المبطنة بمخلفات المماجات الخضر. ازهارها حطرية للزلفه لونها الى الحمرة او البياض. ازهارها قنوي التجميع. يستمر من تموز الى آب.

١٥٧٩٥ - شَوَاقِي سَوْدَاكَة ٥

Ereus niger, Er. cinnabarinus (S).

Ereus noire (F). Ereus niger (E).

دورية من الحناكب السابعة القانصة رباعية الرايا والمشتان من قصيلة الشوطيات || جسمها يتنيز بفراقة القد الكبير بين الذكر والانثى. الذكر يطول نحو ١٠ سم. ثوبه الى الصبغة الحمراء ويلوحا بتجميع ابيض واسود. الانثى تطلو نحو ٢٧ سم. ثوبها الى السواد الباقو يطلو على الحبل وتديب في الاطراف ويملو صفحة بطنا كشة رباعية اطقات سفراء اللون || صدراها كبير القد، مقنوم الطرف. عينها زرقيتان. شوشها صغيران ذريان. فكها جميعا الاطراف، كليلها الحلب. جرمها قوية. بطنها يبيضي الشكل، مبطط الجرم || تألف البراري. سرهما جبوي. قوتها الاغشرا والاباب والحوام عكديتها يش اسطواني الشكل، محودي الازنكار، بعيد القنور تحتضر في التربة تحت الحجارة || يياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تعيش نحو ثلاث سنوات. ملجتها الحالي لا يتحضر من ملجن غيرها من الحناكب || تعتبر من العويات النافعة اللازوية.



شَوَاقِي سَوْدَاكَة



شَوَت



شَوْحَلَة فَرْقَاء الذَّب

منقطة خاسية الاعية للتأدية التائية أو التائية السام
اللسانية || أشهر انبعاثا واضرا شول الورد وشول
القرمبواز .

١٥٨١٠ - شَوَّحِلُ القَرَمبِوازِ ٥

Phragmidium rubri-ideal, Uredo rubri-ideal, Caecomyces (S). Rouille du framboisier (F).



شول

فطر مجهرى يتطفل على الاوراق فانيها ويصيب سفطها
البكر || مظهره الخارجي بنور قرحية لا ياتية الشكل
تركب الاوراق على سفطها العليا . تبو صفراء اللون
ثم تتحرف نحو البرتقالي تقسب جفاف التسبيج وذيل
الاوراق وسقطها البكر || افرازه زينة لا تستريب
المكافسة وان كان لا يدبها فامتثال اخضر النحاس على
فظة او فستين كان لقفاه عليه .

١٥٨١١ - شَوَّحِلُ الْوَرْدِ ٥

Phragmidium subcorticium (S). Rouille de rosier (F).



شول القرمبواز

فطر مجهرى يتطفل على مطم الورود المزروعة . مظهره
الخارجي يقع سفية لا ياتية الشكل لها الى السفرة
البرتقالية ، تركب الاوراق على سفطها العليا يخالها
قرب الفروق || وقد يصيب مالحق الانثاء وكورسها
ليستعطفها يرباع على اللس ينقل الى || يكلف
بأخضر النحاس او بالاكسيكلورير .

١٥٨١٢ - شَوَّحِلُكَ ، مِمْسِكَةُ ، Mimidses (F). Mimesis, Mimicry (E).

خاصة كاتمة في بعض الحيوانات واخرات تمكنا من
التشابه بالاشياء التي تحيط بها .

١٥٨١٣ - شَوَّرْ

هو اجتناء السمل او السمل المشور اي المسفرج من
القوسية .



شول الورد

١٥٨١٤ - شَوَّوْبِ هو غلطف اللباب ، اظله .

١٥٨١٥ - شَوَّرْكَ Ruche (F). Bee-hive (E).

هي مأوى النحل كالكيلة والقفير ، الخ .

١٥٨١٦ - شَوَّرْذِ Cystoparis (S).

Cystoparis (F). *Cystoparis* (E).

جنس نباتات عشوائية ، برية ، معمرة من الراسم .
انواعه المعمرة عديدة منتشرة في مطم اقطار العالم القديم
والجديد || اوراقها مركبة قطون من ٢٥ الى ٤٥ سم .
وردياتها شبه اطليجية النصل . راجعها حشفة البشرة .
زكاتها عريانة يطبقها حار كثيف الزغب ، تبي اللون .



شوري

١٥٨١٧ - شَوَّرِي Avicennia officinalis (S).

Paldeuvier (F). *White mangrove* (E). *Salsbaum* (D). *Avicennia* (I).

شجيرة سرجية معمرة من فصيلة هي الحام معها البلاد
الاستوائية . قشورها سامة طيبة يقال انها تغيد للمنة .
لوراتها وانجازها مياحية .

١٥٨١٨ - شَوَّوْبِيَّة ٥ ، قَلْفَة Morphology interna (F). Internal morphology (E).

درس هيئة الاجسام الحية وتركيبها في الحيوان والنبات .

جوزية . بقتا جزوي اللون ، اربه اللاتي السكية ||
رواشنا عند التشتين الى البياض اللامي تملو في التزج
الامامي زخارف جوزية وجماء || لما جيلان في الحول .
تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل
الثاني في تموز . نرح في الليل . تماثل بعد ظهورها
بنحو اربعة اسابيع وتضع اللمن مياحيا على الصفحات
السفل من نصال الاوراق || السرة قطون من ٢٨ الى
٣٠ م . جسمها مالحق القشار ، اكهب اللون ، مسطوط
الرأس ، مستطيف البطن ، مستطيل الموزع الذي يتسهي
بقرنين مستقيمين اسويين || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٤ يوما ينقضي ضمن صلبة متدلة التسبيج تمكها
السرة بين شقوق ماء الحور والصفحات .

١٥٨١٦ - شَوَّحِيَّات ٥

Curuidae, Notodontidae (S). *Curuidae, Pro-*
notontidae (F). *Curuidae, Pro-*
notontidae (E). *Zahnpinner* (D).

فصيلة حشرات فراشية من حشريات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع
العالم || تسرح في الليل . طيراتها طويل الشوط . اجسامها
متوسطة القد . رؤوسها مستطيلة الجرم . هيئات كبيرة .
قرونها الاستشعارية مشطية مزودة عن الذكور ، غيطية
او مشطية عند الاناث . ملاسها صغيرة ونحيلة . مراشفها
خامسة كلها تجازو الجذمة . بطونها كيفية الحمل والزغب .
سكها الشرجية مطوية بأطر من الهلب المستطيل . حلقها
تقع على جانبي الجش . رؤاشتها كبيرة ، جلطية
الاسترسال عند الراحة ، الامامية منها مزعولة ، الخلفية
وحيدة اللون . جزامها تامة التلو . ظاهيها الخلفية ثنائية
المناسخ او رباعيتها || اساريها عريانة او مبرحة الهلب
القصير . اجسامها ثنائية الاحجام والاشكال المستعرة .
سكها الشرجية لتفهي بقرون صلبة || غاداتها طبقة
او ملحقة بالغالب متدلة التسبيج || أشهر اجناسها الفوشل
والسمريرة والفيط والقاليرا والفيجرة والديكراتور .

١٥٨١٧ - شَوَّوْشَم Aeschynanthus (S).

Aeschynanthus (F).

جنس نباتات مدادة من فصيلة الفشوريات . معها
البلاد الحارة . سورها نخيلة ، ملتوية ، مدادة وحانية .
اوراتها لحية متعاقبة . انزاعها فردي التجميع ، محوري
او حامي الانكناز . انزاعها كبيرة القند ، مستطيلة ،
ثنائية اللون ، زاحية الحسة .

١٥٨١٨ - شَوَّوْخ Physospermum (S).

Physosperme (F). *Physospermum* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الحيات .
انواعه المعمرة قليلة العدد ، جميعها من ثويت الشرق الاذي
واروبة || سورها رفيعة قليلة الفروع . اوراقها متعاقبة
مركبة ، صلبة الورديات الدقيقة ، انزاعها سيولي
التجميع ، حامي الانكناز . انزاعها صغيرة يشاء اللون .
تنويرها صلي .

١٥٨١٩ - شَوَّوْكَ Phragmidium

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحابيات . انواعه نحو
٥٠ تتطفل على نباتات الفصيلة الوردية || يتسرح بلبانته
الغازية التي تركب لبلي النبات وأخر البار || نكاته
صقية الشكل مستطيلة الانكناز يطوحها دملة مفردة

١٥٨٢٦ - شَوْكَة مَذْهَبَة ٥ Lonchaea surra (S).

Lonchaea dorée (F).

نوع من الشوب ، طولها من ٢ الى ٣ م. رأسها واربعها سود ، جسمها زبرجدي اللون ، ملعب المراج . رقاتها تمش على الثآليل الناضجة الساقطة من أي نوع كانت .

١٥٨٢٧ - شَوْكِيَّات ٥ Loncheidae (S).

Loncheidae (F). Loncheidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، طولها يراوح من ٢ الى ٦ م. أثوابها غنقلقة الألوان ينقلب فيها الأزرق والاعصر . معظمها من الحشرات الثنائية الخلفية . رقاتها تمش على المواد الصقوية في الثآليل الناضجة وفي التزليل ويحت خلاء الاثبار .

١٥٨٢٨ - شَوْكَة ٥ Entéromorpha (S).

Entéromorpha (F).

جنس نباتات بحرية من الحفريات الخضر . أنواعها المعروفة نحو عشرة . اصطناعها بحار البلاد المحيطة بالحرارة || جميعها استوائية أو دوسية القواعد . قصيرة الكلاب . عويطة أو قذبة الإدراك المستطيلة ، ثلثولية المراج .

١٥٨٢٩ - شَوْكَة ٥ Anome (F).

في المال ، اطلبه .

١٥٨٣٠ - شَوْصَر هو الشمر ، اطلبه .

١٥٨٣١ - شَوُوط ٥ Course (F). Rîde (E).

هو الجري مرة الى الثانية .

١٥٨٣٢ - شَوْطَس ٥ Anomia (S).

Anomie (F). Anomia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحار . أنواعها المعروفة عديدة معظمها من عصيرات الطبقة الجيرية السفلى . اما الانواع المعاصرة لثائرة في معظم بحار البلاد المحيطة بالحرارة || اصطناعها لانظمة الشكل ، يغلب فيها الاهليسي . مصارعها لامتبوية ، دائمة الانفراج ، قليلة التفاعل ، شبه شفاة ، ثلثولية الدائل . وبصارعها السفلية أي اليسارية متقوية قرب الرباط وينفق حدهم بقية تمت الفضلات التي تمكن الحيوان من الالتصاق بالاجسام الخارجية || لحومها مأكولة جيدة المصفت ، مرفوف فيها .

١٥٨٣٣ - شَوْع Ben olifère

هو شجر البان واسمته شوة ويقال لشوة حبه البان وزيتته دهن البان وعطر ملش .

١٥٨٣٤ - شَوْف Sarcloir (F). Hoe (E).

الشوف : الحبر تسوى به الارض المحروقة (القاموس) .

١٥٨٣٥ - شَوْفَان

هو الحرفال ، اطلبه . وهو بري وسفلي وزراعي وعريان .

١٥٨٣٦ - شَوْكَال هو الشقال ، اطلبه .

١٥٨٣٧ - شَوْكَة ٥ Chovea

في شراب الزرع ، اطلبه .

١٥٨٢٩ - شَوَرَزْ مُزْغَب ٥

Cryptophagus pilosus (S). Cryptophage poilu (F). Cryptophagus pilosus (E).

حشرة دائمة وأنجم من فصيلة الشوزويات ورتبة معدنات الاجنحة . تألف الاجنحة والمغاور والسكان الارضية . غنقلها ويزقاتها تعيش تحت القش والجشاة على المواد الصقوية والنباتية المنحلة || جسمها صغير القند بطول نحو ٣ م. ثوبها الى الصخرة الشفراء المالح . مرناعها كيرتان . زياتها صولانيان . رأسها مستطيل الجرم . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، كيت الحمل والزرع . ارسافها خاسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتعيش حتى اوائل الشتاء . تسرح في الليل . تنجح المكن مصادياً وتلقي بين القش والميل || البرقة عند بلوغها الإدراك التام تقول نحو ٤ م. جسمها اسطواني الشكل سدسي الروابج ، تنه القرن ، لمر الرأس ينهي ، في مؤخر شرجها ، بكتلاتين قريبتا الشبه بكتلاتي البهك .

١٥٨٢٠ - شَوَرِيَّات ٥ Cryptophagidae (S).

Cryptophagidae (F). Cryptophagidae (E).

فصيلة حشرات غنقلية ودائمة من رتبة حشرات الجناح || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقف الرطبة والاماكن الظليلة والاجنية والمغاور والكهوف . قوتها المواد الغنقلية والذاتة || جميعها صغيرة القند قلما يتجاوز طولها ٤ م. اجسامها خلية القشور . مسعرقة الرؤوس ، مستطيلة التزليل الصوبانية الاطراف المركبة من ١١ فصلة || احمادها لاحة . جرامزها نفضة . ارسافها خاسية المعقل || أشهر اجناسها الشوزور والاتيواريه .

١٥٨٢١ - شَوَرَن ٥ Gaberi, Gaberit (F).

Mould, Full-sized model (E).

غنط الشيء بمقابله التسمية الصحيحة .

١٥٨٢٢ - شَوْش ٥ Zanchus (S). Zanco (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مستديرة الشكل ، مغلطحة الجسم ، لامة الاذيان . تكثر في بحار البلاد الحارة . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

١٥٨٢٣ - شَوْشِيَّة ٥ Lonchaea (S). Lonchaea (F).

الشوشية ج. شوب . جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة الشوشيات . أنواعها عديدة جميعها ثالثة وعشائية تعيش على مختلف المواد الصقوية الحيوانية والنباتية || أشهر انواعها الثلاثة التالية .

١٥٨٢٤ - شَوْشِيَّة الْيَكَّة ٥ Lonchaea chorea (S). Lonchaea sociale (F).

نوع من الشوب . طولها من ٣ الى ٤ م. رأسها سفلي ، اربعها سود ، جسمها أزرق لاص . رقاتها تمش تحت سلف ماء الانجار .

١٥٨٢٥ - شَوْشِيَّة عَصْرَكَة ٥ Lonchaea aristella (S). Lonchaea verte (F).

نوع من الشوب . طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الخضر الباقين يطو ملج اسود . رقاتها تركب ثمار التين فضليا .



شوزر مزغب



شوش



شوشية الية



شوشية خضراء



شوش

١٥٨٣٨ - شَوْكَة شَرِيَّة ٥

Ceanomyia pamphilus, *Chortobius pamphilus* (S), *Procris* (F), *Procris* (E).

حشرة من فصيلة الحانيات ورتبة حرشيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقيا الشمالية. قوتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها تعيش على صنف التيجليات || جسمها صغير القه يعلو نحو ١١ م. يستلها نحو ٢٨ م. راسها صغير الحجم. صمغها كيرتان. زياتها صمغياتان. مرشها ثنائي اللون. بيوتها ويطها الى الحطاي السكتي المويج || وراثتها، حث الثقلين، الى الصمغ الصغار يطونها حار لهم ويملونها في الزوج الامامي بقعة عديدة السرة، خمار الالام، طرية الازنكان || طها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تعاقل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتتمتع الممكن لطعام مريبة الشكل على نصال صنف التيجليات || السرة تطول نحو ٢٥ م. ثوبا الى الخضار الاخير الزين المويج يملو خط ثبيبي ويطان جانبان وعشرة اطواق جميعا كسكتة اللون. قشاقها مائل البشرة راسها واطواق التي يليه الى الجوزة. مدتها ووروجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو خمسة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا.

١٥٨٣٩ - شَوْكَة، شَهِيَّاه *Chardon* (F), *Thistle* (E). اسم شابل يطلق على عدة نباتات مختلفة من فصيلة المركبات وطيورها يحسبها شبه في شكل الاوراق وسا يطوها من ابر دقيقة حادة.

١٥٨٤٠ - شَوْكَة أَجْرَ عو الحرس، اطلبه.

١٥٨٤١ - شَوْكَة الْجَمَال * *Cardus dipacus* (S), *Cardus*, *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول المزروعة وحول الطرقات. ساقه مسطحة تطول من ٤٥ الى ٨٥ سم. اوراقه كبيرة القده مفرسة النصل المتجبع الصفحة الشاكك الحلق. ازهاره تاجية الازنكان لونها الى الليموني العايق || يستمر من النباتات البرية الخضراء غامضة بالازرع. اما الايل فلتهب بهموه.

١٥٨٤٢ - شَوْكَة الْجَمَال

هو الاقتضا السورية وهو ذي الايل، اطلبها.

١٥٨٤٣ - شَوْكَة الْحَلِيب * شَوْكَة الْحَمِير

Galeatium (S), *Galeatium*, *Chardon halcaux* (F), *Milk pea*, *Milk thistle* (E), *Milchdistel* (D), *Galeatite*, *Scarlino* (I).

نبات حشبي بري شاكك من فصيلة المركبات. ساقه اسطوانية تطول من ٦٥ الى ١٥٥ سم. صمغاتها لبنية يضاء اللون. يقال انها طيبة تقية الصدر. اوراقه كبيرة الله مفرسة، متجعبة. صمغها اخضر الصفحة الجوزة للزواج يملوها يتبع ابيض، حمارها متراكب المتعرج، شاكك الحلق || ازهاره تاجية، بنفسجية اللون، يملوها شبه من الاخر والازدر.

١٥٨٤٤ - شَوْكَة الدُرُج هو مدط الراسي، اطلبه.

١٥٨٤٥ - شَوْكَة الدِيس هو الحرف البري، اطلبه.

١٥٨٤٦ - شَوْكَة الصَّبَّ هو الاثنا الشبية، اطلبها.

١٥٨٤٧ - شَوْكَة الْعَلَك هو الاخيض، اطلبه.

١٥٨٤٨ - شَوْكَة الْعَقَم هو ابر تيلون ابن سينا، اطلبه.

١٥٨٤٩ - شَوْكَة النَّار *، زُحُرُور عُمَي، زُحُرُور *Pyraechtha coctinea* (S).



شوك الجبال

Bulson ardent *clacata*, *Pyraechtha*, *Aibre de Moise* (F), *Fire thorn*, *Firebush* (E), *Echter Fendorn* (D), *Kovo ardente*, *Spina ardente* (I). شجرة شاككة فراء من فصيلة الزبدات. تطول من سترين الى خمسة امتار. فروعها كيفية الشوك الحاد. اوراقها مسقة اذنية. ازهارها حلقية المتجبع، يضاء اللون. ثمارها منية الشكل، ابريوتية اللون، لثافتها السيوق الرقيق.

١٥٨٥٠ - شَوْكَة الْيَهُود هو الاثنا لرحلة، اطلبها.

١٥٨٥١ - شَوْكَة عَقَرَبَاتِي هو القرمصة، اطلبها.



شوك الحليب

١٥٨٥٢ - شَوْكَة فَرِيَس * لِسَان الصَّبَّ

Cardus pycnoccephalus (S), *Chardon à têtes paquantes* (F), *Slender thistle* (E), *Slender distel* (D), *Cardo del campi* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات ينبت في الميالح القرطية وحول جوانب الطرقات. ساقه تطول نحو ٦٥ سم. اوراقه مسطحة كثيرة التفريغ وللشعر واشك. اكلان الزهرية شاككة الحرافش المتراصة. ازهاره بنفسجية اللون يملوها تليخ ابيض.

١٥٨٥٣ - شَوْكَة لَفِي * شَوْكَة عَقَر

Cardus argentatus (S), *Chardon argenté* (F), *Silvered thistle* (E), *Silber distel* (D), *Cardo argenteo* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يتميز بكثافة خل اوراقه وسك الذي يملها بجلياب اغير اللون، لفي المويج. ساقه تطول نحو ٨٥ سم. اوراقه مسطحة، متجعبة. التفريغ، متراكبة المتجبع والمتعرج، كثيرة الشوك. ازهاره بنفسجية القاطعة، زرق الجسم، يفي الاطراف.



شوك النار

١٥٨٥٤ - شَوْكَة مَسْكِي

Cardus nutans (S), *Chardon penché* (F), *Musk thistle* (E), *Nickdistel* (D), *Cardo rosso* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات ساقه فراء، تطول نحو ١٥٥ سم. اوراقه الجليبية سانية النصل الشديد المتجبع. اوراقه القرعية صغيرة الله، لا قياسية التفريغ، كثيرة الشوك. اكلان الزهرية اثنية الاضداد وبسطها مسدل || ساقه وازهاره ويملوها مسكية الحرف.



شوك لفي

١٥٨٥٥ - شَوْكَارِي ٥

Gruacius (S), *Choucarf* (F).

جنس طير من الجوارم نباتات للتاتير وفصيلة التفريجات انواعه المعروفة نحو ٢٥ سلطانها فصيلة الانباء، تمتد من الهند الى جزر الزايج واستراليا. تألف الطيائير والالزاج وتتسلق الاشجار تحفة. قوتها الاساريج والهدان وبعض الطائر المتينة || اجسامها متحطة الله تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. اجنتها رتاجية، مسطحة، لاثافة. متعلقها ضليعة مسنة معتلة الطولي مستوية الاطراف. متعلقها ضليعة مسنة الحاقط العليا. قوتها معتلة الحيل. اصابعها نيشية. غذائها كبيرة حادة الاطراف. انزلها متعلقة الايوان

ساقه قوية فراءه رقيق نحو ١٠٠ سم. بشرتها منشقة برقة ارجوانية جوية لا تياقصة الانتظام. اوراقه مركبة تشبه اوراق البقدونس، نصلها شديد الخضار المابق نسيجه غزير اللادة الجسالية الفسالة. ازهاره صغيرة القد، يفساد اللون. ثماره كروية صغيرة || منبته المناطق المعتدلة الحرارة يقرب في الاراضي البور المتوسطة الرطوبة. يكثر قرب السباحيات وجوانب الانية. وهو في البلاد الكثيرة الاشعاع الشمسي اغزر مادة وادى فاعلية. وهو من النباتات الطبية الجزيلة النفع يستخرج من حصارته مادة الشوكرين التي تدخل في عدة تركيبات ومستحضرات ناعمة || كان شائع الاستعمال في الصور الغابرة لتسميم الناس وقد أمر سقراط بشرب نقيته فانت.

١٥٨٦٦ - شوكران صام* ، شوكران مشين، قاتل البقر

Cicuta virosa (S). Cicutaire, Cigu virose, C. des marais (F). Cow-bane, Water hemlock (E). Echter wasserschierling, Wütherick (D). Cicuta, Finocchio acquatico, Cicutarria (I).

ليات حشي بري طلي جمالي من فصيلة الحميميات. يكثر في المنطق وحل ضفاف مجاري الماء. جلوده خفيفة. ساقه فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه مركبة، متعاقبة و رية التجميع. ورقها لينة، حادة العنقة. نصلها عايق الخضار اللامع، مسن الحافة. ازهاره صغيرة القد. تلية اللون، خضره الموج. رائحة ازهاره واوراقه منبته. حصارته غزيرة للمادة الجسالية الفعالة المسية، تستعمل في الطب استعمال الشوكران.

١٥٨٦٧ - شوكران صغير* ، شوكران البستاني، بقند ولس كاذب

Aethusa cynapium (S). Aethusa, Petite ciguë, Ciguë des jardins, Ache des chiens, Faux-perill (F). Asse's parsley, Fool's parsley, Lesser hemlock (E). Hundsgleisse, Hundes Petersilie (D). Piccola cicuta, Przemoloto bastardo (I).

حشية برية جمالية طلية من فصيلة الحميميات تكثر في الاراضي المزدرة المتوسطة الرطوبة، ساقها تملو نحو ٥٠ سم. فروصها اقلية الانتشار. اوراقها تشبه البقدونس. حصارها جمالية مينة.

١٥٨٦٨ - شوكرات، ورق الملفوف الحفوظ الملح.

١٥٨٦٩ - شوكرين، مادة جمالية فالة تستخرج من حصاره الشوكران والشوكران المتن والصنير.

١٥٨٧٠ - شوكل، هو البويع. واحدته شوكله وثمرته شمول.

١٥٨٧١ - شوكي، شكل من الزباني قومه فواصل اسطوانية مستطيلة متتامة تستعمل تقديماً مع ابيضاضها عن السكية ورأس الحشرة.

١٥٨٧٢ - شوكرات، الشوكيات قسم من الحيوانات البحرية. رقبها وفصالها واناسها وانواعها عدة آلاف تبسها حبة سفوف ||

يكثر فيها الاسود والاشهب || اعرف انواعه واشهرها شوكراني الهند.

١٥٨٥٦ - شوكراني الهند*

Graculus indicus (S). Choucarri des Indes (F). نوع من الشوكاري. موطنه الهند. يألف القبايات والاحراج قوة الاسراع وبهذه ان يقبب الايجار في طليها ان لم يجدها سارسة || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٨ سم. ثوبه الملوي متراكب الاسود والاشهب. عيناه مظلوان بالاسود القاسم زووه وصدره وبطنه الى الفيرة. منقاده اسود. قائمتا واصابه الى السرة المابقة. جناحه وتاجي و ذلق، لاحت. ذنبه معتدل الطول خفي الطرف المستدير || يذنب حشه في الايجار الدامية. الاتي تحضن بتناوبة الاكر من ثلاث الى خمس بويضات مرة واحدة في الحول.

١٥٨٥٧ - شوكران، هو الشكامة، اطلها.

١٥٨٥٨ - شوكة، عضو حشي صلب الجسم حاد الطرف يحصل من تحول رقة او برمة او زينة او اذلة. والشوكه تكون دائمة الاتصال بنشب النبات.

١٥٨٥٩ - شوكة الصباغين، اطلها.

١٥٨٦٠ - شوكة حادة، في الضرور الشاك، اطلها.

١٥٨٦١ - شوكة زرقاء، في الشفاب الجسني، اطلها.

١٥٨٦٢ - شوكة صفراء* ، سكرليخس، قرنون Scolymus (S). Scolyme, Epine jaune (F). Spotted golden thistle (E). Labgoldkorn (D). Scardiacione, Spina gialla (I).

ليات حشي بري وزاعي من فصيلة المركبات. ساقه مسطحة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد، كثيرة التفريخ والتمسج، قليلة الشوك، نائكة الازرة الطرفية الصفراء اللون || اكوازه الزهرية كوية القاعدية، ازهاره بنسجية الانتشار زرق الازام الثاني ولثالث، ليلية الزام الاخير || يزوح جلوده المأكولة السكرية الطعم.

١٥٨٦٣ - شوكة قبطية، في البسط العربي، اطلها.

١٥٨٦٤ - شوكة مباركة*

Cnicus benedictus (S). Chardon béni (F). Blessed thistle (E). Benedikten ditzel (D). Cardo benedictus (I). ليات حشي بري حولي من فصيلة المركبات. ساقه مسطحة فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه الجسمية كبيرة القد منبته، نصلها ثنائي التفريخ و اعصر اللون، اصفر الموج، ابيض البروق، غليظ الشوكه الطرفية. اوراقه القريبة لاطنة، مسطحة، غمرضة، مسنة الحافة، شاككة. اكوازه الزهرية صغيرة القد مسطحة. ازهاره صفراء اللون، طيبة، تستعمل كقوية ومبرقة وداملة الجرح ومبيدة للاكل.

١٥٨٦٥ - شوكران* ، قطحاء، يسنيس Conium maculatum (S). Ciguë, C. tachette, Grande ciguë (F). Hemlock, Poison hemlock, Herb benet (E). Echter schierling (D). Cicuta, Erba grande (I). ليات حشي بري طلي جمالي حول من فصيلة الحميميات.



شوكراني الهند



شوكة صفراء



شوكة مباركة



شوكران



شوكران سام



شوكران صغير

جزوي اللون . عيناه زيمتان . شيفاهها شيطان ، عينا العفاف الذرية . فكاهها مستطيلان . جرانها سمراء اللون ، كثيفة الحلب يملأها يضيء الشكل ، احمر اللون تملوه خمسة خطوط يضيء متفرقة يقطبا خط مستقيم ابيض || تألف الاساكن القريبة من المساكن الزرقية ، عكدها قرب يطلو من ٣٥ الى ٤٠ سم . تقسمه تحت الحجابة وبنيها . سرسها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة || بيتها الشتوي من ١٨ اسيوط . تعيش نحو ثلاث سنوات || والاقن تتجسجس في الكفن في فضاء مئين الحيك تلتد وتحمله لاصفاً شفاها حتى التفت . ثم تحسن الصغار عل ظلو يملأها نحو اربعة اسابيع || تتغير من اللويحات النافذة اللافوفية .

١٥٨٩٨ - شيباحيات (S). Dysderidae (F). Dysderidae (E).

فصيلة عاكب من رتبة الارتبلاوات . اجناسها وارتواها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جميعها مقترنة ، متوسطة القد أو صغيرة . تتميز بما يعلوها من رسوم متناقلة الاشكال . ويمركز حولها الزيمية الست التي لا تشرق حل حافة الجبهة بل تتأخر عنها بعض الشيء . شيفاهها قوية و نشيطة ، مستطيلة العفاف . ألوانها متباينة الالوان يكثر لها الاحمر والاسمر || سرسها دجوي . تخصي || النهار حسن مكادب قرابية الشكل ، متينة الحيك ، سمراء اللون || أشهر اجناسها الشياحة والشبيصة .

١٥٨٩٩ - شيبك (F). Schema (F).

١٥٩٠٠ - شيلكة ساهية (S). Sciera huntia (S). Sciera messagaria (F). حشرة لافوفية من فصيلة الشياريات . جسمها صغير القد يطلو من ٦ الى ٧ سم . رأسها مكور ، مستقل . عيناها متلاصقتان عند الذكر ، متفارتان عند الاقن . زبالها عيطيان . قوتها مستطيلة ، قصيرة . طنائها مجهزة بمناسخ ذرية . ورشاهها مستطيلان . ثوبا الى الخطي المايق الاطحل المايح || الاقن اكبر قد من الذكر ، تتجسجس في الجلالة فينقش من يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة .

١٥٩٠١ - شيلريات (S). Sciaridae (F). Sciaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وارتواها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على رقيق الاطرا || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، مستطيلة الشكل . رؤوسها مكورة ، مستقلة . اعطاهها صغيرة . حيويا زيمية ، متقلبة عند الذكور ، متباينة عند الاناث . قوتها الاستشارية عيطية تتألف من ١٦ فصلة . قوتها مستطيلة ، نحيلة . طنائها مجهزة بمناسخ ذرية || يرقاتها انبوبية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، تعيش على المواد النباتية المنحلة .

١٥٩٠٢ - شيبكة (F). Diagmætrie (F). Diagmætry (E).

الشياحة علم يبحث في لوصاية المواد المختلفة .

١٥٩٠٣ - شيلك (F). هي الاسوخ ، اطليه .

١٥٩٠٤ - شيبب (F). هو وشق الناقع ، اطليه .

١٥٨٩٠ - شوبيل (S). Dipteronomia sinensis (S).

شوبيل هو الاسم الصيني . جمرة شبه مظلة الشكل من فصيلة التقييات . منبتها الصين . ساقها مائلة السماء منبسة الاضمان والافان ، تملو نحو ستة امار . اوراها عابلة ، متقلبة ، مركبة ، وقرية التجميع تمتد ١١ الى ١٥ وريقة . تصالها ستانية الشكل ، لافافية التسين الحاري ، تطلو من ٧ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . انزراها شحولي التجميع ، طرفي الارتكاز ، متصبب . انزاهها صغيرة القد ، غفراء اللون ، خاسية اقتراب || نماها جناحية يضيء الشكل ، ثنائية الكرايل ، رسيحة البزة ، تطلو نحو ٢٥ سم .

١٥٨٩١ - شوبكر (F). Tetanus (F).

هو الكزاز مرض خبيث .

١٥٨٩٢ - شوبب (F). Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الابيض للذب ، اطليه .

١٥٨٩٣ - شوبكة (F). Agénésie (F). Agénésie (E).

الشرية اغتراف عضوي شاذ سبه عجز في الطاقة المبدة .

١٥٨٩٤ - شوبكي (F). هو الحسون ، اطليه .

١٥٨٩٥ - شوبلاد (F). شوبكة ، شوبكران ، شوبل ، بروتجكليف ، بكتجكليف ، حيتي افراعي

Artemisia vulgaris (S). Arnolise commune, Herbe de St. Jean, M. à cant goûts (F). Mother wort, Mugwort (E). Echar Belfus, Mugwurz (D). Artemisia vulgaris, Erba di S. Giovanni, Amarelle (I). نوع من الشج يكثر في الاساكن المغفرة وجل جوانب المساكن الجبلية . ساقه عشوية ، غضة ، جزوية السماء تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراها ضبابية ، نصليا اخضر الصفحة العليا المبرقة الزغب ، اخضر السفلى الحاملة البورة . انزراها عشوية التجميع ، حربي الشكل . انزاهها صرية ، مرة الطعم ، طيبة مضادة للشنج والصرع والرقص السنجي .

١٥٨٩٦ - شيبكة (S). Dysdera (S).

شيبك ثمانية بطاظة تعيش في المراتج الظليلة وفي الابنية وتحت الحجابة || انواعها المعروفة نحو ٤٠ احاطها البلاد المعتدلة الحرارة والحرارة || اجسامها صغيرة لقد تطلو من ٨ الى ١٥ سم . جرانها مستطيلة ، حقيقة الاطرا . ألوانها الى الحمرة الخطية للمايح يعلوها خط قلاب ابيض واربية خطوط متفرقة يضاء اللون || سرسها دجوي . ترك مكدها في طلب القنص عند حلول الظلام . وهي لا تفت من حشرة تسطيع اليها سبيلا من النمل الى غديات الجليح .

١٥٨٩٧ - شيبكة حركه (S). Dysdera erythrina (S). Dysdera erythrina (F).

نوع من العناكب الساحية الثمانية ثنائية الروايا سداسية المفاصل تنتمي الى فصيلة الشياحيات || جسمها متوسط القد يطلو نحو ١٢ سم . عند الذكر ونحو ١٨ سم . عند الاقن . صدراها مزواطي الشكل ، حمرين الصفحة العليا ،



شوبلا



شبكة حمر

Décembre (F).

١٥٩٠٥ - شَبَان

هو شهر كانون الاول .

١٥٩٠٦ - شَبَكَة هي قن الشبح ، اكلية .

١٥٩٠٧ - شَبَكَة الصَّجُور هي سزار الصخر ، اكلية .

١٥٩٠٨ - شَبِيث Scutigera (S). Scutigères (F).

House centipedes (E). Spinnenassel (D).

جنس دويبات من الشبذاعيات الزحافات . اناوله المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها مفترسة ، دجوية المسرى ، تفعل المنازل اعصها الارضية تقضي على الكثير من الحشرات المذمنة وغير المذمنة ومنها الذباب على اختلاف اجناسه .

١٥٩٠٩ - شَبِيث حَبْكُوتِي *

Scutigera araneoides, S. Coleoptera (S).

Scutigère aranéide (F).

دويبة مفترسة من الشبث وصيغة الشبذاعيات شفوية الاكليل . تألف المراتب الربلية واللاقية والكهوف . تسرح في الليل وتقتل المنازل الارضية وتقضي على الكثير من الحشرات اعصها المذمنة وديدان الجناح والذباب || جسمها سكي ، التركيب ، مبط ، مستطيل ، كثير الجرامز الدقيقة التي يبلغ عددها ١٥ زوجاً . الذكر اصفر من الانثى ، بطول نحو ١٦ م . والاني ٢٤ م . راسها صغير . شفاها لافان . عندها مركبتان ، ثلاثية الزوايا . زها لاما نحيلان . التزوج الاخير من جرمها بالغ الطول الذي يفوق طول الجسم || تنجر من القويبات الشائعة .

١٥٩١٠ - شَبَكَة Particularité (F). Particularity (E).

هو كل لون يختلف اللون الفاصل ان في الخلل او في الابقار . فائقة والتسجيل والتعظيم من الشبات .

١٥٩١١ - شَبَكَة البَيجَان Ecison (zooc.) (F).

Beutcheon (E).

حلافة في البئر الحلو يتنقل في اواسط او اعالي مظهر الفسح وتلتقي عند طائر الفرج او في محيط . يستل منها ، بالنسبة الى شكلها وسحبها وانفراجها ، من قابلية اللد في البقرة .

١٥٩١٢ - شَبِيث ، شَوْحَة Chitine (F). Chitin (E).

هي المادة القشرية التي يتكون منها جلد الحشرات والجمادات وهي باسطة شديدة المقاومة لاحتياها على بعض المواد الجيرية .

١٥٩١٣ - شَبِيث Gymnogramma (S).

Gymnogramme (F). Gymnogramma (E).

جنس نباتات خشبانية ، برية ، معمرة ، من فصيلة البسباسيات . الانواع المعروفة نحو ٣٠ منها بعض اصقاع البلاد الحارة من المال القديم || اوراقها كبيرة ، مركبة ، وتزدهن جميع ، جميلة انفسار الزواي . مراوحها عطية . زكاتها شبه لمسونة باصباح النصال || منها انواع قديمة تنزرع في المراكن .

١٥٩١٤ - شَبَح ، لُزْطَاسِيَا Artemisia (S).

Armoise (F). Wormwood (E). Salsuff (D).

Artemisia (I).

جنس نباتات عشبية خشبية برية وزراعية من فصيلة

للركبات الانبوبية الزهر . اناوله عاتقة منتشرة في معظم اصقاع العالم منها البرية والعلبية والسنابية والتربينية . فروصها نجلة عشوية . اوراقها صمالية زياء للصل . اناولها دقيقة ، روية ، يبل فيها اللون الاصفر المشع بالاصفر || اعرف اناوله واشهرها الانسين والقيصوم وقشورلا والبيتران ، جميعها من النباتات العلبية التي تقطع البند وتخرج البندان بقطب البزوا والمص . يقال ان تقطع اناولها واوراقها يقيد قلوب السكري . وادها مع اي دهن كان يزل داء القلب والغاز . سريق اوراقها في المنازل يطرد ويكسر الحشرات والحولم . مادتها الدالة تسمى سستين .

١٥٩١٥ - شَبَح اَبْيَس الزَّهَر

Artemisia lactiflora (S). Armoise à fleurs blanches (F).

نوع من الشبح وهو جينة معمرة برية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وفروصها ملس للدهاء ، سحر اللين . اوراقها سنانية النصل ، خالية الصفة العليا ، عريضة الزاوية . اناولها مفترسة تجرمها النصل . قنايتها وسراقها يفسد اكلها || اناولها يستمر طويل الخريف .

١٥٩١٦ - شَبَح اُرْصِي Artemisia pontica (S).

Armoise pontique, A. du Pont, Petite absinthe (F). Roman wormwood (E). Römischer Belfuss (D). Asenzio pontico, Piccolo asenzio (I).

نوع من الشبح وهو نجلة معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروصها زياء للدهاء ، قلبية الشكل . اوراقها لائمة الخفسار ، ثلاثية الانقسام ، شديدة البرق . اناولها معقودية ، مستعقة ، عطلية || اناولها يستمر من آب الى تشرين .

١٥٩١٧ - شَبَح اُسْمَر Artemisia atrata (S).

Armoise brune (F).

نوع من الشبح وهو نبات بري وزراعي معمر يرضع في المواقع الجبلية . بطول نحو ٢٠ سم . اوراقه ثلاثية الانقسام ، غفراء اللون ، حادة البرق . اناولها معقودية التجميع ، وروصها الزهرية كروية الشكل ، عطلية ، قنايتها زياء البشرة سحر الحنار || اناولها يستمر من نموز الى آب .

١٥٩١٨ - شَبَح البَهر *

Ascophyllum nodosum (S).

Ascophyllé noueux (F).

نوع من الفطرس . اصلته بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاله صغيرة . ساقه مبطلة فزاه . اوراقه عطية . مرحة شبه رضية الشكل . لونه الى السمرة .

١٥٩١٩ - شَبَح اليهودية * ، شَبَحَان ، حَبِيثَان

Artemisia judaica (S).

Armoise de Judée, Absinthe de Judée, Semeococra (F). Judan wormwood (E). Wermut aus Judäa (D). Seme zanto (I).

نوع من الشبح وهو نجلة برية طيبة معمرة تملو نحو ١٢٠ سم . معاهد البلاد الفلسطينية . اوراقها وناولها تنصل بصفات سائر انواع الشبح الا انها خيرة المادة القعالة . يستخرج منها اصل السنتولين .

١٥٩٢٠ - شَبَح حَوِي Artemisia annua (S).

Armoise annuelle (F).

نوع من الشبح وهو نبات حولي لولج البرق الطري



شبح حكيبي



شبح بحر



شبح اليهودية



شجيرة نسي

يملون من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه خلية النصل، مستعرضة التثنية. ثباته شائعة، حروفها خضراء اللون || ازهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٩٢١ - شجيرة خراساني، قيصوم طبي

Artemisia santonicum (S). *Armoise santonique* (F). Holy wormwood (E). *Helliger Belfuss* (D). *Santonico* (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم بيرة طيبة ممتدة طولها من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقها بقرورها زاهي اللون. أوراقها مفصصة الصلبة، تملأها خلية البيرة عابث الخضار، قوي العرق. ازهارها مبشرة، كثيفة التجميع، فواكه الفلأ. أوراقها وازهارها طيبة وتستخرج منها مادة المستنق. ||

١٥٩٢٢ - شجيرة رومي، هو الابلست، اطليه.

Artemisia frigida (S). *Armoise frigidie* (F). *Armoise rustique* (F).

نوع من الشجيرة وهو بحجم صغيرة ممتدة طولها من ٥٠ سم. ساقها بقرورها مبشرة اللون. كثيفة الزغب التي اللون. أوراقها وسيدة القورس، لثائية التثنية، خلية النصل، عادية العرق || ازهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

١٥٩٢٤ - شجيرة ليفي، هيبيركان ابيض

Artemisia argentea (S). *Armoise argentea* (F). *Silvery wormwood* (E). *Silber Wermut* (D). *Assenzio argenteo* (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم ممتدة طولها من ١٠٠ إلى ١٧٠ سم. ساقها بقرورها كثيفة الزغب الكافي اللون. ازهارها متدلية عادية العرق، ثباتها مبشرة البيرة، زغبها ابيض اللون. نسي المواجه || ازهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

١٥٩٢٥ - شجيرة كالكوري

Artemisia camphorata (S). *Armoise camphrée* (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات مسمر فواكه العرق الكالكوري يملون من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه معتقة النصل، خلية الصلبة الحسية البيرة. ازهارها متعددية التجميع، رطبة. || ازهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٩٢٦ - شجيرة مكاسي

Artemisia scoparia (S). *Armoise à balais* (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات محلي يملون من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها بقرورها ممتدة اللون، سماء الزغب. أوراقه لمساء البيرة. ثباتها ازهاره جزوية اللون، شائعة الخمار اللامع || ازهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

١٥٩٢٧ - شجيرة حبان، هو حبيب البوذية، اطليه.

Armoise de Judée (F).

١٥٩٢٨ - شجيرة البعر، شجيرة اليهود، أبو مريكة

Lepocoech monachus (S). *Lepocoech*, *Phoque moine*, *Moine* (F). *Leptocoech*, *Monk-seal* (E).

حيوان بحري لبي من زعتيات الاقدام فضيلة التفتحات. موطنه البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. ملجته الحيواني جماعي، جاماعة قليلة البدن. قوته الاسماك والقشريات والرخويات || جسمه معتدل الطول عنه الذكر من ٢٤٠ إلى ٢٦٠ سم. رأسه متوسط الحجم يتميز بكثافة سباله. ذيله سالي الشكل. ثوبه الملوي إلى.



شجيرة البحر

السمة الممتدة يملونها مواج اسود. يملونها إلى البياض المائي. يمتد مرقشتان بالاسمر الاسود || الاثني اصفر قنأ من الذكر. طولها يراوح من ١٨٠ إلى ٢٠٠ سم. تمنع حمرا واحدا ترصه نحو ستة اشهر ويبقى يحميها من ٢٠ إلى ٢٢ شهرا.

١٥٩٢٩ - شجيرة الربيع، هو الاريدارون، اطليه.

١٥٩٣٠ - شجيرة، هو النيرج، اطليه.

١٥٩٣١ - شجيرة، Antilope thibétaine (F).

الشجيرة حيوان لبي جبري يدعى طبي التبت، اطليه.

١٥٩٣٢ - شجيرة، جنيسة، Genista (S).

Genêt (F). *Genista* (E).

جنس نباتات جبلية وبحلية معمرة من فصيلة القرنيات القرابية. انواعها الممتدة قليلة المدد اصلاها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || ساقها قرعاء. فروعها متباينة الاشكال ونسبها الشاك. أوراقها بسيطة أو لثائية التركيب، صغيرة النصل الجامدة. ازهارها متعددية التجميع أو فردية ابطي الانكاز. ازهارها صفراء اللون. اشهر انواعها:

١٥٩٣٣ - شجيرة، Schizocopa

G. casia (S). شجيرة افرعية

G. libanotica (S). شجيرة لبنانية

G. lydia (S). شجيرة ليدية

G. scanthocida (S). شجيرة فوكية

١٥٩٣٤ - شجيرة، Schizoneila

جنس نباتات عشبية صغرية من فصيلة التكتيات. انواعها قليلة، منها البلاد الحارة، تزرع للزينة. ازهارها كبيرة اللد بحجم غطلة الالوان الزاهية.

١٥٩٣٥ - شجيرة، Schizoneila

جنس فلور مجهرية من فصيلة الراهرديات تتميز بطولها القياسي الشكل ثم يعضها الكتيبة القسي التجميع وبهريقاتها الشفوية الثنائية التركيب || يصيب السدييات حل اعتلاط انواعها.

١٥٩٣٥ - شجيرة، هو المرمر، اطليه.

١٥٩٣٦ - شجيرة، شس، Schista (F).

Schist, *Slaty rock* (E).

خضار صخر صليبي التركيب اصابه غطط شديد في اعماق الارض. يرجع منه إلى ما قبل الاراضي الطباشيرية في الحقبة الكانونية.

١٥٩٣٧ - شجيرة، Chélicère (F).

Chelicer (E). شجيرة الحشرة أو الكانونية حيا كلابيا مقصفا الشفوي.

١٥٩٣٨ - شجيرة، Chélicérates (F).

Cheliceræ (E).

فئة من المفصليات حيواناتها عادية الزباني تستعصى منها بزيج من الشيلسيف. يعضها غشوي التفتش كما في صف المرصعيات، والبيض الآخر لذي أو قصبي التفتش كما في صف المتكبيات.

الرقابة تركت على اجتناب بطرية التربة وكثافة الاشجار .
ثم استعمال الاملح الموزونة التركيب والصيغة واجتناب
نقص الادوية في الاوقات الحارة .



شيش

Marginella (S). * شيشع ١٥٩٤٥
Marginelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الايل
وضيلة الشيشيات. انواعها المروفة نحو ٣٠٠ وبها
مخارج الاساق الثلاثة والباقي منتشر في معظم
بحار البلاد الحارة . بعض انواعها يعيش على رمال الشواطئ
المسورة والبعض الآخر على حشائش الجبلان || اصنافها
مألفة متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل
البصري ثم الخدوني . فماتها مستطيلة ، غشقة .
اريفاتها اليسرى ملتوية الى الداخل اما اليمنى فالى الخارج ||
اجسامها كبيرة . رؤوسها واضحة ، ثنائية الالوان للمحيرة
اعطامها صغيرة . اذنيها فضفاضة . ارجلها ماعدة المغاط .
اشهر انواعها الشيش السرديني (Marginella sarda) الذي
يشبه السردين شكلًا وحجمًا والذي يكثر وجوده في البحر
الابيض المتوسط .

Marginellidae (S). * شيشيات ١٥٩٤٦
Marginellidés (F). Marginellides (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الايل .
اجناسها وانواعها المروفة عديدة ، بعضها من متحجرات
الاساق الثلاثة والبعض الآخر مناصر منتشر في معظم
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعراف اجناسها
واشهرها الشيشع .



شيشع

١٥٩٤٧ - شيشرج هو الصاب ، اطبخ .

١٥٩٤٨ - شيشس الزفرين *

Gonepteryx rhamni (S).
Gonepteryx citron, Citron (F).

حشرة من فصيلة الكرنشيات روية جرثومات الاجنحة .
اصطانتها مصطب وجبال الشرق الاذل وارودية والريفية
التالية . خرافتها واضحة فتها عنر الاضرار . مرشباتها
على براعم التقيبات وتوليبها || جسمها بطول نحو ١٩ سم .
سقطتها نحو ٥٦ سم . رأسها معتدل الحجم . ارجلها اللون .
ميناها كيرتوان . زباناها صولطانيان شيشيا كثيف الخمل
احمل اللون . بطنها اريد اللون عند الذكر ، الخمل عند
الانثى . ووشانها الاماميان الى الصغار البصريين عند الذكر
والى الصغار الباهت الازرق المزاج عند الانثى . وتلونها
نقطة برتقالية في كل ريشة وبض نفط حاشية فمسية
اللون . الزوج الخلفي بلون الانثى وتلونه عند الششين
نقطة برتقالية كبيرة واربعة نقط صغيرة فمسية اللون ،
حاشية || لها جيل واحد في الحول . الانثى تضع المكن
زويبا زويبا على زيمات الزفرين والقيق والفتاب || السورة
اسطوانية الشكل تطول نحو ٣٦ سم . فورها الى الحاملة
الخضراء يملوا عطلان جانبيين اسفراون ونسمة خطوط
كستنية يحمها اطوار اسود . رأسها اسود ملها ورواجها
الى الحاملة الداكنة || طوار الاكمال يستمر نحو ١٥
يوما ويتقشر ضمن غشاء ضوحي اللدة ويطلع غيط
سريري تعمله الحفصة .



شيشس زفرين

١٥٩٣٩ - شيشس *
Rumex (S).
Rumée (F). Rumex (E).

جنس نباتات دليسية من فصيلة السونيات . منبتها
ساحل حوض البحر الابيض المتوسط . انواعها المروفة
سنة . سوقها غمراخية ، قرصية الالتفاف ، لايامية الارماح
منها الوحيدة ومنها الفمية . اوراقها متماثلة شقيقة اتصال
المستطيلة . اذعارها فردية ، طرفية الازنكار . الوانها تختلف
من نوع الى نوع ، منها البنفسجي والوردي والاصفر
والبلكي والمزلق .

١٥٩٤٠ - شيشيان ١٥٩٤٠
Fourmi mâle (F). Ant male (F).
هو ذكر النمل .

١٥٩٤١ - شيشير ١٥٩٤١
Lonchoptera (S).
Lonchoptère (F). Lonchoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الشيشيريات وريبة ذوات
الجانحين . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول
من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها كبيرة ، مسترسفة . عينها كبيرة ،
ناذرة ، غايقة عند الششين . قرونها الاستعمارية قصيرة ،
ثلاثية الفصل ، تنهي بنسيلة دقيقة . اعطامها فمسية .
ملابسها وحدة العلة . كوسلها وبنظها مساوية العرض .
روافئها فيه شفاقة . قرونها مبرقة الحلب الشالك .
الولها ملونة || تأتت الفلبات وشفاف مجاري الماء .
جسمها واضحة ، قوتها رسيق الازمار وطلمها . يرقاتها تعوي
على المواد النباتية الجزئية الاصلول في الجلالة وفي كل
مكان آخر .

١٥٩٤٢ - شيشيرات ١٥٩٤٢
Lonchopteridae (S).
Lonchopteridés (F). Lonchopterides (E).

فصيلة حشرات من رية ذوات الجانحين . اجناسها وانواعها
المروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع العالم
تألف الحراج والفلبات وبعضها يعيش قرب مجاري الماء ||
اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها
كبيرة . عينها غايقة عند الششين . قرونها الاستعمارية
قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعطامها فمسية تتدرج في
التجويث اللكي . شفاهها السفلى لافة . تآكلها غامرة .
روافئها شبه متانة الشكل . قرونها نفطية ، مبرقة الحلب ||
يرقاتها مبطلة تعيش في المواق الرطبة على المواد النباتية
الجزئية الاصلول || اشهر اجناسها الشيشير .

١٥٩٤٣ - شيشط ١٥٩٤٣
Brûture (F). Scald (E).

استراق النبات من الصقيع . يقال شيشط الصقيع النبات .

١٥٩٤٤ - شيشط البشركة ، شيشط البشكار
Rousissement de l'épiderme, Rousissement des
fruits (F).

الشيط تشويه عايط يحل بمخلبا الاملح فيفقس عليها ويصعب
استبدالها بمادة فلفية . اسبابها عديدة احصاها :

- ١ - العوامل الجوية اللاذاتية كالبرد والرطوبة وتغي
الحرارة التي تعقب البقعة وتستر نحو ٤ اسابيع .
- ٢ - الاختلال في توازن اللماء .
- ٣ - الحش الخائى عن استعمال بعض الادوية الكاوية .
- ٤ - الاملح الباكرك اذا امتزج القابل الاوراق او
ركب الاوراق والتار في آن واحد .

من اللبالية الى السرة الخلفية يطبقها حصار اسود. رأسها غروي الشكل، ذلق الخط. شفها متوسط الانتراج. فكها متعادلان. اسناتها متراصة وسيدة الصف في الفكين. زعنفا مستديرتان، ولشزتان. زعنفا الظهرية لثنتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لها وديك، ابيض اللون، مستحب اللحم.

١٥٩٨١ - شيم طرخوري * طرخورة

Trachurus trachurus (S). Saarel, Chinchard (F).
Scad, Horse-mackerel (E).

سمكة بحرية يمرض من الشيمات الاسقرليات شالكات الزمائف. اصطلها جيم بحار البلاد المظلة الحارة من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي والمحيط الهادي من جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الاربعة اترقاء ينضف ويسمر عند الظهر ويدبر عند البطن. رأسها غروي الشكل مستد الحصر. فكها الاسفل يتقدم الاسفل. تتميز باستطاعة زعنفاها الظهرية والشرجية. زعنفتها الذيلية فاقية. حرافتها خطها الجانبي جانبية الشكل تملأها مناس متعقبة تتجسم وتكبر مع الاقارب من اللب || لها متوسط الصف، مأكول.

١٥٩٨٢ - شيم قراب * قراب

Caranx korab (S). *Caranx korab* (F).
Caranx korab (E).

سمكة بحرية يمرض من اللحم. اصطلها جيم القالم البحر الاحمر ويض مناطق البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الشفاف واليم جسمها اعليجي الشكل، مستطيط، بطول من ٥٠ الى ٥٥ سم. ثوبها الى الشبه النضية المالح. ظهرها الى الزرق. زعنفاها الصدرية والخصية الى الشفحة. الظهرية الى الخشار البحري، الشرجية شائعة بطولها حصار اصفر. الفلقة العليا من الذيلية الى الزرقه الخشراء المواج، الشفلة السفلى الى الصغار الباهت || لها في ظهرها زعنفتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لها جيد الصف، مغروب فيه.

١٥٩٨٣ - شيمييات

Carangidae (S). *Carangidae* (F).
Carangidae (E).

عارة اسماك من الاسقرليات الشالكات الزمائف.

١٥٩٨٤ - شيميية * شيميية

Caractérológia (F). *Characterology* (E).

الشيميية قسم من السيكلوبية يمتد في الطباع الخلقية.

١٥٩٨٥ - شيميير * شيميير

Hystrix (S). *Porc-épic* (F). *Porcupine* (E).

جس سوزانات لينة قاسمة من فصيلة الشيمات انواعه سة. جميعها غليظة الاجسام المشفحة الصمورة. رؤوسها مكرمة. مقاصها مشقولة. خناياها مسترسفة. حيتنا وأذنا صنية. اعناتها قصيرة. جرانها مستدلة القدة قرية. اخلافها مقوسة حادة. اذنانها جذع بارزة. ملها كيف التجميع قصير القدة يصله شوك كاسلال طين الطويل والغلف يملو الجسم من قة الرأس الى طرف الذنب || اعرف انواعه الشيم الملبول والشيم الابيض الذنب. قال فيه الجاسط : « من شاته انه يمدد قائما واذا رأى ما يكره انتفض وتنفض فيخرج منه شوك كاسلال يرحم من اصابه ».

كل مستطيلة. الكلة تشمل من ٢٤ الى ٢٦ مكة تنقف بعد منها بنسبة او سبة ايام نسية الى موائل النفس من رقات صغيرة نسية تنقل على الارواق وتنضف السرق ويبلغ كامل نمجا البرقي بنحو ثلاثة اسابيع ثم تتحول الى عذارى منها الى حشرات كاملة. طورها القذري يدوم في الربيع والصف من ٤ الى ٦ ايام || اما البرقة الكلاسة فطولا نحو ٢٠ م. لونها الى الجلالة الخلفية يطبقها حسة خطوط ارجوانية مستطيلة تتكشف الظهر والجانين || موائلها عديدة اعلمها قصب السكر والارز والقدو الصغراء والبيضاء والذئب والتبيل || اخرها شديدة القبح لانها تنضف السرق وتضي على النوايا.

١٥٩٧٧ - شيميكة * شيميكة

Chilina (S). *Chilina* (F). *Chilina* (E).

جس سوزانات مائية من الرغويات مبدات الاربيل وفضيلة الشيمات. انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلها اتر ويتابع ارمكة الجنوبية. تفتها التباينات اللالقة || اصطلها نصف كروية للشكل، قصيرة الوب، كبيرة القوة المستطيلة. اجسامها مستطيلة. رؤوسها قليلة النضوح مبطلة. لواسها مزوانية الشكل. اربطها وسيدة، مسترسفة، عادمة السقاط.

١٥٩٧٨ - شيم * شيم

Caranx (S). *Caranx, Carangue* (F). *Scad, Cavally, Horse-mackerel* (E).

جس اسماك بحرية من فصيلة الاسقرليات. انواعه عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة والمعتدة. جميعها من الاسماك المأكولة. كبيرة القدة طولا يراوح من ٤٠ الى ٧٠ سم. تتميز بخط جانبي من الحرافش الحلالية الشكل، السوداء اللون، يعلها من البق الى التخرج.

١٥٩٧٩ - شيم اوبه * شيم اوبه

Caranx glaucus (S). *Caranx glaucus* (F). *Glaucous scad* (E).

سمكة بحرية يمرض من فصيلة الشيمات ودية شالكات الزمائف. اصطلها يضف القالم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي... تتميز من الاسماك البنية || جسمها اعليجي الشكل، مستطيط، بطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الاربعة يطبقها مواج ازرق يتخلله الاخضر البحري يمتد في الظهر ويدبر في البطن ويملو شمع قصي منه قامة الزعنفة الظهرية الثانية والزعنفة الشرجية. رأسها غروي الشكل، ذلق الخط. شفها واسع الانتراج. فكها متعادلان. اسناتها صغيرة وسيدة الصف في الفكين. زعنفاها مستديرتان، ولشزتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لها وديك، ابيض اللون، مستحب اللحم.

١٥٩٨٠ - شيم صتمين * صتمين

Caranx zameun (S). *Caranx zameun* (F). *Caranx zameun* (E).

سمكة بحرية من اللحم. اصطلها جيم القالم البحر الاحمر ويض مناطق البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الشفاف واليم. لمنها الحياتي جلعي يمد الادراك || جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. ثوبها الى الشبه النضية الماعدة اللبس. زعنفاها الصدرية والخصية عبره اللون. زعنفتها الشرجية والفلة السفلى من الذيلية الى الصغار الخشفي المواج. زعنفاها الظهرية والفلة العليا



شيمي



شيم اوبه



شيم صتمين



شيم طرخوري



شيم قراب

ورقة للقرص . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باجسامها البنية المتقرنة . رؤوسها غليظة . مقامها مشوية . اذنانها قصيرة او طويلة اخاذة . جرائزها متساوية الطول رباعية او خمسية الاضلاع . انظرها قوية ذرية . جلودها حسية التركيب يطولها حلب دقيق وشوك كالشال متباين القلط والطول || جلودها المناطق الحارة من المائلين القديم والجديد . وهي بطيئة الحركة تسرح في الليل قريبا مختلف المواد النباتية والظاوع والافاعي .

تقسم هذه الفصيلة الى فئتين :

— فئة الشياحم الشاجرة المتسلقة وهي تشمل ثلاثة اجناس الاروين والكتنوس والشطوس .

— فئة الشياحم الأرضية وهي مؤلفة من جنتين الشيم والاطرور .



شيم مدبل

١٥٩٩١ - شبهات الفؤوب ٥

Hysticomorpha (F). مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القوارض تشمل اربع فصائل الشبهات والافاغات والشنبيات والكندريات .

١٥٩٩٢ - شبهات ٥

Cheyota (F). هو الشوك من نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

١٥٩٩٣ - شيوخ ، شوكية شائعة

Inilivision (Jov.) (F). *Jole-poussion* (E). ساقه قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره في مال او مقام لم يقسم بين مالكيه ويكون كل مشتاق شريكاً بقدر نصيبه في كل جزء من اجزاء المال المشترك على الشيوخ ويكون نصيبه معنوياً محصاً بغير عه بالارقام كالنصف والربع والثلث في حين يبقى المال الذي ينصب عليه هذا الحق شاملاً .

١٥٩٩٤ - شينودكة

Chionodonta (F). هي الثرثث ، اطليه .

١٥٩٨٧ - شبهات أبيض الذئب ، شبهات ومدكع *Hystrix leucura* (S). *Porc-épic à queue blanche* (F). نوع من الشيم كبير الجثة غليظها بطيء الحركة ، طوله يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . وذنبه من ٧ الى ١٠ سم . ثوبه الى الصهبة البيضاء . عليه ابلق اللون وشوكه كلك . ذنبه ابيض الحلب والشوك || موطنه الهند ويران والعراق حتى ضفاف بحر قزوين . يأنف المناطق القترية من العراق . جسمه ردة فسيحة مستطبة يطرها على حق ٧٠ سم . يادى لها في النهار . يسرح في الليل . قوته الجلود والسفل والاضباب || اثناء تقص من ٢ الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٨٨ - شبهات بحري *Hérion de mer* (F). *Porcupine fish, Sea hedgehog* (E). هو قنفذة البحر من الفئيات ، اطليه .

١٥٩٨٩ - شبهات مدبل ، شيقم ، دكك ،

Hystrix cristata (S). *Hystrix cristata* (F). نوع من الشيم غليظ الجثة القوية الصمورة . بطيء الحركة . طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم . وذنبه ١٦ . شوك فقرته ومنقعه دقيق مستطيل منطوف اقزام الاخير . طوله نحو ٣٣ سم . شوك ظهوره كثيف التجميع مستطيل الشكل غليظ القذ ذرب الاطراف يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . يلفسه الحيوان لتفادع عن النفس فينقل ويؤدي حيث يفرز || موطنه فسيح الارياب يعم كامل حوض البحر المتوسط || يأنف الاحراج والمغصبات والاماكن البعيدة عن العمران . جسمه ردة فسيحة يطرها في التربة على حق ٦٠ او ٧٠ سم . مدغنها ويخربها لفق واحد طوله نحو ٥ امتار || يسرح في الليل . قوته الاضباب والجلود وجميع انواع الشوك والضميد وبعض الحشرات والديدان والورع والظاوع والافاعي || اثناء تقص من درعين الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٩٠ - شبهات

Hystriidae (S). *Hystriidae* (F). *Hystriidae* (E). فصيلة حيوانات لبونة قاضية من مرتبة شبهات الفؤوب



ص

١٥٩٩٩ - صابونيات ، قروسيات

Clupeidae (S), *Clupeidae* (S), *Clupeidae* (S).
فصيلة اسماك حديدية الاجناس والانواع، متفارقة القد وقدر
الاسراب. اشهر اجناسها الصابونية والشابل والسردين
والرلكة الخ.

١٦٠٠٠ - صابون Savon (F), Soap (E).
مادة صناعية تستعمل للتنظيف تتكون من تفاعل بعض
المواد الدهنية مع بعض المواد القلوية .

١٦٠٠١ - صابونيات Sapindaceae (F).
هي فصيلة السبنديات ، اطلبها .

١٦٠٠٢ - صابونية Saponaria (S).
Saponaria (F), Saponaria (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنفليات ،
انواعها نحو ٢٠ جميعها منقطة . اوراقها كاملة متفارقة .
ازهارها نورية التجميع . تاجية الارتكاز ، زاهية الالوان
التي تختلف با اختلاف الانواع || اعرف انواعها واشهرها
سائل .

١٦٠٠٣ - صابونية دابكية

Saponaria glutinosa (S), *Saponaria visqueuse* (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة سبروتية محولة تملو من ٢٥
الى ٥٠ سم . ساقها فراء مزغبنة . اوراقها كبيرة القد ،
تصلها ثلاثي او خماسي المروق ، ازغب البشرة ، دابق
المسام . ازهارها حربي الشكل . ازهارها قرمزية اللون ،
صغيرة البتلات الجزلة .

١٦٠٠٤ - صابونية زيمانية

Saponaria ocimoides (S), *Saponaria faux-basilic* (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة سبروتية معمرة تملو من ٢٠
الى ٤٠ سم . ساقها فراء . اوراقها منقطة ، اعطليجية ،

١٥٩٩٥ - صادة Délivre (F), After-birth (E).
ما يخرج من رحم انثى الحيوان من القلي بعد الوضع .
يقال القلت البقرة صانها .

١٥٩٩٦ - صابة ، مكيلا

Hippomane manchinella (S), *Mancanillier*, *Arbre*
poison, *A. de mort* (F), *Manchineel tree* (E), *Man-*
cinellenbaum (D), *Mancanilla*, *Mancinella*, *Noce*
valenoso (I).
شجرة من فصيلة السبسيات تملو من ٥ الى ٧ امتار ،
شكلها على هيئة الجوز . ساقها سرسة صهوية . اوراقها
معتقة ، متعاقبة ، قلبية ، مستطيلة . تصلها شديدة الحصار ،
متسعة الصفحة ، حبيك التسيج . ازهارها وسيدة المسكن ؛
الذكورية قدية الشكل ، غدية التجميع ، والانثوية فردية .
ثمارها كائناتح الصغير شكل وحسب وهي مأكولة ، لذيلة
العلم . والشجيرة تفرز شائنة اي عصارة لينة حريفة ،
كاوية ، سامة . ومنهم من قال ان كل من نام في ظلها
كان نصيبه الموت . ج صاب .



صابة



صابونية

١٥٩٩٧ - صابونة Alose finta (S).
Alose, Feinte (F), Shad (E).
سمكة من الصابونيات كبيرة القد ، تملو نحو ١٠٠ سم .
تكثر في المتوسط وعلى شواطئ الاطلسي . تتسلل الاغوار
وتصعد الانهار في زمن السرم ثم تعود الى البحر في اواخر
الصيف || لديها لذيلة العلم غير انه كثير الحسك .

١٥٩٩٨ - صابونة النيل Clupea nilotica (S).
Alose du Nil (F), Nile Shad (E).
سمكة بحرية ونهرية من الشابلات الصابونيات ، موطنها
المتوسط . يكثر بجيها في النيل من اذار الى تموز وهي
كبيرة القد ، كثيرة الحسك ، مأكولة .



صابونية ربحانية

مقلوبة المتأصلة ، نصلها دابق السام ، ائيب البشرة .
انهارها يضاء اللون او ودية ، كلها متراكب المرافف
الحطية || انهارها يستمر من تموز الى آب .

١٦٠١٥ - صَابُونِيَّة شَرَفِيَّة

Saponaria orientalis (S).

نوع من الصابونية وهي عشبة سولية سرولية تملو ١٥ سم .
ساقها زيار ، اوراقها معتقة سنيرة اللثة ، اعليجية الشكل .
نصلها مائل للبشرة وحيد الفرق . انهارها ودية اللون
او حراء ، كلها اسطوانية الشكل ، خلية البشرة || انهارها
يستم من ايار الى تموز .

١٦٠١٦ - صَابُونِيَّة صَفْرَاء

Saponaria lutea (S).

نوع من الصابونية وهي عشبة معمرة تروى في الاربة
المجسية وهي من نباتاتها الطولية . تملو نحو ١٠ سم .
ساقها حامدة الفروع ، قليلة الاوراق المتباعدة . نورها
الزهرية حمراء الالوان . كأس الزهرة زيفاء البشرة ،
تتلاها صفراء اللون مشقة بالاسود || انهارها يستمر
من تموز الى آب .

١٦٠١٧ - صَابُونِيَّة قَزْمِيَّة

Saponaria pumila (S).

نوع من الصابونية وهي عشبة برية جبلية معمرة . ساقها
جمعة وحيدة الزهرة تملو نحو ٥ سم . اوراقها خيشة متصل
للتسطيل المائل . زهرتها ودية ليلتلات . كلها خلية
البشرة ، حراء اللون .

١٦٠١٨ - صَابُونِيَّة قَزْمِيَّة * ، عَرَقِ الحَلَاوَةِ

Saponaria officinalis (S), Saponaria officinalis, Savon-
nière, Herbe à foulon (F), Soapwort, Hedge pink,
Fuller's herb (E), Echtes Seifenkraut (D), Saponaria
officinalis, Saponella, Conditi (I).

نوع من الصابونية وهو نبات حشوي طلي وصناعي معمر .
ساقه ليفية مدادة تملو نحو ٨٠ سم . اوراقه كبيرة اللثة
تملو نحو ١٥ سم . وترعى ٥ سم . انهارها عطرية كبيرة ،
حراء اللون او ودية . انهارها يستمر من حزيران الى
ايلول || جلوره وسقه واراقه وانهاره طيبة تدخل في
تركيب عدة مستحضرات تعهد الجلد وابتهاج للمفاصل
ويقال انها تنفع السلسل || سقه صناعية تستعمل في
تطهير الثياب وهي زخفي في الماء كالصابون .

١٦٠١٩ - صَابُونِيَّة

Saponine (F), Saponin (E).

مادة صابونية تستخرج من عرق الحلاوة وغيره . تستعمل
في التنظيف .

١٦٠١٠ - صَابِيَّة

Vent du Sud-Ouest (F).

South-West wind (E).
هي الريح الجنوبية الغربية ، دبح مها بين الجنوب
والغرب وجهتها بين الشرق والغرب .

١٦٠١١ - صَادَاتُ الرِيح

Bris-vent (F).

Wind-screen (E).
صف او عدة صلبون من الاشجار اللينة الكثيفة الاثان
تزرع لصد الريح وقاية المزروعات من حبوب المذي
النار .

١٦٠١٢ - صَادِر

Effluent (F), Effluent (E).

١٦٠١٣ - صَادِل *
Profluvium (F), Profluvium (E).
المادة المعدلة نمت ترفيقي يطلق على كل شخص لا
يستطيع الانزلاق الا يشعله .



صَابُونِيَّة شَرَفِيَّة

١٦٠١٤ - صَادُور

Echale (F), Vine-prop (E).

الصناديد ما يمرض عليه الكرّم .

١٦٠١٥ - صَاكِرَة

Empaqueuse (F).

جهاز آلي يصر تلقائياً ما جبل بمنزله من الاشياء .

١٦٠١٦ - صَاكِرَة

Shene

ملك يصرف ليه قسم من اتيار الكهرالي فيصنف .

١٦٠١٧ - صَاكِرُج * ، صَرَج

Psaltria, Psaltria

تربة جسية سيبها نعية اللؤلؤ قدراها يراوح من حيم
زرة الطرد الى الحصة .

١٦٠١٨ - صَاكِرُخ

Fusée (F), Spindletul (E).

سهم شديد الانحناء رتش به يفس السحب فيحول بلدا
الى ماء يسقط على الارض مطراً بدلاً من البرد .

١٦٠١٩ - صَاكَلَة

Couture (F).

سقوط الزهر بعد التايير والانشاب ، راجع تحشف .

١٦٠٢٠ - صَاكَل

Fusée (F), Spindletul (E).

هو الاشراس ، اطبه .

١٦٠٢١ - صَاكَل الحَشَش

هو اشراس الحشش هو اشراس الحشش ، اطبه .

١٦٠٢٢ - صَاكَل حَشِيَّتِي

هو الاشراس الاسابي ، اطبه .

١٦٠٢٣ - صَاكَلَة ، صَحَاكَلَة

Ascendens (F).

صاحدة ج . صولته : رولب كلبية متجمعة لفة تطو
ارض الفلور ويوتاين .

١٦٠٢٤ - صَاكَلَة

Stalagmite

صاحدة ج . صولته : رولب كلبية متجمعة لفة تطو
ارض الفلور ويوتاين .

١٦٠٢٥ - صَاكَلَة

Foudre (F).

Lightning, Thunderbolt (E).
افراخ كهرالي جوي بين محابة مكهوية والارض او
بين محابتن . واصافقة يصحبها برق ووده .

١٦٠٢٦ - صَاكَل

Chair, Limpide (F).

ما كان لا دس فيه .

١٦٠٢٨ - صَاكَل

Thin, Limpid, Clear (E).

الصافر : كل ما لا يصيد من الطير . والتسر يصفر .
وفي الثقل : اجين من صافر واصفر من ليل .

١٦٠٢٩ - صَاكِرَة

Couteuvre-chapelet (F).

الصافرة اسم ثل لصبان المرقط ، اطبه .

١٦٠٣٠ - صَاكَلَة

Evéement (F).

راجع حادث .

١٦٠٣١ - صَاكَلِي

Saphine (F), Saphens (E).

ويدعى السافز والفرود الصافز . هو الوريد الذي يلين
نقل الدم الى اطراف الجسم الفضل .

١٦٠٣٢ - صَاكَلِي

Net (F), Clean, Clear (E).

هو ما يبقى بعد حذر الكلفة .

١٦٠٤٦ - صَبَّار بَيْضِي *Opuntia ovata* (S).

Raquette ovoïde (F).
يزرع للزينة ، غليه يملو نحو ١٢ سم. ساقه ملسية
اللون البني الشكل المبط. سداثر رافعة ، مضربة ،
صفراء اللون ، حاتها مستقلة مفصلة || ازهارها جزئية ،
جيلة ، كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم.

١٦٠٤٧ - صَبَّار مَرَح *Opuntia inermis* (S).

Raquette sans épines (F).
يزرع للزينة ولأثر المأكولة . مهد بلاد الاقليل ولزوربا
غليه يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ألواحها اهليجية الشكل ،
بحرية اللون تطلو نحو ٢٠ سم. سداثر قليلة ميمرة سمراء
اللون ، مادمة الشكل || ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو
٧ سم. لونها ال الصفرة الباهية . ثماره يرتقالية الشكل
متصلة الحجم ، سكرية اللب ، حرارة الزور المراساة .

١٦٠٤٨ - صَبَّار سَتْنِي *Opuntia stanleyi* (S).

Raquette de Stanley (F).
يزرع للزينة ، غليه يملو نحو ٣٥ سم. ساقه مفصلة.
الواسه صفية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. سداثر رافعة
خضدة يضاء اللون . حاتها كيفية التجميع مشربة السرة
تطلو من ٤ الى ٦ سم || ازهارها كبريتية الصفار ، زاهية
اللون ، قطرها نحو ٥ سم.

١٦٠٤٩ - صَبَّار قَنْدَدي * ، كاكوس شوكي

Echinocactus (S). *Echinocactus* (F). *Spine cactus* (E).
Igelkaktus (D). *Echinocacto* (I).
جنس نباتات زربية شاككة ميمرة من فصيلة الصباريات.
ألواحها مدمجة مهدا البلاد الامريكية الراسي . ساقها
حسية واسعة القطعة ، يرتقالية الشكل بخدة الجسم ،
مقطوعة الرأس والمقرب . سداثرها كثيرة العدد ، مستقلة
الايام ، حشلية اللون ، تركل على ليج الاعمادية .
حاتها ، قوية صلبة ، منسجة ، متشابكة || ازهارها
حادية ، كبيرة القد ، بحرية اللون تطلو يفس السداثر
للمكان لأنها تحشى البرد .

١٦٠٥٠ - صَبَّار مَعْرُوف * ، صَبَّار ، تين شوكي

Opuntia vulgaris (S). *Raquette commune*, *Figuler*
de Barbarie (F). *Barbery fig* (E). *Gewöhnlicher Fel-*
genkaktus (D). *Fico di Barberia* (I).
لبات سبروتي شائع الاستعمال يزود التسبيح ولأثر
المأكولة . غليه كيفية التجميع يملو نحو ٢٠٠ سم.
ألواحها كبيرة القد ، بحرية اللون . سداثر حشلية شاككة ،
حاتها غليظة سادة || ازهارها كبيرة القد ، زاهية الصفار
الجليل . ثماره مأكولة ، يفضية الشكل مقطوعة الرأس
والمقرب . قشورها ال الخضار الاصفر تملو عند الادلاك
مشفة حرارة . وهي مستقلة السداثر الشاككة . شوكها
كثيف التجميع شديد أصلاية والفة . لبها سكري الطعم
مرصوف الزور ، يقال انه لا يخلو من يفس المناسبر
الندانية المفيدة وثنها الحامض التسريفي الجزيل النفع .
يميش في جميع الارربة من البردية القاحلة الى الحسية
الندنية . يتكاثر بفرس ألواحها او بمزج منها .

١٦٠٥١ - صَبَّار مَعْنَن *Opuntia tunicata* (S).

Raquette à tunique (F).
يزرع للزينة . غليه يملو نحو ٣٠ سم. ساقه وقرمها
اسطوانية ، مراساة ، قليلة التبطيط ، تطلو نحو ٥ سم.
الواسه صفرة القد ، بحرية اللون . سداثر حشلية ميمرة ،
حاتها قوية تيلة اللون تطلو نحو ٤ سم . || ازهارها ال
الخضار الاصفر الزلامي الماوج .

١٦٠٣٣ - صَبَّارِي الحِسَاب *Décompte* (F).

Deduction, Allowance (E).
هو تين رصية الحساب المطلوب .

١٦٠٣٤ - صَبَّور *Epierrour* (F). *Clempur* (E).

الصابور هو المند آلة تقطع الحجارة من الارض ويجمعها .

١٦٠٣٥ - صَبَّورَة *Fosse cérébelleuse* (F).

Cerebellar fossa (E).
الصانورة : بلمان التصف لتصرف على الدماغ .

١٦٠٣٦ - صَبَّ *صال*

الصال : الحار الوحشي الحاد الصوت ، ج. صالة .

١٦٠٣٧ - صَبَّغ ، لَصَّي *Gommeux* (F).

Gummosus (E).
ما كان معني المادة او ما كانت تملو مادة صمغية .

١٦٠٣٨ - صَبَّيل ، صَبَّيل *Sec, Desséché* (F).

Dry, Withered (E).
١٦٠٣٩ - صَبَّور

هو الشبان ، لبث شاكك من التنبهات ، اطلبه .

١٦٠٤٠ - صَبَّورَة *هي لئن* ، اطلبه .

١٦٠٤١ - صَبَّ *Vent de l'Est* (F). *Easterly wind* (E).

هي الريح الشرقية ميمها من مطلع قمرها الى بسات نش .
يقابلها المديور .

١٦٠٤٢ - صَبَّور *هو التمر الحسي* ، اطلبه .

١٦٠٤٣ - صَبَّار *Opuntia* (S). *Raquette, Oponos* (F).

جنس نباتات حسية من فصيلة الصباريات . ازهارها عديدة
مظنها بري وبسها زرامي وزربي . يميز بسكه
وفره المركبة من عدة ألواح متشابهة وتنسجة ، يفضية
الشكل ، صمكة التصل ، بحرية اللون تطلو يفس السداثر
الشاككة الانطالية الاكثر . هذه الالواح تظهر وتند
مبطلة ، مادمة الصلابة ، فزيرة المادة الكروية ثم تتصلب
وتشده ألوانها مع كر الزين تصمد وتندرف نحو الشكل
الاسطواني || ازهارها كبيرة القد ، زاهية الالوان المختلفة .
ثماره متباعدة الاحجام ، شاككة القشور ، لذرة اللب ، كيفية
البور الهلينة الشكل ، الصغيرة القد ، الشديدة الصلابة
والسرة || احرف ألواحها واشهرها ما يبع .

١٦٠٤٤ - صَبَّار الصَّرُوع *هو القرصية* ، اطلبه .

١٦٠٤٥ - صَبَّار المَنَد * ، صَبَّار حَنَدِي ، يين

المَنَد *Opuntia ficus indica* (S).

Raquette des indes, Figuler d'Inde, Nojral (F). *Indian*
fig, Prickly-pear (E). *Indischer Felgenkaktus* (D).

Fico d'India, Fichidindia, Pero pungente (I).
نبات سبروتي شائع الاستعمال . مأكول الثمار . غليه يملو

من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. ألواحها الحولية يفضية الشكل

تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتندرف من ٢٠ الى ٢٥ ،

نصلها بحري الخضار يسلك نحو ٤ سم. سداثر ميمرة

يبدون انتظام ، شوكها خيل مستط || ازهارها كبيرة القد ،

صفراء اللون . ثماره كتال الصير الا انها اقل استدارة

وشوكا . لبها سكري الطعم مستحب للملق ، زبورها

كيفية التجميع ، سمراء اللون || زواحه شائمة الاستعمال .

ألواحها الحولية مطنية تأكلها الابل والبقار ويربون عليها

نوع من الكوكشيل قريزي الخضاب .



صبار المند



صبار قنددي



صبار معروف

صنير القند ، جبل الازهار المتتابعة الثلاث المرجانية اللون . لا ينشئ سوى كثرة الازوت والرطوبة المستحكة .

١٦٠٦٦ - صَبْرَيْن هو القشاق الخزني ، اطبله .

١٦٠٦٧ - صَبْرَيْن * Saprinus (S). Saprina (F).
جلس حشرات مفترسة من فصيلة الحسريات . انزاهه للمعرفة نحو ٣٠٠ جميعا صنيرة القند بنسبة الشكل طويلا براوح من ٣ الى ٧ م . انزاهها مختلفة الالوان منها الاسود المنقط بالاحمر ومنها الازرق الاخضر اللؤلؤ ومنها الاخضر الالس الاسفل اللؤلؤ || ريقاتها وانجحة وقائمة .

١٦٠٦٨ - صَبْرَاء

نبات قريب القنب من البام ، ابيض الثمر ، يألف الرمال وتألفه الطلح .

١٦٠٦٩ - صَبْرَج * Sepiols (S).
Sépiola (F). Sépiola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الازيل ثنائيات الخياشيم ، حشرات الجرامز بقسوة الصبريات . انزاهه المعرفة قليلة العدد اصطلها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها فيه اسطوانية لشكل مستديرة الاطراف . زمامها غليظة مستديرة . جوامعها حافسة ، عادية الهامج ، منها ثمانية متساوية الطول ولثنتان مستطيلتان || اشهر انزاهه الصبورج المبلول (Sepiola vulgaris) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . لحمه مأكلي جيد الصنف .

١٦٠٧٠ - صَبْرَجِيَّات * Sapidées (S).
Sapidées (F). Sapidées (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الازيل ، ثنائيات الخياشيم ، حشرات الجرامز || اجسامها صغيرة القند جرابية الشكل او اسطوانية . اجناسها المعرفة اربعة اشهرها الصبورج الذي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اما الاجناس الاخرى فاصطلها بحار المناطق الشمالية .

١٦٠٧١ - صَبْرُوكَة Barilus (S).
جلس امسك ثورية من الشبايط . انزاهها المعرفة ٧ جميعا من امسك المناطق الحارة وفي منطقة القند او صغيرة . اشهرها صورة الازدن المعرفة بالاشرى وصبروك التيل وصبروك القرات .

١٦٠٧٢ - صَبْرُوكَة ، تَجْع ، تَجْرُ Dabit (F).
Gaueing (E).

كبة الماء المنقعة التي تلصق من بحر وبيع وقتة وتقطط وفيها في ثائرة او دقيقة او ساحة .

١٦٠٧٣ - صَبْرُوكَة هو الحجار ، اطبله .

١٦٠٧٤ - صَبْرُوكَة ، صَبْرُوكَة Curneio
نوع من الثورم الكثيفة التسجع الباقية للترابكة المستديرة الاطراف المتوسطة الارتفاع القزيرة الطول .

١٦٠٧٥ - صَبْرُوكَة هو الصبار المروث ، اطبله .

١٦٠٧٦ - صَبْرُوكَة Figue de Barbario (F).
Barbary fig (E).

ثمرة الصبير المأكولة .

١٦٠٧٧ - صَبْرُوكَة Pétrographie (F).

هي علم الصخور .

١٦٠٥٢ - صَبْرُوكَة كوكبي هو القليلوكاكبيوس ، اطبله .

١٦٠٥٣ - صَبْرُوكَة اسم شائع الاستعمال يطلق على الصبار والالوة والقمرة .

١٦٠٥٤ - صَبْرُوكَات Cactosae (S).
Cactosae (F). Cactosae (E).

ومنهم من قال شوكرات . فصيلة نباتية من ذوات الثقلتين مستقلة العائلات منخفضة اللبش || اجناسها ١٣ تشمل زهاء ٢٠٠٠ نوع ، مهددا البلاد الحارة ، معظمها امريكي المكتش .

١٦٠٥٥ - صَبْرُوكَة Colorant (F). Colouring (E).

كل مادة ملونة تستعمل في التذهيب .

١٦٠٥٦ - صَبْرُوكَة Nutation (F). Nutation (E).

الصنب ، فلنكيا ، اتبال المصروط في قطب الارض . دورته الكاملة في الحداد الشمسي تستغرق نحو ١٨ سنة و٧ اشهر || والصنب ، نباتيا ، الانحراف الظاهر الذي يطرأ على اوراق بعض النباتات او ازهارها في اوقات معينة من التهار او في ظروف خاصة من الاشعاع .

١٦٠٥٧ - صَبْرُوكَة Proclivité (F). Slope, incline (E).

الصنب حالة التي المنتشر او المائل الى الامام .

١٦٠٥٨ - صَبْرُوكَة Troupes de 20 à 40 bêtes (F).

قطع من القاء والرمز ما بين العشرين الى الاربعين .

١٦٠٥٩ - صَبْرُوكَة هو الآلة ، اطبله .

١٦٠٦٠ - صَبْرُوكَة Diète (F). Diet (E).

هو احتساب البنية بلا علف بعض الوقت في سبيل صحتها والصبر هو الجهد ، اطبله .

١٦٠٦١ - صَبْرُوكَة ، كَدَى لَفْطِي ، كَلْج Givre (F). Mon-froid, Rime (E).

طبقة غليظة من الجليد تتكون في سمس الاجسام الصلبة بتجمد قطرات ماء الصقيع .

١٦٠٦٢ - صَبْرُوكَة Sabéra (F).

هو الجلمل الغليظ ، اطبله .

١٦٠٦٣ - صَبْرُوكَة ، كَاكَبُوس Cactus (S). Cactus, Cactier (F). Cactus, Torch thistle (E). Kaktus (D). Cacto (I).

جلس نباتات لحية برية ونبوتية من فصيلة الصباريات . انزاهه مدينة مهددا البلاد الحارة . معظمها صنير القند ، ثنائيات النصل || تزوح في المراكز والمصارى . مجموعاتها نفيسة غالية الثمن يقوم بها بعض المواة .

١٦٠٦٤ - صَبْرُوكَة القُرْمُز * Cactus coccinellifera (S). Cactus à cochenille (F).
Cochineal bearing opuntia (E). Nopal (D). Cacto de cochenille, Nopal del giardino (I).

نوع من الصبيرة الزراعية الصناعية منتبها البلاد الحارة . زرعونها ويربون عليها دودة القزير الصبغية .

١٦٠٦٥ - صَبْرُوكَة الرَمْجَان * Epiphyllum truncatum (S). Epiphyll (F). Christmas cactus, Wintercactus (E). Blattsaktus (D). Epifilio (I).

نوع من الصبيرة وهو نبات تزئيني ، مركبي ، مصر ،



صبرة القزير



صبرة المرجان



صبرين



صبرج

Surface de la terre (F).

١٦٠٧٣ - صحيف

هو الأديم ، الظله .

١٦٠٧٨ - صَئَع هو سحر الجش ، الظله .

Roche dure (F). Tough rock (E). صَئَمَة

الصخرة والصنعية هي الصخرة الصلبة .

Sueur (F). Sweat (E). سَعَر

هو عرق الجسم وفي التنفيس عرق الخيل ويل حياها .

Santé (F). Health (E). سَئَمَة

حالة الجسم السليم من المرض .

Validité (F). Validity (E). صَئَمَة الْعَدَد

هي إن لا يكون مشوياً بسبب من اسباب البطلان .

Désert (F). Desert, Waste (E). سَحَرَاء

سهول ترابية الاطراف شاسعة المدى تتميز بمخلفات مناخها وبالندام الحلية النباتية والحيوانية فيها إلا في بعض الواحات والوادي حيث تنضج وتسيل بعض بعض العيون .

Désertique (F). سَحَرَوِيَّ

Pertaining to (E).

لمت تعريفه يطلق كل ما هو يخص بالصحراء كقولك نبوت صحراوي ومناطق صحراوية .

١٦٠٨٥ - صَحْب ، صَحْبُ الْمَتَاع

Sphagnum (S). Sphagne (F). Bog moss, Gold beech Tarfmoor (D). Sphagno, Muschio di palude (I).

جنس لحباب من فصيلة الصمليات تعيش في المناطق والمياه الرطبة الصافية . انواعه قليلة العدد . سطحها غنية تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . فروجها دقيقة متباعدة رطبة متقلبة الانتعاش تكسوها اوراق حرشلية مدهية مرصعة .

١٦٠٨٦ - صَحْبِيَّات ، صَحْبِيَّات

Sphagnaceae (S). Sphagnaceae (F). Sphagnaceae (E). فصيلة نباتية من الحباب اجناسها والوانها قليلة العدد جميعها اشباب ممررة متجمعة تكثر في القرب وتند باضائها المنسلعة .

١٦٠٨٧ - صَحْمَاء

الصماء بقلة (السان) .

Jaune terne (F). صَحْمَاء

١٦٠٨٨ - صَحْمِيَّات

Leptotrichaceae (S). Leptotrichaceae (F). Leptotrichaceae (E).

فصيلة من البكتريات تتميز بكتلها الاسطوانية المستطيل . خلاياها مغلقة ، وسية الانحاء ، عمودية الانقسام . اجناسها وانواعها عديدة لكن علاقتها بالاقتصاد الزراعي لا تتجاوز بعض الاضرار النباتية .

١٦٠٩٠ - صَحْن

Sole هي الصفيحة القرنية الباطنية السفلى من الحافر عند الخيل والبقال والحير .

١٦٠٩١ - صَحْنُ الْحَرَكَةِ

Cavité coxale (F). Coxal cavity (E). هو موضع اتصال الحرقفة بالخدو .

١٦٠٩٢ - صَحْنَاء ، صَحْنَاء

Tympan (F). Tympanum, Ear-drum (E).

تجويف الاذن حيث نصب وبتر الغشاء الغتان المعروف بالغشاء الطبل .

Placuna (S).

١٦٠٩٤ - صَحْنِيَّة

Placuna (F). Placuna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيصيات الخياشيم ونضلية الحاربات . انواعها المأمرة المعروفة خمسة ، اصلها تمتد من شابلو الخليج العربي الى الهند فالصين || لصدافها كبيرة لانظمة الشكل ، لاقامية المصارع ، مساربها ثلاثة الاضلاع ، ورقية الاصداف الشبه شفافة ، نغولية الغشاء الداخلي || اصفاها شائعة الاستعمال الصناعي .

Feuillet foncier (F). صَحْنِيَّة عَقَارِيَّة

Landed leaf (E). شهادة يحررها امين المكتب العقاري موثقاً فيها كل ما له علاقة بقطر معين كالساحة والحديد والمشتلات والارتفاع والهيمن والبرن .

Lamellée, Lamellaire (F). صَحْنِيَّة

Lamellar, Scaly (E). شكل من الزباني ينتهي بفواصل صمغية رقيقة مستطيلة .

Bombycilla (S). صَحَّاد

Jaseur (F). Waxwing (E).

جنس طير من فصيلة الصغاديات ورقية الجوانم غروريات المتانير . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها متوسطة القد ، ريمية الجسم . مثالها قصيرة غرورية الشكل ، مستنة الانك العاليا ، غائسة السيل . اجنسها ذلقة . اذانها متوسطة الطول ، مقلوبة . اصباها قوية . رؤوسها متوجة بفرس من القريش التام المتسرل الى القرد || افهر انواعه الصغاد الاروبي والاسيوي والامريكي .

١٦٠٩٨ - صَحَّاد اُورَبي

Bombycilla garrula (S). Jaseur d'Europe, J. de Bohême (F). European Waxwing (E).

نوع من الصغاد . موطنه يشمل جميع مناطق اوروبا المعتدلة الحارة وبعض مناطق الشرق الاطل || جسمه ريع القامة يطول نحو ٢٧ سم . ثوبه الى الريدة الصمانية تقيع عنه الظهر والجيشن وقشر عند البطن . ذوره وجهته الى السرة السوداء . جناحه اسود اللون يجمع بالابيض والاصفر والاجر . ذنبه اسود اللون ، اصفر الطرف المنطوم || وهو من الصغاد التي تهجر البلاد في طلب الرزق والمصيف والشتى . يألّف الغابات والكرود . قوته الحشرات على اعتلات انواعها واصلاتها وكثيرا الهامة ومنها الحب || يدن حقه في الاشجار الدائسة على ارتفاع قليل لا يتجاوز عشرة اقدام من سطح الارض . الاثنى قطع من ٦ الى ٧ يلمات تحسبها بملوبة الذكر نحو ١٤ يوما .

١٦٠٩٩ - صَحَّادِيَّات

Bombycillidae (S). Bombycillidae (F). Bombycillidae (E).

فصيلة طير من الجوانم غروريات المتانير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها يمتد من البلاد الاسيوية الى الاوربية والامريكية || تتميز باجسامها الربعة وبطريها المسترسلة الى القردا ويتناقصها الغرورية المستنة الانك العاليا || افهر اجناسها الصغاد .



صحب



صحيفة



صَحَّاد اُورَبي

١٦١٠٠ - صَفَاةٌ

Lithogénésie (F).

Lithogenesis (E).

١٦١١٠ - صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ
هو شقران قرع من الفطور الجهرية الشقرانية التي
تركب الزروع .

الصفاة علم يبحث في العال وللوجبات التي هيئت على
تكوين الصخور .

١٦١١١ - صَفَاةٌ

Chant des oiseaux, Gazouillement (F). Chirping,
Warbling, Tittering (E).

صوت الطائر . صبح الطائر : صبح وفرد وتفرق .

١٦١٠١ - صَفَاةٌ : الصوت : صوت الماء والصدر .

١٦١٠٢ - صَفَاةٌ

Roche (F). Rock (E).

كتلة خضراء وسيدة اللؤل من الحجر . والصخر في العرف
البدي يطلق على كل مادة صلبة تدخل في تكوين التلالف
الأرضي . أما في العرف الجيولوجي أي الحسلي الذي لا
يتميز الصلابة شرطاً لازماً ، فالصخر يطلق على الرو
والحجر الجيري والزلزل والصلصالي || وقد تقسم الصخور
حسبياً ونسبة إلى تكوينها الطبيعي إلى ثلاثة أقسام :
(١) الصخور النارية وهي الأصلية أو المتبلورة التي
تكونت من مواد معدنية منصهرة تصلبت بالبرودة كالصخر
(البرلت).

(٢) الصخور الرسوبية وهي الثانوية التي نتجت من تراكم
وتماسك فالت ذرات الصخور الأصلية مع مختلف المواد
الحيوانية والنباتية كالحجارة الجسية .

(٣) الصخور المتحولة وهي التي كانت في أول أسرها
أما نارية أو رسوبية ثم تحولت بتأثير عوامل طبيعية خاصة
إلى حالة بيئة جديدة كالرنيام .

١٦١٠٣ - صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ

Rocher (F).

Steep, Crag (E).

كتلة من الصخر . ج صخر وصخور وصفا وصفوات .

١٦١٠٤ - صَفَاةٌ

Pétroux (F).

Stonelike, Petrosal (E).

لنت تعريفي يطلق على ما هو من الصخور أو يشبهها .

١٦١٠٥ - صَفَاةٌ

Empetraceae (S).

Empetraceae (F). Empetraceae (E).

نصلية نباتية من فوات الملقنتين، اجناسها ثلاثة وأزواها
خمس . لباتها جنات وأشباب مصرة . تثبت بين الصخور
وفي الأماكن القاحلة .

١٦١٠٦ - صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ

Empetrum nigrum (S). Empetrum, Camarine, Cam-
rigne (F). Crowberry, Black-berryed heath (E). Echta
krahensbeera, Ranchbeere (D). Empetro.

Erica bacclifera ners (I).

بجلة برية طيبة مبررة وسيدة الجلس والنوع من نصلية
الصخريات ، منها جبال البلاد المنطلة المنرفة نحو
البرد . ماها منتسبة تلوح نحو ٣٠ سم . أزواها أبيضه ،
غنية ، صغيرة القد ، نسيقة تفصل || أزواها حمر
اللون . ثمارها مأكولة لوردة الشكل ، عاقبة السوداء ،
حازمة القلم ، مضادة لداء الحفر ، قدر البيل وتضع
في علاج بعض الحيات .

١٦١٠٧ - صَفَاةٌ

Brûler (poile) (F).

Roches-mères (F).

Basic-rocks (E).

١٦١٠٨ - صَفَاةٌ

في الصخور الأساسية الأولى .

١٦١٠٩ - صَفَاةٌ

Rouille (F). Ruz (E).

مادة ميكروية القرات جزوية اللون حمراء المالح تتكون

على سطح الحديد من حمراء تعرض لطرية الهواء حيث

يتمد الأكسجين ولأد مع الحديد .



صَفَاةٌ

١٦١١٢ - صَفَاةٌ

Bee-fins (F). Warblers (E).

وتسمى الطيور الصفاة . طيور مفيدة من الجائيم وفضيلة
الغنليات .

١٦١١٣ - صَفَاةٌ

Luscinole à moustaches (F).

طائر من الجوازج يلقى لهذكة ، الحلبا .

١٦١١٤ - صَفَاةٌ

Total

هو الزنقة ، الحلبا . ج صفاة .

١٦١١٥ - صَفَاةٌ

Proletariat (F).

Proletariate, Proletarianism (E).

حالة الذين لا يستطيعون الايزال إلا ببساطة علمهم .

١٦١١٦ - صَفَاةٌ

شجرة ثمرتها أشد حرة من العنب . (اللسان) .

١٦١١٧ - صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ

Potrira, Thorax (F). Chest, Thorax (E).

جزء من الهيكل العظمي يحضن القلب والرئتان يقع بين
المتن وعضل الصدر . وهو تقص عظمي غروبي الشكل
يتكون من عدة خلوع مقوسة متحدة الأطراف .

١٦١١٨ - صَفَاةٌ

الصدر نجم ثير من كوكبة الدجاجة .

١٦١١٩ - صَفَاةٌ

Céphalothorax (F).

Cephalothorax (E).

الصدراس إتمام الصدر بالرأس في جز واحد كما هي الحال
عند بعض اليرويات كالمتاكب .

١٦١٢٠ - صَفَاةٌ

Pectoral

لنت رسمي يطلق على كل ما له صلة بصدر الحيوان .

١٦١٢١ - صَفَاةٌ

Faïlle (F). Fausta (E).

١٦١٢٢ - صَفَاةٌ

Tempe (F). Temple (E).

ما هو من الرأس ما بين العينين ولأذن وهما صفاة .

١٦١٢٣ - صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ

Coquillage, Mollusque testacé (F). Shell-fish, Tes-
tacaeus mollusc (E).

حيوانات في البحر من القشريات الحشرية . ج أصداف
وأصداف .

١٦١٢٤ - صَفَاةٌ

Conque, Coquille (F).

Conch, Shell (E).

ج صفاة . خطاء ضوي ثلاثي الحليقات صلب للمادة
يلطف أجسام بعض الرغويات . داته مركبة من كرويات
الكليوم ، أما طبقات الثلاث تصرف بالتحاريرية المزرققة



صَفَاةٌ

الجزر فيضمه ويؤذي || مظهره الخارجي يثور صغيرة مستديرة متناهية مَرَامَة حلالية التجميع تقريبا اللون ثم تنصرف نحو الجلود تركب السوق والأوراق والمُلائق القزمية || يكالغ بتطهير التربة ويحيد القُبار ويهتانب تكرار الزراعة في الحق نفسه .

١٦١٣٥ - صَدَنِيَّة الجِرَانِيوم

Uromyces geranii (S). Rouille du géranium (F).
فطر مجهري يصيب أوراق الجِرَانِيوم فيضها . مظهره الخارجي يقع صغيرة قليلة الاستدارة والكثافة تركب الأوراق، لونها ال الفقرة الباقية ويلجوا حواج آخر يشو الأوراق بتفجير بشره نصلها ثم يقودها ال القليل . يكالغ بانتزاع الشتل الموصية ويظهر التربة بالكلس والكبريت بمعدل ١ ال ٢ .

١٦١٣٦ - صَدَنِيَّة الرُّمَاحِ

Uromyces rumicis (S). Rouille des rumex (F).
فطر مجهري يصيب أوراق الرُّمَاحِ فيضها ويجعلها غير صالحة للاستعمال || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة لثوب حلالية اللون ثم تنصرف نحو الكسنتالي تركب لثوب الأوراق حل صفحتها || أضراره قائمة على مدى انتشاره لان الأوراق الموصية لا قيمة لها || يكالغ حين ظهوره بسائل بورديو الحلبي ١ % .

١٦١٣٧ - صَدَنِيَّة الحِمَصِ

Uromyces pisi, Aecidium euphorbiae (S). Rouille du pois (F).
فطر مجهري يصيب الحمص والبريين || مظهره الخارجي على الحمص يقع صغيرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفته السفل . تبدو صفراء اللون ثم تنصرف نحو المحطلي فالاحمر ويفرغ منها اذ ذلك رائحة كريهة يمتصها الفجار البشرة ظليل التسج والكلس يسقط الأوراق . وهو حل القريبين يقع صغيرة ميمرة بدون انتظام تركب الاذنان تقصب لها الارام والشملة مع قصر الأوراق وصاكة النصل . وهو حل الأوراق اوضح شكلا واكثر توشيحاً . يركب النصل حل صفحته وقد يفضل العليا . يفرغ منه عند كمال دوره الحياتية ، اي عند تفجير الجيوب الباقية ، رائحة حلوية مستحبة لا تتصلح الحمص وان حصرت فسمت والفطيلت الى كرية || يكالغ بالكلس القوية وبسددها مع الاكثار من عصير الازوت .

١٦١٣٨ - صَدَنِيَّة الدَّكْشِيل

Uromyces dactylidis (S). Rouille du dactyle (F).
فطر مجهري يصيب جميع أنواع وضروب الدكشيل فيلوي الأوراق ويميتها || مظهره الخارجي يثور صغيرة مستديرة لونها الى المفرة ميمرة بدون انتظام او مرصوفة يتنازع وتناسق . نصل ثوب الأوراق تقصب يدها بعد اضملاخ غصبي . يكالغ بالقتاح النباتات الموصية ويظهر التربة قبل اعادة بلوها او غرسها .

١٦١٣٩ - صَدَنِيَّة الشَّوْكَر

Uromyces betae, Aecidium betae (S). Rouille de la betterave (F).
فطر مجهري فسيح الشيع يركب أوراق الشوكر فيلويها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة تحمل بالاوراق السفل وتنتشر حل صفته النصل السفل ميمرة بدون انتظام . لونها الى الجلود || أضراره قليلة لانها محصورة بتفجير وبذيل الأوراق السفل التي تضال نشاطها الحيوي .

والنصل الاساسية ثم الداخلية الصدفية البراقة المساء . والصدفات حل لويين : الصدفات ذات المصراعين كما في الحار وي فيضية الشكل ، مربوية المصراع ، رباطها شفروري التكون ، يلفف حوضاً مملأً يضي القليل وظيفته اقترار المادة الصدفية || والنوع الثاني يشمل الصدفات الحلزونية التي تتميز بظلوها واعادها المتنازلة المروية بتطوط واغاييد التو .

١٦١٣٥ - صَدَنِيَّ

Ostracod (F). *Oysterous* (E).
نمت تعريفي يطلق حل ما هو صدفى التركيب او الشكل .

١٦١٣٦ - صَدَنِيَّ الجِلْد

Ostracoderme (F).
نمت تعريفي يطلق حل كل حيوان جلده صدفى المادة .

١٦١٣٧ - صَدَنِيَّات

Ostracodes
رتبة من القشريات الحشرات الصف .

١٦١٣٨ - صَدَنِيَّات الجِلْدُود

Ostracodermes (F).
فئة من الاسماك المتحجرة ظهرت في الحقبة السيلورية وانقرضت في الحقبة الكربونية .

١٦١٣٩ - صَدُونِيَّة

Impénétrabilité (F).
مجم قابلة للتدخل .

١٦١٤٠ - صَدُونُ، شَدُونُ، كَتَمُ

Crevasse (F). *Chape* (E).
مواضع وشواطئ تحصل في جلد اسراخ الغراب والبري وفي جلد سوق الثبات تقصب تصداعها وتشققتها .

١٦١٤١ - صَدَنِيَّة

Uromyces
جنس تطور مجهريه من فصيلة السحابيات يتميز بدهاناته الوحيدة الحالية || انواعه عديدة تركب النباتات المختلفة المائلة الى القزليات والقزليات والشمليات والسرقيات والزبقيات والبسبابيات والسمليات .

١٦١٤٢ - صَدَنِيَّة الإِسْكِيل

Uromyces scillarum (S). Rouille des scilles (F).
فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الزنبقية اصحاب الاشقل والمحلل || مظهره الخارجي طلع قدية لا قياسية الشكل والحجم ، تلو الأوراق والانسلاط الخارجية . تبدو حلوية ثم تنصرف نحو الجلود وتضي بالمره عند انفجار بشره التسج || يكالغ بتطهير التربة بالكبريت والكلس او القرموط بعد القلاع وسرق النباتات الموصية .

١٦١٤٣ - صَدَنِيَّة الرُّوم

Uromyces ambiguus (S). Rouille de l'ail (F).
فطر مجهري يصيب الرُّوم بلوراته وزناده الزمري . مظهره الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم ، تركب الأوراق تظلوها بعد ان تقضي حل الحصبي فيصبح النصل حاد اللون || وهو حل الزناد يقع قربية كسفائية يحيطها اطار ، تقلم غصبي ، لونه كالتين . يستحسن اجتناب تكرار الزراعة في ذات المكان المويرة .

١٦١٤٤ - صَدَنِيَّة الحَمَزَر

Uromyces lincolns, U. scirpi (S). Rouille de la carotte (F).
فطر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الحسية اصحابها



صدنية الاشقل



صدنية الثوم



صدنية الجزر



صدنية الجيرانيم



صدنية الحامض



صدنية الحمص



صدنية الشوكر



صدية الفول



صدية القرنفل



صدية القرنبات



صدية الربو



صدية الموز



صدية النفل



صدية

١٦١٤٥ - صدِيكَةُ المَوْزِ *
Uromyces musae (S.)
Rouille du bananier (F).
نظر مجهري يصيب الموز في أفراته || مظهره الخارجي
يظهر حسمية الشكل والحجم، تركب النسل حل صفته
السفل. تبدو حسمية اللون ثم تتصرف نحو الجوزة السوداء.
أضراره زرة لا تستجيب للحفنة.

١٦١٤٦ - صدِيكَةُ الفُصْلِ *
Uromyces trifolii, Ascidium trifolii-repentis (S).
Rouille des trèfles (F).
نظر مجهري يركب جميع أنواع التفل الرطبي والبري.
مظهره الخارجي يقع حسمية قليلة ممتدة على صفته النسل
العليا. تبدو صفراء اللون ثم تتصرف نحو البني الكستالي.
وهو وسم لا يستجيب للحفنة لانه يسلط النبات حل
النمو وازدياد المحصول الورقي ولكنه يذو نسبة الكروتين
نحو ٢٠٪ مما يؤدي الى انخفاض حيق القيتامين ٥٠٪.

١٦١٤٧ - صدِيكُ *
Echo (F). Echo (E).
الصدى كوكب مرصفي سيار اكشفه وفريون * عام
١٨٦٠.

١٦١٤٨ - صدِيكُ *
Echo
هو الصوت الناتج من انعكاس صوت اصل حل سطح
عاكس.

١٦١٤٩ - صدِيكُ *
جاء في تحديدها : سمكة طويلة سواد (السان).

١٦١٥٠ - صدِيكُ *، أم السهر، أم قوتق
Achna noctua, Carice noctua (S), Charvêche, Char-
vêche commune (F), Litsea owl (E).

طائر من البويات وممرات الغناديات. روج الوجة صفراء.
طول نحو ٢٣ سم. منزه قوي الانقاف، حاد البعرة.
سقطه وذنيه صغيرة مستديرة. أرساغه كاسية، غشاه
مدنية حادة، ثوبه الى الريدة المنشة بالارد || موك
فسح الاربعه يسم جميع البلاد المحتلة الحارة. يالاف
الاجراع ويشت في منوع الاثمار الصويتانة وفي الغراب
والاقلاد. اثناء قطع نحو ه يضايت تحسبها ١٦
الى ١٨ يومًا || وهو من الرواس يلمس كوك من
القروب الى الفجر، يصيد الحرد والكار والزباب والجلان
والجراد.

١٦١٥١ - صدِيكُ *
Senie (F), Sanies (E).
هو قيق الفروح والجيف الباردة الى الاخذل المصوي.

١٦١٥٢ - صدِيكُ *
حليب وضع فريد نكهة البولية وهي القشرة الرقيقة حل
ويجبه.

١٦١٥٣ - صدِيكُ، قَلِيح *
Gailh (F). Frost-delt (E).
نمت حال توصف به الاشياء القليلة أو القابلة للانصاع
والقلع من تأثير فعل المصقق قها.

١٦١٥٤ - صدِيكَةُ *
Pissurella (S). Pissurella (F), Pissurella (E).
جنس حيوانات بحرية من الغرويات مديات الاصيل
امليات الهياكل المحيطية وعلية الصدفيات. أنواعها

يكتفح بقطع وطر الاوراق الصابة وباحتجاب اخل
لبلار من الامهات الموصية.

١٦١٤٠ - صدِيكَةُ الْفُسْتَقِ *
Rouille du pistachier
وهم فطري يحترق الفستق (اطلب ايرويس).

١٦١٤١ - صدِيكَةُ الفُولِ *
Uromyces fabae, Ascidium album (S). Rouille de
la fève (F).
نظر مجهري يصيب عدة نباتات من الفصيلة القرنية،
انحصها الفول ونها البقية والجلان والبقية والكزسة.
مظهره الخارجي يقع صفرة مستديرة ممتدة حل صفته
النصل السفلى تبدو صفراء اللون ثم تتصرف نحو القشرة
السراء، وقد يصيب السرق والمالين نبات الفولان.
يكتفح عند ظهوره اما باستعمال سائل يورود الحليل ١٪
او غيره من الفوطان الفعالة اللاكوية.

١٦١٤٢ - صدِيكَةُ القَرْنَفَلِ *
Uromyces caryophyllinus (S). Rouille de l'aillet (F).
نظر مجهري يصيب القرنفل في جميع فصائل البسة ليلب
الاوراق ويؤخر النمو ويؤدي الانزهار والازهار.
مظهره الخارجي يقع صفرة بضية الشكل بنية اللون
تركب نصل الاوراق حل صفاتها العليا تقسب تنجيب
بشرة النسيج وتقرنل البعرة النضية ان لم تحل دون انجازها
وبيرها الطليبي.
يكافح اولًا : باحتجاب ريش الماء حل الاوراق لان الماء
يكن نشاط اللطع ويهيب انتشار الوبس.
ثانيًا : بانتزاع يسرق الاوراق للامالة والياينة مس
القولن اللارية.
ثالثًا : بنسح النباتات للصابة بسائل يورود الحليل
١٪ او بسلول بمسمنات البزاس او غيره من املاح النحاس.

١٦١٤٣ - صدِيكَةُ القَرْنَبَاتِ *
Uromyces anachyridis (S). Rouille des légumi-
neuses (F).
نظر مجهري يصيب بعض النباتات القرنية سها القرنية
والقرس والفسة والخنفوق والحلبة والفلوس والامروس.
مظهره الخارجي يقع مستديرة صغيرة تركب نصل الاوراق
حل صفاتها العليا تبدو ممتدة بين انتظام || لونها
الى الشبهه ثم يتصرف تدريجيًا نحو الكستالي || أضراره
زديدة. يكثر ويبدو في بلاد حوض البحر المتوسط وفي
اروبة الشرقية والغربية.

١٦١٤٤ - صدِيكَةُ اللُّوبِيَاءِ *
Uromyces appendiculatus, U. phaseoli, Ascidium
phaseoli (S). Rouille du haricot (F).
نظر مجهري يصيب معظم انواع وضروب اللوبياء.
مظهره الخارجي يقع لا نفاية الشكل والحجم تطور نصل
الاوراق فتوضها برقشة لا متجانسة الكثافة تبدو تلبية
اللون ثم حسمية لسراء، تؤدي الاوراق تقسب جفاتها
وصقرطها الباكر || وهو حل القرون يقع قرنية نطاب
نها الاسداعة تقضي حل الانسبة الليلية دين ان نصل
الى الحب || يربذاته بضية الشكل طولها يراوح من
٢٢ الى ٢٥ مم. عرضها من ٢٠ الى ٢٣ مم. || يكتفح
باستعمال اركيسكلوربر النحاس تفضيًا حل النبات بمد
العصر معفا تحف وطاة اشمه الشمس.

١٦١٦٥ - صِرَاكِي *
Orographique (F).
Orographical (E).
نبت تربي يطلع على ما له علاقة بالصراة أي وصف الجبال.

١٦١٦٦ - صِرَاو
Achète (F).
اسم يطلق على جمع الحشرات الصراصة اخصها الجديد والزيز.

١٦١٦٧ - صِرَاو اللَّيْل هو الجديد ، المطبخ .

١٦١٦٨ - صِرَاوَكَة
Circaetus (S).
Circaète (F). Serpent eagle (E).
جنس طير من عمار السقاوت وفصيلة الصقريات .
أنواعه ١٢ ، موطنها جميع المناطق المعتدلة من العالم القديم .
اجسامها رفيعة متوسطة القتل من ٥٥ الى ٧٠ سم .
ويصلها تراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . ورونها كبيرة ،
اعتناقها قصيرة ، مناسرها قوية البهرة الليرة الحادة .
ارسلها سرحة ، غالبا دقيقة الاطراف الحادة || اثوابها
كدراء اللون يملوها توشم لطيف حاقق ، صدرها وبطونها
الفتح واندى من ظهورها وسوقها || تألف الجبال
والاخراج ويجاري الماء والادخال والبروج والنبات .
الزسلمات من العطاء الى الانثى والصفاوح والاسماك
والصافير والحشرات || كمن اوكارها الى الانجار
والادخال . انثيا تضع من رطبتي الى ثلاث رفقات
تحضنها بنابوة الاكور نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعه
مرارة المتوسط .

١٦١٦٩ - صِرَاوَة الْمُتَوَسِّط * ، أَبُو صَوِي
Circaetus gallicus (S). Circaète Jean-le-Blanc (F).
Short-toed eagle (E).
نوع من الصراة كبيرة الجثة طولها نحو ٧٠ سم . ويصلها
١٨٠ سم . ثوبها الى الربة السماء تعلوها بقعة مائلة .
زورها وبطها وبخونها الى البياض الاخر يملو تهبج
اسمر . منسرها الى الزرقه السوداء . مينها الى الصفرة
اللامعة . رسلها واصابعها تلبية اللون ، غالبا سود .
ويحي من الطور القواطع تجوب البلاد رنحوم فوق الماء .
تألف الجبال والخراج والمناقع ويجاري الماء والسهول
والشواطئ || قريبا الانثى والظاء والصفاوح والاسماك
والصافير .

١٦١٧٠ - صِرَاكِيه *
Sauropodes (F).
Sauropoda (E).
الصراعية رتيبة من الزحافات المنقرضة ، الناصير ،
جميع اجناسها وانواعها جبانة ، وبهاية القوائم ، عايشة ||
ظهورها يمد الى الخفية التراسمية . وقد بلغت ارجع انتشارها
في الحقبة الجوروية . وانتقرضت في الطباقيرية || اشهرها
المرصد الجبلي (Atlantosaurius) الذي كان طول
جسمه لا يقل من ٤٠ مترًا ، ثم الصرد الصخري الرأس
(Brontosaurus) الذي كان طوله من ٢٠ الى ٢٢ مترًا .

١٦١٧١ - صِرَاكَم ، صِرَاكَم
Cueillea (F).
Gathering (E).
هو جنس الثمر في اوان أدراكه .

١٦١٧٢ - صِرَاكَم ، حَكَاك
Serranus (S).
Serran (F). Serranus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات ذرية شاككات

المروفة قليلة العدد . اصطلحنا معجم بحار العالم تيش على
حضور المعاجد || اصطلحنا فيه قيمة الشكل مصنوعة القمة .
وصدورها الى تسع يبرور الماء اللازم للتنفس ، تسع
ايضا بخروج البراز . اجسامها مستطيلة الشكل . ورونها
مقطوعة القمم . مينها تتمركز عند قواعد القوائم الخروطية ||
عيالها مشطية في القسم العلوي . اوريثها ضففاة
تتمتد خارج الاصداف . انبساطها وسيفة مستعرة وميكة .

١٦١٥٥ - صِدْبِيَّات *
Fissurellidae (S).
Fissurellidés (F). Fissurellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاربع
امامات الخياشيم الجحفية . اجناسها وانواعها المروفة
عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والثالثة
والبيض الآخر من صلح بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ||
اصنافها وحيدة المصارع يومية الشوزن او مستعرة ،
معتلة الاصداف ، مصنوعة القطن ، يكثر في صدورها
الشكل المسطلي || اشهر اجناسها المعاصرة الصلمية
والمرجينية .

١٦١٥٦ - صِر *
Empaquetage (F). Packing (E).
جمع الشيء وتلده وتقليده .

١٦١٥٧ - صِر *
Tichodroms (S). Tichodrome (F).
جنس طير من فصيلة المتقلات . انواعه قليلة تتميز
باعتدال المنظر وبهذه ، بذلاقة الجوانح ، بقصر الارباع
وبخفلة صغر الخالب الحادة . ثلوثها عديدة تتخلف مع
الانواع وضل البتة . تألف المناطق الصخرية الجبلية .
ينثر من الانهار . قوته الحشرات والتماكب . يئن حقه
في صرلح المنخور . اناله تحضن وحدها من ٥ الى ٧
بيضات نحو اسبوعين وذلك في شهر ايار . احرف انواعه
واشهرها صر المنخور .

١٦١٥٨ - صِر الصُخُور *
Tichodroma muraria (S). Tichodroma de muralles,
Echelette (F).
نوع من الصر . ثوبه متراكب الالوان المنقطة المنقطة
الجبلية . طولها نحو ١٧ سم . ويصلها ٣٠ || تألف الجبال
الصخرية الجرداء . يكثر في صرد لبنان مشاء الادوية
السبية والمغالب الصخرية .

١٦١٥٩ - صِرَاب
الزعر ينثر في الخريف يه اول مطر .

١٦١٦٠ - صُرَاو
Pur (F). Nez (E).
الحاصل من كل دس او ش . يقال صر صرلح وزيت
زيتون صرلح .

١٦١٦١ - صُرَاو
الصرك طائر يؤكل (صحت المحيط).

١٦١٦٢ - صُرَاكِيه *
هي الدجاجة تجسبل لحظ الحمر .

١٦١٦٣ - صُرَاكَم
سحاب بارد ندي ليس فيه ماء .

١٦١٦٤ - صِرَاكَاك *
Orographie (F).
Orography (E).
علم يبحث في وصف الجبال وتجليتها .



صلبة



صر المنخور



مرارة المتوسط

١٦١٧٨ - صُرَّاب ، صُرَّاب (F).
Lak callé (F).
اللبن الرائب إذا اشعلت حوته .
Curdled milk (E).

١٦١٧٩ - صُرَّاب (F).
Gomme d'acacia, G. rouge (F).
صمغ القزط والطلع والمرفط وي حر كآبها سبالك
تكسر بالمجربة .

١٦١٨٠ - صُرَّابَة هي الثنواء ، انطبا .



صُرَّان كَاتِب

١٦١٨١ - صُرَّابِيَّة ٥
Sorbina
مادة غلاية لا طعم لها تراقق السكر لكنها عادمة للقودور
التسليط . وهي توجد في معظم بلاد المأكولة وسينها تراوح
من ٥ الى ١٢٠ غرام في الكيلو .

١٦١٨٢ - صُرَّابِيَّة ٥
Serjania (S).
Serjania (F). Serjania (E).

جنس جلبات سرية عارضة من فصيلة السابنديات ، أنواعها
المعروفة نحو ١٠٠ منها من لبوت امريكا الاسرائيلي
والبيض الآخر ينبت في جزر المحيط الهادي ويشمل الهند ٥
سطها سرية . اوراقها متعاقبة ، مركبة ثلاثية التجميع .
نصلا مسننة الحوافي ، غائرة السطوح والبرق . انزاعها
ابنيل الازنكاز ، عضوي التجميع . ثمرها جناحية ،
ثلاثية التركيب .

١٦١٨٣ - صُرَّابِيَّة ٥
Bryum (S).
Bryum (F). Bryum (E).

جنس طحالب ممررة من فصيلة الصرغيفيات . أنواعها
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم ٥ تعيش
على الصخور وفي التربة . اكياسها البورية حقة لشكل
طرية الازنكاز .



صُرَّابِيَّة

١٦١٨٤ - صُرَّابِيَّة ٥
Bryocaea (S).
Bryocaea (F). Bryocaea (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبديات .

١٦١٨٥ - صُرَّة ، صُرَّة (F).
Cold (grand) (F).
Cold (extreme) (E).

١٦١٨٦ - صُرَّة ، صُرَّة (E).
Eptar (F).
Cold (extreme) (E).

١٦١٨٧ - صُرَّة ، صُرَّة (F).
Lanius (S).
Pie-grièche, Piegriche (F). Shrike (E).

ج صردان . جنس طير من الطيور وفصيلة الصرديات .
أنواعه ١٨ ، موطنها بلاد الشام القديم . جميعها يقام
الرب . فضة الرأس . منقوشها خفيفة مسنة الخاطم
المردية . سواقلها متصلة الطول مجلعة . اذانها زائجة
الريش . ارسافها جسمية الجلد . غلاية عادة ٥ لا ترى
الا في سفة او فجرة وهي شرسة الطباع ، ثقلة ، شديدة
التنوير . قوتها الحشرات والديدان والافاعي والسنابير .
تتغذى في الاجار الفناء . اناثها تنصع من ٤ الى ٧ بيضات
تحضنها وسعها نحو اسبوعين .



صُرَّة أُرْدِيَّة

١٦١٨٨ - صُرَّة أُرْدِيَّة ٥
Lanius excubitor (S). Pie-grièche gris (grande).
Boisallière (F). Great grey shrike (E).

نوع من الصرد الأبد الشائع . يتر من الطيور الفسارة .
طوله يراوح من ٢٣ الى ٢٤ سم . نوبه الى الغربة الفسلا .

الزنايف . انواعه المعروفة نحو ١٢٠ منها من املاك
بجار المناطق الحارة ٥ اجسامها اعليجية الشكل ، متصلة
القد او صغيرة . اوراقها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر
الاجر الملح يملو تجليج متفرق لاقاسي الانتظام والالوان
سدها مبراشية الشكل ٥ زانفها الظهريه شاذكة في الجزء
الامامي ، سرسة في الجزء الخلفي ٥ بعضها يبر اعوار
الانهار ويبر في المياه العذبة ٥ طويها بين المتوسطة
الصنف والجمدة ٥ اشهر انواعه الصران الكاتب والصران
المبجج .

١٦١٨٩ - صُرَّان جَبَّار ٥
Serran gisant (F).
سمكة بحرية بيوض تدعى لقس جبار ، انطبا .

١٦١٩٠ - صُرَّان كَاتِب ٥ ، حَدَد صُرَّانِكُوف

Serranus scriba (S). Serran écriture, Serran
scribe (F). Serranus scriba (E).
نوع من الصران . سمكة بحرية بيوض . اصطباها
واصولج واعوار البسر الابيض المقطوع ٥ جسمها
اعليجي الشكل ، مستدل التيطيط ، يطول من ٢٥ الى
٣٠ سم . نوبها متراكب الالوان يركز على الاصفر
الحظلي . رأسها وظهريها مجلجان بالاسمر . جانباها مشعان
بالازرق والكتني . زانفها مضروبة بالاجر . رأسها يبرسي
الشكل قصير الخط . شفتها قليل الرطبة . عيناها صغيرتان ٥
زانفها متباعدة الاشكال . الظهريه مسطبة ، شاذكة
النصف الاول ، سرسة النصف الثاني . الشرجية تقابل
الشم السرح من الظهريه . البليدية مقبسة الطرف المنحوب ٥
طويها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٩١ - صُرَّان مَبْجَج ، حَدَد مَبْجَج

Serranus hepatus (S). Serran maculé (F).
Serranus hepatus (E).

سمكة بحرية بيوض من الصران . اصطباها اصولج وظهريها
البسر الابيض المتوسط ٥ جسمها صغير القد ، اعليجي
الشكل ، مستدل التيطيط يطول من ١٨ الى ٢٢ سم . نوبها
يرتكز على الاصفر الاخر الحظلي المواج . رأسها وظهريها
مبججان بالكتني المايق . جانباها مجلجان وبغسلان بالاجر
والازرق . زانفها مشعة وبنيجية ينتظية . رأسها غمريري
الشكل ٥ ذلي الخط . شفتها قليل الرطبة . عيناها كبرتان ٥
زانفها متباعدة الاشكال ٥ كما في الصران الكاتب ٥ طويها
متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٩٢ - صُرَّابِيَّة ٥
Serranidae (S).
Serranidae (F). Serranidae (E).

فصيلة املاك بحرية من رتبة شاذكات الزنايف . اجسامها
وانواعها المعروفة نحو ٥٥٠ جميعها من املاك بجار المناطق
الحارة والمعتدة الحرارة . تتميز بحيدة الصبح وبقلة اصباحها
من المجاهد والمجلجان والاصولج ٥ اجسامها اعليجية
الشكل ، لاقياسها الطول الذي يراوح من ١٥ الى ٢٠٠ سم .
حراشها مبراشية عشة متساكة الاطراف ٥ زانفها
المقبسة سداسية الاشاة المرفجة بالمقتناء شام واحد جامد
شالك . اسنانها الفكوية والحكيمة منتظمة الصفوف المتباعدة ٥
اشهر اجناسها الصران واللاتياس واققس والقياب .

١٦١٩٣ - صُرَّابِيَّة المختلط اذا اصفر .

١٦١٩٧ - صُرَّة
الصُرَّة: الزروع قصبت موه وأكملت مثابه دون حبه .
الواحدة صُرَّة .

١٦١٩٨ - صُرَصَر
هو الديك ، اطلبه .
Coq (F). Cock (E).

١٦١٩٩ - صُرَصَرَكَن *
Scymnus litchi (S).
Liche, Gatta (F).
سمكة بحرية وسيدة الجنس والنوع من السمكيات ، تلوذ
نحو ثلاثة أمتار . جنبها اسطوانية الشكل ، دقيقة المخز ،
كبيرة الزينة الفرجية . ثوبها الى السمرة الزرقاء المولج
يلوحها تجلج اسد . جلجها عادم الفلوس شائع الاستعمال
الصناعي . لحما ماكلي .

١٦٢٠٠ - صُرَصَرَكَة
Crie du milan (F).
Cry of the kite (E).
صوت البازي .

١٦٢٠١ - صُرَصُرُور
حشرة مملوكة تعرف ببلت وردان ، اطلبها . منها
الامريكية والجرمانية والشرقية .

١٦٢٠٢ - صُرَع
Epilepsy (F). Epilepsy (E).
حالة عينية في الجهاز العصبي تصيب الحبل . تعرف
من حصول الليبرية والسقوط على الارض والتشنج في
الحمل .

١٦٢٠٣ - صُرَعَاكَة *
Chrysobothris affinis (S).
Chrysobothris complice (F). Chrysobothris af-
finis (E).

حشرة خاضعة ناهمة من فصيلة الزنبقيات ودية غمديات
الاجنحة . تألف الاجراع والغباط والغباط . خاضعها
تمش على اوراق الاشجار . يرقاتها مرقاة تمش على
الاشجار الحمراء تقربد السماء ولها كسب الشكير
جسمها متوسط القد ، بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها
الى السمرة الكستنية يملوها مزلج اسف . غمداء ثلاثيا
النقر ، خضراء اللون عند الذكر ، صفراء اللون عند
الانثى . رأسها مستد الجرم . عينها كبيرتان ، ناشزتان .
زبانها عيطان ، لمشايها التركيب . فمها شبيه جلوني
الشكل ، ذلق المخز ، مقطوم الطرف . غمداء متابعتا
التحيز الخفيف . ارباعها خاضعة العقل الى الانثى اميز
تدأ من الذكر وأكد ثوباً من والقصر زبناً الى جيلها
ثلاثي الحبل . تظهر الحشرة الجبلانة في اوائل ايار وتعيش
حتى اوائل آب . تروح في التبار ويبيت في الليل الى الريقة
بطيئة النمو تطلي عند الادراك انتم نحو ٣٠ م . جسمها
مستطال المقدم والرأس ، مستدق المخز . ثوبها الى الطلعة .

١٦٢٠٤ - صُرَف ، صُرَفَاك ، صُرَفَاك
Agio, Change (F).
Agio, Premium, Exchange (E).
لقرق بين سر التقد الاسمي وسره المظني .

١٦٢٠٥ - صُرَفَة
الصُرَفَة منزل من منازل القمر الشامية يتزل في الليلة الثانية
حشرة . وهو نجم واحد نير تلقاها الزيرة غماط بكواكب
صغار طمس . وميت سرقة لانصراف الحر والبرد بطولها .
بين العرب من يسمي الصُرَفَة قلب الاسد الى رقيب الصُرَفَة
فرح الدلو المقدم .

ظهور هابق المزلج الاسمر . يلقه الى البياض الاخير . سقطه
الى السمرة الحامكة المحببة الابيض التاسع . ذنبه اسود
الوسط ، ابيض القاعدة والطرف . . بقاره وسقاء سود .
يألف الرياض والاسراج القريبة من المروج والمراعي .

١٦١٨٩ - صُرَدُ الْجَنْبِ *
Lanius meridionalis (S). Pie-grèche méridionale (F).
نوع من الصرد ، موطنه افريقية الشمالية وشمالى المتوسط
طوله نحو ٢٥ سم . ظهره احمى اللون . سقطه الى السمرة .
ذنبه ابيض الاطراف ، اسمر الوسط . صدر وبعده الى
البياض الوردي المزلج . عيناه مكشفتان بالاسود الى يألف
الغابات والخضاب للامساك والشرائط الصخرية .

١٦١٩٠ - صُرَدُ الْمُتَوَسِّط * دَقَنَاش شَكِي
Lanius senator, L. rufus (S). Pie-grèche rousse (F).
Woodchat shrike (E).
نوع من الصرد الجبلان يحرب معظم مناطق العالم القديم .
طوله نحو ١٩ سم . ثوبه ابيض اللون كثير فيه الصبغة .
يألف الادغال والحدايق والمروج . قوته الظاه والمزورغ
والصفاد ويختلف الحشرات الى بين في الجنبات الفتاة
القليلة الارتفاع من الثرة .

١٦١٩١ - صُرَدُ الْغُرَّاء * لُهِس
Lanius collurio (S). Pie-grèche écorcheuse, Pie-grèche
grise (F). Red-backed shrike, Butcher bird (E).
نوع من الصرد الجبلان يحرب أكثر مناطق العالم القديم .
طوله نحو ١٧ سم . ثوبه اسمر اللون يبق عند الظهر
ويبيض عند الزور والصدر . خضراء الى السمرة القائمة .
سقطه الى السمرة الطلعة الخطيئة المزلج . ذنبه ابيض
الاطراف . يألف الاجراج ويجاري الماء والحدايق
والمراعي . وهو شرس الطبع ، ضيق الخلق . قوته الحشرات
على اختلافها والوديات والصافير .

١٦١٩٢ - صُرَدُ وَرْدِي * دَقَنَاش
Lanius minor (S). Pie-grèche à poitrine rose, Pie-
grèche d'Italie (F). Lesser grey shrike (E).
نوع من الصرد الايه ، موطنه يمتد من بلاد فارس الى
اطراف اوروبا الجنوبية . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى
الصبغة الطلعة . رأسه اسود اللون . صدر وردي اللون .
سقطه الى الصبغة الخطيئة الباقية الى يألف الادغال
ويجاري الماء ، قوته الحشرات والوديات .

١٦١٩٣ - صُرَدَاك
Terre meuble (F).
الصرداد والرداد والردادة هي الثرة الية .

١٦١٩٤ - صُرَفَح ، صُرَفَحَة
Terre délaissée (F). Abandoned ground (E).
الارض الزراعية المهملة المتروكة لا تبت لها .

١٦١٩٥ - صُرَفَحِي *
Edaphique (F). Edaphic (E).
المسرب الى الصرصح ، اي الثرة ، باختياره حامد
من حوامل البيئة .

١٦١٩٦ - صُرَدِيَّات
Lanidae (S).
Lanidae (F). Lanidae (E).
فصيلة طيور من الجوائم المشروبات المتناثر . اجنحتها
وانواعها عديدة تتميز بمتناثرها القليلة ، القوة الجباله ،
المعنة الحامل الجباله ، اجنحتها متوسطة القد الى ثوبها
ما تقتضيه من حشرات ووديات وصافير .



صُرَدُ الْجَنْبِ



صُرَدُ الْمُتَوَسِّط



صُرَدُ امِر



صُرَدُ وَرْدِي



صُرَصِرَان



صُرَعَاكَة

روشتا الخلفيان سيقان بالازرق ويغطيان بالبرتقال .
الانثى سمراء اللون ، روشتها الانثى يحمل بقعة غروية
الشكل مقلدة للثعلب . روشتها الخلفي يحمل من نقطتين الى
ثلاث نقط صفراء . ريشته تيش على ورق الزعرور
والخوخ البري .

١٦٢١٤ - صرْمُونُ السَّنْدِيَان * Strymon ilicis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم .
الذكر اصفر نقا من الانثى ثوبه الى السرة الكستنائية المولج .
رواشته مسنجة بالابيض والاحمر . الانثى سوية الثوب
الاسمر المائل تحمل في طرف كل ريشة من روشتها
الخلفيتين نقطة صفراء اللون . ريشته تيش على ورق
السنديان .

١٦٢١٥ - صرْمُونُ السَّنْط * Strymon scabra (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٧ سم .
الذكر
حطلي الثوب المائل للروشن . رواشته زرق الانتقاص
يلوحها تسليح مغزى ابيض وتبين طرني اصعب . الانثى
سمراء اللون كستنية المولج . ريشته تظهر من نيسان الى
ايار تيش على اوراق السنط .

١٦٢١٦ - صرْمُونُ * ، ذكَبُ الذَّب * Saururus (S). Saurura (F). Lizard's tail, Swamp lily (E). Molchschwanz (D). Saurura (I).

جنس نباتات عشبية جملوية مدادة معمرة من فصيلة
الصرويات . انوارها حليلة جديها متعينة سبرية .
سوقها تحيلة حليلة تمل من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
مستطقة ، متعاقبة ، نصلها لثبي الشكل ، متواجده الصفة ،
خلى البشرة . ازهارها غشوية ، سلبية التجميع . ازهارها
يستر من آب الى تشرين .

١٦٢١٧ - صرْمُونُ رَمَادِيَّة * في الوضحة القنار ، الحطاب .

١٦٢١٨ - صرْمُونَات * Saururaceae (S). Saururaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مدادة القتالات . نباتاتها
عشبية معمرة . ازهارها غشوية . ثمارها جرداء غشوة
الاشكال .

١٦٢١٩ - صرْمُونُ * هو الصرب ، راجيه .

١٦٢٢٠ - صرْمُونُ * ، صرْمُونُ * ، صرْمُونُ * ، صرْمُونُ * Pur-pur (F). Thoroughbred (E).

نعت يطلق على كل حيوان اعلى من مملكة صافية التسب
متنوعة .

١٦٢٢١ - صرْمُونُ * Glacé (F). Ice (E).

هو الجليد ، الحطاب .

١٦٢٢٢ - صرْمُونُ * هو الحصاد ، الحطاب .

١٦٢٢٣ - صرْمُونُ * Palmeria (F). Daza-Garden (E).

الحطاب المتجمع من التخل في الربال .

١٦٢٢٤ - صرْمُونُ الجدي ، سَلْطَانُ الجبل * Lonicer (S). Chèvrefeuille (F). Caprifoly (E). Geiss- blatt (D). Caprifoglio, Capriola (I).

جنس نباتات معمرة برية وتربينية من فصيلة الهليانثيات .

١٦٢٢٦ - صرْمُونُ * Sous-variété, Cultivar (F). Subvariety, Cultivar (E).

الصرم ج . اسرام هي افراد من صرْمُونُ واحد تميزت بصفات
معينة خاصة مثالا صرْمُونُ الساتركن ريشه ر .

١٦٢٢٧ - صرْمُونُ * Saurumatum (S). Saurumatum (F). Saurumatum (E).

جنس نباتات عشبية عسقلية معمرة من فصيلة اللقناتيات .
متنبا بعض مناطق البلاد الحارة المعتدة من الهند والافغان
الى خط العرب . اصنافها كثيرة الجرم تطول نحو ١٥ سم .
وتعرض نحو ١٥ سم . ازهارها يستيق الاوراق وله رائحة
كرية . شرافتها بطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وهو ضيق
التصل ، لونه الى الحمرة البضحية المولج . ثمارها اغص
ضبتها غروية الشكل . اوراقها مستطيلة المائلين
التي تطول نحو ٥٠ سم . نصلها قليبة الشكل تطول نحو
٢٥ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . . تزدور لثريين لكنها
تقتضى الموقع البادية . اعرف انواعها وانوارها التالية :

١٦٢٢٨ - صرْمُونُ صرْمُونُ * Saurumatum venosum (S).

نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت .

صافها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحطابية التي
تلعب بالتحسين .

١٦٢٢٩ - صرْمُونُ صرْمُونُ * Saurumatum guttatum (S).

نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

صافها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحطابية التي
تلعب بالتحسين .

١٦٢٢٠ - صرْمُونُ * Strymon (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة اللقناتيات . انواعه عديدة
متنوعة في منظر اطار العالم . ذكورها واناثها غشوة
الالوان . منظر كروي الشكل ، ريشاتها صلبة القد
متنوعة الرؤوس ، مديبة الاطراف . تيش على النباتات
الشجرية . اشهر انواعه ما يلي .

١٦٢٢١ - صرْمُونُ ابيض * Strymon album (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٢ سم . ثوبها
الى السرة السوداء . رواشن الذكر حطلي اللون يلوها
تسليج ابيض مغزى وتبين طرني بمده اطار
اسود وخمس نقط سم . رواشن الانثى سوية اللون الاسمر
الداكن . يالفت الجناح والحدائق والقباب . يصرح
من حزيران الى تموز . ريشته تيش على ورق التندار .

١٦٢٢٢ - صرْمُونُ الخوخ * Strymon pruni (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٤ سم .
حطلي الثوب ، رواشته الى الصفة يلوها تبين وتبين
وتسليج براوح من الابيض الى الاصفر والاحمر والاسمر .
الانثى سوية الثوب الكستني المظلمت الامرار . ريشته
تظهر في ايار تركب اوراق الخوخ .

١٦٢٢٣ - صرْمُونُ الزعرور * Strymon tenebris (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٢ سم .
الذكر
اسمر اللون ، حطلي الرواشن المسنجة بخط مغزى ابيض .



صرْمُونُ ابيض



صرْمُونُ الخوخ



صرْمُونُ الزعرور



صرْمُونُ السنديان



صرْمُونُ السنط



صرْمُونُ

الآخر يملو توشع اصفر. ثمارها صغيرة القذ حراء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || صدارة ثمارها مرة العلم مسهلة تدخل في عدة مستحضرات طبية موعدة .

١٦٣٣١ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الزَّرْقَاءِ الْقَصِيمِ

Loncera corulea (S). Chèvrefeuille à fruits bleus (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .
فروعها زباد اللحاء ، يبيض الملاك . ازهارها ثؤالبية
الانتشاب . توجعها عذوب الانبوب الاكروش . لونها
الى البياض الاصفر تملو حلة ذمية . اورقها بيضية ،
مقطوعة القاعدة ، زباد لونها الى الزرقاء المائلة || ازهارها يستمر من
ايار الى تموز .

١٦٣٣٢ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الشَّالِكَةِ ، يَاسْمِين

Loncera caprifolium (S). **عَرَّالِي**
Chèvrefeuille des jardins, C. commun (F).
جنية معمرة عارضة تملو نحو ٥ أمتار . ساقها فراء .
فروعها عارضة الملاك . اورقها عارضة بيضية الشكل ،
مقطوعة القاعدة . نصلها مائل الى البشرة ، اخضر الصنفه
البلبا ، يجرى السفل . ازهارها كبيرة القذ فواحة العرف
الطري . لونها ارجواني الخارج اصفر الداخل || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٣ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الشَّالِكَةِ

Loncera spinosa (S). Chèvrefeuille épineux (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .
فروعها نخلية متدلية ، مكاكها ابيض اللون . اورقها
خلفية مسطوية مسنة القاعدة . ازهارها ثؤالبية الانتشاب ،
انبوبية التوجع ، ضيقة القنابات الطويلة ، ودية اللون ،
ثمارها الى الحمرة الزرقاء المولج يطوها طيلم الحبر .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٤ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الشَّرْقِيَةِ

Loncera orientalis (S). Chèvrefeuille d'Orient (F).
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها مثلية
فراء . فروعها مثلية يبيض الملاك . اورقها صغيرة
القذ ، نصلها اخضر البشرة في صنفهيا . ازهارها ودية
اللون يطوها توشع بنفسجي . ثمارها الى البسرة السوداء
اللامعة || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٦٣٣٥ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْقَصِيمَةِ

Loncera myrsillus (S). Chèvrefeuille-myrsille (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية . مكاك .
فروعها ابيض اللون . اورقها اهليلجية صغيرة القذ .
نصلها عاق الحصار خلى الصنفه السفل . ازهارها ثؤالبية
الانتشاب ، انبوبية التوجع ، جرسية الاطراف ، ضيقة
القنابات المستطيلة . لونها الى البياض النقي . ثمارها
مزدوبة ، لاصقة ، ثنائية الحدر ، حراء اللون || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٦ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْقَصِيمَةِ

Loncera pileata (S). Chèvrefeuille à cupule (F).
جنية معمرة صغيرة القذ تملو نحو ٦٠ سم. ساقها مثلية
فناء . لثنتها زباد اللحاء . اورقها ابيدة بقضية الشكل .
ازهارها صغيرة الحجم ، قمية القاعطة يضاء اللون .
ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

انواعها نحو ١٥٠ تميل بعد نظميتها . ساقها مثلية
لو عارضة . اورقها متعاقبة الارتكاز ، ابيدة او عارضة
النصل . ازهارها لا تقاسية الاحصام ، رقيقة الشكل ،
حطرية الرائحة || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٦٣٣٥ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْأَيَّدَةِ

Loncera sempervirens (S). Chèvrefeuille toujours
vert, C. de Virginie (F).
جنية معمرة عارضة تملو ٥ الى ٥ أمتار . ساقها مثلية
فروعها عارضة الملاك . اورقها ابيدة بيضية الشكل .
نصلها خلى البشرة يجرى اللون . ازهارها مثلية التجميع
تاجية الارتكاز حطرية الرائحة ، لونها الى الازرقاء الاصفر
المولج || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٦٣٣٦ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الشَّيْبَةِ

Loncera thibetica (S). Chèvrefeuille du Thibet (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها مثلية فراء .
ملاك فروعها ابيض اللون . اورقها صغيرة القذ ، نصلها
اخضر الصنفه البلبا ، الحامل للسفل الكثيفة الزغب .
ازهارها ثؤالبية الانتشاب ، انبوبية التوجع ، حطرية
الرائحة ، ليكية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى
حزيران .

١٦٣٣٧ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْقَرْتَرِيَةِ

Loncera tartarica (S). Chèvrefeuille de Tartarie,
Chamécristier, Caméristier (F).
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها
واصرها الزغبية عديمة ، ساقها فراء . فروعها الفتية
مير الملاك اما الحولية فيضاه . اورقها صغيرة القذ ،
قلبية الشكل مقطوعة القاعدة . نصلها حاد الحبل ،
اخضر اللون . ازهارها تختلف مع القروب لنها
الايض والودي والاجر ، كزوبها خماسية التركيب .
ثمارها صفر او حر ، كروية الشكل ، مسطوية الاذن .
ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٣٣٨ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْإِسْبَلِيَّةِ

Loncera alpigena (S). Chèvrefeuille alpestre (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء ، فروعها
عارضة يبيض الملاك . اورقها كبيرة القذ اهليلجية النصل
المهذب . ازهارها جوية اللون توجعها مزدوبة القصور .
ثمارها الى الحمرة القترية || ازهارها يستمر من ايار
الى تموز .

١٦٣٣٩ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْحَرَجِيَّةِ

Loncera periclymenum (S). Chèvrefeuille des
bois (F).
جنية معمرة عارضة تملو نحو ٥ أمتار . ساقها فراء .
فروعها عارضة الملاك . اورقها بيضية الشكل ، ثقلة
الزباد الاخضر ، نصلها مائل الصنفه البلبا اخضره ،
خلى السفل المصطاد . ازهارها فواحة العرف اللقي ، لونها
الى الصفرة الجسيلة يطوها مولج ارجواني || ازهارها يستمر
من حزيران الى ايلول .

١٦٣٤٠ - صِرْمَةُ الْجَدْيِ الشَّدَقِيَّةِ

Loncera xylosteum (S). Chèvrefeuille des haies,
C. des buissons (F).
جنية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها مثلية
فناء . فروعها جوف ، لثنتها مير الملاك . اورقها
بيضية مسطوية القاعطة خلية النصل . ازهارها الى البياض



صِرْمَةُ الْجَدْيِ الْحَرَجِيَّةِ

- نحو ٢ سم. أزهاره وردية اللون. حثولية التجميع.
يستخرج من أوراقه وزهره دهن السحر الشائع الاستعمال.
١٦٢٤٤ - **صَعْقَرُ الْبَرِّ** هو للعج، اطبله.
١٦٢٤٥ - **صَعْقَرُ الْجَبَلِ** هو ندغ الجبل، اطبله.
١٦٢٤٦ - **صَعْقَرُ الْفَرِّ** هو الطيريين الكوربي، اطبله.
١٦٢٤٧ - **صَعْقَرُ بَرْزِي** هو ستر البر، اطبله.



صعر ازغب

- ١٦٢٤٨ - **صَعْقَرُ الْبَرْزِي** *، **فُودَنْج**
Origenum vulgare (S). Origan commun, Marjolaine
bittarde, Fausse marjolaine (F). Wild marjoram,
Organy (E). Echter Dist, Wilder Marjoran (D).
Origeno, Regano (I).
نبات عشبي طلي يري معمر من فصيلة الشفويات. ساقه
قوامها خشوية تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه منقطة،
مقابلية، بيضيه الشكل؛ لصلها خلي البشرة، مبرش
الجيوب المطرية. أزهاره وردية اللون، حر التفتات.
حكيكها الزهري عسيبي الشكل || يستخرج من أوراقه
عطر الصعر.



صعر البازري

- ١٦٢٤٩ - **صَعْدَكَة** (F). Erect stem (E).
هي كل ساق تمكها أليافها التماسية من الالتصاف دين
ويست أو تفتيف.

١٦٢٥٠ - **صُعْرُوكَة، عَقِيكَة، قُمْعُوكَة**

- Boule de scarabée (F). Ball of beetle (E).
الصعروكة أو العقية أو القمعية حشريّة من ذبيل
ولتين تصطنعها بعض أاث الخنافس، أخصها الجبل لآرؤ
المكن في داغها.



صَعْق

- ١٦٢٥١ - **صَعْق** *
Ictinia (S). Ictinia (F).
جنس طير من حارة الحدأ وفصيلة السقرات. أنوامه
قليلة جميعها من القواطع الكبيرة الجفة. ألونها إلى السهية
الرصاصة يعلوها موج أزرق. رؤوسها زائفة. سواقلها
وأفنانها عابقة. حيرتها حر اللون، سود الأظار والأدهاب.
متأسرها إلى السواد الأزرق، أرساغها جلوية || قوتها
الطاهة وللأوبيا والخرطرات على اختلافها. تثن في الأشجار
الباسقة. أناتها تقع من رفعتين إلى ثلاث رفعات تحضنها
بمنارة ذكورها نحو لريمة أساييم.

- Rotor
١٦٢٥٢ - **صَعْفَع**
نعت قمرني يطلق على القسم المتحرك الدوار من الحركات
الآلية.

- ١٦٢٥٣ - **صَعْف** *
Oxylophus glandarius (S).
Oxylophus-Gel (F).
طائر من حارة البوقليات وفصيلة القيقويات. أحاطه
نسمة الأرجاء تشغل الشرق الأوسط وأجزيرة العربية
وأفريقية الشرقية والشيالية || وهو من القوطيات التي تحب
البلاد في طلب الرزق. جسده متوسط القد، يطلي نحو
٤٠ سم. ثوبه متباين الألوان. رأسه إلى الوردية. جبينه
وزوره وعلاطا عقه إلى السهية الصفراء. ينك إلى الأبيض.
ظهره إلى الوردية الحطية الموج. ريش قوامه وسكاك
وأباهه وذنبه إلى السرة الحطية باشتاد الأظراف البيض.
مقاده أحر القاطدة، أسد الملاط. أفتاده إلى السرة



صَعْف

١٦٢٥٤ - **صِرْمَةُ الْجَدِيّ النَّجْدِيَّة**

- Lonchra syringantha (S). Chèvrefeuille-filas (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها منقسمة فروع.
مككاً فروعها أبيض اللون. أوراقها أبيضية صغيرة القد.
نصلها مائل البشرة حيل الخفسار. أزهارها تولوية الانتداب،
الوردية التويج، خضبة التفتات، حطرية الرأسة و
وردية اللون. ثمارها حمية القد، حراء اللون، ثلاثية
الحفر || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٦٢٥٥ - **صِرْمَةُ الْجَدِيّ الْيَابَانِيَّة**

- Lonchra japonica (S). Chèvrefeuille du Japon (F).
جنية معمرة عارضة تملو نحو عشرة أمتار. ساقها منقسمة
فروعها متباعدة، عادمة المكك. أوراقها أليدة، بيضيه
الشكل، مبدية الزام الأخير. نصلها خلي الصفحة السفلى.
أزهارها تولوية التجميع، كبيرة القد، حرية الرأسة.
لونها إلى الأبيض اللويح بالأحر || أزهارها يستمر من
سزيان إلى تشرين.

١٦٢٥٦ - **صَعْب**

- Quels (S).
Quells, Diach, Travailleur (F).
جنس طير من فصيلة التوطيات. أنوامه للمرة ثلاثة
موطيا أفريقية الشرقية من شواطئ بحر القلزم إلى ما
وراء الحيفشة. أجسامها مبرشة الخميم طولاً يراوح من
١٢ إلى ١٥ سم. ألوانها قليلة الاختلاف من بعضها بكثر
فيها الأحر المائي، رؤوسها وأعضائها واجنباتها سود.
حناجر قوامها وأباهرها سقر. متأخرها سود أو حر.
أرساغها إلى السرة الحطية || قوتها الجيوب ولزور
والطوام. تثن في الأدهاب. حطها حيوكة التفتش
كروية الشكل، مغطية للمخل. أناتها تقع من ٥
إلى ٧ بيضات تحضنها بمنارة الكور نحو أسويين.
ج صماب.

١٦٢٥٧ - **صَعْبَر، صَعْبَر**

- Berchemia (S).
Berchemia (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البقيات. أنوامه قليلة.
سفيها عارضة طول من ٤ إلى ٣٠ م. أوراقها حاملة بيضيه
الشكل، مغطية القاعدة. نصلها حديد البروق، بحري
اللون. أزهارها صغيرة القد، غصراء اللون، حثوية
التجميع، ثمارها زيتونية الشكل ولقد واللون، تسد
عند الأدراك. أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

١٦٢٥٨ - **صَعْقَر**

- Frai (F). Spawning (E).
سره السمك قبل أن يخرج من الأنظام وهو الذي يحضر
يصبح من المأكلا المفردة التيبة المعروسة بالطرخ
والجباري || أنوامه عديدة تحضف باختلاف مصادر
وصيم البره ولونه وطريقة تحضيره.

١٦٢٥٩ - **صَعْقَر** هو السحر، اطبله.

١٦٢٦٠ - **صَعْقَرُ الْزُغَب** *، **زَيْعَر**

- Origenum hirtum (S). Origen hirtasé, Marjolaine
hérissée (F). Hairy Marjoram (E). Kretischer Dostan
(D). Origeno di Creta (I).
نبات عشبي يري حطري معمر من فصيلة الشفويات.
يكثر في الأراضي الجبلية المخساة. ساقه فروع تملو نحو
٤٠ سم. فروعها دقيقة، خشوية، منقسمة، زغبية اللام.
أوراقه منقطة، مقابلية، بيضيه الشكل، نصلها خلي
البشرة. كفيف الجيوب المطرية، مسن الحافة، يطلي

ظهورها اريمة تزاويق متقابلة صفراء اللون . رأسها كبير الجرم . صيئها كبيرتان جهافتان . زباناها خطيان دقيقان || ظهورها فارقة للمخضر لا يلحف السكة الشريية . غذاءها محتاجتا التحيزر الخفيف . اصافها رباعية المقل الظاهرة || الاثن اكبر عمدا من الذكر واطول سرما منه واتصر زبانا || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجبلانة في ابواجر ايار وبقية حتى ابواجر آب . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوطها الادراك الجسوري تطول من ٢٥ الى ٢٤ م . جسمها حيدى التركيب ، مادم الروابج ، اصفر اللون ، اسمر الرأس والشرج ، مبشر الحلب القصير النقيق || طور الاكالم الذي يستمر من ٤٠ الى ٤٥ يوما ينتهي في آخر نفق تحضره البرقة قرب سطح الجلع او الفصم الذي تقم فيه .

١٦٢٦١ - صُمَّرٌ

هو الصبر نبات عاشر من التنبقات ، اطليه .

١٦٢٦١ - صُمَّوَّةٌ ، دَعْوِيَّةٌ

Regulus (S).
Roiteale (F). Wren, Kinglet (E).
ج صمو . جنس طير من فصيلة الشعليات . انواعه ٦ جميعها من العصافير الصغيرة اللد . رؤوسها مطوّقة . متاخرها دقيقة مستقيمة . اوتواها متباينة الالوان وعلب فيها الاملل والاضفر الزيتوني . اجنتها متوسطة اللد . اذنانها مقعرة الريش قصيرة || قوتها الحشرات والطرار . تألف الادخال والاصابع . تدن في الاجمار الكفاء . اناثها تبيض مرتين في العام . المرة الاولى في ايار والثانية في تموز . حضنها يستمر نحو اسبوعين تقوم به الاثن دون الذكر .

١٦٢٦٢ - صُمَّوَّةُ الحُطَبِ

هي الاطلان ، اطليه .

١٦٢٦٣ - صُمَّوَّةُ حُجْرَةِ الرَأْسِ * ، صُمَّوَّةُ مَرَجَةٍ

Regulus ignicapillus (S).
Roiteale à tête rouge (F). Fire cree, Fire crested wren (E).
نوع من الصموة تألف الادخال والسيجات والمدايق . طولها نحو ١١ سم . رأسها الى الحمرة الصنانية . محسراها الى الصفرة . ثوبا الى الوردية زهو في الصدر والجن ، يبق في الظهر ويملو موج أصفر ذهبي في الجناسين .

١٦٢٦٤ - صُمَّوَّةُ قُضْبِيَّةٌ *

Regulus cristatus, R. regulus (S). Roiteale huppé (F).
نوع من الصموة تألف الصنور والاصفر . طولها نحو ١٠ سم . رأسها يرتقالي الريش المستطيل ، اسود الطوق ، اصفر الحسرين ، ظهورها الى الخضار الزيتوني . جناحهاا الى البسرة البقاء . صفرها وبعظها الى الوردية المملدة . تدن في الصنور والتتوب .

١٦٢٦٥ - صُمَّوَّةُ مِجْدَعَةٍ *

Regulus aticapillus (S). Roiteale triple bandeau (F).
نوع من الصموة طولها نحو ٩ سم . رأسها اسمر اللون اسود الطوق . محسراها بجذعان بلاييض . سائر ثوبها كالصموة القنبرية . تأم الجبل في اوائل ايار فتضم حتى ايلول ثم ترسل الى الشواطئ هربا من البرد .

١٦٢٦٦ - صُمَّوَلٌ

Acrocephale (F).
Acrocephalic, Acrocephalous (E).

الصمولى من كان رأسه ضيق القمة .

الخضره || قوته الحشرات والاصار . اثناء كائى القوق لا تختم البيض بل تقسمه في عشاش غيرها من الطير اعصها عشاش الزناج . ج صمك .

١٦٢٥٤ - صُمَّرٌ

Fral (F). Spawning (E).
الصممر سره السك ويدعى صممر ، اطليه .

١٦٢٥٥ - صُمَّرِيَّاتٌ

Chytridiaceae
فصيلة ظهور مجهرية من مرتبة السرييات ورتبة البشيات . اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها من الوسعة الاقتصادية الزراعية : القس والوزم والروحة .

١٦٢٥٦ - صُمَّكَةٌ

الصمكة : غلة فيها عوج واصول صفها جرداء .

١٦٢٥٧ - صُمَّكُلٌ *

Galeria marginata (S).
Galerine marginée (F).

نظر كامن الصنف لاما كول من فصيلة الغاريقونيات . اصائله اقل الصنوبريات حيث يمشي مجموعات على القشور والاعشاب النخرة . جموعاته لاقنسية العدد الذي يراوح من ٦ الى ٢٠ يوه الى البيض الاخير . سله معتدلة الطول ثنية اللون ، طويها الى الحطلة . اوسعه شبه صيرانية الشكل غمدة الحافية . قطرها نحو ٤ سم . لونها الى البسرة يملو موج اصفر . اطرافها معتدلة الكثافة بنية اللون . وانحته عند الس قربة الشبه من راحة النقيق .

١٦٢٥٨ - صُمَّلُولُ زُهَبٍ * ، كَلِيْسُ زُهَبٍ *

Clytus pilosus (S). Clytus polli (F).
Clytus pilosus (E).

حشرة خاضعة غاشبة من فصيلة القنبريات ورتبة مفدمات الاجسمة . تألف الجنان وكروم التين . غشاشها تعيش على اوراق الاجمار . يرقاتها تسردب الجلمع اليابسة || جسمها متوسط اللد بطول من ١٢ الى ١٦ م . ثوبا الى الصفار الزيتي الاضفر الموج يملو في الظهران ست نقط سود . رأسها معتدل الجرم . صيئها صغيراتان بارزتان . زباناها خطيان ، دقيقان . فكاهما ذربان . ظهورها حمراني الشكل لا يلحف السكة الشريية . غذاءها كيتفا الحبل والزنب . اصافها رباعية المقل الظاهرة || الاثن اكبر قدما من الذكر واطول سرما منه واتصر زبانا || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجبلانة في ابواجر حزيران وبقية حتى ابواجر ايلول . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها الكوال الجسوري تطول نحو ٢٢ م . جسمها حيدى التركيب قليل القشور ، مادم الروابج ، حطلي اللون ، افسر الموج ، اسود الرأس ، مبشر الحلب النقيق .

١٦٢٥٩ - صُمَّلُولُ اَهْيَتٍ * ، كَلِيْسُ اَهْيَتٍ *

Clytus arcuatus (S). Clytus étroit (F).
Clytus arcuatus (E).

حشرة خاضعة غاشبة من فصيلة القنبريات ورتبة مفدمات الاجسمة . تألف اسراج الصنوبر والتتوب والشرين . غشاشها تعيش على : اذغال الشفويات والصنوبريات . يرقاتها تسردب الجلمع والاصخان اليابسة || جسمها متوسط اللد اهيت الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ م . ثوبا الى البسرة السوداء يملو في كوتلها اربع بقع صفر ويملو في



صمّل



صمّلول ازهب



صمّلول اهيت



صموة حمره الرأس



صموة قنبرية



صموة مجذعة



صُرُور

Emberiza citrinella (S).
Bruant jaune, Verdrière (F). Yellow hammer (E).
صغور من الشراير. طول نحو ١٧ سم. لونه الى
الصفرة الخضراء المائل. رأسه رمق وصفره وبطنه سفري.
ظهوره وبنتاه وذنبه الى الصفرة الصفانية يطولها توشج
حطلي. ابطاء موشة بالمجوري. عيناه عسلتان، متفاد
ازرق. وصفاه الى الصفرة الزرقية. الاذن اصفر تفاد
واقل تزويقاً من الذكر. قوته الحشرات والديدان والمجرب
الغريبة. يالغ الادغال والكروم والحلقاق والسيجات.
يشن عته في الارض او على ارتقاء قليل منها في الادغال
الكثيفة. اثناء تحضن من الزرين الى الثلاث مرات
في العام تحضنها تراوح من ٤ الى ٥ يعضات.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Classé (F). Class (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة.
راجع تصنيف.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.



صنح



صفارية

صُرُورِيَّات

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

Acrocephalus (F).
Acrocephalus (E).
تسويه خلقي يحصل للرأس فيلوس شيق القمة. الصولة
لا تحم تحت الذنوب المقلية.

١٦٣٠٢ - **صفرة الشعر السورية**
Brant de Syrie (F).
طائر من الشرائير يسمى درسة بدهاء ، اطلها .

١٦٣٠٣ - **صفرة الشعر سوداء الرأس**
Embrézie à capuchon (F).
طائر من الدرس يسمى درسة سوداء الرأس ، اطلها .

١٦٣٠٤ - **صفرة**
Aubère, Obère (F).
With a white and chestnut coat (E).
من الثوب الخليل وهو اختلاط شعرات بيض بأخرى ضاربة الى حرة .

١٦٣٠٥ - **صفرة** ، **سكوي**
Crox pratensis (S).
Crox des prés, Râle des genêts, R. terrestre, Rol des Caillies (F).
Corncrake, Landrail (E).
نوع من الطوق وهو طائر من القرايط يشبه الباني وياتي معها في زين واحد . طول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الصبهة السمر تملها رقة حنطية عابطة . ظهوره اغير المواجه المايق . صدره وبطنه الى البطة البيضاء ، جناحاه مرقشان بالاحمر الصافي . منقاره جهوري الخضم العلوي ثوبي السفلي || فيه الحشرات والديدان والحبوب . يطن في التربة بين الاشجار . انشاء تقع نحو ٧ بيضات تحضنها وسحها لثلاثة اسابيع || يقال انه جبان يفرح من الصوة وفي الخلل و اجبن من صفرة و قد قال الشاعر :
و تراه كالليل لدى امته
وفي الرضى اجبن من صفرة

١٦٣٠٦ - **صفرة**
الصفرة لبنت نبتت في اوائل الخريف (السان) .

١٦٣٠٧ - **صفريات**
Chalcididae (S).
Chalcididae (F). Chalcid Wasps (E).
Zehrwaspes, Erzwaspes (D).
فصيلة حشرات من رتبة خشايات الاجنحة المصنوعة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نائمة تتطفل على خيفات الحشرات الضارة اخصها ذوات الجناسين ومرشقيات الاجنحة .

١٦٣٠٨ - **صفرة انترشيات**
Chalcis stipes (S).
Chalcide (F).
حشرة من الصفريات ، طولها نحو ٨ م . جسمها اسود اللون ، ارجلها حر . خصرها انبوي الشكل مستطيل . رقاتها تتطفل على جميع انواع الخرشيات .

١٦٣٠٩ - **صفرة الدود**
Brachymeria foveolata (S).
Brachymère (F).
شجرة صغيرة من الصفريات ، طولها نحو ٤ م . ثوبها الى السودة . زياتها وقواتها الى الصفرة . رقاتها تتطفل على خيفات ديدان حشرقيات الاجنحة .

١٦٣١٠ - **صفرة المتوسط**
Phaenoglyphis conica (S).
Phaenoglyphis (F).
شجرة من الصفريات ، طولها نحو ٨ م . رأسها وصدرها وبطنها اسود ، بقاياها الى الامامية سود . ارجلها الخلفية حر . مرزها غليظ مستطيل . رقاتها تتطفل على حدة حشرات اخصها ذات الجناسين .

١٦٣١١ - **صفة متعينة**
Caractère récessif
Recessive character (E).
هي الصفة الملقطة المضمومة الممكن ان تود الى الظهور .

١٦٣١٨ - **صفة** ، **سقيفة**
Hangar (F).
Outhouse, Shed (E).
بناء زراعي مكشوف الجوانب او بمعناها تحفظ فيه الآلات الزراعية والفلوات فيها من الشمس والمطر .

١٦٣١٩ - **صفدة**
هو الصفدة من حيوانات البحر ، اطلها .

١٦٣٢٠ - **صفدي**
Testaci (F). Testaceous (E).
لنت تعريفه توصف به الالفة الكلية المادة التي تلصق الاصداق البحرية .

١٦٣٢١ - **صفرة**
Zéro (F). Zero, Naughe (E).
صلاة عديدة تغير من اتمام القيمة . والصفرة حدة وجرده عن عين عدد دل على شربه بشفرة .

١٦٣٢٢ - **صفرة** ، **أسكريد** ، **أسكريس**
Ascaride, Ascaris (F).
جنس ديدان طفيلية من رتبة السلكيات . انواعها عديدة جميعها من الديدان الخيطية المعوية الكؤذية . يقضى عليها باستعمال بعض المسهلات الباثية اخصها البستران .

١٦٣٢٣ - **صفرة الخيل**
Ascaris magalocephala (S).
Ascaride mégalocephale, A. du cheval (F).
Thread-worm horse (E).
نوع من الصفرة يصيب الخيل والجدير والبقال . يعيش في السطح وقد يصيب ارجامجا يسبح الحيوان .

١٦٣٢٤ - **صفرة الكلاب**
Ascaris mystax (S).
Ascaride mystax, A. du chien (F).
Thread-worm dog (E).
يصيب الكلاب والسنائير يعيش في المني البتقيق .

١٦٣٢٥ - **صفرة**
الصفراء من نبات السهل والربول وقد تنبت بالجله . قال ابو حنيفة : الصفراء نبت من المشب تسقط على الارض وكان ورقها ورق الخس ، فأكالها الابل اكلًا شديداً . (السان)

١٦٣٢٦ - **صفرة**
Bile
حصارة تقرتها الكبد تتميز بلونها الاصفر الداكن ولينة مراريا . وهي ثلوية التفاعل تحوي بعض الاصلاح الضورية والمعدنية والمواد الملونة || وظائفها الجسدية عديدة اهمها : تنظيف عمل البكرياس وحث حركات الامعاء البكتانية وترتيب المواد للمضوية الى ان يتم انهامها مع وقاتها من الاغبار والمغن .

١٦٣٢٧ - **صفرة العروق**
هي الكستورزا ، اطلها .

١٦٣٢٨ - **صفرة العروق**
هي الكستورزا ، اطلها .

١٦٣٢٩ - **صفرة**
هو الزفران ، اطلها .

١٦٣٣٠ - **صفرة** ، **صفرة**
هي الصفارة ، اطلها .

١٦٣٣١ - **صفرة الشعر**
Verdère (F).
طائر من الشرائير يسمى صفنت ، اطلها .





صَفَافَات ابيض



صَفَافَات ارجواني



صَفَافَات اريد



صَفَافَات البلاتين



صَفَافَات الماعز



صَفَافَات ماعز

الاطراف. اسديتها ثنائية . ثمارها زاهد اقشور مستدة الاذن الشديدة القصر || يعيش على الماء . زواحه منتشرة في جميع الاصقاع . قصباتها لينة ساعية شائعة الانتحال .

١٦٣١٧ - صَفَافَات الماعز *
Salix caprea (S).
Sauce des chèvres, Bourgade (F).
Goat willow, Sallow (E). Sahweide (D). Salice caprea, Caprareccio (I).

شجرة سريرية متوسطة القند ، تملو نحو عشرة امتار . قصباتها وانفاتها حديدية اللحاء . اوراقها مسطحة ، بيضيه ، صغيرة القند تطلو نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ . نصلها غثن اللمس ، ازرق الصفعة السفلى . حراشف شياؤها رقيقة . اسديتها ثنائية || يعيش في جميع الارضية والمواقع الرطبة . اغشاهها صناعية . لحاء سويها تسلمع للدهانة .

١٦٣١٨ - صَفَافَات قَبِيْقُ القَلَم

Salix acutifolia (S). Saule à feuilles étroites (F).
شجرة متوسطة القند ، تملو من ١٠ الى ١٥ فرسها تحلة منتسطة خلية اللحاء . اوراقها ضيقة ، نصلها بطول نحو ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شياؤها لاسعة خلية . اسديتها انزاعيا ثنائية التجميع || يعيش في الوديان ، يزرع في الكتبان لتثبيت رمالها المتحركة .

١٦٣١٩ - صَفَافَات قاصير *

Salix magnifica (S).
Saule magnifique (F).
جنسية سريرية جميلة الشكل ، تملو نحو ٢٥٠ سم . قصباتها ارجوانية اللحاء . اوراقها بيضيه تطلو من ٢٠ الى ٢٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٥ سم . نصلها جامد النسيج ، جميل الخضار الزاهي . شياؤها الذكورية تطلو ١٥ سم . والانثوية ٢٥ ، حراشفها جزئية اللون ، اسديتها ضفعية || يزرع القزوين جيد في جميع الارضية والمواقع للرطوبة الرطوية .

١٦٣٢٠ - صَفَافَات قَرَم

Salix herbacea (S).
Saule nain, S. argente (F). Dwarf willow, Arctic willow (E). Krautweide (D). Saliceo nano (I).
نبطة جبالية ترطب في المواقع الرطبة الباردة . تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . فرسها وقصباتها زاهد اللحاء . اوراقها صغيرة القند تطلو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شياؤها خلية فضية . اسديتها ثنائية .

١٦٣٢١ - صَفَافَات قَصِير

Salix fragilis (S).
Saule fragile (F).
شجرة فرسها ، تملو من ١٥ الى ١٥ م . فرسها متدلية ، حادة الحبل الازرق ، سرية القسم . اوراقها سنانية ، متدلية ، تطلو نحو ١٦ سم . حراشف شياؤها صفر . اسديتها انزاعيا ثنائية التجميع ، مرطبة الاثلام || يزرع لاشغاه وقصباتها الصناعية ، يرغب في المواقع المستمرة الرطوية .

١٦٣٢٢ - صَفَافَات قَلْبِي الْوَرَق

Salix cordata (S). Saule à feuilles en coeur (F).
شجرة فرسها منتسبة الاثلام ، تملو من ٢٥ الى ٤٠٠ سم . اوراقها قلبية الشكل ، نصلها مائل البشرة ذات اديم الاخير للشاري الحافة . حراشف شياؤها خلية . اسديتها انزاعيا ثنائية التجميع مرطبة الاثلام || يزرع القزوين يرغب في المواقع الرطبة والارضية السميكة الغور .

١٦٣١١ - صَفَافَات سَوَحَر

Salix (S).
Saule, Osier (F). Willow (E). Weide (D). Salice, Saliceo, Salicio (I).
جنس اشجار وشجيرات ونباتية سريرية من فصيلة المصنعات . انزاعيا نحو ١٢٠ منتشرة في جميع الاصقاع . اوراقها مائلة مسطحة متعاقبة تطلو فيها الاستعانة ، نصلها ازرق الصفعة السفلى . انزاعيا ثنائية المسكن ، شريفة ، وسيدة الشق || جميع انواعها ترطب في الاراضي الرطبة . اغشاهها خفيفة لينة سهلة التصنيع لا تتفكك . لحاء سويها تسلمع للدهانة . قصباتها تتسمل في صناعة البلال . اشهر انواعها ما يتبع .

١٦٣١٢ - صَفَافَات اَبْيَس * ، اِسْبِيدَاكِر

Salix alba (S). Saule blanc, Osier blanc (F). White willow, Swallow tailed willow (E). Silberweide (D). Salice bianco, Salicastro (I).
شجرة كبيرة القند ، تملو زاهد ٢٥ م . فرسها متوسطة الانبساط ، قصباتها وانفاتها منتسبة ، لونها الى الحمار الازرق يعطونها زاهد ابيض . اوراقها سنانية الشكل ، مديفة الطول تطلو نحو ١٢ سم . وتعرض ٢ . نصلها منشاري الحافة ، خلي البشرة التي تبدو فراء اللون . حراشف شياؤها صفر . اسديتها ثنائية || زواحه شائعة ، يرغب في المواقع الرطبة اغشاهها طرية وصناعية . لحاء سويها وفرومه دباغة .

١٦٣١٣ - صَفَافَات اَرْجَوَانِي *

Salix purpurea (S). Saule pourpre, Osier rouge (F).
شجرة صغيرة القند ، تملو من مترين الى خمسة امتار . فرسها جزئية اللحاء . اوراقها سنانية تطلو نحو ١١ سم . وتعرض ١٥ م . نصلها مائل الصفعة لينا ازرق السفلى ، مسن حافة الزايم الاخير . حراشف شياؤها قلنية ازرق . اسديتها انزاعيا فردية ، مآبرها ارجوانية || يزرع القزوين .

١٦٣١٤ - صَفَافَات اُرْمَد *

Salix cinerea (S).
Saule cendré, S. gris (F).
شجرة صغيرة القند ، سريرية ، جميلة الشكل . تملو من ٨ الى ٦ امتار . شجيراتها اجوف التبخيد السويدي . اوراقها تطلو من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ . نصلها خلي الصفعة ، مديبة للمقصة المتسعة . حراشف شياؤها قلنية ازرق الايدي اللون || يكثر في الاثلام المختلة قرب مجاري الماء .

١٦٣١٥ - صَفَافَات اَسْوَد

Salix nigra (S).
Saule noir (F).
شجرة كبيرة القند دائمة تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها مسطحة ، اهليجية ، ضيقة ، تطلو من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٦ م . نصلها مائل البشرة ، خلي العروق ، مائل الخضار القاتم . حراشف شياؤها سود . اسديتها وريّة التجميع ثلاثية او خلية او سباعية . اقلامها مرط . ثمارها بطولية اقشور ، مستحيلة الاذن . يرغب في المواقع الرطبة وفي الارضية السميكة الغور .

١٦٣١٦ - صَفَافَات السَكَكِين *

Salix viminalis (S). Saule viminal, Osier vert, S. des vanniers (F). Basket willow, Osier willow (E). Kobweide (D). Saliceo vetrice, Vincio, Scrope (I).
شجرة متوسطة القند ، تملو من ٤ الى ١٥ امتار . ساقها فرسها ، عديدة القصبان اللينة المسطحة . اوراقها سنانية ضيقة ، نصلها بطول نحو ١٢ سم . وتعرض ١٢ م . صفحته السفلى فضية الخمل . حراشف شياؤها سود

١٦٣٣١ - صَفَافٌ طَوِيلُ الذَّكَبِ *

Orthotomus longicauda (S). Orthotome à longue queue, Fauvette couturrière (F).

طائر من الصفاف. أصدانه تمتد من مايليزيا إلى الهند وإيران وإفريقيا. ثوبه جميل الألوان الزائفة. ظهره إلى الخضر الزيتوني "الداغ". عنقه يمتدحه ويصل إلى اليأس الأضمر الموشم بالأصفر. عزازان ذنبه مستطيلان || قوته الحشرات والحيتة والديدان والتسلق. يألف الحدائق والقباض والمتاع وشغاف بجاري الماء || الأنيق قطع من || ال || يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوما.

١٦٣٣٢ - صَفَافٌ * ، سَيْسَك

Secotomus (S). Saccotome (F).

جنس حيوانات قاضية جامة من القاربات. أنواعه ٤ موطنها البلاد الإفريقية. جميعها ربة الحقة ، صغيرة القند. الثوبان إلى السرة تسود مع اقترابها من الظهر والرأس وتبيض عند البطن. قوتهاها قصيرة. أظفارها ذرية. رؤوسها غروبية. أذنانها كبيرة مستديرة. أذنانها دقيقة. قصيرة. كاسية || قوتها الجذور وجميع المواد الصبوية والحشرات. تألف الازدحام الكثيفة وصفاف الأنهار والمروج المرتفعة والاراضي للمساكن. مجارها أنفاق مستطيلة تتخللها رداء قسيمة.

١٦٣٣٣ - صَفَافٌ ، بَاكَة

Manoqua (F).

Hand, Plug (E).

الضمة من أوراق التبغ المجافة المروسة، مبسطة كانت أو غير مبسطة.

١٦٣٣٤ - صَفَافٌ *

Lethrinus (S).

Léthrin (F). Lethrinus (E).

جنس سمك بحرية من ثلاثيات الزعانف وبسليسة الاسبوريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || أعرف أنواعه وأشهرها الصفند المأكول وصفند الأطلسي.

١٦٣٣٥ - صَفَافٌ مَأْكُولٌ *

Lethrinus esculentus (S). Léthrin mangeable (F). Esculent lethrinus (E).

نوع من الصفند، سمكة بحرية يبيض. أصدانه تمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي || جسمه أعليجي الشكل، قصور المقعر، مستدل التسطيط، يطول من ١٦ إلى ١٨ سم. رأسه كبير الجرم، غروبي الشكل. شفة مستطيلة الانفرج. صيناه مقاربتيان نازحتان. زعنفته الظهرية مستطيلة، ثلاثية القسم الامامي. اما الشرسية ثلاثية المناسخ الغريبة. والذيلية فاقرة. ثوبه إلى الخضار الغنيض المواج. رأسه أصفر. زعانفه حر. وتعلو بقية جروية في أواسط الأيائل من الجانبين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

١٦٣٣٦ - صَفَافٌ ، تَصْفِيقٌ ، صَفَافٌ

Décantage, Décantation, Soutirage (F). Decantation Drawing off (E).

نقل الخمر وسائر السوائل من آنية إلى أخرى لفصلها من رواسبها.

١٦٣٣٧ - صَفَافٌ

Marché (F). Market (E).

اتفاق يشتد على تسليم بضاعة.

١٦٣٣٨ - صَفَافٌ مُنْتَح ، صَفَافٌ رُومِي ، شَعَرُ الْبَيْتِ ، أَمُ الشُّعُورِ

Salix babylonica (S). Saule pleureur, S. de Babylone (F). Weeping willow, Mourning willow (E). Trauer weide, Babylonische Weide (D). Salix pangsanta, Salice di Babilonia (I).

شجرة تسمى: الكبر ، تملو نحو عشرة أمتار فروها منتسبة. قضبانها وانفانها دقيقة متعديلة. أوراقها سنانة ، ضيقة ، قصيرة المتق ، نصلها يطول نحو ١٧ سم. ويعرض ٢٥ سم. وهو مائل الصفرة العليا ازغب البقل وزنيه اطول اللين. حراشفها ضاربة خضلة. اسديتها ثنائية. زراعه شائعة ، يرغب في الواقع الكثيرة الماء ، قضبانها صناعية ، غشبه متوسط البنية.

١٦٣٣٩ - صَفَافٌ نَهْرِي

Salix fluviatilis (S).

Saule fluviat (F).

شجرة سرورية ، تملو من ١٠٠ إلى ٤٠٠ سم. فروها منفرجة الزوايا. قضبانها شبه منتسبة. أوراقها ضيقة تطول من ٦ إلى ١٠ سم. ويعرض من ٥ إلى ١٠ سم. نصلها مشاري الحافة ، خلي البشرة على صفحتيه. حراشف شاربها وريدة اللين. اسديتها ثنائية. اقلامها خلية ، ثمارها زقية القشور || يعيش على مجاري الماء وفي الحصباء وبين الصخور.

١٦٣٤٠ - صَفَافٌ يَابَانِي

Salix elegantissima (S).

Saule pleureur du Japon, S. elegant (F).

شجرة متوسطة القند ، تملو نحو عشرة أمتار. الحصباء انفية الانتساب. قضبانها وانفانها متعديلة ، زباه اللحم. أوراقها ضيقة تطول نحو ١٥ سم. وتعرض ٢ سم. نصلها بارز البروق المهدبة. حراشف شاربها مستطيلة ، وريدة اللين. اسديتها ثنائية. ثمارها خلية القشور ، قصيرة الامن. يزود القزوين ، يرغب في الاربة البريلة المتوسطة الانتماج.

١٦٣٤١ - صَفَافَاتٌ ، صَالِيَاتٌ

Salicinae

اسم املاح الحامض الصلصالي أي الخلتني.

١٦٣٤٢ - صَفَافِيَّاتٌ

Salicaceae (S). Salicées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الثفلتين حاملة الثعلات تشمل الصفاف والجرور.

١٦٣٤٣ - صَفَافِيَّةٌ

Salix (F).

هي الاية نبات من ثفلتات ، اطليا.

١٦٣٤٤ - صَفَافِيَّانٌ ، صَالِيَّانٌ

Salicinae (F).

صالحين (E).

غلو كوزيه يستخلص من كشور واوراق الصفاف والجرور وهو مقو نافع ويستعمل في معالجة داء المفاصل.

١٦٣٤٥ - صَفَافٌ *

Orthotomus (S).

Orthotome (F).

جنس طير من فصيلة السليقيات وريبة الجواثم. أنواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الاسيرية || تتميز بانثائها الزائفة وبطريقة صنع اعشائها الجارية الشكل المولفة من وريتين يجسهما وتبعكها بنيط من القطن او النيل الناعم تحسه وتقتله قبل الاستعمال بمقارها الذي يقوم مقام المفرك والابرة واليد || أعرف أنواعه وأشهرها الصفند الطويل الذنب.



صفاف منحن



صفاف طويل الذنب



صفندة



صفند مأكول

١٦٣٤٨ - صَفَرِيَّاتُ الْقُرُونِ

Lamellifrons (F). Lamellifrons (E).

لمت تقريباً يطلق على الخنافس القليلة لفصيلة الجليات ذلك لأن قرونها الاستعمارية الورقية تشكلت لتفتح وتطبق كصفحات الكتاب .

١٦٣٤٩ - صَفَرِيَّاتُ الْمَتَابَرِ

زبابة طير من كليات السقدم تتميز بتقنيها المبطلة الصفيحية الشكل ، من فصائلها الطيقات والوزيات ولتعلقات ، الخ .

Glatsement (F).

١٦٣٥٠ - صَفِيرٌ

صوت السر .

١٦٣٥١ - صَفِيرٌ

هو الثمن جنبة من الفطيات ، اطلة .

١٦٣٥٢ - صَفِيرَاكٌ

Sophora (S). Sophora (E). Sophora (D). Sofora (I).
جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الترياقيات القرارية . أنواعها عديدة منها الأشجار والشجيرات والجنائيات والأشواب . أوراقها مركبة ريشية . أزهارها متفرقة تتجمع بكثر لها اللون الاسفر ، بني متفرقة تجبرها لتتحلل || أشهر أنواعها ما يتبع .

١٦٣٥٣ - صَفِيرَاكُ الْكُنْكَشِكِ

Sophora secundiflora (S). Sophora du Mexique (F).
شجرة متوسطة الحجم ، تملو نحو ١١ م . ساقها سرسة . أوراقها أريدة . وريقاتها تد من ٧ الى ٩ ، لصلها مائل للبرقة . حبل الخصار ، حنائقها الزهرية ابطية وصانية الاوتكاز . أزهارها بتجمية اللون ، فواحة العرف . أزهارها يستمر طوال الصيف .

١٦٣٥٤ - صَفِيرَاكُ الْيَابَانِ *

Sophora japonica (S). Sophora du Japon (F). Japanese pagoda tree, Sophora Japanese (E). Japonische Sophore (D). Sofora del Giappone (I).

شجرة سرعوية كبيرة القد ، تملو من ١٥ الى ٢٠ م . فروعها المشهورة أريدة . ساقها سرسة . أوراقها عابلة تملو نحو ٢٥ سم . وهي مؤلفة من نحو ١٥ ورقة لصلها باحت الخصار . حنائقها الزهرية محبوبة الاوتكاز ، حنائقها حربية الشكل تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . أزهارها خافتة العرف للمستحب لونها الى الصفرة البيضاء المزعج . ثمارها قرنية يستخرج منها خضاب اسفر قليل كبير الشأن يستعمل في صباغ ثياب ملك الشمس || اعتاشها صناعية ناعمة الرقعة جيدة الصنف || أزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٦٣٥٥ - صَفِيرَاكُ امْرِيْكِيَّةِ

Sophora affinis (S). Sophora d'Amérique (F).
شجرة تملو نحو ٢٥ أمتار . ساقها سرسة . أوراقها عابلة كبيرة مركبة من نحو ١٧ ورقة لصلها مائل البرقة . حبل الخصار . حنائقها الزهرية ابطية الاوتكاز . أزهارها الى البياض المزعج بالوردي || أزهارها يستمر طوال الصيف .

١٦٣٥٦ - صَفِيرَاكُ يَتِيَّةِ الزَّرَقِ

Sophora viciifolia (S). Sophora à feuilles de vicia (F).
جنبة سرعوية معمرة ، تملو من متر الى مترين . ساقها شاذكة . أوراقها عابلة صغيرة . وريقاتها مستطلة يراوح



صَفِيرَةٌ



صَفَرَاءُ الْيَابَانِ

١٦٣٣٨ - صَفَنٌ

Guépier (F). Wasp's nest (E).

مبارة الزناير . بيت تتصده الزناير ونحوا لها ولقراغها .

١٦٣٣٩ - صَفَنٌ

Bourse, Scrotum (F). Scrotum (E).

الجراب الجدي الذي يغلف الخصيتان للظامرتان عند الحيوان .

١٦٣٤٠ - صَفْرُوكَةٌ ، زُؤِيَّةٌ *

Zonitis immaculata (S). Zonitis immaculé (F).

Zonitis immaculata (E).

حشرة طيبة واثمة غامضة وانجبة من فصيلة اللويديات وزيئة معدلات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . غشائها تميش على بيلات الازهار وفطيات النبات وهي تفرز منه لسها مادة صفراء اللون كروية الرائحة ونحوي في شوارها وني جهازها التناسلي مادة لاصقة تهيج بشرة الجلد وتثير البلاء . يرقاتها مقترنة || جسمها متوسط القد يملو من ١٢ الى ١٥ م . قوامها الى الصفار الكاظم ، رأبها وبراميزها سود . صفاها كيرقان وبارتقان . زباناها عظيمات مستطيلات . ظواهرها سائي الاطراف القليلة اللاحقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى اواخر تموز . تسرح في التبار . تساهل في حزيروان وتتمتع الممكن في كل مكان يكون له الخفاء || البوقه عند بلوغها الادراك اتام تقول نحو ٢٢ م . جسمها شبه امطواني الشكل ، عابلي الصفرة الداكنة ، اسفل الحواشي الترحية ، اسفل اللب ، سداسي الزواجب ، بني الرأس . قليل الحلب المجرى على الجانين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما ينقضي في التربة .

١٦٣٤١ - صَفِيٌّ

لمت يطلق على كل حيوان اعلى صريح السلالة الصافية المتشعبة . راجع صريح .

١٦٣٤٢ - صَفِيْحَةٌ

هي التصل ، اطلة .

١٦٣٤٣ - صَفِيْحِيٌّ

Ma كالمصفحة شكلا .

١٦٣٤٤ - صَفِيْحِيَّاتُ الْاَحْتَاكِ

Mysticetes (F).

مربية حيوانات بحرية لبونة . راجع وقيطات الاحتاك .

١٦٣٤٥ - صَفِيْحِيَّاتُ الْأَرْجُلِ

Pélicypodes (F).

صف حيوانات من الرخويات يعرف أيضاً بصفيحات الخياشيم وبلوات الصمرايين .

١٦٣٤٦ - صَفِيْحِيَّاتُ الْجُلُودِ

Piscodermes (F).

Piscodermata (E).

مربية من الاسماك المتحجرة ظهرت في اواخر الحقبة السيلورية وانقرضت في الكربونية . تميزت ببياكلها الففرفرية المادة الملوقة بمصالح عطية التركيب .

١٦٣٤٧ - صَفِيْحِيَّاتُ الْخَيْطَانِ

Lamellibranchs (F). Lamellibranchiata (E).

صف حيوانات من الرخويات يسمونها ايضاً ذوات الصمرايين أو الصمدتين (Bivalves) .

مستوية القوام، سرية الطيران، حادة المزاج وقوية الشجاعة. تمرلها : الصقر وصقر الصنم وصقر المروج وصقر الهند والحُرّ والسوق والشاهين والفرق || اما كنيته فأبو شجاع وأبو الاصم وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو حوان .

١٦٣٦٩ - صَفَرَاءُ ، أَجْدَاك ، جَدَاك ، قُطَامِي
Falco sacer (S). Faucon sacre, Sacre (F).

طائر من الكولاس تنسب إليه عارة الصقور وفضيلة الصقريات . وهو أبيض الجفّة ، حسن الشكل ، مجدول العين ، طويل السنن والذنب ، عاري الساقين ، حاد الخالب . منسره قصير القد ، أعف الجبهة ، منحن الخطمين . وهو أهدأ من البازي وأقنع منه وأبرد مزاجاً وأشدّ أقداماً وأكثر إلفاً || موطنه البلاد المعتدلة الحارّة من آسية وأروبة الشرقية || يأوى الإسراج والثنايا الكئيصة والجبال الجرداء على السواء . قوته الطير من المسفوق والبط . ينش وكته في صدوح الصقور النائية أو في أعالي الأشجار الباسقة . أثناء تنصع من ٣ الى ٤ فترات تحسبها وحدها نحو أربعة أسابيع .

١٦٣٧٠ - صَفَرَاءُ الْأَرْتَبِ هو العقاب السعادي ، اطليها .

١٦٣٧١ - صَفَرَاءُ الْبَطِّ هو السوق ، اطليها .

١٦٣٧٢ - صَفَرَاءُ الْجَرَادِ هو الويسق ، طائر من الصقريات ، اطليها .

١٦٣٧٣ - صَفَرَاءُ الصَّخْمِ *
Falco orientalis (S). Faucon de Barbarie, Tartaret (F).

نوع من الصقر . اصطناعه تحت من العراق الى التبت . وهو أصغر قدّاً من الشاهين والأجدل لكنه أشرس خلفاً وأبليس مزاجاً وأشدّ بطلاً .

١٦٣٧٤ - صَفَرَاءُ الْفَرَكَالِ هو الشرق ، اطليها .

١٦٣٧٥ - صَفَرَاءُ الْهَيَوَانِ هو مرزّة الدجاج ، اطليها .

١٦٣٧٦ - صَفَرَاءُ الْمُرُوجِ
Falco mexicanus (S). Faucon des prairies (F).

نوع من الصقر . اصطناعه البلاد الامريكية بكثير في المكسيك . يألف المناطق البداعلية مبدأً من الشواطئ قوته الصافيير والقناريس والحشرات .

١٦٣٧٧ - صَفَرَاءُ الْهِنْدِ *
Falco calidus (S). Faucon des Indes (F).

نوع من الصقر ، متوسط القد ، جميل التوشيم الزاهي ، سريع الحركة والانفصاف . موطنه الهند وهو من طيورها الأبدية .

١٦٣٧٨ - صَفَرَاءُ يَزْ هو البازي ، اطليها .

١٦٣٧٩ - صَفَرَاءُ جَرَمَاحِ هو السقاوة ، اطليها .

١٦٣٨٠ - صَفَرَاءُ حَوَامِ هو السقاوة الشائبة ، اطليها .

١٦٣٨١ - صَفَرَاءُ بَ هو الجروية ، اطليها .

١٦٣٨٢ - صَفَرَاءُ *
Cycchraque (S). Cycchraque (F).

جنس حشرات واشمة من مخديات الاجنحة وفضيلة

معددا من ١١ الى ١٥ . اصلها مالى البشرى ، بحري الصفة السفل . عتاقها الزهرية وملة تقسم من ٦ الى ١٢ . زهرة لونها الى الياض الموشح بالازرق || ازهارها يستمر طول شهر حزيران .

١٦٣٨٧ - صَفَرَاءُ مُدَهِّجَةٍ

Sophora chrysophylla (S). Sophora doré (F).

جنية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها قليلة الشوك . اوراقها مستطيلة ، وريقاتها غيبية التصل ، خلية البشرة ، معددا يراوح بين ١٧ و ٢١ . عتاقها الزهرية لينة . ازهارها الى الصفرة اللحية النواجية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٨٨ - صَفَرَاءُ الصنم هو الزرع المذرك .

١٦٣٨٩ - صَفَرَاءُ الْجَلْدِ
Pachydermes (F). Pachydermatous (E).

١٦٣٩٠ - صَفَرَاءُ
Méricarpe (F). Méricarpe (E). كل غشاء من احبة الثمرة النافخة التي لا تنفلق من زورها .

١٦٣٩١ - صَفَرَاءُ هي الاجل نوع من العمر ، اطليها .

١٦٣٩٢ - صَفَرَاءُ
Scithare (F). صفة بحرية تسمى سطار . اطليها .

١٦٣٩٣ - صَفَرَاءُ *
Egrisé, Egrisée (F). Bort, Diamond-powder (E).

الصقال مسحوقة لأم من اللام يستعمل في صقل الحجارة الكريمة وبها اللام .

١٦٣٩٤ - صَفَرَاءُ
Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).

١٦٣٩٥ - صَفَرَاءُ *
Cicadula (S). Cicadula (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الوزدييات . انواعها عديدة . اصطناعها العالم . مرتها الصفات والراوة وبظم الثباثات المنصبة والمائية . اجسامها اعطليجية الشكل تطول من ٣ الى ٦ سم . انثيا مختلفة الالوان حادة الزرقة منها الاصفر والاعمر والحظلي والبناني ، الخ .

١٦٣٩٦ - صَفَرَاءُ
Sacré (F). Sugared (E).

١٦٣٩٧ - صَفَرَاءُ
Substance sucrée (F). Sugary substance (E).

١٦٣٩٨ - صَفَرَاءُ
Faucon (F). Falcon, Hawk (E). الصقر يجمع مقور وصقار وصقارة والاشق مقرة . والصقر بالرف البدوي كل طائر يصيد ما خلا العقاب والسنر . فالصقر يشمل البازي والشاهين والفرق والحُرّ والباشق والبيشق والسقاوة والزرزق واليزيد... والصقور عند البزادة تفتان : الصقور والبزاة . فالصقور سود العين معددة الرؤوس طول الاجنحة قصار الارجل . والبزاة صفر العين مدورة الرؤوس قصار الاجنحة طول الارجل || اما الصقر بالرف البدوي البلي فهو جنس طير من عمارة الصقور وفضيلة الصقريات . انواعه ثمانية منتشرة في جميع اقطار العالم جميعها حسنة الشكل والمعتاد ،



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ

١٦٣٨٧ - صَفَلَاب سُورِي *، سِتْكُرُوزَا، شَجَرَة

الحوري

Asclepias syriaca, *A. cornuti* (S). *Asclépiade* de Syrie, *A.* à ouste (F). Silk cotton, Wild cotton (E). *Echte Soelenpflanze* (D). *Asclepiade di Siria*, *Falso cotone* (I).

جَنَّة تَعْلُو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اورثاها مستطيلة او رمية التجعج. نصلها احليبي الشكل بطول من ١٠ الى ٢٢ سم. ويغرس من ٥ الى ١٢. ازهارها الى العفرة الخضر الزاهية يعطوا مزيج احر. ثمارها كمار احليبية لشكل، مدرة البشرة، فسقية اللون، تلهبا حري. ابيض. يزورها صغيرة مستطيلة مفلطحة سوداء اللون.

١٦٣٨٨ - صَفَلَاب عُسْكُوِي *، حَسْبِيَّة ذَاك

الجنس

Asclepias tuberosa (S). *Asclépiade tubéreuse* (F). Butterfly weed, Tuber root (E). *Echtes mudarplanze* (D). *Asclepiade tuberosa* (I).

بجلة عمرة تَعْلُو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اورتها عسكوية. ساقها زبداء حامدة المصاراة البنية. اورثاها لائفة، احليبية، مسطلة. ازهارها حامية، عوجها برتقالية، لونها صفير. ازهارها يشتر من تمر الى ابيض. يستخرج من ساقها مادة جوية فعالة تشمل في الطب. ويقال ان اورثاها وازهارها تعيد للمصاب بكذا الجنس.

١٦٣٨٩ - صَفَلَاب كُفْرُوِي

Asclepiade officinale (S). *Asclépiade officinale* (F). *Asclepiade officinale* (E). *Asclepiade officinale* (D). *Asclepiade officinale* (I).

هو الغلقة من النباتات الطبية، اعطيا.

١٦٣٩٠ - صَفَلَاب مَدَقْسِي *، زَهْرَة الدَّم

Asclepias curassavica (S). *Asclépiade de Curaçao*, *Asclepiade de Curaçao* (F). *Blood flower*, *Wild ipocacuanha* (E). *Bestard ipocacuanha* (D). *Ipecacuanha della Antille* (I).

بجلة عمرة تَعْلُو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اورثاها سنائية النصل تَعْلُو من ١٠ الى ١٥ سم. ويغرس من ٢ الى ٤. ازهارها صوانية التجعج، حامية الارزكاز، وردية اللون او حراء. ازهارها يشتر من زهران الى ثرين.

١٦٣٩١ - صَفَلَابِيَّات

Asclepiadaceae (S). *Asclépiadaceae* (F). *Asclepiadaceae* (E). *Asclepiadaceae* (D). *Asclepiadaceae* (I).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الصقلاب والبلغ والعشر والشقفة والشراشيف واليديد الخ.

١٦٣٩٢ - صَفَلَاب *،

Cyclope (S). *Cyclope* (F). *Cyclope* (E). *Cyclope* (D). *Cyclope* (I).

جنس ذويات مائة من القشريات الدنيا مجليات الارجل نصيلة الصقلويات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق ودعان البلاد الباردة والمعتدلة. الحرارة اجسامها سكية التركيب بطول من ٤ الى ٧ سم. وزوجها ملتصقة بالحلقة الصدرية الاولى. حيويا متعاطفة فيقتها الفاخر اليها حياء واحدة. بطونها جرابية الشكل. قوائمها ثنائية للمفاد باستثناء الزوجين الاول والسادس. الاوليا تراوح من التبرة القصية الى اللقطة والمعلقة البحرية للمزج.

١٦٣٩٣ - صَفَلَابِيَّات *،

Cyclopidae (S). *Cyclopidae* (F). *Cyclopidae* (E). *Cyclopidae* (D). *Cyclopidae* (I).

نصيلة ذويات مائة من القشريات الدنيا مجليات الارجل.

الذويات. انواعها المعروفة ستة اصنافها البلاد الباردة. تأت الجراح. قوتها الانذار اولاً ثم التطور. اجسامها صلبة القد، شبه ييشية الشكل، زبداء القشور دبوية الزباني. اولها سوية الالوان الزاهية يعطوا في كولها زوج او زوجان من النقط السود.

١٦٣٨٩ - صَفَرِيَّات

Falconidae (S). *Falconidae* (F). *Falconidae* (E). *Falconidae* (D). *Falconidae* (I).

فصيلة طير من قسم الصقور تنتمي الى فئة كواسر النبار وردية الجوارح. تقبل ٦ عمارات وزها ٢٠٠ جنس ونوع. تتميز باجسامها الربية المنسوبة التجانس الشكل. رؤوسها متوسطة الحجم كاسية الريش. حيويا ناشطة، شهلة، عجمرة داخل اورثاها الباردة الحليج. امتها قصيرة. ساقها كبيرة وارة. منارها قصيرة تتميز بمخاطها الملوية المسنة الاطراف. جهادها شديدة الانسلاف، حادة المهاجن. اصنافها متوسطة الطول تغلب فيها السرولة ومنها حارية. غالبا ذرية قوية متغنية. انثاها في معظم الاجناس اكبر قدماً من ذكورها. تقتصر السيد وتقتله حركاً بخالها. تعيش ازواجا او افراد لا يجها سوى فطرة الانضمام الى الرصيل في الانواع القليلة. وهي تشمل، بون ريب، اجسر البيرور وانها خلفا واقولها شكية واصليها حواء. اما عماراتها الست فهي: العقبان والهداء والصقور والبراز والسفالات والمزيات.

١٦٣٨٤ - صَفَلَاب *،

Scatopse (S). *Scatopse* (F). *Scatopse* (E). *Scatopse* (D). *Scatopse* (I).

جنس حشرات من فصيلة الصقلويات وردية ذوات الجناسين. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم القار العالم. اجسامها صغيرة تَعْلُو من ٢ الى ٥ سم. وزوجها صيرة مزوانية الشكل. حيويا فاقية منه الشقين. مرافها قصيرة. ملابسها ربيدة الغلقة. قوتها الاستعمارية تحلة وقصيرة. كولها احليبية يعطوا حل قصير. بطونها مستقيمة الظهر، مستقلة الطرف المستطير. رؤوسها كبيرة، قسطانية التخفيف. قوائمها مستطيلة، حامدة الحلب والمناس. ملجسها الحياي كرمجي. تأت الاماكن الرية. يكثر وجودها على الاحشاب والازهار. اسارها نائلة او داسة.

١٦٣٨٥ - صَفَلَابِيَّات *،

Scatopidae (S). *Scatopidae* (F). *Scatopidae* (E). *Scatopidae* (D). *Scatopidae* (I).

فصيلة حشرات من رية ذوات الجناسين. اجسامها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. جميعها داسة او نائلة. تأت القابات والجراح والهداق والمزاق اربعة اجسامها صغيرة، تَعْلُو من ١ الى ٩ سم. رؤوسها مفلطحة. حيويا كوية الشكل. مرافها وملاسها صيرة. قوتها الاستعمارية تحلة قصيرة. كولها احليبية. بطونها شبه مدنية الشكل. رؤوسها قسطانية التخفيف. قوائمها مستطيلة. يرقاها داسة او نائلة. اشهر اجناسها الصقلويين.

١٦٣٨٦ - صَفَلَاب

Asclepias (S). *Asclépiade* (F). *Asclepiade* (E). *Asclepiade* (D). *Asclepiade* (I).

جنس نباتات برية وريزية من نصيلة الصقلويات. انواعها عديدة. جميعها جنينات ومجلات واحشاب متعاطفة الاوراق الكاملة. ازهارها طبقية التجعج ابطية او حامية الارزكاز. يزورها مفلقة زغب نام آتية قصيرها شبه الحرير. اشهر انواعها ما يتبع.



صَفَلَاب سُورِي



صَفَلَاب عُسْكُوِي



صَفَلَاب مَدَقْسِي



صَفَلَاب

Detrictidote, Detridiphage (F). • صككام • ١٦٤٠١
Detridiphagus (E).
صفة الحشرة التي تعيش على التفاتيف العضوية من أي مصدر كانت .

Naja (S). • كرويرا • ١٦٤٠٢
Naja, Cobra (F). Cobra (E).
جنس حيات خبيثة من امبيات الازناخيد . اثنائه المرفة مشرة ، سمه منها افرقية المهد وثلاثة اسيدية ، اولها الى القشة يطولها تحطيط اسمر ويقلع اصفر . اجسامها عادية الشكل طولها يختلف مع النوع وهو اراوح ما بين ٨٠ و ٤٥٠ سم . تتميز باحناها المخططة المستمرة التي تلتفتع عند التليظ || جميعها سامة لدغتها يميتة لا تنفع لها الرقية لانها سريعة الطب والتشفي || اشهر اولها ما يتبع .

١٦٤٠٣ • صيل أسود العنق • رَحْمَة
Naja nigricollis (S). Naja à cou noir (F).
نوع من الصل يكتر في بعض مناطق افريقية الشرقية اعصها اريتريا والصين . ثوبه الى القشة المخططة بالاصفر والاسمر . عنقه اسود ، رأسه اخير اسمر . لسته يميتة .

١٦٤٠٤ • صيل الصحراء
Naja melanoleuca (S).
Naja du désert (F).
نوع من الصل موطنه الصحراء الكبرى و افريقية الاستوائية . ثوبه الى الصبغة المخططة بتجلمه اصفر . لسته قتالة .

١٦٤٠٥ • صيل النوبة
Naja flava (S).
Naja du Nubie (F).
نوع من الصل يكتر في النوبة والسودان ثوبه الى الصبغة النابية يطول تجلمه اسمر . لسته يميتة .

١٦٤٠٦ • صيل مصري • لآسبر
Naja, Aspic d'Egypte, Serpent à colles (F). Egyptian cobra, E. asp. (E).
نوع من الصل يكتر في البلاد المصرية . لسته يميتة . وقد اجمع المحققين على ان هذا النوع من الصل هو الحية التي كان يقتسمها لقضاء المصريين وهو الحية التي اختارتها كلبوبالمرقة القضاء على حياتها .

١٦٤٠٧ • صيل هيندي • لآغيركان
Naja tripudiana (S). Naja à lunettes, Serpent à lunettes, Cobra indien (F). Indian cobra (E).
نوع من الصل يكتر في الهند . لسته قتالة . يقال ان هذا صلي حياياه المخططة السوداء . مع الصل الحلي ، لا يقل عن ٢٥٠٠٠ لسته مقلها من الازلاذ والاساء .

١٦٤٠٨ • صيل هندي ، صيل الغاب ، صيل قارسي
Naja bungurus, N. hannah, N. morgani (S). Naja de Perse (F). Persian cobra (E).
نوع من الصل موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس . يألف المناطق الحارة الرطبة . يطول نحو ٤٥٠ سم . قوته الانامي والقتال والفساد . ثوبه الى القشة المنقطة بالاسمر يطولها بعض التفرع الصفر . سمه شديد القاتلية سريعها . لسته تقضي على الثور بطرف ثلاث دقائق .

١٦٤٠٩ • صلاكة
Dureté (F). Hardness (E).
خاصية مقاومة الصخر لخدش .

اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في مياه البلاد الباردة والمعتدة الحارة || اجناسها شديدة الصغر ، سمية التركيب . الزوج الانامي من قوائم الذكور ، عند جميع الانواع ، يمشي للثوزن ، أخذ || امرف اجناسها واشهرها المقلوب .

١٦٣٩٤ • مفللود •
Cincloides (S). Cincloide (F).
جنس طير من الجواثم ريقات المنائر وصبية الطيوريات اثنائه المروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار امريكا الجنوبية || اجسامها رقيقة تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . مناقبها مستطيلة دقيقة . اخفاها مستديرة الاطراف . اثنائها صياغة الالوان ، جميعها مكحلة اللون ، شبه مقلوبة الاعتقال ، مرقوشة الصلور || قوتها الحشرات والتهبان والقتل .

١٦٣٩٥ • صكفور
Falconiens, Faucons (F).
Falcons (E).
عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل سبعة اجناس : الصقر والسفر والكنيع والساوق والزلزل والكمم واليومي . اما انواعها فكثيرة العدد جميعها رمية الجثة المتصلة اللد . اعناقها قصيرة . سواقلها كبيرة مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية مسلة الخاطم ، ياربها شديدة الانتفاخ . ارباغها متوسطة الطول . غالبها عارة ذرية . مهدا الما تجوبه او تلد في بعض اصقلها . حي من اضل طير الصقريات . طيار بسرعة فائقة تحلق في الاجواء الرقيقة وتقتص كالمهم . تصيد مع الصباح ومنه القروب . قوتها الطير والنبويات وصائر الحيوانات التي تستكن منها .

١٦٣٩٦ • صكولين •
Secouline (S).
Secouline (F).
جنس دويبات بحرية من القشريات الدنيا جلدويبات الغرويس || اثنائه المروفة قليلة العدد تستغل على السرطان وغيره من القشريات .

١٦٣٩٧ • صكي •
Masua (F). Club (E).
لست صيني يطلق على ما كان شكله كالصق .

١٦٣٩٨ • صكج
Froidure (F). Coldness (E).
هو البرد البسي الذي يبيه خاصة صرد الحمار .

١٦٣٩٩ • صككة •
Parscaryum (S).
Parscaryum (F).
جنس نباتات عشبية صمرة زياه من فصيلة الحمصيات . اثنائه المروفة قليلة العدد اصطلها يمتد من الشرق الاوسط الى الهند || سواها كيفية الخمل والزيب تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم . اولها الجذرية قليلة الشكل ، سنانية الاطراف . اولها الجلمية يبيضه الشرنق . اثنائها متباين الاشكال منه المتقوي والشكولي . اثنائها مديدة الالوان يكتر فيها الاحمر والارذق || امرف اثنائها واشهرها الصفيقة المستنوية المنقضية الاثمار الزرقاء اللون والصفيقة الكشميرية المشكولة الاثمار الازرقالية || تنويرها صيني يستمر من حزيران الى تموز .

١٦٤٠٠ • صكيل
Liophyle (F).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات اولوه مالة اتصال .



مفللود



صل مصري



صل هندي

بعدة البحر يقال انها تبصر البوصة على بعد مئة متر .
قوتها اللذباب والبوص والحوام والنمل المنح ومعظم الحشرات
الصفيرة || تقيم وكناتها في اقواب الصخور الطليقة .
ركيزتها الرقيق الذي تفرزه يلفصق بالصخر ويجمد بسرعة .
وكناتها فيه حلالية الشكل . اناثها تضع من بيضتين الى
ثلاث بيضات تحضنها نحو اسبوعين || اعرف انواعه
واشهرها الصلجان البهلون .

١٦٤٣٤ - صَلْجَان صَبْلُول

Colocalia nidifica (S). Salangane commune (F).
Common salangane (E).

طائر من الصلجان . موطنه جزر الزانج وبعض مناطق
آسية الجنوبية . يألف الحوارق والحادس الثانية || جسمه
صغير القد اعين القوام ، يطول نحو ١٣ سم . يسطه
نحو ٣٠ سم . توجه الى الطلعة يسر في الرأس والظهر
ويبرز في الصدر والبطن والذني . جناحه وذني رقة زائقة
الى السحرة السوداء . ذنيه فارقة الطرف . عيناه كبيرتان .
سفلة عينه سوداء اللون . سباله مستدلة الكثافة والطول .
متناره شديد القصر ، مستعرض الشفق ، اعقب الهرة
كما في الطيور الجارحة . رصه قصيرة ، عارية ، عمراء
الون || طيرانه فائق السرعة . قوته الحشرات الصفيرة
واللذباب والبوص والحوام || يقيم وكته في اقواب الصخور
الطليقة . وكته حلالي الشكل والتقدير يشبه بالريش
المزجج بالطحاب البحرية والفصوص والافنة . الاثني
تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها رسعا نحو
١٤ يوما يبيتها الذكر يزين لها الغذاء || وفي الصين ويجزو
الزبانج يتهاقن على اكل وكنات الصلجان ، مطبوخة
او مسلوقة ، لانها شايقة لا مؤذية .

١٦٤٣٥ - صَلْجَ Pack (F). Pack (E).

الصلوج كلفة ضخمة من الجليد العائم المتراكم المالح الحام
قرب القطب الشمالي .

١٦٤٣٦ - صَبْلُول هو السلور ، اطليه .

١٦٤٣٧ - صَلْبِي البَحْر

هو كوكب البحر ، اطليه .

١٦٤٣٨ - صَلْبِي الجَنُوب ، نَعَم

la Croix du Sud (F). the Southern Cross (E).
صلب الجنوب ونعم اسمان لكوكبة نجوم واسعة مركزها
الجنوب فيها اربعة نجوم مزدوجة وضادة ونجم مثلث من
المرتبة الثانية يسمى « ثير نعم » .

١٦٤٣٩ - صَلْبِي الشَّال

Croix du Nord (F). Northern Cross (E).
صلب الشمال مجموعة من ستة نجم تلاصق كوكبة الدجاجة .

١٦٤٤٠ - صَلْبِيَكَة

Sclerite (F). Sclerite (E).
الصلبية مثيلة جامدة في هيكل الحشرات .

١٦٤٤١ - صَلْبِيَّ

Crucial, Cruciforme (F).
Cross-shaped, Crucial, Cruciform (E).
حل شكل صليب .

وسائر افريقية الشرقية والوسطى . يعيش اسراباً صغيرة
برايح عددها من ٢٠ الى ٣٠ . يألف النابت والاحراج .
قوته القار والحروب . يذثن عنه في تجاوبف الاجمار .

١٦٤٤٢ - صَلْفَاة

Cirrocaulis (S). Cirrocantilis (E).

حيوان بحري مفترون وحيد الجنس والنوع من الرعويات
وفصيلة الصلفاحيات . اصطناع بحار البلاد الباردة اصنها
بحار الشمال || جسمه بيضي الشكل . زصافته ضيقة
مستوية الاطراف . رأسه مستعظم الجرم يحمل ثمانية
جرامز عظمية ، متساوية الطول ، مجزوة نصف واحد من
الحامس . جرامزه واسطحتها عند انتشارها تشكل قمماً كبيراً
قاعته القم .



صلفاة

١٦٤٤٨ - صَلْفَاَحِيَّات

Cirrocautides (S). Cirrocantides (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات ورأسها الارجل
مزدويات الخوصم . ثمانية الجرامز || لها جنس واحد
معروف حتى الآن يسمى صلفاة .

١٦٤٤٩ - صَلْغُوم

Glycymeris (S). Glycymeris (F). Glycymeris (E).

جنس حيوانات بحرية من الرعويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة الصلغومييات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها
كبيرة مستطيلة المنحاط . عتية الاصماف الخشيرة من
الطين . اصمافها فيه بيضية الشكل ، مستوية التحزيز
الخفيف || تعيش منفصة في الرمال قرب الشطوط ||
لحمها مأكولة .



صلغوم

١٦٤٥٠ - صَلْغُومِيَّات

Glycymeridae (S). Glycymeridae (F). Glycymeridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات صفحيات الخياشيم
اجتمتها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || تتميز بمخاطها
المستطيلة وباصمافها الصلبة المتفربة من الطرين || اعرف
اجناسها واشهرها الصلغوم والسكريلك .

١٦٤٥١ - صَلْغِين

هو الخلج من النباتات العلية ، اطليه .

١٦٤٥٢ - صَلْبَانْج ، صَلْبَانْج

هو الاقنيس ، اطليه .

١٦٤٥٣ - صَلْجَان

Colocalia (S). Salangane (F). Salangane (E).

جنس طير من فصيلة الباميات . انواعه المعروفة قليلة
العدد جميعها من طيور الصين والهند وجزر الزانج . تألف
المواضع الرقيقة الكثيرة الامات والصخور || اجسامها
صغيرة القد ، وشيقة القوام هيفاء . اجنتها ذلقة غارقة
الطول ، اطول قواعدها الثانية . اذناها فارقة الطرف ،
عشارية القزاق . عيشها كبيرة . سبالها مستدلة الكثافة
والطول . متنارها بالغة القصر ، مستعرضة الاشفاق التي
تحمل في وسطها . تحت رباط اللسان ، جيئاً وسيماً
يحتوي كية من الحشرات والحوام . اصمافها قصيرة ،
عارية ، عمراء اللون . اصامها نضيقة . غالبها متفربة ،
مقوسة ، حادة الاطراف || طيرانها فائق السرعة . وتضمن



صلجان ببلون

١٦٤٥٠ - صليبيات * Alepocephalus (S).

Alépocéphale (F). Alepocephalus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصليبيات. انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في سطر بحار البلاد المعتدلة الحارة. جميعها لينة تعيش في الاعماق التي يراوح غورها من ٦٠٠ الى ٣٥٠٠ م. تحت سطح الماء. اجسامها مستطيلة ضيقة. تتميز ببروصها الرماطة العديدة الخرافش. اشهر انواعها صليبة المتوسط (Alepocephalus rostratus).



صليبة

١٦٤٥١ - صليبيات * Alepocephalidae (F).

Alépocéphalidés (F). Alepocephalidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات الخياشيم. اجناسها المروقة خسة اما انواعها ضئيلة. جميعها لينة تعيش في الاعماق البعيدة للبحر ولا تقترب من الشاطئ الا في زمن الترسد. جميع اجناسها مستطيلة الاجسام مستطيلة الرؤوس العديدة الخرافش.

١٦٤٥٢ - صليبيات * Cyanocorax chrysops (F).

Cyanocorax capuchon, Cyanurus capuchon (F). Cyanocorax chrysops (E).

طائر من فصيلة الثريان. اصابته معظم مناطق امريكا الجنوبية. يألف الثياب والاسراج المبهجة الانهار. قوته الحشرات والفار والبروزر. جسمه مستدلل القدر بطول نحو ٤٠ سم. رأسه مع القنن والقرور الى السواد المماثل يمتلئ مع حمار العين الأزرق. ظهره ورجلاه وذنبه الى التزينة الجميلة الملبقة بالابيض. حشوته وبلته وانثيته الى البياض الناصع. يدق عنده في الانهار الرقيقة. الاثنان تحضن من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يدين لها القلاء.



صليبة

١٦٤٥٣ - صليبيات * Ceryle (F).

هو الزراف القامح، اطبا.

١٦٤٥٤ - صليبيات * Lathridium (F).

Lathridie (F). Lathridius (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبيات وبقية عمديات الاجنحة. انواعها المروقة نحو ١٥٠ اصنافا تنبت من اشرف الاقصى الى اطراف اوروبا. اجسامها صغيرة، قليل من ٢ الى ٣ م. رجليها غروبية الشكل. حبيبات صغيرة، ناعسة. قرونها الاستشارية قلبية. تأثيرها نظامية. ملابسها مستطيلة. كولسلها ويطونها والحاداها مضامة. الحادها لاسعة. فصيلة القنن والقرور. اثنائها متباينة الالوان والاماجات. جميعها دامة تعيش في الجفنة والبردي النباتي وعلى الطحالب والفطور وتحت القشور والحاء.

١٦٤٥٥ - صليبيات * Lathridiidae (S).

Lathridiidae (F). Lathridiidae (E).

فصيلة حشرات من عمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروقة عديدة منتشرة في سطر اصقاع العالم. اجسامها ضئيلة الصغر قليل من ٢ الى ٣ م. رجليها غروبية الشكل. حبيبات بارزة. تأثيرها نظامية. ملابسها مستطيلة. قرونها الاستشارية بالغة الطول. مهدبة. حركتها ١١ فصلة. كولسلها مضامة. الحادها لاسعة. قرونها لينة. ارجاسها ثلاثية الشكل. جميعها دامة تعيش في الجفنة والبردي النباتي والطحالب والفطور. اشهر اجناسها الصليبة والقرور.



صليبة

١٦٤٥٢ - صليبيات * Cruciferae (S).

Crucifères (F). Cruciferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفصائل. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. معظمها عشبي. اورثاقها متعاقبة. ازهارها نظامية رباعية الفصل والبتلات المتصالية. اسديتها سداسية. مغلفاتها ثنائية الكبريل. ثمارها غروبية. زهورها دقيقة زيتية المادة. وهي تشغل الكثير من النباتات البتلية المشهورة بخواصها المضادة للحرق كالفلوف والجرول والبقول والرشاد والقررة والجرجير.

١٦٤٥٣ - صليبيات

هي الصليبية، نبات من الفصائل، اطبا.

١٦٤٥٤ - صليبيات * Soliya (S).

Soliya (F). Soliya (E).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخياشيم. مهدبا بعض مناطق اسراليا. سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اورثاقها ابيدة، متعاقبة، كاملة. ستانية الاتصال الجلامدة. ازهارها عشوية التجميع. حلاج. ازهارها صغيرة القدر، مستطيلة الحاديق النحيلة. لها نومان ممروران الصلبة الحادكة والصلبة الصغيرة الزهر.

١٦٤٥٥ - صليبيات صغيرة الزهر * Soliya parviflora (S).

Soliya parviflora (F). Soliya parviflora (E).

نوع من الصليبة. ساقها ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اورثاقها متعاقبة، صغيرة الاتصال. جملة الحاديق الاسع الحلاج. ازهارها شبيهة الصغر. ثنية اللون. تنويرها صيفي.

١٦٤٥٦ - صليبيات * Soliya heterophylla (S).

Soliya heterophylla (F). Soliya heterophylla (E).

نوع من الصليبة. ساقها ترتفع نحو ٢٠٠ م. اورثاقها جملة الحاديق الاسع الحلاج. نصالها حادكة قليل من ٣ الى ٧ م. وتعرض من ٥ الى ١٥ م. ازهارها مستطيلة الحاديق. صغيرة القدر. ينفذ اللون. تنويرها صيفي يستمر طوال شهر تموز.

١٦٤٥٧ - صليبيات * Argent pur (F).

Naked silver (E).

الفضة الصلابة الخالصة.

١٦٤٥٨ - صليبيات * Cardilla (S).

Cardille (F). Cardilla (E).

جنس حيوانات بحرية من الرنوبيات صليبيات الخياشيم وفصيلة الصليبيات. انواعها للماصرة المروقة قليلة العدد اصنافا متباينة البحر الاحمر والخليج الهندي. اصنافها شبه لينة الشكل مهدبة. صلبة القنن المكورة. تعيش لاصفة بالصخور القليلة السمق. لفتها كليف المائدة قليلها.

١٦٤٥٩ - صليبيات * Cardillidae (S).

Cardillidae (F). Cardillidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرنوبيات صليبيات الخياشيم وانواعها للماصرة المروقة قليلة العدد جميعها جنس واحد. اصنافها شبه قبية الشكل، مكورة القنن اللينة. اجسامها صغيرة وطحالبها كلاك. حصراتها كثيرة في الاراضي المائية.

١٦٤٦٧ - صَمْعَر * Mesodesma (S).

Mésodesme (F). Mesodesma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة الصمريات. أتلوه المماصرة المرفقة نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة مقبسة للتأصير. أصدافها عديمة الشوئن أو بيضية. تعيش لاسقة بالصخور القريبة من السطوط.

١٦٤٦٨ - صَمْعَرِيَّات * Mesodesmatidae (S).

Mésodesmatidés (F). Mesodesmatidae (E).

صفيحة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم أجسامها المماصرة المرفقة قليلة العدد جميعها صغيرة القد ، بيضية الشوئن أو عديمة. تتميز بقصر مشاعها وبصغر أرجلها الشديدة التطيل || أشهر أجناسها الصمعر.

١٦٤٦٩ - صَمْعُور * Haplocerus montanus, Orsannus montanus (S).

Haplocère montagnard, Orsanne montagnard (F). Orsannus of Kennedy (E).

حيوان لبنى فلب مجتر وحيد الجنس والنوع من ذوات الأضلاع ، عجوزات القرن. موطنه الجبال الرفيعة النائية وبعض الأضلاع النائية ومنها أسكا || جسمه صغير القد وبضعه بطول نحو ٨٥ سم. ويرتفع نحو ٥٥ سم. قرنه بطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رأسه مع العينين والأذنين والقرنين كراس الطير. جسمه كبشر الماعز. أذناه مستقيمة الأطراف. حياته وقرباه إلى الأسود الحالك. شعره مستطيل يغطي كامل الجسم. لونه أبيض اللون الناصع. فرع الأثر ثنائي الخلف. يحملها يوم يوم حتى تستقر تضع عنه تمامه مغموراً واحداً || أجله قليل البدن ألى فصل الشتاء الذي يستمر من تشرين الثاني إلى أواخر آذار.

١٦٤٧٠ - صَمِغ * Gomme (F). Gum (E).

مادة لزجة دافئة عديمة الطعم والزائفة تتركها بعض النباتات إما طلياً أو يتأثر بحالة مرضية. لذلك فالصمغ طينة الأشكال ، مخلطة التركيب وهي تقسم عادة إلى قسمين : قسم الصمغ القابلة للذوبان في الماء. وقسم الصمغ التي تنحصر الماء. أشهرها الصمغ العربي الذي يستخرج من السط وهو شائع الاستعمال ويدخل في معظم المستحضرات الطبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.

١٦٤٧١ - صَمِغ الدَّهْنَاب

هو الطليق الآخر. أطلقه.

١٦٤٧٢ - صَمَل * Durclir (F). To harden (E).

عمل لشجر : لم يجد رأياً ففعل.

١٦٤٧٣ - صَمَل ، أَبُو الْهَوَكِ Sphinx (F).

Hawk-moth (E).

جنس حشرات من فصيلة الموليات ، أنواعه نحو ٦٠ منتشرة في جميع الأضلاع المالحة. معظمها من الفراشات البسيطة المتوسطة الحجم أو الكبيرة. أجسامها مرفوعة الشكل. رؤسها كبيرة مزخرفة. قرونها الاستشعارية قلدية. برقبتها كبيرة القد ، مرطبة الجسم. عاداتها عادية || أشهر أنواعه الاقتصادية التي تركب النبات ما يتبع.

١٦٤٧٤ - صَمَل الحَذَائِقِ * Sphinx ocellata (S).

Sphinx demi-paon (F).

فراشة كبيرة القد خيلطة الجسم ، تطول نحو ٤ سم. قرونها

١٦٤٥٦ - صَيَاخ الأَذْن Conduit auditif (F).

Cavity of the ear (E).

قناة الأذن التي تشكل صلة الوصل بين القسم الخارجي والداخلي.

١٦٤٥٧ - صَيَاخَة Hélicotropleme (F).

Helicetropis (E).

أثر اتجاه الضوء في انحناء التنبؤ الثاني. لذلك فهو يسمى إيجابياً عندما يكون التنبؤ باتجاه الضوء وسلباً عندما يكون في الحالة العاكسة.

١٦٤٥٨ - صَيَاخِيَّة صَمْعِيَّة مَبْدُولَة Picarel commun, Gerret (F).

صمكة بحرية تسمى شاذمة مبدولة ، أطلها.

١٦٤٥٩ - صَيَام Soupepe (F). Valve (E).

صمكة بحرية تسمى شاذمة مبدولة ، أطلها.

١٦٤٦٠ - صَيَان Allos (F). Pan (E).

رأى من القرب صلب الهيكله نشطت صلاته بعض المواد الطرية أو أكسيدات البوليبيروم أو كربونات الكلسيوم أو ميروكسيدات الحديد.

١٦٤٦١ - صَمَكَة Sous-espèce (F). Sub-especies (E).

تأني الصمكة في تصنيف الأسماء بين النوع والفرد وفي تشبه عدة غريب كان أن النوع يشمل بعض الصم.

١٦٤٦٢ - صَمْرَاج Lucraia (S).

Lucraire (F). Lucraia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة الصمريات. أتلوه المماصرة المرفقة نحو ٣٠ سطوها من سطح البحر الأبيض المتوسط || أصدافها أحليجية الشوئن ، متساوية الأضلاع لاشعورية الأضلاع ، غضة الصفيحة البيضاء المورقة بالأخضر والآخر || تعيش منتشرة في البحار العميقة بالأمم. يتكاثر ويجهز قرب مصبات الأنهر.

١٦٤٦٣ - صَمْرَان Penasa (S). Pinda (F).

جنس نباتات جنينية برية من فصيلة الصمريات. أتلوه قليلة ، منها البلاد الحارة جميعها شاذمة يستخرج من حن طلاء صفيحة صفيحة طرية تستعمل في العلاجات الخارجية أصحها الجروح. ويقال أنها تشبه الجمل وتزبل بجيده.

١٦٤٦٤ - صَمْرَالِيَّات Penecone (S).

Pénécées (F). Penecone (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القامات مرتفعة المبيض. أشهر أجناسها الصمران.

١٦٤٦٥ - صَمْرُوحِيَّين

صمكة بحرية تسمى شاذمة ، أطلها.

١٦٤٦٦ - صَمْعَاء Actus (S). Aote (F).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البذرليات وصفيحة للقرنيات البذرلية. أنواعه قليلة جميعها جنين قرصه شاذمة قليلة الأوراق الملطقة الشكل الصغيرة القد. أتلوها علقية تاجية صفراء اللون ، ويقال لها تقيع الجروح وتقي على عملها.



صم



صمور



صمل الحذائق

اسود. سيجفها وريدة المراج يطولها حصار بني ينهي عند الرأس. رواشها موشجة وبجعة || رقبها مستطيلة الشكل ممره اللون تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول. تركب اذنان جميع الصنوبريات.



صمل الحور

١٦٤٨١ - صَمَلُ الْهَرَبِيَّةِ هو صمل البتريخ، الجلبه.



صمل الكحل

١٦٤٨٢ - صَمَلُ الْكَرْمَةِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَخْضَرِ *Pergesa eplanor, Chaeocampa celery (S). Sphinx de la vigne (F). White-lined sphynx (E).*

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٢ سم. جسمها مردني الشكل، ثوبها الى الصبغة الصنائية السطاه المراج. رواشها موشجة بالاسمر والوردي اللبكي، توضعها قلبية مفرغى. رواشها الاماميان مهلهل بالمراج فضي || رقبها مستطيلة الشكل، شديدة الخضار تحمل حل جانيي رتبها العلوية بقما سود يعطها اطار اصفر. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول. تركب اوراق الكرمة تفنيزها.



صمل الكزيتون

١٦٤٨٣ - صَمَلُ الْكَرْمَةِ الْمُحَطَّطِ، دَلِيلِيَّة

Dalephila livornica (S). Déléphila de la vigne (F). فراشة مجولة طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصبغة السمر، يقطب بطنها اربعة خطوط متوازية سيد وبض. رواشها موشجة مختلف الالوان يكثر فيها الاسمر || رقبها كبيرة القد خضراء اللون. تبيج ظهرها احر الخط يكتنفه من حل جانيي خضراء اصفران يتخللها بلع سود نظامي تدنو جميع التراجيات. تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى اواخر آب. تركب اوراق الكرمة تصطبها وقد تدمر الكرمة من اوراقها اذا كثر جمعها.



صمل السندبان

١٦٤٨٤ - صَمَلُ الْبَلَابِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَلْفَج

Sphinx convolvuli, Heras convolvuli, Protoparce convolvuli (S). Sphinx du liaron (F). فراشة مجولة تجوب البلاد. طولها نحو ٤ سم. ثوبها الغالب وبدي اللون. رقبها غسطة وبجعة بالاسود، ملقني تجديدها يكتن رقم ٨ || تركب اوراق الالباب والبطاطا وغيرها.



صمل الصنوبر

١٦٤٨٥ - صَمَلُ النَّحْلِ، جَالِيرِيَا

Galleria (S). Gallérie (F). جنس ششرات من سرشنيات الاجنحة فضيلة التاربات. اقوامه عديدة بعضها يتهدى حل حليا للنحل فيدخلها ويضع نكته عن ايتها استطاع يحفظ من رقات دقيقة خمر سراديبها وانفاقها في التخاروب تصلف الرصع وتبريق القمل || اشهر اقوامه الموزية اثنان: صمل النحل الصغير وصمل النحل الكبير.



صمل الكرمة

١٦٤٨٦ - صَمَلُ النَّحْلِ الصَّغِيرِ، لَكْرِيَّةُ الشَّمْعِ

Galleria alvearia, G. grisella, Melliphora grisella (S). Alveicole, Taïgne de la cire (F).

فراشة من فصيلة التاربات صغيرة القد، كثيفة الحراشف طويلة الفراش، وبادية التوب تتقسم نحات وتلايا النسل حيث تحت مكنها حل التخاروب فيضف من رقات نمة تفكك بالشمع وتغذي حل الرصع والسمل.



صمل الكرمة المخطط

١٦٤٨٧ - صَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِيرِ، لَكْرِيَّةُ الشَّمْعِ

Galleria cecilia, G. mellonella (S). Gallérie de la cire, Fausse-taigne (F). فراشة من فصيلة التاربات كبيرة القد، كثيفة الحراشف



صمل الالباب

الى الصبغة الصنائية يطولها تجليج، اريد اللون. جنتانها حنطية. رواشها الاماميان مزخرفان وموحدان. رواشها الخلفيان موحدان بالمره وتقلو كل واحد منها بقية بضية الشكل، ممره اللون، يفضا الخطر الداعخل، سودا اختصار الخلفي المستعرض || رقبها خضراء اللون، سوداء المتجديج تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى ايلول تشربن اللون. تركب اوراق جميع الانجار للقره، وقد شوهت حل الصفاف والحور.

١٦٤٨٥ - صَمَلُ الْحَوَرِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُوَشَّجِ

Amorpha populi (S). Sphinx du peuplier (F). فراشة متوسطة القد، طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الحنطة القديار. رواشها موشجة ومزخرفة بالاسمر والحنطي والوردي والابيض || رقبها غبراء اللون، خضراء المراج، تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى ايلول. تركب اوراق الحور والصفاف والبتولا.

١٦٤٨٦ - صَمَلُ الْفَلَقِي، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبَجَّجِ

Daphnis nerii (S). Sphinx du laurier-rose (F). فراشة مجولة تجوب البلاد. كبيرة القد، مدوية الشكل طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السمره الصنائية المراج يطولها تجليج وشيخ وزخرفة وتزيين وتجليج جملة الاشكال والالوان يغلب فيها الاصفر || رقبها كبيرة القد خضراء اللون ممره النضر والمطب تظهر في اواخر تموز وتبقى حتى اوائل تشرين الاول. تركب اوراق النخل.

١٦٤٨٧ - صَمَلُ الْفَرْزَقِينِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبَشَّجِ

Himas cillia (S). Sphinx du lilail (F). فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الصبغة الحنطية. رواشها مبشجة ومزخرفة بالابيض والاسمر. رقبها صغيرة القد ممره اللون مجلحة بالاسود. تظهر في تموز وتبقى الى ايلول. تركب اوراق الزرنيخ والديدار.

١٦٤٨٨ - صَمَلُ الْمَسْمُومِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَسْمَرِ

Acherontia atropos (S). Sphinx tête de mort (F). Death's head moth (E). Tockenkopf (D).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبغة البنية يطولها تجليج متبرقي. سيجفها ممره اللون يتوسطها فيه هيكل تملو بجسة. رواشها غسطة وبجعة ومزخرفة بشي الالوان || رقبها في الطوامر الاول تذك خضراء اللون ثم تنكسر نحو الزرقه. تكتن بطنها اسودين يركبان الرأس من جانبيه. طولها عند اكتمال نموها يبلغ ١٥ سم. خادتها تطول نحو ٥ سم. لونها الى القبي المايق || الخثرة الكاملة تقسمه المناسل الضعيفة تقسم التخاروب وتلقى المسمل. اما البرقة فتركب اوراق السهم والزيتين والبطاطا ومطم لياتات الفصيلة الباذنجانية. تظهر ملدة في تموز وتبقى حتى تشرين الاول.

١٦٤٨٩ - صَمَلُ الْمَشْدِيكِيَانِ

Marumba quercus (S). Sphinx du chêne (F). فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الاصفر البني. رواشها موشجة بالاسمر والوردي || رقبها مستطيلة الشكل حنطية اللون. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول. تركب اوراق السندبان حل اختلاف اقلوه.

١٦٤٩٠ - صَمَلُ الصَّنَوْبَرِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُرَّيِّ

Hylocius pinastri (S). Sphinx du pin (F). فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. جسمها صفالي اللون يتبره تجليج كشي ويقطبه خط حنطي يتوسطه سلك

Bulbille (F).
Bulbil, Bulbic (E).

١٦٤٩٥ - صنوع

اسم تعريفي يطلق على الزئمة الهوائية المحرقة الصلبة التي تظهر غالباً في ابط الورقة والتي يفصلها عن النبات الام ويزدهر في التربة تنمو وتنتج.

Elasmucha grisea (S). - صنوكة شهباء
Punalea grisea (F).

حشرة من فصيلة القسايات، جسمها صغير القد، مفلطح، بجني اللون، بطول نحو ٨ سم، ثوبها الى الصفار البني تملوه شحمة ارجوانية وبشير اسمر ما يحمله اشهب الموضع. رأسها غروطي. خطمها مستد الطول. صينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كسولها قوي اللون. حقيقتها مدبة الطرف. ظهرها ابيض اللون. قدامها شفاف. بطنها الى الشبهه يملو في حثارة تجلج اسد || مرملها اوراق الاشجار الحرجية واقرعها باستثناء السنوبريات || راملها كريمة.

Somidia - صميدة *
تعريف عام يطلق على كل جسم مادي مركز ضمن الخلية يتأثر بمجال الجين السببي.

Scarieux (F). Scarious (E). - صمبل

نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل ما هو رقيق، جليفي وشبه شفاف أو مدغى.

Amphilius (S). - صميلة *
Amphilius (F). Amphilius (E).

سمكة بحرية بيوض من شالكات الزمانف وصيلة الزناريات. موطنها عند نهر البحر الاحمر الى المحيط الهندي لغاداي || جسمها مستطيل الشكل، قليل المرض، بطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الخضار البحري تملوه مابة فضية. رأسها صغير الحجم، مستطيل الخط الاسفي الشكل. زينتها الظهرية ذيلية الاركانز، مستطيلة المنحس الطرفي. الحاد من ميثاها انما تنفتح بطنها، الانبوي الطرف، ككل الحوام الحامزة فوق سطح الماء لتفتح فيه فتحتها || عندها متوسط الصنف مأكلي.

Thyrta (S). - صميلة *
Thyrta (F). Thyrta (E).

حشرة من فصيلة الصمليات روية حشرليات الاجنحة. اصلها تشمل بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف الموائع التي تكثر فيها الملمويات || جسمها صغير القد، شبه اسطواني الشكل. بسطها نحو ١٦ سم. رأسها مكور. صينها صغيرتان. زباناها مشطيان. خطمها مستد القد. ملامسها مستطيلة. اجنحتها مبطية ومدهجة. بطونها متكافئة السقف اللقيح. ظنايبها الخلفية رباعية المنحس || سرقتها كثيرة، لاهمة، تعيش على وزن النصال وقد تميل النصال الى لغافات شبيهة بالايواك.

Thyrididae (S). - صمليات *
Thyrididae (F). Thyrididae (E).

فصيلة حشرات من روية حشرليات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٩٠٠ منتشرة باكثريتها في المناطق الاستوائية من المابين القديم والجديد || اجسامها صغيرة صلبة، شبه اسطوانية الشكل. بسطها تراوح من ١٥

البلية، مستطيلة الراش الزركشة. ثوبها بني اللون تملوه رقة سمراء. تقسم قنار النصل وتحت مكنها على التناوب فينصف من رقات حاجية دقيقة لا تليث ان تكبر فيفسر فيها ويبلغ طول نحو ٣ سم. وهي تعيش كامل حياتها الحرة على شمع التناوب تنقص عليه.

Sphinx ligustri (S). Sphinx du crohob (F). - صنل الياسم *
Sphinx ligustri (S).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الوردي يتدرج بمجامع اسود ويغطي خط حطلي يملو سلك اسود. حقيقتها حطلية اللون تملوها جناة سمراء يحرقها حثار اسود. رواشها مزرقعة ومجلمة || رطلها كبيرة القد غليظة، ثوبها الى الصفرة الخضراء يتدرجها تجلج ابيض ونقط حر || تظهر في ايار ويقي حتى اواخر حزيران. تركب اوراق الياسم والليلك والازدرخت.

Sphinx ligustri (S). - صنل البتروج، صنل القريبيون، صنل المخطط

Calerio euphorbiae, Dellephila euphorbiae (S).
Sphinx de l'euphorbe (F).

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الوردية السمراء. رواشها بجيلة التخطيط والفتيح واقرعها البني والخضر || رطلها سوداء اللون، يضاء النشة النليقة، صفراء النقط الارجية، حواء الخط البنيج القاطب، صفراء الخط البني الجاني، سوداء الملمب. تظهر في تموز ويقي حتى ايلول، تركب اوراق البتروج.

Sphinx empress (F). - صنل هيرور

فراشة من حشرليات الاجنحة لدى ابو الحول السببي، اطلها.

Amphideuma (S). - صميلة *
Amphideuma (F). Amphideuma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صمليات التناوب وصيلة القناريات. انواعها المعروفة حديثة منتشرة في سطر بحر اقال. اصلها شبه مستديرة الشكل، قليلة الانحدار، ثنائية المصارع، وصيدة لورثالية الاستان الصغيرة. تعيش لاصقة بصخور المجامع المغمورة بالماء. لغتها قليل المادة والكتافة.

Sphingidae (S). - صمليات، هوكليات
Sphingidae (F). Sphingidae, Sphinx moths, Hawk moths (E). Schwärmer (D).

فصيلة حشرات من حشرليات الاجنحة المخططات الزناب. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ معظمها من القنارات البدوية للمرح. اشتهر اجناسها الصنل.

Myocetidum nobile (S). - صمبل *
Myocetidae remarquable (F).

نبات حشبي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحمصيات. ساقه متعصبة زياء تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه لحمية كبيرة شبه قلبية الشكل تطلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. نصلها بجيلة الخضار الزاهر. ازهاره متفويدي الجميع المتكاثف. ازهاره صغيرة الحجم، زقاء اللون، عادمة المرف || تنويره ديمبي.



صنل النسل الكبير



صنل الياسم



صميلة



صنبه



صميلة

١٦٥١٨ - صِنَاجَة ، مَاصُوث ، مَعْمُود Elephas primigenius (S), Mammoth (F), Mammoth (E).

نوع من القيلة البائدة التي عاشت الإنسان في احيائه القديمة المألوفة الى ما قبل التاريخ . وجنوا بعض جنسها واقفة على قوائمها عطفة من حيث الزين في شائع سيرية وغيرها من بلاد الشرق .

١٦٥١٩ - صِنَاج ٥ Séplon (F).

الصنَّاج صنفه داخلية مبرجة عنه بعض الرغويات كالخيار . وهو جسم بيض الشكل المستطيل ، عذب الصلابة طمعا ، ابيض اللون ، يتكون من مواد عضوية مزوية بكميات الكلس . وهو شديد الخفة اي قليل الوزن النسبي لانه كثير الفجوات التي يجمع فيها الازوت والحامض الكربوني .

١٦٥٢٠ - صِنَاج Pistane d'Orient (F).

هو الدلب الشرقى ، اطلبه .

١٦٥٢١ - صِنَاجَة

هي الشمس ، تستعمل لصيد السك .

١٦٥٢٢ - صِنَاعَات زُرَاعِيَّة

Industries agricoles (F), Agricultural industry (E).

الصناعات التي تصالغ المواد الالوية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والطور والزيوت .

١٦٥٢٣ - صِنَاعَة ، كَيْش ، رَقْلَة Fascine (F), Faggot (E).

اغصان واغصان ردا شبه توضع في وجه الماء لتحصيل قس منه الى مجرى آخر .

١٦٥٢٤ - صِنَاعَة التَحْمِير Zymotechnie (F), Zymotechnics (E).

١٦٥٢٥ - صِنَاعَة التَحْمُر Vinification

علم صنع الخمر وخطها وتجويدها .

١٦٥٢٦ - صِنَاعَة السِيَال Vannerie (F), Basket-making (E).

تشمل كل ما يصنع بقشبات الصلصات والخيزان والاسل وغيرها من سلال وينساف ، الخ .

١٦٥٢٧ - صِنَاجَة Totalité (F), Totality (E).

١٦٥٢٨ - صِنَاج مَبْدُول ٥

Crioccephalus rusticus (S), Crioccephalus rusticus (F), Crioccephalus rusticus (E).

حشرة خاشبة من فصيلة القرنييات ورتبة مفدمات الاجنحة . اعطائها معظم مناطق الصنوبر || انثا اكبر قداً من ذكرها تغزل من ١٨ الى ٢٥ م . اما ذكرها فتغزل من ١٢ الى ١٧ م . ثوبا الى السرة المغطاة الحمر الموالج . سرسها دجوي يتغير من الغروب الى الشرق || تقطر في اوائل حزيران ويقتصر حتى اواسط تموز . تمنع مكها في شرق لحاء الاجبار القائمة والمقطوعة فينتفخ برفات دقيقة صغيرة تتكسر وتكسر بسرعة وتدمر اللحاء والتشكير الى ان يحل زين الاكمال حيث تتحول الى حوريات ونها الى حشرات جلانة تجم السرايب في

الشكل لونها الى البسطة ثم ينحرف ويستقر على السرة . يكافح باستمال الفوطير المركزة على النحاس .

١٦٥١٠ - صِنَاء الصَلِيبِيَّات ٥

Peronospora brassicae, P. parasitica (S), Mildew des crucifères (F), Downy mildew of crucifers (E), Falscher Mehltau der Kreuzblüter (D).

وصم فطري يصيب سوق وبروع ولورق وزاد نباتات النضبة الصليبية اغصانها اللث والكرب والمفلون . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية غبراء اللون || تتحرف الى السرة تشوه الفروع والاوراق والازهار || يكافح كثير من الصناء باستمال مركبات النحاس .

١٦٥١١ - صِنَاء القَنَب

Peronospora cannabina (S).

وصم يصيب اوراق القنب سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية صفراء اللون ثم عطفية تصطب ليج الاوراق وتصب يباسها .

١٦٥١٢ - صِنَاء التَفَلُّ

Peronospora trifoliorum (S), Mildew des trèfles et luzernes (F), Downy mildew of alfalfa and clover (E), Falscher Mehltau der Luzerne (D).

وصم يصيب اوراق التفل والقصه والبطس . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية لا تراسه الشكل والرتب لونها الى البسطة ويلها موالج بنفسجي تركب فصل الاوراق وتصب يباسها || يستحسن حتى النباتات المصابة منه ظهور المرض وان تصطب الخش لسبب جوي فلا مانع من استمال الفوطير التنمسية شرط الانتاج من الخش قبل مرور ١٥ يوما على المكافسة .

١٦٥١٣ - صِنَاء الوَرْد ٥ ، مَبْدُول الوَرْد

Peronospora sparsa (S), Mildew du rosier (F).

وصم فطري يمتري الورد في اصغاله المولاة اغصانها الازراق ليؤذيها وقد يشوهها دون ان يقضي عليها بكاملها . سببه فطر مجهري من الصناء . مظهره الخارجي يقع صغيرة القد ، مزوانية الشكل ، جوية اللون ، بنسجية الموالج ، تركب حنار الاوراق واسناتها ولها الانتاد اللثية وماليج الازهار فطرستها وتصلها || يكافح باستمال الفوطير التنمسية او غيرها من الفوطير المركبة الحديثة .

١٦٥١٤ - صِنَاجِيَّات Peronosporaceae (S), Péronosporacées (F), Peronosporacées (E).

فصيلة الفطور الصائفة من رتبة الثشويات ورتبة البشيات || تشمل ثلاث عمارات : الحصبيات والنباتات والبرصيات . اما اجناسها وانواعها فمفيدة منها التسة والحصيف والصناء والصعل واللثة والنباغ .

١٦٥١٥ - صِنَاج Cardamina (S), Cardamina (F).

جس نباتات عشبية رية من فصيلة الصليبيات . انواعها نحو ٦٠ منها الحولية والخلولة والسرة . اوراقها مركبة متعاقبة حريفة الملاق . اقاربها بيض او ودية .

١٦٥١٦ - صِنَاج المَاء Cardamine des prés (F).

هو حرف الخقل ، اطلبه .

١٦٥١٧ - صِنَاج يَمْرِي هو حرف السوط ، اطلبه .



صناء الصليبيات



صناء الورد



صناب



صنار مبدول

١٦٥٢٥ - صَنْجِيَّةٌ * أَفْشُونُ ، ذَاتُ الْأَجْرَاسِ ذَاتُ الصَّلَاحِلِ ، كِرَوَال

Crotalus (S). *Crotale*, *Serpent à sonnettes* (F). *Rattlesnake* (E).



صنط

جنس حيات خبيثة من فصيلة الصنطييات لها في أذنانها ما يشبه الحراشف تحدث ما تتحرك أو تلتصق التربة صمًا كصوت الصنج || يكثر وجودها في البلاد الأمريكية ، يقضون عليها في الأماكن المروية بترية الخنازير لأن الخنزير يقتل منها ويقتلها ولا تستطيع الهرب سببًا لأن سمومها لا تفسد في جلده .

١٦٥٣٦ - صَنْطَابُ ، صَنْشِير
هو الجمل الصخم اللين : (F). *Chameau gros et gras*

١٦٥٣٧ - صَنْحَه * طَرْشِيلِيَا *
Tranzschelia (S).

جنس ظفور مجهرية قريبة الشبه من الصندية . تتميز ببنيتها البنية اللزجة الشكل اللين الانتشاب واللبان اللثة . سماها الساسية حديثة استوائية الإرتكاز . ذنبها كثيرة التمامات الزوية التجميع . دعائمها مؤلفة من خيلتين لا متجانستين الشكل استوائية الشكل واللبان كروية . أعينها منفصلة || أنواعه الاقتصادية قليلة أشهرها صنخة الخوخ .

١٦٥٣٨ - صَنْحَه الْخَوْخ *
Tranzschelia pruni-spinosa, *Puccinia pruni-spinosae*, *Acciduum punctum* (S). *Rouille du prunier* (F).

ظفر مجهرية يتطفل على معظم اللوزيات أصعبها الخوخ والنش ودرائق واللوز يلعب الأوراق ويضعف الأشجار ويضعفها || مظهره الخارجي بخور صغيرة جوية اللون لا تباينة التجميع تركيب النصل حل صفحت غسل بين المروق والفصل فطير البشرة به أن تصطب التسج . لثاها يكثف ألا يجمع وقرق جميع الأوراق به مغولها . لثاها ينفع الأشجار التي كان ظهر حل أوراقها الجسم يأسد القوالب الصمالة الشديدة الانحماص والالتصاق تؤك به الأوراق .

١٦٥٣٩ - صَنْدَرَه *
Luctopercia sandra (S). *Sandra* (F).

سمكة بحرية من القرصييات شالكت الزعانف . أطناها فصية الأجزاء تشغل معظم أشر البلاد المعتدلة الحارة للبحرية بحر الباردة || طولها من أرواح من ١٠ إلى ١٠٠ سم . ثوبها إلى الخضار الزهري يبلعها من جانبها توضع أسير ويزاد إسمرازا مع اقترابه من شبح الظفر || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .



صنخة الخوخ

١٦٥٤٠ - صَنْدَلُ
مجهرية من محيط التبغ الجاف يراوح عدد مشاكبيها ما بين ٣ و ٥ ح . صندل .

١٦٥٤١ - صَنْدَلُ
هو أرقية الصنوبر ، الطلها .

١٦٥٤٢ - صَنْدَلُ
Santalum (S). *Santal* (F). *Sandalwood* (E).

جنس نباتات صمرة برية وزراعية صناعية من فصيلة الصندليات . أنواعه ثمانية منهاها الشرق الأقصى جميعها جنات وأشجار صغيرة القد ، أوراقها معتقة متضاربة لونها زاهي مغنوي التجميع ، إبطي وثلاثي الإرتكاز . أزهارها خشوية . ثمارها نوية . بذورها سود . تزود أخشابها للصنوبر اللين ، اللطيفة الصنف . أخشابها



صندر

طلب الحرية والكم وتفيد سببها الأولى مع حلول شهر حزيران || أضرارها شديدة القوي لأنها تنسب الأشجار اللطيفة وقد تسبب يباسها .

١٦٥٣٩ - صَنْطَابُ *
Ceanobita (S). *Ceanobita* (F). *Ceanobita* (E).

جنس دوبييات بحرية من القشرييات عشاريات الأبريل طويلا الذيل وفضيلة الباغوريات . أنواعه المرفوعة قليلة العدد منتشرة قرب شواطئ البلاد الاستوائية والشمالية نحوها || أجسامها مستطيلة الشكل ، صدرها قصير المتك . تتميز بانقباضها في الإصداق المجهورة ولا تقني سوى بطونها عند الانتقال || أشهر أنواعها الصنطاب الأخضر (C. rugosa) الذي يكثر وجوده قرب شواطئ المحيط الهندي والبحر الأحمر .

١٦٥٣٠ - صَنْبُوبِ *
Pila (S). *Pelle* (F). *Pila* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصنوبييات وقبيلة ذوات الجناسين . أنواعه المعروفة عديدة أطناها منظم أقطار العالم || أجسامها متوسطة الحجم تطول من ٨ إلى ١٠ م . رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة . حوزها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستثمارية صغيرة ، تحمله . ملاسها صغيرة . أصطافها متوسطة الحجم . كواسلها مستطيلة ، ثنائية التحديق ، مبعثرة الحلب . بطونها اهليلجية . رواشها كبيرة . قوائمها نشيطة . أظفارها عديدة ، جميعها وسيدة اللون || الجمللة واضحة تألف المروج والنباتات . البرقة نعمة تخرج الجلود والسوق فتقضي لثبات الذي تركه .

١٦٥٣١ - صَنْبُوبِيَّات *
Pallidus (S). *Pallidus* (F). *Pallidus* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناسين . أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم . تألف المروج والنباتات ، ترطب في المروج أرضية || أجسامها هياض تولى من ٦ إلى ١٢ م . رؤوسها مكورة ، مستقلة . حوزها فارقة عند الشقين . قرونها الاستثمارية خيطية متفارقة الطول . ملاسها صغيرة أو ضامرة . كواسلها مستطيلة . بطونها اهليلجية . رواشها كبيرة . قوائمها نشيطة . أظفارها باعثة || الحشرة الجملدة تمشي على سطح الأزهار ورحيقها البرقة تعيش في جذور النباتات المختلفة ونسها الجزر واللفت والمفلوف || أشهر أجناسها الصنبوب .

١٦٥٣٢ - صَنْبُورُ
النخلة دقت من أصلها وانجدر كرها يقل لحمها . والنخلة تخرج من أصل النخلة الأخرى من غير أن تفسد .

١٦٥٣٣ - صَنْبُورُ ، صَنْكِيَّةُ
Robinet (F). *Cock*, *Tap* (E).

جهاز يسمح لسوائل الحوض ، من ماء وغيره ، بالمرور أو بالخروج عند الطلب .

١٦٥٣٤ - صَنْجِيَّات * أَلْفُونِيَّات *
Crotalidae (S). *Crotalidae*, *Rattlesnakes* (E).

فصيلة حيات سامة من انوبييات الأفاعيد . أجناسها وأنواعها عديدة جميعها خبيثة سامة تتميز برؤوسها اللطيفة واحداثها الدقيقة ويوجد نقرة واضحة جلدية بين الانف والعين .

١٦٥٥٠ - **صَنْدَلٌ**
Caranx saurus (F).
سمكة بحرية تسمى شيم صندون، اطليها .

١٦٥٥١ - **صَنْعُ الْمَلَك، مَلَكَج**
Malage (F).
Malting (E).
عملية تحويل الشعير وغيره من الحبوب الى ملت أي حبوب ناشئة (نايلة) .

١٦٥٥٢ - **صَنْف**
Qualité (F). Quality (E).
خاصة الشيء القيمة .

١٦٥٥٣ - **صَنْمَكَة**
Hamp de la plume (F).
Staff of the feather (E).
قصب الريش استعملت او غلظت .

١٦٥٥٤ - **صَنْهَج**
Critère, Critérium (F).
Criterion (E).
هو طابع الحقيقة الحاسم الذي يمكن من التقدير والفصل .
ج. صناع .

١٦٥٥٥ - **صَنْوِير**
Pinus (S). Pin (F). Pine-tree (E).
جنس الشجار حرجية وصناعية من فصيلة الصنوبريات .
انواعه عديدة . بعضها متسقة . تشوبها سلفة . اغصانها متفرعة . غراصيمها ضيقة الاكواز . اوراقها ابيدة عديمة مختلفة التجميع . ثمارها اقواز ريمية الشكل او مريضة . جميعها من الاشجار المقيمة الدائمة الاثمار ويستخرج من بعضها مادة راتنجية لها استعمالها الصناعي المشهور .
أصنف واثني أنواعه المزروعة ما يقع .

١٦٥٥٦ - **صَنْوِيرٌ أَيْضٌ**
Pin blanc (F).
هو صنوبر ويوت ، اطليها .

١٦٥٥٧ - **صَنْوِيرٌ أَحْمَر**
Pinus resinosa (S).
Pin rouge (F). Red-pine (E).
شجرة مبرقية مهدا أمريكية الدالية . خشبها احمر اللون غزير للمادة الراتنجية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اغصانها فارشة . غراصيمها جوية حادة المنسل . بتاتها خفيفة قصيرة حراء اللون . اغصانها شفعية ، ثنائية التجميع . نصلها عيني الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ويعرض نحو ١ سم . وهو مسنن الحافة حائض الخضار . اكارها مخروطية ، صندرية ، طولها نحو ٥ سم . وقطر قاعدتها ٣ سم . جريهاها صاجية الشويز لونها الى البقرة الزرقاء المزاج . يعيش ويوجد في جميع المناطق المعتدلة والاربية الصيفية البور .

١٦٥٥٨ - **صَنْوِيرٌ أَرْمَنْدِي**
Pinus armandi (S).
Pin Armand (F). Armand-pine (E).
شجرة مبرقية تزيينية سريعة النمو مهدا الشرق الاقصى تكثر في الصين واليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها انيقة الاكواز . غراصيمها وبتاتها حادة المادة الشمعية الزرقية . راصها يضيئة ، صندرية ، ذلقة ومديبة . اغصانها وريية . خلسية التجميع ، نصلها جامد الصفة المنطقية .
السلطان مرقى الشكل يتم في حدود الزلزم الاول . اكارها مخروطية طولها يراوح بين ١٥ و ٢٠ سم . وريهاها ٨ الى ٨ سم . لونها الى الخضرة المتساقطة الاثنية . جريهاها مثلك الزوايا . منبسطة الفترة الدائرة الحمار . يعيش في جميع اقاليم الصنوبر دون ان يتأثر كثيراً بنوع التربة .

ناعمة الرقعة ، شديدة الصلابة ، حطرية اللون لا تقربها حشرة ولا يفسدنا الزمن .

١٦٥٤٣ - **صَنْدَلٌ أَيْضٌ**
Santalum album (S).
Santal blanc (F). White sandalwood (E). Weisser sandelbaum (D). Sandalo bianco (I).
نوع من الصندل الزراعي المشهور باخشابه الصناعية الفاخرة وبسوطه الطبي الثابت الاستعمال . يربط في المولع الحارة ذات الارربة الخصبة . يتكاثر بالبذور وينمو في مستنقعات الجبال الى المائلاته لا يتفرق على القتل . ثمرته تملو من ٦ الى ٨ اثمار . خشبها غزير المادة الصلابة يحرق نحو ٥ ٪ .

١٦٥٤٤ - **صَنْدَلٌ مَرْجَانِي**
Adenanthera (S). Adénanthere, Bois de corail, Crête de paon (F). Red sandalwood tree, Coral tree (E). Korallenbaum, Phänakamm (D). Pavoniana, Sami di corallo (I).
شجرة حرجية طيبة صناعية وزيينية من فصيلة القرنيات القرنالية . مهدا البلاد الاستوائية . تملو نحو ١٢ م . ساقيها سرسة ، اوراقها متعاقبة مركبة ريشية . ازهارها سليل التجميع ، مرقى الشكل ، ابيض الاكواز . ازهارها غشوية صفيرة الحجم ، حشوية الكأس والورقيات ، ضيقة الالوان الوردية . ثمارها اقرون ليلية ضيقة مستطيلة محببة . يزورها يضيئة الشكل شفيدة الصلابة تستعمل في صناعة السبعات . اغصانها مرجانية اللون صناعية . جلودها طيبة مقيية .

١٦٥٤٥ - **صَنْدَلَان**
Pterocarpus santal (F).
هو الثورز الصندل ، اطليها .

١٦٥٤٦ - **صَنْدَلِيَّات**
Santalaceae (S).
Santalacées (F). Santalaceae (E).
فصيلة ثنائية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات . اغصانها واناملها عديدة التجميع الى ثلاثة اسباط . نباتاتها احباب ونباتات وبجيرات مغطيا ويض طويلاً يرقم الحلية وعمل وتليفات الخشبية .

١٦٥٤٧ - **صَنْدَلُوقُ الْاَدَمْعَر**
Caisse de prévoyance (F). Foresight chest (E).
منشأة خاصة في بعض المصارف والكرات تنظم لاجل تحسين حالة المستفيدين والمال بالتصاع نسبة مئوية من اجورهم وادخلها لم يضاف اليها مملها من رب العمل او احباب الشركة . واشهر ثرونها ان لا تكتف الى اصحابها الا منته مفاداة العمل .

١٦٥٤٨ - **صَنْدَلُوقُ التَّوْقِير**
Caisse d'épargne (F).
Savings-bank (E).
نظام تنبه بعض الحكومات والمصارف قواصم التشجيع على التوفير وحمل الناس على الاقتصاد . فكل من يربط في الادخار يطلب دفراً يحرقه باسمه فيخرج بمقتضاه مبلغاً لا يقل من كمية محدودة من شاد ذلك . ويحسب له ربح على ودائمه . وله ان يسحب ما يربط في محبه على ان لا يتجاوز مبلغاً معيناً في يوم واحد .

١٦٥٤٩ - **صَنْدَلُوقُ الرِّزْم** ، **هَنْدَلُ**
Caisse de manipulation (F). Manipulation chest (E).
صندوق ميكانيكي الجوانب لا قمر له رزم فيه نباتات التبع عند تقنيتهما سفياً متناحية مراكبة الى ان تبلغ الارتفاع المطلوب .



صندل ابيض



صندل مرجاني

١٦٥٦٤ - صَوْنَرُ بُنْج Pin de Bungo (F).

هو الصنوبر الصيني، أصله .

١٦٥٦٥ - صَوْنَرُ جَرْدِي

Pinus montana (S). Pin à crochet, P. mugo, P. de montagne (F). Swiss mountain pine (E). Krummkiefer, Mugokiefer (D). Pino mugo, P. alpino (I). شجرة سروية تملو من ١٥ م. أصلها مغربية. قنبا مخروطية الشكل، أهدابها شفافة ثنائية التجميع. تلتصق إلى الخصار المايك. أكرانها مسطلة ممددة تتناسق. جرهاتها جزئية اللون، بارزة القترنة المنقطة السن || يعيش في جميع الأثرية الجبلية وبين الصغور، يتصلل البرد المستمر ولا يتغاد.



صنوبر اسود

١٦٥٦٦ - صَوْنَرُ حَبِينِي Pinus halepensis (S).

Pin d'Alep, P. de Jerusalem (F). Aleppo pine tree, Jerusalem pine (E). Aleppokiefer, Aleppokiefer (D). Pino d'Aleppo, P. di Gerusalemme (I).

شجرة سروية تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. أصلها مغربية. غراحيها سطحة اللون. يتألقها دقيقة. براعمها شفافة الشكل. أهدابها شفافة، ثنائية التجميع، تلتصق غشبي الشكل زاهر الخصار يطول نحو ٨ سم. ويخرج من ١ إلى ٢ م. أكرانها ممددة طولها نحو ١٢ سم. وقطر قاعدتها ٤ سم. جرهاتها شارة القترنة المنبسطة لونها إلى البازرة السهام اللؤلؤ || يألف الأثرية الجبلية ومجيد فيها تمامًا.



صنوبر بحري

١٦٥٦٧ - صَوْنَرُ حَمَلَا Pinus excelsa (S).

Pin pleureur de l'Himalaya (F). شجرة جادة صنعية وزينية سرية التملو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أصلها أفقية فائقة. يتألقها خيطات الأطراف المتدلية. براعمها شفافة، مغطوة، حادة الزانج والمادة الصفية. أهدابها وريّة، خالصة التجميع. تلتصق جامد الصفة الخيطية للشدة الاغتمار. أكرانها مخروطية طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. ويخرج من ٧ إلى ٧ م. لونها إلى السمرة الخيطية السهام اللؤلؤ. جرهاتها لينة القترنة المسطرية البارزة || يرغب في الآمال والمواقع الرطبة.



صنوبر بري

١٦٥٦٨ - صَوْنَرُ كَهْرُو Pinus cembra (S).

Pin cembra, Ahlar, Arolla, Auvier (F). شجرة سروية تملو من ٨ إلى ٢٠ م. ساقها متعينة متناوبة الاوصاج. أصلها خضراء. غراحيها وبناتها خيطية، كثيفة الزغب المسطحة. براعمها شفافة الشكل مدبسة الأطراف. أهدابها وريّة، خالصة التجميع، تلتصق جامد الصفة يطول نحو ٧ سم. لونها إلى الحمرة الزرقاء. أكرانها مخروطية، مغطوة للقاعدة. طولها نحو ١٥ سم. وقطر قاعدتها ٦ سم. جرهاتها لينة القترنة القديمة الضدة، لونها إلى السمرة البنفسجية.



صنوبر جردى

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ صِينِي، صَوْنَرُ بُنْج Pinus bungeana (S). Pin de Bungo (F).

شجرة كبيرة أقدم منها الصين. ساقها متعينة تملو من ٢٠ إلى ٣٥ م. قنبا أجاسية الشكل. تشويها سلفة مسطلة الصفائح. أصلها أفقية الجلبوس. أهدابها وريّة، ثلاثية التجميع، تلتصق جامد السنج، وبات اغتمار، يطول نحو ٩ سم. أكرانها مدبسة اللد، شفافة الشكل، تطول نحو ٦ سم. جرهاتها بارزة القترنة الضدة، لونها إلى الخيطي الاسمر اللؤلؤ || يزود لأغراض الحياة المصنّف لكنه يندر من الانتاج الجالصة التي لا تجيد إلا في مواقع خاصة ضمن إقليم معين.



صنوبر حلبي

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ أُسُود*، صَوْنَرُ لِسِيُ

Pinus laricio (S). Pin noir, P. laricio, P. de Corse, P. d'Austrice (F). Corsican pine, Austrian pine, Larch pine (E). Schwarzkiefer, Koralschicht (D). Pino laricio, P. di Corsica (I).

شجرة خضراء دائمة. ساقها تملو من ٣٠ إلى ٥٠ م. قنبا مريّة الشكل. أصلها مغربية فائقة. غراحيها وبناتها خيطات الجسم خيطية اللون. براعمها بيضيه مدبسة الأطراف. سراسفها كثيفة متراكمة ذرية. أهدابها شفافة. ثنائية التجميع. تلتصق جامد الصفة، مسن الحلقه، بحري اللون. أكرانها مخروطية تطول نحو ٧ سم. وقطر نحو ٣ سم. جرهاتها بارزة نازحة، قنبا متصالية التصفيد لونها إلى الخيطي الاسمر يطول مروج اصفر || يرغب في الملقح الرطبة يدر من الانجاب السرية النمو.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ الْبَحْرُ

Pinus taeda (S).

Pin à l'ancres (F). شجرة سروية خضراء تملو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أصلها مغربية فائقة. غراحيها وبناتها كثيفة التجميع خيطية اللون. براعمها مخروطية، جزئية المرافش المخرشة. أهدابها وريّة، ثلاثية التجميع، تلتصق جامد الصفة بحري اللون يطول نحو ٢٠ سم. ويخرج من ٢ م. أكرانها مخروطية الشكل تطول نحو ١٠ سم. وقطر نحو ٤ سم. لونها إلى السمرة السهام اللؤلؤ. جرهاتها مدبسة القترنة النازحة الخيطية المتصفيد || يندر من الانجاب السرية النمو التي تجيد في جميع المواقع والأثرية المتصلة الرطبة. غشبه لزيز المادة الزانجية البخورية العرف.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ الْكَبْشَان Pinastre (F).

هو الصنوبر البحري، أصله.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَحْرِي*، صَوْنَرُ الْكَبْشَان

Pinus pinaster (S). Pin maritime, P. de Bordeaux, Pinastro (F). Swamp pine, Sea-side pine, Cluster-pine, Pinaster (E). Starnkiefer, Seekiefer, Bordeauxkiefer (D). Pino maritimo, P. pinastro, P. di Bardo, Pinastro (I).

شجرة سروية كبيرة خضراء. ساقها تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. تشويها صفة مسطلة التصلب لونها إلى الحمرة البنفسجية. أصلها خيطية متصلة الانفراج. غراحيها جزئية اللون. براعمها مخروطية الشكل كثيفة المرافش المتراكمة. أهدابها شفافة، ثنائية التجميع، تلتصق جامد السنج، داكن الخصار، يطول نحو ٣٠ سم. أكرانها ممددة الشكل متدلية تطول نحو ٢٠ سم. لونها إلى البازرة المابقة للامدة. جرهاتها بارزة، قنبا الشكل ضدة القترنة || يعيش في جميع الأثرية. اقليمه للمناطق الساحلية أصحها الأماكن الرطبة حيث لا يصلح غيره.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَرْي*، بَرْي

Pinus sylvestris (S). Pin sylvestre, Pinasso, Pin de Norvège, P. d'Ecosse (F). Scotch pine, Birch apple (E). Nordische Kiefer (D). Pino sylvestre, P. silvestico, P. comune (I).

شجرة سروية تملو من ٢٠ إلى ٤٠ م. أصلها خيطية الانفراج. غراحيها شفافة متطابقة. يتألقها مخروطية الشكل سراسفها مدبسة. أهدابها شفافة ثنائية التجميع، تلتصق إلى الخصار الأزرق. أكرانها ممددة طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٣ سم. جرهاتها فائقة الخطر. يزويها دقيقة مجنسة || ترضب في الأثرية الرملية.

الحراشف والعلف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة أو خماسيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة الخيطيّة، لونها الى الزرقة البحرية. اكرانها غرويطيّة، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٥ سم. لونها الى الصفرة المائلة للآدميّة. بذورها لوزيّة الشكل مأكولة الالباب. البويجا يبيغ الشكل يطول نحو ١٠ سم. ويعرض من ٧ الى ٨ سم. وهو مستحب الطعم غريز المادة الصنيعة.

١٦٥٧٦ - صَوْبَرٌ مُصْفَرٌ *
Pinus pinea (S).
Pin pignon, P. pinier, P. parasol, P. bon, P. d'Italie (F). Italian stone pine (E). Steinkiefer, Italienischekiefer (D). Pino pinea, P. da pinocchi, P. gentile, Pignolo (I).

شجرة سبروتية تكثر زراعتها في لبنان وفي مختلف تهايم وهضاب المتوسط من فلسطين الى ايطاليا والاندلس. ساقها جالسة مستقيمة تملو من ٢٥ الى ٣٥ م. قشورها مقلعة، سلسة، ممرّسة الطبقات. اغصانها غليظة فارشة. قنبها مظلمة الشكل. اغصانها سحطية اللون، صفراء المولج. بناتها مستقيمة. راعمها اسطوانية. حراشفها جامدة الكوب ناشرة. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة، عاتق الحصار، يطول من ١٢ الى ٢٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها بيضيّة الشكل مقلمية القاعدية، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. وعرضها قطرها من ٦ الى ٨ سم. جرهاتها شاذلة ناشرة، لونها الى الخمرية الصنافية السفماء المولج || يعيش ويجمد في جميع الارربة الا انه بطيء النمو. بذور ثماره مأكولة وتستخدم في الطعام والحلويات.

١٦٥٧٧ - صَوْبَرٌ مَنَقِيحِي *
Pinus palustris (S).
Pin palustre (F). Pich-pin (E).
شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. ساقها جالسة مستقيمة كالشعنة. اغصانها صخرية اقلية الايزكان، غراحمها وبناتها كثيرة العدد متركبة. راعمها بيضيّة الشكل، قطنية الحراشف اللينة. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها غرويطيّة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ويعرض من ٥ الى ٨ سم. جرهاتها سحطية اللون يطولها مولج آخر || يرشب في المواعظ الرطبة العميقة الغور. احشائها لينة، جيدة الصنف، شاملة الاستعمال المنزلي والصناعي.

١٦٥٧٨ - صَوْبَرٌ مَتَيَّ *
Pinus lambertiana (S).
Pin à sucre (F).
شجرة سبروتية جبابرة بطيئة للنمو تملو من ٥٠ الى ١٠٠ م. مهيمة البلاد الامريكية. ترشب في الاقاليم الرطبة والارربة العميقة الغور. غصنها ثقيل الوزن، اصفر اللون. احمر القليل. اغصانها خضرة فارشة. راعمها خدرطية الشكل، متركبة الحراشف الجلورية اللون. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها شديد الانغصان، جامد الصفحة للظلمة الزوايا، يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٢ سم. اكرانها غرويطيّة كبيرة اللد طولها يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. وعرضها من ٨ الى ١٢ سم || وهو يتنبز بما تلوّزه بناتقه وراعمه من مادة سكرية تخبه المنبت.

١٦٥٧٩ - صَوْبَرٌ وَيَمُوتُ *، صَوْبَرٌ أَبْيَض *
Pinus strobus (S).
Pinus lardus (F). White pine, Weymouth pine (E). Weymouthskiefer, Gemeine Weimutskiefer (D). Pino di weymouth, Pino bianco (I).

شجرة كبيرة الحجم تملو من ٣٠ الى ٥٠ م. اغصانها

١٦٥٧٠ - صَوْبَرٌ كَثِيفُ الزَّهْرِ، صَوْبَرٌ يَابَانِي *
Pinus densiflora (S). Pin densiflora (F).
شجرة سبروتية مهددة اليابان تملو من ٣٠ الى ٣٥ م. شكلها شكل الصنوبر المحلي. اغصانها مغنبرة. غراحمها حطراء اللون. بناتها غليظة. راعمها غلورية مغنبرة الحراشف. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها الى الحصار الارزق يطول من ٨ الى ١٢ سم. ويعرض نحو ١ سم. ايزوايا كثيفة متركبة. اكرانها ريمية صخيرة اللد، جرهاتها منبسطة متوسطة النشور لونها الى الحمرية السطلاء المولج || يعيش في جميع الارربة والمواعظ المعتدلة وهو في الاقاليم الرطبة اسرع نمواً واقل مادة راتنجية.

١٦٥٧١ - صَوْبَرٌ كَثِيفٌ *
Pinus brucei (S).
Pin de Calabre (F). Calabrian cluster pine (E). Kalabrischkiefer (D). Pino calabrese (I).

شجرة سبروتية تملو من ٢٥ الى ٣٥ م. اغصانها مغنبرة. غراحمها سطلاء اللون. بناتها غليظة. راعمها غلورية. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها غصلي الشكل، باعد الحصار، يطول من ١٤ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ سم. اكرانها ريمية، طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٥ سم. جرهاتها عددة القترّة القليلة النشور. لونها الى السرة الصنافية السفماء المولج || يعيش في جميع الارربة والمواعظ المعتدلة.

١٦٥٧٢ - صَوْبَرٌ كَنْتَالِيَّة *
Pinus canariensis (S).
Pin des Canaries (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. ساقها فرواه. فرجها خضرة صخيرة اللد. غراحمها نمجية. بناتها وراعمها مسنة الحراشف الجالسة الاطراف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويعرض نحو ١ سم. اكرانها غرويطيّة مسطليّة، لونها الى الخمرية اللامعة، متوسط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ٥ سم. جرهاتها مميّة القترّة البارزة المهددة || يصير من الانواع البريانية المعتدلة للنمو.

١٦٥٧٣ - صَوْبَرٌ كَوْرِيَّة *
Pinus korstenii (S).
Pin de Cordé (F).

شجرة دائمة تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها خضرة كبيرة. غراحمها وبناتها غليظة فضية اللون. راعمها غلورية، قطنية الحراشف. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها مغنق الصفحة، مسن الحافة، يطول نحو ١٢ سم. اكرانها غرويطيّة غليظة، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. وعرضها من ٥ الى ٧ سم. جرهاتها مظلمة الزوايا، ناشرة القترّة، لونها الى السرة الصفراء || يصير من الانماجر السبروتية البريانية السريعة النمو التي تجرد في جميع الاقاليم والمواعظ المعتدلة الرطوية.

١٦٥٧٤ - صَوْبَرٌ لَرِيصِي *
Pin Laricio (F).
هو الصنوبر الاسود، اظلمه.

١٦٥٧٥ - صَوْبَرٌ لَوْرِي *
Pinus edulis (S).
Pin à amandes (F).

شجرة سبروتية زراعية متوسطة الحجم مهددة بلاد المكسيك وجولوا. تملو من ٣ الى ٦ امتار. قنبها هريمة الشكل. اغصانها متوسطة الانحراج. غراحمها وبناتها غليظة الاطراف. راعمها غلورية، سحطية اللون، غبراه



صنوبر مشر



صنوبر ويوت

١٦٥٩٢ - صَوَاذِي
الصوادي : النفل أكلال وقد تكون بمنى التي لا تثرب .

١٦٥٩٤ - صَوَاوَر
Troupeau de gros bétail (F). Drove of cattle (E).
هو قطع البقر والجواميس .

١٦٥٩٥ - صَوَاوَر
هو الصفور الذي يجب إذا دعي .

١٦٥٩٦ - صَوَان ، صَوَانْ
Silex, Silica (F). Silica (E).
هو السيليس .

١٦٥٩٧ - صَوَانَاة
في السيلكا ، المطبا .

١٦٥٩٨ - صَوَانِي
Granitique (F). Granitic (E).
ما كان تركيبة من الصوان .

١٦٥٩٩ - صَوَاي ، زَوَاي ، زَوَاوَر
Maraca (S).
Marica, Marique, Casard siffleur (F). Widgeon (E).
جنس طير من البطيات انزله ثلاثة واحد اسوي وثلاث
امريكيان . جميعها كبيرة الجثة ، حادة الزنبرك ، تنسج
بمقننهما للفلسة التي لا يبدل طرفا على الرأس . مناقشا
صغيرة متباعدة ، اجنحتها منطوية عند زائفة ، تقضم
الاصحاب كالزور ويتجنب غمر الماء والامساك كما يفعل
البط || اما انزلها الثلاثة فهي :

صَوَاي امريكة

M. americana (S).

صَوَاي الشرق

Marque americaine (F).

M. penelope (S).

صَوَاي بجلان

Marque pénalope (F).

M. sibirizix (S).

Marque de Magellan (F).

نفس منها بالتحلية الصوي الشرق .

١٦٦٠٠ - صَوَاي الشرق

Marque penelope (S).

Marque pénalope, Vigeon (F). Widgeon (E).

طائر من الصوي ربح الجثة طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه

مزاكب الالوان ، جميل الزواوي والقرمكة . فيه الابيض

والاصفر والاشير والصناني والرمادي والاسمر والاسود .

هناك مستطيان . متقارب الى القربة الحمراء . سلاله وباديتان .

وهو من القواطع يحرب الشرق والغرب ، يألف البسرات

وتجاري الاخر . قوت الاغصان وسط القلوبيات المائية .

يشن شدة في الغضب على شفة الماء . انشاء تينش وتجنش

من ٨ الى ١٠ ابيض . يألف السنين اذا اخذ صغيراً

لكه يتطلب الكثير من الماء وما يتبع الماء من الاقشريات

والغشرات || سره متفاوت القدر يد من ٢٠ الى ٨٠

وأكثر .

١٦٦٠١ - صَوْب

Point de direction (F).

Point of the direction (E).

نقطة الاتجاه .

١٦٦٠٢ - صَوْب

الصوب : زُرول المطر . صاب المطر صوباً وانصاب :

انصب وطل وأهبر .

١٦٦٠٣ - صَوْبَة

Tin de graines (F).

Heap of seeds (E).

الكومة من الحبوب على اختلاطها .

١٦٦٠٤ - صَوْت

Voix (F). Voice (E).

الصوت هو حركة اهتزازية تحدث من اضطراب الاجسام

للمادية كالقوافل فيوصل اثرها الى الاذن || ويطلق الصوت

على الاحساس السمي نفسه || ولكي يكون الصوت

خضة فاشرة . نراهيها وينالها غليظة ، قلنية الزنب .
رأصها يضيء الشكل مدنية الاطراف . سرانها تنية
اللون يضاء اخار الكيف الزنب . احداها وربة ، خلية
التصنيع ، تسلفا ثلاثي الزوايا ، جهاد الصفة ، يجري
اللون . اكرانها مدنية الشكل تطول نحو ٢٠ سم . وتعرض
، سم . جهاتها منخفضة الحافة ، منبسطة القبة المتساوية
الصفة . لهذا الى السرة الخفية || يرض في الازربة
الزلية والمواقع المحدلة الرطبة وهو فيها سريع التنو .

١٦٥٨٠ - صَوْتَر يَابَانِي
Pin densiflora (F).
هو الصنوبر الكيف الزهر ، اطليه .

١٦٥٨١ - صَوْتَرِيَاة ، صَوْتَرِيَاة ، كَرَز
Cône, Pomme de pin (F). Pine-cone, Fir-cone, Fir-nut (E).

شكل من اشكال اثمار . وهي ايضا ثمرة الصنوبر والارز
والتنوب وغيرها من اشجار فصيلة الصنوبريات . تحليتها
العلمية : محور وصفت عليه قنابات لينة جامدة تنسج
جهرات تحمل كل منها غشاء وزرئين مجتمحين .

١٦٥٨٢ - صَوْتَرِيَاة ، صَوْتَرِيَاة

Confiserie (S). Confiserie (F). Confiserie (E).

فضيلة لينة من باديات الزهر هراء الى الزور تشل
ثلاثة اسباط : التوتويات والسروريات والطقوسيات .
اجتناسها وانزلها كثيرة العدد معظمها اشجار راتنجية صناعية
شائعة الاستعمال .

١٦٥٨٣ - صِهَاء

Sources d'eau (F). Springs (E).

الصهاء : منابع الماء .

١٦٥٨٤ - صِهَاءَاة

Magma (F). Magma (E).

الصهارة وتسمى بها كل مادة يصره شدة دائمة كالزجاج
المصهور او كالفلح الذي يغلف به البركان عند ثورانه .

١٦٥٨٥ - صِهَاءَاة

Moelle (F). Marrow, Mechin (E).

هي النخاع الشري وهي المكاء .

١٦٥٨٦ - صِهَاءَاة

Vin blanc (F).

Colourless wine (E).

الخمر البيضاء .

١٦٥٨٧ - صِهَاءَاة

Enologie (F). Enologie (E).

علم صناعة الخمر يشمل كل ما يتعلق بصناعتها وتحليتها
وتغفلها الخ .

١٦٥٨٨ - صِهَاءَاة

Citerne (F). Cistern (E).

وعاء يحكم البند كثير الاستعمال يستعمل لنقل السوائل .

١٦٥٨٩ - صِهَاءَاة

Hennissement (F). Neighing (E).

صوت الخيل عاة .

١٦٥٩٠ - صَوَّ

في البحاري الصغيرة ، اطليا .

١٦٥٩١ - صَوَاوِيَاة

Rationalisme (F).

Rationalisme (E).

الصوابية مذهب فلسفي لاهوتي يعتبر العقل محور السلطة
وبرسمها المريد فينفي الوحي والتسلسل الى العرف التتليدي .

١٦٥٩٢ - صَوَاوِيَاة

Pollen

غبار الى الصفرة سكون من جذرات الطلع ينشأ في المبر

اي في الجزء الاقل من السداة وذلك في باديات الزهر .



صَوَاي الشرق

صوت الظلم	المرار	مسموحاً يجب ان لا تقل ذبذباته في الثانية عن ٣٠ اهتزازة
صوت الضج	المشعر	ولا تزيد من ٣٠٠٠ اما سرعه في الهواء فمطلبا ٣٣٠
صوت المفق	القممقة	متراً بالثانية وهي تتأثر بشدة وبالوسط الذي ينتقل فيه.
صوت التمايل	الشدقة	اما سرعه في الماء فتبلغ ١٤٣٥ متراً ولصوت اسماء
صوت الذئب	المواء	كثيرة عند الحيوان والعلير ، ذلك لان الاصوات تختلف
صوت الثور عند اللع	المنغمة	مع اختلاف مساحدها وقد وضعنا في الجدول التالي ،
صوت الابل	القليل	الذي نودوه ايجدياً ، كل ما تيسر من هذه الاسماء :
صوت الحية من لها	الصحيح	صوت المزي
صوت الجندب	الفصيص	صوت البيط
صوت الخنزير	القياح	صوت القليلة
صوت الفحل من الابل	القنينة	صوت ثقب الخيل عند حفرها
صوت الفحل من الابل	القرقرة	صوت المكاء
صوت الضبع الاتي	القشاح	صوت المصفور
صوت القطا	المنطقلة	صوت القم
صوت المقاب	القممقة	صوت القنان
صوت البعر	القلغ	صوت البقرة
صوت الذئب	القهاق	صوت الحام
صوت الدجاج	الحقنقة	صوت الحيقان
صوت الدجاجة	القواء	صوت الدواب عند طلبها الملق
صوت الابل	الكت	صوت الحرة في تماسها
صوت الجارو والسرکه	الكسكة	صوت الخيل من بطونها
صوت الابل	الكش	صوت الخيل عند طلبها الملق
صوت الحية من جلدها	الكشيش	صوت البقر
صوت الفأرة	الكعيس	صوت الناقة المرضع
صوت الغراب المجهود	الكيد	صوت ذوات الخلف
صوت القفق	الققلقة	صوت البيط والاوز
صوت الحر	المواء	صوت الغراب
صوت الكلب	التياح	صوت الفحل من الابل
صوت التيس	التيب	صوت الببو
صوت الظبي	الزيب	صوت القرد
صوت الغراب (بالين)	التيب	صوت المصفور
صوت الغراب (بالخير)	التيق	صوت النمامة
صوت الدجاجة	التنقة	صوت الاحد
صوت الضفادع	التنيل	صوت القمري
صوت الاسود	التبوت	صوت البغل
صوت الحسير	التبوق	صوت البغل
صوت القليل والبروم	التشم	صوت الكيش والتيس
صوت الخلد	المخددة	صوت الحمار
صوت الابل	المخدر	صوت الصرد
صوت الحام	المخيل	صوت البراة
صوت الفسان	المرفرة	صوت الجراد
صوت الكلب عند الاستنكار	المزير	صوت النسر
صوت الورشان	الوت	صوت الديك
صوت صغار المصائير	الوصيح	صياح الطائر
صوت الذئب وابن آوى	الوصوعة	صوت الخيل
صوت الصرد	الوق	صوت النبل
صوت الخيل من بطونها	الوقيب	صوت الديك غامة والعلير حامة
صوت الابل	اليجار	صوت الثعلب

١٦٦٥ - صوتان ٥

Helminthosporium, Ophiobolus (S). Helminthosporiose (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . يتميز باصان ضخمة ، متفصمة ، ظاهرة الملق ويبرغ وبيري الخلية ، غطلي الشكل ، متوازي الترتيب . نجمه تكات مسطوية || انواعه المعروفة اربعة تحديدها ما يلي .

صوت نفس الخيل عند حفرها
صوت القرد
صوت الكلب عند الجرح
صوت الازير
صوت القوق
صوت التيس عند الهياج

الصنج
الصنك
الصفا
الصناب
الصراع
الغلاب



صوجان اتمح



صوجان الارز



صوجان الحب



صوجان الزروع



صوجة



صوجة

أقلبيها انقش من اقليم القاصوليا لانها ائتم منها حل احوال
الحرق والرطوبة في ايار بمثل ٥ او ٥ كيلو
لدم الواحد الذي يراوى معدل ائتاليه العادي ٢٠٠
كغرام ٣٠٠ كيلو من الحب ويخرج ٢٠٠٠ كيلو من الكذبة
الاخضر || اما المواد الغذائية التي تتركب منها الصوجة
هي ، بالترتيب الى الحصة والقيمة ، ما يلي :

النوع	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد هيدروكربونية
صوجة	١٧,٥٠٠ %	١٧,٥٠٠ %	٩,٥٠٠ %
حصة	١٢,٥٠٠ %	٥,٥٠٠ %	٦١,٥٠٠ %
لم يفر	٢٢,٥٠٠ %	٢,٥٠٠ %	-

ومن الاطباء من ينصح باستعمال دقيقها عوضاً من
الحصة وذلك لمن كان مصاباً بداء السكري || ويستخرج
من صوجها مادة دهنية غذائية شائعة الاستعمال ، اما كسبها
فيغلب الحليب ، ويؤخذ فيه نسبة القليل || اما علفها فتخرج
في جميع المواني (رأى جملوه المولد الغذائية) .

Deséch (F). Dried (E).

صوج وصوج البقل ، ثم يسه . يتقال صوجته الربع .
أليسته . وتصرح من البرد . يسه .

١٦٦١٢ - صُوجَم * Barraldé (S). Barraldé (S).

الوحدة صوجة || جلس الحجار وحبيرات برية وزواحية
ازوتية من فصيلة القرصيات . انماوه المعروفة مدينة منبتها
للمناطق الحارة والاسوائية من القارتين الاسيوية والافريقية ||
سوها فراه . اثنائها متعاقبة . اوراثها متعاقبة ، مضقة ،
متالية اتصال الجامة . ازهارها عشوية ، فسيمة التجميع ،
محورية الارتكاز . ثمارها كروية ، مكللة باسنان
التجميع || اوراثها حفصة اللدق ، طيبة ، تستعمل في
معالجة الجذام والتهاب غطائية اللحم .

١٦٦١٣ - صُودَا Soudé (F). Soda, Kali (E).

الصودا كايوتا مركب من الصوديوم والاكسجين اما
تجاريها فهي مركب من كربينات الصوديوم المتبادل .

١٦٦١٤ - صُودِيُوم Sodium

فلز ابيض نفسي المالح ، شديد اللبونة ، اسدي ، يتكاثف .
وزنه (ص) ٢٣ ، وزنه الذري ٢٣ ، ثقله النوعي ١,٢٦٩ .
يتسهر في ٩٦ بسخ || وهو سريع الصدأ في الهواء
الطلق ولا يبريد سفرداً بل الطيبة بل متحدة بمتناس
اخرى يذلل معها مختلف المركبات ، اهمها : كلوريد
الصوديوم او ملح الطعام ، ونيترات الصوديوم او ملح
البارود ، وكربينات الصوديوم او التطرون ، وبيكربونات
الصوديوم . ويكره نباتات الصوديوم او سلفات الصودا .

١٦٦١٥ - صُودُ Palmearie (F). Palm-grove (E).

الصود هو الخشخ من النخل في اي تربة كان .

١٦٦١٦ - صُودِي Pictif (F). Feigned (E).

نعت تعري يطلق على كل حدة ليس له وبيد قانوني حل
الرمح من مظهره وشكله كالحب الصودي مثلاً .

١٦٦١٧ - صُوص ، قُوب ، كُوكُوت Poussin (F). Chick (E).

صغير البجج من يوم نطقه من البيضة الى حين تزويجه .

١٦٦١٨ - صُوجَلَة في الانراس ، اخلية .

١٦٦٠٦ - صُوجَانُ اَبَمَح * Ophiobolus harporichus (S). Pictin (F).

نظر مجري يصيب بعض التبيليات انحصا الحطة .
مظهره الخارجي يقع من تركب الباق من عتقا ومصادماً
نفضتها بعد ان تثل فيها الحركة التنبسية || اغزارها
تختلف باختلاف نشاطها وما يرافقه من عوامل مشجبة او
قائمة . وان ردت الرياح في الارض قبل ادخال الحب نفس
ونحو .

١٦٦٠٧ - صُوجَانُ اَلُوز * Helminthosporium oryzae, Ophiobolus myribeanus

(S). Helminthosporioses du riz, Burnson (F). Stripe
disease of barley (E).

نظر مجري يركب الارز فيطيه || مظهره الخارجي
يقع سفيرة فسيمة التي تمتد وتتفرع ويتم كامل تصل
الثرثرات قسب اسمرار واصفرار وذبوله . بعد يلوته
صعفات الحب يشفا بنكات سود تطلب القلب وتتخذ ،
يكافح مظهر البذار باحتجاب الموانع المروية .

١٦٦٠٨ - صُوجَانُ الحَب * Helminthosporium sativum, H. sorokinianum,

Ophiobolus sativus (S). Helminthosporioses des
grains (F). Spot blotch of barley (E).

نظر مجري يصيب الحنطة والقمح والشيلم وبس
التبيليات البرية ومنها التيل || مظهره الخارجي يقع
لاقياسية الحبيب تركب تصل الصف . اما الفطر فيراول
سبة البذار من يوم ائتاليه وتكون جلودها حي
اسبالها وتغيبها حيث يطب الحب فيه مرقعاً وضعداً .
اغزارها محبوسة لانه لا ينتشر الا بطرف خاصة من
الحرارة والرطوبة .

١٦٦٠٩ - صُوجَانُ الزُورُوع * Ophiobolus graminis, O. caricoti, Sphaeria caricoti,

Rhaphidophora graminis (S). Pictin des céréales
(F). Take-all of wheat (E). Schwarzbeinigkeit (D).

نظر مجري يصيب الزروع انحصا الحنطة فيؤذيها وقد
يمنعها من ادخال الحب || مظهره الخارجي يقع حطية
هاقية تركب سلاحيات انقص من الباطن والخارج للقل
التبادل التنسي وتسبب اصفرار الحبيب وذبوله قبله الجلود
والسوق || اغزارها جسيمة لانه يحل دون ادخال الحب
تفيدو السنايل يفضاه التي ذافرة .

١٦٦١٠ - صُوجَة ، صُوجَة * Glycine hispida, G. soja, Soja hispida (S). Soja, Soya,

Haricot soja (F). Soja bean, Soya bean (E). Soja,
Sojabohne (D). Soja, Sola, Fava soja (I).

نبات عشبي زراعي صناعي وكلائي من فصيلة البقوليات
الفرغاية . مهد الشرق الاقي وقد تمت زراسته منذ
اصفاح العالم نظراً لفرائده الاقتصادية ولاارتفاع نسبة ما
يصويه حبه من المواد الازوتية والعدنية || اسمها الصيني
« تيو » والياباني « دندو » وفي حبة حولة فرعاء تملو
نحو ١٥٠ سم . فرويها حنطة متعاقبة . اوراثها مركبة
طويلة الزناد ، ثلاثية الوريقات السنانة اللدقة . ازهارها
عشوية التجميع ، محورية الارتكاز . ازهارها بتنجسية
اللون او سفراء . ثمارها قرون صغيرة التسد ، قليلة
التجميع ، حلية القشور ، تغلف من حبتين الى خمس حبات .
اصرارها المشهورة بنحو ١٦ تخلف بالوان حبا وما تحويه
من مواد دهنية وصلابيتها للاطعام والربية لذلك فهي
تجود في جميع الارته بالنسبة والتوصلة الحبيب والاندماج .

١٦٦٦٦ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة * ، حَافِرِيَّة حَلْقِيَّة

Ungulus annosa, Fomes annosus, Polyporus annosus, Trametes radiciperda (S). Polypore annelé, Maladie du rond des pins (F).

فطر من السميات مركب التنوب والعنبر والياض والرعر والأجل والبتولا والصنوبر || يصيب الجذور فيقتضي على جوداتها ويبيتها ويصيب السخ فيقتضي على الماء والشكيز دون أن يترسب الخشب لأن الراتنج يحول دون انتشاره . يبدو على الجذوة والشكيز اطارات حلقة متتابة بأذنياتها اللون تتحول الى السمرة عندما يبدأ حيف المشج بعمله الانجلاي في الاجزاء والمواد الخشبية || اما القطر فلا يملو سطح القرية وهو صغير القدر حافري الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ٣ و ١٠ سم . ثوبه الى الصلابة الخشبية . لبايه اخضر اللون ، لبني التركيب او غليبي || يوفاته يغيثه قيسها ٤٨٦ ميكرون .

١٦٦٦٧ - صَوْتِيَّات كاذب * ، فِلَيْتْس مِلْهَاب * ،

Phellinus igniarius (S). Faux-amadouvier, Apoplexie, Escu (F).

فطر من السميات موطنه البلاد المعتدلة الحارة والباردة . مركب حدة نباتات حرجية انحصار الاسفندان ، البتولا ، الجوز ، الحور ، الدوار ، الشمر ، الصفصاف ، الفاسول ، الفيزياء ، القزولوس ، الخش ... ومركب من النباتات الزراعية الطماح والقرين والكرية || مشبهه اغبر اللون يدخل من الجروح اليابسة فيطبع في الاشجار الحرجية طبقاتها الخشبية حتى القلب ويصطب الشكيز في الجوز والستديان . وقد يدوم حصة سنوات لانه يطوي النمو والانتشار . ويكون الخشب الموصوم شديد السرة او زاهي الصفرة عدم الحيوية سريع الانتعاش || وهو في الكرية رسم ونمط القالب لانه يفتحي على الحفرة بسرعة بعد ان يعطب الماء والياث الساك والجهاز الرئوي الذي يؤمن نقل النسغ وتبادلده || يكثف باقتلاع الاجفان الموصومة وينضج الكرية بعد تقليبها باسبور بعض المطهرات السائلة المركزة حل مادة القزوينج || اما القطر فتوسط القدر ، قبي الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ١٠ و ٣٠ سم . لصادوده قليلة سمكية ، عمودية ، صهبا اللون او قزوين ، زبد السطح خيرا المل || لبايه حنطي اللون جامد الملقط الناعم . وهو من الفطور التي تضر من ٥٠ الى ٦٠ سنة .

١٦٦٦٨ - صَوْتِيَّات * ، Coniopterygidae (S).

Coniopterygidae (F). Caniopterygidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحارة . تألف النباتات . حشرات الاجلانة تعيش على تنس الاججار . يرقاتها مبرقة تعيش خاصة على الارق والحليسات || اجسامها صغيرة قطرها من ٢ الى ٥ سم . بسطتها تراوح من ٥ الى ١٠ م . تشابهها مغلول بمادة طيسلية كالنقيق . وهي مجهزة بعدد خاصة مبرقة في جميع احاء الجسم ، تفرز مادة شمعية واقية . قربها الانتشارية مهدية عند الاجلانة والبرقة . عينا صديرة . اجناسها انتشارية اللد بين الزوج الاناسي والخلفي || يرقاتها صغيرة ، مدنية الشكل ، خضيلة التاكثير ، مقترنة || اشهر اجناسها الصوق والسدال .

١٦٦٦٩ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة ، فِلَيْتْس ، الحلب .

Semblable (F). صَوْتِيَّات صَوْتِيَّات (E).

Phylum (F). Phylum (E).

كل صوتية تسلسلية ، صنيانة او نباتية ، تقتصل على انواع متعددة من يعضها البعض تقضى صوة .

١٦٦٧٢ - صَوْتِيَّات صَوْتِيَّات (F). Wool (E).

الصوت بالعرف العام مجسمة من الشعر تؤلف الصفات الذي ينطلي اجسام بعض الحيوانات المبرقة كالنم والملمز والابل الخ || اما شعره الصوت تتكون من ثلاثة اجزاء : البصلة وما فيها من مادة نشوية وملونة ثم الطبقة الصنوية البنية التي تفرز اللانعة واللونعة ويلبها الطبقة الحرفية القرنية السطحية التي تمد خاصية التلبه .

١٦٦٧٣ - صَوْتِيَّات كاذب * ، حَافِرِيَّة

Ungulus fomentaria, Polyporus fomentarius (S). Amadouvier (F).

فطر من السميات مركب الزان والبتولا والقرين والحور والخروج والستديان . رقة شديدة صلدة على الثوب والطح . وهو من اكبر فطور السميات والمطها . شكله شكل سافر الحصان . خطوط قطر قاعدته نحو ٢٠ سم . وقد يبلغ في ظرف خاصة ٤٠ و ٥٠ سم . يبتا براوح ارتفاع فيه بين ١٠ و ٢٠ سم . || ثوبه في اول صده لبد اللون تبي المواج ثم ينحول الى الخنطي وينتهي باخوري . لبايه غليبي ندي ، لونه الى الصبغة الخشبية . بوياته متسلسلة مغلوطة الاطراف قيسها ١٤x٥ ميكرون || يترى الملوخ يدخل الى ثوبها من جروحها اليابسة بعد ان يعطب لشكيز والخشب الذي يلفقه بالثوب والعرض الى مكبات ساحتها ساحة الطبقة الخشبية النضارة || مشبهه اغبر اللون يكتنف الكليات ويسبب انحلال موادها الخشبية .

١٦٦٧٤ - صَوْتِيَّات أَشْفَح * ، فِلَيْتْس

Phellinus pomaceus, Polyporus fulvus (S). Phellinus (F).

فطر من السميات مركب التفاحيات والوزيات في سورها واحصائها . يدخل من جروح التشليل التي اعمل ملازها بالمسكيز ويرق حتى القلب فيسبب انحلال المواد الخشبية والخشبية || وهو حافري الشكل صغير القدر حبه من ٣ الى ٦ سم . سطحه خلي للملحس قرني اللون . لبايه صلب الملقط غليبي التركيب ، اسمر اللون || يكثف بانتراخ القطر ويصطير الجرح وظلاله بالمسكيز بعد تنظيحه من المشج والخشب المتطوب .

١٦٦٧٥ - صَوْتِيَّات السنديان * ، فِلَيْتْس السنديان * ،

Phellinus dryadens (S).

فطر من السميات مركبه جلوج السنديان وقد يصيب الكنتنا || ظهوره الخارجي قيمة مستديرة ، غسدة ، فاشرة الحافة ، قطر قاعدتها براوح من ١٠ الى ٢٠ سم . غلافها الخارجي الملوي رقيق القشرة الرضوة ، لونه الى البياض الاغبر ، يرشح بعض انفسد الخشبية اللون || لبايه حنطي عايق ، جامد الملقط الغليبي . بوياته شفاقة او تنية اللون ، مدنية الشكل ، قطرها نحو ٩ ميكرون وقطر قاعدتها ٣ ميكرون || وهو من الفطور السرية النمو يظهر في اواخر تموز . مشبهه يسبب المغن الخشبي بعد ان يحرب الاوية و يعضها .



صوتان



صوتان اشقح



صوتان حلقى



صوتان كاذب

خلية السفسفة. أضرارها طرية، فريدة التجميع، تحرق
ضمة من الأوراق المستعرضة.



صوبل الشام

١٦٦٣٧ - صَوَّرة * Acharia (S), Acharie (F).

الصورة ج صوبر. نبات لبني عاشر مدبر من فصيلة
الصوبريات يكثر في التياض وعل سفات مجاري الماء.
يزرع القزوين. جنين بكثرة فروه الحقة السبيجة،
بقلة أوراكه للمبرقة، يهدم جبال أنظاره وبغرابة ثماره
وزروره المبردة المستحقة الشكل.



صولة

١٦٦٣٨ - صَوَّرة البُقُول * Miselia clausa,

Mamestra clausa, Polla clausa (S).
Miselia potagrea, Noctuella potagrea (F).
Bright-line brown-eye (E).

حشرة مؤذية من الفسقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها
يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اريوة. فراشها جارية
قوتها مشتر الاضرار. سرقتها تموش على اوراق الصليبيات
البرية والزرعاه وعلى البقول. جسمها متوسط طوله
نحو ١٥ م. بسطها نحو ٢٨ م. رأسها معتدل الحجم
عجوزي اللون. صحنها كيرتان زباناها عيطان.
حيثما الى الجوزة. يمتد الى الخلف الاخرى ملو غط
لحي من النقط السود. ورشها الاماميان الى الجوزة
الاصفر، ويملوها تسنين طرية بني اللون. ورشها
الحلقات الى الكسكة. اهدائها الى القطعة النصفية. لها
جهاز في الخلف. تظهر فراشة الجبل الاول في حزيران
وتظهر فراشة الجبل الثاني في ايلول. تسرح في الليل.
تقاتل به ظهورها بنسوخة ايام وتفتح المكن لسطحاً
على الصفحات السفلى من نصال النبات كمالاً في السرعة
تطوي نحو ٣٥ م. جسمها مائل للفسار. ثوربا الى
الخضار الاقصى ملو غط لحي قاطب عجوزي اللون يحده
من العينين واليسار عطان اهدان واربع نقط سود في كل
سكة. ويملوها ايضاً عطان جانبيا سفراوان. رأسها الى
الجوزة. منها الى الشبهة السوداء المولج. رواجها سود.
طوي الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة.



صوبلية



صورة

١٦٦٣٩ - صَوَّرة القَرْفَل * Miselia compta (S).

Miselia parva, Noctuella
des diantheas (F). Miselia compta (E).

حشرة من الفسقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض
الاقاصيص البحر الابيض المتوسط. فراشها واسعة قوتها
رقيق الاضرار. سرقتها نامة تلثم اوراق القرفليات
وتلقب الكماير وتلثم الزيتون للتجميع. جسمها
متوسط طوله نحو ١٤ م. بسطها نحو ٣١ م. رأسها
خادوني الشكل اسهب اللون. صحنها كيرتان. زباناها
عيطان. حيثما وربتها الى الصخرة السوداء المولج
ورشها الاماميان الى الصخرة السوداء المولج. رواجها
وايضاً وزرقة سفلية وتقلب اسود. ورشها
الحلقات الى الصخرة السوداء السوداء اللون. اهدائها الى
القطعة النصفية. لها جيل واحد في الخلف. تظهر الفراشة
في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تقاتل به
ظهورها بنسوخة اسابيع وتفتح المكن لسطحاً على الصفحات
السفلى من نصال الاوراق. في السرعة تطوي نحو ٣٠ م.
جسمها اسطواني الشكل. مشقة القشاز. ثوربا الى
القطعة الخضراء يصر في الظهور ويتر في الجانبين. رأسها
عجوزي اللون. منها الى الربكة. رواجها سود. طوي



صورة البقول



صورة القرفل

Sperme des esquidés (F).

Sperm of the esquidae (E).

هو افراز اللبد التناسلية الذكرية عند القواب من خيل
وجير.

١٦٦٤٠ - صَوَّبة * Corynespora.

جنس فلور مجهرية من الريدانتيات وفصيلة الطعيات.
جره الكيفية سماء اللون، اسطوانية الشكل، غليظة
للمفاصل القدية، فريدة او شعبة التجميع. كتانه
سبيجة الترتيب، تحلة القواسل الشفافة. انوامه قليلة
المدد، اعرفها صوبل الشام.

١٦٦٤١ - صَوَّبة الشام * Corynespora melonis (S).

فلور مجهرية يتطفل على اوراق الشام والقرع والخيار
والكمون. مظهرها الخارجي يقع لاقبسية الشكل والحجم،
لونها الى السرة الضفراء، اطرافها حالي حاقب اللون، تركب
نصل الاوراق ففسب ذبوا ويملوها. يكالغ عند
ظهوره باستعمال المركبات النصلية المركزة ١٪.

١٦٦٤٢ - صَوَّكة * Aeschynomene (S).

Aeschynomene (S), Aeschynomene, Sola, Nelitte (F).
Sola, Bastard sensitive plant, Pitt-hat plant (E).
Schampfianze, Sinnpflanze (D). Planta modesta basta
rd (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرظيات الفراسية.
انواعها المعروفة سبعة مهاد البلاد الحارة تكثر في الصين
والهند. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها مختلفة الالوان
الزاهية تتميز بكثرة اسديتها التي يبلغ عددها عشرة. وهو
نوعان.

الصولة الصينية Aes. paludosa (S).

Aeschynomene de Chine (F).

ساقها مستطيلة، ليفية، لينة، تستعمل في صناعة الورق
الفاسخ المعروف بورق الرز.

الصولة الهندية Aes. cannabica (S).

Aeschynomene de l'Inde (F).

جنية ليفية مستطيلة السال اللطيفة. اوراقها فزلية متينة
تستعمل في عدة صناعات منزلية وغيرها.

١٦٦٤٣ - صَوَّك Argem pur (F).

Pura silver (E).

١٦٦٤٤ - صَوَّك Calviforme (F).

Calviforme (E). صَوَّك

شكل من الزراني يشبه السوجان.

١٦٦٤٥ - صَوَّكيات الفلور Rhopaloceros (F).

Rhopaloceros (E).

مرتبة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. فصلاتها
عديدة تتميز بقربها الاستثنائية الصوبانية الشكل.
خادراتها حارية لا يملوها في نباتها، فهي. مكها يربل
الشكل، فريدة الوضع، لا نظامي الترتيب.

١٦٦٤٦ - صَوَّجبة * Leucadendron argentum (S).

Leucadendron argentum, Arbre d'argent (F).

شجيرة زينة سبوتية من فصيلة النسيات. ساقها
متنصبة فراه. اوراقها تطوي من ١٠ الى ١٦ م. وتوش
من ١٢ الى ١٦ م. نصلها جامد النسيج، على البشرة
الفسية اللون. ازهارها اثيوبية، ضيقة، رباعية التشرع،

المرشدة الممرسة حُبًا برية موطنها النيابس والادغال الرطبة
وسبها زراعية تزيينية . اشهرها الصبور .

١٦٦٤٣ - صَوْبَكَة Solenanthus (S). Solananche (F).
الصوبكة ح صوبل. نبات عشبي محلي من فصيلة الجاسمينا.
انواعه قليلة موطنها جبال الشرق الاوسط . سوقها زباء
القضاء، عاصمة الفزوع، تنمو من ٧٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
معتقة ، لاهليبية، ذلقة الزام الاخضر . نصلها خالي البشرة
اثير اللون . ازهارها عتقوي التجميع ، ابيض الزركاز .
ازهارها انبوية الشكل تبدو خمره ابيض ثم تتحول الى
الارجواني الازرق . ازهارها يستمر من نيسان الى
سبيران .

١٦٦٤٤ - صَوْبَكِيَّات Protoblastoptères (F).
Protoblastoptera (E).
رَبِيَّة حشرات مغترسة من طبقة الوردانيات . اساقيرها
تعود الى الحقيقتين الكربونية والبرمية من الاباج الاول
الاسم العلمي يربط اليها من اسلاف الوردانيات .
تزينها البروش واحد اما مقدم حوشنها فلا يسلط الرأس
وكانت تعيش على الاشجار علافاً لنبات وردان الدالة .

١٦٦٤٥ - صَوْبِيَّة هي الصوبكة ، اطبا .

١٦٦٤٦ - صَبْصَبَكَة Ergot (F). Spur (E).
غلب الديك في ساقه .

١٦٦٤٧ - صَبْصَبَاء ، صَبْصَبَكَة Coutard (F). صَبْصَبَكَة
هو كل نبات معرض لأمراض قاصاة أي لسقوط الزهر او
لانتعاش الثمر بعد البعد .

١٦٦٤٨ - صَبَاد السَمَك Cérýle (F).
هو الغراف ، اطبا .

١٦٦٤٩ - صَبَادَة الْأَوْح Hippodamia (S).
Hippodamie (F).
جلس حشرات عديدة من فصيلة الدعاسيق ورَبِيَّة مبدعات
الاجنحة .
١٦٦٥٠ - صَبْكُو القَطِيع من البقر .

١٦٦٥١ - صَبَاكَة Formulation (F).
Formulation (E).
الصباغة وضع الصبغة وتوضيحها .
١٦٦٥٢ - صَبَاكَة Entretien (F). Keeping (E).
هي جعل الاعمال المتروكة المتروكة الصالحات على الشيء سليماً من
التشوايب .

١٦٦٥٣ - صَبْخُور Roc (F). Rock (E).
الصخرة الصلبة الثابتة في مكانها .

١٦٦٥٤ - صَبْد ، صَبْدِيَّات ، صَبْدِيَّات Chasse (F). Hunting (E).
هو اقتناص الطير والحواشي . ويملك الصائد قصصه
بالاستيلاء .

١٦٦٥٥ - صَبْد Glibier (F). Game (E).
الصيد هو كل ما صيد من حيوان ينتج بوقاهه او جناحه .

الاكامل يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتفيش ضمن جلباب
من العين لتلفه البركة بعد ان تنتمن في التربة على عمق
٤ او ٥ سم .

١٦٦٥٠ - صَوْبَكَة الْهَنْتَبَاء Misella dysodes (S). Misella dysodes, Noctuelle
des chiorcées (F). Misella dysodes (E).
حشرة مستجبة الرائحة من فصيلة النسيقيات ورَبِيَّة حشرغيات
الاجنحة . موطنها يمتل محضر اناليم حوض البحر الابيض
المتوسط . فراشها واثمة قوتها منثر الازهار . سرقها تمش
على اوراق وايزار المركبات واخصها الهنتباء . جسمها
متوسط القند بطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣١ سم . رأسها
غريب الشكل . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان .
سرقها مجتدل الجرم والفلول . جوشنها وبعثها الى الرربة
السراء الملوخ . ووشنها الاساميان الى الرربة الخنطية
الملوخ يطولها يتبع امر متخلفه نقط سيد . ووشنها
الحلقيان الى الرربة الخنطية الزائرة تسير قرب الاطراف
لها جيل واحد في الجيل . تظهر فراشة في ايار وتبقى حتى
نحو . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة
اسابيع وتنتج المكن لطفها على الصفحات السفلى من نصال
الارزاق . البرقة تطول نحو ٣٠ سم . جسمها اسطواني
الشكل ، مشعوب القشاور . ثوبها الى النطلة السراء يطولها
خط لبيبي قاطب اسود اللون ، ابيض الخنار من العينين
والايسار . جانبها ممتدقان بالاسود والاصفر . رأسها احر .
مدبها الى الرربة . وواجبها الى السرة . طور الاكامل
الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتفيش في التربة ضمن
جلباب من العين .

١٦٦٤١ - صَوْبَكَة رَحَاكَة Misella paragrana (S). Misella paragrana (F).
Misella paragrana (E).

حشرة من النسيقيات حشرغيات الاجنحة . موطنها مجادح
وتنام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واثمة قوتها
منثر الازهار كثير غضة الازهار من بقعة الى بقعة .
سرقها تمش على اوراق السريق والحرض والقطف والاشنان
والرث . جسمها متوسط القند بطول نحو ٣٥ سم . رأسها
مستدل الجرم ، اربو اللون . عيناها كبيرتان . زباناها
خيطيان . جوشنها وبعثها الى الرربة الخنطية الملوخ
روشنا الاساميان الى الرربة الخنطية تملوها رشة وزونقة
تاروح من النطقة الى الصبة والشمية . ووشنها الحلقيان
الى الرربة البيضاء الملوخ تملوها جده مغترسة تسبق اختار
المنجاري . لها جيلان في الجيل . تظهر فراشة الجيل الاول
في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في الليل .
تماثل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتنتج المكن لطفها
على الصفحات السفلى من نصال اوراق ثبات المائل
السرة تطول نحو ٣١ سم . جسمها شبه اسطواني ، الشكل ،
مائل القشاور ، عادم الحلب والقطف السود . ثوبها الى
الخنار الزبني تملوها ثلاثة خطوط قاطبة جوية . رأسها
الى الحفرة المرجانية . مدبها ورواجبها الى السرة السواء .
طور الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتفيش في التربة
ضمن جلباب من العين .

١٦٦٤٢ - صَوْبَكِيَّات Achariaca (S).
Achariaca (F). Achariaca (E).
صليبة نباتية من ذات الفلتنتين عديدة الالوان . ازهارها
كثيرة مظهرها الفريحي المنبت . جميعها من النباتات اللقية



صورة الهنتباء



صورة رصاة

١٦٦٥٦ - صَيْدُ السَّمَك (Fishing) (F).
هو البحث عن السمك وإخذه بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لصياده بحق الاستيلاء .



صيداء

١٦٦٦٦ - صَيْدُ الدَّهْم *
Sarcophaga carnaria (S). Mouche à daniens, M. de la viande (F).



صيدان أبيض الرأس

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٧ و ٢٠ م. ثوبها أغرض اللون يعلو غسوط متصالية تشكل مبريات تشبه رقعة الشطرنج . يكثر وجودها من أيار إلى تشرين الثاني . تسرح في كل مكان . مكنتها يفتن في جراحها القبيح فضحه رقات صغيرة دقيقة على اللحم والجيف والافتقار .

١٦٦٦٧ - صَيْدُ كَالِي *
Tumla
هو التامة ، الحظايا . أما صيدنا في وضع القترين إلى كتور أين الملوغ .



صيدان أزرق

١٦٦٦٨ - صَيْدُ كَيْتَات ، لَكَاغِيَّات *
Calliphoridae (S). Calliphoridae (F).

فصيلة شرشات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . اجنتها وانزاعها نحو ٥٠٠ مظهرها صغير اللد وبطنها متوسط وكثير . أنثىها تخطفه يلبس ثياب الرصاص . أرجلها زياء . ذكورها كالناتج لا تفرق بينها سوى عدة البك للولادة القاطرة في موضع الحلقة الطرية عند الذكر . قوتها مثل الأعداد والفرزات ، والحلالم ، وأكثر المواد الضورية والبراز || يرقاتها هواكة وأجعة ومنها خاضعة وثالثة وبطنها لاسع يركب الحيوان ليؤذي .



صيدان الجراد

١٦٦٦٩ - صَيْدُ عِي *
Cynagétique (F). Hunting art (E).

ما له علاقة بفن الصيد .

١٦٦٧٠ - صَيْصُور *
اسم شامل يطلق على البلم المشبع ويل بعض صفار السمك كالشعير والملت والرشا الخ .



صيدان العم

١٦٦٧١ - صَيْصُور *
Bercail (F). Fold (E).

الصيرة والسيارة . حشرة البقر والفم والمز .

١٦٦٧٢ - صَيْصُور *
Inoceramus (S). Inoceramus (E).

جلس حيوانات من الرضويات صغريات الجناحين حادمت اللثام وفضيلة الاطريات . أنواعه للمرة مدينة جميعها من مستعمرات الاراضي الطليانية || اصداها شبه غروبية الشكل بالغة التشديد الطولي .

١٦٦٧٣ - صَيْصُور *
هو السامة ، الحظايا .



صيم

١٦٦٧٤ - صَيْصُور *
حب البليغ والمنظل والقيام وما أشبه الذي ليس في جوفه لب .

١٦٦٧٥ - صَيْصُورُ قَلْق *
Selsura inoleuca (S). Selsura inoleuca (F).

طائر من الجوارث منيات المتغير يستحي إلى فصيلة اللذابيات . يألف الغابات وصفات مجاري الماء . لجبهه الحيالي جامعي . جماعته قليلة العدد . قوته للذباب والرمال والديدان || جسده صغير اللد يطول نحو ١٦ م . متقار غرزي الشكل ، صغير الحجم . سباله كثيف قصير . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، مقطوع الطرف . ثوبه البدرى إلى الخضار الالاس الاصفر اللؤلؤ . زوره وصنوه ويطة إلى



صيصور قلق

١٦٦٥٧ - صَيْصُورُ كَاغِي *
Callionymus (S). Callionyme, Chiqueux, Dragonnet (F).

جلس اسماك بحرية من شالكانات الزنائف . أنثىها مدينة منها واحد يقيم في البس الايض المتوسط . وهو صغير اللد ، مستطيل الشكل ، كبير الرأس ، مزربف الثوب ، متجان الزنائف الخفيفة والمديجة بمختلف الالوان .

١٦٦٥٨ - صَيْصُور *
هي الارض الحمراء التربة الخفيفة الحجارة المستوية السطح

١٦٦٥٩ - صَيْصُور *
Hibou (mâle) (F). Owl (male) (E).

ذكر البومة .

١٦٦٦٠ - صَيْصُورُ كَاغِي *
Pharmacopée (F). Pharmacopoeia (E).

بحث تركيب الادوية وطرق استخدامها للمعالجة .

١٦٦٦١ - صَيْصُورُ زَنْبَار *
Sarcophaga (F). Sarcophaga (F).

جلس ذباب يبيض ولده لاسع من فصيلة الصيديات . أنواعه عديدة جميعها وأجعة وثالثة يكثر وجودها في الصيف . أشهر أنواعها وأجعة الاربعة التالية .

١٦٦٦٢ - صَيْصُورُ أَيْبُصُ الرَّأْس *
Chrysomya albiceps (S). Mouche à tête blanche (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح من ٥ إلى ٧ م . لونها إلى الزرق . رأسها أبيض . زبالها سوداوان . يرقاتها غبراء اللون ، زياء الجسم تدبش على الجيف .

١٦٦٦٣ - صَيْصُورُ أَغْشَن *
Pollania rudis (S). Pollénie rude (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين فضيلة الصيديات . جسمها متوسط اللد يطول من ٨ إلى ١٠ م . حليها متكاثف غشن . طيراتها منيف الحركة سريعة . رأسها كبير الحجم . خطمها ذرب . زبالانها صغيران . حليها كيرتان ، صفراء اريد اللون ، حشلي اللؤلؤ . بطنها إلى القردة . اسود الزركفة . ريشها كيرتان ، شفافة ، يملؤها شفخ حشلي . قوتها إلى السمرة || يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الثاني . تربط في المواقف الممرضة لاسعة الشمس . قوتها مثل الأعداد والفرزات أنثايتها وقد تقتبس المنائل الغريبة في طلب القوت || يرقاتها وأجعة وتكامل مل الخراطيم تقتضي حليها .

١٦٦٦٤ - صَيْصُورُ أَرْزَق *
Calliphora erythrocephala (S). Mouche bleue (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٨ و ١٢ م . ثوبها إلى الزرقعة اللامعة . يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الاول . مسرعها كل مكان مشمس . لا تدخل المساكن الا لتتبع مكنا على اللحم والجيف والبقول اللذابة . يرقتها دقيقة غبراء اللون ، سمره الرأس ، مبرية الحلب .

١٦٦٦٥ - صَيْصُورُ الْجِرَاد *
Stomoxys calcitrans (S). Mouche des sauterelles (F).

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٥ و ٧ م . ثوبها مجذع ومغط بالاسود والاخير . يكثر وجودها من سيران



صيف



صيف



صيف



صيف الخيل

١٦٦٨٢ - صيف
Rostellaria (S).
Rostellaria (F). **Rostellaria (E).**
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الارجل
 وفصيلة الدلائيات . انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة
 في بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر
 الابيض المتوسط || اصداؤها مردينية الشكل ، متباينة
 اللد ، طول من ٤ الى ١٢ سم . جميعها محذرة حتى
 الاطباء . فحاشتها مستطيلة ، دقيقة الاطراف المزانية ،
 مقرصه الجوانح || اجسامها محذرة ، مستطيلة الرؤوس
 المنتهية باضمار مغلوقة . لوانها ثنائية ، مغلوقة ، مبهمة .
 ارجلها مشطورة الى لفتين ، الخلفية مجهزة بسقاط قشري
 المادة ظلي الشكل .

١٦٦٨٣ - صيف
Dériction (F).
Dériction, Wearing away (E).
 الصيغة الانقراض بالاحتكاك او المنك .

١٦٦٨٤ - صيف
Dérictique (F).
Dérictal (E).
 نعت تعريفي يطلق على جميع التكاوين الروسية الخشبية .
 من تقنيات الصنوبر ميكانيكياً .

١٦٦٨٥ - صيف
Sclerostomum (S).
Sclérostome (F). **Sclerostoma (E).**
 جنس دود من السلديات . انواعه عديدة جميعها طفيلية .
 بعضها يتطفل على الدواجن اعضاها الخيل .

١٦٦٨٦ - صيف الخيل
Sclerostomum equinum (S). **Sclérostome du cheval, Strongie armé (F).**
 نوع من الصيول يعيش طفيلياً في مساريق وابواب الخيل
 ليشيها بما يشبه من مفس مؤلم .

١٦٦٨٧ - صيف
 الصيف : شدة الحر . يوم صيف وصيف : شديد الحر .

١٦٦٨٨ - صيف
Déserticole (F).
Déserticole (E).
 نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يألف
 الصحراء .

١٦٦٨٩ - صيف
Lisse (F). **Smooth (E).**
 الصعيح هو الاملس المعاد من النبات .

١٦٦٩٠ - صيف
 صيف الخيلات هي فصيلة الخبيبات ، اطبا .

البيض الناصع || يلدن حقه في الانجار القريبة . الاث
 تحسن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١٦٦٧٦ - صيف
Formule (F). **Formula (E).**
 تعبير مجازي او رقمي يدل على كميات المواد التي يتألف
 منها تركيب معين ما مع نسبة عناصره وعدد وسائطه
 الغذائية .

١٦٦٧٧ - صيف
Ené (F). **Sumerer (E).**
 احد اصول السنة العربية مدته ثلاثة اشهر تبدأ في نصف
 الكرة الشمالي في ٢١ حزيران وتنتهي في ٢٠ ايلول . وهو
 يتميز بقلدة حرارته وبطول نهاره وذلك لانه يبدأ عندما
 تكون الشمس في الست عمودية على مدار السرطان .

١٦٦٧٨ - صيف ، صيف
Poussière suspendue dans l'air (F).
 الصوف والصيغة : الغبار الجائل في الهواء .

١٦٦٧٩ - صيف ، صيف
Loxia (S).
Loxia, Bec-croisé (F). **Crossbill (E).**
 جنس صافير من فصيلة الشرشوريات . انواعه سبعة جميعها
 من صافير المناطق المتفلة . طولها يراوح بين ١٤ و
 ٢٠ سم . انوثها عديدة الالوان فيها الجزوي والاصفر
 والاسمر والاسود والرمادي والابيض والبنفسج .
 غليظة ، قوية ، متصالبة . اذنانها غائرة || يألف
 الاحراج اعضاها اسراج الصنوبر والتوب والسرو . قوته
 سحب الصنوبر وتختلف البزور البرية والفراخية وبعض
 الحشرات والحلرم || يلدن في الانجار الكثيفة . اناته
 تحسن وسعها || بيضات على مرتين في السنة يبدأ ذكرها
 قرون الغذاء وفرد .

١٦٦٨٠ - صيف ، صيف
Codex
 المبرزة الرسمية التي تيمث في الادوية ودرجاتها وطرق
 تحقيقها .

١٦٦٨١ - صيف
Smerinchus (S). **Smerinthe (F).**
 جنس حشرات من فصيلة الخيليات انواعه اربعة او خمسة
 جميعها دجوية تسرح في الليل . اجسامها متوسطة اللد
 طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . القواها الى القبرة الخلفية .
 حشباتها مقلبة بالاسود . وراشها كبيرة ، مزركفة
 وودجة . قرونها الاستشارية تقليدية الشكل || رقاتها
 مرطاة الجسم يكثر فيها اللون الاخضر الغامق . وهي غاشقة
 قلمها اوراق بعض الاشجار اعضاها السنتيان والثرزوث .



ض

مرة من ٤ إلى ٦ بيضات تحملها بمثابة الذكر نحو ١٧ يوماً :

Entropie (F).
Entropy (E).

١٦٦٩٣ - **ضابطة التغير**

طريقة تسمح بتحديد انعطاط جهد القوة الحرارية .

١٦٦٩٤ - **ضابطة بيطرية**
Police sanitaire vétérinaire (F).

جام القوانين والانظمة المرحية الاجراء المهادنة الى مقاومة انتشار الامراض السارية والمعدية في المواجن .

١٦٦٩٥ - **ضابطة**
Embouchure, Delta (F).
هي دلتا النهر ونحوه او مصبه .

١٦٦٩٦ - **ضابطة**
Carnassier (F). Felina animal (E).
الحوان المفترس . م ضارية . ج ضوار .

١٦٦٩٧ - **ضابطة**
Erratique (F). Erratic (E).
تمت تعريفه يطلق على كل طائر ليس بأبنة او قاطع بل يحير البلاد من منطقة الى اخرى في طلب الرزق . ج ضوارب .

١٦٦٩٨ - **ضابطة**
Multipliant (F). Multiplying (E).

١٦٦٩٩ - **ضابطة**
Procrustes (S). Procruste (F).
جنس عنقاص مفيدة من فصيلة البرطانيات ورتبة مفيدات الاجنحة . انواعها عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح بين ٣٠ و ٤٠ م . انولها الى السواد النحسي . تخرج في الليل وتفتسر الكثير من الحشرات والحوام الضارة .

١٦٧٠٠ - **ضابطة**
ضاس النبات : باثر بالقضيس والقضيس اول الحج .

١٦٦٩١ - **ضابطان**
Agelaius (S).
Troupiale (F). Bobolink (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبينيات . انواعه المعروفة اربعة . جميعها من قواطع القارة الامريكية تحضي فصل الشتاء والبرد في الاقاليم الحارة من امريكا الوسطى والجنوبية وفصل الصيف في امريكا الشمالية . نطالها الحياتي جامي . اسرارها وافر البند || اجسامها متوسطة القد طولها من ٢٤ الى ٢٩ سم . متناهدا غمرولية ، مستقلة الاطراف . اجنتها مستطيلة . اذنانها مستديرة الاطراف . اسافلها معتلة الارتقاع . اذواها سوداء اللون او كستنية . اكثافها ، اي لواحش اجنتها ، صفراء اللون او حمراء . انثاها اصفر قدماً من ذكورها واهت الذواها منها || تألف الاجسام والمستنقعات ويجاري الماء . قوتها الحشرات والحبوب والبلودور . تقسم حقول الحنطة والارز والنقم .. فتقع بها اشد الانثى || اعرف انواعه واشهرها ضابطان آخر الشريط .

١٦٦٩٢ - **ضابطان آخر الشريط**
Agelaius phoeniceus (S).
Troupiale à épaulettes rouges (F).

طائر من الضابطان القواطع يحير امريكا الوسطى والشمالية في طلب الحصيد والمضي . يأنف الاجسام ويجاري الماء والمستنقعات . سريره وافر البند || جسمه متدل القد بطول نحو ٢٥ سم . ذوب الذكر الى السواد الاحمر الاسف . لواحش منكبية الى الحمرة الازرقولية . حلقة حبة كستنية الكون . منقاد وسقاء الى السواد الازرق المزاج . الانثى اصغر قدماً من الذكر ، قطول نحو ٢٢ سم . ذواها الى الكهبة تعلوها في صدرها وبلها رقة سوداء . اخلاعه مرسة ، فرقة ، آتسة . قوته الحشرات والحبوب || يثن عشه في الاشجار النارية على الماء . عشه قدسي الشكل رفيع الجانب . الاثني تحضن مرتين في الحول وتضع في كل



ضابطان احمر الشريط



ضارية

١٦٧١٣ - ضَبَاب (F). Oxypetalum (S).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الصقلابيات. أنواعه ثلثة، سوقها مستقيمة. أوراقها متعاقبة، ممتعة، أحليجية النصل، قلبية القاعدة. أزهارها مستطيلة الأنبوب القارضة. الوحدة ضبابية || أشهر أنواعه الأترينية ما يلي.

١٦٧١٤ - ضَبَاب أَرْوَق (F).

Oxypetalum coruleum (S). *Oxypétale bleu* (F). نوع من الضباب وهي حشوة حولية تطلع من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها ليفية فراء. أوراقها زبابة النصل حل صفحية. أزهارها تبدو زرقاء اللون ثم يتغير إلى أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٦٧١٥ - ضَبَاب كَثِير الزَّهَر (F).

Oxypetalum solanoides, *Tweedia floribunda* (S). *Oxypétale faux-solanum* (F). نوع من الضباب وهي جنبة ممرعة تطلع نحو ١٨٠ سم. ساقها غشوية فراء. أوراقها زبابة النصل حل صفحية. أزهارها زرقاء اللون يملأها بتيج وردى || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٦٧١٦ - ضَبَاب (F).

الضباب مجموعة كواكب كثيرة العدد أسفل من نبات نش.

١٦٧١٧ - ضَبَابَة (F). Nivenia (S).

Nivénia (F). *Nivenia* (E). جنس نباتات جنبة تربيتية من فصيلة السوسنيات. مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية. جودها درنية. سوقها مبطلة، مستقيمة، قليلة الفروع ترتفع نحو ٦٠ سم. أوراقها سانية مشرعة النصل. أزهارها حلقي التجميع. أزهارها إلى الزرة الساجية. ثنائياتها بينة اللون || أنواعه المروعة اثنتان للآبارق بينها سوى شكل الأزهار وعدد الأجزاء ولونها || تنموه يستمر من الربيع إلى الخريف.

١٦٧١٨ - ضَبَابَة (F). Spadice (F).

Spadice (F). *Spadix* (E). الطلعة قبل أن تنفلق عن القريض.

١٦٧١٩ - ضَبَابَة، لَيْم (F). Cri du hibou (F).

Cry of the owl (E). صوت البوم.

١٦٧٢٠ - ضَبَاب (F). Cendre brune (F).

Brown ashes (E). هو الرماد الأسمر اللون.

١٦٧٢١ - ضَبَاب، ضَبَاب (F). Spadice (F).

هو حجرة جوز بوز.

١٦٧٢٢ - ضَبَاب (F). Dendromecon (S).

Dendromecon (F). *Dendromecon* (E). جنبة ممرعة من فصيلة النضفانيات. ساقها فراء تطلع نحو ٢٥٠ سم. أوراقها أحليجية النصل، بحرية الخضار، ثلاثية القروعة، تطلع من ١٢ إلى ١٥ سم. أزهارها صفراء اللون، تطلعها يراوح من ٣ إلى ٧ سم. || تزدهر كثرين. تنموها يستمر من أواخر آذار إلى أواخر حزيران.

١٦٧٢٣ - ضَبَاب (F). Galacantha (S).

Galacantha (F). *Galacantha* (E). جنس حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الأرجل

طوال الليل وفصيلة الضبابات. أنواعه المروعة خمسة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

١٦٧٠١ - ضَبَاب (F).

الضباب من الخيل الذي لا يعطي ما عنه من الجري إلا بالغرب.

١٦٧٠٢ - ضَبَاب (F). Zizyphus lotus (S).

Zizyphus lotus, *Rhamnus lotus* (S). *Jubiter sauvage*, *J. des lotophages*, *Lotus* (F). *Lotus tree*, *L. jubite*, *Wild jubite* (E). *Lotobaum* (D). *Giugliolo salvatico*, *Loso dei lotofagi* (I). حجرة حربية ثلاثية من فصيلة النضفانيات. كانوا يقسموها في الزمان الثمار ويمزون إلى ثمارها حدة فضايل نضفانية وصحية. ثمارها صلبة القد، غشائية الشكل واللون، لليلة العظم. ثمرها يغيد السفر ويقويه.

١٦٧٠٣ - ضَبَاب (F). Connectif (F).

نمت تمرني يطلع على بعض السج الحويانية المنسدة المنسدة.

١٦٧٠٤ - ضَبَاب (F). Ovis aries (S).

Mouton, *Ovin* (F). *Sheep*, *Ovis* (E). جنس حيوانات داجية مجترمة من فصيلة النضفانيات ترقى للقبالة والصوت والخلب. الولاد ضبان للذكر وضبانة للإناث. والذكر القمل يعطي كيشاً والناث نمجة وشاة. أنواعه معروفة كثيرة المند لا مجال للذكرما وتعليلها في هذه الموصلة.

١٦٧٠٥ - ضَبَاب أَلْبَان (F). Ovis aries stantopyga (S).

Mouton à queue grasse (F). ضبان ذو آية وهو من السلالات المروعة في الشرق الأوسط وأواس آسيا.

١٦٧٠٦ - ضَبَابَات (F). Ovinés (F).

الضبابات أو الضبابية اسم قسي فصيلة النضفانيات.

١٦٧٠٧ - ضَبَاب (F). Imperméable à l'air (F).

هو ما كان لا يتغلغل الهواء. راجع شيف.

١٦٧٠٨ - ضَبَاب (F). Uromastix (F).

حيوان من الزحافات يشبه الورل. موطنه البلاد الحارة يكثر في الجزيرة. يطلع نحو ٤٠ سم. وهو فيج الحية والشكل، صلب الرأس، قصير العنق، مستطيل الذنب الأخرى المقر المقلد. لونه إلى الصبغة وهي فيرة مشرعة سوداء. وأذنين أصفر صلب. يطلع يقفه في الرمل فينتفضر بعد وضعه بارهين يرباً || قوته الجنداب والدا والضب. والغرب يمرضون على صيده وأكله. كنهه أبو حل. انشاء كنهى قبة وجهه ضباب وأشب وضبان.

١٦٧٠٩ - ضَبَاب (F). Brouillard, Brume (F).

Fog, *Haze* (E).

بخار ماء كالكلي سريع الانتشار يتكاثف قرب سطح الأرض فيضها ويصحب البرودة. أسبابه عديدة أرسبها مرور دياح دافئة رطبة فوق سطح بارد أو اختلاط دياح حارة رطبة بغيرها أبرد منها.

١٦٧١٠ - ضَبَابَات (F). Griffe de lion (F).

Claw of lion (E). الضباب والضباب والضباب والضباب: بران الأسد.

١٦٧١٢ - ضَبَاب (F). Glattement du ceruad (F).

Yelping of the fox (E). هو حواء الضباب.



ضاب



ضبان



ضبان الألبان



ضباب



ضبابك



ضباب



ضباب

كثرة الازوت وقلة النيتروجين . ثانياً كثرة الرطوبة الجوية والحراة . ثالثاً الظل . الخ.

١٦٧٤٧ - ضُبُوبَة * Patersonia (S).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسيات . مهدا استراليا . سيقانها جذمية قصيرة . أوراقها خضراء النضال الجميلة . شواذها مائسة . أزهارها سبيل التجميع . أزهارها ملونة بقلوب كبيرة زرقاء اللون تتألف من أنبوب دقيق وثلاث بتلات خارجية كبيرة الحجم غائرة وثلاث بتلات داخلية دقيقة صغيرة متصبية || تزود الأزوين ضمن البويضات وفي الحقائق . ترضب في التربة المعتدلة الانحدار الزاوية الخصب || أنواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها التالية :

١٦٧٤٨ - ضُبُوبَة نَاعِمَة * Patersonia sericea (S).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها مزخرفة الخلفات تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . أزهارها الى الزرقاء البنفسجية المواج . قناباتها الزهرية مستطيلة الزغب القوام || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٧٤٩ - ضُبُوبَة هَزِيلَة * Patersonia fragilis (S).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم . أوراقها تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . أزهارها الى الزرقاء الجميلة . قناباتها الزهرية مرطاة . بتلاتها الخارجية املحجية الشكل تطول نحو ١٠ م . بتلاتها الداخلية تطول نحو ٣ م . || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

١٦٧٥٠ - ضُبُوبَة * Malaptera (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل وفصيلة الكنتيثيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الأبيض المتوسط || اصداؤها صندرة القد وشعيرة مخملية . فروانها معتدلة الانحدار وباعية الفلق الانحدارية التي تبدو كأرجل الارز شككاً وحظائياً .

١٦٧٥١ - فيج Insolation, Luminosité (F).

Sun-stroke, Luminosity (E).
الضج غيرة الشمس على الارض وهو تقيض الظل .

١٦٧٥٢ - ضُبُوبَة * Rhagonyque (F).

حشرة من القراحات تكسى رقيق ، اطلبها .

١٦٧٥٣ - ضُبُوبَة Cri du singe (F).

Cry of the ape (E).
صوت القرد .

١٦٧٥٤ - فيحل Etage (F).

Low-water mark, Lowest water level (E).
هو البروض ، المستوى الأدنى لياه بحر أو نبع . وهو المياه القليلة المسك بها كان مصفراً .

اسود . ظهراتها الى الطحلة الرمادية . وريشها عشائي ، عشائي اللون عند الانتشار . بطنها ويدها الى السمر || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الشبان .

١٦٧٥٨ - ضُبُوبَة

الانثى الضيقة الاحليل ، الصعبة الوضع من البقر والتم والمنازل .

١٦٧٥٩ - ضُبُوبَة كَرِيْفِيَّة * Laccocle cretica (S).

Laccocle de Crète (F).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . منته جزيرة اكريت وجبال لبنان من ارتفاع ١٠٠٠ الى ١٨٠٠ متر من سطح البحر || ساقه متصبية فراءه ، أوراقه مركبة ، وريشها ، السفلى مستطيلة اما العليا قصيرة . أزهارها صولاني التجميع ، تاجي . الانتكاز . أزهارها صفيرة تيفية اللون . ثمارها بيضية الشكل ، حسكة القشار ، ثنائية الفلق || تنويرها ربيعي .

١٦٧٦٠ - ضُبُوبَة * Unicites (S).

Unicites (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مضطربة الارجل وفصيلة الكنتيثيات || انواعها المعروفة عديدة . جميعها من متحجرات الطبقة الارضية الاولى .

١٦٧٦١ - ضُبُوبَة * Brachyculeus (S).

Brachyculeus, Brachycule (F).
جنس حشرات من فصيلة الضبوبات ، انواعها المعروفة اربعة جميعها صندرة القد بنية اللون الجاهل والموش بالاسمر والاخضر . وريشها خضيلة اللون ، سواد المواج || تركيب ريقاتها معظم التبييضات البنية انحصار التجميل والتنجير . ولأزهارها خصص صارة الارزاق وتلويها .

١٦٧٦٢ - ضُبُوبَة مُعَرَّجَة * Brachyculeus triangularis (S).

Brachyculeus triangularis (F).
حشرة غاشلة من فصيلة الضبوبات . جسمها صندرة القد بطول نحو ٨ م . رأسها مستعرض الفلق ، محرم ، بني اللون . خطها معتدل الحجم . عيناها صغيرتان . زباناها قشبان ، اسفان . كويلها بني اللون ، اسود الطوق . حجلتها صندرة سواد . ظهراتها لاحف . اورد اللون . بطنها الى السمر السواد . قنابها سود الانحدار والازراع ، بنية الفلتانين || تألف البراري حيث تكثر نباتات فصيلة المركبات انحصار الضفهاء .

١٦٧٦٣ - ضُبُوبَة Ivoire (F).

Ivory (E).
هو الما ، اطلبه .

١٦٧٦٤ - ضُبُوبَة فيج

الضباج : صمغ يركل . وكل جيرة يسم بها الطير وقيل السباع .

١٦٧٦٥ - ضُبُوبَة

نبات كالفستاييس الا انه اعظم مربع التضيض يصير ملونه في القرن الرائب فيطيب || (السان) .

١٦٧٦٦ - ضُبُوبَة شَمَل Verse (F).

Beaten down (E).
عارض يصيب الزرع فيستلقي على الارض . اسبابه عديدة اهمها عدم ازنان المتنامر التفاضلية في التربة انحصار



نسيث



فستج



ضبوبة هزيلة

Contributions (F).

Tax or rate (E).

في الاموال التي يجب على كل مكلف دفعها سائبة
ليسلم في النفقات العامة . وقد تكون ضريبة وقارية .

Contributions indirectes (F).

Indirect taxes or excise (E).

في الضرائب غير المقررة التي تدفع بمناسبة على معين .

Contributions directes (F).

Direct or assessed taxes (E).

في العائدات الثابتة أي الضرائب المصنفة بصفة الاستقرار .

Multiplication

ضرب عدد في غيره .

Variétés (F).

Variety (E).

الضرب ج شروب هي افراد حيوانية او نباتية من نوع
واحد تتميز بصفات خاصة فيزيولوجية وشكلية مثالا
ضرب الفطاح السماركن .

Verbe (F).

Verb (E).

اسم شامئ يطلق على غثفل الاعراض التي تسبب عدم
الادراك القلبي . وضربة الدم قد تكون اما زحف او وضع
او انكساب دموي في النسبة للتح أو غيره .

Mamelles (F).

Breast (E).

الثدي في اصل اللذي يعني ايضا للفرع كله .

Dommage (F).

Damage (E).

هو الاذى المادي والادبي الذي يقع على النفس او على
المال .

Molain, Mochellière (F).

Molar, Grinder (E).

اسم اقسام الانسان الثلاثة وهي القواطع والانياب والافراس
وتعرف الافراس بالانواج لانها تنجد الطعام قبل ارساله
الى المعدة . اما مدحها فيختلف مع فصيلة الحيوان ويجه .

Molles (F).

Serving (E).

نحو الاطعمة التي تتركب من فواكه الخضر والحبوب
التي تتميز بسلطانها المتعددة .

Nyctaribis (F).

Nyctaribis (E).

جنس حشرات راشنة من فصيلة القرصيات ودية ذوات
الجناسين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد
الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،

Pyrométrie (F).

Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

Pyrométrie (F).

Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

Lepturus (S).

Lepture (F).

جنس نباتات عشبية برية ، معروية ، حولية او مسرة
من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع المناطق الحارة من المائلين القدم والجديد || جميعها
شدية ، صغيرة ، متكاثفة المصنف ترتعها الماشية فيجود
درما وتسن عليها .

Orthogoriscus (S).

Orthogoriscus, Môle, Molide (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السمكيات . اصطلح مياه
بحار المناطق الحارة . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة
الشكل تبدو كأنها مقطوعة المؤخر . اجسامها غليظة
مطلقة تطول من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . زعانفها الظهرية
والبطنية مسطحة لتلاصق الفرجية القصيرة المقوسة .

Mollusca, Orthogoriscidae (S).

Mollus, Orthogoriscidae (F).

فصيلة اسماك بحرية من حريانات الانسان ودية ملحويات

Mollusca, Orthogoriscidae (S).

Mollus, Orthogoriscidae (F).

الفك . اجسامها ثلاثة . اصطلح مياه بحار المناطق الحارة .

جميعها غليظة الشكل ، خضة ، مبطلة ، مقطوعة المؤخر .

اشهر اجسامها الضخمة .

Photopériodisme (F).

Photoperiodism (E).

تأثير الضياء والاحتام في شراع النبات ونمو افعال النبات
من استجابة النهار أو الليل .

Macrocephale (F).

Macrocephalous (E).

ذو رأس أكبر واظم من المعتاد . رأس .

Cranilobé (F).

لحم وصفي يطلق على كل نبات مستضخم الفلقة .

Craniolobé (F).

لحم وصفي يطلق على كل نبات مستضخم الفلقة .

Lutte (F).

مصارعة .

Molles (F).

Serving (E).

نحو الاطعمة التي تتركب من فواكه الخضر والحبوب
التي تتميز بسلطانها المتعددة .

Nyctaribis (F).

Nyctaribis (E).

جنس حشرات راشنة من فصيلة القرصيات ودية ذوات
الجناسين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد
الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،

Pyrométrie (F).

Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

Pyrométrie (F).

Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

Pyrométrie (F).

Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .



ضفة

Mamelle, Pis (F).
Breast, Udder, Dug (E).

١٦٧٨٨ - صُرْمُوم

هو مدرّ اللبن عند البقرة والشاة والماعز .

١٦٧٨٩ - صُرْمُومَة ، صُرْمُومَة

هي النطفة الخارج من البقرة والشاة والماعز وبغيرها .

Mammaire (F). Mammary (E).

١٦٧٩٠ - صُرْمُومِيّ

لعت تمرّين يطلق على كل ما له صلة بالضرع .

١٦٧٩١ - صُرْمُومَة ، قَدِيَّات ، لَبَنَات

Mammifères (F). Mammifères (E).

أحد صفات الحيوان الخمسة ، تميز بالثداء أنها المرصعة ، يوضع الأولاد أسناء وبجهازها التنفسي الذي لا يخلو من اللثة . لذلك فهي تحتل مركز الصدارة بين الحيوانات الفقيرة || رتبها ١٤ تكتفي إلى شصتين المشفيات واللاشميات .

١٦٧٩٢ - صُرْمُومَة * ، صَبْوُ الصُرْمُوم

Mamillaria (S). Mamillaire (F). Mamillary (E).

جنس نباتات لحية مسمرة من فصيلة الصباريات . أنواعها المعروفة زهاء ١٥٠ منبتها البلاد الأمريكية . معظمها زينة يزرع لندابة أشكاله وحسن أزهارها وروقتها وجلها .

١٦٧٩٣ - صُرْمُومُوس ، هو اندوين الماء ، أطله .

Codium (S).

١٦٧٩٤ - صُرْمُومُوس *

Codie (F). Codium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . أنواعها المعروفة قليلة العدد . أقطابها بجوار البلاد المعتدلة الحارة || جميعها أسلنجية التركيب ، غاطية ، عادمة الأوراق .

١٦٧٩٥ - صُرْمُوم

* حجر يشبه الآثاب في منطه وورقه وله ثمر أبيض مدور مفلطح كعين الحائط المصنوع بفرس* (السان) .

Gourde (F).

١٦٧٩٦ - صُرْمُوم

هو القرح الطويل ، أطله .

Queraillet (F).

١٦٧٩٧ - صُرْمُوم

الضرع هي الخواص البحرية ، نبات طبي طيب الرائحة أزهاره مشربة بحبرها للتل .

Aiglon (F). Eaglec (E).

١٦٧٩٨ - صُرْمُوم

هو قرع الغراب .

Acidanthers (S).

١٦٧٩٩ - صُرْمُومُوس *

Acidanthère (F). Acidanthères (E).

جنس نباتات عشبية دفيضية من فصيلة السونيات . منبتها بعض المناطق الأوربية . سورها دقيقة ترتفع من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوراقها عسفية اتصال معتدلة الطول ، بحرية الخضار . أزهارها عقودية التجميع . أزهارها مستطيلة الأنايب ، سداسية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة ثلاثة ، أشهرها التالية :

١٦٨٠٠ - صُرْمُومُوم أَصْفَر

Acidanthères lutes (S). Acidanthères jaune (F).

نوع من الصُرْمُوم . ساقه دقيقة ترتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها عسفية اتصال البحرية الخضار . أزهاره كبيرة القد ،

Nyctzeribides (S).

١٦٧٨١ - صُرْمُومِيَّات *

Nyctzeribides (F). Nyctzeribides (E).

فصيلة حشرات رابضة من رتبة ذوات الجناحين . أجسامها وأرجاعها المعروفة نحو ٩٥ منتشرة في معظم مناطق العالم . أجسامها الاستوائية والحارة || أجسامها صغيرة معتدلة الطول من ٢ إلى ٤ سم . رؤوسها مزوالية الشكل ، شبه مدسمة . عينها شديدة الصغر . قوائمها نحيفة . جميعها عادمة الأجنحة ولقرزان || جميع أنواعها رابضة تعيش على الأوراق والخنافس || أشهر أجناسها القرمرة .

Gelsorrhiza (S).

١٦٧٨٢ - صُرْمُومُوم *

Gelsorrhiza (F). Gelsorrhiza (E).

جنس نباتات عشبية دفيضية من فصيلة السونيات . مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية . أوراقها ضيقة اتصال السيلية الشكل أو الخيطية . أزهارها سفلى التجميع يركن على شراخ قصير . أزهارها قمية الشكل ، متساوية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة عديدة معظمها برقي وبضها زرامي تركبي ، أشهرها التالية :

١٦٧٨٣ - صُرْمُومَة بِصُفِيَّة الرُّوك

Gelsorrhiza ovata (S). Gelsorrhiza à feuilles ovales (F).

نوع من الصُرْمُوم الأتريني . أوراقها بيضية الشكل قليلة العدد الذي لا يتجاوز ٤ فصلا عابقة الخضار المنتصب بالأسود . شراخها يرتفع نحو ١٥ سم . وينتهي بسيلة ودلة عديدة الأزهار . أزهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢٠ مم . || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

١٦٧٨٤ - صُرْمُومَة كَسُومِيَّة *

Gelsorrhiza secunda (S).

Gelsorrhiza monotrope (F).

نوع من الصُرْمُوم الأتريني . أوراقها غيظية . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي بمجموعة الأزهار السيلية الترتيب . أزهارها بنفسجية اللون ، متصلة الحجم ، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٣٠ مم . || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٦٧٨٥ - صُرْمُومَة مَتَوَالِصَة *

Gelsorrhiza humilis (S).

Gelsorrhiza modesta (F).

نوع من الصُرْمُوم الأتريني . أوراقها غيظية . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي ببعض الأزهار المتتالية ، المتوسطة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم . لنبا إلى الخضار الكثيف المشيز بالأحر || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٦٧٨٦ - صُرْمُومَة نَشِيطَة *

Gelsorrhiza grandis (S).

Gelsorrhiza robusta (F).

نوع من الصُرْمُوم الأتريني . أوراقها سيفية الشكل مستطيلة شراخها تثنى ضلع موزع يرتفع من ٢٥ إلى ٣٥ سم . أزهارها إلى الخضار الباهت التي الملوخ يطو تشيز وسطى أحر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٦٧٨٧ - صُرْمُوم

* دابة بين الكلب والذئب أو بين الكلب والسنور (م).



صُرْمُومَة



صُرْمُوم

سداسية البتلات التي تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يملو تنحس يرتقالي ناري الملاج || تنويرها يستمر طول شهر حزيران .

١٦٨٠١ - فُتُرو هو البطل الشرقي ، اطلبه .

١٦٨٠٢ - فُتُرو Limier (F). Bloodhound (E). الاثنى عشرة ج شواء . والفُتُرو كلب كبير الجفة شديد المراس يستندم في سيد الوشوش .

١٦٨٠٣ - فُتُروغ الفُتُروغ : الصنبر من كل شيء

١٦٨٠٤ - فُتُري Polygama (F). Polygamist (E). صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة اناث . وصفة كل نبات يحصل ازهاراً خشوية وذكرية واكثرية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - فُتُريكة Impôt (F). Impost, Tax (E). الضريبة هي حصة اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي لكل اسلوب تتبين به التكاليف العامة على الملكيين . والضرائب عديدة تنحس منها :

ضريبة استدلالية Impôt indiciaire
ضريبة الارباح الاستثنائية Impôt sur les bénéfices exceptionnels
ضريبة البلدية Impôt municipal
ضريبة التراكات Impôt de succession
ضريبة التفتح Patente
ضريبة النخل Impôt sur les salaires
ضريبة التعلل امام ضريبة الربع Impôt général sur le revenu
ضريبة الطرق ، بدل الطريق Prestation
ضريبة القيم المنقولة Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
ضريبة التصاب Impôt de quotité
ضريبة تصاعدية Impôt progressif
ضريبة تنازلية ، ضريبة انحدارية Impôt dégressif
ضريبة توزيعية Impôt de répartition
ضريبة جزائية Impôt forfaitaire
ضريبة شخصية ، بدل Impôt personnel
ضريبة عقارية ، خراج Impôt foncier
ضريبة حقية Impôt réel
ضريبة غير مباشرة Impôt indirect
ضريبة مباشرة ، مقروءة Impôt direct
ضريبة نسبية Impôt proportionnel
ضريبة نفوية Impôt cédulaire

١٦٨١٤ - فُتُريم Gommosa (F). وسم يصيب الأشجار المنتشرة ويثيرها يمرض بالتفصيص ، اطلبه .

١٦٨١٥ - فُتُمالكة Endogamie (F). Inbreeding (E). التصالب بين اقارب من اصل واحد او بين الانسال قديم واحد .

١٦٨١٦ - فُتُمة Echinops (S). Echinops, Edinops (F). Echinops (E). جنس نباتات زينة شائكة مسمرة من فصيلة الصباريات انواهم عديدة بعضها اسطوانية ، فضلة ، لحية ، فزوة الشثانة . سدائهما شائكة تركز على ثيج الاضلع . ازهارها كبيرة اللد ، جميلة الشكل والالوان تقوم حل شاربغ مستطيلة تكسيها الحرافف المرسوقة العراقية . تزود في المراكب لانها تخشى البرد .

١٦٨١٧ - فُتُف Multiple الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - فُتُفل Consanguinité (F). Consanguinity (E). هو في اللوجان اسطفا الاقارب فاستفادوا ذلك لاصح النسل او تحسبه او تكبت بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - فُتُفاب Cri du lapin (F). Cry of the rabbit (E). صوت الارنب اذا اخلت .



فُتُمة

١٦٨١٦ - فُتُفونف Triple-awned grass (E). Aristida (S). Aristide (F). Dreygrannan (D). Aristide (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ويصمر من فصيلة النجيليات . منتها البلاد الحارة والمعتدلة . انواعها كثيرة البند جميعها زقية الصفات المسن الحافة . ستالها لينة زباء . تكثر في المروج والمراعي الطبيعية وبين الزروع .

١٦٨٠٧ - فُتُفوس Colibri (F). هو الطرقلوس . اطلبه .

١٦٨٣١ - **سَمَط دَمَوِي** (F). Tension artérielle (F).
Blood pressure (E).
الضغط الدموي أو التوتر الشرياني هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين بفعل حركة القلب .

١٦٨٣٢ - **سَمَطِي** (F). Glapissement du lapin (F).
Yelping of the rabbit (E).
صوت الأرنب .

١٦٨٣٣ - **سَمَطِيَّة** (F). Luxuriante (F). Luxuriant (E).
هي الغرسة الكثيرة الريانة وتُلبى الشفيرة من بقل وشب .

١٦٨٣٤ - **سَمَطِيَّة** (S). Cristatella (S). Cristatelle (F).
جنس حيوانات طفيلية من طائرات الشرج تعيش في المياه العذبة . الثواها متحركة .

١٦٨٣٥ - **سَمَط** (F).
هي نارية الحطاة فراشة صغيرة القند سمراء اللون إذا لمست شري الجذع من لسعها يذيق حراشفتها . ج غفلة .

١٦٨٣٦ - **سَمَطَج** (F). Discoglossus (F). Discoglossus (E).
جنس ضفادع من فصيلة الضفاديات . أنواعه المعروفة خمسة ، أعطاهم تمتد من الهند الصينية إلى الشرق الأوسط وبعض البحر المتوسط || أجسامها صغيرة الحجم تطول من ٥ إلى ٨ سم . رؤوسها متوسطة القند . جبينها كبيرة نافرة . السنبا مستديرة الشكل . قليلة الحركة . أصابع قوائمها الخلفية قصيرة الحطاب الذي لا يتجاوز أنزاع الأذن . جلدها عادية الناعمة والنعول ، شديدة العمة || أنوثها إلى السمرة الخفيفة يملؤها تيجاج اسمر حادق وضط اصفر احمر تمتد من الرأس إلى العجز . وتحتل اصمرا عايشان يمتدان من العينين إلى طرف الحطاب || يطنها سوية الألوان الباهية يغلب فيها الحطاب الاخير || تعيش في المناطق الجارية الماء . تسرح في الليل . قنبا الحشرات والبهتان || الاناث تسرا دعبها في الماء ضمن شلثين كل شلة تحوي من ٢٠ إلى ٣٠ دعبلة تتكثف بعد التمرلة بنحو ثلاثة اسابيع .

١٦٨٣٧ - **سَمَطَج مَلَوَن** (F). Discoglossus pictus (S). Discoglossus pictus (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة الضفاديات التي تحمل اسمه . جسمه صغير القند يطول نحو ٦ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الانثى . رأسه متوسط الحجم . جبينها كيرتان جاسطتان . حنكه واسع الشفق . مسن الفك العلوي . قاتمها الاماميتان رابعيتان الاصابع الطويلة . قاتمها الخلفيتان خامستان الاصابع المقيدة بخطاب قصير || جلده قليل الناعمة ، شديد البهتان . ثوبه إلى السمرة الخفيفة يملؤها تيجاج اسمر وضط اصفر احمر تمتد من مقدم الرأس إلى طرف العجز ويبدتان كستيتان تمتدان || العينين إلى طرف الحطاب . بطنه إلى الحطاب الاخير || يألف المنطق والتدن . يسرح في الليل . قوته الحشرات والبهتان والذباب والحوم . يباه الشوي يستمر نحو اربعة اشهر || يعبر من الضفادع النافعة .

١٦٨٣٨ - **سَمَطَجِيَّات** (S). Discoglossidae (F). Discoglossidae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازية من لة القبيات ومريئة

١٦٨٣٩ - **سَمَطَج** (S). Euryceus (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم سنيات المنقار وصيلة الزرزوريات . موطنه جزيرة مدغشقر || جسمه معتدل القند شبه السمرة . ثوبه إلى السواد اللامع . ذناؤه واباهر إلى السمرة الطرازية . منقاده أزرق اللون شبه غروبي الشكل . كبير ونظيف ويغلف مقدم الرأس كالكامنة . جناحه ذريا الاطراف . ذنبه مستدير الزوال || قوته الحبوب والطار واخترت .

١٦٨٤٠ - **سَمَطِيَّوس** (F).
هو الحليين المرفوف ، الحلب .

١٦٨٤١ - **سَمَطِيَّوس** (F). Renardeau (F). Fox-cub (E).
هو ولد الثملة أي أنثى الثعلب .

١٦٨٤٢ - **سَمَطِيَّوس** (F). Poignée d'herbes (F). Wisp of herbs (E).
الضفت : تيقنة من حشيش غسطة الرطب باليابس . وكل ما ملا الكف من النبات فهو سَمَطِيَّوس || وضفت النبات : جعله اسفلًا .

١٦٨٤٣ - **سَمَطِيَّة** (S). Roscoe (S). Roscée (F). Roscoe (E).
نبات عشبي نجيل الاربية من فصيلة الزنجبليات . مهدا بعض مناطق الهند والافغان . ساقها موقفة ترتفع نحو ٥٠ سم . اوراقها لائحة متعاقبة سنائية التصل بحرية الخضار انزاعها سبيل التسجيع . انزاعها صغيرة القند زرقاء اللون || تزود للقرين في الحقائق التي لا تفتش شدة القر .

١٦٨٤٤ - **سَمَطِيَّة** (F). Poule (F). Hen (E).
هي الدجاج . ج . سقادر .

١٦٨٤٥ - **سَمَطِيَّوس** (F). Pousée (F). Thrust (E).
هو الطبع الاقني على جدار ما من جراء ككل التراب او الماء .

١٦٨٤٦ - **سَمَطِيَّوس** (F). Pression (F). Pressure (E).

١٦٨٤٧ - **سَمَطِيَّوس** (F). Tension de la vapeur (F). Vapour pressure (E).
هو قوة امتداد البخار .

١٦٨٤٨ - **سَمَطِيَّوس** (F). Pression atmosphérique (F). Atmospheric pressure (E).
الضغط الجوي هو مقدار وزن الهواء في أي نقطة كانت معينة فوق سطح الأرض . وهو يقدر حته سطح البحر بما يعادل ضغط هواء من الزئبق ارتفاعه نحو ٧٦ سم . لذلك فالارتفاع عن سطح البحر يتعكس كمية الضغط كما هو الحال في الجبال حيث تقل كثافة الهواء التي تقرر الضغط || ويتأثر الضغط أيضا بميل الحرارة والرطوبة اذ كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وضغط وزنه وكما زاد بخار الماء يزداد وزنه كذلك || وهذا الضغط الجوي يقاس بواسطة جهاز خاص يسمى المرواز (الباربومتر) .

١٦٨٤٩ - **سَمَطِيَّوس** (F). Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).
اثبت العلم حل ان محتويات الحويصلات النباتية يد ان تأخذ كائنة معينة من المحلول الملحي الفلاني تنفك من اللشاء الذي يحيط بها وتتقلص . فهذه البادرة الطبيعية الحيوية تسمى الضغط الحلو أو الانسلا .



سَمَط



سَمَط



سَمَطَج مَلَوَن

١٦٨٤٦ - هَفْدَعُ أَحْمَرُ * هَدْمُولُ أَحْمَرُ

Rana esculenta (S). Grenouille verte (F).
Green Frog (E).

فَنَان

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الضفدليات. اصطناعه تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى الى الادي واوروپا الجنوبية والوسطى والغربية وافريقية الشمالية. جسمه صغير الحجم. الذكر اصغر حجماً من الانثى. يطول من ٥ الى ٦ سم. بينا تطول الانثى من ٧ الى ٨ سم. رأسه متوسط الحجم. خطمه مستعرض للشدق. فكه السفلي عديم الاسنان. عيناه كبيرتان جاحشتان. اصابع قاتمته الامامية طليقة. اما اصابع الخلفيتين فليقة عسكارية لا يتجاوز الزام الثاني. جلده مائل البشرة الشائبة. ثوبه الى الخضار القامق تلوين مائية عطلة ورقيقة سمراء لاقياسية الشكل تكسفت الظهر والاطلاقان والقوائم من جوانبها الخارضية. ينقل الى البياض الاخير. وهذا النوع من الضفادع يمان، يبيض الشيء، البينة التي يبيض فيها. يتميز الذكر بملفين في مؤخر الرأس من البين واليسار ينتفخان عند التلقيح، ثم بالعلبان المحبسة التي تملأ اطراف اصابعه الامامية في زمن التزاوج. يبيض معظم حياته، نحو ١٠ سنوات، في الغدران والمناجم يتكرها في الليل عندما يسرح في طلب القرع ويمرر فيها عند الفجر. قوته الحشرات والديدان. الانثى تسرا في احوال الربيع من ٥٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ بيضة طغر الواحدة نحو ١ سم. في ثلة هلامية المادة تتلفد بها في المياه الفسحة فتفترس وتستقر في مكانها حتى التفك الذي تفرح منه من اسبوع الى ثلاثة اسابيع. اما الطور البلعبي فيستمر من ٧٠ الى ٩٠ يوماً.



صفداح اخضر

١٦٨٤٧ - هَفْدَعُ أَحْمَرُ * هَدْمُولُ أَحْمَرُ

Trichobatrachus robustus (S). Grenouille polue (F). Hairy frog (E).



فندع اشمر

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الضفدليات. موطنه بلاد الكاميرون من امثال افريقية الاستوائية. جسمه صغير القد اعليبي الشكل يتميز بكبر قد الذكر الذي يطول من ١٢ الى ١٤ سم. ويصغر قد الانثى التي تطول من ٨ الى ٩ سم. ويتميز الذكر ايضاً بشعره الكثيرة التي تكسفت الاطبلين وباعمال الفخطين. رأسه مستعرض القامة، مغطوم الخلف، كبير الشفق. عيناه صغيرتان، مستديرتان، جاحشتان. فكه السفلي عديم الاسنان. اصابعه طليقة في القاتمحين الاماميتين وبقيدة في الخلفيتين عسكارية لا يتجاوز الزام الاول. اطراف اصابعه الامامية والخلفية مجعزة بظباب حبيبية تمكته من تسلق السطح المائلة. ثوبه الى الخضار الاسمر تلوين ماجة سعاد قامة ورضان اسودان يمتدان من مقدم الخلف الى مؤخر الرأس، ويبدع سمراء قامة تقطع الصفعة املها من قد الرأس الى العجز. ثم رشفة طليقة سوداء يتيقج مستدير اسود يملو مؤخر الظهر والقوائم الاربع. الانثى تشمل بذات الثوب ولكنها عادية الشهور الكثيرة والظباب العرفية وهي تعيش وسحبا في البراري والسهول القريبة من مجاري الماء بينا يعيش الذكر في مياه الجبال العالية الحرارة ولا يفتش عن الانثى ويقترب منها الا في زمن السفاد.



صفداح اخر

١٦٨٤٨ - هَفْدَعُ أَحْمَرُ * هَدْمُولُ أَحْمَرُ

Rana temporaria (S). Grenouille rousse (F).
Red Frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الضفدليات. اصطناعه

السوفيات ورتبة البتراوات اي عديلات الذهب. اجناسها وانواعها متوسطة العدد. اجناسها شبيهة باجناس الضفادع لكنها تتميز بالثبات المستوية لقليلة الحركة. ثم بوجود اصلاح قصيرة تركزت على الفقار الامامية المتقدمة، واصيراً بتعدد التحويلات الظلية الجانبية القائمة على قعر العجز. اعرف اجناسها واشهرها الضفادع والاكيت والفتاق.

١٦٨٤٩ - هَفْدَعُ مَذْكَبَةٌ

Urodèles (F).
Urodèle (E).

رتبة من الضفدنيات تعرف بالسفريات، اطبلها.

١٦٨٥٠ - هَفْدَعُ

Boues de vache (F).
Cow-dung (E).

هو خشي البقر.

١٦٨٥١ - هَفْدَعُ

Amnicle (F).

الصفاني من الحيوان واليات الذي يعيش على صفاف الانهر والبيسات.

١٦٨٥٢ - هَفْدَعُ

Omostra colon (S). Omostra colon (E).

حشرة نائمة دامت من فصيلة الرزيبات ورتبة سمذات الاجنحة. تألف الموائع الرطبة التي تكثر فيها الفطور. غذائها تعيش على الفطور وعلى المواد النباتية والفسوية المتحللة. يربطها ثوب الفطور وتعيش عليها دون سواها. جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ سم. ثوبها الى السمرة الجارية للملح. رأسها صغير الحجم. صياها صغيرتان، زباناها صولجانيان، نحيلان. ظهرها قليل الاحدباب، مستدير المؤخر الاسفل. شداهما غفيلتان التميز، كهيئة الخيل. لها جيل واحد في الجيل. تظهر الحشرة المعدلة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف، تسرح في النهار. كساده بعد ظهورها بسة اسابيع. تمتع المكان في تكاثر الفطور. البرقة عنه بلونها الادراك التام تطول نحو ٧ سم. جسمها مستطيل للمقدم والرأس، مستطيل المؤخر، سداسي الارباع، عسكي. اللون اسمر للملح، حالك السمرة في الرأس والمفاصل. طوط الاكامل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر تلق تحضره البرقة في الفطر العالي.

١٦٨٥٣ - هَفْدَعُ

الضفادع من الضفادع هو الضفد الاحمر.

١٦٨٥٤ - هَفْدَعُ

الضفادع مائة هفريقية صلبة في حوف الحافار من القفوس. وقد تكون القفس. اطبل نسر.

١٦٨٥٥ - هَفْدَعُ، هَفْدَعُ، هَفْدَعُ

Rana (S). Grenouille (F). Frog (E).

جنس حيوانات يترأ قاذية من فصيلة الضفدليات وصف الضفدنيات. انواعه المعروفة ١١٧ موطنها العالم. تتميز باجناسها الريمية وباستطالة قوائمها الخلفية التي تساعدها على السط والرياسة. تبيض في المياه الراتكة، يبيضها يبيض السبل واكثر يفتق من بلاصت صغيرة تقع في الماء حتى بروز واكامل قوائمها. قوته الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة. ومن امثاله الضفدول والنداد والفتاق. ولذكر يكتي باي حيرة الا انثى تنصق صفعة ويحاجه وكنيتها ام حيرة. اشهر انواعه واعماها ما لي.

١٦٨٥٢ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول جَبَر

Rana goliath (S). Grenouille géante (F).

Goliath frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. موطنه بلاد الكابرون من أعمال إفريقية الاستوائية. اكتشف في أوائل القرن الحالي ويستمر أكبر أنواع الضفادع المعروفة وأكثها وإبطها. الذكر صغير. الذكر يبلغ من ٣٧ سم. والآن طول من ٤٥ إلى ٥٢ سم. يعيش قرب المنابع ويجاري الماء ولكنه لا يتراد الماء إلى زين التسرة. تقيته قريب الشبه بصيغ القور. قوته الحشرات والجوارح والمظاء والوزغ والفئران وكل ما دب ويمكن منه.

١٦٨٥٤ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

Rana agilis (S). Grenouille agile (F).

Agile frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله قعر من الشرق الأدنى إلى أدوية الجنوبية الشرقية وللشمال. جسمه صغير القند. الذكر بطول من ٦ إلى ٧ سم. والآن طول من ٨ إلى ٩ سم. ثورته قريب الشبه بصيغ الضفادع الأخرى إلا أنه يتميز بانسلاخ القامتين الخلفيتين ما يجعل مجال قفزه نحو مترين. وهو يستعرض الشفق. عامد الانسان في الفك السفلي. عيناه صيرتان مستطيلتان. أصابه طليقة في القامتين الاماميتين وقيدة في الخلفيتين بحظاظ متوسط الامتداد لا يتجاوز نصف الاصابع. جلده مائس البشرة، قليل التصلب الثقيلة المتبادلة المبيضة في ثوربه يمانن البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشفعة المحتلطة تملحها رشفة سمراء في الظهر والقوائم ويرتادان كستيتان تمتدان من مقدم الحلق إلى مستوى الكتف. يطنه وشفاة إلى البياض الأخرى. يعيش معظم حياته في الحقل ويبيت في النهار ولا يقرب من الماء إلا في زين السفاد والكترة ويصنمها بكثرة يرد الشفاء على هجر الماء الأرضي إلى الماء. قوته الحشرات والديدان. ذكره عامدة البيلة القصيرة. الآن تسراً ابتداء من أواخر نيسان من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ ديلة في حبل حلامي المادة تطرحه في المياه الفصيلة نفوس ويستقر في مكانه حتى التفت الذي يتم عادة قرب أواخر تموز.

١٦٨٥٥ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

Amphibia (S). Amphibiens, Batraciens (F). Batrachia (E).

صف حيوانات من الفقاريات الجملدية التنفس. صلاله واجناسه وأنواعه كثيرة التجمع جميعها ثلاث رتب: حديدات الذنب وديدان الذنب والبرمائيات.

١٦٨٥٦ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

Odontophorus (S).

Odontophore, Capucine (F).

جنس طير من فصيلة الطيوريات. الأنواع المعروفة نحو ١٧ أصلها من المناطق الاستوائية الآسيوية والأمريكية. ملحيها الجاهلي حامي. جماعاتها قليلة العدد. تألف البراري والارحاج الضلة. قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والأنواع وبعض الأصناف والوزور البرية. أجسامها ربة تعلق من ٣٠ إلى ٣٦ سم. رؤوسها صغيرة عترة بفتازع قصيرة مرفية الشكل تمتد من قواعد منقارها إلى الأقداف. متلحيها صيرتة غالية الشكل، مسلة الأذنان السفلي. عيرتها صيرتة، حارها عامد الريش خضف بالآخر أو الأصفر أو الأحمر. سواقلها مستديرة، لاسعة. أذناها

تتمل معظم البلاد الآسيوية والشرق الأوسط وأدوية. جسمه صغير القند. الذكر بطول من ٦ إلى ٧ سم. والآن طول من ٨ إلى ١٠ سم. رأسه متوسط القند. خطمه مستعرض الشفق. فكاه الانسان. عيناه كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القامتين الاماميتين وقيدة في الخلفيتين بحظاظ متوسط الامتداد. جلده مائس البشرة. عامد التصلب. قوته الشفعة المحتلطة المزاج يمتد في الاطليل ويبيت في الجبل وتعلو رشفة سمراء متروحة في القوائم ريدة كستية منه مؤخر كل حين. وهذا الضفدع الذي يمانن إلى حد ما البيئة التي يعيش فيها يشق ويسمر ويلتون، بعض الشيء، بالوان محيطه. يعيش معظم حياته في الحقل نحو ١٢ سنة قرب المنابع ويجاري الماء والفئران. يسرح في الليل ويحجب في النهار أما في الماء أو بين الحجارة ونحوها في كل مكان يزين له الاستار والسكنية. قوته الحشرات والجوارح والمظاء والوزغ والديدان. الآن تسراً في أوائل الربيع من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ ديلة. قطر الوحيدة نحو ٢ سم. في شلة من الحبال خشابة المادة تموم على سطح الماء. التنف يحصل بمد التدرج باسبونين وثلاث يتجاوز ثلاثة اسابيع. والظهور البلوطي ينتمي في أواسط الصيف.

١٦٨٤٩ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

Crapeud (F). Toad (E).

هو السليوم، الطليق.

١٦٨٥٠ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

Rana arvalis (S). Grenouille oxyrhina (F).

Arvalis frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله قعر من الشرق الأوسط إلى أدوية الوسطى. جسمه صغير القند. الذكر بطول من ٥ إلى ٦ سم. والآن طول من ٧ إلى ٨ سم. ثورته شوكية الضفادع الأخضر وهو مستعرض الشفق. عامد الانسان في الفك السفلي. عيناه كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القامتين الاماميتين وقيدة في الخلفيتين بحظاظ ضيق لا يتجاوز الزايم الاول. جلده مائس البشرة قليل التصلب الثقيلة المبيضة. ثوربه يمانن البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشفعة الصنابية تملحها ماجة سطحية وتقيح اسمر وشفة بنية. يعيش معظم حياته في الحقل نحو ١٢ سنة في الحقل والرماري والنباض القريبة من الماء. يسرح في الليل ويحجب في النهار بين انبات ونحت الحجارة والقلم على كل موضع يزين له الاستار. قوته الحشرات والديدان. الآن تسراً نحو ٢٠٠٠ ديلة في شلة حلامية المادة تطرحها في المياه الفصيلة نفوس ويستقر في مكانها حتى التفت الذي لا يتجاوز مدته ثلاثة اسابيع.

١٦٨٥١ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

الصفدع الثاني نجم ثير من كوكية تقطس مركزه على الشعة الجنوبية من الذنب.

١٦٨٥٢ - هُكْدَعَجَجَبَر * ، هُدْمُول تَشِيْط

Rana muglens (S).

Grenouille taureau (F).

نوع من الضفادع موطنه امريكية الشمالية. كير الجئة طول نحو ٥٠ سم. تقيته يقبه صيغ القور.



صفدع الحقل



صفدع جبار



صفدع تشييط



صفدود

اسمر المرقوق. يظنها اسمر الصفحة العليا، اسود السفلى. قوائمها الى الشقعة اسفرا || مسرعا البراري والنايات حيث تكثر الاغشاب النجيلية. قوتها صنف النجيليات .

١٦٨٨٨ - مُصَيَّرَة مَرْقُوقَة

Miridius punctulatus (S). Miris punctus (F). حشرة غاشلة من فصيلة النجيليات . جسمها صغير اللثة ، يطول نحو ٥ م. رأسها صغير ، محرم ، حنطى اللون . خطمها مستدل الطول . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها حنطى اللون . كوسلها حنطى مرقوش بالاسمر . حجبها صغيرة . حجبها ظهرها مستطيلتان ، حنطيتان ، تعلوها رقعة سمراء وبقع اسود واصفر . ظهرها لائح . يظنها الى السمرة السوداء حنار اصفر بني . قوائمها سمراء || تألف البراري والمواقع كفضلة مرتعها الاغشاب الجرية .

١٦٨٨٩ - مُصَيَّرَات

Capidae, Miridae (S). Capidae, Miridae (E). فصيلة حشرات من رتبة غشقات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد . بعضها صار . جميعها صغيرة اللثة ، مستطيلة الشكل . ألوانها مختلفة الالوان يظن فيها الاصفر ثم الاخضر والبي . قرونها الاستشعارية رباعية الفواصل . استنكاكها ثلاثية الاجزاء . اسنانها ثلاثية القل . تمتص مكبا داخل الانسجة النباتية وتركب عدة نباتات تمتص منها .

١٦٨٩٠ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Panement (F). Dressing (E). حاية الجرح والملاج والنساي تسهيلا لانساه .

١٦٨٩١ - مُصَيَّرَة

Tetracentron (S). Tétracentre (F). حشرة حرجية وزراعية ترميئة من فصيلة الغشقات . ساقها مستقيمة فناء ، طول نحو ٣٠ م. اوراقها عابلة بيضية ، طول نحو ١٢ م. وتعرض نحو ٧ م. ناعما الى الخضار الزاهي ، عروقها خراء اللون ، مدحا من . اذواج الى ٧ . اذواها صغيرة اللثة ، صفراء اللون ، رباعية القصل ، ثلاثية البليات ، رباعية الاسدية .

١٦٨٩٢ - مُصَيَّرَة

Bouquet (F). Grove, Arbour (E). هي الآلة الصغيرة الخافضة ج. فموز .

١٦٨٩٣ - مُصَيَّرَة

Atrophie (F). Atrophy, Atrophie (E). مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

١٦٨٩٤ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Atrophie (F). Atrophy, Atrophie (E). مُصَيَّرَات الخفاش

١٦٨٩٥ - مُصَيَّرَات الخفاش

Protobranches (F). Protobranch (E). رتبة من الرغويات صفحيات الخفاش تتميز بنحاشتها الخيطية البسيطة المنتصبة ، غير المتعوية ، لتفصا يعضها او يجمعها الى يعضها نزع من الحلب اللينق القصير .

١٦٨٩٦ - مُصَيَّرَة

Turgenia (S). Turgenia (E). جنس نباتات عشبية سولية برية من فصيلة الخياثيات . انواعها الممروقة قليلة المدد منتجا بعض مناطق سويس

البحر الايض المتوسط اصحها سورية ولبنان وفلسطين || سيقها مثلمة ، غشقة ، زبد ، قليلة الفروع الانشعاب .

١٦٨٩٧ - مُصَيَّرَة

Garantie (F). Garantie, Warranty (E). الضمان هو حاية شخص من ضرر يهدد او تعرضه من ضرر وقع عليه . لذلك فصيته عديدة تخص منها بالذكر :

ضمان اليريب

ضمان القتل الشخصي

ضمان فعل

ضمان ملوك

١٦٨٩٨ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Bouquet, Gerbe de fleurs (F). Bouquet, Bunch of the flowers (E).

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة الجُنُجُل

Capsus vandilicus (S). Capsus du houblon (F). حشرة من النجيليات ثوبا الى الصفرة الباضة . طول نحو ٦ م. ومرضها ٢ || تركب اوراق الجنبيل تنصص صارتها وتؤذيها .

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة الحُجُوز

Phytoecoris populi (S). Phytoecoris du peuplier (F). حشرة غاشلة من فصيلة النجيليات . جسمها صغير اللثة ، يطول نحو ٧ م. لونها الى البياض الاخير يطوي تقيج اسمر يشمل جميع الاضداد بما فيها الزباني والقروم || رأسها صغير . خطمها مستدل الطول . حناها كيرتان ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كوسلها في الفكك ، مقطوم الطرف . حجبها حرجية . حجبها ظهرها مستطيلتان . قوائمها مبعثرة الحلب || تركب اوراق الحشور والصفصاف والزيون .

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة السُّسُكُورُون

Capsus pestinaceus (S). Capsus du pansis (F). حشرة من النجيليات ثوبا الى الزرقعة يطولها موج اخضر . طول نحو ٤ م || تركب مع رقاتها اوراق واخضر السيسارون والجزر .

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة الحُجُوز

Capsus carvinus (S). Capsus du sainfoin (E). حشرة من النجيليات طول نحو ٤ م. ثوبا الى الصفرة الزاكية . ارجلها خضر . زباناها الى الايبورية || تركب الثرن حل اختلاط انوامه فتؤذي الارواق وتذبلها .

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة الحُجُوز

Capsus bipunctatus (S). Capsus du chou (F). حشرة من النجيليات ثوبا فسقي اللون . طول نحو ٨ م. ومرضها نحو ٢ || رقاتها دقيقة الجسم خضرار اللون تنقص وتتشمل حل اللقوف وتقتل فعل الحشرة الكاملة بالمتصاص مصابة الورق .

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة سَوْدَاة

Capsus star (S). Capsus noir (F). حشرة غاشلة من فصيلة النجيليات . جسمها صغير اللثة ، يطول نحو ٦ م. رأسها مستعرض القفص ، اسود اللون . خطمها مستدل الجرم . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها شديدة الاسر . كوسلها اسود . حجبها صغيرة حرجية . حجبها ظهرها مستطيلتان . ظهرها اظفر اللون ، اسود .



مصينة الجنبيل



مصينة السيسارون



مصينة المرن



مصينة اللقوف

من ذنب البلوغ والتجبر || يكثف ويستعمل احد الفواقر
القائمة المركزة على النملى تروا به الاثر او عند ظهور
عوارض القطر .

١٦٩٠٢ - شَهْل

Sternotherus (S). Sternothera (F).

جنس سلاف مائية من فصيلة الخسفيات . انواعه
المعروفة ثلاثة . اصلاتها بعض مناطق افريقية الشرقية
والخليج حتى الهند ، تألف الاخر الجبلية والشمالية ||
اجسامها متوسطة القد طول من ٤٥ الى ٩٠ سم . ذنبها
قليلة الايدياد ، شبه بيضة الشوزن . ثوبها الى السرة
التيانية المايات ، فيها الجروي والاخضر والاسم والبي
والصنابي . زعانها متوسطة لمسة بعد الفحال . رؤوسها
مكرسة . اعناقها متوسطة الطول والعذلة . اذنانها قصيرة .
قوائمها شديدة النقط ، خاسية الخالب في الزويين .

Debur masticur (F).

١٦٩٠٣ - شَهْل

الشهل والاضهال هو اول النضج المعروف بالادراك .

Cyon (S).

١٦٩٠٤ - شَهْل

Dohle (F). Dohles (E).

جنس كلاب متوحشة مقررة موطنها سيرير ووسط مناطق
آسية الوسطى والبرية . له ثوبان شهل الشمال وشهل
الجنوب . يألف النباتات والبراري الجبلية . لحمه الحاني
جاني . جماعته تعد من حدة الى عشرة ازواج . لا يتشم
فرسته منفرداً معها كانت الحال . انقل طرائقه الطاء
والشواذن || شكله الخارجي منقسم المتقاطع فيه بالكلب
الاقل اما رائحته العاطفة رائحة ابن آدم . رين ميزان
جسه ان عدد اطراف الاثا هو ١٢ و ١٤ في حين ان
لكلية ١٠ اطراف فقط .

Cyon javanicus (S).

١٦٩٠٥ - شَهْل الجَنُوب

Dohle méridional, Bureau (F).

نوع من الشهل . موطنه يمتد من جبال حلايا الى جزر
الزواج وبهال بورنيو . يألف الحشبات والجبال . جماعته
تعد من ٤ الى ٥ أزواج يقودها ذكر مسن . يقتصر جمع
المحيوانات الضعيفة والاوز والبط ... يصرح في الليل ولي
التيار || جسه ابيض الشكل يطول نحو ٩٥ سم . ذنبه
٢٠ سم . ارتفاعه ٥٠ سم . ثوبه الى الشفة السمر يزيد
اسمراراً في الصيف ويضع في الشتاء || وهو سهل المراس
لا يطيع الا من يتي به ويقدم له الطعام || قيل لنا
مضى ان بعض الكلاب الاطرية لمحت منة . ثم تحقق
فما بعد ان النظرية خاطئة لان المادة السنية عند الكلب
تقل ٤٢ سناً في حين انها لا تقل سوى ٤٠ سناً
عند الشهل .

Cyon alpinus (S).

١٦٩٠٦ - شَهْل الشمال ، لَبُون الجبل

Dohle septentrional, Caon de montagne (F).

نوع من الشهل . موطنه يمتد من سيرير الى التركستان
والبيت . يألف المناطق الجبلية الكثيرة النباتات والارواح .
جماعته تعد من ٥ الى ٧ أزواج يقودها ذكر مسن . يقتصر
الطاء والارواح والراغور والافلح ... جسه منقسم
ابيض يطول نحو ١٠٣ سم . ذنبه ٤٤ سم . ارتفاعه ٥٢ سم .
ثوبه الصفبي الى الشفة كسمر في الرأس والظهر وتبيض

اوراقها معتقة ، حاشية ، متعاقبة ، مركبة ، وترية
التصميم . وديقاتها متطيلة النصال المشارة التفرض .
ازهارها صفيرة ، سبوانية التصميم ، بيضاء اللون أو
اريجوانية . ثمارها حب حقيق ، مسطبل ، إيرى الشكل
المثابئين الطول || ثوبها ريمبي || اعرف الوأعها واشهرها
للصيدة الريمبية الورق (*T. latifolia*) .

Benincasa cerifera (S).

١٦٩٠٧ - شَهْلِك

Bénincase (F).

نبات زراعي حولي مداد وحيد الجنس والذو من ذنبها
الفرعيات . هذه الثمر الاخص . زراعته واسعة الانتشار
يستعمل كالكرسي في الطبخ وكالبطون في المربيات ||
ساقه مدادة طول نحو ٢٠٠ سم . حلقه متشعبة . اوراقه
معتقة ، كدية النصل المتصبع المزئير ، خاسية الغصص
أو سابعيتها . ازهار فردية ، محورية ، كبيرة الله ،
خاسية البليات ، صفراء اللون . ثماره متطيلة شبه
اسطوانية الشكل ، طول من ٢٥ الى ٤٠ سم . يحطو
يرواح من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الباحت
يملو توشع اسمر . قدور الثمار في اول مهدها كثيفة الزغب
الحبي الاطراف ثم يتقلص الزغب ليشاعا مادة شبة
تكتسل مع الادراك . لياها جامد المكسر ، ابيض اللون ،
خافت العرف المسكي ، من الحفاق .

Dangila (S).

١٦٩٠٨ - شَهْلِك

Dangile (F) Dangila (E).

سمكة بحرية من مفصليات اللسان وفصيلة السرطيات .
موطنها جمع البحر الهند والبلاد المجاورة || جسمها اعلاحي
الشكل ، عذب الظهر ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى
الخضار الاخضر يمتد في الظهر ويغير في البطن . رأسها
معتدل الجرم ، يرمي الشكل . غطها ثنائي الطبقات
التيقية . شفتها قليل الانفرج . زعنفتها الظهرية كبيرة
الله ، حلالية التقعر . زعنفتها الذيلية ناقة || فيها
متوسط الصنف ، مأكلة .

١٦٩٠٩ - شَهْب

Dissymétrie (F). Dissymetry (E).

الشفب عدم التانسق في التركيب الاحصائي او الجسموري .

Communiella (S).

١٦٩٠٠ - شَهْبَة

جنس فلور مجهرية قريبة الشبه من الصدفية . تتميز بيغها
البرقي المردلي الشكل ، الفيق الانتساب وتلطيف الله .
ذميتها عديدة الدعامات الرزوية التصميم . دملها مظة
من حليتين لا متجانستين النصل اسطوانية الشكل واقليا
كروية . اغنيها متصلة المام الثنائية || انواعها
الاقتصادية قليلة اعرفها شبه الماهونه .

Communiella sanguinea, Uropyx sanguinea, Puc-

cinia mirabilissima, Uromyces sanguineus (S). Rouille

du mahonia (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وثمار الماهونه فيؤذيها
ويطعمها || ظهوره الخارجي بثور عسية مبرزة لاقليمية
التصميم تركب الاوراق والثمار الفتية . تبو طلعها اللون
فسفيسية الخلفة تتصبع النصل وترفعه ثم تنصرف الى الجوزة
فالسرة حيث تنفجر من بؤرها القرمزي اللون || وهو
على الثمار وأنها بثور صفيرة مستديرة واحة مبرزة أو
متراسة تثير طلعها اللون ثم تحيل الى السرة مع اقترابها



صيفك



شَهْلِك



شبه الماهونه



شهر



شهل

الضفديات. مهدا البلاد الحارة. اجسامها دودية مستطيلة، حلقاها حرقفية التركيب، غيقة، متجانسة من الرأس الى طرف الذنب. وروصها وكدية. عيونها دقيقة مغلقة. قوتها الحشرات. تموش بين الحجارة وتحبها وفي انفاق تسربها كالحيات.

١٦٩١٧ - ضفديات **Caecillidae (S).**
Caecillidae, Cécillidae (F). **Caecillidae (E).**
فصيلة حيوانات عادمة الارابل من صف الضفديات اجناسها وانواعها عديدة مهدا البلاد الاستوائية والحارة. قوتها الحشرات والحوام والمواد العضوية المتحللة.

١٦٩١٨ - ضور **Sinus**
هو التوجيه للمقر في فصل النبات ج. اضواء.

١٦٩١٩ - ضور **ضور**
ضور العين : مزجها بالماء ووضعه كذلك.

١٦٩٢٠ - ضوركة **Enkanythus (S).**
Enkanythe (F). **Enkanythus (E).**
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الزهرة الفسحة ». جنس اشجار ونباتات حرجية وتزيينية من فصيلة الخنجنيات. منبتها يحد من الشرق الاوسط الى اليابان. سيقانها ترتفع من متر الى عشرة امتار. اوراقها متعاقبة، مستطلة القواعد والاطراف. ازهارها حلقية النسيج، طرفي الازهار. اثمارها ملونة، عشارية الاسدية، مغلفة المتكاث || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

١٦٩٢١ - ضوركة جرسيكية **Enkanythus campanulatus (S).**
Enkanythe en cloche (F).
نوع من الضفوة. مهدا الشرق الاقصى. ساقها فروع متلو نحو عشرة امتار. اثمارها فاكهة اقية الامتداد. اوراقها تطلو نحو ١٠ سم. وتقرض نحو ٤ سم. نصلها مهدية، ذرية الانسان الحادة، اثارها كبيرة متدلية جرسية الشكل صفراء اللون تلوها مشعة وردية || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

١٦٩٢٢ - ضوركة هندية **Enkanythus deflexus (S).** **Enkanythe des Indes (F).**
نوع من الضفوة. مهدا جبال الهند، اخصها حلايا. ساقها متحللة الضخامة تملو من ٣ الى ٧ امتار. اثمارها ولانها مراكية. اوراقها لحياسية الشكل منها السنانية والاحليسية، تطلو من ٥ الى ٨ سم. وتقرض من ٣ الى ٤ سم. نصلها قصيرة الانسان اختارية. ازهارها حراء وردية. شجرة بالودية || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٦٩٢٣ - ضوركة يابانية **Enkanythus japonicus (S).** **Enkanythe du Japon (F).**
نوع من الضفوة. ساقها فروع مراكية الانفاذ والاغصان تملو من متر الى مترين. اوراقها احليسية تطلو نحو ٤ سم. وتقرض نحو ٣ سم. نصلها مستطلة الحمار. ازهارها يستيق الاوراق. اثارها بيضاء اللون، جلجلية التبرجات الحليسية الخدبات || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

١٦٩٢٤ - ضور **Rut des bovidés (F).**
Rut of the bovids (E).
هو استرحام البقر وسبها واء الثيران.

في الاطيان والبلن. ثوبه الشوي الى البياض الاصفر || نباحه يخلف من نباح الكلب ومواء الذئب وضياح الضفد، يسرح في الليل وفي النهار. قولته الوبية لا تتجاوز خمس ساعات.

١٦٩٠٧ - شهوة **Abajous (F).** **Cheek-pouch (E).**
الشهوة جراب في باطن الفد تتميز به بعض الحيوانات. اخصها القرود تستعمله لطبع الطعام من صوب وثيرها. وما شهوات عني ويسرى. ج. اضمه.

١٦٩٠٨ - شهول
الشهول : البقرة والشاة والمز والناقة التي قل لبنها. وهي البئر الغليلة الماء.

١٦٩٠٩ - شهية **Chardon (F).** **Thistle (E).**
الشفهية تشبه على اختلاف انواعه. والشفهية كل التي لا تحبس.

١٦٩١٠ - شهوة، نور **Lumière (F).** **Light (E).**
الشمس، هو المؤثر الطبيعي الذي يسبب الابدسار. مصادر مختلفة منها طبيعية كالشمس ومنها صناعية كالمصابيح الكهربائية وغيرها.

١٦٩١١ - شهوة
هنة تخرج من سياه الناقة والبقرة والشاة قبل خروج الولد.

١٦٩١٢ - شهوة شرسية **Staurotypus triplicatus (S).**
Staurotypus agresiva (F).
نوع من الضفوة. سلطانية من فصيلة الخنجنيات. سيقانها يشمل معظم مناطق امريكا الوسطى. تألف المتاعق والعتوان والافواجر ويجاري الماء || اغلاقها شرسية قوية، تهاجم كل من يقترب منها || جسمها متوسط القد. ذيلها بيضي اللون، قليل الاحديداد، يطول نحو ٤ سم. زطها منبسطة بالمسحة صليبية الشكل. رأسها مستدل الجرم شارف الفك الاخر، سنكها ثنائي الزوائد القرنية. حلقها غليظ قصير وذنبها قصير. قوائمها مستدلة القد، نشيطة || قوتها الضفادع والاسماك والبطا والطياريين.

١٦٩١٣ - شهوة **Haliotinelles (S).**
Haliotinelles (F). **Haliotinelles (E).**
جنس حيوانات حرجية من الرضويات مهدا الارابل غليظيات الخواص وصيلية الكنجيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، اطرافها البحر الاخر والخليج. تموش لامة بالصخور المسورة الثرية من السطوط || اصداها صغيرة، داخلية، وريقة تلمش الظهور. اجسامها احليسية الشكل، مستطلة المقدم للمهب. اريدتها فضفاضة. غياشيها يميني الازتكاز، نظلية الترتيب الصفي. افواها غليظة مستدلة الطول. لواسها انبوبية مغلفة بالسطوح الخارجية.

١٦٩١٤ - شوكارب **Erratiques (F).**
هي الطيور التي تغلب الرزق.

١٦٩١٥ - شوكيان **١٦٩١٦ - شوتق**
Cacelia (S). **Cécile (F).**
جنس حيوانات صمام، دجوية، دودية الشكل من فصيلة



شوتق



صرخنة

Callictea (F). Rennet (E).

١٦٩٣٢ - صَفِين

هو الخثرة ، اطباء .

Rayonnement diurne,

١٦٩٣٣ - صَفِين

Radiation diurne (F). Diurnal radianca, Diurnal radiation (E).

هو الاشعاع الشمسي اليهاري .

Thalamiflora (F).

١٦٩٣٤ - صَفِين

Thalamifloral (E).

نمت تنوي يخلق حل النباتات المزروعة الخلاف الزراعي من ثنائيات الفلقة .

١٦٩٣٥ - صَفِين ، صَفِين

قال النعمري عن ابن سيدة « الصيب شي من دواب البحر على هيئة الكلب وخلقت » .

Miel (F). Honey (E).

١٦٩٣٦ - صَفِين

النسج هو السمل فصل عن شهد .

Caranx sanson

١٦٩٣٧ - صَفِين ، صَفِين

سمكة كبيرة مأكولة تكثر في البحر الاحمر والمتوسط . وهي نوع من السمك تطلق نحو ٦٠ سم . ثوبها الاربعة القفصية زهر ويشفر حته البطن ويقل مع اقترابه من ثوج القلبي .

Poulche (F). Filly (E).

١٦٩٣٨ - صَفِين

فوس لم يقطن الاثان ولم ينز ثلد (السان) .

Hétérogamie (F).

١٦٩٣٩ - صَفِين ، صَفِين

Heterogamous (E).

نمت تنوي يطلق حل النباتات المزروعة التي تحمل اذعرا ذكيرة والثرية في زرع واحد .

Hétérogamie (F).

١٦٩٤٠ - صَفِين

Heterogamy (E).

الصفيرة جسموديا حيوانيا هي تعاقب ثوبه بكري مع ثوبه كصي صبيح . وهي حادقا حالة تباين القناعات الوراثية من حيث الابداء المركزية او التكون . وهي شوزيبا حالة وجود اذعرا مختلفة المنق في تنور واحد .

Ictocyon vanatensis (S).

١٦٩٤١ - صَفِين

Ictocyon (F). Ictocyon (E).

حيوان لاح مفترس وحيد الجلس والنوم من نصيلة الكليليات . موطنه بعض اصقاع امريكية الجبلية اصعبها البرازيل . يالفت اطراف الغابات والاصراج المشعة الاشجار قوته كل ما استطاع قتصه واقتراه من حيوان صغير . ملجته الحياتي جماعي ، جماعته تمه من ٥ الى ١٢ ذكورا . جسمه مستدل قليل الارتفاع بطول نحو ٩٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٢ سم . واهم مستضفي الشكل عريض الجبهة والخلف . اذناه صغيرتان . ثوبه الى الثلثة السوداء يمتد في الراس والفقر ويبيت في البطن . ويرد قصير ليد . الاذن اصغر قدما من الذكور واهت ثوبا . عدد اطباها ١٢ . يحملها يشتر نحو تسعة اشابيع تقصع في تمامه من ٦ الى ٨ جراه طامسة لا يقصر التولد قبل مضي سبعة ايام .

Parasito

١٦٩٤٢ - صَفِين

هو الطفيلي ، اطباء . ومن اسمائه بالني دون الاختصاص ليش .

١٦٩٤٥ - صَفِين هو الشرقا ، اطباء .

Coraciidae (S).

١٦٩٤٦ - صَفِين

Coraciidae (F). Coraciidae (E).

نصيلة طير من الجواثم تدعى ايضا شرقايات ، اطباء .

Speotzzy cunicularia (S).

١٦٩٤٧ - صَفِين

Hiboux des terriers (F).

من اسماء ضوع الجوار

H. des cavernes (F).

ضوع الكهوف

H. des lapins (F).

ضوع الارانب

H. des prairies (F).

ضوع المراعي

H. des marais (F).

ضوع المنابع

طائر من البويات وماراة القناعات يحير البلاد في طلب الرزق لا يقم في مكان اكثر من شهرين . يبيض جماعات كبيرة ، سره يمد من ٢٠ الى ١٠٠ طائر في وطر من الطيور النافذة اقارب حياتها . يالفت المروج والمراعي والبراري والنامق يملس قوته في النهار . يصيد الجرذ والذئب والذباب والفظاء والحيات والقاربان . يلدن حشه في صروع الصغور والكهوف والجوار وفي اسفل وقرع الاشجار اليابسة . اثناء تضع اربع بيضات تحضنها ثلاثة اسابيع .

١٦٩٤٨ - صَفِين ، صَفِين

Engoulevant à collier (F). Fern-owl (E).

طائر من السبد الرواس طوله نحو ٢٧ سم . وهو امد الريش الاخير الموشم بخطوط سود وحر . واهم مفطع الشكل . متقار صغير لثد راسه الشدين يحمل صولجا يعض الريش التدقيق الملبس الركب . عتقه مطوق بقلادتين عاجيتين . سقطاه مستطولان ذلقان . ساقاه مسرولتان . ذنبه متوا الطول . وهو من قرايط صوف البحر المتوسط . اذنه تشر في الفصوص تدره وسط الادغال تحضن فيه اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ بيضا .

Sallie (F). Cover (E).

١٦٩٤٩ - صَفِين

نرو ذكر الحيوان على الاذن . ضاك الجواد الحبر : نزا ملها .

١٦٩٥٠ - صَفِين ، صَفِين

Moschoema (S). Moschoema (F).

جنس نباتات حولية بعصرة من نصيلة الشفويات اذناه قليلة العدد جميعا من الرياسين . سوقها دقيقة رمية الزوايا تدور من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، يضية الشكل نصليا سبك النسيج ، منشاري الحافة ، خمل البثرة على صفحته . اذعراها سليل التجميع . اذعراها صغيرة لثد ، ضية ، متعاقبة ، لونها يراوح بين الازرق والاصفر الباهت . اذعراها يمتد من كائون الاذن الى شفاط ارن من تموز الى آب . اوراقها واذعراها مسكية اللف الطري .

Lioplox (S).

١٦٩٥١ - صَفِين

Lioplox (F). Lioplox (E).

جنس حيوانات مائية سرلويد من الرغويات مديدت الاجليل ونصيلة البليونيوات . اناواعة المعروفة قليلة العدد اصلاطها بعض مناطق الناطق المتدلة الحارة وشها امريكية الشانية . اصدانها اطليجية ، بطيئة ، متباينة الاحجام ، رقيقة الشفاء اكليسي ، ملوية وزعفرنة .



ضوع



ضوع



صيف

١٦٩٤٨ - صَيْكَلَة سَاطِعَة *

Masdevallia ignea (S). *Masdevallia flamboyans* (F).
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ١٥ سم . أوراقها
حرفشية . زهرتها حمراء ساطعة يملوها موج قمرزي يتخلله
البنفسجي . فصلتها العليا مستطيلة منقطة عل الزهرة ||
تنويرها ويهي .

١٦٩٤٩ - صَيْكَلَة قِرْمِزِيَّة *

Masdevallia coccinea (S). *Masdevallia écarlate* (F).
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ٢٥ سم . أوراقها
بريضية الشكل تطول نحو ٥ سم . زهرتها بنفسجية يملوها
مواج قمرزي أسفم || تنويرها يستمر عدة أسابيع ، من
أواخر آذار الى أوائل حزيران .

١٦٩٥٠ - صَيْكَلَة نَيْبُوتِيَّة *

Népocisme (F). *Nepotism* (E).
للصيلة تجاوز مفاير للانظمة او الشرع يقوم به من
ييده السلطة في سبيل مصلحة قريبه او صديقه .

١٦٩٥١ - صَيْحُرَان * هو تمنع الماء ، اطلبه .

١٦٩٥٢ - صَيُون *
Matou (F). *Tom-cat* (E).
هو القط الذكر ج . صياون .

Parasitologie (F).

Parasitology (E).

Encastelure (F).

Contraction of the hoof (E).

عارض يصيب وبل القرس سبيه ضيق الدابة في الحافر .

Paraphimosis

١٦٩٤٥ - ضَيْقُ الْقَتَب *
سوء تركيب طبيعي في القتب يمنع بروز الحشفة الى
الخارج وهو شائع عند الكلاب تادر عند الجياد .

١٦٩٤٦ - صَيْكَل * ، صَيْكَلُوس *
Janus (S).

Janus (F). *Janus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
وفصيلة الخرشوبيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها
بحار البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها حريالة مستطيلة
منقطة بلواس متكاثفة ورقية الاطراف || اعرف انواعها
واشهرها الصيكل القنبراني (*Janus cristatus*) الذي
يكثر وجوده في المناطق الشمالية من البحر الابيض المتوسط .

Masdevallia (S).

Masdevallie (F). *Masdevallie* (E).


١٦٩٤٧ - صَيْكَلَة *
جنس نباتات امنية من فصيلة السطليات . جفورها
لحمية قليلة الانشعاب . سيقها فيه اسطوانية الشكل .
اوراقها حرفشية . ازهارها وسيدة ، كثيرة ، ملونة ||
انواعها المعروفة قليلة المدد اشهرها التالية :



صَيْكَل



صَيْكَلَة سَاطِعَة



ط



طاية



طارسة

منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها شبه يفسية الشونن ، كبيرة الفم المصراعي القاطب ، مائلة الصفحة المزخرفة بالالوان الزاهية ، عادة الحلزونة || اجسامها اعليجية ، فلق ارجلها تلحف الاصداف . رؤوسها قليلة الزنوج ، عادة الرأس .

١٦٩٥٨ - طاحون ، طاحولة ، مطحنة Moulin (F). Mill (E). الرمح تحق الحب تنصره دقيقاً ، والطاحون يني أيضاً البيت المد الطحن . ج طواحين .

١٦٩٥٩ - طاعير ، طخور ، Nimbostratus (S). ضرب من الغيوم وهو محاب مراكب له اكهب اللون او اسمر يحجب الشمس .

١٦٩٦٠ - طادة الطادة ضرب من السمك (السان) .

١٦٩٦١ - طارحة * Pissette, Pipette اداة غبرية تستعمل في القاء السوائل اللينة .

١٦٩٦٢ - طارق الطارق نجم يقال له كوكب الصبح .

١٦٩٦٣ - طاروي ، عارض ، اتحق Adventif (F). Advencious (E). تمت تمرني يطلق على بعض اعضاء النبات كالبرام وغيرها التي تظهر عرضاً من القيات لم تألفها قياً .

١٦٩٦٤ - طاروي Accident راجع اصابة .

١٦٩٥٣ - طابع ، صفة Caractère (F). Character (E).

١٦٩٥٤ - طابق Etage (F). Stor, Floor (E).

١٦٩٥٥ - طابورة Tapura (S). Tapura (F). Tapura (E).

جنس نباتات برية جينية معمرة من فصيلة الجوزيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها المناطق الحارة الاسيوية || جنباتها فرعا تملو من مترين الى اربعة امتار . اوراقها معنقة ، متعاقبة . نصالها سنانية متموجة . ازهارها متعقدي التجميع . ازهارها صغيرة متباعدة الالوان اكثر فيها الاصفر الاخضر الموالج ، قوامياتها متحدة البيلات ، اكاسها جزلة . ثمارها نصف مغلفة السوك . صجاتها آحية .

١٦٩٥٦ - طابيات Bullidae (S). Bullidae (F). Bullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية . اجسامها واتواها عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الثالثة والبيض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة (الحارة || اصداؤها قراوح بين الاستدارة والاستطالة وقد يظلب فيها الصفر والرقعة وهي كثيراً ما تكون مغلفة بالرداء او بالرجل . خياشيمها مضمومة في تجاويف خاصة مركزها عند مؤخر الظهر يغلها الرداء . رؤوسها قليلة الزنوج عادة الموالج || اعرف اجناسها وانهرها الطابية والجمبية والمهنية والميزوب والكوارية .

١٦٩٥٧ - طابية * Bullana (S). Bufile (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة الطابيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد،

١٦٩٧٨ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، مَرَضُ الْخَيْلِ الْأَفْرِجِي،

تَجَمُّعُ

Peste aquorum (S).

Peste equine, P. du cheval (F).

وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وصائر الدواب فيسيبها أن تم تالاج وقائياً .

١٦٩٧٩ - طَاعُونُ الطَيْرِ ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ ،

شَرَطْلَة

Pests avium (S). Peste aviaire (F).
وباء خبيث سريع الانتشار يفتك بالطيور الباجية انحصا الدجاج . يعالج وقائياً .

١٦٩٨٠ - طَاعُونُ الْكِلَابِ ، جَلَاعَة الْكِلَابِ ،

بُرَسْتُور

Febri catarrhalis x nervosa
caum (S). Maladie de Carré, Morbus carre (F).
وباء خبيث يصيب الكلاب فيسيبها أن تم يعالج وقائياً .

١٦٩٨١ - طَاعُونُ بَقَرِي ، أَبُو هَدَلَان ، أَبُو

دُمَيْعَة ، هَبْت

Peste bovine (S). Cattle-plague, Rinderpest (E).

وباء شديد الخلق سريع الانتشار يصيب البقر والغنم والماعز والجائوس فيسيبها أن تم تالاج وقائياً .

١٦٩٨٢ - طَاعِيم ٥

Imperméable à l'eau (F).
Waterproof (E).
نمت تعريني يطلق كل مادة لا يغلها الماء .

١٦٩٨٣ - طَافِر ٥

Mutant (F).
فرد أو جزء من فرد ظهرت فيه طفرة أي شرد .

١٦٩٨٤ - طَاوَان ٥

Pecorinus petaurista (S).
Podomys petaurista, Taguan, Orul (F).

نوع من البطارييس وهو حيوان قاصم من السنجايات موطن الهند وسريلاندي . طوله نحو ٥٠ سم . وزنه ٥٥ سم .

جسمه مستطيل الشكل . جوارزه قصيرة ، اطفاؤه صغيرة مدنية . ثوبه الى الصهبة السوداء تديق مع اقترابها من النضج

ولرأس والصدر . يلقه الى الثيرة المرحضة بالابيض . رائحته الجناسية الملدنية كاسية || يأنث الاجراج الكثيفة

ويقترب من الاماكن الاكلة || قوته البار والقشور والحشرات والديدان .

١٦٩٨٥ - طَاو ٥

Boopis (S). Boopide (F).

الاسم العلمي معناه « عين الثور » والاسم العربي للماعا الى شكل جميع الارواق والازهار . جنس نباتات مسمرة

بيرة وفريزيين من فصيلة الكليريوات . منبتها الطوسي بعض مناطق امريكا الجنوبية المعتدلة الحرارة || انواعها

المعروفة شرة ، اما ضروبها الزينية لكثيرة البلد .

سوقها خشوية ، قليلة الفروع التي تنتهي بطاقات من الارواق والازهار || تنويرها يستمر من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .

١٦٩٨٦ - طَاعَة

Energie (F). Energy (E).
صفة كل جسم يستطع القيام بعمل .

١٦٩٨٧ - طَاعَة الْحَرَكَة

Energie cinétique (F).
Kinetic energy (E).

١٦٩٨٨ - طَاعَة حَرَكِيَّة

Dynamisme (F).
Dynamism (E).

١٦٩٨٩ - طَاوَة عَفِيَّة

Force cryptique (F).
هي القوة اللبوية المستعدة التي تشمل تجميع الطاقة الذي يشمل بدوره الحياة والمثل والمثل .

١٦٩٩٠ - طَاوَة كَامَة

Energie potentielle,
Potentiel (F). Potential energy, Potential (E).
يرتقى الطاقة المقدورة او المقدور الكامن .

١٦٩٩١ - طَاوَة ٥

Energiétique (F).
Energetic (E).
ما هو منوط بالثاقة .

١٦٩٩٢ - طَاوَان ٥ ، طَعِيم ٥

Budurcas taxicolor (S).
Takang, Takin (F). Takang (E).

حيوان لبون عاشب يجير من ذوات الاخلاف . موطنه يند من الاسام الى التبت على حدود التلج الدائم . ملجته الحيواني

جماعي . قطانه صغيرة متفرقة لا يتجمع الا عند الرجل من مقاطعة الى اخرى فيبلغ عدد الاجل ، اذ ذلك ، نحو ٥٠٠ نفر || جسمه رمية ، مستطيل الشكل ، فيه من

الثور والكبش والظبي . يطل نحو ٢١٥ سم . ويصل نحو ١١٥ سم . ويزن عند بلوغه الكلال الجسوري من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو . قرن الذكر يطل نحو ٥٠ سم . وقرن

الانثى نحو ٣٠ سم . رأسه مستطيل الجرم ، عذبة قصيرة الانف . عيناه صغيرتان لوزيتان . اذناه صغيرتان

مستعرضتان . قرناه خيليان يتحان الجهة . عنقه معتدل القد ، كثيف الوبر المستطيل . صدره غريس النقص

مادم النيب . كفه مقوس الطرف المنحدر . قوائمها خفيفة ، شديدة النشط . ثوبه الى الصهبة الزرقاء الملوحة بغير ويشرق صفحي الفتق ويشرق الى الشقعة في البطن . فرج

الانثى ثنائي الخلف || قوته الاصاب الخضر والجلشاش اليابسة .

١٦٩٩٣ - طَاوِل ٥

Table de pointage (F).
جدول قياسي يحدد فيه قيمة الجزء من الذي بالنسبة الى

كامله .

١٦٩٩٤ - طَان

Tan
الطان هو للمادة المائلة في مسوق لحد النقص وغيره من انواع الستين والكمسة الخ . يستعمل في تحضير

١٦٩٩٥ - طَانِخ ٥

Indigene (F). Undigested (E).
ما تملر انهضاه على المعدة .

١٦٩٩٦ - طَاوُوس

le Paon (F). Pavo (E).
الطاووس كوكبة نجوم جنوبية الميخ . مركزها بين المربع

الفلكي والثلث والثلثين || عدد نجومها تسعة مراتها تراوح من الخامسة الى الثامنة .

١٦٩٩٧ - طَاوُوس ، طَاوُوس

Pavo (S).
Paon (F). Peacock (E).

جنس طير من فصيلة التندريبات . مشهور بمجال ريشه والازهر يتنفس والخيلاء . كنيته ابو الحسن وابو الشبي .

انواعه قليلة . جميعها كبيرة الوجة مستطيلة ريش القروادم والزعبي ، قصيرة ريش الانثى ، رؤوسها صغيرة

متنوعة . متغيرها غليظة . ارسافها طويلة . مغالها صغيرة . انبيا متراكبة الا لوان الهية يعلوها تشيتم جميل ومشة

١٦٩٩٨ - طَاوُوس ، طَاوُوس

Pavo (S).
Paon (F). Peacock (E).

جنس طير من فصيلة التندريبات . مشهور بمجال ريشه والازهر يتنفس والخيلاء . كنيته ابو الحسن وابو الشبي .

انواعه قليلة . جميعها كبيرة الوجة مستطيلة ريش القروادم والزعبي ، قصيرة ريش الانثى ، رؤوسها صغيرة

متنوعة . متغيرها غليظة . ارسافها طويلة . مغالها صغيرة . انبيا متراكبة الا لوان الهية يعلوها تشيتم جميل ومشة



طَاوَان



طَاوَة



طَاوَان

Paradisea minor (S). طائر الفردوس الصغير
Paradisier petit émeraude (F).
Paradisea apoda (S). طائر الفردوس الكبير
Paradisier apode, Paradisier grand émeraude (F).

1٧٠٠٧ - طائر الفينيكس *
Oiseau-lyre (F). طائر من الجوامع لاقتات التل يدعى مانور ، اطلبه .

1٧٠٠٨ - طائر الفينيكس الأبيض *
Oiseau-lyre superbe (F). طائر من الجوامع لاقتات التل وصيلة المانوريات يدعى مانور ميلور او اتيق ، اطلبه .

1٧٠٠٩ - طائر المغاليب *
Oiseau des tropiques (F). طائر من كليات القدم وصيلة الفينيكسات يدعى فيتين ، اطلبه .

1٧٠١٠ - طائفك *
Sous-classe (F). Sub-class (E). الطائفة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الصف وقبل النعمة .

1٧٠١١ - طب أنثييل *
Hippiatrie (F). Hippiatry, Vetrinary art (E). علم يبحث في امراض الخيل ومدواها .

1٧٠١٢ - طب بيطري *
Médecine vétérinaire (F). Veterinary medicine (E). هو طب الحيوان او طب الحيوانات الداجنة .

1٧٠١٣ - طيباب ، ديسك *
Disque (F). Discus, Disk (E). شكل قرصي الهيئة مطع الصلصة اورد عليها او مقعها .

1٧٠١٤ - طباج *
Lagria (S). Lagrie (F). Lagria (E). جنس حشرات غاشلة من غديات الاجنحة وصيلة الطابجيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٨ م . رؤوسها شبه غروبية . متناكها غريبة . عينيها كبيرة نافذة . قرنها الاستشعارية غيبطة . كواسها خفية مستطيلة . بطونها الهلجية مفطسة . احمادها عذبة ، لاسفة ، خلية الكشار ، مهدية الاطراف . قوتها مستطيلة || تألف المواقع الدفلة . قوتها الارواق والازهار . يرقاتها حادة تمشي على المواد النباتية المنحلة في الجلالة وتحت التقشور والحاء .

1٧٠١٥ - طباجيات *
Lagrideae (S). Lagrideae (F). Lagrideae (E). فصيلة حشرات من غديات الاجنحة مخفلات الاجزاء . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة . جميعها غاشلة قوتها المواد النباتية . يرقاتها تعيش في الجلالة وتحت التقشور || اجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ١٢ م . رؤوسها عرجمة . كواسها خفية مستطيلة . احمادها جالسة القاعدة ، مستديرة الاطراف اللاسفة . قرنها الاستشعارية غيبطة مركبة من ١١ فصلة . مختلفة الاجزاء || اشهر اجناسها واعها انتشاراً الطباج .

غلاية . ذنابها ربة اللد ، مروحية النثر || موطنه الهند وجوارها وسرنديب . ياقظ الغابات والدياش والمروج الدفلة . يعيش اسراباً صغيرة براوح صعدا بين ٦ و ٢٠ . قوته اللد والجرب والاشباب وقنواي والحشرات والوزغ والافاعي || جمده الاشجار المنجسة الاضمان . اناته تقسم نحو ١٠ فصلات تحسباً وسجدا في انحصرت دلتته في آخرة بين الاعتدال والاشباب || اشهر انواعه ما يتبع .

1٦٩٩٨ - طاووس أسود *
Pavo nigripennis (S). Black peacock (E). طائر من الطاووس موطنه الشرق الاقصى . يتميز باموداد ريشه وباستدارة فليس ذنابها وبالنسبة الغضبية المواج التي تملو ريش صدره .

1٦٩٩٩ - طاووس الثيبث *
Paon du Thibet (F). هو قشكيس طائر من كندريجات ، اطلبه .

1٧٠٠٠ - طاووس صيني *
Pavo muticus (S). Paon spicifera (F). طائر من الطاووس . موطنه الهند . كبير الجفة والى الجبال . رأسه وقتره وصفته الى الاخضر المايق الازرق المواج . صدره الى الاخضر الازرق الملعب المواج . بطنه شديد الخضار الازرق . ظهره اسف لاسع يتخلله الاخضر والاصهب . قولده الى الصهبة . اياهره الى السواد الازرق المواج . كلاء الى الخضار المايق . ذيله اكبر من ذيل الطاووس المادي وازني لونا وابي رونقا .

1٧٠٠١ - طاووس عادي *
Pavo cristatus (S). Paon vulgaire, P. commun (F). Common peacock (E). طائر من الطاووس رأسه وصفته وصدره وبطنه الى الازرق الباقية ، الجلية ، الخضراء المواج . لة رأسه سوداء حمرة مشوح بالابيض . ريش ظهره اخضر اسف ، اسيد الحافة ، قولده الى الصهبة الباقية . اياهره الى السواد الازرق المواج . ذيله اخضر اسف تملو فليس سود يحرقها الاخضر الزاهي .

1٧٠٠٢ - طاووس *
Pacome (F). Penhen (E). انى الطاووس .

1٧٠٠٣ - طاكير البرقي *
Thalassidrome (F). طائر من كليات القدم مشهور باسم قندوم ، اطلبه .

1٧٠٠٤ - طاكير الزوايح *
Oiseau de pluie (F). طائر من فصيلة الفينيكسات يعرف باسم قشاق ، اطلبه .

1٧٠٠٥ - طاكير الفينث *
Paradisea (S). Paradisier (F). Bird of paradise (E). جنس طير من فصيلة الفردوسيات وربة الجوامع المشروبات المناظر . انواعه قليلة مهدا جزو المحيط الهادي . تتميز بزدها اوتياها الماخرة الجبال . اجسامها متوسطة القد . طولها براوح بين ٣٠ و ٤٥ م . رؤوسها معتدلة ، متناكها مستطيلة ، عذبة ، ذرية . مناقشها قاعدية الارتكاز منشاة بالزغب . اجنتها متوسطة القد ، ذلفة . اذنابها قصيرة . ارباش انفيكتها الجانبية مقوكة الشكل متناحية في الفتة والرسية || احرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

1٧٠٠٦ - طاكير الفردوس *
Paradisier (F). Bird of paradise (E). جنس طير من فصيلة الفردوسيات وربة الجوامع المشروبات المناظر . انواعه قليلة مهدا جزو المحيط الهادي . تتميز بزدها اوتياها الماخرة الجبال . اجسامها متوسطة القد . طولها براوح بين ٣٠ و ٤٥ م . رؤوسها معتدلة ، متناكها مستطيلة ، عذبة ، ذرية . مناقشها قاعدية الارتكاز منشاة بالزغب . اجنتها متوسطة القد ، ذلفة . اذنابها قصيرة . ارباش انفيكتها الجانبية مقوكة الشكل متناحية في الفتة والرسية || احرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

1٧٠٠٧ - طاكير الفردوس الاحمر *
Paradisier rouge (F). طائر الفردوس الاحمر



طاووس سني



طاووس عادي



طاووس الفردوس



طباج

١٧٠٢٥ - مَطْرَحِي

Gutta-Percha مادة حليبية تستخرج من بعض اشجار الفصيلة السبوتية. تستعمل كأداة عازلة في غنظت الحشاشات لأنها لا تنقل الكهرباء ولا تقوب بالجليد أما تلويب بالكولورومز ولفور الكبريت والبنزين.

١٧٠٢٦ - مَطْرُودَة

هو الأبلوج، الحلب.

١٧٠٢٧ - مَطْرُودَن

هو السكر الأبيض المالح المقلوب ويصنع البلرزد والبلرزل.

١٧٠٢٨ - مَطْرُوسَة مُسْتَحَبَّة

Tetragnatha fuscata (S). *Tetragnatha agréable* (F). دودية من العناكب الساعية القانصة من ثنائيات الروايا سداسيات المشانق وفضيلة الشياحات. موطنها معظم أقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. جسمها شبه مدني الشكل يطول عند العنكب نحو ١٨ مم. وعد العنكب نحو ٣٠ مم. صدورها يلسي الشكل اسمر اللون. صياحها مركبتان زحيتان. شيفلها دقيقان خريان. فكها معجنان. جرائنها مستطيلة، نشطة، مسننة الاطراف. فوجا الى الصخرة الجميلة يطويها تقارون قائمة أو قريبا الحشرات اغصنها الذباب والحمام.

١٧٠٢٩ - مَطْرِيَّات

Cyprinidae (S). *Cyprinidae* (F). *Cyprinidae* (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الحياشيم والابريل. اجنتها وانواعها المبرقة كثيرة العدد. متشربتها تظهر في الطبقة البلطيرية. انواعها الحياشيم منتشرة في معظم بحار العالم. اصداؤها سميكة الاصفاذ، متباينة الاشكال والاحجام. تتميز بنحاشيها الانسارسية الذرة. يطاعها الطبقة، القصيرة وباربيلها المستطيلة القعدة الصفحات السفلى. اعرف انواعها واشهرها الطرية والوطيب والبريت.

١٧٠٣٠ - مَطْرِيَّة

Cyprina (S). *Cyprina* (F). *Cyprina* (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الحياشيم والابريل من فصيلة الطيريات. انواعها المعروفة عديدة اصلاها مصبات انهر المناطق الشمالية. اصداؤها شبه مخروطية الشكل خمسية الاطراف او سباعية، سميكة الصفحة المشقة، مائلة الحمار. خيما اللون غالبا. تعيش بين الرمال والحصى. لحمها كاعنة المصفت.

١٧٠٣١ - مَطْرِيَّ

هو الفالح، الجبل ذو السنانين، الحلب.

١٧٠٣٢ - مَطْرِسُون

هو اللسان السوي، الحلب.

١٧٠٣٣ - مَطْرَبَاب

Megacephale (S). *Mégacéphale* (F). جنس طير من فصيلة الشبانيات. انواعه قليلة تتميز باختلاف اجسامها. رؤوسها صلب تعلوها خوذ قوية التركيب. اذنانها كبيرة القند. طاهر انواعها الى السمرة الشايقة يطويها موج زيرتي. ياطن الثيابا ويطويها وانفاها الى السمرة الوردية. اجنتها مستديرة الشكل، مستوية الحجم. اذنانها صغيرة فرقة. ارسلها قوية لونها الى البسود. تألفت الاجرالح القترية من الشولوي. تعيش

١٧٠١٦ - مَطْبَارَة ، مَيْسَة شَتَوِيَة (F). *Figue d'or* (F). ثمرة الطبار وهي متوسطة الصنف كبيرة القند غلا الكن. والطبار غريب من التين الكشوي يعيش في البلاد المعتدلة الحارة.

١٧٠١٧ - مَطْبَاشِير

Craie (F). *Chalk* (E). حجارة جيرية ناعمة البيضاء، قليلة الصلابة، حذبة الأثر، مسكونة من ذرات الجير تخالطها بقايا عارية صلبة صوطا مرور الزين بالضغط والترتيب. اما اصابع الطباشير التي تستعمل في الكتابة على اللوح السدي فهي مزيج مركب من الجير مع كربونات الكلسيوم او كربونات الكلسيوم.

١٧٠١٨ - مَطْبَاشِيرِي

Crétacé (F). *Cretaceous, Chalky* (E). تمت تعريفه يطلق على الحقبة الثالثة من الابراج الاوسط اي الثاني. وبهذا التسمي الطباشيري والاراضي الطباشيرية. تتميز هذه الحقبة بتطور انصاع القشرة الارضية وانقسامها الى بعض القارات. وبمعية استيلاط المناطق المناعية، وبكثرة انتشار الرغويات ونها سديات الابريل ومزدوجيات المسامير، وبالتشعار الزخافات الكبيرة والجلابة وتطور الثبيات الصغيرة القدرية القترية شبه بالثبيات الحالية.

١٧٠١٩ - مَطْبَاق ، مَطْبُون ، رَكْسَن دَبِي

Infus viscosa (S). *Aunée visqueuse, Inus visqueuse, Conyze visqueux* (F). *Rock fles-bane* (E). *Alpenflöhkraut* (D). *Enula viscosa* (I). نوع من الراس وهو نبات عشبي بري مسر من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. ساقه فراء، زياء الحاء، تلوي من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه صغيرة القند، احليجية، ذرة. اصلها انضبط البشرة الخريبة على صفحيه. وكه جاءه من في السان. والطباق شجر منابه جبال مكة كثير المنافع.

١٧٠٢٠ - مَطْبَاق البرَاحِيث

هو البرنوف، الحلب.

١٧٠٢١ - مَطْبَب

شماع الشمس وهي الطرائق التي ترى فيها نعت طلوبها.

١٧٠٢٢ - مَطْبَعَة

كل تلمة من الارض مستطيلة الشكل، خيفة العرض كثر لبانها او قل تدعى طبعة.

١٧٠٢٣ - مَطْرِي ، عُنْدَرِيَّة

Ganoderma جنس من السيات تركيب الجلعق اليابسة في السديان والحار والاكابي واذا والينق فيسب انفلاتها الطولي ثم عليها وانواعها البقي. يشبه ابيض اللون كثيف الحيز. فطر طلي الشكل، تشج السطح، جل الاطار، ناعم البشرة الزياء الحلية للفس، لونه اصعب اغبر، يمتد عند منخض خط الاطار. اما الاطار فاغبر والصمعة السفلى بنية. لباه قروي اللون، جامد الحظ، نقي التركيب. سماكه من ١ الى ٣ سم. يورثاته قمية الشكل طولا نحو ٨ ميكرون وقطر ناعمتها ٨ ميكرون.

١٧٠٢٤ - مَطْرِي

Pisetre (F). *Plaster* (E).



مطاب



مطري



مطريوسه مستحبه



مطريه



مطباب

١٧٠٤٥ - طَبِيْءٌ ، طَبِيْءٌ
Tétine, Tétin (F).
Teat, Nipple (E).

حلمات الضرع التي من تحت وتلف وحافر واسع وأكثر ما يكون الطبي السباح . ج. ألباء .

١٧٠٤٦ - طَبِيْءُ الْكَلْبَةِ
هو الخلاف القوي الورق ، أطلبه .

١٧٠٤٧ - طَبِيْبٌ بَطْنِيْ
Vétérinaire, Médecin vétérinaire (F). Veterinary, Veterinary surgeon (E).
هو الطبيب المختص بمعالجة الحيوان .

١٧٠٤٨ - طَبِيْحًا
هي الجبوسا ، أطلها .

١٧٠٤٩ - طَبِيْرَةٌ
Gasteropelecus (S).
Gastéropélaque (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفضيلة السلوميات ، أنواعها المعروفة قليلة العدد مملوكة عند مصبات الأنهر || أجسامها صغيرة ، مبططة ، طرية الشكل ، تقلب من ٥ إلى ٦ سم. رؤوسها وأعضائها متوسطة الحجم ، اشتدتها شبه حديدية الانفرج . زعانفها الظهرية خلفية الأركان صغيرة . الصدرية جناحية الشكل . الحوضية شديدة الصغر . الشرجية مستطيلة والذيلية فائقة . جميعها تتميز بطبونها النصف دائرية الشكل . الأوباء إلى انخسار الغلي المالح .

١٧٠٥٠ - طَبِيْجٌ
هو لب الطلعة .

١٧٠٥١ - طَبِيْعَةٌ
Nature

١٧٠٥٢ - طَبِيْعِيٌّ ، مَادِّي
Physique, Matériel (F). Physikal, Material, Natural (E).

١٧٠٥٣ - طَبِيْقٌ
Coronula (F).
جنس صيولات بحرية من القشريات أصفادها طرية الشكل ، مسننة الاضلاع ، صغيرة القد تعيش على غلاف اجناس الحيتان .

١٧٠٥٤ - طَبِيْقٌ
Hymenocallis (S).
Hyménocallide (F). Hymenocallis (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة التريسيات . موطنها بعض اقاليم امريكا الجنوبية . أوراقها اهليلجية الشكل . أزهارها عطرية العرف ، صيوانية التجميع ، قواعده يحيط أسيانها مستعرضة مندغة قديمة الشكل || تزود كثرتين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترطب في الاتربة القليلة الاندماج المنسوبة التركيب . المنصري الزائرة المواد الغذائية || أنواعها قليلة العدد ، أشهرها الثلاثة التالية .

١٧٠٥٥ - طَبِيْقٌ أَهْيَفُ

Hymenocallis speciosa (S).
Hyménocallide élégante (F).

نوع من الطيب . عشبة دوفضية سبروتية . شراغها ثنائي الصلوع المزروانية ، يرتفع من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها اهليلجية مستطيلة ، نصلها جبل انخسار الزاهي . أزهارها صيوانية التجميع . أزهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، تطول نحو ١٠ سم. تاجها أي قدسها سداسي الشكل المندمعة المحلاد انخسار || تنويرها خريفي .

ذكرًا وأثنى كالحمام . اسرأها لعد من ٧ إلى ١٥ زنبًا . قوتها الجيوب على اشتدتها . أنثاها تبيض في الحوض كبير القد قطر رايوح بين ١٢٠ و ١٥٠ سم. وعقد من ٣٠ إلى ٦٠ سم. تنفخه مع ذكورها ورفيقاتها من السرب الواسد في دمال الشاطئ على سلود مربي اللد . وهي لا تحسن بيضها بل تنسه في الاقموس وتطليه بطيخة من الرمل ساجتها نحو ٢ سم. يفتقد بعد اسبوعين . وهي تبيض في مومها من ٨ إلى ١٠ بيضات تضعها بالتتابع حيث ينقضي بين الواحدة وأثنى ثلثها من ١٢ إلى ١٤ يومًا . والبيضة كبيرة القد مستطيلة الشكل تبدو عند وضعها قريديلة اللون ثم تتحول إلى الصفرة وتستقر على البياض . الفرغ يفتقد كليًا فشيلاً مستنقيا عن حضانة انه التي يحلها ولا تعرفه .

١٧٠٣٤ - طَبْعَانُ
Argile grasse (F).
Clay, Greasy, Rich (E).

١٧٠٣٥ - طَبِيْقٌ
Vertèbre animale (F).
Animal vertebre (E).
قنار القنار عند الحيوان .

١٧٠٣٦ - طَبَقٌ ، كَتَبٌ ، أَبُو طَبَقٌ ، أَبُو قُرْصُ
Holacanthus (S). Holacanth (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السلطيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠ مؤنثها بجار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد مغططة مستدرة طولها رايوح بين ١٥ و ٢٠ سم. أنثاها زاهية الألوان الجميلة المحملة بالاصفر والبرتقالي والوردي .

١٧٠٣٧ - طَبَقَةٌ
Seras, Stratum, Couché (F).
Seratum (E).

١٧٠٣٨ - طَبَقَةٌ
Superordre (F). Superorder (E).
باب في تصنيف الاسباء يأتي بعد الشبة وقبل الرتبة .

١٧٠٣٩ - طَبَقَةٌ مَوْلَدَةٌ
هي القلب أي الكيسوم ، أطله .

١٧٠٤٠ - طَبَقَةٌ
Tympan (F).
هي الصمحاء ، راجع اذن .

١٧٠٤١ - طَبَقَةُ الْأَذُنِ
Tambour de l'oreille (F).
Ear drum (E).
راجع اذن .

١٧٠٤٢ - طَبَقِيٌّ
Tympanique (F). Tympanic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بطيلة الاذن .

١٧٠٤٣ - طَبْنٌ ، طَبْنٌ
Pître de charogne (F).
Food of carrion (E).

الجيفة توضع فيصاد عليها السور والسباع .

١٧٠٤٤ - طَبْرُوعٌ ، قَمَلُ الْعَاكَةِ

Phitirus pubis (S). Morpion, Pou du pubis (F). Crab-louse (E).

نوع من القترصيات صغير الجسم مستعرض الشكل طولها رايوح بين ملبرم وأربعة خطوط وعلبرم وسمكة خطوط . أربطة دقيقة ، أرساغه تنقضي بمقايض خادشة حادة . يعيش بين الشعر الخشن كشم المانة والابند والحاجب .



طَبَقٌ



طَبَقٌ



طَبَقَةٌ



طَبَقٌ

١٧٠٥٦ - طليق كبير الناج *

Hymenocallis calathina (S).
Hymenocallide à grande couronne (F).

نوع من الطليق، عشبة دوفضية سريرية. شراخها ثنائي الضلع المزدانية يعلو من ٤٥ إلى ٨٠ سم. اوراقها قلبية الشكل، مستطلة الطرف لذلك، طول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. ازهارها سيولي التجميع. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القذ طول من ١٥ إلى ٢٠ سم. تاجها اي قدما سداسي الشكل للندغة الباحة الخضار للثوريما يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٠٥٧ - طليق متواجل *

Hymenocallis undulata (S).
Hymenocallide ondulée (F).

نوع من الطليق، عشبة دوفضية سريرية. شراخها عديم التضلع يرتفع نحو ٦٠ سم. اوراقها سنانية الشكل، رقيقة التصل المخرج، طول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٢ سم. ازهارها سيولي التجميع. ازهارها عابجة اللون، كبيرة القذ، طول من ١٥ إلى ١٨ سم. تاجها سداسي الشكل للندغة، زيتي اللون للثوريما ديمي او غريفي.

١٧٠٥٨ - طليق *

Cryptocare (F).

Cryptocareus (E).

نمت تعريفها يعلق كل حشرة غطية الزباني.

١٧٠٥٩ - طليقة البطاطا *

Lygaeus solani (S).
حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٦ م. ثوبا الى الخفصة. اطرافها صفراء اللون تتميز بكسيتها النظيف الصمغ ورأسها الكبير الممتد نحو تركيب اوراق البطاطا فتؤذيها.

١٧٠٦٠ - طليقة الزرع *

Blissus leucopertus (S).
حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٥ م. ثوبا الى السرة العافية. جدرانها مستطيلتان متركبتان وينشطان. ارجلها صفراء، ريقها تبدو صفراء اللون عند التفتت ثم تنصرف الى الحشرة ويزداد ازهارها بعد كل انشراح الى ان يستقر على الجزرة والتركيب الحطبة والشعير والشيلم والشوفان والذعن والذرة والارز.

١٧٠٦١ - طليقة السنديان *

Lygaeus aequestr (S). *Lygée aequestre* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطليقات ورتبة غشائيات ورتبة الحشرات جسمها مبسط الجرم يعلو نحو ١٢ م. رأسها احر اللون، اسود ابيض الممثل الطول. عنابها صفيرتان، انشراقتان. زياتها مستطيلتان، اسودتان. كسيتها احر اللون، اسود القسم الذي يتنام الرأس، بلتها وسداسي الى الحشرة، سيجتها مزدانية، سوداء. طولها احر المضاف، اسود الطرف واليتيج ويعلو من طرفه الاسود يتجمع ابيض وتنتفخ. قشراتها شفاف. قوائمها الى السرة للثوريما السنديان.

١٧٠٦٢ - طليقة الفطن *

Oxyacarus hyalinipennis (S).

حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٥ م. ثوبا الى السرة السوداء. جدرانها بلن كفضة الالامه للتركيب براعم البطن الزرية وتقع بها اشد الاذى.

١٧٠٦٣ - طليقة الكرتمه *

Pyrrhocoris apterus (S). *Punaise éto de mort*, *Diabie* (F).

حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٦ م. ثوبا ابيض اللون. اجنتها قصيرة. جدرانها جعقة للتركيب برام الكرتمه فتؤذيها.

١٧٠٦٤ - طليقة *

Fourmis (F). *Anta* (E).

١٧٠٦٥ - طليقات * و ليغيات *

Lygaeidae (S). *Lygaeidae* (F). *Lygaeidae*, *Chinch bugs* (E). *Lang wazzen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجنتها وانواعها كثيرة العدد جميعها خاضعة او شائعة، صغيرة القذ او متوسطة. تتميز بطولها من عند فروق السوائل الكرتمه الرائحة. عيونها جانبية. قرونها الاستشعارية مستطيلة، مقوسة، لثافة المفصل. ارجلها ثلاثية المقل. مجاديفها خالية العروق القاطية الطولية.

١٧٠٦٦ - طليقة *

حشرة تسمر نحو اقامة مشوكة من اسهلها الى اعلاها شوكها غالب لونها وورقها صلب ولها ثورية يبداه يحرمها للتصل. ج طي (السان).

١٧٠٦٧ - طليقات *

Etudes des nuages (F).

١٧٠٦٨ - طليقات، طليقات، طليقات *

Cirrus
غريب من النجوم وهو يتجلب مرتفع رقيق روى السماء من غلاط.

١٧٠٦٩ - طليقات مركطة *

Tropiderus sepicola (S). *Tropiderus moucheé* (F). *Tropiderus sepicola* (E).

حشرة خاضعة غشائية دامت من فصيلة القاطريات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف ارجلها الستة. غشائياتها تمش على الارواق. يرقاتها تمش على الجملع والاضبان اليابسة فتسرد بها بالقطر والفرس. جسمها صغير القذ يعلو من ٤ الى ٥ م. ثوبا الى السواد القشري الاصهب المالح يعلو ترقيط ابيض وبعض التزيق الكسيتية. رأسها مستد الجرم، عظمها متكي بريق الطرف. منابها صيرتان. زياتها صيرتان. طولها مستد الموتر للانسف. جدرانها شديدة الصلابة، كسيتها الخصل. ارجلها ثلاثية المقل للجليل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملعة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز. تسرح في التبار. تساه بعد ظهورها بنس اربعة اسابيع تمتع المكان في شقوق الاعشاب اليابسة او تحت قشورها للثورية عنه بلونها الكمال الجسموي طول نحو ٨ م. جسمها مستطيل الرأس والمقدم، سداسي الارجاء الصغيرة. ثوبا الى التني الاصفر المالح. رأسها اسود. تكلمها خلياك ذويان. طول الكلال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقفي في السرداب الريقي ضمن شفاة خليل.

١٧٠٧٠ - طليقات *

Rate (F). *Spleen* (E).
ضوء باطني في الجسم يبريد في تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. وظيفته التفاع من الدم عند الكبرويرات لذلك فهو يمتزج الكثير من كريات الدم الحمر ويستهلكها عند الحاجة اليها. ج طليق والطحلة وطحالات.



طليقة البطاطا



طليقة الزرع



طليقة الفطن



طليقة الكرتمه



طليقات مركطة

* ١٧٠٨٠ - طَحْرُوب السَّنْدِيَان *
Pleurotus dryinus (S). Pleurote du chêne (F).

نوع من الطحروب . يعيش على جنوع السنديان وأغصانه . جميعته شبيهة العدد الذي يتألف من وحدات أو أربع وحدات . ساقه شديدة القصر . نكتة مفروطة ، متحدة الحجم ، مكثورة الأطراف ، مزينة السطح ، لونها إلى البنية الصفراء المراءج يطولها تنبتش اسمر . اطراسها إلى الصفرة السمره المراءج || لحيته كاعثة الصنف ، غير مرغوب فيها .

* ١٧٠٨١ - طَحْرُوب صَحَارِي *
Pleurotus ostreatus (S). Pleurote en hultre (F).

نوع من الطحروب يعيش على جلوع السنوبريات . جميعته تعد من ٦ إلى ١٢ وحدة . ساقه قصيرة شبيهة اللون . نكتة عارية الشكل لونها إلى البنية السمره ، اطراسها إلى اليلكي المابق || لحيته مأكولة ، لذيلة الطعم .

١٧٠٨٢ - طَحْرُور ، طَحْرُورُوك *
Nuage (F). Cloud (E).

الطحرور والطررور : السحاب . والطحارور قطع السحاب للثفرة .

١٧٠٨٣ - طَحْلَب *
Muscleale (F). Muscolous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على النباتات الطحلبية .

١٧٠٨٤ - طَحْلَب ، طَحْلَب ، طَحْلَب *
Mousse (F). Moss (E).

اسم شامل يطلق على مختلف النباتات الطحلبية دون تمييز رتبة أو فصيلة أو جنس . والطحلب من النباتات المادمة الاضرار والجلود الحقيقية تلتصق للذء بمراشخ غيبطة تنبت في التربة وعلى الشجر والصخور .

١٧٠٨٥ - طَحْلَب السَّمَك *
Mousse (F).

مرض سار يفتك بأشكال المياه العذبة . مظهره الخارجي لواس غلي التجصع ، قطني اللون يطو أجسام السلك . سبه نظر مجهرى ينحى سرولوجية (Saprologia) يعيش في المياه الملوثة القذرة .

١٧٠٨٦ - طَحْلَب المتناسق *
Sphagne (F). هو الصمبل ، اطليه .١٧٠٨٧ - طَحْلَبِيَّات *
Bryophytes, Muscinées (F). Bryophytes, Muscina (E).

قسم من المملكة النباتية يتميز بخلو نباتاته من الجلود والأزهار . اجنسه وأنواعه كثيرة العدد جميعها نحالي فصائل تنتمي إلى أربع رتب وصفين .

١٧٠٨٨ - طَحْصَاء *
Mouture (F). Grinding (E).

جمل البر وسائر الحبوب دقيقاً .

١٧٠٩٠ - طَحِيرَب *
Olivella (S). Olivella (F). Olivella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنيات الاربل وفصيلة الطحيريات . أنواعه الماعصرة المروقة نحو ٣٠

١٧٠٧١ - طَحَالِب *
Mousses (F). Moss (E).

صنف من قسم الطحليات انواعه واجنسه عديدة جميعها اربع فصائل تنتمي إلى مرتبتين : السبقيات والسفانبات . اما فصائلها فهي : الروكيكات والسفانبات والثرنيثبات والصرغيات .

١٧٠٧٢ - طَحَلِّي *
Splénique (F). Splenic (E).

نمت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالطحال .

١٧٠٧٣ - طَحَان *
Meunier (F). Miller (E).

هو من تاعلى مهنة الطحن من صانع الطحين وبائه .

١٧٠٧٤ - طَحْصَانَة *
Meunerie (F). Miller's crade (E).

سرة الطحان وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً .

١٧٠٧٥ - طَحْرَاب *
Olivancillaria (S). Olivancillaire (F). Olivancillaria (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مهنيات الاربل وفصيلة الطحيريات . أنواعه الماعصرة المروقة عديدة موطنها بدار امريكية الجنوبية || اصداها شبيهة بأصداط الطحرب إلا انها ازلق منها ويواشها مقوسة الشكل . صفحاتها ناعمة ، جميلة الألوان والزخرفة .

١٧٠٧٦ - طَحْرُوب *
Olive, Dactylus (S). Olive (F).

الواحدة طحربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنيات الاربل وفصيلة الطحيريات . أنواعه المروقة نحو ٦٠ جميعها مفترسة . موطنها بدار البلاد الحارة . تعيش على السطوط الرملية الممطرة || اصداها مألوفة شبيه زيتونية الشكل . متوسطة الحجم ، جميلة الألوان والزخرفة . بعض أنواعها يفرز مادة صناعية لونها وركيبها كالزبدون || اثير انواعه واكثرها قذا ويزدها ارجوانياً الطحرب الزرقى (Dactylus utriculus) لونه إلى الشفحة المزخرفة بالكنية . موطنه المحيط الهندي .

١٧٠٧٧ - طَحْرَبِيَّات *
Olividae (S). Olividae, Dactylidae (F). Olividae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مهنيات الاربل . اجناسها وأنواعها الماعصرة المروقة عديدة موطنها بدار البلاد الحارة || اصداها شبيهة امليحية ، زيتونية الشلون ، متقاربة الاجسام ، جميلة الألوان . مستطيلة كتوتها الضيقة الناعمة . ارجلها كبيرة ، ثنائية القلق || اعرف اجناسها واشهرها الطحرب والطحيرب والطحراب والروطب والماعبة .

١٧٠٧٨ - طَحْرُوك *
Tégument (F). Tegument (E).

للشاة الناعم الذي ينفذ القشرة والبرزة وما اشبه .

١٧٠٧٩ - طَحْرُوب *
Pleurotus (S). Pleurote (F).

جنس طرور كاملة التركيب من فصيلة الفاروقيات . انواعه المروقة قليلة العدد اصلاها غابات وسراج جبال المناطق المعتدلة الحارة . تعيش على جلوع الاشجار واغصانها دون أن تفرقها . تتميز بسوقها القصيرة وبكاعها القسمية الشكل || اعرف أنواعها واشهرها الطحروب المأروي وطحروب السنديان .



طحرب



طحرب السنديان



طحرب بداري



طحرب

المروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || مستتراتها نادر كمنقذ ملوثة قطنية الخشب تتوأم في اللاه توجهها ملاسها المديدة وما ينشأ لها من الياث راشية مستطيلة عجيبة الاطراف .

١٧١٠٤ - طرزيات *
Phyosphoridae (S).
Phyosphoridae (F). Phyosphoridae (E).

فصيلة من الضفائيات المتشيمات البحرية . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || اشهر اجناسها الطرزة .

Type ١٧١٠٥ - طركاز

١٧١٠٦ - طركاز برنقالي *
Rupicola crocea (S).
Rupicola orangé (F).

طائر من فصيلة الطرزيات . موطنه بعض المناطق الجبلية من اليونان والبرازيل . تألف المواق العصرية والاراضي الويرة باستثناء فصل الشتاء حيث ياتي الى الغابات . سره يند بعض المئات || جسمه مكروم الشكل يطول نحو ٣٠ سم . عنه الذكر نحو ٢٧ سم . عنه الانثى . ثوب الذكر الى الصفار البرتقالي . حمار قزخته الى الابيض المائل . لوانس قوامه وياهره الى الجزوة . فقال ذنبه جزوية اللون صفراء الاطراف . حقة عنه برقالية اللون . منقده وساقه الى الصفار المخطي . ثوب الانثى الى الصفار المائل . يطويها بياضه الى الازرق واللب || طيارها خفيف الحركة سريعها طويل الطول . قوته التار المختلفة والبادور || يشبه وكسه في تخاليف الصفور . عمل طريقة السنفر . بالثمن المزوج بالاليات النباتية . الانثى تحضن ثلاث مرات في الحيرة . حفتها تتألف من بيضتين . القرحم يمتد نحو اسبوعين تقوم به الانثى بيتا الذكر يبين لها الشتاء .

١٧١٠٧ - طركازيات *
Rupicolidae (S).
Rupicolidae (E).

فصيلة طير من الجولم سنيات المناظر . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى اعصها اليونان . تألف البير والواقع العصرية التي لا تبد كثيرا عن شلالات اللاه || اجسامها حيلة مكرومة مستطيلة الاجنحة قصيرة الاذنان والارواح . صفيرة المنقذ . كبيرة القنارح التي تمتد من المناش الى الانفية . القواها تختلف مع القرح واثق || نظامها الحياتي جماعي . اسرارها تد بعض المئات . قوتها التار والبادور || اعراف انواعها واشهرها الطركاز البرتقالي .

١٧١٠٨ - طرقة البع *
Terapha hyocinai (S).
Punat des Jusquames (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الكوريات وردية خضفلات الاجنحة . جسمها ميجر الملب ، متعل التبطيط ، يطول نحو ١٠ سم . رأسها مستطيل ، محرم . عظمها متعل الملب . عينها صغرتان ، ناشرتان . زباناها مستطيلان || ثوبها الى الحمرة الصفراء المواج يعلوا تيج اسدي في الكول والحيفة وسنجي القلوان . طرارها اريد اللون . قترانها شفاف . يطها الى الحمرة يعلوا تيج اسدي . قواها متكافئة الملب || تركب العديد من النبات واعصها الباذنجانيات ومنها البع .



طخوف



طرزة



طرز برنقالي

موطنها مجار البلاد الحارة || اصداها مائة ثامة زيرفة الشوزن ، صفيرة اللحم ، حيلة الايوان الزامية || منه انواع تنفخ قوت سلع اللاه وذلك بواسطة اربيلها المغلقة المسكن نفخها .

١٧٠٩١ - طحين
Farine (F). Flour (E).
هو التيق ، مسروق ناعم يحصل من طمن حبوب القمح والذرة الصفراء وغيرها من الحبوب .

١٧٠٩٢ - طخاف
Cirrus (S).
ويدهى الطخاف ، صباب مرتفع رقيق .

١٧٠٩٣ - طخفروور *
Nimbostratus (S).
هو الطاخور غريب من اليوم ، اطلبه .

١٧٠٩٤ - طخفروور *
Languria (S).
Langurie (F). Languria (E).

جنس مشرات من غديات الاجنحة ديوسيات القرن ونصفية الطرطليات . انواعها المروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صفيرة ، صفيرة الشكل ، تطول من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها حمرة . عيونها نازرة . قرونها الاستعمارية خيطية ، ديوسية الاطراف . كولها شبه مكورة . بطونها اسطوانية . الخادما ضيقة ، لاحقة . قواها دقيقة . انولها ثمانية اللون ، اكثر نيا الاحمر والبرتقالي . اخادها زرقاء او خضراء او كستنية او صفراء مدهية المواج || معظم انواعها يعيش على الطلور والبعض الآخر تحت قشور النبات النازل . روقاتها دامت .

١٧٠٩٥ - طخفكاه
الانسان السوداء الالاف .

١٧٠٩٦ - طخمكة
Troupeau de chèvres (F).
Flock of goats (E).
طغي المز .

١٧٠٩٧ - طخميل
Cooq (F). Cock (E).
هو البك المزر .

١٧٠٩٨ - طيخم
Takang (F).
حيوان ليون عايب مجز يدهى طاككان ، اطلبه .

١٧٠٩٩ - طر
Duvet (F). Down (E).
الطر : ما طلع من الورر بعد التنول . وطر النبات : رطل او كبح .

١٧١٠٠ - طراخوور
هو الاسقمري . نوع من السمك ، اطلبه .

١٧١٠١ - طراخوور شاليع
Maquerasu commun (F).
سمكة بحرية تدعى اسقمري معروف ، اطلبه .

١٧١٠٢ - طراخوور كلياس
Maquerasu colias (F).
سمكة بحرية تدعى اسقمري كلياس ، اطلبه .

١٧١٠٣ - طرارة *
Phosphora (S).
Phosphore (F). Phosphore (E).
جنس عضاء من المشيمات وفصيلة الطراريات . انواعها

١٧١١٨ - طرؤث *

Balanothorus (S).

Balanothorus (F).

جنس نباتات لحمية فطرية الشكل معمرة من فصيلة الطروثيات. أنواعه المشهورة ثلاثة تنضفحل على جلود الخفافيش الأجنحة. سيقانها وفروعها صلبة القدر غليظة الجسم. أوراقها شريفة متراكبة. أزهارها صفراء أو بيضاء أو حمراء. عصارها أعاليه شديدة التركيب شائعة الاستعمال.

١٧١١٩ - طرؤث * ، مصرور ، زب الأرض ،

إبر الحقيق ، إبر الذهب

Cynomorium coccineum (S). Cynomoir, Cynomorium écarlate, Champignon de Malte (F). Maltese mushroom, Scarlet synomorium (E). Malteser Pilz, Schwamm von Malta (D). Fungo di Malta (I).

نبات طفيل يسيد الجلس والنوع من سبط المصرووات. فضيلة الطروثيات. منته حوض البسر المنحط. أعاليه مأكولة قابضة وهو لا ينمو من بعض الحواش الطبية الصالحة للمقوية النافعة ، كما يستعمل لقطع الزحف .

١٧١٢٠ - طرؤث أحمر * ، هالوك شرقي

Phelipaea coccinea (S). Phélpée écarlate, Claudes-tine du Levant (F). Red showy broom rape (E). Claudes-tine di Levante (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفيليات ينمو من بعض مناطق الشرق الأدنى. لحميته ينسجس اللون ، أزهاره أرجوانية ، حمر المراج . وهو شديد البقع والضرر ، يؤذي النباتات التي يركبها .

١٧١٢١ - طرؤث حلو

هو الأناثيون المرئي ، الحليه .

١٧١٢٢ - طرؤث مصري * ، هالوك ريجيني

Phelipaea aegyptiaca (S). Phélpée d'Egypte (F). Sweet scented broom rape (E). Nalkensommer-wurz (D). Succicamele piccolo (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفيليات يركب أكثر الأزروع السيفية ويوقع بها اشد الأذى .

١٧١٢٣ - طروثيات

Balanothoraceae (S).

Balanothoraceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات المثلثين. أجناسها وأزهارها عديدة تتميز بظلاله سيقانها اللحمية . أوراقها شريفة متراكبة . أزهارها وبيدة أو ثنائية المسكن ، صغيرة القدر ، هامة الأركان ، قرصية التجميع ، لينة ، متنامية .

١٧١٢٤ - طرح

Soustraction (F), Subtraction (E).

Régime de banane (F).

Bunch, Stem (E).

هو القوط يتألف من عدة أشواط متنامية ترتكز على شراخ لوني التركيب ، متين الحيك ، غزير العصاره اللدنية .

١٧١٢٦ - طرح في المؤايدة

Mise aux enchères (F). Bidding (E).

هو طرح مالى مقبول أو ثابت للبيع بطريق المزاد العلني ليشتره من يعرض أجل من فيه .

١٧١٢٧ - طرؤث

Eau altérée (F).

Corrupt water (E).

هو الماء الأجن .

١٧١٢٨ - طرح ، طرؤث

Puisard (F). Cesspool (E).

شبه حوض كبير عند خرج القناة يجمع فيه الماء .

١٧١٠٩ - طرائق الإفساد

Méthodes de reproduction (F). Methods of reproduction (E).

طرائق الإفساد في الحيوانات الدواجن تأتي بالنسبة إلى البداية المتوخاة على حدة الشكال : الإفساد والتجبن والانتفال والتخليل والانتخاب . وإيجها في مواضعها .

١٧١١٠ - طرؤث

Tourbe (F). Peat (E).

هو التراب ، الحليه .

١٧١١١ - طرؤث

Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E).

هي التراب ، الحليه .

١٧١١٢ - طرؤث مطوحي * ، دومة القصب

المطوكة

Cynchramus schoenicus, Embertia schoenicus (S).

Cynchrame schoenicole, Bruant des roseaux (F).

Dalmatian Reed Bunting (E).

طائر من الدروس وفضيلة الكشوريات. موطنه أروبة الجنوبية ويقع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر . يستمر في الضواري التي تقع في لبنان من شهر ألى أربعة أشهر . جسمه ريع القامة ينمو نحو ١٥ سم. ويبلغ بسطه نحو ١٨ سم. ثوبه ألى الطحلة البنية يعلوها توضيح كسفي . رأسه وذوؤه ألى السرة . ويعد من قادمي الشتاء غطان أبيضان فاصلان بين أحمرين والقرور ثم يتصلان بقلادة بيضاء تطوق الرأس . ويعلو الرداء والقنار والسرير خطوط كسفية يتخللها الأسود. ذنبه مستدل القدر ، فارق الطرف . صدره ويطة ألى القنرة البيضاء . أبطاء موشان بالني . حلقه عنه كسفية . منقاده سبورى اللون . الأني أصفر قدام من الذكر وشرها قريب الشبه بفره . يأنف المنطق والأجام وضفاف جاري للماء . يذبح عنه على الأرض بين الأشجار الكسفية . الأني تحسن مرة واحدة في العام . حشيتها تراوح من ٤ إلى ٦ بيضات ترطبها بمتانة للذكر من ١٣ إلى ١٤ بيضا . يستر من المسافير النافعة القليلة الأذى .

١٧١١٣ - طرؤث

Equus asaticus (S).

Tarpan (F).

ضرب من الخيل موطنه فياني آسيا الشمالية . علماء الحيوان لا تتعرف بالظن أن كنوع مستقل بل تقبل أنه ضرب من الخيل الوحش بعد أن كان داجنا . جسمه أصغر من جسم الفرس العربي . ثوبه كسفي اللون يمتد في الشتاء ويرفع في الربيع والصيف . يتميز بالصلاب والشاط . وبظلاله الرأس وبأسطالة النق الأضلع القصير العرف . ويصدر الحافر وبزواة شمر الذنب الذي يمتد حتى لأواخر الظهر .

١٧١١٤ - طرؤث العرأب هو لابل الحقل ، الحليه .

١٧١١٥ - طرؤث

الطيرة هي القطة الواحدة .

١٧١١٦ - طرؤث

Bord (F). Edge, Margin (E).

طرؤ كل شيء : حرفة . وطرة الورقة سرحها أو حناها .

ج طرو وطرار وطرات وأطرار .

١٧١١٧ - طرؤث

Huppe (F). Crest, Tufted (E).

شكل من اشكال القنطرة .



طرؤث مطوحي



طرؤث



طرؤث



طرؤث



طرؤث أحمر



طرؤث مصري



طرخون



طردوس



طرب



طرسوج امير



طرسوج دلي



طرسوج صهري

النبات . ملجته الحلياني زويي . مسرحة دجوي . قوته الخشرات والذباب والبار وريق الانذار يرتفعه بلسانه الصيق المالح || جسمه صغير اقصد بطول نحو ١٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٠ سم . رأسه مخروطي الشكل ، دقيق القمم . عيناه صغيرتان . اذناه مستديرتان . قوائمه قصيرة . ابلهه تقابل اسنابه . ويره كيت وقصير . ثوبه الى الشبهة يملوها موج لشع في الرأس والظهر وبداج اسفر في الصدر والبطن ، ويملوها ايضا خط بني اسود قاطب يمتد من القف الى قاعدة الذنب . حصره الى الشبهة الصنانية || الاثني تحمل بعض الثوب وما جراب في اسفل البطن تقم في الوضع حتى الطام .

١٧١٣٩ - طُرْسُوجٌ ، سُلْطَانُ اِبْرَاهِم

Mullus (S). Mulla, Rouget (F). Mullet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الطرسوجيات انزله ثلاثة موطنا شوطي القنوط والاغلي . جميعها صغيرة القند طولها يراوح بين ١٠ و ٢٥ سم . اجسامها اهلينية الشكل عفاة . اوتابا زامية الالوان التراكبية المتداخلة بين الرادي والوردي والبرتقالي والاخر والبني والاسمر . رؤوسها صغيرة . عظامها قصيرة . طبانها ثلثية مسطيلة . زعانفها الشرجية فائقة || انواعه الثلاثة مأكولة ومستعملة اما متفولة الصنف .

١٧١٤٠ - طُرْسُوجٌ اَسْمَرٌ ، قُرْقُورَةٌ

Mullus fasciatus (S). Mulla brun (F). Dark mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الشجيرة واكثر البحرية الرملية والصخرية . يكثر في البحر المتوسط . طوله عند اكتمال بلوغه يقارب ٢٥ سم . ملمسه اهليني الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يدخل فيها القوي والرادي والوردي والاخر الصناني المالح . ظهره اسبق لونا من جنبه . رأسه صغير القند . عظمه متوسط البروز . عظامه خفيفة . عيناه صغيرتان . زعانفها الظهرية والصخرية متدلة الحجم ، لينة . قلوبه صغيرة ودقيقة || يصير من اجيد الاسماك المأكولة ومنهم من ماله ان لم يغسله حل الطرسوج الصهري .

١٧١٤١ - طُرْسُوجٌ رَمْلِيٌّ ، سُلْطَانُ اِبْرَاهِم

الرْمْلِيٌّ ، بَرَبَرِيٌّ صَغِيرٌ

Mullus barbatus (S). Mulla rouget, Rouget-barbas, Petit barbarin (F). Red mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الثوب الردي البحرية . طوله يراوح من ١٠ الى ٢٥ سم . ملمسه جالس الظهر . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يدخل فيها القوي والرادي والاردي . رأسه صغير القند . عظمه قليل البروز . قصير . عيناه دقيقتان مسطيلتان . زعانفها الظهرية والصخرية متدلة القند لينة . زعنفة الشرجية فائقة . قلوبه متدلة رفيقة || يصير من اجيد الاسماك المأكولة الا انه يأتي بعد الطرسوج الصهري . وهو مبلول حل الشوطي البانانية السوري .

١٧١٤٢ - طُرْسُوجٌ صَحْرِيٌّ ، سُلْطَانُ اِبْرَاهِم

الصَحْرِيٌّ ، بَرَبَرِيٌّ

Mullus surmuletus (S). Mulla surmulet, Surmulet, Barbarin (F). Surmulet (E).

نوع من الطرسوج قوته الثوب الصخرية المأكولة . طوله يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم . ملمسه ردي الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يعلب فيها الرادي والوردي

١٧١٣٩ - طُرْسُوجٌ هُوَ المذهب البري ، اهلبي .

١٧١٣٠ - طُرْسُوجٌ سَمَكَةٌ بحرية تسمى شيم طرسودي ، اهلبي .

١٧١٣١ - طُرْسُوجٌ

Artemisia dracunculus (S). Estragon, Armoise petit dragon, Dragons, Fargon, Tragon, Serpentine (F). Estragon, Tarragon (E). Estragon, Tragabueffus (D). Dragonte, Dragoncello, Targone (I). بقلة زراعية مسمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ساقه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة خيفة النصل . انذاره منلية التجميع ، وروسية الشكل ، بحورية الارتكاز || وهو من التوابل الشائعة الاستعمال . اوراقه ولونها مأكولة . جميع اجزائه صطرية . بعض الشبهة وبنيه المدة || يتكاثر بالبزور والقص . يوجد في جميع الاربة الزراعية لكنه ينشئ الرطوبة والصقيع .

١٧١٣٢ - طُرْدُوسٌ ، طُرْدُوسٌ

هو فرق التلح . ج . طردوس .

١٧١٣٣ - طُرْدُوكٌ هُوَ السوران السوري . اهلبي .

١٧١٣٤ - طُرْدُوسٌ

Onychoteuthis (S). Onychoteuthis (F).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات رأسيات الاجرل لفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مسطيلة ، تنقسم بزوائد مزوانية كبيرة القند . رؤوسها متدلة الحجم . صوبها كبيرة ماصة . جرابها ملطقة ، ثمانية منها محجمة متساوية الطول واثنان لقيقتان مسطيلتان تنشيان برسي ستانية الشكل بمجوز كلابي سادة || اشهر انواعه الطردوس القوي (On. robusta) الذي يكثر وجوده في بعض مناطق المحيط الهادي والذي يطول من ١٠ الى ١٢ متراً .

١٧١٣٥ - طُرْدُوسِيَّاتٌ

Onychoteuthidae (S). Onychoteuthidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات رأسيات الاجرل ، مزدنبات انلياسيس ، عشاريات الجرامز . اجناسها وانواعها المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتدلة الحارة والباردة || اعرف اجناسه واشهرها الطردوس والورانس والساس والفوس .

١٧١٣٦ - طُرْسٌ

جزء ودي الشكل من صفحة بعض القنطور . ج اطراس وطروس . ج الاطراس فهو كائنا اطراف اوراق مرصوة متناصبة متطبة .

١٧١٣٧ - طُرْسُوكٌ

نمت ترفيقي يطلق حل كل طائر يصير او حيوان يتجدد قشاره او جلده .

١٧١٣٨ - طُرْسَبٌ

Tarpsel rostratus (S). Tarpselpe rostré (F).

حيوان حاشر ثامر وصيد الجلس والنوع من فصيلة القنقنريات . موطنه بعض مناطق استراليا الشمالية . يأنف

الزئيفة. الاناث تبني من ٤ الى ٥ بيضات والذكور تنابذ الاناث في الحضان.

١٧١٥٠ - **طرسوجيات** (S): **Pteroptochidae**
١٧١٥٠ - **طرسوجيات** (F): **Pteroptochidae** (E).

فصيلة طير من الجلام سيات المناقير. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. اصطلها بعض مناطق الشرق الاقصى وامريكا الجنوبية. تألفت البراري والمراعي قوتها الحشرات والحوام واليزور البرية || اجسامها صغيرة. اوتها باعامة التخفيف الزاهر. اعرف اجناسها واشهرها الطرام والرامز.

١٧١٥١ - **طرسوب**

هو الفرع الضخم الطويل المسترخي. ويقال لطويلة الفرع من الحيوان طرسوب.

١٧١٥٢ - **طرسوجيات**

الطرسوجيات من المزر الطويلة شطري الفرع.

١٧١٥٣ - **طرسوجيات** (F): **Vanneu huppé**

طائر يدعى ابو طيط متوج، اطلبه.

١٧١٥٤ - **طرسوب** (F): **Petite centauree**

هو القنطريون الصغير او مرارة الحش.

١٧١٥٥ - **طرسوب** (F): **Tartrage**

هي معالجة الحمر بجافس الطريرك سدا لموز في نسبة حوضها.

١٧١٥٦ - **طرسوب** (S): **Clitus argentatus**
١٧١٥٦ - **طرسوب** (F): **Clitus, Crested blenny** (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الجيريات شاكات الزمانف. اصطلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها شبه اهلبيجي الشكل، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. توتها الى الحضان البحرية القفص المواجه يطوى تجذع متفرق اسر بعد من الزئيفة الظهيرة الى البطن. رأسها صغير الخطر الدلق يطوى في وسط الجبهة رتة صغيرة تحمله غشروية المادة. زعنفتها الظهيرة وبيضة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٧١٥٧ - **طرسوب** هو البرازية، اطلها.

١٧١٥٨ - **طرسوب الباس**

هو الكويين الكبير، اطله.

١٧١٥٩ - **طرسوب** (F): **Topinambour**

هو حباد الشمس المستولي، اطلبه.

١٧١٦٠ - **طرسوب مُحَرَّر**، **كبريوس**

طرسوب مُحَرَّر (S): **Coprophilus striatus**

طرسوب مُحَرَّر (F): **Coprophilus striatus** (E).

حشرة نائلة من فصيلة الدنيات وربة سندات الاجنحة. تألفت المزراع التي تكثر فيها الماشية لانها تمش على الزبل والورث || جسمها صغير القفص يطول من ٦ الى ٧ سم. توتها الى السمرة الكسبية الباقية. رأسها صغير الحجم ينتهي بفكين كبيرين. حياها بارزتان. زياناها غليظان دقيقان. ظهرها يلمع نحو ثلث البطن. غمداها قليلتا الصلابة، متباينة التميز. بطنها مستطيل المخز ينتهي

والاجواني الصنابي اللوح. رأسه صغير القفص. غطه ذق بارز. جذباه مستطيلتان. حياها اريوانيتان. زمانفه الظهيرة والصدرية كبيرة القفص لينة. زعنفته الشريفة فارقة مستطيلة || يتبر من اقصر الاسماك واجودها صغدا. وهو مبدول على التواطي النباتية السورية.

١٧١٤٣ - **طرسوجيات** (S): **Mullidae**

Mullidae (F): **Mullidae, Goatfishes** (E).

فصيلة اسماك من البطنيات الشاكات الزمانف. اجناسها وانواعها عديدة جميعها مأكولة مستحبة العلم. اجسامها رفيقة متوسطة القفص او صغيرة. اوتها زامة الالوان الجميلة. اشهر اجناسها الطرسوج.

١٧١٤٤ - **طرسوب** (F): **Exavis**

الطرس ما يتخل عنه الجسم الحيواني عنه التصير او الانلاخ او الاكمال.

١٧١٤٥ - **طرسوب** (F): **Exuvialité**

Exuvialité (E).

الطرمة خاصة التصير او الانلاخ او ابدال القشار التي تنتج بها الطير والحشرات وبعض الحيوانات.

١٧١٤٦ - **طرسوب** (S): **Aptenodytes**

Mancho (F): **Penguin** (E).

جنس طيور بحرية من دمجات الريش وكليات القدم. تتميز باجسامها الغليظة المستطيلة. طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. اجنتها بجذفة الشكل، حشوية الريش. اعتاقها وبنايتها مستطيلة، ورؤوسها صغيرة. اذنانها جدام كاسية || قوتها الاسماك والقشريات. تثن اوكارها في تخاليف المسنور فوق الماء. اناتها قبيص وحشش بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع.

١٧١٤٧ - **طرسوجيات** (S): **Aptenodytes**

Aptenodytes (F): **Aptenodytes** (E).

فصيلة طيور بحرية من دمجات الريش وكليات القدم. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. موطنها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبة غشوية الشكل. رؤوسها صغيرة، مناقبها جالسة، معتلة الطول، غمدة الاالك العليا الباترة السطام الحاد. اعتاقها مستطيلة: اجنتها بجذفة الشكل، حشوية الريش. اذنانها جدام كاسية. ارسافها متوسطة الحجم واربعة الاصابع، كاملة الخطاف || اشهر اجناسها الطرسوب والقفاف.

١٧١٤٨ - **طرسوب** (F): **Agrodrome champêtre**

طائر من فصيلة الليريات يدعى جشة الحقل. اطله.

١٧١٤٩ - **طرسوب** (S): **Pteroptochos**

Pteroptochos (F): **Pteroptochos** (E).

جنس طير من فصيلة الطرسوجيات. انواعه المروفة قليلة العدد. موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية. تألفت المروج والنباتات وضخاف مجاري الماء. قوتها الحوام والحشرات والينان واليزور البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٤ الى ١٦ سم. اجنتها قصيرة. اذنانها مستطيلة. مستقيمة الاطراف. اوتها تراوح من الشقعة الى السمرة والصدرية والشبهة. صدورها وبطنها من البياض الى التبرة الموشة بالاسود || تثن اعاشتها في الاجار



طرسوب



طرام



طرسوب



طرسوب محرز

١٧١٦٦ - طَرَفُونِيَّات * Trogonidae (S).
Trogonidae (F). Trogonidae (E).
فصيلة طير من اللسقات. اجناسها وانواعها عديدة
اعطانها البلاد الاستوائية. تتميز بامتلاكها اذنانها وبجل
الوانها والوانها الزاهية. أشهر اجناسها الطرغون

١٧١٦٧ - طَرَف

الطرف أو الطرفان منزل من منازل القمر الشامية. وما
نجمان من برج الاسد يتقاسمان الجهة. سيما بذلك لاجلها
كمنى الاسد || رقيب الطرف يعنى سد بلع.



طرفة

١٧١٦٨ - طَرِف Racé, Pur sang (F).
Thoroughbred (E).

نعت تعريفى يطلق على كل حيوان سريع السبق النسب الاصيل
اي كرم الطرفين طرف الاب وطرف الام.

١٧١٦٩ - طَرِف Partie (F). Part (E).
هو من اشترك في عقد قانوني مع غيره.

١٧١٧٠ - طَرَفَا المَعَادِكَة Membres de l'équation (F). Members (sides) of
equation (E).

١٧١٧١ - طَرَفَاء في الأثل، اطليه.

١٧١٧٢ - طَرَفَاء المَنّ في اثل اللز، اطليه.

١٧١٧٣ - طَرَفَالِيَّات وتسمى الاثليات. فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة
الاقلام. واسع الهياكل.

١٧١٧٤ - طَرَفَة

الطرفة نجم ثير من كوكبة برج السرطان مركزه على قائمة
السرطان المؤخرة.

١٧١٧٥ - طَرَقِيّ Couvrir (F).
طرق لقتل الاثني. كما عليها (المسح).

١٧١٧٦ - طَرَقِيّ Ecrour (F). To hard-hammer (E). طَرَقِيّ مدد.

١٧١٧٧ - طَرَقِيّ Rangée de dactyles (F).
Range of date-trees (E). صف البنطل بها طال وايضا زرع.

١٧١٧٨ - طَرَقُون Trygon (S).
Patensague (F). Whip-tailed sting ray (E).

جنس اسماك ملحية بحرية من فصيلة الطرقونيات. انواعها
المعروفة قليلة المد اعطانها بحار البلاد الحارة يكثر ريوها
قرب الاغوار حيث تلتصق البراك والاصمال بانتظار ما
تفترسه لا اجسامها مبطلة فيه مستندة الشكل تظلم من
الام الى ٢٠٠ سم. بما فيه الاذناب المستطيلة كالسياط
تحبسها متاخس حادة شديدة الصلابة جرسها مؤذية
سامة وقد تكاثر بيمت. اذنانها تظلم من ٨٥ الى ١٠٠ سم.
الوانها تختلف مع الانواع. اعرفت انواعها المجلد والبسبي



طرقون

١٧١٧٩ - طَرَقُون بِفَسْجِي

Trygon violacea (S). Patensague violette (F).
نوع من الطرقون. يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط.
طوله بما فيه الذنب نحو ١٩٠ سم. ثوبه الملوي الى

بشرج عريض. ارساغها خضابة الغعل || طا جليل واحد في
الحبل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتموت حتى
اواسط آب. تسرح في التمار وتبيت في الليل داخل افاق
مستطيلة تحفها في التربة || التربة عند بلوغها الاذناك
التام تظلم من ١٠ الى ١٢ م. ثوبها الى السرة الكسنية.
حلقاتها الصدرية مستطيلة الجرم. رأسها معتل للقد اسود
اللون. ذكاتها فضيحات. رواجها وشرجها الى السرة
السوداء || طر الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع
ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية.

١٧١٦١ - طَرَعِب Cephalopterus (S).
Céphaloptère (F). Cephalopterus (E).

جنس طير من الجوارم منيات المناظر وفصيلة القطعنيات.
انواعه المعروفة قليلة المد اعطانها بعض مناطق امريكة
الاستوائية. تألف الغابات. قوتها اثار البرية. ملجئها
الحياضي جاهي. انوعها قليلة المد من ٤ الى ١٠ ازواج
اجسامها متوسطة القد شبيهة بالزرداب. رؤوسها متوجة
كبيرة الطور. اعناقها مقلمة باخفاف مستمرة الرض.
مناقلها ضلجة عزمة || اشهر انواعه الطرعب المزين
Ceph. ornatus (S). الذي يكثر وجوده على ضفاف
نهر الامازون. ثوبه الى السواد الاسف الازرق المالح.

١٧١٦٢ - طَرَعِيلَة * Columbella (S).
Colombella (F). Columbella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
وفصيلة الطرغليات. انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ مظهرها
يعيش على شواطئ بحار المناطق الاستوائية || اصداؤها
متماسكة شبه بيضية. غنية عازلة. قشرة الغراب، مبطنة
ومجلمة بالالوان الزاهية. رؤوسها صغيرة مبطلة، ثنائية
الواسا المنيعة الخروطية الشكل. انواعها ملحقة
بالرؤوس، مستطيلة الانضمام الانبوية. ارجلها مستطيلة.
ضيقه مجعرة باسقاط قرنية المادة.

١٧١٦٣ - طَرَعِيلُونِيّ * عَرَفِيّ، طَشَان Trachilus (S). Colibri, Ouesu-mouche (F). Humming-bird (E).

طرغيلوس وعرفس من الجاسط. صفور صغير القد
طوله نحو ١٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الزاهية الجميلة
فيه الرمادي والاخر والاصفر والاسمر وفي جناحيه ريشة
ذهبية. ذنبه متوازي التقط البيض النقية. متقارب رقيق
مستطيل. قوته الذباب والحمام وريق الزمار || يمش
عنه في الانجار الفتاة فوق مجاري الماء || انشاء تحسن
من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنته لا تكسى
اربع بيضات.

١٧١٦٤ - طَرَعِيلِيَّات * Columbellidae (S).
Columbellidae (F). Columbellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل
مشطيات الحياض. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في سبط بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداؤها
صغيرة القد متباينة الاشكال منها البيضية والخروطية
والرشية، جميعها متماسكة الصفة المزخرفة بالالوان
الزاهية || اشهر اجناسها الطرغيلة.

١٧١٦٥ - طَرَعُون * Trygon
جنس طير من الطرقونيات للسلقات. انواعه عديدة
جميعها من الحشرات تشتمل تألف غابات واشراج البلاد
الحارة الاستوائية.

السديان . ساقه رفيعة ، متعصبة ، معتلة الجرم ، غيراه
الذين . نكتة فائضة ، مستديرة ، قطرها نحو ١٠ سم .
لونها الى الصبغة للسرار السفاه الموج . اطرافها الى
الصبغة الوردية الموج || لحيتها جيدة الصنف ، مرغوب
فيها .

١٧١٨٩ - طُرْمُوسُ
Mouton engraisé (F).
Fatten sheep (E).
هو أغروف السمين .

١٧١٩٠ - طُرْمُوسُ المَرْجُحُ
Longitarsus pratensis (S).
Longitarsus des prés (F). Longitarsus pratensis (E).

حشرة من فصيلة النصاريات . موطنها بعض الالام سويس
البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . تألف
المرج والاراضي وضايف مجاري الماء . خنافسها تعيش على
اوراق النباتات التابعة لفصليتي الفريسيويات والحمصيات
ولا تصف من السرق والخوض . يرقاتها تعيش في التربة على
جلود البزاق المائل || جسمها صغير القد ، شبه بيضي
للشكل ، بطول من ٢ الى ٣ سم . قريبا الى الجلود يطولها
موج اشجع . رأسها مستعرض الجرم ، اسفليها الملمع .
زباناها خيطيان مقوسان || لها جيلان في الحول . تخرج
الحشرة الجبلانة من مكمنها في اواخر نيسان . تصاف بهد
ظهورها باسويين وتهاجر مع المكان بعد الكرم يبينين ،
تنتفن من التربة وترز للمكن قرب استاخ ويظهر النباتات
المائل || البرقة منه تغدق كتوبه نحو جلود النبات فتنتفب
الادمة وتلج الى الداخل ، قريبا المصاراة والعلما النباتية .
وتبقى حتى اكمال طورها البرقي اي نحو ٣٠ يوما ثم
تلتصق الى التربة وتدخل في طور الاكمال . والبرقة عند
بلوغها الادراك بطول نحو ٥ سم . جسمها حنطي اللون ،
اسطواني الشكل ، رأسها اسود || اما خنافس الجيل الثاني
فيئاتها الشوي ينسر حتى يبين زين النشاط ويكون ذلك
في اواخر نيسان .

١٧١٩١ - طُرْمُوقُ
Vespertilion (F).
هو الخفاش ، اطلبه .

١٧١٩٢ - طُرْمُودُ * ، طُورْمُوسُ *
Torymus (S). Toryme (F). Torymus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطريدنيات . انواعها المعروفة
نحو ٢٥ اصنافها الاقاليم الحارة والمتلة الحارة || جميعها
ناقة تتطفل على الحشرات الضارة اخصها الابرار ||
اجسامها صغيرة بطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها مخروطية
للشكل . كولعلها معتقة . بطولها فضية . مرزاتها دقيقة
مستطيلة . اولؤها مختلفة الالوان ، لامة .

١٧١٩٣ - طُرْمُودِيَّاتُ *
Torymidae (S).
Torymidae (F). Torymidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المضمورة .
انواعها عديدة . اصنافها الاقاليم الحارة والمتلة الحارة .
جميعها ناقة تتطفل على الحشرات الضارة || حشراتها صغيرة
القد وعصاة بطول من ٢ الى ٧ سم . اجسامها نحيلة ملونة .
رؤوسها مستعرضة . زباناها صولبانية . قوللها طويلة .
مرزاتها لاقامية الجرم منها القليلة منها الحارقة الطول ||
اشهر انواعها الطريد والديبور والجمبرية .

١٧١٩٤ - طُرْمُودِيَّةُ
Tornella (F).
هي الشرس نبات من القلقليات ، اطلبه .

البنفسجي السابق تملو حاجات فراوح من الاترق الى
الاسود . ثوبه السفلى الى الخيطي الاسمر . منشفه الليل
كبير القند طوله نحو ١٨ سم . || لحمه متوسط الصنف ،
مأكول .

١٧١٨٠ - طُرْمُودُون مَبْدُولُ *

Tryon pastinaca (S). Pastanagae communis (F).
نوع من الطرودون يكثر وجيده في المحيط الاطلسي . طوله
يما فيه اللتب نحو ٢٠٠ سم . ثوبه العلوي الى الشقة
السرارة الناعمة . ثوبه السفلى الى الخيطي الاسمر . منشفه
التليل كبير القند ، حاد الطرف ، طوله نحو ٢٠ سم . ||
لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٨١ - طُرْمُودِيَّاتُ *
Trygonidae (S).
Trygonidae (F). Trygonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفغيات الاطلاق . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مفترسة وريدة . مرئها
الايخار واغوار الشطوط || اعرف اجناسها واشهرها الطرودون .

١٧١٨٢ - طُرْمُ * ، طُرْمُومُ
Rayon de miel (F).
Honey comb (E).
الفرم والفرم هو الشهد من العسل .

١٧١٨٣ - طُرْمُ * ، طُرْمُومُ
Rayon (F). Ray (E).
هو شعاع الجلود والجدوع .

١٧١٨٤ - طُرْمُومُ مَكْنَاكِي
Rayon médullaire (F).
Medullary ray (E).

صفائح مرشمية شعاعية الشكل تنطلق من محور الساق
او الجذر الى المكالك والخشب والكثير .

١٧١٨٥ - طُرْمُومُوزُ
نعت تعريفي يطلق على الفرس الكرم القراع .

١٧١٨٦ - طُرْمُومُ *
Ommatostrophes (S).
Ommatostrophes (F).

الواحدة طرمعة . جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات
وفصيلة الطرمحات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم
بحار العالم || اجسامها كبيرة القد وشبه الشكل تنتهي
بزمانف رمية . رؤوسها مستطيلة . حويها كبيرة ،
جاسطة . رمية متفترقة . ثمانية من جزامها محبة متساوية
الطول واثنان مستطيلتان تنهان برسي ستانية الشكل ||
تتميز بشدة اليابس والنشاط وبالقفر فوق سطح الماء حتى
ان ينفشها يقع على سطح المراكب || اشهر انواعها
طرمعة كولانتي (Omm. Cloandesi) التي يكثر وجيدها
في البحر الابيض المتوسط .

١٧١٨٧ - طُرْمُومُحِيَّاتُ *
Ommatostrophidae (S).
Ommatostrophidae (F). Ommatostrophidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات ورأسيات
الاريل ، مزدويات الخياشيم ، حشريات الجرامز .
اجناسها المعروفة قليلة العدد اما انواعها فكثيرة جميعها
يحية لا تقرب للشطوط . ملجها الحياتي جماعي ، اسرارها
تد بعض اللات || اعرف اجناسها واشهرها الطرمع .

١٧١٨٨ - طُرْمُومُوثُ *
Pluteus cornutus (S).
Pluteu couleur de cor (F).

طرمماكول من فصيلة القارديقيات . يكثر وجيده في
النباتات الجبلية . يعيش على رويات الاشجار المبررة اخصها



طردون مبدول



طرمع



طرموت



طرموش المروج



طرميد



طريشون الصافي

1٧٢٠٦ - طريق أشهب
Trigla milvus (S).
Trigla milva (F).
نوع من الطريخ يطول من ٥٥ إلى ٦٥ سم. ثوبه ال
للشبة القفصية يطول موج وودي يتخلله شيء من الاصفر
والأخضر .

1٧٢٠٧ - طريق رماندي
Trigla gurnardus (S). *Trigla gurnardus*, *Gronidia*
gris (F). *Gournard*, *Gurnard* (E).
نوع من الطريخ يوجد في جميع البحار أما يكثر في الترسد
وعلى الشواطئ الاطلسية الاوربية والاثرية || يطول
نحو ٦٥ سم. ثوبه الى الربة القفصية يمتد مع اقترابه
من فوج الظهور ويبيض منه البطن .

1٧٢٠٨ - طريق صبور
Trigla aspera (S).
Trigla rude, *Cavallion* (F).
نوع من الطريخ الصغير القند يطول نحو ١٢ سم. ثوبه
الى الصفرة المرجانية الزاهية يزيد احمراراً مع اقترابه من
الظهور ويصفر نحو اليافس الاكبر منه البطن . يوجد
في جميع البحار .

1٧٢٠٩ - طريق كير
Trigla corax (S).
Trigla parlon, *Perlon*, *Perlan* (F).
نوع من الطريخ يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى الربة
القفسية السراء اللحية . يسكن منه الظهور ويبيض منه
البطن . يكثر وجوده في المحيط الهادي .

1٧٢١٠ - طريق مرجاني
Trigla cucullus (S).
Trigla morruda, *Gronidia barbarin*, *Orgus* (F).
نوع من الطريخ يكثر في المتوسط يطول من ٢٠ الى ٢٧
سم. ظهوره الى الحمرة المرجانية . جانباه ويك الى اليافس
الاصفر اللؤلؤ .

1٧٢١١ - طريق متمش
Trigla lineata (S).
Trigla Imbrigo, *Surmulet sans barbe*, *Camard* (F).
نوع من الطريخ يبلول في جميع البحار يطول من ٢٥ الى
٣٥ سم. ثوبه الى الحمرة الجوزية اللامعة تعلوها نمشة
سوداء .

1٧٢١٢ - طريق غياني
Triglide (S).
Triglide (F). *Triglide* (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة الشبليات الشاككة الزعانف.
اجناسها وانواعها عديدة اعرفها واشهرها الطريخ والجبلنج .

1٧٢١٣ - طريق
Rameau de moins d'un an (F).
الطريخ هو العريون قبل ان يبلغ الحبل .

1٧٢١٤ - طريقلا
جلس اسماك بحرية تدعى الطريخ .

1٧٢١٥ - طريق
Courlis malle (F).
Carlew malle (E).
هو الكروان الذكر .

1٧٢١٦ - طريق
Voie (F). *Way* (E).
طريق ج طرق . كلمة شاملة تشمل في عدة معنى اشياء :
Voies de recours (F).
طرق الملن
Voie (F).
طرق المواصلات
Voie de droit (F).
طرق وقانونية
Voies et moyens (F).
طرق واساليب
Voie d'excusation (F).
طريق التفسير
Voie classée
طريق تنظيمية

1٧١٩٥ - طريكة ليد يلدك
Tornelle délicate
هي الشمس القليل للأكل آثار ، اطليه .

1٧١٩٦ - طريكة
هي البليط ، اطليه .

1٧١٩٧ - طريشيا
Trenschalla
جلس فطور مجهرية يعرف بالصفحة ، اطليا .

1٧١٩٨ - طريشيل
هو جود الشمس السوي ، اطليه .

1٧١٩٩ - طريشون الصافي
Chrozophora tinctoria (S). *Chrozophora tinctoria*.
Chrozophora tinctoria, *Croton des teinturiers*,
Maurelle (F). *Turnesola*, *Dyer's litmus paper* (E).
Turnesolpflanze, *Färber-Kroton* (D). *Turnesole*,
Girasole (I).
نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة القريزيات ، اطليه
موسس البحر للتصود ، يذهب في الربة الجيدة التركيب
المختلة الانساج . زراعت تتطلب بعض الناية الخاصة
كالزرق والتشيب بعد التفتيح || يستخرج من سوكه
منه الاضرار ويعد لعلها ومحقها صارة صباغة شامة
الاستعمال الصناعي .

1٧٢٠٠ - طريكة
Torula, *Torulée* (F).
جلس فطور مجهرية من الفطريات وفصيلة الطحيات .
مشبه مؤثر التركيب . جربه الكنديية سببة الانساج .
انواعه عديدة تعيش على ماء الانسان اليابسة والارواح
المتارة على الخضوض ولؤلؤ البضوية البائرة الى الانحلال .

1٧٢٠١ - طريكة
Torreya
شجرة حرجية من القسوسيات تعرف بالوطوق ، اطليه .

1٧٢٠٢ - طريكة
Lithodorus (S).
Lithodorus (F). *Lithodorus* (E).
جلس حيوانات بحرية من الرخويات فصليات الخياشيم
وفصيلة الميديات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٢
منتشرة في معظم بلاد الحارة والمختلة الحارة ||
اصنافها شبه اسطوانية الشكل متراكبة الصفحات للملحمة
بمشاد آدمي . اجسامها فسفورية مشعة || تعيش في اول
مهددا لاصقة بالصخور للمفورة ثم تتحدر من قيعها
اليقني فتشطب احصل الصخور وتعيش في الانفاق التي
تخلدها .

1٧٢٠٣ - طريخ
هو الفرس ، اطليه .

1٧٢٠٤ - طريخ ، طريخلا ، جرياني
Trigla (S). *Trigle*, *Gronidin* (F). *Gurnard* (E).
جلس اسماك بحرية من فصيلة الطريخيات . انواعه نحو ١٥
منتشرة في جميع بحار العالم . رؤوسها كبيرة مسطحة ،
هزينة للشكل . اجسامها مختلفة الاجسام تطلو من ١٢
الى ١٠٠ سم . زعانفها كبيرة شاككة لاقطية . انثياها
متراكبة الالوان الزاهية . فويها ماكولة ، مستعمية ،
جيدة الصنت || اشهر انواعه ما يلي .

1٧٢٠٥ - طريق آخر
Trigla pini (S).
Trigle pin, *Rouget rouge*, *Trigle hirondelle* (F).
نوع من الطريخ ، يبلول في جميع البحار ، يطول من ٢٥
الى ٣٠ سم. ظهوره احمر اللون . جانباه الى الودي الزاهي .
يعد اغبر الين .



طريخ

الجذور المتحرة تنقص عليها وتتركز بين الجرادة والاليف الخشبية حيث تتابع نشاطها الجوي وعملها التخريبي الذي يؤدي النبات لانه يمتلأ الاوعية ويمنع التبادل التنفسي || يكافح بالتلاصق النباتات الموسومة ويظهر التربة بالكلس الحراق او بلفور الكربون.

Tazard (F).

١٧٢٢٦ - طزور

مكة بحرية تسمى اسفري طراز ، اطلها .

Véranda (F).

١٧٢٢٧ - طزور ، فوكندا

Veranda (E).

١٧٢٢٨ - طسك ، طسك ، تكسك

Taxe, Contribution (F). Tax, Impost (E).

الطسك : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على الارض . وكسب عمر الى صان ارفع الجزية عن رؤوسها ونحو الطسك من ارضها . وقيل شبه الخراج له مقدار معلوم (السان) .

١٧٢٢٩ - طسل

هو الماء الجاري على وجه الارض وهو التراب البقيق الناعم ذو قوة السراب .

Géotropisme (F).

١٧٢٣٠ - طسم

Geotropism (E).

اثر الجاذبية الارضية في انحناء النمو النباتي . وهو يندعي ايجابياً اذا كان متجهاً نحو مركز الجاذبية الارضية وسلباً اذا اتجه ابتعاداً ماعاك .

Desman (F).

١٧٢٣١ - طسمان

جنس حيوانات حاشية من فصيلة البريديات . يألف ضفاف الأنهار والبيمرات ، قوته الحشرات المسالية والاسماك الصغيرة . له نبيان طمان المسك وطمان الجبل .

١٧٢٣٢ - طسمان المسك

Myogale moschata (S). Desman musqué (F).

Musk-rat (E).

نوع من الطمان موطنه فسح الارياء يمتد من بحر ارال الى بحر قزوين وإلى ضفاف بحر البندر . وهو يشبه الزبابة لكنه يجمع السنجاب الكبير . صخر الين . فاسر الفراء . مستطيل الخطم والذنب . يعمل عند قلعة ذئبه خلد مسكية للمادة القوية المرف . قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . يعيش في نفق يخلده على مستوى الماء .

١٧٢٣٣ - طسناج

Spheniscus (S).

جنس طير من طيور الريش ، كفيات القدم ، وفصيلة الطسناجيات . انواحه المرفقة قليلة العدد موطنها القطب الجنوبي . اجسامها تقطع من ٦٥ الى ٨٠ سم . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . مناقبها جاسلة ، مبطلة ، متعددة الافاك الملياة انشابة المبدودة الخواقي . اجنتها مجنافية الشكل ، حشوية الريش . اذنتها جداد كفس || تدن في اخاصيص متدلة المسك . انائها تبيض وتكفن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع || قوتها الاسماك والقشريات .

١٧٢٣٤ - طسناجيات

Spheniscidae (S).

فصيلة طيور بحرية من طيور الريش ، كفيات القدم .

Voie privée (F).

طريق خاص

Voie publique (F).

طريق عام

Voie de fait (F).

طريقة التفت

١٧٢١٧ - طريق البحر ، طريق السحب

Chemin de halage (F). Towing-path (E).

هي الطريق المصفاة حذاء النهر او القناة المصفاة لاجلحة وهي يجرز استعمالها لجر المركاب او سحبا .

Chemin rural (F).

١٧٢١٨ - طريق ريفية

Rural road (E).

كل طريق في الريف تربط للمساكن والقرى ببعضها بعض .

Chemin agricole (F).

١٧٢١٩ - طريق زراعية

Agricultural road (E).

كل طريق يمر بين الاراضي الزراعية او تربطها ببعضها بعض .

Méthode (F).

١٧٢٢٠ - طريقة ، منهج

Method (E).

هي الاسلوب المفروض اتباعه في شئ معين . كذلك طريقة الاستيثار والاستغلال او العمل .

١٧٢٢١ - طريقة الحدف

Méthode de réduction (F). Method by reduction (E).

١٧٢٢٢ - طريقة سيكية

Méthode saccagéniale (F). Saccagénial method (E).

Système décimal (F).

١٧٢٢٣ - طريقة عشرية

Decimal system (E).

Système métrique (F).

١٧٢٢٤ - طريقة مقترية

Metric system (E).

هي طريقة للقياسات المترية .

١٧٢٢٥ - طريق

Armillaria mellea, Armillariella mellea, Agaricus melleus, Rhizomorpha intacta, R. subcorticalis, R. fragilis (S). Armillaire de miel, Pourmid-agric (F). Root-rot honey agaric (E). Hallimisch (D).

فطر من الفاريفريات موطنه فسح الارياء ، يركب الجذور فيقطنها . يصيب من الاثمار الحرجية السديان والزان والقرنم والبيروا والحور والاكسبا والسنوبر والنبوت والارديس . ويصيب من الاثمار المشرة الكربة والحوو والمشمش والدلائن والكرز والقطيع والاباس والجوز والحشويات على اختلافها ثم للوز والبرت والين والشاي والكاكاو والكنيا والمطاط . ويصيب ايضاً بعض النباتات الزراعية والفريضة كالملطاط والفلقاس والابزر والاضاليا والدرجس والوزام || مظهره الخارجي في دوره الفطري الصحيح : فطر طويل الساق النيلية الاسطوانية ، اوسمه قطنسوة الشكل ، دقيقة الحافة المنكسرة الى الداخل ، ظهرها نحو هـ م . قوتها اصفر صلب يعلو مروج زني . لباها جبانة الملقط ، ابيض اللون مر الزراق . وهو من الفطور الماكولة . مردود تلعيب مع الفل || يظهر في الخريف ويؤدم حتى اوائل الشتاء . يركب للمواد الصخرية والخشبية المنحلة على الجفوع والاشخاب المظروسة ارضاً || وهو في دوره المشعبي يتبعث بيرة مفطلة حديدية الاطراف ظهرها نحو ١٢ م . لونها الى البسرة ، تنفلق من خيوط كتلية مستطيلة تسرح في التربة المسطحة الى ان تلتقي



طريق



طمان المسك



طسناج

1٧٧٤٣ - طَعْمِيَّة Agraine, Agrénage (F).

نثر الحب في مواقع معينة لتجذب عليه الطير فصاد.

1٧٧٤٤ - طَعْن، وَجُوع، إِلْجَاء Recours (F).

Recours (F).

في الالتجاء الى السلطة المسمول على القائد حكم أو تمليك

أو تقصير أو إعادة بحث.

1٧٧٤٥ - طَعْنُ الشُّهُود Reproche de témoins (F).

Objection of witness (E).

وسيلة يتلوع بها احد المتخاصمين ليلجئ بشهادة شخص معين.

1٧٧٤٦ - طَعَام اربال الطير والسباع.

1٧٧٤٧ - طَفَر

الطفر طائر. ج طفران (السان).

1٧٧٤٨ - طَفْمُوس Gorilla (F).

هو الغورل، أظليا.

1٧٧٤٩ - طَفْمُوسٌ مُعْتَمِيَّةٌ *، سَمَكُفُورَةٌ مُعْتَمِيَّةٌ

Cymbalophora pudica (S), Cymbalophora pudica (F), Cymbalophora pudica (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض مناطق حوض البحر الايئش المتوسط.

لرأشتها جارية قتها رحيق الازهار. مرتبها خاصة قتها

حصفت التنبيلد || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م.

بسطها نحو ٤٤ م. رأسها غلوري للشكل، عيناها

كبرتان باقنيتان. زباناها مطببان. مؤلفها مستطيل.

حبشها حطلي اللين. بطنها الى الخلفي الاحمر المراج ||

رؤشها الاسمان الى الياض التي يملو بضع وتجمع

كسنت. رؤشها الخلفيان الى الياض الوردية المراج

يملو تقيج كسنت || لها جبل واحد في الحبل. تظهر

لقراشة في حزيوان وثبي حتى أب. تسرح في الليل.

تتأكل بعد ظهورها بنحو اربعة أسابيع وتتمتع الممكن على

الصفحات الغلل من لصال الأوراق || السرعة طول نحو

٣٠ م. جسمها انوبي للشكل، ايد اللين، سم المراج

تلو مجعوبات متفرقة من الحلب الاسود الانتشاب،

الحطلي الاطراف. رأسها اسود. معها ورواجها الى

المرادى || طسود الاكمال ينسمر نحو اربعة أسابيع

ويتنقي فمن صلبة تحبها السرعة في شقوق الحاء أو

تحت القشور.

1٧٧٥٠ - طَفَف، طَفَاف، طَفَاحَة

Excédent de mesure (F).

1٧٧٥١ - طَفَف

الطفف هو منع الجبل وساحل البحر ج فلوب.

1٧٧٥٢ - طَفَا Emerger (F). To emerge (E).

برز على سطح الماء.

1٧٧٥٣ - طَفَكَر *، طَفِي الوَعْر

Oreotragus sauteur (S), Oreotragus sauteur (F), Klippbock, Klippspringer (E).

حيوان لين يجتر من القاء وسيد الجنس والزوج. موطنه

ينته من الحيفة الى كنية اولفندا ورويديه. يألف

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، أصلها التقلب الجنوبي || ملجئها الحبال جامي تمشي معظم حياتها في الماء ولا تألف الجزر الا في زمن القساة والبرسيم || قوتها الاسماك والقشريات || أشهر اجناسها الطنجان.

1٧٧٣٥ - طَسِينَةُ الشَّكَّان *، نَارِيَّةٌ شَهْبَاء

Cryptoblabes gnidiella (S).

Pyrale grise, Cryptoblabes polyphage (F).

Cryptoblabes gnidiella (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الكاربات حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض المناطق الشرقية من حوض البحر الايئش المتوسط.

تألف يساتين الليمون وسنائل البذران والمطوق التي

يكثر فيها الشكَّان، فراشتها عجيبة تمشي على غزونها

الاسمان، مرتبها نائمة تمشي على بشرة ثمار البرتقال وصل

اوراك الدراق والكرية والمثنان || جسمها صغير قصيف

بطول نحو ٤ م. بسطها تراوح من ١١ الى ١٣ م. رأسها

ممتلئ الجرم، قصير الخطم. عيناها كبرتان، نافذتان.

زباناها عظيمات. طساعها دقيقان. مؤلفها جعدة.

حبشها وبعثا الى الشفة || رؤاشها الى الشفة يملو

مواج ثبي وخار اسم || لها جبلان في الحبل. تظهر

قراصة الجبل الاول في ايار بقراصة الجبل الثاني في آب.

تسرح في الجبل وقبيت في التبار || السرعة، عنه بلوفاها

الادراك التام، تطول نحو ١٠ م. جسمها شبه اسطواني

الشكل، مستطيل القدم والمخسر. ثوبا الى السرعة الجلوية

المراج يملوها عطان جانبيان، قاطبان، شديدة السرعة.

رأسها اسود. معها ورواجها الى الحطلي الاسمي || طرد

الاكامل في الجبل الاول ينسمر نحو ١٥ يوما وينسمر

في الجبل الثاني نحو ٢٨ اسبوعا ويتنقي فمن صلبة

تسجها السرعة بين شقوق الحاء أو تحت القشور.

1٧٧٣٦ - طَعَامُ الْأَرْتَب Phagnale (F).

هو الحلبي، أظلب.

1٧٧٣٧ - طَعْمَلُورٌ

Tolypasporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة افراشيات. بنوره

البوية لاقامية الشكل والحجم. طباله حشوة لامتجانسة

تغلغل عنه بلوفاها من غيرات حبابية لوبا الى السرعة القائمة.

1٧٧٣٨ - طَعْمُ

Goût (F). Taste (E).

هو ما يؤذي اللزق من تصنيف لكل ما يدخل الفم.

1٧٧٣٩ - طَعْمُ

Appât (F). Baie (E).

كل ما يوضع من طعام لاجتذاب الصيد من طير أو سمك أو دسحش.

1٧٧٤٠ - طَعْمُ، مَطْعُومٌ، هَرَبٌ، قَلَمٌ، هَرَلُوف

Greffon (F). Greff (E).

هو جزء النبات المطلوب تكثيره والند للاهتمام بالعلم.

1٧٧٤١ - طَعْمُ الْمَرْدُوعِ، نَطْلُ

Goût de merroi (F). Native tang (of wine), Raciness (of style) (E).

علم خاص، يعود الى التربة والمخ، يكون في بعض

الحاصلات كالنبيج والنب وما اشبه.

1٧٧٤٢ - طَعْمَكَة

Production (F). Product (E).

هي ما تنتج من محصول.



طَيِّعَةُ الشَّكَّان



طَفْمُوسَةٌ مُعْتَمِيَّةٌ



طَفَر

Hydrargyris (F).
Hydrargirim (E).

١٧٢٦٢ - **ملقح زئبكي**

تسم بالزئبق .

١٧٢٦٣ - **ملقح وزدي**

هو الحماي مرض جلدي ، اطله .

Electrophanes nivale (S).
Electrophane des neiges (F).

١٧٢٦٤ - **ملقح الثلج**

طائر من الجوارح غروبيات المناقر وضفلة غروبيات . موطنه يمتد من بلاد القطب الشمالي الى حوض البحر الابيض المتوسط ذلك لانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق والصيف والمشتى . ملجته الحياطي جماعي . انجواحه تد بضعة الاف . قوته البزور والحشرات || جسمه صغير اللقد بطول من ١٧ الى ١٩ سم . ثوبه الشفوي يكثر فيه البياض وتقل فيه النقطة والسمرة . ثوبه الصيفي يبقى حل البياض الصنابي الموج في الزور والصدر والبطن والاذنيك . اما الرأس والحشران والرداء والسقطان والذنب قال الشقعة المتباينة الماجات والمطوقة بالابيض . سقطاء ذلقان . ذنبه فارغ الطرف || يدخن عنه بين الحشرات وفي تخاليف الصخور . الاثني قطع من ه الى ٩ يبيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٢ يوما .

Mutation

١٧٢٦٥ - **ملقحة**

تبدل فيالتي يحصل في وثل وسلة وراثية . راجع اختباه وشرو .

١٧٢٦٦ - **ملقح**

زين احمرار الشمس قبيل الغروب .

Argile (F).

١٧٢٦٧ - **ملقح**

هو التصلب ، اطله .

Tendre, soyeux (F).
Tender, Silky (E).

١٧٢٦٨ - **ملقح**

الفلل : الرنص التام من كل شيء . ج . طفال ومفلول .

Cotyledon (F). Cotyledon (E).

١٧٢٦٩ - **ملقح**

هو الافران نبات عشبي ، اطله .

Emerson

١٧٢٧٠ - **ملقو ، ملقو**

Herbe tendre (F).
Tender herb (E).

١٧٢٧١ - **ملقوة**

الطرق : لبت الرقيق .

Paralique (F). Paralic (E).

١٧٢٧٢ - **ملقوي**

تست قريفي يطلق على كل ما له سلة بالطن اي بسائل البحر .

Echis (S). Echis

١٧٢٧٣ - **ملقبة**

جنس حيات خفية من فصيلة الافيات الانوبيات الاعايد . انزلها مدينة جيهما من اقاعي البلاد الحارة . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبا الى الصبغة السوداء تملو رقشة يضاء وضبان اسودان اوا ابيضان متعرجان . وبصفا حنلي الثوب الابلق ، مطوق البق || اشهر انواها الطنية الحرة وام الطفيتين وضد الجوز والأردب .

التجاد الرقبة التي تملو من ٢٤٠٠ الى ٢٧٠٠ م . عن سطح البحر . ملجته الحياطي جماعي . إجله يتألف من ثلاث الى اربع اناث ومن ثلاثة الى اربعة شواذ يقودها ذكر مانع . قوته اوراق السط والاعشاب المختلفة . يسرح في طلب القوت من الفجر الى الساعة التاسعة ومن العصر الى الشاء ولا يرتاد الماء الا بعد المشاء . سميه بقر وساء || جسمه قريب الشبه من الشبوة ومن الرم . طوله نحو ٨٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه نحو ٥٦ سم . وطول قرن الذكر نحو ١٠ سم . اما الانثى فحياء واسه مستعرض الجبهة صغير الخطم . اذناه متصبتان . عيناه كبيرتان كستيتان . قرناه غروبيان جبالان . جماريه الضمعية جلوة الرافض . جرماء شديدة التلشط . ثوبه يتغير مع فصل السنة الا ان اللون السالك هو الصبغة الموحدة بالاسود . بطنه دائما ثوبي القرن اصفر المواج || الاثني تحسلي ثوب الذاكر وبني ثنائية الخلف . تقف شادنا واسدا قترهه نحو ثلاثة اشهر .



ملقاة

Zamenis (S). Zamenis

١٧٢٥٤ - **ملقاة**

جنس حيات من الثعابينات . انواها مدينة منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها طوال دقائق تطفر بين الصخور وورق الكرام وفي للاء . اطولها تراوح من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . قوتها الامساك والضفادع والوزغ والظاظ . الخ .

Podocnemis (S).

١٧٢٥٥ - **ملقاة**

Podocnemis (F). Podocnemis (E). جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاشيات . انواها المعروفة عشرة . اعطائها بعض مناطق امريكا الجنوبية وجزيرة مدغشكر . تألف الانهر والبييرات والقنارات والمنتاق || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة ويطوي والكبيرة . الصغيرة تقبل نحو ٣٠ سم . اما الكبيرة فطول من ٧٥ الى ٩٠ سم . ثولها الى الكلبة السوداء . ذابها شمكة . قليلة الاحادياب . يصبغة الثورن . زعانها منبسطة مسطحة تحت الدبال . رؤوسها مكرسة . اعناها متصلة الطول والغلظة . اخناها قصيرة . قوتها شديدة التلشط ، غلبة الخالب الامامية ، رباعية الخلفية .

Parélie, Parhélie (F).

١٧٢٥٦ - **ملقاة**

Parhelion, Mock sun (E). الطفالة صورة الشمس متعكسة في سحابة .

Immaturité (F).

١٧٢٥٧ - **ملقاة**

Immaturity (E). حالة الشيء غير الناضج . الملاق الحاضر في معظم الآبار دليل الطفالة .

Carne (F). Ring (E).

١٧٢٥٨ - **ملقاة**

البائرة الطالرة في مقطع جلع الشجرة .

Lave (F). Lava (E).

١٧٢٥٩ - **ملقح**

ملقح ج . ملقح . هي حم المادن للصهورة اللابة التي يثلف بها البركان عند ثورانه .

Débordement (F).

١٧٢٦٠ - **ملقح**

Overflowing (E). سيلان الماء خارج مجراه .

١٧٢٦١ - **ملقح النزو**

هو البثار ، اطله .



ملقاة

١٧٢٧٤ - **طَفَيْفِيَّة حَرَّة** * Echis echis,

Echis vulgaris (S). Echis commun, Vipère des sables (F). Echis (E).

حيمة سرلودة من الاتامي اثيوبيات الاغانيه. جسمها مدلل الكثافة بطول نحو ٨٥ سم. ثوبها الى الصبغة الخفيفة متلويا ورقية يضاء غنيقة ونضلات اسودان متبرجان. راسها لوزي الشكل. عظامها مسطحة الجرم. عيناها خرزيتان، انثارتان. منقحها رافضان مرتفعان نحو الملاذ. عدد اسنانها ٤٨ منها ٢٤ في كل فك. عظامها اماميتان متصركان || تسرح في الليل وفي النهار. تنس في الليل والتراب يصره. قوما كل ما دب بطار وتمكتت منه || يبابها الشوي يستمر نحو حة اشهر. تبلغ كامل نموها بمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة || الاثني تساند بمر اربع سنوات. جرابها الشواري يحوي من ١٢ الى ٢٠ بيضة. يتفك البيض منه خروجه من الانطوية الى الجراب ثم يسلك الشوار حتى الفلج حيث يخرج لقاء النور جوارن كاملة البنية سارسة || لفتها غمة ان لم تملع بصره وقد تكون قاسية اذا اصابت احد الشرايين الدموية || تعبر من التامين السامة المهيبة الشديدة الاثني.

١٧٢٧٥ - **طَفَيْفِي، مَعْقَل، هَيْكَن** Parasite كل كائن يعيش على ما هو سي من النبات او الحيوان.

١٧٢٧٦ - **طَفَيْفِي بَاطِي، اَنْتْفِيَت** Entophyte لمت تعريبي يطلق على الفطور المهيبة الفطرية التي تعيش داخل النبات المبتلى بها.

١٧٢٧٧ - **طَفَيْفِي ظَاهِرِي، اِنْتْفِيَت** Ectophyte تمت تعريبي يطلق على كل طفيلي ينمو على ظاهرا الاعضاء النباتية او الحيوانية.

١٧٢٧٨ - **طَفِين** Immature تمت تعريبي توصف به الثآليل والبلور غير الناضجة.

١٧٢٧٩ - **طَقْ** * Tockus (S). Tock (F). Tockus (E). جنس طير من فصيلة الاركيبات. اناؤه قليلة البند، جميعها من الطيور الافريقية. اجسامها كبيرة لينة متليها غليظة، محببة، مسنة الكفاف، تتميز بتلويا من التندوات القرنية || يألف الصيص والقنابات والاحراج. قوته الثآليل والبربور والبلور والحشرات والعطاء والفئران || اعرف انواعه الطن الاخر المتفاد.

١٧٢٨٠ - **طَقْ اَحْمَر المَتَفَاد** * Tockus erythrorhynchus (S). Tock à bec rouge (F).

نوع من الطن. اطناؤه تمتد من الحيشة الى السنابل. جسمه كبير لينة بطول نحو ٨٥ سم. متفاد غليظ القاعدة مغوس الشكل، مسن طفاظ الخطل الاحمر، احر اللون. اسمر اللطخ || يألف الفياض ومغلاف الاجهر. طيراته يديه المهي متقطع الشوط كالنقار || قوته الثآليل والبربور والحشرات والورع والعطاء والفئران || يذئ في تجاويف الجبلوع. تضع الاثني من ٤ الى ٥ بيضا تحضنها نحو ١٥ يوما بحجور عليها بالطين واقتش على غرار البقير والخنو.

١٧٢٨١ - **طَقْسُون** Taxus (S). W (F). Yew (E).

جنس اشجار حرجية من الطقسونيات السنوريات. يقال انها تضر نحو ٣٠٠٠ سنة. اناؤه وضروبه عديدة. اشجارها متفاداة القدر تمل من ٥ الى ١٥ م. اجسامها وضروها منتصبه تقبل التقليل والتقليم. اوراقها متضاربة، ثنائية الصف، شديدة الخضار المايك، لامة الصفة العليا، وهي جمالية للامة ثبات الناس والجل ولزينة القبر والمناظر والفسان. ثمارها غنية الشكل، محبة اللحم، مدامة المذاق السامة. اشعاشها صناعية جبهة الصف، ناعمة اللمعة، قوية الالذخ والورب، لونها الى الجورة المسنية بالاسمر. شكرها ابيض اللون قليل الباك.

١٧٢٨٢ - **طَقْسُون عَادِي** * Taxus baccata (S). Il commun (F). Common yew, Yew tree (E). Echta Eibe, Ebenbaum (D). Tasso, Libo, Livo, Albero della morte (I).

نوع من الطقسون الجبلوع غيرة تمل من ١٢ الى ١٥ م. ضروبه عديدة جميعها بطيئة النمو الا انها تحضن مختلف طرائق التثقيب الذي يجعل منها شئ الاشكال الممكن انسجامها مع الحظوف والمكان.

١٧٢٨٣ - **طَقْسُونِي** هو التكميديم، اعلمه.

١٧٢٨٤ - **طَقْسُونِيَات** Taxinées, Taxodinéas (F). سبط من فصيلة السنوريات يشمل الطقسون والطوق والشنخ والسيلق.

١٧٢٨٥ - **طَقَطَق** هو الاربل، اعلمه.

١٧٢٨٦ - **طَقَطِيَّة** * Chectusia (S).

جنس طير من طوال الباق وصيلة الزرقائيات. اناؤه نحو ١٥ جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق وللصيف والشتي وقد تكثر الاثني في البلاد الحارة. اجسامها صغيرة لينة، رشيقة القوام. انثابها صغيرة. ظهورها وابنسيتها الى السرة. بطونها الى البياض || تألف النائق ويجاري الماء والمروج الفتاه. قوتها الموان والحشرات والفقشريات. تكثر في المناطق بين الاعشاب. الاثني تحضن وسعها نحو ٤ بيضات.

١٧٢٨٧ - **طَقَل** Sève (F). Sap (E). هو الشغ ونهم من غصبه بالتشع الحمايط.

١٧٢٨٨ - **طَقَل** Brume (F). Haze, Mist (E). قيل اخف المطر واضمه وقيل الذي يقبل وفيه نوب المطر. ج طلال وظلل.

١٧٢٨٩ - **طَلَا، طَلُو** Peon (F). Fawn (E). الصغير البمر من ذوات الظلف ج. اطلاد.

١٧٢٩٠ - **طَلَاة** Enduit, Vernis (F). كل مادة مائعة تستعمل طلاء.

١٧٢٩١ - **طَلَاة، طَلَاة، طَلَاة** Luette, Uvule (F). Uvula (E). زائفة لحية التركيب، خروطية الشكل، متحركة، ناضجة، توجبه تامة مثل الحلقوم.

١٧٢٩٢ - **طَلَاة** Habitus رسم هيئة الشيء او النبات الخارجية الطبيعية.



طَفَيْفِي حَرَّة



طَقْ اَحْمَر المتفاد



طقسون عادي



طَلَاة

1٧٣٠٧ - طلع الواسي *
Ixodes reduvius,
Hyalomma aegyptium (S). Tiquet du bétail,
Réduve (F).

نوع من الطلع الاسمر، المبط، البيضي الشكل، الصغير
القد. الذكر منه بطول نحو ٤ مم. والانثى بطول نحو
١٨ || يتغفل على جميع المواضع اعصابه الاقبار والاشنام
والجبال.

1٧٣٠٨ - طليحيات
Ixodidae (S).
Ixodidae (F). *Ixodidae* (E).

فصيلة حشرات من القرايات قوتها الدم تقتصه حيث
تستطيع. اجسادها وانواعها عديدة، جميعها صغيرة القد.
ذكرها اصفر حبيبا من اناثها. تتميز باخطائها الثابتة
للمسحة الفشارية التركيب التي تشبه في اجسام المواليد
التي تركبها. لذلك يصعب زرع الطلع من عائله دون
فصل جسمه حيث يبقى الرأس مع اجزاء الدم في جلد
المائل.

1٧٣٠٩ - طلع
الطلع: ما بقي في الحوض والدير من ماء كثرت فيه
التعاطيس لا سليل الى شربه.

1٧٣١٠ - طليحكم
هو القليل في ذروة يأسه ونشاطه.

1٧٣١١ - طليسة *
Botrytis

جنس تطور مجهرية من الطليسات. وظيفه الوطيات.
يتبين جميعه الميوز الاسطوانى الشكل، الطليق القطر،
اخلاوي او السطحي الانتساب. جزياره الكنديه منتصب
الجلوس، حديد الفروع العمودية الاوتكان. كائناته
طرية، متقوية او ضمية التجميع، يضيئه الشكل،
نحيلة الثلاث، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه كثيرة
العدد اعرفها وانهرها ما يتبع.

1٧٣١٢ - طليسة البعقل *

Botrytis squamosa (S).
لفظ مجهرية مركب اوراق البصل فيسبب يباس اطرافها
بمنه اعتضات لونها || يكالغح باستعمال بيسلفيت
الكلسيوم.

1٧٣١٣ - طليسة التوليب *
Botrytis tulipae (S).

لفظ مجهرية مركب اوراق التوليب فيؤذيها وقد يصيب
الشمراخ الزهري ليطعمه || مظهره المخاربي يقع صغيرة
شبه مستديرة وباعدي اللون تركب التعلل تقسب جفان
نسجه المتحارة || وهو حل الشمراخ الزهري ليطع متندرة
عديدة تشبه الاثمار به ان تسي الى مجعا || يكالغح
من ظهوره باستعمال بيسلفيت الكلسيوم وبطبيخ
التربة بالكر بولين.

1٧٣١٤ - طليسة الثوم *
Botrytis alli (S).

لفظ مجهرية يتري الثوم والبصل في اثناء سفلها. مظهره
المخاربي وشاح كيندي له التجميع، خلي الحية، اغبر
اللون، مركب اقراص اقنوم الثوم والبصل فيسببها || يدارك
باجتناب حفظ الثوم والبصل في الامكان الرطبة.

1٧٣١٥ - طليسة الدمية *
Botrytis galanthina (S).

لفظ مجهرية مركب السمكة عند انتابها من التربة
فيقتلعها ويؤلف اغبر اللون نقي الشكل يسطر على الازراق
فيقرسها بعد ان يؤثما يبشوره السود الكثيفة.

1٧٣١٦ - طلام، قنيز
Chénévris (F).
هو التوم اي حب الشامدنج.

1٧٣١٧ - طلايح
هي الاعراض التي تسبق المرض وتثير اليه.

1٧٣١٨ - طلايح
هي البواكير، اطليا.

1٧٣١٩ - طلب، عريضة، إلتباس
Requête (F). *Requête* (E).

هو كل مطلب يقامه صاحب ال سلطة تملك حق النظر
بقضية واجراء اللازم.

1٧٣٢٠ - طلب، دعوى
Demande (F). *Demand* (E).

هو ما يرميه الماوس حل المحكمة راجيا تقرر ويحب حق
له. ويأتي بمعنى الدعوى توما.

1٧٣٢١ - طلب الإلغاء
Recours en annulation (F). *Petition for annulment* (E).

هو طلب الغاء حل اداري.

1٧٣٢٢ - طلب إعادة النظر في القضية
Pourvoi en révision (F). *Petition for rehearing* (E).

هو طلب اعادة النظر في بعض القواعد القانونية لتثبت
من صحتها او في بعض الاحكام لالغائها.

1٧٣٢٣ - طلب قبول الإلتباس
Reconition (F). *Reconition* (E).

دعوى ضايتها نفس الحكم دون الالفاظ الى موضوع
الدعوى التي صدر عنها.

1٧٣٢٤ - طلب ما فوق الحق

Plus petit, Ultra petit (F).
هو الحكم ينير مطالب الجسم كان يحكم القاضي بشي لم
يطلب منه او بشي يزيد عما طلبه منه.

1٧٣٢٥ - طلب نقض الحكم
Pourvoi en cassation (F). *Appeal for reversal of judgment* (E).

هو الطلب بابطال حكم، صدر من محكمة الدرجة
الانتهائية، طعن فيه.

1٧٣٢٦ - طلة
Arôme agréable (F). *Agréable aroma* (E).

الطلة: النيلة من الروائح. يقال رائحة طلة وخر طلة.

1٧٣٢٧ - طلع

هو السط الصمغي، يخرج من النضار يرعاها الايل. الواسدة
طلع.

1٧٣٢٨ - طلع
hodes (S). *hode* (F).

جنس قراد من فصيلة الطليحات تتركه ادم الذي يمتصه
من الحيوان || اشهر انواعه طلع المواشي وطلع الكلاب.

1٧٣٢٩ - طلع الكلاب *
hodes ricinus (S). *hode ricin, Tique des chiens, Pou des bois* (F).

نوع من الطلع المبط الصغير القد. الذكر منه بطول
نحو ٣ مم. والانثى بطول نحو ٩ مم || يتغفل على معظم
الحيوانات الوحشية والداجنة اعصابه الكلاب والخيترات
فيتمسك دمها ويؤذيها.



طلع الكلاب



طلع المواشي



طليسة البصل



طليسة التوليب



طليسة الثوم

Tomocerus (S). * طُمُوسُر ١٧٣٤٨

Tomocère (F). Tomocerus (E).

جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة الطموسريات. أنواعه الممرقة قليلة البدن منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة محرشفة تعلو من ٤ إلى ٥ سم. ألوانها إلى الخشنى للباين الماجات. حراشفها إلى السرة المايقة الغضبية المواج. بطونها لامشوية التريجات ميسرة الحلب الذي يكثر في الخضر || أشهر أنواعه الطموس الميول (Tomocerus vulgaris) الذي يقيم تحت الحجارة والاشخاب ولبا الانجار الباسية.

Tomoceridae (S). * طُمُوسُورِيَّات ١٧٣٤٩

Tomoceridés (F). Tomoceridae (E).

فصيلة حشرات قافزة دامت من رتبة النكهليات. اجناسها وأنواعها الممرقة قليلة البدن منتشرة في بعض اقطار البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، محرشفة ، تعلو من ٧ إلى ٦ سم. ألوانها ملوكة ، يكثر فيها الخضاب السوي . رؤوسها مستطرفة . الحاكها وكثيرها ناشرة . عيونها زنجية . قرونها الاششائية رباعية الفصل ، مستطيلة . بطونها سدسية السكة اللامشوية العرض . اجنحتها القفزية نشطة وسليمة بمناس حادة . مكائنها مستطيلة مدنة ومهيدة . قوائمها معتدلة الطول تنتهي باظفار حادة || أشهر اجناسها الطموس .

Boue (F). * طُمِل ١٧٣٥٠

Loup (F). * طُمِلال ١٧٣٥١

هو الذئب ، أظله .

Eau bourbaise (F). * طُمْلَكَة ١٧٣٥٢

Muddy water (E). ما يني في الحوض من الماء الكثر .

Inerma (F). Thornless (E). * طُمْلُول ١٧٣٥٣

الطلول هو الباري . وهو من النبات ما كان سراً مسلماً لا زغب عليه .

١٧٣٥٤ - طُمَمّ - طممّ - نظم البطار : وقع على حصن .

١٧٣٥٥ - طُمِنّ - طمنّ من الارض : تسهل المنخفض .

١٧٣٥٦ - طُمِيّ - Alluvion (F). Alluvium (E).

هو ما يحمله النهر من تراب ويلين يتصلق باملاك المتاخين

عل ان لا يبلغ قلعة من ارض يضيئها الى ما بعدها في

سيله او الى ما يقابلها . ويعبر الطي ملكاً لمن لصق

بأرضه .

١٧٣٥٧ - طُمِيَّو * Cryptophytes (F).

Cryptophyte (E).

نمت تعريف يطلق على كل نبات ينمو تحت سطح التربة .

الكرم من النباتات الطرية .

١٧٣٥٨ - طُمِيلَة ، شِيكُو * Gymnocladus (S).

Gymnocladé, Chicot (F).

شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من الثنائيات وفصيلة

القرنيتات || ساقها منتصبة ، رفيعة ، عديمة الاثان .

اوراقها صغيرة النصال السنائية الشكل . اجزائها غمرية

كبيرة القند ، يضاء اللون ، غصنها المواج ، خافتة الورد

الطري . ثمارها حنابل متساكنة تلفت بعض البزور

الاعية المادة .

١٧٣٣٨ - طَلِيل

الحصير المنسوج من دود او من سف .

١٧٣٣٩ - طَلِيلِيْس * ، دَلِيلِيْس Tellinus (S).

Telline (F).

جنس حمار من الرنويات الصفحيات الخيشم . أنواعه

عديدة جميعها سيولانية الاصفاذ تعيش غارزة في رمال

الشاطئ .

١٧٣٤٠ - طَلِيلِيْسِيَّات * Tellinidae (S).

Tellinidés (F). Tellinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرنويات صفحيات الخيشم .

اجناسها وانواعها الممرقة عديدة بعضها من محجرات

الاراضي الطليانية والبيض الآخر معاصر . موطنها يشمل

معظم بحار العالم باستثناء المناطق القطبية || اصداؤها

تتروح بين المستطيرة والاحليلجية الرقيقة اللتن ، جميعها

متصلة القند او كيرة . ألوانها جميلة الالوان الزاهرة يكثر

فيها الاجر ويشققاته || اعرف اجناسها واشهرها الطلييس

والديلدان .

١٧٣٤١ - طِيمّ - ما حل وجهه لئام من غشاء .

١٧٣٤٢ - طَيَّاطِيْمّ Tomato (F).

رايح بطورة .

١٧٣٤٣ - طَيِّمِخ Rhus à feuilles d'épine (F).

الطيخ شجر يدعى به يحمي ادعاه اخر القرن . ويحي ايضاً

الدرب ، اظله .

١٧٣٤٤ - طَمْر Ernilago

هو اللقن في الطمورة كفن البلال والكلاء والساقط

لحفظها مدة من الزمن .

١٧٣٤٥ - طَمْر ، دَقْن Enfouissement (F).

Burying (E).

وضع الشيء في التربة وطمرو كالبادر والاصمدة >

١٧٣٤٦ - طَمْرُوق * Plecotus (S). Oreillard (F).

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . أنواعه عديدة تتميز

بشاذ كبير ذاتها المتدخعة فوق الجبهة . معظم أنواعه

يعيش في البلاد الباردة وبعضها يالغ للمناطق المعتدلة .

أهوه الممروق الميول .

١٧٣٤٧ - طَمْرُوقِيَّات * Plecotus auritus (S). Oreillard commun (F).

نوع من الطمروقة موطنه فسح الاربياء يمتد من آسيا المعتدلة

الى الشرق الاوسط واروپة وأفريقية الشمالية || ثوبه الى

الريدة الحليقة السراء يقيق مع اقترابه من ثيج الظهر .

طوله نحو ٨٥ سم . يسلط ٢٥٠ سم ، ذنبه ٤٠ سم . ولذنه

٣ سم || يالغ في الشتاء جميع المواقع القليلة الرطوبة

وهو الممرقة الى الرياح الباردة كالبيوت المنفردة والحربة

والكهوف الجنوية المرش . ويالغ في الصيف الانجار

الحرجية النضة والاراج المنفردة والمناور الشمالية المرش .

يعيش جماعات قليلة البدن . يحمي على الارض ويتسلق

الحيطان كما تقفل الثارة وبرسها . قوة الحول والذباب

والحشرات الصغيرة المختلفة . مسرعه يدمم من الفس

حتى فحة الليل وبين الفجر الباكر حتى الشروق .



طلييس



طمروق ميول



طمور



طنانة التربة



طنانة الحقائق



طنانة الحراج



طنانة القاع



طنانة حطرة



طنبرجية

Rejeton (F).
Shoot, Sprout, Offshoot (E).
الطنب ج أطباب : عروق تنشب من أروية الشجرة .
Tombereau (F). Tip-cart (E).
الطنبر كالمصبة حربة للقل ذات دولابين .

Thunbergia (S).
Thunbergia (F). Black eyed susan (E). Thunbergia (O). Thunbergia (I).
جنس نباتات من فصيلة الانتيات مقبوضة الحريف على اسم الطبيب الرحالة السويدي « طنبرج » . أنواعها ثمانية منها المشقية الحولية ومنها البليحة المأبوضة العصرة . أوراقها متعابلة الأركانز ، قلبية أو سهمية متصل . أزهارها كبيرة القد ، زائجة الألوان || أشهر أنواعها ما يتبع .

Thunbergia fragrans (S). Thunbergia odorifera (F).
جنس سريرية عاتية معمرة تملو نحو ١٥٠ م . أوراقها سهمية مسنة الحافة . أزهارها عاتية اللون ، فواشي الحريف البصري . قطرها نحو ٣ م || أزهارها يستمر من أيار الى أيلول .

Thunbergia slata (S). Thunbergia silae (F).
جنس سريرية عاتية معمرة تملو نحو ١٥٠ م . أوراقها سهمية الشكل متعابلة السنتين المنصف . أزهارها صفراء اللون أو برتقالية يعلوها في وسطها مزاج أسود تنحطه بقعة بيضاء || أزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الأول .

Thunbergia chrysops (S). Thunbergia dorae (F).
عشبة سريرية حولية زينة تملو نحو ١٠٠ م . أوراقها قلبية الشكل . كأس زهرتها مسكة النسيج ، مقبوضة الحروف . ثنائياتها بيضية مهدية ، تزدها برجي الحية ، يتلاتها ذمية اللون ، أريجوانية المزاج يعلوها طوق أزرق . أزهارها يستمر من أيار الى أيلول .

Xiphidria (S). Xiphidria (F).
جنس حشرات من فصيلة الخنثيرويات . أنواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد المعتدلة . أجسامها اسطوانية الشكل طولها يراوح بين ١٠ و ١٦ م . أجنحتها سوية الألوان وتلب فيها الاسمر والحلي . قرونها الانتشارية خيوية التركيب ، أفتية الانتشاب . رواشتها شائعة كثيرة العروق . مزاوت أناثها صغيرة القد ذرية || قرونها غاشية التركيب جذوع الأشجار الحرجية المأبلة انصمها للث والحور والدرادر .

Xiphidriidae (S).
Xiphidriidae (F).
فصيلة حشرات من غشائيات الأجنحة الأشرابات . أجنحتها وانواعها عديدة تتميز باستدارة رؤوسها واستطالة أمتائها وقصر الجوان أناثها . قرونها غاشية تحل وتزدرب جذوع اللث والينزلا والسيتيان والحور والدرادر .

Tanytus culiciformis (S). Tanytus culiciformis (F).
حشرة من فصيلة المنشيوات . جسمها قريب الشبه من البعوضة ، يطلو نحو ٥ م . || قرونها الى القطعة الاسراء يعلوها ، عذ الذكر ، سلطان اسودان في الصدر وسط

Cheval de race (F).
Botte de roseaux (F).
Bunch of reeds (E).
حزمة القصب . والقصبه الواحدة طنـة .

Sonométrie (F). Sonometry (E).
الطنانة علم يبحث في مقاييس الاصوات ومقارنتها .

Bombus (S).
Bourdon (F). Humble-bee (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة النمليات . أنواعها نحو ٢٠٠ موطنها العالم . تتميز بأجسامها الخطية الزهراء .

Bombus terrestris (S).
Bourdon terrestris (F).
طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ م . رأسها أسود يعلو توتيج اسمر وسط اسفر . قرونها سوداء . جوشها والمفصل الأول من بطنها الى الصفرة . مفصلها الثاني والثالث الى السواد اللامع . اما الرابع والخامس فالى البياض الاثير . قرونها سود . عرشها متوسط القد تقيم في التربة أو تحت الشيا . تسرح ابتداء من أواخر أيار .

Bombus hortorum (S). Bourdon des jardins (F).
طولها نحو ٢٠ م . رأسها أسود يعلو توتيج اسمر . جوشها وقرونها والمفصل الأول من بطنها الى الصفرة . مفصلها الثاني والثالث الى السواد . اما الرابع والخامس فالى البياض . قرونها سود . عرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من نيسان . تألف الحقائق والجنانز القريبة من الأماكن الآهلة .

Bombus sylvarum (S). Bourdon des bois (F).
طولها نحو ٢٠ م . جسمها كفيف الزغب الدقيق الطويل . ثوبها الى الصفرة الشفراء . قرونها جزوية اللون . عرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من أيار . تألف الحراج والغابات الكثيفة الظليلة .

Bombus lapidarius (S). Bourdon des carrières (F).
طولها نحو ١٦ م . ثوبها الى السواد اللامع . مفصلها الثلاثة الطرفية الى الحمرة الصنائية . قرونها سمر يعلوها زغب اسمر . عرشها متوسط العدد تقيم بين الحجارة والصخور . تسرح ابتداء من أيار .

Bombus fragrans (S).
Bourdon parfumé (F).
طولها نحو ٢٠ م . رأسها وبطنها الى الصفرة . جوشها زيتوني . قرونها سود يعلوها زغب اشقر . عرشها قليل العدد تقيم في صمغ الاشجار . تسرح ابتداء من أيار .

Bombus terrestris (S).
Bourdon terrestris (F).
طولها نحو ٢٠ م . رأسها وبطنها الى الصفرة . جوشها زيتوني . قرونها سود يعلوها زغب اشقر . عرشها قليل العدد تقيم في صمغ الاشجار . تسرح ابتداء من أيار .

خاسيا الفصّل. جوشها اصفر من بطنها. بطنها يبيّض الشكل. مرزّتها مستقيمة. اجنتها حادة اللون، مهدبة الاطراف. ثوبها الى البني الاشقر المواج || تربيتها منتشرة في اودية وامريكة.

١٧٢٨٨ - **طنجوشيات** (S).
Trichogrammidæ (F). Trichogrammidæ (E).

فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة المصنوعة. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها نائمة تغطّل على مكن الحشرات من غثفل الفصائل || حشرتها شديدة الصغر طولها من ١ الى ٢ مم. اجسامها ديمية. جواشها اقصر من بطنها. قرونها الاستشعارية قصيرة، خماسية الفصّل او سباعيتها. ارسافها ثلاثية الفصّل. مرزّتها قصيرة، مستقيمة. اجنتها مهدبة الحنصار || اشهر انواعها الطنقوش الشارد.

١٧٢٨٩ - **طنجاف** (S).
Stetun هو السديم ضرب من السحاب المرتفع.

١٧٣٩٠ - **طنجر**، **لقاء** (F).
Asepsis, Aseptic methods (E).
استخدام المواد البنية او الفاسدة التي تنقل الامراض.

١٧٣٩١ - **طنجورج** (S).
Ithaginis (E). Ithaginis (F).
جنس طير من الدجائيات ونصف الطيوريات. انواعه المعروفة خمسة موطنها جبال الهند. لونها الحيالي جامي. قوتها الاغشاب والحبوب والجزائير والحشرات اغصها النمل || اجسامها متوسطة القتل من ٤ الى ٥ سم. اقوتها الى الطحلة السمره المنطوية الماجات. رؤوسها صغيرة متوسية بفتاير لاقائية التنجيع والاستاطلة. صويتها مطوقة بالايض. مثالبها قصيرة ورطبية. اعناقها طويلة. اذنانها متوسطة الطول، مقنطرة الاطراف || الانثى اصفر قدام الذكر واقنع لونها منه. تكثر الصومعها في الارض. تعيش من ٧ الى ٩ بيشات تحضنها نحو ثلاثة اسابيع بينما الذكر يلقن لها الغذاء || تعيش من الطرائل الفاخرة.

١٧٣٩٢ - **طنيس** (F).
Endonastie (F).
الطنيس الحشرات الزئبد على السويق تسهلها لجوز الوردية من الربة.

١٧٣٩٣ - **طنيس** (F).
Détariorat (F). To detariorat (E).
افسد العمل بسره تصروه.

١٧٣٩٤ - **طنيف** (F). Fresh (E).
تمت وصفي بقل على طراوية التي كفتك زينة طيفه اي طازينة.

١٧٣٩٥ - **طنيف** (S).
Milium nigricans (S).
Mals de Guinée (F). African millet-grass (E). Ecthas Flaccargras (D). Milio nero (I).

نبات عشبي زراعي حولي من التجليلات. مهد البلاد الافريقية الحارة حيث تكثر زراعتة نظراً لاستعماله الغذاء والمالي. وهو قريب الشبه من القطن. اوراقه كبيرة القف، صلبة النصل، متقاربة الابعاد. حشوكه الزهري كبير الحجم. ثماره حبوب صغيرة مستديرة مغطاة بخرق الين.

سلط متدّرة في البطن. اما السلط المتدّرة في ثوب الانثى صفراء اللون || رأسها مستعرض. زياتها ورشيان. عذ الذكر، قلايدان عند الانثى. ورشها، عذ الشقين، الى البياض الاخير المرقوش بالحنطي. قوامها الى الصفرة، مفاسلها سود || تظهر الحشرة الجملة من ايار الى تشرين الاول. تألف حشرات المنقوع ويجاري الماء || يربتها مائية ثم قازية، وانجته ودائمة.

١٧٣٧٨ - **طنج** هو المور، الحلبه.

١٧٣٧٩ - **طنش** **ميدوله** (F).
Tanrac comusa (F). حيوان لين حائر يدعى مزال، الحلبه.

١٧٣٨٠ - **طنز** (F).
طنز غريب من السك (الحيد).

١٧٣٨١ - **طنطور الجندي** (F).
Tanghin, Tanghin (F). هو القليلة الحبشية. الحلبه.

١٧٣٨٢ - **طنطين** (F).
Tanghin, Tanghin (F). مادة جمالية تستخرج من عصارة ساق الطنينة السامة او من لباب ثمارها.

١٧٣٨٣ - **طنطينة** (S).
Tanghinia (S).
جنس اثمار برية وتربيتية من فصيلة الفطيات انواعها المعروفة خمسة جميعها كيرة القتل تملو من A الى ١٥ م. اغشابها صلبة منسجة متعقبة اللون. ثمارها نوية الشكل بنقية الحمر لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر || اشهر انواعها الطنينة السامة.

١٧٣٨٤ - **طنطينة سامة**، **طنطينة مدسكرة** (F).
Tanghinia venenifera (S).
نوع من الطنينة يهي ثمرة جملة الختام تملو نحو ١٥ اثمار. اوراقها سانية الشكل، نصلها جامد الصلصة حاقب انضار اطلل المواج || يستخرج من لباب ثمارها وين صارة مائها مادة جمالية شديدة القوت تثل القلب والجهاز العصبي || يقال ان يقر ملك مدسكرة امر عام ١٨٣٠ باستحار جميع ثمره الجزيرة وقلتها وكان مدم نحو ٦٠٠٠ فتم جلبهم باجترار صارة الطنينة السامة لتستريح البلاد من طفة الالهامة. يكفلا كان قاترا جميعهم بيوم واحد.

١٧٣٨٥ - **طنف**، **طنف** (F).
Auvent (F). Pant-roof, Porch-roof (E).

الحيد من الجبل وما تشأ منه. والبرز الحائط وما اشر غاربا عن البيت. والسقفة تشرع فوق باب الدار.

١٧٣٨٦ - **طنف** حجر احمر يشبه النمل (السان).

١٧٣٨٧ - **طنقوش شارد** (S).

Trichogramma evanescens (S).
Trichogramme errant (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطنقوشيات. موطنها بعض مناطق البلاد المتفعة الحارة. تغطّل على مكن الحشرات ومنها الترميزات (الكوشيل) || جسمها صغير القف بطول نحو ١ مم. رأسها مستعرض الجرم. زياتها قصيران، منفرجان.



طنقوش شارد



طجورج



طنف



طُوكَلَاب مُهْدَب

كبيرة ، ناضرة ، متباعدة عند الشقين . قربتها الاستعمارية صغيرة ونحيلة . اعطائها لثقة او ماسة . كولسلها مستطيلة الشكل ، مبهرة الحلب . شيلاتها كبيرة . بطونها شبه اسطوانية . قوائمها نحيفة . ارجلها كبيرة ، اثنىها الاسود ثم الاسمر الحلي || يرقتها ونجحة او نائلة او عاحلة || اشهر اجناسها الطوخة والكرودنة .

١٧٤٠٣ - طُوكَلَابَة في الانثلة السوداء ، اطليا .

١٧٤٠٤ - طُوكَلَابَة الصُرْف (F). Disponibilité (F). Disposal (E). في القانون المدني صفة متسقة بالاموال يجعلها قابلة للتسليك .

١٧٤٠٥ - طُوكَلَاب الساق ، طُوكَلَابَات الساق

Echassiers (F). Wading-birds (E). ربة من الطيور تتميز باستطالة سيقانها واعناقها ومنقبيها . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع في شرة فضائل : القشريات والعلقيات والتطليات والحياريات وديجيات الارض والفرزقيات والكركات والقلقيات والتساميات والكتاتيات

١٧٤٠٦ - طُوكَلَاب القُرُون في القزليات ، اطليا .



طُوكَلَاب

١٧٤٠٧ - طُوكَلَابَة ، طُوكَلَابَة . Tupala (S). Toupala, Cladobate (F). جنس حيوانات لبنة حاشرة من فصيلة الطوباجيات . انواعه المعروفة مبهمة . اعطائها تمتد من الحد الى الحد الصيفية والاثام ويبرز الاربعيل حتى صوته والقلبيين . تألف القنابات والاحراج . تسلك الاجمار بقة . تروح في الثمار رتيبة في الليل ، قوتها الحشرات والفروع والفتران والجرذان ... || اجسامها تعول من ٣٠ الى ٥٠ سم . بما فيه الاذنان التي تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها مستطيلة الاعظام ، غروبية الشكل . سبالها كيفية . عيونها ولذاتها صغيرة . اذنانها مستطيلة جلة . ارجلها تختلف مع الانواع . اناثا رباعية الاطراف .

اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية :

طوباجية اسمر حديدي . Tupala ferruginea (S). Toupala ferrugineux (F).

طوباجية تانا - تانا . Tupala tana (S). Toupala tana, Tana (F).

طوباجية جاوا . Tupala javanica (S). Toupala de java (F).

طوباجية نيكوبار . Tupala nicobarica (S). Toupala de Nicobar (F).

١٧٤٠٨ - طُوكَلَابَات Tupalidae (S).

Tupalidae, Tupalidae (F). Tupalidae (E). فصيلة حيوانات لبنة حاشرة مسقلة . اجناسها وانواعها قليلة البدن . اعطائها المناطق الحارة والاستوائية من الحد والاثام ويبرز الاربعيل || جميع اجناسها مبهمة ، مستطيلة الاجسام والاذنان ، قريبة اليه بالتسحاب . رؤوسها غروبية ، ذلقة الاعظام . آذانها صغيرة . قوائمها الخلفية اطول من الامامية || تألف القنابات والحراج . تسلك الاجمار بقة . قوتها الحشرات والوديات والفروع والفتران || اعرف اجناسها واشهرها الطوباجية .



طُوكَلَابَة

١٧٣٩٦ - طُوكَلَاب مُهْدَب

Dolomedes fimbriatus (S). Dolomède frangé (F). Long-legged spider (E). Garteilachspinne (D). نوع من العناكب القانصة الساعية ثنائية ارجلها ساعية المشانق ينتمي الى فصيلة العنكبوتيات . جسمه متوسط القد بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ٢٤ سم . عند الانثى . صدراها احليجي الشكل ، اصعب اللون ، اثير التشريح عينا زيمتان ، شيفاه ضليخان ، عديا الغلاف . فكاه مستطيلان . جزامه قوية ، نحيفة ، مبهرة الحلب . بطة مستطيلة الشكل البيضي ، حلي اللد ، اسمر الحلي ، يملؤ تشمع ابيض واسود وحار مهدب الحبر || يال المنافع والاحوار . قوته الحشرات الحلانية . يسرح في التبار . عكبه كالجارب ونسجها تحت الحجارة في مكان قصه || ملجئه الحياتي لا يختلف من ملجين سائر العناكب .

١٧٣٩٧ - طُوكَلَاب Fourrage débine (F). Straits fodder (E). اليسير من الكلاء .

١٧٣٩٨ - طُوكَلَاب حشائش مرة كانت تأكلها اليهود في القصح . (السلان) .

١٧٣٩٩ - طُوكَلَاب Pimelopterus tahnai (S). Pimélode (F).

سمكة بحرية مأكولة من متنوعات الثنائيات وفصيلة السلوريات . توجد في منط البلاد الحارة . تتميز بزاية شكلها ، بقصر رأسها المقطوع ، بكثرة طبقاتها الفكية وباستطالة بطن حشاكها الزمنية كما يبدو في الزم . وهي عادمة الانسان ، خلية العظام الفكية .

١٧٤٠٠ - طُوكَلَاب Chaunilia (S). Chaunille (F).

جنس حيوانات برية من الرغويات مبهيات الاربعيل وفصيلة الحلزويات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٢٠٠ متشرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة || اصنافها صغيرة القد وشبيهة الشكل المستطيل . اطولها تقارب من ٨ الى ٢٠ سم . تعيش في المواق الرطبة وقرب المنافع ويجاري الماء . قوتها المواد النباتية .

١٧٤٠١ - طُوكَلَابَة Scatophaga (S). Scatophage (F). Scatophaga (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة الطُوكَلَابَات وربة ذوات الجنانين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في منط افطار العالم || اجسامها مبهمة تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها كبيرة . ميزنا ناضرة ، متباعدة عند الشقين . قربتها الاستعمارية شديدة القصر لتتبي بسيلة دقيقة . اعطائها ضليخة ، ثائية . كولسلها وطونها متكافئة الحلب . رواشها ملوية . قوائمها نحيفة ، مبهرة الحلب . ارجلها عديدة ، اجسامها الحلي || الحشرة الجملانة قانصة . البرقة نائلة وواجبة .

١٧٤٠٢ - طُوكَلَابَات Scatophagidae (S). Scatophagidae (F). Scatophagidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجنانين . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة البدن ، منتشرة في منط اصقاع العالم . جميعها من اللباب المنافع اللحم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٤ سم . رؤوسها شبه مكورة . ميزنا

Phase

١٧٤١٧ - طور - Brebis (F), Ewe (E).

١٧٤١٩ - طوبالة

هي النجبة . ج. طوبالات . ولا يقال لكيش طوبال .

Disphase

١٧٤١٨ - طور انفصالي

١٧٤١٩ - طوبنة هي الاقنوص ، اظله .

١٧٤١٩ - طوري * ، طوري Geopelia (S).

Géopélie, Pigeon-épervier (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . يتميز بصفرة ريشه وشكله واستطالة أظفره المتراصفت الريش . قوته الى الصخرة المخططة والمؤنثة بالاصفر || موطنه الشرق يأتى الفتيان والحلقى المزدوجة . اشرابه صغيرة بروج حدد افرادها بين ١٢ و ٤٠ . قوته الحبوب والبذور . يندى في الجبال والادغال القليلة الارتفاع . انشاء تبيض بيشتين على مرتين في السنة .

١٧٤٢٠ - طورانية * Torania gloriosa (S).

Toranie glorieuse (F).

دوية من التناكب الساعية القانصة ، ثنائية الرواية سداسية المشان تنتمي الى فصيلة الجاهيات . موطنها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة || جسمها صغير القند بطول نحو ١٥ سم . عند الذكر وهو ٢٠ سم . عند الانثى . صدرها مستدير الشكل ، سطلي اللون ، اسمر المزاج . جناحا زنجيتان . فكها صغيران . جراسمها كبيرة ، كثيفة الحلب . يطها يضيء الشكل ، اسمر اللون منقط بالاحمر كالجارجر || لسمتها مؤذية تسبب بعض السموم .

١٧٤٢١ - طوري * Corythax, Turacus (S).

Toursaco (F), Turacus (E).

جنس طير من فصيلة الموزيات . اطلانه البلاد الافريقية الحارة . انواعه الممرقة قليلة العدد . جميعها ابدية . اجسامها تطول من ٤٣ الى ٤٧ سم . اظفارها حيلة الانوار القامة . متغيرها صغيرة ، غرطية الشكل ، شاذية الخطاط العليا المضمومة الطفاف . رؤوسها حشوة بفتاح غرطية الشكل || اهرق انواعه واشهرها الطورق الازرقاني .

١٧٤٢٢ - طوري ارجواني *

Corythax Buffoni, Turacus perris (S).

نوع من الطورق . اطلانه تشتمل معظم مناطق افريقية الجنوبية . يأتى الاجراج والقباب والباحس حيث تكثر الثمار والحبوب البرية || جسمه بطول نحو ٤٧ سم . قوته الى الحصار الازرقاني المزاج . جناحه مخططة بالاحمر الانياس والازرق والاحمر والاصفر . ذنبه الى الزرقه العابقة الخضراء المزاج . قزخته خضراء القنطرة والزمان الاول ، ينفسجيه الزمان الثاني ، حمراء الثالث والاربع || يندى في تجاويف الاشجار القديمة المهم . انشاء تقنع اربع بيشات تحضنها بمثابة الذكر || قوته الثمار البرية والحبوب . يعيش في التفتن اما يربى في الموائل الظليلة . قوته في الاسر يرتكز على الثمار البائنة وقرقر المسروق والتجزر المجلل بماء السكر .

١٧٤٢٣ - طوس Pulation (F).

Pollution, Swarming (E).

١٧٤٢٤ - طوس هو الجبان الحبيبي ، اظله .

١٧٤١١ - طوبين Talpa (S), Taupe (F), Mole (E).

جنس حيوانات من آكلات الحشرات وفصيلة الطورينيات انواعه الممرقة ١٠ موطنها العالم القديم . اشتهرها العلويون الجلود او اظله الاروي . جميعها جامة تعيش في انفاق ورداء تخدعها على احمال مخططة تراوح بين ٣٠ و ٧٠ سم . اجسامها مكملة اسطوانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . رؤوسها رشيقة تلتهب بفتانطيس صفية . حبيضا غرطية صغيرة . اذانها المخاربية طامسة . اذانها جلع تطول نحو ٢ سم . اذنيها قصيرة مستعرجة خلمية الاصابع المهيضة بالانطافر القوية المستطيلة الليرة . ارجلها صغيرة القند والانطافير || اذانها تحمل مرة في العام وتقع من جبرون الى خمسة جبراء || يهجر الطوبين من الحيوانات المؤذية لانه يقضم كل نبات يهزى طريقه في التصري من الحشرات وهو يسرح اربع مرات في النهار عند الصباح وعند الساعة الثامنة وعند الظهر وعند الغروب || يكافح باستعمال الفمخاخ والمصايد والعظم للسم .

١٧٤١٢ - طوبين امريكي * Scalops parvus (S).

Scalope de Floride (F).

حيوان لبين ساحر جاس من فصيلة الطورينيات . اطلانه بعض مناطق الولايات المتحدة انحصا فلورديه والتكساس || جسمه صغير القند كرم بطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير الجرم مستطيل القند الذي يغير كلفه الزبابية . عيانه غرزيبان . اذناه مساحتان ، طلستان . يدها قصيرتان غليظتان مغطيتا بالاصابع المهيضة بالظفر قوية . ذنبه شديد القصر عادم الور . قوته الى السمرة الباقية باستثناء لة الرأس ومقحم القوام فانها الى الدرة الصفراء || يعيش تحت الارض في انفاق تخدعها على احمال متغايرة النور انحصاها ٤٥ سم . قوته الهدان واساريم الحشرات ويرقاتها وراذن النمل والشنق ... || الانثى تحمل مرة في العام وتقع من جبرون الى ثلاثة جبراء .

١٧٤١٣ - طوبينيات Talpidae (S).

Talpids (F), Talpidae (E).

فصيلة حيوانات صغيرة من رتبة الحشرات تشمل الطورين والكلبان .

١٧٤١٤ - طوت Totia (F), Grivet (E).

هو هجرس سبا ، اظله .

١٧٤١٥ - طوق Plancton, Plankton (F).

Plancton (E).

كلية من المواد العضوية المنسوبة بالماء قولها جسموات من الحيوانات الدنيا المائية والنباتات المهيضة من وحيدات الخلية . البتر لواح من ماء البحر يحوي نحو ٥٠٠٠٠٠ كائن حي من هذه الحيوانات الدنيا والنباتات المهيضة . وسيت ان هذه الكائنات تتكاثر بسرعة لا مثيل لها ، تراوح من يوم الى يومين ، لذلك فالطوح يعني كامل كائنات الكتلعة من حية ميتة . ج. الطوح .

١٧٤١٦ - طوحى * Planctique (F), Planktic (E).

نعت تعريفي يطلق على الكتل العضوية العائمة في الماء او الثابتة فيه .



طوبين امريكي



طوراني



طورانية



طورق ارجواني

١٧٤٣٨ - طوقك

أرض مستديرة سهلة بين أرضين غلاظ .

١٧٤٣٩ - طوقريون ، طوقريون

Teucrium (S), Germandrée (F), Germander (E).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الشفويات
أزواحه نحو ١٠٠ مظهرها عشبي لني معمر شائع الاستعمال
الطبي . منافسة عطرية زيل السعال ويقي السعال . وهو
مر الطم ، حار ومو ، يفر الصفراء ويقي الاصاب
ويقي على الديدان || أوراثة متعاقبة مفرقة كثيرة
التفرع . أزهاره ابيطة غشقة الألوان || أشهر أزواحه
ما يلي .

١٧٤٤٠ - طوقريون أصفر ، عشب الطحال

Teucrium flavum (S), Germandrée flavescente, Pouillot jaune (F), Yellow germander (E), Gelber Gamander (D), Camendrio giallo, Querciola maggiore (I).

عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فروصا
متنصبة زياها العل ، أوراقتها كبيرة مفرقة وسنة التصل
الحمل البشرة حل صفحية . خلل أوراقتها وزنب خساء
فروصا وساقها ييش ألون ، صفر المراج . أزواضا
روؤية التجميع ، حامية الإزكاك ، صفراء ألون .
أزهارها يستمر من حزيران الى آب || يقال أنها تقي
أكثر عل الطحال .

١٧٤٤١ - طوقريون إكزيري ، بكلك العرف

Teucrium creticum (S), Germandrée crétoise, Pouillot de Crète (F), Cretan germander (E), Cretischer bergwandell, Ysop-Gamander (D), Camendrio di Creta, Querciola di Creta (I).

عشبة برية طيبة معمرة مهادا الشرق الأوسط . يقال أنها
من النباتات النافعة النافطة . تملو نحو ٨٠ سم . ساقها
فروصا متنصبة . أوراقتها تطول نحو ٤ سم . وتعرض نحو
٦ م . أزهارها بنفسجية ألون ، فردية أو ثلاثية التجميع .
أزهارها يستمر من أيار الى تموز .

١٧٤٤٢ - طوقريون جبكي

Teucrium montanum (S), Germandrée de montagne, Pouillot de montagne, Thym blanc (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . ساقها فروصا . فروصها
غشوشة ، غشقة ، مستديرة الإصابع . أوراقتها لافقة ،
ضيقة التصل ، خيراها الصفحة السفل . أزهارها يضاء
ألون ويلوحا موانج أصفر || أزهارها يستمر من أيار الى
آب .

١٧٤٤٣ - طوقريون شرقي

Teucrium orientale (S), Germandrée d'Orient (F).
عشبة برية وتزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها
فروصا متنصبة . أوراقتها عطيفة التفريش . تصلها بدت
الحصار ، خلي البشرة . أزهارها متفوية التجميع ، زرقاء
ألون || أزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٤٤ - طوقريون كبير ، طوقريون ليبي

Teucrium fruticosum (S), Germandrée ligneuse (F).
جنية تزيينية تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . فروصها
نباتية متبادلة . أوراقتها معقة مستطيلة . تصلها بارز
المرق والثرانين ، أزغب الصفحة السفلى . أزهارها
كبيرة اللدة ، زرقاء ألون ، أزهارها يستمر من شباط الى
حزيران || هي من النباتات المجادة التي ترغب في بعض
الآربة للمينة والمواقع الخاصة .

Châtré (F).

To castrate, To geld (E).

انزع الحصبين في ذكور الحيوان .

١٧٤٣٦ - طوشاه

Asandra, Anandraire (F).
الطواخ كل زهرة عاصمة الجهاز الذكرى .

١٧٤٣٧ - طوشن ، مكشوش

Chapon (F).
فرخ اللجاج الفصي . ج طوشن ومكشوش .

١٧٤٣٨ - طوط

Epervier commun (F).
هو الباشق المعروف ، اطليه .

١٧٤٣٩ - طوط

هو القطن او قطن البردي .

١٧٤٣٠ - طوطانيات

جماعة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وأنواعها
مدينة جميعها من الفواضع الصغيرات اللدة . أنوعها منقطة
مرقطة ، قطبا اهلجية الشكل . متاثيرها دقيقة نصفية
التعبد . ارساغها غشقة || تألف مجاري الماء وضبوط
البحار والأشجار . قوتها الديدان والحشرات والرخويات
والفقرليات || تدش في الأشجار وبين الاعشاب وعلى
الآراب . الاث تبيض نحو ، يضاء تحضها سحبا
من ١٧ الى ١٩ يوم || أشهر اجناسها الطيطوي والقزاق
والقنص .

١٧٤٣١ - طوطي

هي البهنا (من ابي حامد الغزالي).

١٧٤٣٧ - طوشي

Spontané (F), Spontaneous (E).
نعت ترميني يطلق على كل نبات يتكاثر تلقائيا في تربة
معتة والقيم غامدة .

١٧٤٣٣ - طوشة

Spontanéité (F).
صفة ما هو تلقائي .

١٧٤٣٤ - طوطي

Fretin (F), Fret (E).
اطار من حديد يطوق بعض الاشياء لمنع تصلمها . واطوق
هو حاويل التخل الذي يستعمل في الصيد البيا .

١٧٤٣٥ - طوقان

le Toucan (F), the Toucan (E).
الطوقان كوكبة نجم جنوبية الموضع تشبه بشكلها طائر
الطوقان || عدد نجمها ١٤ جميعها من المرئية الخامسة
وما دونها .

١٧٤٣٦ - طوقان

Rhamphastos (S), Toucan (F).
جنس طيور امريكية مستهجنة الشكل . موطنها البرازيل
والغويان وبولارما . اجسامها كبيرة اللدة طولا براوح بين
٥٠ و ٧٠ سم . أنوعها مختلفة يكثر فيها السواد الاعوج .
اعتاقها وعاصرها ييش . أذناها حمر الالوانيك . متاثيرها
خليلة الشكل ، كبيرة الحجم ، وردية ألون ، سود البرة .
تألف الذنابات وتدش في صلوح الانجار . قوتها البار
والحشرات والفروع .

١٧٤٣٧ - طوقانيات

Rhamphastidae (F), Rhamphastidae (E).
فصيلة طير من المستنقعات . اجناسها وأنواعها مدينة تميز
بشكل متناقضا اللطيفة المصنوعة . اصطناعا البلاد الحارة
والاستوائية . احرف اجناسها واشهرها الطوقان .



طوقان



طوقريون اصفر



طوقريون اكرتي



طوقريون جبلي



طوقريون شرقي



طوقريون كبير

١٧٤٥١ - ملقون نكتات

Dendroplex picus (S).

Talapio-pic (F). Talapio-pic (E).

نوع من الطوب. طائر من فصيلة الطولييات. موطن معظم المناطق القريبة من أمريكا الجنوبية. يألف الغابات والرياح حيث تكثر الديدان والاساريع والحشرات || جسمه مثلث القد بطول نحو ٢٢ سم. يتميز بمقناده الجالس كالحرية المستقلة الطرف. ثوبه الى العنق السراء يطويها جميع معترض اسود في الجناح والذنب ورقة سواد في الصدر. صدره وبطنه وزنكاه الى الشقعة السراء. حلقه عينه الى الزرقاء. مقناده وساقاه الى السرة الباقية || يتسلق الاشجار من الصباح الى المساء وينكت القشور والقحاء في طلب الديدان والاساريع || يذلل حشه في تجاريف الاشجار. الاثنى تقص من يمشين الى ثلاث بياضات بحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

Dendrocolaptidae (S). ملقونيات

Dendrocolaptidae (F). Dendrocolaptidae (E).

فصيلة طير من الجوارث الملتصقات يقبضات المناظير. اجناسها وانواعها المروعة نحو ٧٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية. تألف الغابات والرياح والاسراع الجبلية. قوتها الحشرات واساريعها || اعرف اجناسها واشهرها الطوب والقضاب.

Torreya (S) ملقون ، ملقون

Torreya, Torreya (F).

جنس اشجار حرجية من الطقسيات. انواعه عديدة مهددا الشرق والبلاد الامريكية. اجناسها متوسطة القد دائمة الخضار. غراحيها متعاقبة ابدة. اوراقها حرة ثنائية الصف. مثقبة. احليلية، ذرية. تصلها جامد السج. شائك القصة. حايث الخضار، حطط الصفحة السفلى. اشهر انواعه مايل.

١٧٤٥٤ - ملقون جوزي القصر

Torreya nucifera (S). Torreya à noix (F).

شجرة سروية حرجية وزينية بطيئة النمو. مهددا اليابان تملن من ٧ الى ٢٠ م. غراحيها تدور خضراء اللون ثم تنحرف الى الجارية. اوراقها شديدة الخضار النابت الاصح. مسام تصلها حشد فرحها محمر غرض الواد الحنينة الكريهة الرائحة || ثمارها جوزية القد والشكل، لونها الى الأخضر المنش بالابيض تقطيه بعض الحطوط الحمر.

١٧٤٥٥ - ملقون زربي الورق

Torreya taxifolia (S). Torreya à feuilles d'if (F).

شجرة حرجية جادسة مهددا اسراج فلوريدا من اعمال امريكا الشمالية. تملن من ٧ الى ١٠ امار. غراحيها شديدة الخضار. اوراقها زربية الشكل، ابرية المقعدة، فواصة الرائحة الكريهة.

Torreya grandis (S). ملقون كبير

Torreya grand (F).

شجرة سروية حرجية وزينية، بطيئة النمو، مهددا الصين. تملن من ٢٠ الى ٢٥ م. غراحيها فسقية اللون. اوراقها تطلو نحو ٤ م. تصلها لاح الصفحة العليا الشفافة اللون، يلبث السفلى المعتدلة الخضار، ثمارها بيضنة الشكل، صفراء اللون تطلو نحو ٣ م. وتعرض نحو ٢.

١٧٤٥٥ - ملقون كوربي ، ملقون ، صمغ

المر ، صمغ

Teucrium marum (S). Germandrée ambrée, G. maritime, Marum, Thym aux chas, Herbe aux chas (F). Marum-germander, Cac thyma (E). Katzen-gamander, Katzenkrut (D). Camendrio maritimo, Maro (I).

بجلة برية طيبة مبررة صغيرة القد، ساقها فناء تملن نحو ٥٠ سم. اوراقها مثقبة بيضية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. تعرض من ٢ الى ٥. تصلها رسيد العرق. خلي البشرى التينة اللون. ازهارها ابيلة الارتفاع، فردية او ثنائية التجميع. لونها الى الزرقاء الباهتة || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

١٧٤٦٦ - ملقون عذري ، عكاد رويس

عكاد رويس

Teucrium Chamandrys (S). Germandrée officinale, G. petit-chêne, Petit-chêne (F). Common germander, Ground oak, Wall germander (E). Echter Gamander (D). Camendrio officinale, Germandrie, Querclois (I).

عشب طيبة مبررة تملن من ١٠ الى ٣٠ سم. ساقها خيالة مسطحة. اوراقها مفروقة وسنة. تصلها خلي الصفحة السفلى. ازهارها فمية التجميع. هامة الارتفاع، حراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول. منتفها القلبية عديدة راجعها في مادة ملقون.

١٧٤٦٧ - ملقون البتولا

Theda betula (S). فرائدة من فصيلة القنديات طولها نحو ٣٨ م. ذكرها اسمر الجسم، اسهب الراوش الموجهة والمبقجة بالاحمر والاصفر والخلطي. اثنائها كستية الجسم والراوش يطوي في روثنها الايامين بقية حراء صناعية || يسرح من آب الى ايلول. رقت تركب اوراق البتولا.

١٧٤٦٨ - ملقون السديكان

Theda quercus (S).

فرائدة من فصيلة القنديات طولها نحو ٣٤ م. ذكرها حطلي الجسم، افر الصدر ، بنفسجي الراوش الملوطة بالاسمر. اثنائها حطلية الجسم خراء الراوش المنسجة بالاسمر والمثقبة بالاحمر والاسود || يسرح من حزيران الى تموز. رقت تركب اوراق السديكان.

١٧٤٦٩ - ملقون

قياس درجيات طول الامكنة. عماده قوس خط الاستواء القام بين هاجرة الملق والمجرة الاصيلة.

١٧٤٧٠ - ملقون ، ملقون

Himantopus (S). ملقون

Echasse (F). Stilt (E).

طائر من طوائف الساق الطواق. طول نحو ٤٠ سم. مقناده جالس، مستطيل، اسود. ساقاه الطويل جويوتا اللون. قنقه وظهوره يسقطه الى السواد الاصح يطوي موج اخضر. عنقه وصدره وبطنه وذنبه الى البياض التي يكتشفه موجا وردى || يرئاد التلق والتمطيد البحرية. قوته الحشرات والقشريات والرخويات والديدان || يمش حشه في المناطق بين الاحشاب يدبر اقصوصه في المواقع التي تنمرها المياه. اثنائه تقص من ٣ الى ٤ بياضات بحضنها وسدحا نحو ١٧ يوما.



ملقون كوربي



ملقون عذري



ملقون البتولا



ملقون السديكان



ملقون



ملقون

وسيط الطيفيات . انواره المعروفة ٦٥ مظنها من نباتات المناطق الاستوائية . بعضها يقبل مأكلي الارواق والاخر صنامي يستخرج منه صباغات صفر ، او طوي يدخل في عدة تركيبات صقلية . اوراقه كبيرة لثة . ازهاره فردية التجميع ، محورية الزنكاز .

١٧٤٦٢ - طويئات
Didipodées (F).
سبط من الاقتنيات اجناله وانواره عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية مظنها اعشاب سولية وعشيرة صغوية . لثة ، مستدة الارواق ، جملة الازهار قليلة العدد . لشهر اجناله الطويلة .

١٧٤٦٣ - طويى هي الاثيرة ، الحظا . ج. الحوا .

١٧٤٦٤ - طويل الأرجل
Macropoda (F).
Macrochous (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الارجل .

١٧٤٦٥ - طويل الاصابع
Macrochyle (F).
Macrochactyl, Macrochactylous (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الاصابع .

١٧٤٦٦ - طويل الذئب
Macrocerus (F).
Macrocerus (E).
نمت تعريفي توصف به كل فردية او حشرة مستطيلة الذئب او السرك .

١٧٤٦٧ - طويل الذيل
Macroure (F).
Macrourous (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الذيل .

١٧٤٦٨ - طويل الرأس
Dolichocephale (F).
Dolichocephalic (E).
من نموت تصنيفت الشكلي في الحيوانات الاحلية .

١٧٤٦٩ - طويل الرنح
Long-jointed (F).
Long in the pastern (E).
هو في الخيل صفة الرنح الطويل الذي يقرب الحوشب من الخضيش . وقد يتجر من عيوب جبال السبق .

١٧٤٧٠ - طويل الزمان
Macrochre (F).
Macrochrous (E).
نمت تعريفي توصف به الحشرات المستطيلة الزمان .

١٧٤٧١ - طويولات الأرجل
Macrochodidae (S).
Macrochodidae (F).
فصيلة حيوانات من الجربليات . اشهر انواعها القنقر .

١٧٤٧٢ - طويولات الريش
Longipennis (F).
Longipennates (E).
مرتبة من كفريات القدم تشل بعض الطيور المائية الكبيرة الجثة ، المستطيلة الريش والقوية الطيران كرجع الماء والقطر والخرشة .

١٧٤٧٣ - طويولات الساق هي طوال الساق ، الحظا .

١٧٤٧٤ - طويولات المنكار
Longirostre, Longirostral (F).
نمت تعريفي يطلق على الطيور المستطيلة المنكار .

١٧٤٧٥ - طويلا ، مشبق
Volati (F).
Volatile (E).

١٧٤٥٧ - طوائف كليفونية

Torreya californica, T. myrsinica (S). *Torreya californica (F).*
شجرة سبروتية سربية وتزيينية مهددا احراج كليفونية من اممال امريكية الشمالية . تملو من ١٠ الى ١٤ م .
خراشيبها بحجرة الخشار . اوراقها تقطع نحو ٧ م . وتقرض نحو ٣ م . نصلها جلد السنج ، اسود القصبة الاربعة الشاكلة . حاقب الخشار حل صفحته العليا ، بحرى الصفحة السفلى ، انماذ الرائحة اللانسجية || ثمارها اسطوانية تقطع نحو ٥ م . قطرها ٣ م . ينما الى الخشار الزاهي تملو مشمة حشوية تتخللها خطوط ارجوانية .

١٧٤٥٨ - طويوة التيجليات

Tholera capitis (S).
Tholera capiteus (F). *Tholera capitis (E).*
حشرة متراكبة الحراشف والرتب من فصيلة النسيقات وربة حراشيبات الاجنحة . موطنها بين من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واسعة قوتها مشر الازهار . مرتقا تدبش على النسيقات || جسمها متوسط لثة بطول نحو ١٨ م . يستط نحو ٤١ م . رأسها مستد الجرم ع كستي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، مشطيان عند الانثى . حشوبها كستي اللون . بطنا حشوي اللون ، كستي الحية || ورشها الاماميان الى الكستي الحشوي الحلق المثلج تملو زراكتي وضبوط مسترقة غشايها يراوح من الجوزي الى الحشوي . ورشها الخلفيان الى الحشوي الاثخن طمو موجج رديي يمسر عند الاطراف || لها جيل واحد في الحلق . تقطر القراشة في حموز وثقي حتى ايلول . تسرح في الليل . تقاتل بعد ظهورها بنحو ستة اصابع وتتمتع الممكن للتحا مل الصفحات السفلى من نصال الازهار || الصرة تقطع نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى الصرة القاعة يعلوها موج امبر وضط ينجي اسود وضطان جانبيا من كل جهة . رأسها جويي اللون . مدها الى الصرة . وادباي سوب || طور الاكمال ينشتر نحو ثلاثة اصابع وينقضي في القربة ضمن جلباب من العين .

١٧٤٥٩ - طويوس

Thomomys (S).
Thomomys (F). *Thomomys (E).*
جنس حيوانات لبونة فاضمة جاسة من فصيلة الجروسيات . انواعه المعروفة ٢٦ موطنها البلاد الامريكية . قوتها لمواد النباتية . تدبش كالكاه تحت الارض في اتفاق مستطيلة متصرة تنتهي باجسام قصيرة لا يقل عمقها من ١٥٠ م . || اجسامها صغوية ، مكرومة ، تقطع من ١٣ الى ١٧ م . واذنابها من ٥ الى ٦ م . رؤوسها مستطيلة ، شبه مخروطية الشكل ، مغلفة القفاص . حشوبها غرزوية شديدة الصر . اذانها لاقطية . جرابها قصيرة . اصابعها نسيقة الاظافر المغوصة الحادة . اوتارها تراوح من الركة الباحة الى الطعلة الصمراء || انماها سداسية الاطباء ، تقص من مرتين الى ثلاث مرات في الحلق . تنابها من ٤ الى ٦ ادراس .

١٧٤٦٠ - طون
Tonne (F). *Tun (E).*
وحدة وزنية قديما يساري ١٠٠٠ كيلوغرام .

١٧٤٦١ - طويقة
Didipera bivalvis (S).
Didipera, Herbe dianthère (F). *Balsam herb (E).* *Balsamkraut (D).* *Didipera (I).*
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الاقتنيات



طويوة التيجليات



طويس

الاشي مكها في فصال الاوراق فينتف من رقات دقيقة حراء الون كسروب الصال ويقيم لها حتى الاكمال .

١٧٤٨٦ - **طيفار الشوفان** * ، **ميسيل الشوفان** *
Mayetiola avenae (S). Cécidomyie de l'avoine (F).
حشرة من الطيفاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م . نوبا
الى الزهرة يعلوها مولج جزوي || رقاتها تركب الشوفان
وتقتل فيه قبل البشار للميد في القمح والشيلم .

١٧٤٨٧ - **طيفار الصنوبر** *
Cécidomyie pini (S). Cécidomyie du pin (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر يطول
من ٢ الى ٣ م . رأسها مكور ، شديد السرة . عيناها
زيتان . زباناها غيطيان ، مستطيلان . صدرها الى
السرة الجزوية المراج . بطنها الى السرة الحمار المراج .
زغبها الى العرة النضية . وراثها قسطانيا الون . قواها
مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى
اواخر حزيران . تألف حراج الصنوبر . تمتع الاش
مكها في القشور قرب التابات التي يسيل منها الراتنج .
البرقة برقالية الون تمش على المواد الحشوية والراتنجية
حتى الاكمال .

١٧٤٨٨ - **طيفار العوسج** *
Lasioptera rubi (S). Lasiptère des ronces, Cécidomyie des ronces (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر يطول
من ٢ الى ٣ م . رأسها مضطبع . عيناها زيتان . زباناها
غيطيان . صدرها اسفر تملو ثلاثة خطوط سود متحممة
القاعدة . بطنها يرمي الشكل اخفر ، تملو ستة خطوط
مغرزة . رزها مستطيل . وراثها صيران ابيضان .
قواها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى
تشرين الثاني . تألف المواق التي يكثر فيها العوسج ||
تمتع الاش مكها على المسالج فينتف بعد عشرة ايام
من رقات يضاها الون تبقى مجمدة حتى الاكمال تفرغ
القشور وتعلب .

١٧٤٨٩ - **طيفار القمح** *
Mayetiola tritici, Contarinia tritici (S). Cécidomyie
du blé (F). Wheat midge (E). Weizengalmücke (D).
حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا من ٢ الى ٣ م .
لونها الى الصفرة تمتع مكها حدة قاعدة سفا البر فينتف
من رقات تقضي عليه قبل تمام تكويته .

١٧٤٩٠ - **طيفار القنييط** *
Contarinia nasturtii, C. torquens (S). Cécidomyie
du chou-fleur (F). Swede midge (E). Kohlgalmücke (D).

حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا لا يتجاوز ٢ م .
نوبا فسفي الون . وراثها خلية . تركب القنييط في اول
عده فتتح مكها على برعمه القلب فينتف من رقات
تلتهم ثم تمرد الى الاوراق فتضك بها . اجيالها الحولية
ثلاثة .

١٧٤٩١ - **طيفار الكرمية** *
Contarinia viticola (S). Cécidomyie de la vigne (F).
Grape midge (E). Rebenblüten-galmücke (D).

حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا نحو ٣ م . نوبا
اسمر الون يعلو مولج اخفر . تمتع مكها على حشرات
الكرمية (الحشرة هي الزميمة بعد الاكاف) فينتف من رقات
تقرض داخل الحشرات وتقضي عليها .

١٧٤٩٦ - **طيفار** *
Petrogonia (F). Petrogony (E).
الطيامة نظرية بيولوجية فصولها ان كل جنس حيواني ير ،
في تكويته الجنيني ، بمراحل نمازية متسلسلة الظواهر
التبادلية تقيد في نهاية المطاف الى الشكل المختار .

١٧٤٩٧ - **طيفار** *
Parfum (F). Parfume (E).
كل ذي راتحة صرفة فواحة مستحمة من الحور والادهان .
ج الحباب وطوب .

١٧٤٩٨ - **طيفار العرب** * هو الاذخر ، اعليه .

١٧٤٩٩ - **طيط** *
طائر من طوالب الساق يعرف بالي طيط ، اعليه .

١٧٤٩٠ - **طيط متوج** *
Vannus huppé (F).
واجم ابر طيط متوج .

١٧٤٩١ - **طيفار** *
Cécidomyie (S).
جلس حشرات شارة من فصيلة الطيفاريات انولاه جديدة
جميعها صغيرة اللد تمتع مكها على البات فينتف من
رقات مؤذية تسبب الكثير من الاضرار || اشهر انولاه
واشدا اذى ما يتبع .

١٧٤٩٢ - **طيفار الاجاص** *
Contarinia pyriovora (S). Cécidomyie des poires (F).
Pear midge (E). Birnengalmücke (D).

حشرة من الطيفاريات طويلا يراوح بين ٣ و ٤ م . رأسها
اسود . زباناها غيطية حطية تتألف من ٢٦ فاصلة .
جوشها اسود يشبه مولج فصي . اربطها حطية زياه .
انها تمتع مكها في زهرة الاجاص فينتف من رقات تلم
الضرة أثناء نموها فتسد وتمتص || اضراره قد تكون
كثيرة في الانواع الباكورية . يكافح باستعمال احد
الحواشير القمالة غير المركزة على التماس .

١٧٤٩٣ - **طيفار البنفسج** *
Perrisia affinis (S). Cécidomyie des violettes (F).

حشرة من الطيفاريات صغيرة اللد ، حطية الون ، زياه
الجسم . تركب اوراق البنفسج فتضها وتمتع مكها على
صفحاتها السفلى فينتف من رقات دقيقة غبراء الون
تلم تنصل فتؤدي لتابات وتضم الاضرار بعد ان تسبب
قلبا .

١٧٤٩٤ - **طيفار التفلب** *
Perrisia cenophila (S). Cécidomyie des feuilles de
vigne (F).

حشرة من الطيفاريات صغيرة اللد سمراء الون تركب غلب
الكرمية فتضع مكها في البروق فينتف من رقات دقيقة
نحيلة لونها الى الصفرة تمش تحت البشرة على حبيرات ونسج
البروق .

١٧٤٩٥ - **طيفار السينديان** *
Lestremis leucophaea (S). Cécidomyie du chêne (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر ،
يطول نحو ٢ م . نوبا الى السرة الصفراء المراج .
رأسها مكور . عيناها زيتان . زباناها مستطيلان .
ملاسه رباحية الاجزاء . قواها مستطيلة . وراثها
صيران ، غضبان || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط
نيسان الى اواخر ايار . تألف حراج السينديان || تمتع



طيفار الاجاص



طيفار البنفسج



طيفار الشوفان



طيفار القمح



طيفار القنييط



طيفار الكرمية

١٧٩٧ - طيشّار مُبيد * ذُبَابَة هيس

Mayetia destructor (S). *Cécidomyia destructiva*, *Mouche de Hesse* (F). *Hessian fly* (E). *Hessen fliege* (D).

حشرة من الطياريات. طولهاراوح بين ٢ و ٤ م. ثوبها الى العنقة السوداء. يطنها الى الحشرة. زباناها مركبة من ١٤ فاعلة || تركب القنص والقيار والقيار: تظهر في نيسان ثم تنجح مكها في حلف الزرع فيقتل من يرقات دقيقة تلمن النصل وتتجه نحو الكمية حيث تختص التسع ويتسبب ذبول الحلف والنبات.

١٧٩٣ - طيشّار ورق الاجاص *
Perrisia pyri (S). *Cécidomyie des feuilles de poirier* (F).

حشرة من الطياريات صغيرة القند طولها نحو ٣ م. ثوبها الى العنقة الخفيفة. تظهر في اوائل الربيع فتتركب اوراق الاجاص وتنجح مكها على مسحاتها السفلى فيقتل من يرقات تنحصر حته اطراف النصل حيث تعيش حسل الحشرات النامية فضطها وتقتنها وتثقل عليها الكثر يوليني الجوري. لها جيلان في الحول الواحد.

١٧٩٤ - طيشّاريّات
Cecidomyiidae, *Cécidomyiidae*, *tonididae* (F). *Cecidomyiidae*, *Gall gnats* (E). *Gallmücken* (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة زهاء ٣٠٠٠ صنفها صغيرة القند. اجسامها مستطيلة رقيقة. ارجلها نحيلة وطويلة. قرونها الاستشرابية قلبية الشكل هلبية، طولها في الذكور يقتصر في الاناث. يرقاتها دقيقة، صغيرة، مدببة الاطراف. منسجها خاسل وبعضها طفيل او مفترس. تعيش حسل للنباتات والاشجار والركبات وبعض الاشجار والنباتات الفعرة. تنقص على النجس المجهرية وتسبب الاضرار في غنثف الاجزاء التي تصيبها كالثبرام والازهار والثمار والاوراق والسوق والجذور.

١٧٩٥ - طيشّر ، طيشور ، اُطيشّر

Oiseaux (F). *Birds* (E).

مفرد الطير طائر. والطيور صف حيوانات من الطقاريات. انواعها المعروفة زهاء ٢٥٠٠٠ تقسم الى ثلاث فئات او شصب: (١) الجولجيات (٢) القرواكش او العواوي (٣) عديجات افرش.

اما رتبة ولسائها حسب التصنيف الحديث، فهي موضوع الجدل التابع على الصفحة التالية.

١٧٩٦ - طيشّر ، تسر طائير
Alstyr (F). *Alstyr* (E).

الطير او لئسر الطائر نجم ثير من كوكبة العقاب. مركزه في رأس العقاب قبالة النسر الواقع من كوكبة القيثارة. يبعد من الارض نحو ١٦ سنة ضوئية.

١٧٩٧ - طيشّر العراقيب هو الشرق ، امله.

١٧٩٨ - طيشّر البكّل هو الخفاش ، امله.

١٧٩٩ - طيشّران
Vol (F). *Flock* (E).

انتقال الطير وبعض الحشرات التي تسير في الفضاء بواسطة اجتمعا.

١٧٥٠٠ - طيشّر *
Myripristis (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السيفيات القاتكات انولاه المعروفة قليلة العدد موطنها بحار المناطق الحارة انصها البحر الاحمر والخليج. اجسامها صغيرة القند طولها يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم. اقلها جميلة الالوان الزاحية لها الاحمر والازرق والوردي والاشهب والفضي.

١٧٥٠١ - طيشريّات
Ornithologie (F). *Ornithology* (E).

الطيريات او علم الطير جزء من علم المولدة يبحث في الطيور.

١٧٥٠٢ - طيشس
Myriades (F). *Myriad* (E).

الطيس العدد الحائل بكثرة.

١٧٥٠٣ - طيشسي *
Thalassophile (F). *Thalassophile* (E).

نمت ترمي يطلق على كل حشرة تعيش بعض اذار حياتها في البحر او في الماء الاجاج.

١٧٥٠٤ - طيشسل *
Pruine (F). *Bloom* (E).

مادة عضوية لزجة مستنقة ناعمة كثر القبار تقش بشرة الثمار والقنطور وما اشبه.

١٧٥٠٥ - طيششركه *
Tischeria (S). *Tischeria* (F). *Tischeria* (E).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اصطلحنا على مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف المراج التي يكثر فيها السديان || جسمها صغير، نحيل، شبه اسطواني الشكل. بسطها نحو ١٠ م. رأسها مستد الجرم يكسو بعض السيف. عنانها صغيرتان، بارزتان. خطها صغير. ملمسها قصيران، زباناها غطيان، مستطيلان. اجنتها خفيفة، لامسارية الاحداق. يطنها نحيل، كفيف الحسل. ثوبها الى السرة التنية المواج || سرقتها خاملة تعيش على اوراق النباتات الحربية. انصها السديان والمخلل.

١٧٥٠٦ - طيششركه مُمَكِّسة *

Tischeria complanata (S).
حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اصطلحنا على مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف حراج السديان والزان والبلص والمخلل || جسمها صغير القند. بسطها نحو ٨ م. رأسها مستد الجرم. عنانها صغيرتان، بارزتان. خطها ولسائها قصيرة. زباناها غطيان. اجنتها خفيفة، مدببة الاطراف. يطنها مكثاف الحسل. ثوبها الى العنقة السوداء المواج || سرقتها صغيرة، دقيقة، رقالة. تلمن نصال الاوراق وتعيش بين البشريين.

١٧٥٠٧ - طيششريكات *
Tischeriidae (S).

Tischeriidae (F). *Tischeriidae* (E).
فصيلة حشرات غرائشة من رتبة حرشيات الاجنحة. اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض القاطم البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة قنسية. رؤوسها معتدلة الجرم. لها فاعلتا مسترة بمضغ حشرية. قرونها الاستشرابية عيطية.



طيار سيّد



طيرة



طيشرة

الطير: شعيا ورتيا وصالها (حسب التصنيف الحديث)

[illegible]



طيطن منير



طيطري احر الساق



طيطري اخضر



طيطري البياض



طيطري البياض



طيطري سلفاني

وثني يبيض . اياهم وقوامه وكلاء سود الخمار . متقاربه
اخر الانتشاب جزوي للمطاط . سيقانه الى الاخر
القرنيزي || سر به قليل البعد من ٦ الى ١٢ . يأنف
النمق وضفاف المياه العذبة . ينش منه بين اصحاب
النمق .

١٧٥١٤ - طيطوي اخضر * تستاك

Totanus ochropus, Tringa ochropus (S). Chevalier
cul-blanc (F). Green sandpiper (E).

طائر من الطيطوي موطنه حوض البحر المتوسط . يحوي
من مصفه الى مشتبه معظم بلاد الشرق واروقه وافريقيه
التياليه والبرقيه || يأنف النمق وضفاف المياه العذبة .
ينش منه بين الاصحاب قرب الماء || ثوبه متركب
الالوان الزاهية انضر للوراج . فتنبكه ناصع الليان .
متقاربه اسمر . سيقانه الى الخضار الزيتوني .

١٧٥١٥ - طيطوي البياض *

Totanus stagnatilis, Tringa stagnatilis (S). Chevalier
stagnatilis, C. à pieds vorts (F). Marsh sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٤ سم . رأسه وعينه الى
الابيض الرمادي يطول تنطيط اسود مستطيل . ظهره الى
الرمادي الاخر تلوو رقة سواد . صدره وبيته واظفكه
الى البياض الناصع تمتلكه رقة برء . مبره . اياهم
وقوامه ميلة . متقاربه اسود . سيقانه الى الخضار الزيتوني .
سره به من ٢٠ الى ٥٠ . يأنف النمق وضفاف الانهر
والبحيرات . يسبح ويغوص . ينش منه في النمق فوق
التراب . الفصوصه مستطيل الشكل قليل البعد .

١٧٥١٦ - طيطوي البياض *

Totanus glareola, Tringa glareola (S). Chevalier
sylva (F). Wood sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه متركب الالوان
مرتب || يبيض لزواجا متفرقه يجمع الى اسراب عده
الزوح . يأنف النمق وضفاف الانهار والبحيرات .
ينش منه في الخللج وفي الادلج .

١٧٥١٧ - طيطوي سلفاني *

Totanus griseus (S). Chevalier gris, C. aboyeur (F).
Greysank (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متركب الالوان
الزاهية . ظهره اسود الريش . ريشه جزوي الخمار منق
بالابيض . رأسه وعينه غططان بالابيض بيله واظفكه
يبيضان . ذنبه مشوح بالرمادي الاخر . متقاربه اسود .
سيقانه الى السمره الخضراء || سر به بعد من ١٢ الى
٢٠ . يأنف ضفاف الانهر والبحيرات . ينش منه في
اصحاب النمق فوق التراب .

١٧٥١٨ - طيطيات

Teuthididae (S).

Teuthididae (F). *Teuthididae* (E).

فصيلة اسمك بحريه من كاملات العظم . اجناسها وانواعها
للمروقه قليلة العدد جميعها من اسمك البحر الاخر ||
اجناسها اعليبيه الشكل . حشكيه . وسيله الزعنفة
الظهيريه . رؤوسها معتدلة الجرم . غطاطها صغيره
لاستنفه . استنابها صغيره حاده وسيله الصف في التكوين .
اعرف اجناسها الطيط .

١٧٥١٩ - طيطن *

Gasterophilus (S).

Gasterophilus (F). *Gasterophilus* (E).

جنس حشرات من فصيلة الطيطيات وريه ذوات الجناحين .

ملاسها نحيله . مرافقها صغيره . بطونها كثيفه الحمل
التصير . سنانها مقنقه . رواشها سنانيه الشكل .
بررامزها تامه . غطاطها اكثليه وباميه للنمق ||
اساريمها لانقه . قربها خلجا الوؤن . عاداتها طبقه
تسحور داخل نفق السرقه . اشهر اجناسها الطيطير .

١٧٥٠٨ - طيط * *Teuthis* (F). *Teuthis* (E).

جنس اسمك بحريه من فصيلة الطيطيات . انواعه المروقه
قليله البعد اصلاها البحر الاخر || اجناسها اعليبيه
الشكل . معتدله القدر . تغفل من ١٨ الى ٢٦ سم .
اوثوبها الى الخلقه تنبر وتزهر في النصف السفلي وتسر
في النصف العلوي وتسر الى الرصاصي العاني في الرأس
والظهر || لحومها متوسطه الصنف . مأكوله .

١٧٥٠٩ - طيطان * هو كرات البر . اظله .

١٧٥١٠ - طيطن صغير *

Pteromalus puparum (S). *Pteromalus jouet* (F).

حشرة نافعه من فصيلة الطيطيات . موطنها بعض مناطق
البلاد المعتدله الحارة . تتغفل على البثوريات والكرنبيات
والدهونيات || جسمها صغير القدر يطول نحو ١ سم .
وثلاثه خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زبانتها غطبان
متفرجان . جوشها شبه اسطواني . بطنها يبغي الشكل .
مقطوم القاعه . مرزها صغيره مستقيمه . اجنحتها وديعه
تلطوا مشحه زرقاء خفيفه . ثوبها الى الخضار الاليس
الاسفع المولج .

١٧٥١١ - طيطيات

Pteromalidae (S). *Pteromalidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحه المنصورة .
اجناسها وانواعها المروقه نحو ٢٠٠٠ جميعها نافعه تتغفل
على الحشرات المؤذية من مختلف الفصائل || حشراتنا
صغيره القدر طول من ١ الى ٣ سم . اجناسها وديعه .
جوشها اسفر من بطنها القرويه المؤخر . قرويه
الاستقاميه تنابيه الاشكال . مرزاتها صغيره مستقيمه .
اوثوبها مختلفه الالوان يكثر فيها الاخضر || اشهر انواعها
الطيطن الصغير والديراق الهم والنارون القصير الزمان .

١٧٥١٢ - طيطوي

Totanus (S).

Chevalier (F). *Sandpiper* (E).

جنس طير من عماره الطوطيات رفسليه دجاسيات
الارض . انواعه ١٥ جميعها من القواطع . اوثوبها مرقة .
صدورها وبطنها يبيض . متقاربها مستطيله . شافه
المطاط . سيقانه دقيقه . اوصافها نحيله || يأنف النمق
وجاري الماء وضفاف الانهر والبحيرات . قربها الحشرات
على اختلاف انواعها والشرانيف والاصامك الصغيره .
تدش اوكارها في التراب وبين الاصحاب وفي الاجار .
اناثها تبيض نحو ٣ بيضات تحضنها وسدعا نحو ٣
اسابيع || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٧٥١٣ - طيطوي احم الساق *

Totanus calidris, Tringa totanus (S). Chevalier
gam-bette, C. à pieds rouges (F). Common redshank (E).

طائر من الطيطوي . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى السمره
الرمادية الزيتوني يطولها تنطيط اسود مستطيل . عتفه ويطه

1٧٥٢٨ - طَيْفِيَّة Spectroscopie (F).
Spectroscopy (E).
علم يبحث في طيف النور وهو ما يسمح وبتحليل
المناسبات الكيميائية التي تتركب منها الشمس.

1٧٥٢٩ - طَيْفِيَّات Chlamydospora
هو الفلّات الايسوي الشكل الذي يلفح ويحفظ بوزنات
القطر ج. طيلاس.

1٧٥٣٠ - طَيْفِيَّات Pallé (F). Pallé (E).
نمت تعريفه يطلق على كل ما هو منسوب الى رداء
الزهوريات وضدييات الاربيل. كقولك التجويد الطيلاسي
والاحساس الطيلاسي.

1٧٥٣١ - طَيْفِيَّات هو بيشة الدين ، اطلبها .

1٧٥٣٢ - طَيْفِيَّات Argile (F). Clay, Argil (E).
الطين اي الصلصال هو سيليكات الالومنيوم المالي يربط
غالباً غاروطاً باكسيد الحديد واكسيد المنغنيز وغيرها .
وهو اذا كثر في التراب صيره متدججاً صلباً . انواعه عديدة
تختلف باختلاف مركباته ومقدار كل منها . وهو حل
الوان من الاحمر والاخضر والجلوي والاصفر .

1٧٥٣٣ - طَيْفِيَّات وَحْلٌ ، وَحْلٌ Boue (F).
Diré, Silt, Mud (E).
تراب نام لرج يفسر الماء وقد يسهل على ربة الارض .

1٧٥٣٤ - طَيْفِيَّات حَقْوِيَّ Bol, Argile ocreuse (F).
Bols (E).
نوع من الصلصال الاحمر المروي الشان النام .

1٧٥٣٥ - طَيْفِيَّات حَقْوِيَّ Argile colloïdale (F).
Colloidal clay (E).
نوع من الطين القزج النام السهل التشكيل .

1٧٥٣٦ - طَيْفِيَّات Tinantia (S). Tinantia (F).
جس نباتات عشبية حولية من فصيلة الوردانيات مقبودة
التعريف حل اسم العلامة الفرنسي طينان (١٨٠٣-
١٨٥٢) || انواعها للمروية قليلة العدد ، جميعها سبروتية ،
مهدها امريكة الوسطى . سوطها غرهام لينة تملو من ٥٠
الى ٦٠ سم . اوراثها سفانية تطول نحو ٧ سم . وتعرض
نحو ٣ . تصهلها جاهد الصفحة ، خلي البشرة العليا ، امط
السل . انزاعها عتقوي التسجيع ، تاسي الاركان .
انزاعها زرقاء اللون او بنفسجية || تنورها يستمر من
نحو الى تشرين .

1٧٥٣٧ - طَيْفِيَّات دَبَاغ Prionus coriarius (S).
Prion coriarius (E).
حشرة خالصة من فصيلة القرزيات ورتبة مفدمات الاجنحة .
موطنها البلاد المعتدلة الحارة . تآلف الاحراج . خنافسها
تميش على غزوثها للمري . يرقاتها تميش على المواد النباتية

المنحلة في بطون ونبوط الاشجار اليابسة || جسمها
كبير القد يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . ثوبها ثنائي اللون ،
راسها وزباناها وكسلها وبطنها وبرازمها الى السواد
القمعي . ظهرها الى السمر الكستني . راسها كبير
الجرم . عينها صغيرتان . زباناها كيران . منطفان
الى الوراء . مستطان من الذكر و منثان من الانثى .
ظهرها مقطوع المخمس اللامع . غدها غديتها الصلبة .
برداها كيرتها القد ، حنطية اللون || جيلها لثني الحول .

انواعها المروية قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم ||
اجسامها متوصلة القد تطول من ١٢ الى ١٦ م . ورتوبها
كبيرة . مستعرضة . عينها كبيرة جاحضة ، شاحدة عند
التفتين . قرنها الاستشعارية شديدة التقعر تفتي بنسبة
دقيقة . اعطالها ولباسها صغيرة . كسلها مكورة ،
كثيفة الخمل . بطونها يرمية متكافئة الخمل . مرزاتها
دودة . رواشها كبيرة ، مبقية . قوائمها فشيطة . طيراتها
سريع الحركة ، يمد العينين || الجملانة تسرح في كل
مكان وتكتسب ذوات الحافر . البقرة تنقل باللمس الى
اشياء اقم الحاطية ثم الى المدة حيث تستقر حتى زين
الاكمال حيث تخرج مع الروث .

1٧٥٣٨ - طَيْفِيَّات Gasterophilidae (S).
Gasterophilidae (F). Gasterophilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المروية متوصلة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم .
تآلف الاساكن التي ترعاها الحفريات ان داجية او
متوصلة || اجسامها متوصلة القد ، تطول من ١٠ الى
١٦ م . ورتوبها كبيرة ، مستعرضة . عينها كبيرة ،
جاحضة . شاحدة عند التفتين . قرنها الاستشعارية
صغيرة . اعطالها ضامرة . ملابسها صغيرة . كسلها
مكورة ، كثيفة الخمل التقعر . بطونها يرمية الشكل ،
متكافئة الخمل . مرزاتها صلبة . رواشها قليلة التخصيب .
قوائمها نشيطة . طيراتها سريع الحركة شديدة الطين ،
يمد الاثني تبريق للكن فردياً حل ذوات الحافر .
يرقاتها شبه اعطالية الشكل ، مبطية ، عشارية السكر .
تمش المرحلة الاولى من عمرها في اشياء لقم الحاطية ثم
تنقل الى المدة تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج
مع الروث || انهر اجناسها الطين .

1٧٥٣٩ - طَيْفِيَّات Humidifier (F). To damp (E).
لين التي بواسطة المطيع الذي يزين الرطوبة اللازمة .

1٧٥٤٠ - طَيْفِيَّات Spectra (F).
Spectre, Spectrum (E).

1٧٥٤١ - طَيْفِيَّات Rale noire du spectre (F). Spectrum-line (E).

1٧٥٤٢ - طَيْفِيَّات طَيْفِيَّات طَيْفِيَّات Spectre solaire (F). Solar spectra (E).
مجسمة الاشعة الملونة الناتجة من تفكيك الضوء الشمسي .

1٧٥٤٣ - طَيْفِيَّات صوتي Spectre du son (F).
Spectrum sound (E).

1٧٥٤٤ - طَيْفِيَّات طَيْفِيَّات طَيْفِيَّات Spectre de la lumière (F).
Spectrum light (E).

1٧٥٤٥ - طَيْفِيَّات Anguilis (S). Anguilis (F).
طائر من طوائف الساق وفصيلة الزرقانيات . موطنه الشطوط
البحرية وضفاف الانهر والبحيرات . قوته الحشرات
والذباب والديدان والحوام . يمشى جماعات قليلة العدد ||
جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٠ سم . ثوبه الملوي
جمل الحلقه الخضراء المولج . ثوبه السفلي الى البياض
الماهي . عتقه مطوَّق بالاسود . راسه مبقع بالاسود والجلوي .
جناحه ذلق الطرف يلفح اللب . ذنبه غزوي الشكل ،
صغير الجرم . سلقه خيلة قيمة سمراء اللون .



طير



طيش دَبَاغ

تكثر فيها الجفة الرية . وروصها سفيرة ، مثاقيلها غليظة وصغيرة . سوافلها مستديرة . ارسافها قوية قصيرة . انثاها زاهية الالوان المتداخلة || انثاها كثيرة العدد . اجناسها ١١ تنتمي الى عارئين : الحبيبات والخريصات .

١٧٥٤٢ - طيهوج راجع طير .



طيهوج نيشاري

١٧٥٤٣ - طيهوج القردوس

Oiseaux de paradis (F). Birds of paradise (E).

طيور من مختلف الاجناس والانواع تنتمي الى فصيلة القردوسيات ورتبة الجوارح . وهي مشهورة بفرط نمو ارياشها الجميلة الالوان .

١٧٥٤٤ - طيهوج اهليكية ، طيهوج ذاكجثة

Volailles (F). Poultry, Fowls (E).

هي الطيور التي صار البادعا وتكسيها فاصبحت اليفة تربي مع الانسان ولا تخشاه كالحمام والديج والجهنيات وبعض القبط والاوز والغنم .

١٧٥٤٥ - طيهوج لا تحفص بيضها

Oiseaux qui ne couvent pas (F).

الطيور التي لا تحفص بيضها كثيرة العدد تجسمها مشرة اجناس تنتمي الى اربع فصائل : قتيقيات ، الشبانيات الخريجات والكاروبيات .

اما اجناسها فهي :

Indicateur (F).

الخريجات

Scythrops (F).

الشربوب

Mégapoda (F).

القشبان

Oxylophaga (F).

الصفص

Mégacéphale (F).

الطيطاب

Eudynamis (F).

السنهس

Molothre (F).

القلناس

Cathérura (F).

النهل

Coucou (F).

الوقواق

Lalpoa (F).

البوتوح



طيهوج كيب

١٧٥٤٦ - طيهوج هو عجلو الجروب ، اطليه .

Oiseller (F).

١٧٥٤٧ - طيهوجي

Bird-seller, Bird-fancier

هو بائع الطيور .

Germande (F).

١٧٥٤٨ - طيهوجين

هو الطوريين ، اطليه .

Aunée viqueuse (F).

١٧٥٤٩ - طيهوج

هو الطيطاب . اطليه .

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تسمى في الليل . تسافد بعد ظهورها باسمروج . تروى المكان في شقوق الشب المطروح ارضاً || البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ الجرم شبه اسطواني الشكل ، حنلي اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواج || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما يتفشي في الثروة فمن صلبة من المواد الليفة واللصوية المسجونة بالرياح .

١٧٥٤٨ - طيهوج ، غيريس

Tétras (F).

Grouse (E).

جنس طير من عارة الخريصات وفصيلة الطيوريات له زومان القشباري والكبير || والطيروج يتميز بكبر الجفة وكثافة الريش . مثاقير غليظ الاعول ، حاد الحافة ، احقت البقرة . ثوبه متراكب الالوان المتداخلة المابقة للامعة . وهو يختلف بين الذكر والانثى || يأنف الاجراج الجبلية الكثيفة البهجة عن السران . قوته البرام والبار والحروب والديان والحشرات || اثناء تنش في القنوس تدبره بين الخننج والخنجر حيث تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحفصها وسدا نحو ٣ اسابيع .

١٧٥٤٩ - طيهوج ليكاري ، غيريس الشرق

ذلك التامول

Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix (S). Tétras lyre, Petit coq de bruyère, Tétras à queue fourchue, Coq des bouleaux (F).

طائر من الطيور متوسط القد طول الذكر يراوح بين ٤٥ و ٦٥ سم . وطول الانثى ٤٠ الى ٤٥ . ثوبه متراكب الالوان يظلم فيه الازرق الاسفج المروج والاسود الشديد اللمعة . افخيه مستدير الريش الجانبى على شكل قشارة . زيكاه يبيض الريش وجزءه من مناكبه واباحه || موطنه فسح الارباء . يربط في الموائل الرطبة القليلة الارتفاع . يكثر ويؤوده في الشرق .

١٧٥٤٠ - طيهوج كيب ، غيريس الجبل ،

ذلك الخننج

Tetrao urogallus (S). Tétras urogalle, Grand coq de bruyère, Grand tétras (F). Capercaillie, Cock of the wood (E). Auerhuhn (D).

طائر من الطيور . كبير الجفة ، طول يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . ثوبه متراكب الالوان المابقة للامعة . افخيه اسود اللون مستدير الشكل يتألف من ١٨ ريشة . الانثى اصفر حصا من الذكر ثوبا الى الصبغة الصفراء يملو التحشم الاسمر من الرأس الى الاطراف ومن الخلق الى الزنكي || موطنه شامخ الاطراف يمتد من الهند الى شمالي اوروبة . يأنف الاجراج الكثيفة اعصها اسراج الصوري .

١٧٥٤١ - طيهوجيات

Tetraonidae (S).

Tetraonidae (F).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات اطرافها مختلفة الاجسام

ظ



ظبي



ظبي الثبت

١٧٥٥٥ - ظبياء

الظبياء كواكب .

Acacia mellifera (F).

١٧٥٥٦ - ظبئة

هي السبط المصل من الاشجار المغيرة الزهر التي يكثر وجودها في بعض سفاب جزيرة العرب .

Ajuster (F). To adjust (E).

١٧٥٥٧ - ظبط

Antilope (F). Antelope (E).

١٧٥٥٨ - ظبي *

حيوان وسيد الجنس والنوع من ذوات الظلف المخبرات المخرجات القرون . وهو رشيق القوام ابيض القد ، يطول نحو ١٢٠ سم . ويصلو ٨٠ ، بينا ذنبه لا يتجاوز ١٦ سم . رأسه معتدل القد ، خطبه مستدير الطرف ، عيناه كبيرتان فرحان . اذناه جالستان محدبتان ، جريزوه دقيقة وقوية . ثوبه يختلف باختلاف الشق والزم . الذكور البالغة احين ثوباً من الاثاف والذكور الفتية . قرون ذكورها متشعبة ، متشابيه الخيد ، خماسية الدورة القرنية تطول نحو ٥٠ سم . اما الاثاف فجاء الرووس . ثنائية الاخلاف ، فردية الطل . ج ظباء .

Cephalopa (F).

١٧٥٥٩ - ظبي أزرق

هو الحليم ، اطلبه .

Cervicapra (F).

١٧٥٦٠ - ظبي أسود

هو القنبر ، اطلبه .

١٧٥٦١ - ظبي الثبت * ، شيرؤو

Pantholops Hodgson (S). Pantholops de Hodgson, Chiru, Antelope tibétaine (F).

شيرؤو هو الاسم المشهور في بلاد التبت . حيوان لبون عظيم من الظباء . موطنه نجد التبت من ارتفاع ٤٠٠٠ الى

Ectoproctes (F).

Ectoprocta (E).

ظاهرات الشرج فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز بنشوز الشرج خارج لطاق القواس .

١٧٥٥٠ - ظاهرات الشرج

١٧٥٥١ - ظاهرات المتك

Ectognathes, Ectotrophes (F).

رتبة سشرات دابة من طائفة هدية الاذئاب . تتميز بالظلاق متكها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل غيبية الشكل . اجسامها مستطيلة يكثر فيها الشكل المردني . جميعها دالة هواكة ونسبا الناعلة والقارضة التي تلتص الكتب والنياب . اجناسها وانواعها زهاء ٣٥٠ تجمع الى فصيلتين : لشمسيات والظنبريات .

١٧٥٥٢ - ظاهرات زوئية

Manifestations orageuses (F). Tempestuous manifestations (E).

هي العواجل الجوية التي تسبق او ترافق الزلازل والاعاصير كالرياح والقيار والسحب .

Phénomène (F).

١٧٥٥٣ - ظاهرة ، مكشع *

Phenomenon (E).

هو كل تحول يحدث في حالة الجسم او في خصائصه . فان لم يكن مصحوباً بتغير في طبيعة مادته سمى ظاهرة حكمية (فيزيائية) . اما اذا اقترن بتغير في طبيعته فهو ظاهرة كيميائية .

Phénoménisme (F).

١٧٥٥٤ - ظاهرة

Phenomenism (E).

الظاهرة وتسمى الحمولية والمنشعية ، ملحق فلسفي يقبل بان المعرفة محصورة في الظواهر او في الحوادث الحسية . وهو بذلك يتناقض الانتولوجية اي علم الكائنات ذلك لانه لا يبحث في الاسباب ركنة الانتولوجية .



ظربان



ظربان امريكي



ظرفة



ظرو

Précaire (F). **ظَرْفِي** ، **وَكْشِي**
Precarious (E). قابل الابطال والازوال .

Cloportes (F). **ظَرْفُوط**
Wood-louse, Slat, Sow-bug (E).

دويبة من القشريرات مساويات الاجزالي مشهورة باسم حمار قبان اطليه .

Oniscidea (S). **ظَرْفُوطِيَّات** *
Oniscidae, Cloportes (F). Wood lica, Sow bugs (E).
Kellersassin, Landasseln (D).

فصيلة دويبات من القشريرات مساويات الاجزالي . اجسامها وانواعها المروفة قليلة العدد . اصلها البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالمين القديم والجديد . اشهر انواعها الظرفوط المروف بحمار قبان والظرفوام والكريس .

Koelreuteria (S). Koelreuteria (E). **ظَرْو** *

جنس نباتات شجرية من فصيلة البتديات . انواعها عديدة معظمها حسبي وبري . جميعها اشجار وشجيرات مرسة . اوراقها مركبة متعاقبة حاملة . ازهارها مستقلة الغلظات ، رباعية البتلات ، صفراء اللون ، متشكلة التجميع ، لاجبية الانكاز . اشهر انواعها ما يلي .

17577 - **ظَرْو اُسود** هو البكت ، اطليه .

17578 - **ظَرْو سُتَائِي الریش**

Koelreuteria bipinnata (S). Koelreuteria bipinnata (F).
نوع من الظرو شجرية كبيرة القدر تملو نحو ٢٠ م . اصنافها واثانها متراكبة . اوراقها كبيرة القدر ، وورقاتها عديدة وثرية التجميع ، نصلها يضي الشكل ، مسن الحافة ، خل الصفحة السفلى بطول نحو ٧٠ سم . وورقاتها ثنائية الریش . نصلها يضي الشكل ، مشاري الحافة ، مائل البشرة . حنايكه الزهرية كبيرة القدر تملو براوح بين ٤٠ و ٥٠ سم . ازهارها يدم طول شهر تموز .

17579 - **ظَرْو عُنْكَوِي**

Koelreuteria paniculata (S). Koelreuteria paniculata (F).

نوع من الظرو شجرية سرولية تملو نحو ١٧ م . اصنافها واثانها متراكبة . اوراقها كبيرة القدر ، وورقاتها عديدة وثرية التجميع ، نصلها يضي الشكل ، مسن الحافة ، خل الصفحة السفلى بطول نحو ٩٠ سم . وورقاتها ثنائية الریش . حنايكه الزهرية فائقة قمرها نحو ٤٠ سم . ازهارها مغرية يحمرها النمل . ازهارها يستمر من سززان الى تموز .

17580 - **ظَرْو تحليكي**

Koelreuteria apiculata (S). Koelreuteria apiculata (F).

نوع من الظرو شجرية سرولية صغيرة القدر تملو نحو ٦ ا متر . اتانها واثانها زينة العمار . نصلها صريرة ، وورقاتها احليجية الشكل ، شيرة رصيرة ، نصلها خل البشرة عل صفحته . حنايكه الزهرية كيفية التجميع قمرها نحو ٣٠ سم . ازهارها مغرية يحمرها النمل . ازهارها يستمر من سززان الى آب .

17581 - **ظَرْوِيَه**

Helminthosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الفريديات فضيلة الطمبات . جريه الكيفية ملوقة منصبة حزية التجميع . كائله طرية او جانبية الانكاز ، يضي او عطرية الشكل ، مرفورة ، شفعية الانقسام . انواعها عديدة تضلل حل تخلف النباتات ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٠٠٠ م . من سطح البحر . يالغ السهل والادوية الرية الخنجات . يحرق في الصباح وين البصر الى الغضفة . خشفه الذي يارى اليه في النهار سفيرة في الليل تخفيه عن العين . ملجته الحياتي فردي ، لذلك لا يقترب من الاثر الا في زين الؤاق والساعات بترقان جسمه متوسط القدر بطول نحو ١٢٥ سم ، ويرتفع نحو ٨٠ سم . قلبه ١٨ م ، قرنه ٦٠ م . ثوبه الى الصبغة تفسر في الرأس والظهر وتبيض في البطن . جبهة الذكر وعصره الى العرة العاقبة . قراءه احيوان ، شديدة السواد اللامع . الاثر جاء ثنائية الخلف تقص شاذاً واحداً في اوائل الصيف .

17567 - **ظَبِي الزَّهَر** (F).
Oristragus sauteur (F). حيوان ليون يجتر من الغطاء يضي قطار ، اطليه .

17568 - **ظَبِي شَيْخَانَه** (F).
Antilope tchikara (F). حيوان من الغطاء يضي شخانة ، اطليه .

17569 - **ظَبِي عَرَبِي** هو الآخر ، اطليه .

17570 - **ظَبِيَكَة** (F).
Biche (F). Hind (E). انثى الكلب ج غياض وطيئات والظ . كتيها ام الخشت وام شادن رام الغلال .

17571 - **ظَبِيَة** (F).
Vagin des solipèdes (F). Vagina of solipeds (E).

الحياء من كل ذي حافر (السان) ومنبرج الودي والجرب الصغير وربما كانت الضربة لكيس اثنت مصعقة منها .

17572 - **ظَر** ، **ظَرْوَة** (F).
Slux الحصر الصواني احدى الاطراف ج . ظران وأظرة .

17573 - **ظَرْو** هو القرب اليايس من شلة البرد .

17574 - **ظَرْب** (F).
Butte, Pierre saillante ج ظرب . ما تآ من الحجارة .

17575 - **ظَرْبَان** ، **ظَرْبَان** (S).
Ichthyomys (S). Ichthyomys (F). Ichthyomys (E). حيوان من اليايس صغير الجبة ، تجس الرأس ، اسلم الاذن ، صفراء بويان ، اسيد المرأة ايض البطن ، قصير القروان ، مسن الراحة الكرية . ج ظرون .

17576 - **ظَرْبَان امريكي** (S).
Mephitis (S). Mofette, Mofette (F). Shunk (E).

نوع من الظربان يعيش في امريكة يتصل باكثر صفات ظربان الجزيرة ومنها التثانة التي يفر منها الانسان والحيوان وثنااته حله مسددها جراب يحيط بقاعته الذنب يتجمع فيه مادة سائلة قلبية مدنية التركيب يستعملها الظربان لثقل عند الحوك والفلان من الناس . وهو تجس الرأس . طول الخلم . مستطيل الذنب الكث .

17577 - **ظَرْفُوطَة** (S).
Patunculus (S). Patoncle (F). Patunculus (E).

جنس حيوانات مجرية من الرضويات فضيحات الحيات وفضيلة الفلكتاي . انواعها الماصرة المروفة عديدة مشفرة في مطر بحار المال . اصنافها شبه مستديرة الشكل ، متساوية الصاربع المربعة ، الخفدة ، الملية . تعيش بين الصخور وفي الزبال البعيدة الدور .

طولها ٧ سم. وعرضها ٣ سم. بيضا ينحرف لونها الى الجوزة يطوقه حمار قاتم || يسبب ذبول الارواق وقلة الانتاج. يكافح بتطهير البذار قبل زده.

١٧٥٩٠ - ظُرَيْرُكِل * Zorilla (S).
Zorilla (F), Skunk (E), Banditica (D).

جنس حيوانات ليلية ضاربة من فصيلة السرمويات انواعها للمروعة قليلة اسفلها البلاء الافريقية بني قريية الشبه من الزرنب. اجسامها مستطيلة مستقيمة طولها براوح ٨٠ سم. ووزنها غزولية القالب. قوائمها قصيرة، اذنانها جلقة طويلا مثل الشكل طولها نحو ٢٥ سم. اذنيها الى الصهبة السوداء طويلا ورووسها مخملية بالابيض والاسود. قوتها اثمار والجزر والبلبر والوزغ والحيات وجميع الحشرات.

١٧٥٩١ - ظُرَيْرُشِي * Zonotrichia albicollis (S).

Chingolo à gorge blanche (F).
طائر من فصيلة الثرشوريات. موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية. يألف المزارع والاماكن الاطعمة كاللوري. نظامه الحياتي حامي || جسمه صغير يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة الحمراء المواج يعلوها تسبيج اسود. رأسه مرقوش بالكسيتي والاسود. زوره ابيض. عسراه وصغره وصدره الى الريدة. حقة عينه كسيتية اللون. متفاده ووساه الى السمره. جناحه مستدل الحسم. ذنبه مستطيل الشكل، مغروس الطرف القليل الاستدارة || قوته البور البرية والاثار العتية. تتركبه مستحب الالاحان الطيفة || يطنش عنه في الاغصان والاشجار القريبة من سطح الارض. الاثني تبين من ٣ الى ٤ يبيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٥ بيضا.

١٧٥٩٢ - ظُنُونُ اُدْهَس * Erythrosterne parva (S).

Erythrosterne rougeatre (F).
طائر من الفصاوير الجواثم سنيات النقيذ فصيلة المنيابيات. اصطناعه تمتد من الهند الى اوروبا يحوي حبها وبجبالها ذهابا وايابا كل عام. يألف الادغال والنباتات. قوته الحشرات المنجية اغصها يتقلب || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه يتقلب الى الاسود ويختلف بين الذكر والانثي. الذكر عند بلوغه الاثنا يكون جوي الراس والرداء والجناح والذنب وازرق الحمر، احمر الزور اصفر الصدر، ابيض البطن. ثوب الانثي الى الشبه للسمره تقي في الرأس والرداء وتهيته وتغير في الصدر والبطن. يطنش عنه في الشجيرات المنصبة الارتفاع بين الاغصان والفروع. الاثني تحضن بمثابة الذكر من ٤ الى ٦ يبيضات. التريثم يستمر نحو ١٣ بيضا.

١٧٥٩٣ - ظُنُون Dromedary de somme (F).
Dromedary de burden (E).
البعير يحمل ويحمل عليه. ج. ظن.

١٧٥٩٤ - ظُفَّاف * Eudytes (S).
Gorou (F), Gorou (E).

جنس طير من عديات الريش، كفتيات القدم وفصيلة الطرسويات. انواعه المروعة قليلة العدد اصطناعه حمار القتب الجنوبي || اجسامها شبه غزوية الشكل. حبها حسم البط المفلوط. وروسها صغيرة متوجة بكشاش ملونة. سناقيها جنوبية اللون، عسده الاثناك العليا البائرة السطام.

١٧٥٨٧ - ظُرَيْرُ الثُّوم *

Helminthosporium alli (S).

فطر مجهرى يتطفل على فصوص الثوم فيصطبها || مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل تركب فصوص الثوم في طويها الثشوي فتخرج الكشور المتحارة به ان تشبه بنشابة مابية سوداء اللون تقيدها الى السط. يكافح بتطهير القصص، قبل زرعها، بسائل الفروبول المخلول ١/٢٠٠.

١٧٥٨٣ - ظُرَيْرُ الخِيلَك * Helminthosporium cucumerinum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الخيار فيصطبها ويؤدي النبات || مظهره الخارجي يقع نسبية صفراء اللون قطرها نحو ١٥ م. تركب التصل على صفته العليا يتأهلها على السفلى لطفة خلية رصاصية || يكافح بتطهير البذار قبل استعماله.

١٧٥٨٤ - ظُرَيْرُ الشَّاي * Helminthosporium theae (S).

فطر مجهرى رمي يمتري جنيت الشاي الياصة فيركب على الجلود والقضبان ويتكاثر عليها.

١٧٥٨٥ - ظُرَيْرُ الغُصْن * Helminthosporium gossypii (S).

فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع القطن في ظروف خاصة قوامها استحكام الجفاف الجوي مغروبا بارتفاع الحرارة واستمرار الارتفاع مدة من الوقت || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة وديدة او قرنزية اللون تركب الاوراق والكؤوس الزهرية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية.

١٧٥٨٦ - ظُرَيْرُ المَصَان * Helminthosporium sacchari (S).

Eye spot de la canna à sucre (F).
فطر مجهرى يتطفل على اوراق المصان. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة حمر اللون، سوداء الحور، صفراء الحار تركب نصل الاوراق الفتية على حدود زلفها الأخير. اضراره زهيدة لا تستوجب العناية.

١٧٥٨٧ - ظُرَيْرُ المَطَّاف * Helminthosporium mayae (S).

فطر مجهرى يتطفل على الماط في طوره الثشوي. تركب الاوراق فيرقشها يقع صغيرة سمره اللون تتحول تدريجيا الى بقع قديمة تشبه التصل دون ان تقوي النبات.

١٧٥٨٨ - ظُرَيْرُ المُرُز * Helminthosporium musarum, H. torulosum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق ومزارع المرز || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون تركب التصل بموازاة اعصابها ثم تلصص فيصفر لونها به ان تصعد بشره البنية الرقيقة || يحو على الثابر جذاف يحمل غمام كثيرة يقوحو الى اسوداد القشرة ويضها || يكافح باستعمال سائل بورود المركب ١٠٠/٢/٣. ح. ثلاث مرات. الاولي عند ظهور المرض على الاوراق والثانية بعد ظهور الطرح والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع.

١٧٥٨٩ - ظُرَيْرُ لَدِي * Helminthosporium turcicum (S).

فطر مجهرى يتطفل على الذرة الصفراء وقد شوهد في ظروف خاصة على المنقة والشيطان والشعير والمصان والارز. مظهره الخارجي يقع قديمة الشكل تركب الصف في نصله وعنده. ثوبه ضيقة سمره اللون ثم تستطيل وتوسع فيلف



ظُرَيْرُ المَصَان



ظُرَيْرُ لَدِي



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرُشِي



ظُرَيْرُ اُدْهَس



ظُفَّاف

التياسخ وفضيلة الكليات. اطلانه تحت من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || صفته سيكة ، غليظة ، ثنائية المصارع للاستهلاكية ، مجهزة بخضعة شديدة . جسمه صلب الجرم ، حاد المناسبات ، مستطيل الرجل || يعيش اصلاً بالصخور المنصورة .

١٧٦٧ - ظفيرة هي النسخ البري ، اطله .

١٧٦٨ - ظفيرة * Thalyphonus (S).

Thalyphos (F). موية سامة من الرتلات . مهددا البلاد المارة والاستوائية . تتميز باستطالة الذنب والجرايز || فيها الى الطحلة يبر في الرأس ويسمر في البطن وفي اللسان . لسمها سامة مؤذية || تسرح في الليل وتلوى الى جلود الارواح النخرة في التبار ، فيها الحولم والجلدات .

١٧٦٩ - ظلّ Ombre (F). Darkness, Shade (E).

ظلال هو يقرض الفصح وهو المنطقة المظلمة التي يكرها الجسم الذي يمتدح سير لثة النور .

١٧٦١٠ - ظلال

داه في قوائم الدابة لا من سير ولا من تب .

١٧٦١١ - ظلع Défaut (F). Défaut (E).

١٧٦١٢ - ظلع Chaleurs des chiens (F).

هو ماعلة الكلاب . ويقال للكلبة المستعرة طاعمة . اما الكلب فظالم .

١٧٦١٣ - ظلف Ongle (F). Hoof (E).

ظفر كل حيوان يجتر كالبقرة واكشاة والظفر ... وهو كالحافر للفرس وكالكف للبعير .

١٧٦١٤ - ظليف Rocailleux (F).

Rocky, Pebbly, Flinty (E). لمت تمريني يعلق على كل سطح تكثر فيه الصخور لتناثرة .

١٧٦١٥ - ظلف الفرس

ظلف الفرس يجمر لير من كوكبة السجاجة .

١٧٦١٦ - ظلم Stuvia, Piqueria (S). Stévie (F).

جس نباتات خشية معمرة برية وزينية من سبط الفصليات وفضيلة المركبات . الزواله مديدة . اوراقه ثلاثية المروق . السلية منها الوسطى متعاقبة الى العليا فصائية . ازهاره رومبي . رويته مركبة من ثلاث او خمس اذهار متساوية . اشهر انواعه الزينية ما يتبع .

١٧٦١٧ - ظلم أرجواني Stevia purpurea (S).

Stévie pourpre (F). عفة معمرة زينية جادة تملو نحو ٧٠ سم . ساقها فراء فائقة . اوراقها غنضة النصل ، خلية البشرة . ازهارها حلقة التجميع ، ابيضات اللون || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٦١٨ - ظلم عُرْصُفِيّ الزَّوْكَ

Stavia ivaeifolia (S). Stévie à feuilles d'Iva (F).

شبة معمرة زينية جادة تملو نحو ٦٠ سم . ساقها

اصنافها مستطيلة . اجنتها جذاقية ، حشفية الریش . اذنانها جداد كاسية . اقلوبها ملونة ، رؤوسها واصنافها وظهورها واجنتها سود . صغورها ويطونا يبيض . كشائنها مذهبة اللون او رمادية او ليلكية || قوتها الاسماك والقرشيات ويض الرضويات || ملحتها الحياتي جماعي . اسرارها او بالاحرى مستعمراتها تمد من ٢٠ الى ٣٠ الف نفر .

١٧٥٩٥ - ظفر ، ظفر Ongie, Sabot (F).

Nail, Hoof, Claw (E). الظفر مادة قوية تنبت في اطراف الاصابع . ج انظار واطافير .

١٧٥٩٦ - ظفر العنكب

ظفر العنكب ضرب من كليات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٧ - ظفر القط Pied de chat

عشية برية معروفة برجل القط ، اطلها .

١٧٥٩٨ - ظفر اللسر

ظفر اللسر ضرب من كليات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٩ - ظفرء هي النسخ البري ، اطله .

١٧٦٠٠ - ظفيرة

لبات حريف يتبع القروح الخبيثة والتأكيل . (اللسان) .

١٧٦٠١ - ظفيرة التجوز Graine de cribule

هي ثمرة الحسك . اطلب حسك .

١٧٦٠٢ - ظفيرة الزلان

ظفيرة الزلان كواكب (محيط المحيط) .

١٧٦٠٣ - ظفوف * Tornatella (S).

Tornatelle (F). Tornatella (E). جلس حيوانات بحرية من الرضويات مدييات الاربل وفضيلة الباغية . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اخصها الهند والبحر الابيض المتوسط || اصنافها بضية مستطيلة ، محزنة الاضباب ، مستطيلة الذبعية الاستوائية الرضاية . حيلة التبيح ، زاحية الالوان .

١٧٦٠٤ - ظفبات Myrianglucose (S).

Myrianglucose (F). Myrianglucose (E). عمارة طور مجهرية من فضيلة البقيات . اجناسها وانواعها مديدة . اجربها الزقية كروية الشكل سطحية الارتكاز . اذنانها ريمية . نكاتها اهلجية . غلاتها غشائية المادة ، نصفية ، مستعرضة || منها نوع واحد مؤذ يدمى الصب .

١٧٦٠٥ - ظفبتر ، زالدة Onglet (F). Mitro (E).

جزء الباق الملمعة الذي يترك ويتأ فوق الظلم ، وهو ايضا ما يترك من النسخ الملقم فوق آخر عين .

١٧٦٠٦ - ظفتر * Cleidothaeus (S).

Cleidothère (F). Cleidothaeus (E).

حيوان بحري وسيد الجلس والتمن من الرضويات صفيليات



ظفر



ظفر



ظفيرة

اصطابتها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية من الماعلين القدم والجدي || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحشة. قرونها الاستشعارية صغيرة الاطراف. تأثير الذكور مستطيلة شديدة. كروسلها كبيرة عجيبة. انجدها لائحة. اوزانها متباينة الاناث منها الاجر الاسفع المواج والاعصر والبسجي والذهبي || تألف الحراج الجبلية ولا تقرب الصنوبريات. تعيش في جلود الاشجار النخرة. يرقاتها غاشية مخضية.

Collet de l'arbre (F).

Neck of the tree (E).

هو اصل الشجرة اري مركز اقتساب الجلود على الجذع.

١٧٦٢٩ - ظلم

١٧٦٣٠ - ظنبار عشاري النقط

Zonabris decimpunctata (S). Zonabris à 10 points (F).

Zonabris decimpunctata (E).

حشرة طيبة واثمة خاضعة واثمة من فصيلة الملويدات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. غنائها تعيش على بتلات الاوراق وعلى التوت. يرقاتها تعيش في اول عودها على المواد المضوية ثم على ما تستطع اقتراسه من الحشرات الدنيا. الخفض التي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريمة الرائحة. تحوي في شواربها وفي جهازها الهضمي مادة ناعطة تخرج بشرة الجلد وتثير الباء والايلاج || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. قرونها اسود الرأس والاكوسيل والطين والبراز. اصفر الظهران المنقط بالاسود. رأسها صغير الجسم. زباناها صولجانيان. عيناها صغيرتان. ظهرها منقط الاحديداب و مستطير الطرف الاحف. غنداه خاضية المنقط السود || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اوامر تموز. تسرح في النهار. تساقط بعد ظهورها بظلاله اسابيع وتتبع المكان تحت غلاف الاشجار وتقومها وتحت الجملانة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٠ مم. جسمها مبسط الشكل، سداسي القروارب، اغبر اللون. اسمر المواج، عتاي الرأس، ضلع انتائير || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما يتقضي في القوية.

Heteropatalia (S).

١٧٦٣١ - ظنبة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلايمات. بكتيداته سطحية الارتفاع، كرشية الشكل، جلدية الجبل الاسود، كروية الانفلاق. بوفاته قوية الاحديداب، طيبة الاطراف، مؤثرة الانقسام، شافقة || اوزامه المكؤبة قليلة لغرضها ما يتبع.

١٧٦٣٢ - ظنبة الترنفل

Heteropatalia dianthi, H. valtellinensis (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الترنفل فيعطلها ومنعها عن القيام بوظيفتها || ينمو على الازراق في اول عهده لطفًا مستطيلة محتلة اللون ثم غبراء تركب ساقه التصل الى كامل زامه الاعلى || وهو في طوره الثاني نقط سمر تملو الطلع تنسب انتساع البشرة وانزعاج النسيج || يكالغ بنفسه التثليل باسء الفواظير الخففة وذلك بعد انتساع الازراق الموسوية. ومن الضروري انتساع الازراق عند ظهور الطلع.

١٧٦٣٣ - ظنبة السيسم

Heteropatalia antirrhini (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق السيسم فيعطلها بعد ان يقرح

فرواه زياه. اوراقها عرصية الشكل، مستطيلة التصل، دقيقة الزام الاخير. انجدها بيضاء اللون، خلية البشرة انزوارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

Stevia eupatoria (S).

Stévia eupatoire (F).

حشة عمرة زيبية جاحدة تطو نحو ٦٠ سم. ساقها فرواه مرطاه. اوراقها سنائية التصل. سنة الزام الاخير. انزوارها ودية اللون || انزوارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

١٧٦٢٠ - ظلم مستن

Stevia serrata.

Piqueria trinervia (S). Stévia denticulée (F).

حشة عمرة زيبية حبروية تطو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروها خلية الساء. اوراقها متماثلة، نصلها سنائي الشكل، مالى البشرة، سنن الحافة. انزوارها حر. انزوارها يستمر من تموز الى ايلول.

Softfuges (F).

١٧٦٢١ - ظليبات

رتبة من المنكبويات ترتب في الظل وتخشى الشمس.

Umbraticole (F).

١٧٦٢٢ - ظليل

نمت ترمفي يطل على كل حشرة تعيش في الظل وعلى كل نبات ينمو في ظل غيره.

Pénombre (F).

Penumbra, Semi-darkness (E).

هو الظل الخفيف او شبه الظل الذي يحوق بالظل.

١٧٦٢٤ - ظلم، عسقي، عسقي

Austruche (mâle) (F). Ostrich (male) (E).

ذكر النامج اظلمة وظلان. يقال عار الظلم حرارًا اذا صوت.

١٧٦٢٥ - ظلمع

شجرة على صورة كلب. وهي ايضا شجرة التين في لغة طيو. الراسدة ظلمة او ظلمة. وينهم من قال شجرة الباق.

١٧٦٢٦ - ظلمعة ذهنية الورق

Castanopsis chrysophylla (S).

Castanopsis à feuilles dorées (F).

شجرة حبرية وفريبتية من فصيلة السوليات. ساقها غليظة صلبة تطو من ٢٠ الى ٣٠ سم. يحكلها دالح الثورن. اوراقها تطو من ٨ الى ١٨ سم. وتتمس من ٢ الى ٤ سم. نصلها جرداء لامعة، صفحتها العليا الى الخضار الزيتي صفحتها السفلى الى الصفار الذهبي. ثمارها قروية الشبه بالكستنة لكنها بطيئة النمو لا تنضج الا بعد مرور سنين كاملين.

١٧٦٢٧ - ظلميان

شجر ينبت بنجده يشبه القزط (السان) والقرط هو السط البري.

Lamprina (S).

١٧٦٢٨ - ظلمابكة

Lamprime (F). Lamprina (E).

جنس حشرات غاشية من عذبات الاجنحة صفيميات للقرون وظيفية المنظريات. انواعها المعروفة قليلة الممد



ظنبار عشاري النقط



ظنبة الترنفل



ظنبة السيسم

تجمع المكان في لحاء سوق الأشجار يفتتح فيها ويجعلها ويسهلها || أشهر أنواعها وأهمها انتشاراً قطعة الخشنة .

١٧٦١١ - **ففة مزرقة** *Emphytus cinctus* (S).
Emphyte cinct (F).

نوع من الففيرة . ثوبها إلى السرة السوداء يطولها زفير أصفر || يرقاتها شديدة الأذى تعيش على سوق النباتات تستخرج اللحاء والشكر .

١٧٦١٢ - **ففيرة** * *Pleurodelus* (S).
Pleurodèle (F). *Pleurodelus* (E).

ظهور هو الاسم للفرني القليل . جنس حيوانات عذبة قاذبة من السرفويات وصيلة السمندليات . أنواعه المعروفة قليلة العدد أصلها من بعض مناطق إفريقيا الشمالية أعصها القرب || أجسامها مستطيلة الشكل ، تطول من ٢٠ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقلطة ، فيه مقبضية الإخطام . أذنيها من سنة أختار التيجي القليل التشرز . أذنيها مستطيلة ، رفيعة ، سنة الحمار العلوي . أنثيا مزرقة وستجة وبذجة || تألف اللقاح والذكور والأناث . قنبا البندان واللباعيط والحوم التي تغلف في وجه الماء .

١٧٦١٣ - **ففيرة** هو الجانب القصير من الريش .

١٧٦١٤ - **ففيرة** *Epithélium* (F). *Epithellum* (E).
كل نسيج مكون من حبيبات أو خلايا صليحية التجميع تلتف أو تبطن الأجزاء الحية .

١٧٦١٥ - **ففيرة** *Epithélial* (F). *Epithelial* (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالظهارية .

١٧٦١٦ - **ففيرة** *Dos* (F). *Back* (E).
هو الجانب العلوي المقابل للبطن عند الحيوان يمتد من الحمارك إلى الكفل .

١٧٦١٧ - **ففيرة** *Elytre* (F). *Elytron* (E).
الظهر هو الندة الخشبية للفرني التركيب الذي يلفح جناح الحشرة من غشيات الإجنطة . وهما ظهوران وظهران وبدا في المصنوع من اجنطة الجراد ما حفرته : وقاليلطان يقال لها الظهران والفرنيان يقال لها التشران .

١٧٦١٨ - **ففيرة الأسد**
ظهر الأسد يجتر من كوكبة الأسد الأصفر .

١٧٦١٩ - **ففيرة** *Tortus* (F). *Tortoise* (E).
هي السلحفاة ، أطبقا .

١٧٦٢٠ - **ففيرة** *Dorsal*
نمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بظهر الحيوان .

١٧٦٢١ - **ففيرة** *Ficolidae* (S). *Ficolidae* (F).
Ficolidae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أجسامها وأنواعها المعروفة نداء ٨٠٠ مظهرها بري وبسها لحي وزراعي وربي . أعرف أجسامها الففيرة .

١٧٦٢٢ - **ففيرة** *Mesembryanthemum* (S). *Ficolide* (F).
ج ظهائر . الاسم العلمي من اليوناني بمعنى زهرة مستنبت

البار أي زهرة الظهر . جنس نباتات عشبية ليفية لحمية

نصلها || مظهر الخارجي يقع صخرة مستديرة ظاهرها نحو ٤ م . تركيب نصل الأوراق تنقضي على النجج المنحارة التي ليس وتنحت || يكافح عند ظهوره بانقطاع الأوراق الموصونة وينفخ الشتل بأحد القرواير القمالة .

١٧٦٢٤ - **ففيرة** *Tibia* (F). *Tibia* (E).
الففيرة عند الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ والرسغ . ويدهي الساق .

١٧٦٢٥ - **ففيرة** *Machille* (S). *Machile* (F).
جنس حشرات دابة من فصيلة الففيريوات . أنواعه عذبة جميعها خاضعة دامتة تعيش على التبل ولحاء الأشجار للمقطوعة . أجسامها حشرية الجلد ، مزرقة لشكل تطول من ٧ إلى ١٦ م . || أعرف أنواعها وأهمها ما يلي :

١٧٦٢٦ - **ففيرة أسطوانية** * *Machille cylindrica* (S). *Machille cylindrique* (F).
نوع من الففيرة طولها يراوح بين ٨ و ١٢ م . جسمه أسطواني الشكل ، ثوبه إلى الأصعب المابقة الخطية المالح . يتكرر في البيض والأذكال وبيجات الجنائن . يعيش على المواد العضوية السائرة إلى الإختلال وعلى لحاء النباتات اليابسة والمقطوعة .

١٧٦٢٧ - **ففيرة القباب** * *Machilis polyode* (S). *Machile polyode* (F).
نوع من الففيرة طولها يراوح بين ٩ و ١٢ م . ثوبه إلى الأصعب يعطو موج أشع ويضع سمر جانبة . ملامسه وزبانه وقوائم وأسراكه عذبة بالابيض || يتكرر في الغابات والأحراج . يعيش على التبل وجميع المواد العضوية السائرة إلى الإختلال .

١٧٦٢٨ - **ففيرة بحرية** * *Machilis maritimus*, *Petrobius maritimus* (S). *Machile maritima*, *Pétrobie maritime* (F).
نوع من الففيرة طولها يراوح بين ١٠ و ١٤ م . ثوبه إلى السرة السفاه المالح ، زبانه وقوائم سوية اللون الخشبي القامق . أسراكه عذبة بالابيض || يتكرر قرب الشواطئ البحرية وفي الجرف وعلى سفاف الأنهر .

١٧٦٢٩ - **ففيرة** * *Machillidae* (S). *Machillidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة ظاهرات المشك . أجسامها وأجزاءها عديدة تتميز بأجسامها المزدنية الشكل . ألتاحها وتآخروها وبسها الكمية كبركة اللد ، ثوبها نغذية التركيب . جواشها عديدة . راجعها مستطيلة ، حلقها مستقيمة . أطرافها الصربية ثلاثية الزوائد الذيلية ، مستطيلة الأطوار الدقيقة الذرية || أشهر أجسامها الاقتصادية الففيرة .

١٧٦٣٠ - **ففيرة** *Emphytus* (S). *Emphytus* (F).
الواحدة طفنة . جنس حشرات مؤذية من فصيلة المشاريات ورتبة غشائيات الإجنطة الاسريات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في الشرق الأوسط وأروبة وإفريقية الشمالية || أجسامها صغيرة مستطيلة تطول من ١٠ إلى ١٢ م . يسطها قزاح من ١٨ إلى ٢٠ م . أنثيا إلى المواد الخشنة المماجات وسها الهضة والمزرة بالابيض والأصفر || أنثيا أكبر قدماً من ذكورها ويتكرر بمرزاتها المنشارية . أجسامها الحولية ترواح من اثنين إلى ثلاثة ||

ثدييات أسطواني

ثدييات القباب

ثدييات بحري

ظهور

نحو ٢٥ م. سطحها أخضر اللون ، اغبر المواج ، زهرتها
هامية الارتكاز ، قرمزية اللون ، قطرها نحو ١٠ م.

١٧٦٦٠ - ظهوره تليسية

Mes. testiculare, Argyroderma roseum (S). Ficoïde
testiculare (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها مثل حلالة الشكل او
تليسية طولها نحو ٥ م. عرضها ٣٥ ومماكبها ٢٥
سطحها يجرى اللون مبهر الزغب . انهارها وردية اللون .
اريجوانية المواج . قطرها نحو ٢٥ م || انهارها شوي .

١٧٦٦١ - ظهوره تشميه

Mes. gaminum, Gibbacum gaminum (S). Ficoïde
jumelee (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها غروبية الشكل توامية
التجميع تطلو نحو ١٥ م. انهارها صغيرة القند ، قرمزية
اللون || انهارها يستمر من آذار الى ايار .

١٧٦٦٢ - ظهوره ثنائية اللون

Mes. bilobum, Derenbergia biloba (S). Ficoïde bi-
lobée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة تملو نحو ٤ م. تتركب من
قرص جلبي تملو ثلثتان مفلطحتان متسدتان القاعدة
تتوسطها زهرة جملة ، كبيرة القند ، صفراء اللون . اما
القلعة فخرية اللون ، ثنائية التجميع الطري || انهارها
تستمر طوال تشرين الاول والثاني .

١٧٦٦٣ - ظهوره حشيشية

Mes. calculus, Conophytum calculus (S). Ficoïde-
calicou (F).

نبته تريينية شاذلة . جلجها فتلة حشيشية الشكل سطحها
مالس البشرة ، أخضر اللون ، احر المواج . طولها نحو
٣ م. تملوها زهرة صفراء اللون قطرها نحو ١٢ م.
نفرتها تقوم من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٦٤ - ظهوره عذرونية

Mes. turbiniforme, Lithops turbiniformis (S). Fi-
colde en toupie (F).

نبته تريينية شاذلة . جلجها فتلة تملو وترفع نحو ٢٥ م.
سطحها مالس البشرة ، احر اللون . حناياها اغبر وبدي .
نفرتها هامية الارتكاز، صفراء اللون ، قصيرة الاذن ،
قطرها يراوح بين ٣٥ و ٤٠ م .

١٧٦٦٥ - ظهوره مخليسة

Mes. velutinum, Gibbaea velutinum (S). Ficoïde
veloutée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها ناعشة ، مثلثة الشكل ،
خليفة للنصل ، طولها الاكبر نحو ٩ م. انهارها مسطوية
الاجن ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٥ م || انهارها
يستمر من آذار الى نيسان .

١٧٦٦٦ - ظهوره خيميه

Mes. umbellatum, Ruschia umbellata (S). Ficoïde
en ombelle (F).

جملة تريينية جاذلة تملو نحو ٩٠ م. اوراقها متقايلة ،
متصالبة ، اصصية الشكل ، لاذلية الزوايا ، تطلو نحو
١٦ م. تصلها أخضر زاه || انهارها خيمية التجميع ،
بيضاء اللون ، صغيرة القند || انهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

برية وزراعية من فصيلة الظهريات . انولها نحو ٣٠٠
سطحها من النباتات الافريقية المنبت . اوراقها غريبة
الاشكال المختلفة الهبة والقدر . انهارها كبيرة القند وردية
اللون او مرجانية واريجوانية وصفراء || اكثرا من النباتات
للعمرة ويضها يحول وسولي . اشهرها ما يتبع .

١٧٦٦٣ - ظهوره ٥

Anserina (S).

Anserina (F). *Anserina* (E).

جلجس حيوانات بحرية من العروجات مبدات الازبل
وفصيلة الدلافين . انواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد
اعطانا البحر الابيض المتوسط والخليج الاطلسي || اصداها
شبه وسمية الشكل مستعرضة الجناح الايمن الثنائي الزوائد
الرقمية الشكل || اجسامها حلزونية ، رؤوسها مستطيلة ،
مقطوعة ، ثنائية القراس المميبة . لياها مسطوية دقيقة .
اربطها بيضية التواء يملوا اسطاط قرينة المادة .

١٧٦٦٤ - ظهوره

الظهي نبات شبه القبار او الكبر (محيط المحيط) .

١٧٦٦٥ - ظهوره ارجوانية

Mesembria-

thamum coccineum (S). Ficoïde écarlate (F).

جملة تريينية فرماة تملو نحو ٨٠ م. جلجها ورويسا
دقيقة . اوراقها صغيرة القند ، تصلها الى الخضار الازرق
اللامع . انهارها ارجوانية اللون قطرها نحو ٤ م.
انهارها يستمر طوال الصيف .

١٧٦٦٦ - ظهوره النوية

Mes. aloides,

Nananthus aloides (S). Ficoïde-Aloïde (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها مثل الربة الشكل ، خسية
التجميع ، سطحية الصفة ، غضراء اللون ، تطلو نحو
٥ م. انهارها قصيرة الاذن ، صفراء اللون ، ارجوانية
المواج ، قطرها نحو ٢٥ م. || انهارها يستمر من آب
الى ايلول .

١٧٦٦٧ - ظهوره بترية

Mes. tigrinum,

Foucaria tigrina (S). Ficoïde-Tigre (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها مثل خسية بيضية
الشكل ، مسنة الخلق ، تصلها الى الخضار البشري
يملو تجميع ثني يحته اطار احر . انهارها متوسطة الاذن ،
كبيرة القند ، قطرها يراوح بين ٥ و ٧ م. لونها الى
الاحمر المرجانية || انهارها يستمر من آب الى تشرين
الاول .

١٧٦٦٨ - ظهوره بلورية ، حشيشة البيلور

Mes. cristallinum, Cryophytum cristallinum (S).

Ficoïde glaciale, F. cristalline, Herbe à la glace,

Glaciale (F). Ice plant, Diamond ficoïdes (E). Es-

karum-Mitagsblume (D). Cristallifolée, Diacloide,

Erbs cristallina (I).

حشة برية وزراعية صناعية يستخرج من عصارة اوراقها
الملاح تقوية تدخل في صناعة البلور || اوراقها كبيرة
القند ، ناعشة ، متصعبة للنصل الكثيف الحليان البلورية .
انهارها صغيرة القند ، بيضاء اللون ، خفية السات .
انهارها يستمر من نموز الى آب .

١٧٦٦٩ - ظهوره بتيهية

Mes. oviforme, Oophytum oviforme (S). Ficoïde

ovoidée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . جلجها فتلة خسية الشكل تملو



ظهوره بلورية

اسطوانية ، مقطوعة ، عادمة الحب . أزهارها صغيرة القذ
قصيرة الاذن ، ابطية الاركانز ، يبيض اللون || تستعمل
كالتسليك وفي مدة ليول تقييد المدة وصر الحقم .

١٧١٧٤ - زهرة قارية

Mes. murinum, Scaevola murinum (S). Ficoide
souris (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل غارية الشكل
سنة الخمار ، رديئة اللون || زهرتها سكية العرف ،
مثالة القذ ، لنها الى الصفرة الباهتة || ازهارها صبي .

١٧١٧٥ - زهرة قنفذية

Mes. echinatum, Delosperma echinatum (S). Ficoide
hérisson (F).
بجلة زينة قنفذية الشكل تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها
اسطوانية تطول نحو ١٣ م . قواعدها مهدبة شاذلة ،
نصلها طليعية البثرة ، زباه الحليات || ازهارها فردية
التجميع ، يبيض اللون ، صلبة القذ ، قصبة الاذن .
ازهارها يستمر طوال السنة .

١٧١٧٦ - زهرة مضمرة

Mes. edule, Carpobrotus edulis (S). Ficoide-figue
F. comestible, Figular des Hottentots (F). Hottentot
fig, Sour fig (E). Hottentotzenfeige (D). Fico degli
ottentotti (I).
بجلة زراعية مأكلة الابر ، تملو نحو ١٠٠ سم . متباها
فراء . فروصها مسطحة غائرة . اوراقها متقابلة ،
متشاذكة ، اصعبية الشكل ، ثلاثية الزوايا . سنة
الخمار تطول من ٨ الى ١٢ سم . || ازهارها كبيرة القذ
قطرها نحو ١٠ سم . لنها الى الصفار البهت يملو مذج
وردي . متباها شفعية التجميع مدحدا يراوح بين ١٢ و
١٨ م . جوارها جوزية الشكل ولقده مأكلة سكرية الحقم .

١٧١٧٧ - زهرة مقطوعة

Mes. truncatellum, Conophytum truncatellum (S).
Ficoide tronquée (F).
نبت زينة شاذلة . بجلها قلة كروية الشكل مقطوعة
القاعدة قطرها نحو ١٢ سم . سطحها اخضر اللون مزركش
بالجلوي . زهرتها صفراء ، قطرها نحو ١٥ م . || ازهارها
يلوم من آب الى تشرين الاول .

١٧١٧٨ - زهرة مشكادية

Mes. rostratum, Chiridopsis rostrata (S). Ficoide
à bec (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل مقررة قبيصة
التجميع ، لا تليسية الحقم ، حليقة الخمار ، صبي
مهدبة الخمار . زهرتها فردية ، مسطحة الاذن ، كبيرة
القذ صفراء اللون ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ سم .
ازهارها رديي .

١٧١٧٩ - زهرة نسيكة

Mes. nobile, Pleiospilos nobile (S). Ficoide noble (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل قبيصة التجميع
عززية الشكل . نصلها حايق الخمار البصري ، ابر
الخمار ، يطول نحو ٥ سم . زهرتها مهدبة ، كبيرة القذ ،
صفراء اللون ، قصيرة الاذن ، قطرها نحو ٥ سم .
ازهارها غريبي .

١٧١٨٠ - طواجر

Météores (F). Meteors (E).
جميع المخلوقات الطليعية الجوية القريب رتوها كالمسافة
والبرق وقوس قزح والمطر والقنابل والبرد الخ .

١٧١٦٧ - زهرة دجيرة

Mes. noctiflorum, Aridaria noctiflora (S). Ficoide
nocturna (F).
بجلة زينة فراء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقها
اهليلجية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ م . نصلها الى
الخضار البحري الاحمر المولج || ازهارها دجيرة
الانتيلاج ، يبيض اللون ، فواحة العرف البصري . قطرها
يراوح بين ٢٠ و ٤٥ م || ازهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

١٧١٦٨ - زهرة رؤسية

Mes. capitatum, Conicosia capitata (S). Ficoide à
rosette, F. à fleurs capitées (F).
بجلة زينة مصرة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها اصعبية
الشكل ثلاثية الزوايا تطول من ١٢ الى ١٨ سم . نصلها
الى الرتبة الضلابة . ازهارها رؤسية ، قطرها نحو ٥ سم .
لونها الى الصفرة الناعية || ازهارها يستمر من عوز
الى آب .

١٧١٦٩ - زهرة زعفرانية

Mes. croceum, Hymenocyclus croceus (S). Ficoide
safranée (F).
بجلة زينة تملو نحو ٦٠ سم . متباها فراء متشعبة ، اوراقها
متقابلة ، اصعبية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، قصيرة القذ ،
باهتة الخضار ، سمراء الخمار || ازهارها فردية التجميع
قطرها نحو ٣ م . لنها الى الصفرة الزعفرانية || ازهارها
يستمر طوال الخريف والشتاء .

١٧١٧٠ - زهرة شاذكة

Mes. spinosum, Ebaranzia spinosa (S). Ficoide
épineuse (F).
بجلة زينة فراء تملو نحو ٦٠ سم . بجلها يفروصها
شاذكة . اوراقها قتل صغيرة تطول نحو ٢ م . نصلها
بحري اللون تملو رشفة سمراء || ازهارها صغيرة القذ ،
وردي اللون ، صفراء المولج || ازهارها رديي .

١٧١٧١ - زهرة صلبة

Mes. validum, Cephalophyllum daisimile (S). Ficoide
robusta (F).
بجلة زينة بجلها يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها
اسطوانية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . لنها الى الخضار
الزاهي تملو نشفة قبيصة دقيقة || ازهارها وديئة اللون ،
متوسطة الحجم ، دقيقة الاذن التي يراوح طولها بين ٥
و ٨ م . || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٧١٧٢ - زهرة عطرية

Mes. fragrans, Glottiphyllum fragrans (S). Ficoide
parfumée (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل لا تليسية الحقم
ينطب فيها الشكل النائي . طواجر يراوح بين ٥ و ٧ سم .
عرضها من ٢ الى ٣ سم . وحاكبتها نحو ١٢ م . زهرتها مهدبة ،
قصيرة الاذن ، كبيرة القذ ، صلبة العرف ، قطرها
يراوح من ٨ الى ١٢ سم .

١٧١٧٣ - زهرة عقدية * ، صلبة ، عسكول

Mes. nodiflorum (S).
مصري
Ficoide à nœuds fleuris (F). Egyptian fig-marigold (E).
Aegyptisches kalikraut (D). Erba dei nodiflori (I).
عشبة برية تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . متباها الرمال ،
مهدبا شواطئ البحر المتوسط ، فروصها غائرة . اوراقها



زهرة مقدية

بعض مناطق أفريقية الجنوبية . سوطها جلموية مدادة أو مكشكة فوصية الشكل . أوراقها سيفية النصال ، مزدوجة التصليف . أزهارها سداسية البتلات الثلاثية متساوية الحجم ، ثلاثية الاسدية ، عديدة الألوان . تزهر أقرين في الحدائق والمراكن || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

١٧٦٨٩ - فلوبرة نكاسية اللون

Moraea bicolor (S). *Moraea bicolore* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمورها مداد . شراغها يرتفع من ٣٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها عديدة ، سيفية النصال ، جميلة الخضار الأس . أزهارها كبيرة القذ ، قطرها نحو ٥ سم . لونها أصفر وأبيض || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

١٧٦٩٠ - فلوبرة شراغية

Moraea spathacea (S). *Moraea à spathe* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمورها مداد . شراغها يرتفع من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . وقتها واحدة سيفية النصل البحري الخضر . أزهارها صفراء اللون . حطرية العرف || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

١٧٦٩١ - فلوبرة طرويسية

Moraea pavonia (S). *Moraea paon* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمورها فوصي الشكل . شراغها يرتفع من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وقتها واحدة سيفية النصل المزخرف . أزهارها حراء اللون يملؤها عند قواعدها بتقريب أسود غضب بالأزرق والأخضر || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٦٩٢ - فلوبرة مهدبة

Moraea ambricata (S). *Moraea frangée* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمورها مداد . شراغها يعلو من ٢٥ إلى ٤٥ سم . أوراقها عديدة سيفية النصال الجامعة المهدبة الخلفاء . أزهارها متدلة الخيم . قطرها نحو ٤ سم . لونها ال أبيض الزاهي || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

١٧٦٩٣ - فلوبرة

دعامة تبنى إلى جانب حائط ليعم عليها .

١٧٦٩٤ - فلوبرة

Gymnosporangium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاليات تتميز باستقلالها التطوري وبانتفاء البتلات المتحارة التي تصطب في كل طور . لين هي تتكفل حل الورديات في طورها الأولي إذ بها تتكفل حل حريانات البور في طورها النهائي . طورها الفلوري لا نظامي الإعداد وقد يعلو عدة أسابيع . مظهرها الخالص بقع مستديرة ثم شاذلية لونية الشكل لا قياسية التصنيع غلامية للمادة المتخلطة . شبيهها الفطري يعيش ويتكاثر حل خلايا النجس النباتية || أنواعها المؤذية عديدة أشهرها اقتصادياً ما يلي .

١٧٦٩٥ - فلوبرة الإحاص

Gymnosporangium sabinae, *Rostelia cancellata* (S). *Rouille grillagée du poirier* (F). *Pear rust* (E). *Birnenstecher* (D).

فطر مجهرى يصيب الإحاص والرمر والزرايب والأجل فيؤذي الأوراق والانتاد والآبار || مظهره الخارجي حل الأوراق ، في طوره الأولي ، بقع مستديرة قطرها راوح

١٧٦٨١ - فلوب هو صلح التيس حة المياج .

Alstromeria (S).
Alstromera (F). *Alstromeria* (E).

جنس نباتات عشبية سبوتية من فصيلة الفرجسيات . مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية . سوطها موزة . أوراقها مسطيلة النصال . أزهارها قمية الشكل ، متبدلة الألوان الزاهية || تزهر أقرين في الحدائق وضمن البيت . ترب في الأتربة المنسوبة لتركيب التصري الفلوري المواد الغذائية الضوية والمعدنية || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

١٧٦٨٢ - فلوبا برتقالية

Alstromeria aurantiaca (S). *Alstromera orangée* (F).
نوع من الفلوبا منبتها الشبل واليربو . شراغها مصب يرتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها مسطيلة النصال الضيقة ، عابقة الخضر في الصفحات العليا ، بحريه في السفل ، تطلو من ٧ إلى ١٠ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها برتقالية اللون || تنورها يستمر من حزيران إلى آب .

١٧٦٨٤ - فلوبا حمره

Alstromeria homantha (S). *Alstromera rouge sang* (F).
نوع من الفلوبا . منبتها يمتد من الشبل إلى البرازيل . شراغها مصب يرتفع من ٩٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها مسطيلة ، ضيقة ، تطلو من ٨ إلى ١٢ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصالها بحرية الخضر حل الصفحتين العليا والسفل . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها إلى الحرة المابتة السعدا || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٦٨٥ - فلوبا زخيفية

Alstromeria pulchella (S). *Alstromera élégante* (F).
نوع من الفلوبا . منبتها بلاد المكسيك . شراغها مصب يرتفع من ٥٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها مسطيلة الشكل تطلو من ٨ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ إلى ٣ سم . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها ودية اللون يملؤها بتقريب أحر يخالطه الأصفر || تنورها صهي .

١٧٦٨٦ - فلوبا مكنوكية

Alstromeria varicolor (S). *Alstromera varicolore* (F).
نوع من الفلوبا . منبتها بلاد الشبل . شراغها مصب يعلو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوراقها شبه مضطربة الشكل مسطيلة القذ . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها صفراء اللون يملؤها تميز أبيض يتخلله الأبيض والبرتقالي . وفي قمية الشكل ، تطلو نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٦٨٧ - فلوبا

الفلوري من البئر هي الضجة (التاج) .

١٧٦٨٨ - فلوبرة

Moraea (S). *Moraea* (F). *Moraea* (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السجونييات . مهدا



فلوبا



عطرة الإحاص

الجزء تملأ شمع النصل ويعرقه على صفحته السفلى وتبقى على حالها الى ان يكتمل دورها الايدي الذي يطول بنفسه ايام ثم تدخل في طورها اللدائي فيبلغ طول حاملها نحو ١٥ سم وهو على الاغصان واغصان الباز ينمو قريبا لونها الى السمرة تطيب اللحاء والبشرة وتشوه الباز وتقلها . يكافئ كاسر طور النظرة .



نظرة التفاح



نظرة الزعرور



نظرة الورديات



ظليون

١٧٦٩٩ - نظرة الورديات *

Gymnosporangium juniperi-virginianae, *Rozella pyrata* (S), *Rouille des rosacées cultivées* (F).

نظر مجهرى واسع الانتشار خاصة في امريكا الشمالية حيث يتطفل على جميع نباتات الفصيلة الوردية || مظهره الخارجى على الفروع والافئاد يقع قريبا مبرقة لا نظمية الترتيب تركيب اللحاء تضطيق وتلبس الثوب واللباس . وهو على الاوراق يقع لا قيسية الشكل والحجم تركيب النصل على صفحته العليا بين المروق والنصل . تبدو صفراء اللون ثم تتحول الى الحصى وتطرح بالنصل فتضدده وتتقيد الى الانتفاخ على ذاته الى ان يابل ويتيس . يكافئ مكانسة نظرة الاجناس .

١٧٧٠٠ - ظليان بقية السمل في الخلية .

١٧٧٠١ - ظليان هو الملى الضيقة الورق ، اطلها .

١٧٧٠٢ - ظليكميات *

Gymnolates (F), *Gymnolates* (E).

رقة من الحيوانات الطحلبية ظاهرات الشرج . فساكها وانجاسها عديدة مظهرها مجرى وبعضها يعيش في الماء البذبة || انواعها عادمة البذبة . لوانها دائرية الانتشاب صنية الارتكاز .

١٧٧٠٣ - ظليون *

Curculigo (S), *Charançon* (F), *Curculigo* (E).

جنس نباتات شعية ممررة دورية الجلود من فصيلة النرجسيات . موهنا بعض مناطق الشرق الاقصى انجاسها جليا . اوراقها كبيرة ، جلدية الانتشاب تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٨ سم . نصالحا جملة الاغصان اللامع . لوزارها صويالى تنجيم . انزاعها صفراء اللون او يضاء او ثنائية الخصب || انواعها المعروفة ثلاثة لا فارق بينها سوى لونها لوانها وحجم الاوراق || تزود الزين في الخلدات فقط .

بين ١٠ و ١٥ م . مبرقة ، لاقسية التنجيم ، حراء اللون ، يرتقالية الحافة تركيب النصل على صفحته العليا يتقابلها على الصفحة السفلى يقع بنفس الحجم لونها الى الصفار الداكن . ومنه اكبال هذا الطور الذي يبلغ تمامه نظرف سبعة ايام او ثمانية يتنقذ الطور الحصى الذي تبصر عنه التماثيل النورية الشكل التي تملأ البقع الحمر يندوم نحو ثلاثة ايام ثم يابل بعد ان يتصلب لونه الى الجزرة فاسمرة وبعد ان يقرح النصل المتنامية ويضي عليها || يكافئ باستمال سائل بوردو المركز ٠,٠٦ ٪ . يضاف اليه كلس حراق بمعدل ٠,٠٤٨ ٪ او سائل بوردو المركز ٠,٠٦ ٪ . يضاف اليه ٠,٠٣ ٪ من سلفات الحديد .

١٧٦٩٦ - نظرة الاكيدنيا *

Gymnosporangium confusum, *Rozella mespiti* (S), *Rouille du néflier* (F).

نظر مجهرى يتطفل على الاكيدنيا والبقيريل فيحطب الاوراق ويؤذي الباز || مظهره الخارجى ، على الاوراق ، يقع مستدرة يرتقالية اللون سمر الخاثر تملأ النصل على صفحته العليا تنجيم وترفع البشرة فتضد ذلك دامة اسطوانية طولها نحو ٥ م . تنجبر عنه ادراكها الى مدة قدد || وهو على الباز يقع قريبا صلبة لونها الى السمرة العابقة تشوه الباز وتطليا يسه ان تمرق مير نموا . يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية عند الانزراع .

١٧٦٩٧ - نظرة التفاح *


Gymnosporangium juniperinum, *G. tremellodes*, *Rozella penicillata* (S), *Rouille griligée du pomier* (F), *Scam gall of mountain juniper* (E), *Apeleroat* (D).

نظر مجهرى يصيب التفاح والاجناس والبقيراء . مظهره الخارجى على الافئاد والافئان يقع قريبا لا قيسية الشكل تملأ اللحاء ترفع البشرة وتغيرها وتطليا || وهو على الاوراق يقع مستدرة لونها الى الجزرة تملأ النصل على صفحته السفلى تنجيم وترفع البشرة التي تبدو كالدامة الاسطوانية طولها يراوح بين ٤ و ٦ م . ثم تنجبر الى عدة قدد حلزونية الشكل || يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية قبل الانزراع ومنه اكبال .

١٧٦٩٨ - نظرة الزعرور *

Gymnosporangium clavariaeforme, *Rozella lacesta* (S), *Rouille de l'aubépine* (F).

نظر مجهرى يتطفل على الزعرور وبقه يصيب الاجناس . مظهره الخارجى على الاوراق ، يقع مستدرة لونها الى



ع



عاجة

Eburna (S).

Eburne (F). Eburna (E).

جلس حيوانات بحرية مفرسة من الرخويات مديات الارجل
وفصيلة الطحريات. انواعها المعروفة قليلة المدة منتشرة
في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها مسماكة مألوسة
كالملح ، لناعية ، بيضاء اللون ، وردية الملوحة ، يملوها
تفجع جزوي او عشائي وفي قريته الشبه من البق ، بطينة
القاعدة والوسط ، حلزونة القصب المذهب || شائعة الاستعمال
الصناعي .

١٧٧١٢ - عاجة *

Caducue (F).

Deciduous (E).

المائل اسم حال يطلق على النبات الذي تسقط اوراقه
كل سنة || والمائل هو تلك الاوراق المنتشرة الساقطة .

١٧٧٠٥ - عاتق

الماتق : فرخ الطائر اذا طار واستقل وقيل الماتق فوق
الناقص وهو الذي يتحسر من ريشه الاول وينت له
ريش جلدي اي قري .

١٧٧٠٦ - عاتق الثريا

Aelk

عاتق الثريا نجم لير من كوكبة سيانس .

١٧٧١٣ - عاجيز عن الوقاء ، مخدّم ، مخعير ،

Insolvable (F). Insolvent (E).

مخلاق

هو من عاجز عن وفاء ديونه .

Ada (S). Ade (F).

١٧٧١٤ - عادآه

جنس نباتات عشبية إسمية معمرة من فصيلة السحليات.
انواعها المعروفة قليلة جميعها برية ورّ بنية . اروساتها
اسطوانية او مخروطية ، حشيتة ، تطول نحو ١٠ سم. اوراقها
من اثنين الى ثلاث وفي قرصية الانقسام ضيقة النصل
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٠ م. ازهارها
عنقودية التجميع ، ارجوانية اللون ، سواد التجميع ، تركيز
على شراخ يملو من ٢٥ الى ٣٠ سم. ازهارها يستمر من
شباط الى نيسان .

Aglypha (F).

١٧٧١٥ - عادّم الأعدود

نمت تمريفي يطلق على كل حية غير سامة مألوسة الملائح
العامة التضديد .

Adactyle (F).

١٧٧١٦ - عادّم الأصابع

نمت تمريفي يطلق على بعض القشريات عديمات الملائح .

Damarleuse (F).

Beet thinner, Thinning machine, Gapper (E).

معمل ميكانيكي يقطع في سيرة ما زاد من النبات عن المعدل
المفروب فيه . وهو يستعمل في الزراعات الكبيرة .

Infertile (F).

Infertile, Unfruitful (E).

١٧٧٠٨ - عاتكة

الشجرة التي لا تأثبر .

Antimite, Miteicide (F).

Mite-Killer, Miteicide (E).

١٧٧٠٩ - عاتكث

كل مادة من شأنها ابعاد المث او القضاء عليه تدعى
عاتكثاً .

Rigole (F).

Trench, Channel, Duct (E).

١٧٧١٠ - عائلور

جرى الماء حفر له في التربة . ج عائلور .

Ivoire (F).

Ivory (E).

١٧٧١١ - عاج ، صنجاج ، مسك

انياب الفيلة او عظام اتيانها .

17731 - عاكسية ، قيرفيس Prêt (F). Loss (E).
مقد يدفع به اللز أو غيره متقلو أو حيا أو شيئا ميتا
بنحوه ليستسلمه زنا محبوا ثم يرد .

17732 - عاكسية الاستعمال Prêt à usage (F).
Commodatus (E).
هي دفع شيء الى المستير ليستعمله ثم يرد يمينه بلا
مقابل .

17733 - عاكسية الاستهلاك

Prêt de consommation (F).
توليا ان المير ينقل ملكية العين المارة الى المستير
ليستهلكها في منامه ويرد شلها في زمن معين .

17734 - عاكول Isolant (F).
غير ناقل للكهرباء . Insulating, Isolating (E).

17735 - عاكول Isolateur (F). Insulator (E).
صفة للمواد أو الأشياء التي تتصل بخدمة عدم نقل الكهرباء .

17736 - عاكس Tris fort (F). Very strong (E).
لعت تعريفي يطلق على احد التبرج سورة .

17737 - عاكس Tinnunculus (S).
Crécerelle (F). Kestrel (E).

جنس طير من عائلة الصقور وضيعة الصقريات . انواحه
٢٠ جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل والجمال ، مستقيمة
الاقوام . طولها يراوح بين ٢٢ و ٣٢ سم . ثوبها اتمر
الريش . موطنها ذلقة . اذنانها طويلة . ارباعها دقيقة ،
حريظة ، صفراء اللون . منابرها صغيرة ، سوداء اللون ،
قوة البصر الحادة ، يمشي في الاشجار الشائعة . اناله
تضع وتضع من ٥ الى ٧ بيضة في وهو من الجوارح
القاتلة لانه يقتني جل منظر القوارض الصلبة في انهر
انواحه المسمى المعروف بمسوق الثوري والموسيق .

17738 - عاكس الدودي Tinnunculus sparverius (S). Crécerelle des moineaux (F). Windhover (E).

نوع من الماسوق وهو طائر خفيف الجناح ، حاد المزاج ،
ثديده البلس . طول نحو ٢٧ سم . ثوبه الى الحمرة الناعية
يبقى عنه الظهور ويصغر عنه البطن . ريشه اتمر التوشم
الاصفر . يصيد الثوري والقوارض الصغيرة والقوارض
والسلطان والخشرات . وهو من الطيور القاطن التي يحوي
الشرق والغرب .

17739 - عاكس معروف Tinnunculus alandicus (S). Crécerelle commune, Emouchet doré (E). Common windhover (E).

نوع من الماسوق وهو اكبرها جنس وايضا شكلا وامثها
صيدا . قدره قدر الباق . طول نحو ٢٢ سم . ثوبه الى
الحمرة الناعية اللامعة للمزاج . وهو اتمر الريش ، اسود
التوشم المستطيل . قوته القوارض والسلطان والقوارض
والخشرات .

17740 - عاكس ، عاكس ، عاكس Herboux, Herbu (F). Grassy, Herbous, Overgrown With herbs (E).
ما كان كبير المشب .

17741 - عاكس Herbivorus (F).
Herbivorous (E).
الحوانات التي تأكل الاغشاب .

17717 - عاكس الرأس Acéphale (F).
Acephalous (E).
اسم يطلق على بعض الرخويات من صفحيات الهياشيم
تتميز بانعدام الرأس .

17718 - عاكس العروق Enerve (F). Enervate (E).
نعت تعريفي يطلق على الارواق الخالية من العروق .

17719 - عاكس العنود Esode (E). Enod (E).
نعت تعريفي يطلق على الاغشاب الملمدة العنود .

17720 - عاكس الفك Agneche (F).
Agnathous (E).
هو من الحيوان من كان عديم الفك أو الفك الاسفل من
الشفق . ومن الحشرات من كانت عديمة الفك .

17721 - عاكس المفاصل Inarticulé (F).
Inarticulate, Jointless (E).
اطبال لا مفصل .

17722 - عاكس الفك Agneches (F).
Agnatha (E).

قفة من الاسماك عديمة الفكوك وثرية الزمان . متجسرتها
تدعى صفحيات الجلود . هي كلها غضروفية لاطمية .
غشائيتها جبهة الشكل في القرية الوحيدة الماصرة تدعى
حطليات الاقوال . اعرف اسمهاها الملكن والمكسين .

17723 - عاكس Houtin (F). Haughey (E).
هي الكوة التي ترمى على الفجرة . ج حواد .

17724 - عاكس Grimpance (F).
Twining, Crooping (E).
كل نبتة تتسلق غيرها .

17725 - عاكس Mycophages (F).
Mycetophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الفطور .
م. عاكس .

17726 - عاكس ، معركس ، معركس Liane (F). Liana (E).
كل نبتة سائلا طويلة قصفة لا تمكها من الانتصاب
بدون عائل تركر عليه .

17727 - عاكس Adventica (F). Adventitious (E).
هو السمحاق نوع من البهرم ، اطله .

17728 - عاكس Adventica (F). Adventitious (E).
كل نبتة تنكسر مرسا وتلتقي مع غيرها من النباتات
المزودة .

17729 - عاكس Traversa (F). Joint (E).
كل غشة جازنة تدعى عارضة .

17730 - عاكس ، عاكس Commodat (F).
Free loan (E).

مقد يلزمه للمير دفع شيء الى المستير ليستسلمه زنا
محبا ثم يرد او مثله بمقابل او بلا مقابل .



ماسوق الثوري



ماسوق معروف

Tempête (F). Storm (E).

احتلال جوي عنيف القوة شديد الوقع بهيج الموارض الجوية ويثيرها .

Fistipare (F). Fissiparus (E).

كل ما كان تسانله عضوة اي بالانقسام الى شطرين .
ويعدى ايضاً مفعول .

Serpent véneux (F).

Venomous snakes (E).

حية خبيثة يموت الذي تلسه من ساعته .

Stérile (F).

ما كان لا يقبل الاخصاب .

17754 - عاكور قرحاً * ، عُرْد القَرْح

Anacyclus pyrethrum (S). Anacyclus pyrethre, A. pourpre (F). Pellitory of Spain, Alexander's foot (E). Alexanderfuss, Spichelwurz (D). Pilastro, Parietaria de Spagna (I).

نبات عشبي طبي حولي من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريغ والكشرع . تفصلها خلى البشرة . وريقاتها الزهرية كثيرة العدد . مستطيلة الاذن ، صفيرة القند . ثماره يزور مجتمعة الغلاف ، هدنة المادة ٤ جلوره واوراته واظهاره فواحة الحرف ، طمها حريف لاذع ، وانفها بهيج الانف وقد تسبب العطاس . يستخرج منها مضغوط ناعم مادته القمالة القرويه يستعمل في القضاء على الحشرات . يستعمل في عدة تركيب طبية انحصا بمبيدات الانسان .

17755 - عاكول ، حاج ، وَتَحْسِيلُ المَصْنَم ، أَشْطَرُحَار

Alhai mannifus, Al. maurorum (E). Alhage, A. des Maures, Sainfoin agul (F). Camel thorn, Hebrav manna plant (E). Alhagistrach, Mannastrach (D). Lupinella alhai, Manna di Perlis (I).

نبات عشبي ، لبني مخشوش معمر من فصيلة القرنيات . ساقه شاذكة فرما تملو نحو ١٠٠ سم . فروعه نحلة الشوك . اوراقه بسيطة كاملة مستطيلة ٥ وهو من النباتات التي تفرز المن ويقال ان من بني اسرائيل كان من فرزه لانه كثير الوباء في صحراء سيناء .

17756 - عاكول الفَرْكَال هو الشكاعة ، الحلبا .

Réflecteur (F). Reflector (E).

جهاز يعكس النور او الحرارة .

Claviceps (S).

17758 - عاكوب *
اشمن تطور مجهرية من السناخيات وفصيلة السطويات . تتميز بعصاها التي تحيط الزونية وتنقسم فيها تشكلت اطراً جولي يحمي السرون ٥ يولها خطي الشكل متوازي الترتيب تحفصه تكات مستديرة ٥ اوراقه عديمة منها واحد يركب النبات ويؤيدوه هو عاكوب الشيلم .

17759 - عاكوب الشيلم *

Claviceps purpurea, Sclerotium clavus, Sphecilla segetum (S). Ergot du seigle (F). Ergot (E). Mutterkorn (D).

فطر مجهرى يركب الشيلم ويثيره من النباتات انحصا اليشة والنف والتغرل والتكسيل والديس والديس وذيل الغار واليزير والشبير والشوفان والصوية والمكشوش والذرع

17761 - عاشق ومَشْقُوق اطلب غلدة كروية .

17762 - عاكيم *

Triglochin (S).
Triglochin, Trowart, Joncage, faux jonc (F). Arrow grass, Marsh arrow grass (E). Echter Dreisack (D). Triglochino, Glaucostralle, Glenco falso (I).

جس نباتي رية ، مروحية ، اسلية الشكل ، صمرة من فصيلة السناخيات . اوراقه عديدة مضطمة من نباتات الواقع الرطبة انحصا المنافع وريال الشوط الجيرة ونباتات الانهر واغوارها .

17764 - عاشميسات

Triglochinaceae (S).
Triglochinaceae (F). Triglochinaceae (E).
فصيلة نباتية من صميدات الفلقة . اجناسها وازواها عديدة . جميعها اسلية الشكل والاوراق . اذفارها كية ، مرتفعات الميض . اشهر اجناسها العاشم .

17765 - عاكوب *

Herbicide (F).
Herbicide, Weed-Killer (E).

كل مادة فاعلة تستعمل للقضاء على الاعشاب ج . عاكوب .

17766 - عاشيق * ، عاشيق (F). Corynetes (S).

جس حشرات غشبية من فصيلة اللوزجيات . انواعه المعروفة ١٤ معظمها من حشرات العالم القديم ٥ جميعها صميدة القند . اطوالها تراوح من ٤ الى ٨ سم . اطيافا متراكبة الاذن الزاوية ٥ سرعها نهاري . قوتها رقيق الازداد انحصا اذار الفصيلة الصموية ٥ اشهر انواعها العاشيق الازرق (Corynetes caeruleus) الذي يعيش في الحدائق ويسهل المائل حيث يقتس بعض الحشرات الفسارة .

17767 - عاشيق لَزَق *

Corynetes caeruleus (S).

Corynetes bleu (F). Corynetes caeruleus (E).
حشرة واحة غشبية قافصة من فصيلة اللوزجيات وربة صميدات الاجنسة . يختلسها تموش على اذار النباتات البرية والزرينية . يركبها غشبية قافصة تقتس الحشرات الدنيا ٥ جسمها صلب القند بطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبا الى التزقة . رأسها مستعرض الجرم . زباناها غشبية ، مستطيلة . صماتها صميرتان بورتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، نحيل التجزيز التندقي القاطب . ارساها خاسية البقل ٥ لما جيل واحد في الحقل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في التبار وتبيت في الليل ٥ البرقة عنه ادياها الكمال الجسودي تطول من ٨ الى ١٠ سم . جسمها مدوني الشكل ، مستطيل القدم والرأس ، مستدق الطرف اللامع ، سداسي الروابج ، ضلع التاكثير . اسد القرن ، اسر الموج ، مبر الحلب ، اسد الحراس ٥ طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما يقتضي في شقوق الخشب او تحت القشور والانقاض .

17768 - عاكس

Réfractaire (F). Refractory (E).
كل مادة تقاوم التحويلات للمائرية ولا تنصاع الى غططها الرئيسي . كالبطين الذي يصنع الحرارة فلا تصهره .

17769 - عاصيرة * ، مهترس

Fouloir (F).
Bester (E).
آلة تستعمل لسحق اللآل واستخراج عصارها انحصا العنب .

عاشم



عاشيق لَزَق



عاقور قرحا



عاكوب الشيلم

Pubis

١٧٧٧٥ - عَائِكَة

١٧٧٧٦ - عَائِكَة اصل الإذن. ج. حوانة.

Anthropoide (F).

١٧٧٧٧ - عَائِكَة

المانس طائر يسمى الإديج ، اطلبه .

Démolisse de Numidie (F).

١٧٧٧٨ - عَائِكَة نميدك

طائر يسمى اديج نميدة ، اطلبه .

Pubien (F). Pubic (E).

١٧٧٧٩ - عَائِي

Infrmité (F). Infirmity (E).

١٧٧٨٠ - عَائِكَة

كل أثر يبقى في البدن عقب إصابة أو مرض . والمعالجة قد تكون وقتية إذا كانت وشيكة التوال أو دائمة .

Taxes (F). Taxus (E).

١٧٧٨١ - عَائِكَات

هي الرسوم المفروضة على العقارات والبضائع . وأحياناً مائدة .

Rentabilité (F). Rentability (E).

١٧٧٨٢ - عَائِكَة

راجع إيراد .

Delphinium (S). Dauphinella (F).

١٧٧٨٣ - عَائِقُ

جنس نباتات حولية ومعملة ومعمرة من المربقيات ونباتية الشقيقيات . أزهاره المرفوعة نحو ٦٠ مظهوا بري وبعضها زراعي زرعني . أولها متعاقبة ، منفعة ، مفصصة ومرفوعة . انظرها صنفوي أو سنبل التجميع . انظرها بحيلة الشكل ، مختلفة الألوان || أشهر أزهاره ما يلي .

١٧٧٨٤ - عَائِقُ الحَدَاقِي * وجمل البُصْبُرة ، مَهْمَاكُ Delphinium ajacis (S). Dauphinella des jardins, Pied d'alouette des jardins (F). Rocket larkspur (E). Gazantrisporn (D). Calcestrippe dei gardini, Speronella (F).

نبات عشبي حولي زرعني يعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم . ساقه فراء . أوراقه غليظة القشر . عقوده الزهرية كبير القند ، لبد الأزهار . لون أزهاره يختلف باختلاف الصمم . يكثر فيه الأزود والايض والبنسبي والوردي والأحمر || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٧٨٥ - عَائِقُ الحَفُولُ * كُنْشُودَة مَكْبِيَة

Delphinium consolida (S). Dauphinella consoude, D. des blés, Consoude royale (F). Field larkspur, King's consoude (E). Feldtrittersporn, Hornkümmel (D). Consolida regale, Calcestrippe delle biade (F). نبات عشبي حولي بري وزرعني يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . يحمله هربي الشكل . ساقه فراء . فروعه محمية بالعتاد الزهرية القليلة الكثافة . أزهاره زرقاء اللون ، أو بيضاء . أصراره الزراعية عديدة جنباً إلى جنب الكمية الزهر والصغيرة القند والمردنية المستطيلة . جميعها طيبة تستعمل كمادة لربول وطاردة للود ودائمة الجروح إلا أنها سامة للمادة الغذائية مما يجعلها من النباتات السامة المؤذية || أزهاره يستمر طوال فصل الصيف .

١٧٧٨٦ - عَائِقُ الشَّرْقِي Delphinium orientale (S).

١٧٧٨٦ - عَائِقُ الشَّرْقِي Dauphinelle d'Orléans (F). نبات عشبي حولي بري وزرعني يعلو من ٤٠ إلى ٦٠ سم .



عَائِقُ الحَفُولُ



عَائِقُ الحَفُولُ

والنزار والقطبان والقص والتبوير والتبيل والتبيل والمزمار والمخلص ، الخ . || مظهره الخارجي زباد اسود ، شكله شكل الدائرة ، يدخل بوفرة مع الجذرة عند تقطيع الزهرة فيشتقر في البيض حيث يعيش وينشر طفلياً فيجول الحية وما فيها إلى مادة سائلة سوداء اللون تحوي مع بوفه بعض الجواهر السامة والمواد لشيبة قلبية احصها العاكبون . يكلمه بتظليل الدار من الحب المكروب وقد يتم ذلك اما بالتلفط واما بالتلف في الماء حيث يرته الحب السليم ويظهر الحب المكروب . أو باستبدال اسد القواشير المطهرة .

١٧٧٩٠ - عَاكِبُون * لِرَافُون * دَاكِبُون

Ergotisme

مادة شبه قلبية توجد في الحبوب الموهومة بفطر الماكروب .

Régne (F). Kingdom (E).

١٧٧٩١ - عَائِكَة العالم أو المملكة هو اهل قسم في تصنيف الاسماء ، يقال عالم الحيوان وعالم النبات أو مملكة الحيوان ومملكة النبات . راجع تصنيف .

An (F). Year (E).

١٧٧٩٢ - عَام العام حول يأتي على الفصول الاربع الفاء والربع والصيف والخريف وعلى هذا فالعام اخص من السنة .

١٧٧٩٣ - عَائِكَة Gerbe (F). Sheaf, Bundle (E).

مجموعة من غبول الحصيد .

Facteur (F). Factor (E).

١٧٧٩٤ - عَائِل كل عنصر آخر من مجموع عناصر الوحدة .

Ouvrier, Salaré (F).

١٧٧٩٥ - عَائِل Workman, Salaried, Paid (E).

هو كل شخص مرتبط بمقد العمل أو مقد الاستعاضة فيعمل بيده عملاً صناعياً أو زراعياً .

Facteur premier (F).

١٧٧٩٦ - عَائِل أَسَاسِي Prime factor (E).

١٧٧٩٧ - عَائِل أَلَكْسُند Agent oxydant (F).

Oxidizing agent (E).

١٧٧٩٨ - عَائِل لَتَجْبِيكي Facteur expérimental, F. appliqué (F). Applied factor (E).

١٧٧٩٩ - عَائِل حَيَوِي Facteur biotique (F).

Biotic factor (E).

١٧٧٩٠ - عَائِل وَسَيْط ، عَائِل مُسَاعِد ، وَسَيْطُ Agent catalytique, Catalyseur (F). Catalytic agent, Catalyst (E).

جسم يحدث التحليل بالاملاسة . اطلب مسحال .

١٧٧٩١ - عَائِل مُشْتَرَك Facteur commun (F).

Common factor (E).

١٧٧٩٢ - عَامُور Amor (F).

العامور كوكب سيار يسمى الزامي ، اطلبه .

١٧٧٩٣ - عَائِكَة

ألفان كوكاب يبيض اسفل من السعد .

١٧٧٩٤ - عَائِكَة Anesse (F). She-ass (E).

هي الاتان ، اثى الممار .

١٧٧٩٣ - عائق كشمير

Delphinium cashmirianum (S). *Dauphineelle du Cachemire* (F).

نبات عشبي معمر يصلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه مستطرفة خماسية التفصيص، نصلها خالي البشرة، مسن الحافة. أزهاره كبيرة القدر، قبابها غريزة الشكل، حطية اللون. بتلاتها بنفسجية. عناقيدها صغيرة وعلقة. أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

١٧٧٩٤ - عائق ممسك

Delphinium brunonianum (S). *Dauphineelle musquée* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ٣٠ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه كلبية الشكل، ثلاثية أو خماسية التفصيص. أزهاره كبيرة القدر، زرقاء اللون، أرجوانية الختار، سواد القرقة، فواصة العرف المسكي المستحب. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

Plante hôte (F). *Host-plants* (E). **حائل** - ١٧٧٩٥
هو كل نبات يعيش عليه نبات طفيل.

Lamper (F). *To toss off* (E). **عَبَّ** - ١٧٧٩٦
أخذ الماء حيا من غير مص وهو ما يفعله الطائر. والمب هو طريقة شرب الطير.

Abetia (S). **عَبَالِيَّة** - ١٧٧٩٧
Abatia, *Abetia* (F). *Abetia* (E).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة النضسيات. أنواعها المعروفة قليلة البند أحاطها بعض المناطق الحارة من أمريكا الجنوبية. ساقها منتصبة فراءه. أوراقها متعاقبة. أزهارها عقودية طرفي. أزهارها جميلة يكثر فيها اللون الوردي ثم الأصفر. بعض أنواعها تزدهن بزود في الحائل.

عَيَادُ الشَّمْسِ، عَيْنُ الشَّمْسِ، دَوَّارُ الشَّمْسِ - ١٧٧٩٨
Heliandus (S). *Héliandus*, *Soleil* (F).

جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. الأنواع المعروفة نحو ٥٠ ساقها أسطوانية جالسة. أوراقها منتقة أو لائفة، كاملة، كبيرة القدر. السفلى منها متعاقبة الاكثر اضا الوسطى والعليا متعاقبة. أزهارها رؤسي التجميع، كبير الأقراص المستديرة التي تحمل مع اتجاه الشمس. أزهارها انبوية، صغيرة، لبد، سراسرة، مستطيلة السنينات. بزورها وتدية الشكل، فضلة الحروف، دهنية الباب. الشهر أنوعه الزراعية ما يتبع.

١٧٧٩٩ - عَيَادُ الشَّمْسِ الأزغب

Heliandus mollis (S). *Héliandus velu*, *Soleil velu* (F). نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، زياء، عادية الفروع. أوراقه لائفة متعاقبة، بيضيه الشكل، نصلها كبير السفلى المشعة ثلاث المروق البارزة، الحبل اللون. قرصه الزهري متوسط القدر، قطره نحو ١٥ سم. لسينات أزهاره خلية البشرة لينا إلى الصفار الكبريتي. أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين الأول.

ساقه فراء. هيكله هرمي الشكل. أوراقه قوية التفرع. عناقيد الزهرة صغيرة القدر. أزهاره بنفسجية اللون. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

عائق أنيق - ١٧٧٩٧
Delphinium speciosum (S). *Dauphineelle élégante* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ٩٠ سم. ساقه موقفة قليلة الفروع. أوراقه خماسية التفصيص، مسنة الحافة نصلها خالي البشرة. أزهاره إلى الزرقاة التليبة الالسة. عناقيد الزهرة صغيرة القدر وعلقة. أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

عائق جبتي - ١٧٧٨٨
Delphinium staphisagria (S). **المسك**

Dauphineelle staphisagria, *Staphisagria*, *Herbe aux poux* (F). *Stavesacre*, *Lousewort* (E). *Scharfer rittersporn*, *Leuskraut* (D). *Calceatrippa staphisagria*, *Serfussaria*, *Tusano* (I).

نبات عشبي بري طبي يصلو نحو ٧٠ سم. ساقه فراء. فروعها منتصبة. أوراقه مقصصة وبشرة نصلها خالي البشرة مسن الحافة، مجري اللون. عناقيد الزهرة صغيرة القدر، لبد، أزهاره وردية اللون. بزور حامزة العلم تستعمل كهيصة يسلطه وطاردة للبهان. لكنها خطيرة نظرا لما تحويه من مواد جسمية مؤذية. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

عائق ذليل - ١٧٧٨٩
Delphinium zall (S). *Dauphineelle zall* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ١٥٠ إلى ١٥٠ سم. هيكله هرمي الشكل. ساقه فراء. فروعها منتصبة تشعب على ارتفاع ٣٠ أو ٤٠ سم. أوراقه خيفة التفرع التدي الشكل. أزهاره عناقيد كبيرة القدر كبريتية اللون. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

عائق مستعجلي - ١٧٧٩٠
Delphinium azureum (S). *Dauphineelle azurée* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه وفروعها وأوراقه أزهاره خلية اللحاء والبشرة. أوراقه خماسية أو سباعية التفرع. أزهاره مستعجلية اللون. عناقيد الزهرة مستطيلة الشكل متدة الكتافة. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

عائق كبير الزهر - ١٧٧٩١
Delphinium grandiflorum (S). *Dauphineelle à grande fleur*, *Pied d'aloette de Chine* (F). *Large flowered larkspur* (E). *Grossblütiger Rittersporn* (D). *Calceatrippa a fiori grandi* (I).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ١٠٠ سم. ساقه فراء. فروعها متعاقبة، عاحية العناقيد الزهرية. ثدية التفرع. أزهاره كبيرة القدر بيضاء اللون أو زرقاء أو حمراء. أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

عائق كَرْدَ بَنَلِي - ١٧٧٩٢
Delphinium cardinale (S). *Dauphineelle cardinale* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه موقفة عادية الفروع ثلاثية أو رباعية المقان. أوراقه خماسية التفصيص والتفرع. سنيك الزهرية مستطيلة وعلقة. أزهاره أرجوانية اللون صفراء التيج. أزهاره يستمر من نيسان إلى تموز.



عائق أنيق



عائق جبلي



عائق كبير الزهر

١٧٨٠٠ - عيار الشمس المزدوج

Helianthus orgyalis, *H. salicifolius* (S). *Hélianthe tizan*, *Soleil de six pieds* (F).

نبات زراعي معمر يصلو نحو ثلاثة أمتار وقد يبلغ في ظروف خاصة ستة أمتار. ساقه مرطبة مساه. أوراقه كثيرة البد، متقابلة الارتكاز || اقراصه الزهرية كثيرة البد، قطرها يراوح بين ٣ و ٧ سم. لسيات انذاره سوية الصغار القام || انذاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول.



مباد الشمس الجبار

١٧٨٠٦ - عيار الشمس الضخام

Helianthus laetiflorus (S). *Hélianthe fastueux*, *Soleil fastueux* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه هدية الزغب الجامد. أوراقه سائبة الشكل، جامدة الصفة، نصلها غثن المس، ثلاثي الفروق، مسن الحافة، بحري الخصار، قرصه الزهري صاجي الشكل. قطره نحو ١٢ سم. لسيات انذاره صفراء اللون، ودية اختار || انذاره يستمر من آب الى ايلول.



مباد الشمس الشري

١٧٨٠٧ - عيار الشمس النيلي

هو طرفيل الصباغين، امليه.



مباد الشمس السقولي

١٧٨٠٨ - عيار الشمس عبق الورق

Helianthus angustifolius (S). *Hélianthe à feuilles étroites*, *Soleil à feuilles étroites* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه هدية الزغب. أوراقه متبادعة الارتكاز. نصلها يطوي ٧ الى ١٨ سم. ويبرس من ٤ الى ٨ سم. وهو ميك الصفة الخشن || اقراصه الزهرية قليلة البد. قطرها يراوح من ٥ الى ٨ سم. لسيات انذاره صفراء اللون، صفراء اللون || انذاره يستمر من آب الى تشرين الاول.



مباد الشمس القضي

١٧٨٠٩ - عيار الشمس كبير الورق

Helianthus strombos, *Hélianthe* (S). *Hélianthe macrophylla*, *Soleil à grandes feuilles* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ الى ٢٢٠ سم. جلوه صفريه اصبحية الشكل. ساقه ثنائية او ثلاثية المبان، جامدة الفروع، قليلة الزغب. أوراقه متبادعة، يديسة مستطيلة، نصلها كبير اللد مغبر الصفة. قرصه صاجي الشكل، قطره نحو ٨ سم. لسيات انذاره الى الصفار الباهت || انذاره يستمر من آب الى تشرين الاول.



مباد الشمس المارد

١٧٨١٠ - عيار

Tolypeus (S).

Apar, *Tolypeus* (F).

جنس حيوانات لينة من فصيلة المرمعات. أنواعه المعروفة ثلاثة اصطناعيا بعض مناطق لشركة الجارية. تألف الغابات والاحراج. ملجئها الحيثي فردي. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل اجسام تحفرها في التربة قرب جلوح الاشجار اجسامها صفيرة. رؤوسها غروية. اقناملها مجهزة باسنان اسطوانية الشكل يراوح عددها من ٨ الى ٩ ازواج في كل فك. عيونها وبانها صفيرة. اذنابها قصيرة مشعلة. قوائمها صفيرة. اظفارها قوية. دويها مؤلفة من جن "رأسي" و"جن" متشكي تقصه من الجن "الحوضي" ثلاثة احزمة غضروفية متعاطلة متحركة تنقبض وتتبدد مع الحاجة بما يصل البكر يتكور عندما يشاء || انثاه ثنائية الاطباء تصنع في كل رمس من جرم ثلثة جراء || اما انواعه الثلاثة فهي التالية :



مباد الشمس كبير الورق

١٧٨٠٠ - عيار الشمس الجبار

Helianthus giganteus (S). *Hélianthe géant*, *Soleil géant* (F).

نبات زراعي معمر يصلو نحو ٣٠٠ سم. جلوه صفريه جزائية طويلة. ساقه ضخمة، مائلة للحاء، جامدة الفروع. أوراقه كبيرة اللد، نصلها سائي الشكل، مسن الحافة، جامد الصفة المسكة || قرصه الزهري متوسط الحجم قطره نحو ٨ سم. لسيات انذاره جامدة الصفار || انذاره يستمر من آب الى تشرين الاول.

١٧٨٠١ - عيار الشمس السنوي

Helianthus annuus (S). *Hélianthe annuel*, *Tournesol*, *Grand Soleil* (F). *Golden flower* of Paris, *Sun-flower* (E). *Echte Sonnenblume* (D). *Elfanto del fioro grandi*, *Mirazole*, *Girasole*, *Tazza regia*, *Coppa di sole*, *Sole* (I).

نبات زراعي حولي يصلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة مؤبرة اللحاء تحمل في اعلاها بعض الفروع البقية. أوراقه كبيرة اللد قليلة الشكل || نصلها غثن المس، حاتين الخصار البحري. قرصه الزهري الفرسي كبير اللد قطره يراوح بين ١٥ و ٥٠ سم. لسيات انذاره صفراء اللون ذهنية المواج || انذاره يستمر من آب الى ايلول || وهو من النباتات المتنامية لثلاثة الزراعة والاستعمال. يزود هدية وطيحة.

١٧٨٠٢ - عيار الشمس السقولي

كبتكر، ليلقاس دومي

Helianthus tuberosus (S). *Hélianthe tubéreux*, *Topinambour* (F). *Canadopotato*, *Jersusalem artichoke* (E). *Knollensonnenblume* (D). *Elianto tuberoso*, *Tartufo bianco*, *T. del canna*, *Carciofo di terra* (I).

نبات سقولي زراعي معمر. جلوه سنزائية الشكل والقد، ساقه مستقيمة تدلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أوراقه كبيرة اللد، مستطيلة المت، نصلها جامد الصفة الخشن، مسن الحافة، ثلاثي الفروق الرئيسية. قرصه الزهري متوسط اللد قطره نحو ٦ سم. لسيات انذاره احمليجية الشكل، زاهية الصفار || انذاره يستمر من ايلول الى تشرين. زراعته شائعة، صاقله مأكولة، يرغب في الارربة المتوسطة الانسجام والربطية.

١٧٨٠٣ - عيار الشمس الفضي

Helianthus argophyllus (S). *Hélianthe argenté*, *Soleil argenté*, *S. du Texas* (F).

نبات زراعي حولي يصلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فراء. فروعهها دقيقة، جامدة، زياء للحاء، أوراقه كبيرة اللد، يضيقة الشكل، ثلاثية الفروق || نصلها انغب البشرة فصي للمواج || اقراصه الزهرية كثيرة البد، صغيرة اللد، لسيات انذاره مستطيلة الشكل، جميلة الصفار الزاهي، سطحها المختار || انذاره يستمر من آب الى ايلول.

١٧٨٠٤ - عيار الشمس القاسي

Helianthus rigidus, *H. scaberrimus* (S). *Hélianthe rigide*, *Soleil scabre* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة قلبية. أوراقه متبادلة، كبيرة اللد، يضيقة، لسنة. نصلها جامد الصفة المسكة الخشن. اقراصه الزهرية قليلة البد، محدلة اللد، قطرها يراوح بين ٦ و ١٠ سم. لسيات انذاره الى الصفرة الزاهية السوية. || انذاره يستمر من آب الى ايلول.

١٧٨٢١ - عَيْدُ بُولِين * Eupeimidas (S).

Eupeimidas (F). Eupeimidas (E).
فضيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المصنوعة .
اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها ناعمة تتنقل
على الحشرات الضاربة من نصفيات الاجنحة والضمديات
والحرشفيات || حشرات صغيرة تطول من ٢ الى ٤ سم .
اجسامها شبه اسطوانية . مرنّاتها سلبية ، مستقيمة . اذواها
عديدة الاولان يكثر فيها الاسود القمعي . اجسامها شديدة
القصر او لا يوجد لها || اشهر انواعها عيول جيبي .

١٧٨٢٢ - عَيْدُ بِيحِي * Abdimia abdimi (S).
Sphénorhynchus (F).

طائر من طول الساق وفضيلة القلقليات . اسلانه البلاد
الافريقية يحبب بحيراتا وانهارها كل عام || ثوبه اسود
اللون تملوه مابة ارجوانية في الرأس والظهر والصدر ومابة
خضراء في الجناح والذنب . عيروه وزوره ويطه وزمكته
بيض . واسه تتوج الثفن بكشة صغيرة من الريش الارجواني
الاسود اللؤلؤ || يالف بجاري الماء . قوته الحشرات
والزحافات والقترحات وبعض الاشباب المائية .

١٧٨٢٣ - عَيْدُ كَابِ هو السَّاقِ الكاذب ، اطليه .

١٧٨٢٤ - عَيْدُ المَشَبِ العَبْرُودِ وشب عِرد هو الرقيق الرديء الفشار .

١٧٨٢٥ - عَيْدُ رُوسِ * Epterus (S).
Eptera (F). Epterus (E).

جنس حشرات مؤذية من لمحات الاجنح ديهيات القرون
وضيلة الحشرات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ عاقلها
معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش تحت
قشور طلاء الانجار في اثناء لانظامية الخطوط تحلبها
بالعسل والعرض || اجسامها صغيرة عمدة الظهر ، بيضه
للشعرين ، تطول من ٢ الى ٣ سم . اذواها لامة يكثر فيها
الاسود والكسني والماني . احادها مبهمة التخديط الطويل .

١٧٨٢٦ - عَيْدُ جُوبِ Jububier des Ichtyophages (F).
هو القفال ينبت ويعظم قرب شطوط الانهار .١٧٨٢٧ - عَيْدُ اَبْرَالِ * Abralia (S).
Abralia (F). Abralia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات واسيات الارجل .
انواعه المعروفة ثلاثة منها واحد يعيش في البحر الابيض
المتوسط والثاني في المحيط الاطلسي والثالث في المحيط الهندي .
جميعها تأكل الحياض والشطوط . اجسامها شبه غروبية
الشكل . ارجلها حاسنة ، معتدلة الطول ، مزينة بكلايات
تكتنف القواعد وبصيفين من الحامض الطرفية الارتيكار .

١٧٨٢٨ - عَيْدُ Aunée conyze (F).
هو القزوف ، اطليه .١٧٨٢٩ - عَيْدُ Obsidienne, Obsidiène (F).
Obsidian, Volcanic glass (E).

نوع من التلمسية البروتاني . جسم حجري شديد الصلابة
مرجه الصخور النارية || يكثر وجوده عند فوهات
البراكين القديمة والحديثة ، وفي بعض مناطق مصر وسفارتا
والكميك والبيرو .

١٧٨٢١ - سَبَّار بُولِين * Tolypeustes tricornatus (S).

Apar de Bullion (F).
موطن البرازيل والفونان وبوليفيا . جسمه يطول نحو
٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٧ سم . قوامه خاسية
الاصابع في الامامية والخلفية . دره عنبري اللون .

١٧٨٢٢ - سَبَّار مَحْرُوطِي الذَّكَبِ * Tolypeustes conurus (S).

Apar à queue conique, Mataco (F).
نوع من البسار موطن بوليفيا وبعض مناطق الاربعين .
جسمه يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو
٦ سم . قوامه الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون .
اطلح الملوخ .

١٧٨٢٣ - سَبَّار مَوْرِي * Tolypeustes Muriel (S). Apar de Muriel (F).

موطن الشيل وبعض مناطق الاربعين . جسمه يطول نحو
٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥ سم . قوامه
الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون الملوخ .

١٧٨٢٤ - عَيْدُ كَرَكَةِ جَبْرِية * Expression algébrique (F).

جلة حياية مردحا الجبر .

١٧٨٢٥ - عَيْدُ كَرَكَةِ Pimaria domestica (S). Pimaria domestica (F).

حشرة منبهة قانصة من فصيلة الردييات ورتبة اختلافات
الاجنحة . جسمها صغير لثدي يطول نحو ٩ سم . رأسها
صغير ، بطولي الشكل . غطها معتدل الطول . عيناها
صغيرةتان . زبائنها دقيقتان مستطيلتان . كوسلها وشي
الشكل . الزوج الامامي من قوائمها مجهز قنص . للمور
يحمل متحسا حاداً || قوماها الى الخطي الاسمر يطول موالج
تني في الرأس والكقول || سرسها دجوي . قوتها الدم
تنص من العيوس اولاً ثم من كل حشرة تستطيع قصها .

١٧٨٢٦ - عَيْدُ Eglancier (F). Brinr, Dog-rose (E).
هو الشرسين ويعرف بالورد الجليل ، ينظف وينظف حتى
تقطع منه العصي .١٧٨٢٧ - عَيْدُ القَبِ هو حب الكاكنج وشب كسلب وشجرة الردء من
اللسان . ويكثر من الاغلات من ابي حنيفة .١٧٨٢٨ - عَيْدُ القِدِ : نبات طيب الرائحة تكلف به الايل لانه ملينة
سنة (اللسان) .

١٧٨٢٩ - عَيْدُ اللُّارِي هو السجور ، اطليه .

١٧٨٣٠ - عَيْدُ لِي جِيَرِي * Eupelmus Geer (S). Eupelma Geer (F).

حشرة مباشرة ناعمة من فصيلة الميديليات . موطنها بعض
مناطق البلاد الحارة والمتنوعة نحو المعتدلة الحرارة . تتنقل
على الكثير من الحشرات اعصها المتوسيات ومنها متغذية
الذئ || جسمها عادم الاجنح ، صغير لثدي يطول من ٢
الى ٣ سم . جوشها غدد الجانبيين . يطها معتدل الحجم .
مرزها جالس التصل الجامة ، معتدل الطول . قوماها الى
السواد القمعي اللامع .



سَبَّار بُولِين



عيول جيبي



عَيْدِي



عِدِوس



عشيرة

١٧٨٣٦ - **عشيرة** *Osmanthe* (F).
هي البوق ، أظلم . أما البقرة في وضع الأبرص صفلي
للشباب .

١٧٨٣٧ - **عشيرة** *Griffe* (hoc) (F).
Root (E).

أول ما يبتدئ من أصول القلب ونحوه هو غرض
قبل أن يظهر حل سطح الجذبة . الواحدة مبقرة .

١٧٨٣٨ - **عشيرة** *Zabrus* (F).
Zabrus tenebrius, *Z. gibbus* (S). *Zabrus des cé-*
réales, *Z. bossu*, *Z. des moissons* (F). *Corn ground*
beetle (E). *Getreidelackfresser* (D).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها محبب الشكل ،
طولها يتراوح بين ١٤ و ١٦ م . ثوبها بني اللون ، أسود
المزاج . تعيش تحت الحجاره ونباتها . تسرح في الخليل
تتركب الأزور وتقرض الحب قبل ادراكه . يرقاتها
تقيم في التربة داخل اتفاق تحفرها قرب جلود الزروع ،
تخرج منها في الليل لتفشي حل الاقارب النباتية .



عشيرة

١٧٨٣٩ - **عشيرة** *Ibacus* (S).
Ibacus (F). *Ibacus* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشرية مغاربية الى ابريل
طوال الليل رضية الكركليات . انزله المعروف حديثة
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة . اجسامها مبطنة
كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز بصغر قوائمها
وبدهونها القصيرة المنسنة الطرف الاسامي . انزايها
متباينة الايام يكثر فيها الاخضر ومغطاة . جميعها
ماكولة متوسطة المصنف .



عشيرة

١٧٨٤٠ - **عشيرة** *Amara senesca* (S).
Amara bronze (F).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها لوزي الشكل ،
محبوب السطح طولها نحو ٨ م . قوائمها انضغاطية
يطول مزاج اسف . زياتها حر الجسم ، سود الطرف .
قوائمها سود السيقان والانفذاذ ، حر الارباع . تركب
التجليات على اختلاف اجسامها وانزايها . تعيش على
الزروع قبل ادراكها . يرقاتها خافتة قليلة الاذى .



عشيرة اسف

١٧٨٤١ - **عشيرة** *Amara fulva* (S).
Amara rous (F).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها محبب الشكل ،
طولها يتراوح من ٨ الى ١٠ م . ثوبها اسف اللون ،
اخضر المزاج . تركب الزراعات الخفيفة على اختلاف
انزايها . قوائمها الارباع والبروز تنقصها وتصلب . يرقاتها
خافتة تعيش على مختلف اوراق النبات اغصانها التجليات
والسليبات والركبات .



عشيرة اسف

١٧٨٤٢ - **عشيرة** *Amara eurylna* (S).
Amara chéan (F).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها يعني الشكل يطول
نحو ١٠ م . ثوبها كسفي اللون اشقر المزاج . زياتها
وقوائمها سود . تركب البقول والنباتات الخفيفة اغصانها
السليبات . يرقاتها خافتة قليلة الاذى تكفي بقض
امراض الاروان .



عشيرة كسفي

١٧٨٤٣ - **عشيرة** *Pterostichidae* (S).
Pterostichidae (F). *Pterostichidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة عثويات الاجنحة . اجناسها
وانزايها كثيرة المند . جميعها صغيرة لينة ، نمدة الاتحاد ،

١٧٨٣٠ - **عشيرة** *Agelena* (S).
Agelene (F). *Agelena* (E).

جنس حناكب من فصيلة العنكبوتيات . انزايها المروعة
كبيرة المند ، منتشرة في معظم اصقاع البلاد الممتدة
الحرارة . جميعها كبيرة القند . تعيش في البراري بين
الاشجار والادغال . قوتها الذباب والحوام وبعض الحشرات
الصغيرة . اشهر انزايها عشيرة التي وعشيرة البقرة .

١٧٨٣١ - **عشيرة** *Agelena labyrinthica* (S).
Agelene labyrinthica (F). *Labyrinth-Spider* (E).

نوع من العنكبوتية موطنها البلاد الممتدة الحرارة . تألف
البراري والحراج . قوتها كل ما خلق يراها من حشرات .
جسمها يطول نحو ١٢ م . عند العنكبوت ونحو ١٦ م .
عند العنكبوت . صغارها اعطليجي الشكل ، جزوي اللون
يميل وقود عند الفرس ويغير مع اقترابه من البطن .
صينها زياتان . فوسها صغيران منعقدتان . فكها
ضليمان مقوسان . جبرامها مستطيلة . كثيفة الحب .
بطنها يعني الشكل ينتهي بزالنتين فحيتين وهو الى السرة
المخفية يطولها شمشيح احمر وسرته تنية . شمشي قسي
الشكل ، كبير القند ، قصير العنق الاجوف ، طليق
القاعدة المثبتة ببعض الحويط . يياتها الشترية يستمر
نحو خمسة اشهر تقريبا في عكدة صغرية الشكل ، جامعة
الحيك تخمرها تحت الحجاره المروعة من غير الله .

١٧٨٣٢ - **عشيرة** *Agelena elegans* (S).
Elegant-Spider (E).

نوع من العنكبوتية . موطنها البلاد الممتدة الحرارة . تألف
البراري . قوتها الحشرات الصغيرة اغصانها الذباب والحوام
التي تعلق في شراكها بكثرة . جسمها صغير القند يطول
نحو ٣ م . عند العنكبوت ونحو ٤ م . عند العنكبوت . صغارها
قسي الشكل ، جزوي اللون . صينها زياتان . فوسها
صغيران منعقدتان . فكها مقوسان . جبرامها مستطيلة
كثيفة الحب . بطنها يعني الشكل ينتهي بست زوائد
نحيلة . وهو اسير اللون ، اخضر المزاج يطول طوله اسود
يحمض حسة خطوط متزمنة اثل اسوداد منه . شمشي
قسي الشكل ، كبير القند المستديرة ، طليق القاعدة
المثبتة ببعض الحويط ، حديد الشراك والحجارة التي تملو
من جميع الجهات . مكنتها بطولها الشكل تحبها تحت
الحجاره او بينها في المراتح التي لا تخشى غير الله .

١٧٨٣٣ - **عشيرة** *Agelenidae* (S).
Agelenidae (E).

فصيلة من العناكب . اجناسها وانزايها كثيرة المند .
اعطائها معظم اصقاع العالم . تتميز بفصلها الاجسام ،
بمطاطة الجرامز ، بالباح الشم وبكبر الاشجان العليا .
اشهر اجناسها العنكبوتية ، والفلس المعروف بتكبيوت
النازل ، والدية .

١٧٨٣٤ - **عشيرة** *Andeln* (F).
Swach, Windrow (E).

البقرة كية العشب التي يحصدوا الحاصد عند كل خطوة .
اما اذا كانت من الزروع كالقشع والشعر فقصي فطما .

١٧٨٣٥ - **عشيرة** *Antelope melle* (F).
Antelope melle (E).

هو الذكر القمل من البلاء .

يأتي زهرة سيدة يضاء اللون ، صفراء المواج ، فواحة العرف البطري || أزهاره يستمر من شباط إلى نيسان .

17852 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum pulchellum* (F). *Nivéole gracile* (F).

أوراقه صفسية خفيفة النصل الفسفي اللون . ثمرانه الزهري يملأ نحو ٣٠ سم . زهرته صفيرة اللثة ، يضاء اللون ، صفراء الحنجر ، خافتة العرف || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران .

17853 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum hiemale* (F). *Nivéole d'hiver* (F).

أوراقه عيطية ، نحيلة ، زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٠ إلى ١٥ سم . ثمرانه ثنائي المصراع . أزهاره ثلاثية أو رباعية التجسيم ، يضاء اللون ، خضراء النشة . أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان .

17854 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum aestivum* (F). *Nivéole d'été* (F).

أوراقه صفسية الشكل جملة الخضار الزاهي . ثمرانه يملأ من ٢٠ إلى ٥٠ سم . ياتي بفسه من الأزهار راجح معددا بين ٤ و ٨ وهي عاجية اللون خافتة العرف البطري . أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار .

17855 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum roseum* (F). *Nivéole rose* (F).

نبته نحيلة زهقة . أوراقها دقيقة ، مستطيلة ، خلية النصل ، بحرية اللون . ثمرانها يملأ نحو ١٥ سم . ثمرانها ثنائي المصراع ، زهرتها وردية اللون ، وسيدة ، تطول نحو ١٠ سم || أزهارها يستمر من أيلول إلى تشرين الثاني .

17856 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Dictateur* (F). *Dictator* (E).

الجميل المطلق المصروف . ج عباطة .

17857 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Dictature* (F). *Dictatorship* (E).

الجملة الماطة المطلقة المصروف .

17858 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Magnitude* (F). *Magnitude* (E).

تمير اصطلاحي يستعمل في قياس الضوء الفلكي وتحديد لمعان النجوم والكواكب .

17859 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Esclavagisme* (F). *Pro-slavery* (E).

ملعن طبيعي حث بعض أنواع النمل يرتكز على غزو قري غيره من الأنواع وعلى سلب ما فيها من بيتين للاحتضانه واستعباده فيها بعد .

17860 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Pro-slavery* (E).

المبور : الجملة من الفلم وقيل اصفر وقيل بعد الفلم ج حبار .

17861 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Apus* (F). *Apus* (E).

جلس دويبات مائفة مفترسة من القشريرات غشويات الاطراف وقصيلة البصويبات . انواعها المرولة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المناطق والندردان والاهوار || اجسامها صغيرة شبه بيضبة الشكل ، مبطلة

لامسة الاطراف المختلفة الالوان . قرونها الاستشعارية زبام المفصل ، حلبة الاطراف . اسواق قوائم ذكورها الامامية ثلاثية النقل تحصل صفان من الحاميم || رقاتها دقيقة ، صفيرة ، غير اللون ، سمره الرأس والمكب . امرفها واضرها اقتصاديا للبقوس .

17862 - **عَبْل** (F). *Grivet* (F).

هو الاقل المفصل ، اعطيه . وهو يجري في حاله وارواكه الكثير من حاميس التنيك لذلك يوقف الاسهال كما يصنع النمر وسيله اصفر قائم .

17863 - **عَبْلِيَّة** (S). *Aplidia* (F). *Aplidia* (E).

الواحدة عيطية . جلس حشرات غاضلة من غليات الاجنحة وقصيلة الجمليات صفسيات القرون . انواعها المرفقة ست . اطالها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه اهلجالية الشكل ، صفيرة اللثة ، تطول من ١٦ إلى ٢٠ سم . قرونها الاستشعارية صفسية ، ثلاثية اللون . رزورها وكواشها وبطنها احمر خضاباً من المهاد . ظواهرها لا يخلص كامل البطن || قوتها اوراق النباتات البحرية ولا تصف من للزراعة والبقلي .

17864 - **عَبْلِيَّة** (S). *Vitrina* (F). *Vitrina* (E).

جلس حيوانات برية من الرغويات مدهيات الاجل وقصيلة البزائيات . انواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || تعيش في المناطق الرطبة تحت الصخور والجذابة وتحت حبرز الحطب المقسورة بالثلج || اصداها صغيرة ، حلزونية ، رفيقة ، شفافة ، ملونة . اجسامها مستطيلة ، رباعية الالوان ، ملونة كالاصدا .

17865 - **عَبْلِيَّة** (S). *Leucolum* (F). *Leucolum* (E).

جلس نباتات بصلية من فصيلة التريسيات . اوراقها قرمية الانتشاب ، قليلة العدد ، مستطيلة النصل العصي الشكل . انحدارها بحرية مراكبة البتلات ، يجمعها ويصغرها ثمران دقيق مسط || اشهر انواعها الزراعية التريسية ما يلي .

17866 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Nivéole d'automne* (F).

أوراقه خيطية نحيلة زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٥ إلى ٢٠ سم . ثمرانه سيد للمصراع . أزهاره صفيرة اللثة ، ثلاثية أو رباعية التجسيم . بتلاتها وردية الناعمة والانتشاب يضاء الصفرة || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول

17867 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Leucolum vernum* (S). *Nivéole printanière*, *Gréol blanc* (F). *Spring snow-flake* (E). *Frühlings-Knotenblume* (D). *Primstro*, *Campanello*, *Bulbo bianco* (I).

أوراقه صفسية منبسطة تعرض نحو ١٦ سم . نصلها جيل الخضار المائق . ثمرانه الزهري يملأ من ٢٠ إلى ٣٠ سم .



عبل



عبلية



عبروشية



عُبُوس

Orgasme (F). عُورُفَان - عُورُفَان
Orgasm (E).
المُتَرَفِّعُ وَالْعُورُفَانُ حالة الامتلاء التام التي تعقب التمتع .

١٧٨٧٦ - عُورُفَان

هو مقام حره ، اطلبه . واحدته عوربه .

Genre spécifique (F). عُورُفَان
Specific genus (E).

النسرة في تصنيف الاحياء هي الجنس الذي يشمل معظم الميزات العامة والخاصة للموصوف .

١٧٨٧٨ - عُورُفَان

هو الذئب ، اطلبه .

١٧٨٧٩ - عُورُفَان ، عُورُفَان
Gallus (S).
Coqs (F). Cocks (E).

جنس طير من فصيلة التندريجات . ربع البطة . قصير الاجنحة مستديرا . انفيه يتألف من ١٤ الى ١٨ ريشة منتفخة اقزام الاخير . رأسه منقوش برف لحسي وبجمل حل جانبي شقه رصتين لحيتين . منقاره قوي القرنية ، مقوس الفك الاعلى . ساقه عفيه . ريشه اسطو او كاسي . غشاه خسة منها ثلاثة لامية دائمة واثنان خلفيان ، ويبدوها لا قياسي . دايرة قوية سادة الحروف || انماه خسة اشهرها العُورُفَان الداجِن للمروف بالدياج بالاعلى .

١٧٨٨٠ - عُورُفَان بَنَكِيَّة
Gallus Bankiva,
G. ferrugineus (S). Coq de Bankiva (F).

طائر من العُورُفَان جميل الشكل ، طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه مزيج الالوان الزاهية فيه الاسفر والبنجي والاسمر والاحمر والاريجاني والافضر والاسفر المثلج والاسود والاسمر والاففس . حره احمر اللون وريشاه كذلك || انماه تدنق في القرية وتضع الحوصها بالقش والريش . تعيش من ٢٠ الى ٢٢ يمشة تحضنها بسدعا ثلاثة اشابيع . قوتها الاشباح والحبوب والفاجر والخضار والخشرات . موطنه الهند الشمالية حتى ارتفاع ١٢٠٠ م . والسند وبورمه والهند الصينية والفيليبين .

١٧٨٨١ - عُورُفَان جَاوَه
Gallus fuscatus (S).
Coq de Java, C. tacheat (F).

نوع من العُورُفَان . طوله نحو ٦٥ سم . جميل الشكل حديد الالوان المزركبة الزاهية المنمقة ، يكثر في صدفه الاسود الاسفر المثلج . حره الازرق الاشباح بنفسي القبة ، فكه الاعلى اسود اللون اما الاسفل فاصفر || موطنه جاوه .

١٧٨٨٢ - عُورُفَان دَاجِن * ، عُورُفَان ، دَاجِن اَهْلِي

Coq domestique, Poule domestique (F). Domestic cock, Domestic hen (E).

نوع من العُورُفَان يعرف بالدياج الاعلى . موطنه العالم . يقال انه يتصرف من عُورُفَان بَنَكِيَّة . حره السميتين قبل الميلاد بنحو ١٤٠٠ سنة . وصره البابليين به ذلك بنحو ٨٠٠ سنة ، لما اليونان ظم فذكروه الا في عهد اريستوتل وذلك نحو ٤٥٠ سنة قبل الميلاد || فمرور به وبلااته عديدة لا تعد ، يقال انها تفوق الالف . فوارثها كثيرة منها الثوب والشكل والحجم والحر والبرق وهدد انبيس وصفت اللحم والطاقة الاعائية والمناعة الذاتية ، الخ .

تلحقها جنات عديدة تلتف الطيور وتلتص بالراس . ارجلها صردية شديدة الصفر ، كثيرة البدن . اذنانها طليقة ثنائية الحركة .

١٧٨٩٢ - عُورُفِيَّات *
Apusidae (S).
Apusidae (F). Apusidae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات عورفويات الارطاف . اجناسها وانواعها متوسطة البدن ، منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المنطق والاهوار حتى جفافها وتزداد اليها عندما تزداد المياه . سرعا يحفظ بحيوته في الارض الجافة اكثر من ثلاث سنوات || اجناسها صغيرة القبة تلحقها جنات عديدة ملتصقة بالراس . اقبالها الى الريدة الحفر والبرق في الماء || جميعها مفترسة ، قوتها الحويثان والديدان التي تعيش في الماء || اشهر اجناسها الكويوس .

١٧٨٩٢ - عُورُفِيَّات
Adenoma (S).
Adénoma (F). Adenoma (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانتنيات . انواعها المعروفة قليلة البدن جميعها من ثورت افريقية الشرقية وسواحل الهند . تنبت في المواقع الرطبة || اوراقها متفائلة ، صلبة القبة ، اذنية الاتصال الاحليلجية الشكل ، حطرية المرف الشبيه بالتمسك ، ازهارها وردية اللون ، غلافه المرف المتصحب . ازهارها سنبل التجميع .

١٧٨٩٤ - عُورُفِيَّان ، عُورُفِيَّان ، عُورُفِيَّان
هو الشيطان ، اطلبه .

١٧٨٩٥ - عُورُفِيَّان اَبْنَس
هو الشبح القمعي ، اطلبه .

١٧٨٩٦ - عُورُفِيَّان مَبْدُول
هو الشولا ، اطلبه .

١٧٨٩٧ - عُورُفِيَّان
هي اللد ، اطلبه .

١٧٨٩٨ - عُورُفِيَّان *
Abyla (S).
Abyla (F). Abyla (E).

البيضة حويان بحري من الحويثات وردية الماصات . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٧٨٩٩ - عُورُفِيَّان
هو الشحية ، اطلبه .

١٧٨٩٠ - عُورُفِيَّان
الثنائي والحار الثنائي واحد . واسع سمار الزرد .

١٧٨٩١ - عُورُفِيَّان السَافِيَّة
Agrès, Appareux (F).
Rigging, Apparatus, Gear (E).

هي الادوات التي لا بد منها لصلاحية وتعتبر جزءا من السفينة في حالة البيع والرمز والحجز والتأمين .

١٧٨٩٢ - عُورُفِيَّان زَرَاعِي
Masériel agricole (F).
Agricultural material (E).

هي الاجهزة الزراعية الثقيلة .

١٧٨٩٣ - عُورُفِيَّان
الحنق من الخيل : النجائب ، مفردة حتى || العناق من الطير : الحمارج ، مفردة حتى .

١٧٨٩٤ - عُورُفِيَّان
Hyène mâle (F). Hyène male (E).
الذكر من الفصاع .



عُورُفَان بَنَكِيَّة



عُورُفَان دَاجِن

١٧٨٩٠ - عِثْم * عِثْم ، زَيْتُون بَرِي

Olea sylvestris, *O. oleaster* (S). *Oleastre*, *Olivier sauvage* (F). *Wild olive tree* (E). *Wilder Ölbaum* (D). *Olivo salvatico* (I).

هو الزيتون البري شجرته تملو من ٥ الى ١٠ امتار . فروعه وفاتنه شائكة . اوراقه معتقة سنائية . نصلها جامد اللسيح ، مذهب المقصبة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . صفحته العليا بجمرة اللون والسفل خالية يطولها مواج فضي . ازهاره عطوي التجميع ، محوري الازدكار . ازهاره صغيرة قهوي يفسد اللون ، غصنوا المواج || ثماره بيضيه الشكل ، صغيرة القند ، قليلة البلب تدهى الزنج .

١٧٨٩١ - عِثُود

العتود هو الجدي الذي استكرش وقيل هو الذي بلغ السفاد .

١٧٨٩٢ - عِثُومَة *Chamelle bonne laitière* (F). *She-Camel great deal of milk* (E).

الناقة الغزيرة الدر .

١٧٨٩٣ - عِثِي * *Nova* (F). *Nova* (E).
الشي كل نجم يشبه عبقله فجأة ثم يهبر . ج . حثات .

١٧٨٩٤ - عِثِيَق *Cheval pur sang* (F). *Blood-horse* (E).
نعت تمرني يطلق على كل فرس كريم منسوب السلالة .

١٧٨٩٥ - عِثُث *Mites*
كلمة شاملة تطلق على عدة حشرات من فصائل مختلفة يسمها ما تلحقه من اذى بالحيوان والطير والفراء والالبسة الصوفية والكتن ، الخ .

١٧٨٩٦ - عِثَان * *Fumago vagans* (S).
Fumagine, *Noir*, *Sule* (F). *Sooty mould* (E). *Russta* (D).
وسم فطري يمد الى مختلف انواع العثان من فصيلة الرشيميات ورتبة الرشيمات . يصيب نوعي النبات فيركب الاذن والافان والاوراق الفتية ويمتصها ويوشع لبد من السنام يمنها من القيام بوظيفتها || اضراره قليلة لانه محدود الانتشار يمتد الى البرتقال والزيتون والكرمة وبعض النباتات الصناعية كالتبغ .

١٧٨٩٧ - عِثَّة *Dermestes*, *Attagenus* (S). *Dermeste* (F).

جنس حشرات مؤذية من فصيلة البشيات . انواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة القند باعثة الالوان . تميش على ازمار البشيات || رقاتها مؤذية تفسد الجيوب والفراء واللبس والبط والشر والصوف والريش والفراء واللحم المقددة ، الخ . اضرارها واضرها ما يتبع .

١٧٨٩٨ - عِثَّة الحُيُوب *

Trogoderma granarium, *T. versicolor* (S). *Trogoderma des grains* (F). *Khapra beetle* (E). *Khaprakifer* (D).

حشرة من البشيات طولها نحو ٣ م . ثوبها بني اللون ، رأسها وبشيتها ورديها سود . زبالدا على الحرة الابروانية . رقتها حليلة الجسم ، دقيقة القند ، بنية الثوب الجذع بالايض . تركيب الجيوب الخزونة فتلتصمها وتلتفها .

١٧٨٩٣ - عِثْرَقَان سَرْتَدِيْب

Gallus stanleyi, *G. lineatus* (S). *Coq de Stanley*, *C. de Ceylan* (F).

نوع من العتراق ، ثوبه ثوب عتراق بكيفه الا انه اسفر البرق والورعيتين حاد الصوت للسيل للقرقرة . موطنه سرتديب .

١٧٨٩٤ - عِثْرَقَان هِنْدِي *Gallus sonnerati* (S). *Coq de Sonnerat*, *C. sauvage de l'Inde*, *Katukoli* (F).

نوع من العتراق . موطنه الهند . طول نحو ٥٠ سم . ثوبه كثالب ، جسده متراكب الالوان الكثيرة الزاهية غير انه يتركز على الالوان الاربعة . عرقه احمر اللون وريشاته كذلك ، مقاربه وريشاته الى الصفرة || جسمه مع سائر انواع جسده الاجنح الاقضية الاخصان .



عتريس

١٧٨٩٥ - عِثْرِيَس * *Atherix* (S). *Athérice*, *Athérice* (F). *Atherix* (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة ذوات الجناحين اناوله المروقة عشرة اعطائها تمتد من الصين الى اوروبا || اجسامها ممتصة القند ، تطول من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها كبيرة . عريضا كبيرة ، فلققة عند التقين . قرنيها الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطائها مستطيلة . ملابها صغيرة . كراسها كبيرة . بطونها مستطيلة . ظنايب قوامها الوسيط والمخلفة شائكة المناسخ اللدية . وراشها ملونة والظايب ايضا || تألف الملقح الرطبة وشفاف عياري الماء . جميعها قاصدة . يرقاها تميش في الماء على المواد الصوفية المنسلة .



ثم

١٧٨٩٦ - عِثْرِيَس * *Campaphagus* (S). *Campaphage* (F). *Campaphagus* (E).

جنس طير من فصيلة الترسيات . اناوله المروقة نحو ٥٠ جميعها من اناوله وضوايرب العالم القديم . تألف النابات والاحراج والحدائق || اجسامها صغيرة القند ، تباينة الالوان المستديرة الاطراف . صغيرة الناقية اللدية . الظايب متباينة الالوان المتراكبة . رؤوسها ميلقة . صدورها وبعطوها محتلة تملوها رقيقة سمراء تنصر حتى الانتفاذ || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان والذباب . تكثر في الاجنح لقتل المعتلة الارتفاع البعيدة من السمرا . تحسن نحو خمس يضياف ترعها الاثان بمناوبة الذكور نحو ١٥ يوما .



عثان

١٧٨٩٧ - عِثْرِيَسِيَات * *Campaphagidae* (S). *Campaphagidae* (F). *Campaphagidae* (E).

فصيلة طير من الجوام مشروبات المنابر . اجسامها والظايب المروقة عديدة لا تقل من تسعين . موطنها العالم القديم ، معظمها اميري وبعضها اوروبي وافريقي . الانواع الاسيوية والادوية من الضوايرب اما الافريقية قليلة || تألف النابات والاحراج والحدائق . قوتها الحشرات واساريها والديدان والذباب || اجسامها تراوح بين الصغيرة والوسطى . تتميز بمناقضها الصغيرة اللدية وبانذابها قرتاجية الريش || اشهر اجسامها الترس .

١٧٨٩٨ - عِثْك *Agamie* (F). *Agamy* (E).
هو اندام الازمار .

١٧٨٩٩ - عِثْكَة *Levier* (F). *Lever*, *Crow-bar* (E).
هي الزائمة اي الخلل . ج . حل .



عثة الحبوب

١٣٧ - عثة السجاد * *Anthrenus verbasci* (S).*Anchrène des tapis* (F). *Carpet beetle* (E).

حشرة من العثيات يضيئة الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها اسود اللون. عذماها مدبجتان يقع شرقية طلاء اللون. ريقها دقيقة قصيرة حلوية الجسم، سمراء اللون، سوداء الرأس والأرجل، يضاء للذب. تلحق السجاد وتترى الأثاث الصفي.

١٣٨ - عثة الشمع * *Dermestes lardarius* (S).*Dermeste du lard* (F). *Larder beetle* (E).

حشرة من العثيات طولها نحو ٩ م. ثوبها اسود اللون تملو شحمة خلية طلاء. تتركز في النصف الاول من العمدن || ريقها غبراء اللون تلمس الشمع والقراء وتترى المواد الحيوانية.

١٣٩ - عثة البرك * *Dermestes vulpinus* (S).*Dermeste renard* (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٨ م. ثوبها اسود اللون، افر الحوافر الخلية. يطنها الى السمرة يملو خط قاطب احمر || ريقها سمراء اللون سوداء الرأس والفرج والأرجل. تركب القراء والجلين وتختلف المواد الحيوانية والنباتية.

١٤٠ - عثة الترائل * *Actagenes peltis* (S).*Actagene des pelledors* (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٤ م. ثوبها حشلي اللون. افر المراج تحمل في كل من عذماها نقطة يضاء || ريقها ففراء اللون سمراء الرأس تحمل عند ذريها قمة من الحلب الطويل. تركب وتقرض القراء والبسط واليابب الصفي.

١٤١ - عثة الكمون * *Anthrenus pimpinellae* (S).*Anchrène des pimpinelles* (F).

حشرة من العثيات يضيئة الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة تحمل في وسط عذماها جدة متفرقة يضاء اللون. تركب بيوم عام جميع ازاوار نباتات فصيلة المركبات اعصها الكمون والانيسون.

١٤٢ - عثة المتاحف * *Anthrenus museorum* (S).

Anchrène des musées (F). حشرة من العثيات جسمها يضيي الشكل مبسط. طولها نحو ٣ م. ثوبها ابيض اللون. تعيش على ازاوار نباتات الفصيلة الحمضية || ريقها صغرية، دقيقة، غبراء اللون، مجعدة بطول حلوية حشلية، تقرض كل ما وصلت اليه من المواد الحيوانية المحفوظة كالخشب والجلين والحيوان.

١٤٣ - عثيل * *Clavatus* (S).*Clavatus* (F). *Clavatus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدعيات الارجل وفصيلة للكريزيات. انواعها المعاصرة المروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي وشواطئ افريقية الشمالية || اصداها وشعبة الشكل تملوها بعض المتاحف الكبيرة المأددة. فروعها شبه فريضة الشكل. سرود الفوية مجهز بثلاث اسنان، السن الوسطى قصيرة اما الجانبيتان فكثيرتا القد مدببتا الاطراف.

١٤٤ - عثور، عثري * *Culture sèche* (F).*Dry-farming* (E).

المشر والعثري والبدي: ما سقته السياه من الاجار والزرع. ومنه في حديث الاكاذب: ما كان يذر او مرقيا فيه لعشر.

١٣٧ - عثور

هو الاطر من النباتات الزينية، اطاله.

١٣٨ - عثوب

غير نحو شجر الرمان في القدر وورقه احمر مثل ورق الحماض رق عليه بطون المثنية ابل شيء ثم تغط عليه الشمع بعد ذلك وله صالح جمر وله حب كعب الحماض. واسفة شربة (من اي حنيفة).

١٣٩ - عثق

هو البقس الدائم الحفرة، اطاله. واسفة عثقة.

١٤٠ - عثكول

Panicule (F). *Panicle* (E). عثقون من السيليات بسيط كان او مركبا.

١٤١ - عثكولي

Paniculé (F). *Paniculate* (E). نمت تعريفي يوصف به الازهار الذي شكله شكل الشكول.

١٤٢ - عثلب

Bouture (F). *Slip, Cutting* (E). عثلب هو كل قصيب او فند او حقة الخ. صار قطعة وقصيرة للفرس.

١٤٣ - عثلب

Bouturage (F). *Propagation by slips, P. by cutting* (E). حلية فرس العثالب بعد تأليبها.

١٤٤ - عثلوييت

Schizophytes (F). العثلوييت فئة من النبات تتكاثر بالتجزئة اي بقطع جزء منها وقرنه في التربة. يقال نبات عثلوي.

١٤٥ - عثمان

فرع الجباري وقرع النيران.

١٤٦ - عثنج

العثنج: القسم الثقيل من الابل.

١٤٧ - عثبات

Dermestidae (S). *Dermestidae* (F). *Dermestidae* (E). *Speckkäfer* (D).

فصيلة حشرات البث من رتبة عذبات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القند، زهاب الجسم، متراكبة الانواع المختلفة الزركفة. قرونها الاستشعارية صرطنانية الشكل. ارسافها حلوية الشكل || تركب الازهار ولحاء الاشجار وتختلف المواد الحيوانية. ريقها تعيش على المواد الصغرية وبقايا الحيوان الجافة كالجلود والقراء والريش واللحوم المقددة، الخ.

١٤٨ - عثيل

Desfilore (F). *Desfiloreus* (E). نمت تعريفي يطلق على كل نبات متراكب الازهار البلية.

١٤٩ - عثجاة

Ergot (F). *Spur* (E). دائرة الطائر آتي يقرب بها.

١٥٠ - عثجالة، عثجالة

Salario (F). *Salary, Hire* (E). هي الاجرة التي يتقاضاها العامل لقاء لفسل الذي قام به.

١٥١ - عثجام

المعجم الخفاش الضخم.



عثة السجاد



عثة الشمع



عثة البرك



عثة الكمون



عثة المتاحف



عثور

اجناسها وأنواعها المرفوعة عديدة معظمها من نمول المناطق الاستوائية والحارة || جميعها حرجية تألف الغابات والحدائق اجسامها كبيرة القند مجهزة بمخاض حادة تهريق السم او تقلقه من بعد || يفسى أنواعها دجوي والبيض الأغر يسرح في النهار || اشهر اجناسها المجروف والكبار .

١٧٩٣٦ - عَجَزْ
هي القباب الذهبية ، تأخذ السخلة لتطير بها . ج عجزان .

١٧٩٣٧ - عَجَزْ
Déficit (F). Deficit (E).
هو مقدار النقص المحقق بعد اجراء كاسل الحساب .

١٧٩٣٨ - عَجَزْ ، قَبْ
Sacrum
عظم في آخر سلسلة الظهر .

١٧٩٣٩ - عَجَزْ الاستغلال
Déficit d'exploitation (F). Working deficit (E).
هو ما نقص من الدخل بعد تقويم المستغل بالنسبة الى الكلفة .

١٧٩٤٠ - عَجَزْ الأسد
عجز الاسد اربعة كواكب صغار اسفل من المراء .

١٧٩٤١ - عَجَزْ حرثي
Sacro-iliac (F).
Sacro-iliac (E).

١٧٩٤٢ - عَجَزْ ذبلي
Sacro-caudal

١٧٩٤٣ - عَجَزْ فريجي
Sacro-rectal
ويسمى مستقي وهو يختص بالحي المستقيم .

١٧٩٤٤ - عَجَزْ عصفري
Sacro-coccygien (F).
Sacro-coccygeal (E).

١٧٩٤٥ - عَجَزْ فقري
Sacro-vertébral (F).
Sacro-vertebral (E).

١٧٩٤٦ - عَجَزْ قطني
Sacro-lombaire (F).
Sacro-lumbal (E).

١٧٩٤٧ - عَجِفْ
Qui se prive de nourriture (F).
نمت ترميني يطلق على كل فراشة او حشرة جلالة لا تفارق القوت . وهي ، غالباً ، تعيش من يوم الى اسبوع . م . عيفة .

١٧٩٤٨ - عَجِفَاء
Terre aride (F).
Barren ground (E).
المجفأ والأرض المجفأ : التي لا خير فيها .

١٧٩٤٩ - عَجِفَات
Entomophthoraceae (S).
Entomophthoracées (F). Entomophthoraceae (E).
فصيلة لطور مجهرية من مرتبة النطريات ورتبة الليفيات .

١٧٩٥٠ - عَجَلْ
Veau (F). Calf, Veal (E).
ولد البقرة حتى السنة الثانية من عمره ثم يصبح جنداً .

١٧٩٥١ - عَجَلْ البَحْر
هو الفقة حيوان مائي لبون ..

١٧٩٥٢ - عَجَلْ حصي
Bouffillon (F).
Young bullock, Steer (E).
هو المجل سلأ حصياء .

١٧٩٢٢ - عَجَان
Périnée (F). Perineum (E).
المسافة الكائنة بين عضو التنازل والشرج .

١٧٩٢٣ - عَجَانِي
Périnée (F). Perineal (E).

١٧٩٢٤ - عَجَايَة
Tendon
التيامة . ج عجي وصيايات وصبايا : اوتار قوائم الخيل والاول .

١٧٩٢٥ - عَجَبْ
هو جلاب انيل ، اطليه .

١٧٩٢٦ - عَجَبْ ، عَجَبْ
Racine de la queue (F).
Origin of the tail (E).

المعجب : اصل الذنب وهو من كل دابة مسا اتم عليه الوركين من اصل الذنب المنفرد في مؤخر التيمر . وهو المعصب والمعصب . ج اعصاب وصعير .

١٧٩٢٧ - عَجْدْ
Raisin sec (F). Raisins (E).
المجد هو التزبيب او حب التزبيب .

١٧٩٢٨ - عَجِير ، عَكِيد
Loupeux (F).
Wenny, Knobby (E).
من الثبات ما كان ذا عير او عقد .

١٧٩٢٩ - عَجْرَة
Eclat de souche, Souches,
Souquet (F). Shiver, Splinter, Ragstone (E).
جزء من اروية الشجرة ، يحل رمحة او يفسى الجرام ، يقطع ويلتص .

١٧٩٣٠ - عَجْرَة ، مَعَجْرَة
Défolié (F).
Defoliate (E).
شجر عجرد وبمعرد : حار من ولة .

١٧٩٣١ - عَجْرَم ، أَشْكَل
Rhamnus pestiolaris (S). Narprun pestiolé (F).

الأشدة صخرة وأشكلة : شجرة برية ، حرجية ، جبلية من فصيلة النبقيات . اصلها يفسى جبال الشرق الادنى ومنها جرود لبنان || سلكها فرعاء كثيرة العقد الشائكة . فروصها متعاقبة ، متفرعة ، شائكة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، سنائية الاتصال الجمدة ، شديدة الحفار ، متعاقبة العروق . ازهارها ضمية التجميع ، عشوية ، خاسية الاجزاء . ثمارها كروية لحمية ، سامقة المذاق ، جزوية اللون عند الادراك || ازهارها يسمر من ايار الى حزيران .

١٧٩٣٢ - عَجْرَم
دوية سلبة تكون في الشجر (للان) .

١٧٩٣٣ - عَجْرَمَة
شجرة شائكة كثيرة العقد . ج عجيرم .

١٧٩٣٤ - عَجْرُون *
Camponotus (S).
Camponote (F).

جلس نمل كبير القند عديد الانواع يكثر ويهود في اسراج البلاد الحارة . منه انواع تبي قراها بالطين وفيها تسردب الخشب وتقتضه .

١٧٩٣٥ - عَجْرُونِيَّات *
Camponotidae (S).
Camponotides (F). Camponotidae (E).

فصيلة حشرات من التلييات غشائيات الاجنحة المحمويات .



صبرون

١٧٩٦٢ - عَجُور * ، عَيْدُ اللّاهِي

Cucumis chate (S). Concombre chaté, Abdellavi den Egyptiens (F). Chate of Egypt, Orange melon (E). Agyptische Melone, Orangen Melone (D). Clatze, Cocomero d'Egitto (I).

نوع من الفناء المأكول الثمار تكثر زراعت في البلاد الحارة انحصار مصر والسودان . يجود في الاربة البدائية المتروكة الانتماع وهو يرغب في الري لكنه يخشى الرطوبة المتحمكة

١٧٩٦٣ - عَجُورُ الْفِرْيَاسِي

هو البياض الزراري ، اطبه .

١٧٩٦٤ - عَجِيج (F). Bauglement, Meuglement (F). Bellowing (E). صوت البقر من ذكر واثق .

١٧٩٦٥ - عَدَدٌ ، عَدَدٌ ، عَدَدُك (F). Dénombrement (F). Enumeration (E). البعد والعدد هو الاسماء التي لخصت مكان معين .

١٧٩٦٦ - عَدَدَاهُ ، وَكُر (F). Couraer (F). Runner (E). كل من كان سريع العدو او اشترك في سباق الركض .

١٧٩٦٧ - عَدَدَاهُ الْفُط (F). Octodrome (F). طائر من طواي الساق يدعى جيتوك ، اطبه .

١٧٩٦٨ - عَدَدَاهُ ، وَرَمَلُ الْفُط (F). Tanguu, Tanque, Tangu (sable fin) (F). Slimy sand (E). رمل ورمال الفط والفسار للشفية التيشلية . يستعمل في دمل الاربة القامدة الانتماع .

١٧٩٦٩ - عَدَدَاك (F). Effectif (F). Actual (E). هو مجموع الاجراء والعمال والمؤدرون الذين يقتضون ال فكرة ما او مصنع او مؤسسة ، الخ .

١٧٩٧٠ - عَدَدَاك السَّرْعَة (F). Compteur de vitesse (F). Quickness meter (E). آلة تستعمل في معرفة سرعة الشيء .

١٧٩٧١ - عَدَدَاك * ، هِدْرَاك (F). Hydra (S). Hydra (F). Hydra (E). جنس حيوانات مائية من العنديات اربعة كترة العدد جميعها مفرقة تعيش لاصقة على النباتات البحرية . اجسامها مؤلفة من انبوب عضوي دقيق طوله يراوح بين ٥٠ و ٥٠٠ سم ومن جاس خيطية نحيلة شديدة الغلظ وطيفتها القبيض على الحيوانات الدنيا التي تمر في جها .

١٧٩٧٢ - عَدَدَاك * (F). Zoidiome (F). Zoidiogenous (E). لغت تعريفية يطلق على كل نبات لا يتم تأييد ازغاف الا بواسطة الطير او الحشرات .

١٧٩٧٣ - عَدَاكَاك ، هِدْرَاك (F). Hydrains (F). رتبة حيوانات مائية من المحفلات .

١٧٩٧٤ - عَدَاكَاك (F). Zoidigamin (F). Zoidigamy (E). اسم يطلق على التأييد الذي يحصل بواسطة الطير والحشرات .

Véle (F). She-veal (E). عَجَلَة

اربة البقرة حتى السنة الثانية من عمرها ويعدنا تصح جلدته .

١٧٩٤٤ - عَجَلَة ، طَبْر (F). Charrette, Tomberau (F). Cart, Tip-cart (E). حربة النقل ذات دولابين .

١٧٩٥٥ - عَجَلَس * (F). Hlopostachus (S). Hlopostachus (F). سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة العنديات

الثلاثيات الزمانف . موطنها المتوسط والجزر . تتميز بعينها الكبريتين المستديرتين وبزواية الانكسار الثالثة التي تلو كامل رأسها . طولها نحو ٢٥ سم . قوتها الى السمرة السفراء يملونها مراح بنفسجي . بطنها فضي اللون ، زعنفتها وريدية والزعنفة منها كبيرة القد فارقة .

١٧٩٥٦ - عَجَلَسُ الْمَتَرَسُ

Hlopostathus mediterraneus (S). Hlopostathus de la Méditerranée (F). Hlopostathus mediterraneus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة العنديات وريدية ثلاثيات الزمانف . اصطناعها معظم اقالي البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من املاك الثنائ . ملجئها الحياتي شرسني الى جسمها شبه بيضي الشكل ، متدل التليط ، طولها من ٢٠ الى ٢٥ سم . قوتها الى الخسار الزهني يملونها مراح بنفسجي يقيم في الظهر . بطنها فضي المراح . زعنفتها متراكبة الاخر والوردي . رأسها كبير الحجم ، اظفار الخيط ، تملونها زعنارف نائكة . شعها رطب الانتماع . فكها اسفلي يتقدم العلوي . اسنانه صغيرة ، منارحة ، حليمة السطح . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، نافذتان ، معلقتان بالزوايق النائكة . زعنفتها الظهرية وحيدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها القيلية كبيرة ، لائقة الى عيناها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧٩٥٧ - عَجَمَكَة (F). Noyau (F). Stone (E). القسم الداخلي من الثمرة صلب وقسا وسوى البزرة .

١٧٩٥٨ - عَجَمَكَة (F). نخلة تثبت من قوفا .

١٧٩٥٩ - عَجَمَكَات ، لَوْرِيَات

Arbres à noyaux (F). Trees from stones (E). هي الاشجار الجمية البزور كالفراخ والخوخ والشمش والقرز ، الخ .

١٧٩٦٠ - عَجَمَن ، عَجَمَان (F). Péérinage (F). Kranding (E). عملية غلط الدقيق بالماء ودعكه ليمير صعبا .

١٧٩٦١ - عَجَمَم * ، اَبْرُ جَكَم (F). Rhynchope (S). Bec-en-ciseaux (F). Scissor-bill, Stimmer (E).

جنس طيور راسه مائنة من صليحيات الناقير كنفيات الاقدام . انواحه حصة جميعها لقتل الكوب . تتميز بشكل مناقيرها التي تشبه جلي الحياض . رؤوسها صغيرة القد . امتانها طويلة . اجنحتها مستطيلة ذائقة . اذنانها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تأنف الضبوط البحرية والخرية . قوتها الحشرات والامساك . مسرحها دجوي يتعد من القرب الى الشروق الى انائها تثن في انحصار لدرها على الرمل بين حصور الجرف والشرابي .



عجل



عجور



عجور



عكاز

القدم || جسمها صلبية ، متوشط القد ، متكاثف الخمل .
يصلتها تراوح من ٤ الى ٦٠ م . الاذن اكبر قدماً من
الذكر واهت ثوباً منه . رأسها مخروطي . مينها صغيرتان ،
بارزتان . زباناها شطيان مزدوجتان . خطها قصير .
مسلها صغيران . اجنتها كبيرة ، ملونة وبقيقة ||
سرقها غاشلة تعيش على اوراق البتليات .

Adrastra (S). * هَدْرَسِكَة *
Adrastra (F).

جنبة معمرة بيرية وزراعية تربيته من فصيلة الالانبات .
مينها جزر الزرايع || سلقها تنسبة . فرومها نحلة .
اوراقها شتاقية ، سنانية النصال الجمادة المتوسطة القد .
ازهارها فردية التنسج ، طرفي الاوتكاز . ازهارها كبيرة ،
خماسية البتلات ، تبينة اللون يعلوها موانج ليلكي || تززع
في الحدائق في الموانج الجنوبية لانها تحشى صبح الشتاء .

Endromididae (S). * هَدْرَمِيدِيَّة *
Endromididae (F). Endromididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة المند جميعها شتالية الاصلان .
مركزها التربيته يقرها من البتليات || اجسامها صلبية ،
شبه اسطوانية الشكل ، يغلها حل مستطيل ، يسلها
تواضع من ٥٠ الى ٦٠ م . انثاها اكبر قدماً من ذكورها .
رؤوسها مخروطية . عينها مرطاه . اعطافها قصيرة . ملاسها
صغيرة . قرونها الاستشعارية شطية مزدوجة . اجنتها
كبيرة ، عامدة التهذيب . الوانها متراكبة الالوان الجبلية .
اسارمها شبه مرطاه ، تعيش على الانجبار . اكمال خادراتها
ثم ضمن صلجة مستقلة || اشهر اجناسها المدرس .

Mules (F). Mule (E). * هَدْس *
الهدس والهدس هو البيل وقد سموه بزمير . قال الشاعر :
اذا حلت بذي من على حسن

١٧٩٨٨ - هَدْسِي * ، يَهْسَن
Ervm lens, Lens esculenta (S). Lentille (F). Lentil
(E). Echte Linse (D). Lenta, Lencichla (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية .
شروبه عديدة تختلف باختلاف مقدورها الانماي والانتاجي
وبرحة ادراكها والوان حيويها ، الق . جميعها صغيرة
القد ، جذورها سطحية ، سيقانها مضطمة لونها تلو من
٢٠ الى ٤٠ م . اوراقها مركبة ، متساقية ، حنية
الاطراف . وريقاتها صغيرة القد يفسية الشكل متعاقبة .
ازهارها محورية الاوتكاز ، طويلة المانيق ، يضاء اللون ،
زرقاء التبرج . ثمارها قرون صغيرة مغلطة ، ماسة البشرة ،
يوجد في داخل كل منها من الحبة الى الحبتين || وهو
من البتليات الزراعية الشائعة الاستعمال بمجدي في جميع الاربية
المخفية للمنتد الانساج التي لا تقتصر الى الكلس . موقعه
في الثورة الزراعية يأتي في الاول ، ثم تفتحه الحشرة او الصير .
والعس من البتليات المشهورة بفزارة موداسها اللذائفة
التامة . فهو يحوي نحو ٨٢ وحدة غذائية يمكن تحميدها
كما يلي :

مولد هيدروكربونية ٥٨ %
مولد بروينية ٢٢ %
مولد دحية ٢ %

اما تين العيس فهو من انواع الكلاء الجيدة التي تتلفها
المواشي بشوة .

Hydroides (F). هَدْرِيَّات ، هَدْرِيَّات
طبقه حيوانات مائية من شعبة الهيفات تشمل ثلاث رتب :
البدارات والمرجانيات والجلجليات .

Génétique (F). Genetic (E). * هَدَالَة *
علم يبحث في التمثل وروابطه واراسره عنه الحيوان
والنبات .

١٧٩٧٧ - هَدَدَدَم ، هَدَدَصَحِيح ، هَدَدَكَمِيل
Nombre entier, N. intégral (F). Integral number,
Whole number (E).

١٧٩٧٨ - هَدَدَقَانُونِي ، نَصَاب
Quorum
هو المند الاقل المفروض ليكون اجتماع اعضاء الجمعية
قانونياً .

١٧٩٧٩ - هَدَدَكَسْرِي
Nombre fractionnaire (F). Fractional number (E).

١٧٩٨٠ - هَدَدَكَرْكَب
Nombre composé (F). Composita number (E).

١٧٩٨١ - هَدَدِي
Numéral, Numérique (F). Numeral, Numerical (E).

دال على عدد او مخصص بالعدد .

١٧٩٨٢ - هَدَر
Striga (S).
Strige, Goutte de sang (F). Witch weed (E). Echte
Witchweeder (D). Striga (I).

جنس نباتات عشبية بيرية مرموعة من فصيلة الخنازيريات
مهدا البلاد الحارة تكثر في المروج وفي البور على السواء .
يقال انها طيبة .

١٧٩٨٣ - هَدَرَكْس مَعْقَب *
Adrastra limbus (S). Adrastra bandé (F).

Adrastra limbus (E).

حشرة غاشلة ناهمة من فصيلة السالويات ورتبة مندقات
الاجنحة . موطنها بعض اقالم البلاد المطلة الحاررة . من
الشرق الاذل واروبه . تألف الموانج للرطبة والمروج وضفاف
الاء والارواح المغلة . غنقتها تعيش على اوراق النبات .
يرقاتها تعيش على المواد الضعوية وعلى جذور البتليات
المارة نحو الاخلال || جسمها صغير دقيق بطول من
٦ الى ٦ م . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، كشي
الظفران المصب بخار اسمر . رأسها صغير القد . زباناها
عظيخان . مينها صغيرتان . ارباسها خلسة العقل ||
الاثن ايز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه وقصر زبانا
واشتر بطناً || جيلها رباعي الخول . تظهر الحشرة
الجملدة في اواخر شهر ايار وتبقى حتى اواخر تموز .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || زين الدساج يستمر
طول شهر حزيران وترز المكن في الجلالة وحت الليل
ضمن انابيب سجيبة الشكل || البرقة منه ادراكها الكمال
الجمسوري قطلي نحو ١٢ م . ثوبها الى الصفار المانيق
التناهي المراج || طول الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ م
ويما ويتفشي في التربة .

١٧٩٨٤ - هَدَرَس *
Endromis (S).
Endromis (F). Endromis (E).

حشرة من فصيلة المدرسيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .
اصلها تشمل كامل المنطقة اللبنانية وما يتأخها من العالم



عدراس مصب



عدريس



عدرية



عس

1٧٩٩ - عَدَمَ الْمَاء * Irrévocabilité (F).

Irrevocability (E).

صفة تنبئ بها الحية بين الاحياء وقد لا تصح بدونها
فمسلما انه يحظر على الزواج ان يحتفظ لنفسه مباشرة
او مفادورة في عقد الحية بحق الاطلاق او التخليط .

1٨٠٠٢ - عَدَمُ الْقَصْدِ Irrégularité (F).

Irregularity (E).

هو القصد الذي لا يصح للمرضع الا بدنه .

1٨٠٠٣ - عَدَمُ الْمَحْجُوزِيَّةِ ، عَدَمُ الْاِحْتِجَاجِ

Inopposabilité (F). Inopposability (E).

هو ان يستحيل على الخصم ان يبيع نفسه بحق له .

1٨٠٠٤ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّعْزِيلِ

Incessibilité (F). Untransferable (E).

صفة الاموال التي لا يمكن نقل ملكيتها الى الغير .

1٨٠٠٥ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّصَرُّفِ

Inaliénabilité (F). Inalienability (E).

صفة الاموال المينة التي لا يمكن نقلها او تملكها
بحقوق حية جديدة كالارثاق والقرن ، الخ .

1٨٠٠٦ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّقَادُّمِ

Imprescriptibilité (F). Imprescriptibility (E).

صفة تلازم حقاً او دعوى لا يستطاع مرور الزمن
كتجاوز الاحوال الشخصية والاملاك العامة .

1٨٠٠٧ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْحِزْمِ

Insaisissabilité (F). Unsaisiability (E).

صفة عين ثابتة او منقولة لا يستطيع الدائن مالهها ان
يبيعها .

1٨٠٠٨ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْقِسْمِ

Indivisibilité (F). Indivisibility (E).

هي حالة ما تقسمه مادياً او معنوياً . كالاقطار
وسبق الارتفاق والالتزام ببيع ثمن حيوان حي معين .

1٨٠٠٩ - عُدْمُولُ

Pernoptère mâle (F).

Pernopterus male (E).

الذكر من الغريم .

1٨٠١٠ - عُدْمُولُ هو الضفدع ، اطليه .

1٨٠١١ - عُدْمُولُ اخضر ، اطليه .

1٨٠١٢ - عُدْمُولُ اشعر ، اطليه .

1٨٠١٣ - عُدْمُولُ اقر ، اطليه .

1٨٠١٤ - عُدْمُولُ الحقل ، اطليه .

1٨٠١٥ - عُدْمُولُ جيتار ، اطليه .

1٨٠١٦ - عُدْمُولُ تقيط ، اطليه .

هو الضفدع الجيكر ، اطليه .

هو الضفدع النشط ، اطليه .

1٧٩٩ - عَدَمَ الْمَاء * Lemna (S). Lentille d'eau, Lenticule, Canifée, Canelle (F). Duck-weed, Water-lens, Water lentil (E). Kleine Wasserlinse (D). Lenticularia, Lente d'acqua, Erba antrina (I).

جنس نباتات شبيهة مائية من وحيات الفلقة ونباتات
عسبات الماء . تنبئ بصغرها ودقة سوقها واستدارة اوراقها
المدنية الشكل والقد التي تغلق على سطح الماء . زوارها
وحيدة المسكن ، ثلاثية التجميع يضمها ثمرات واحد
يتألف من زهرتين ذكريتين وزهرة انثوية واحدة .

1٧٩٩٠ - عَدَمَ مَرُ هو الاينوسارون ، اطليه .

1٧٩٩١ - عَدَمَ الْعَيْنِ Lentille de l'œil (F).

Eye lens (E).

1٧٩٩٢ - عَدَمَ سَبِيلَتِ الْمَاءِ Lemnaceae (F). Lemnaceae (E).

فصيلة عسبات الماء من وحيات الفلقة . اجتماعها وازواجها
٢١ جميعها من النباتات المائية والمنقوية المنتشرة في جميع
اسواق العالم .

1٧٩٩٣ - عِدْفُ Géniteur (femelle) (F).

Begetter (female) (E).

هو في النبات ما صار تنبغ ميسم زهره بمكبر زهرة
اغرى مصدرا الاسم المختص .

1٧٩٩٤ - عِدْفُكَّة Incompressibilité (F).

Incompressibility (E).

عدم القابلية لقصط والانسداد والكبس .

1٧٩٩٥ - عُدْمُولُ ٥٠ Adolops (S). Adolops (F).

حشرة كفية من عذبات الاجنحة ديوريات القرون . تألف
الاجنية والكهون والواقع المظلمة في معظم اقطار البلاد
الحارة والمعتدلة الحارة الى جسمها ابيض الشكلى يطول
من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السرة الثانية اللامع . زبانتها
ديوريات مستطيلة . قوائمها نحلة مستطيلة الى قوائم المولد
القوية للنحلة تنلسها بزبانتها لانها كفة عادمة اليصر .

1٧٩٩٦ - عَدَمُ الْاِحْتِصَاصِ Incompétence (F).

Incompétence (E).

هو ان لا تكون لقاضي او المحكمة او لادنى السلطات
العامة سلطة على اجبار عمل قانوني .

1٧٩٩٧ - عَدَمُ الْاِنْقِيَاصِ Asyzoie (F).

Incapacité (F).

Incapacity (E).

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من تزويج
حق له . لذلك تقسم عدم الاحلية الى :

عدم أهلية الاداء

Incapacité d'exercice

Incapacité de jouissance

عدم أهلية التمتع

1٧٩٩٨ - عَدَمُ الْأَهْلِيَّةِ

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من تزويج
حق له . لذلك تقسم عدم الاحلية الى :

عدم أهلية الاداء

Incapacité d'exercice

Incapacité de jouissance

عدم أهلية التمتع

1٧٩٩٩ - عَدَمُ التَّعَادُلِ Asymétrie (F). Asymmetry (E).

شذوذ غير مألوف في التناظر او التماثل .

1٨٠٠٠ - عَدَمُ التَّنْفِيدِ Inexécution (F).

Non-fulfilment (E).

هو ان لا يقوم المرء بكل ما التزم به او بضمه .



عَسَمَ الْمَاء



عُدْمُولُ

الزبان والدخان ولا تقع في الش الراسد أكثر من
يضة .

١٨٠٢٦ - عَدْن

Dérochement, Epiarrage, Epierrament (F). Scouring, Clearing land of stones (E).

رفع الحجارة أو اتلاعها من أرض الحقل .

١٨٠٢٧ - هَدْن - هَدْن *
Adenium venustum (S). Adenium (E). Adenie (D). Adenia (I).
جنبة يرية ممررة من فصيلة العدنات . أوراقها معتقة .
متعاقبة . سنانية . نصلها جلدي الصفحة بحري اللون .
ازهارها حنكولي تاجي . ازهارها خيرة اللون || منبتها
البلاد الحارة ، تكثر في الجزيرة وهي من النباتات السامة .

١٨٠٢٨ - هَدُو
Galop (F). Gallop (E).
ركض الدابة السريع .

١٨٠٢٩ - هَدُوته *
Idotes (S). Idotée (F). Idotée (E).
جنس دوبيات بحرية من فصيلة العدنات . أصلها بحار
البلاد الحارة وأخصها البحر الأحمر والمحيط الهندي . تعيش
بين النباتات البحرية قرب المباح والشطوط || أجسامها
تساعية الشكل مستطيلة التخليط ، تقطع من ٣ إلى ٦ سم .
مناطقها التشريعية ملبقة بصفائح متدعة تبدو كالخشب
المستطيل . قرونها الاستشعارية مسطحة ، مدبة الأطراف .
أرجلها سباعية الأزواج ، غصينة المقاطع الدرية || أنثاها
مترابكة الجذري والأحر والأصفر والأزرق والبنيجي .

١٨٠٣٠ - عَدُوبَات *
Idoteidae (S). Idotéidés (F). Idotéidés (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات مسارات الأرجل
أجسامها وأولها المعروفة نحو ٤٠ متشرة في جميع بحار
العالم باستثناء القطبية . تعيش بين النباتات البحرية
القريبة من المباح والشطوط || أعرف أجسامها وأشهرها
المدنة .

١٨٠٣١ - هَدُوِي

Infection, Contagion, Contamination
انتقال الجراثيم أو الميكروبات الطبية إلى جسم الحيوان
السليم وأصابته بالمرض الذي تحمله تلك الجراثيم أو
الميكروبات ، وأصبح إصابة .

١٨٠٣٢ - هَدِيد
Multi, Poly (F).

١٨٠٣٣ - هَدِيد الْأَرْجُل
Polypode (F). Polypod (E).

١٨٠٣٤ - هَدِيد الْبُزُر
Polysperme (F). Polysperm (E).

صفة بعض البذور التي تتميز فيها الأعضاء الذرية
بوفرة البذور .

١٨٠٣٥ - هَدِيد الثُّغُور
Polystomata (F). Polystomatous (E).

١٨٠٣٦ - عَدِيدَات الصِّحَاف

Polylapophores (F). Polylapophora (E).
شعبة من الرخويات الراباطيات . أنواعها المعروفة نحو
٦٠٠ يتكرر بجودها على محور الشاطئ * أشهر أنواعها
الحيدة والكيتون .

١٨٠١٧ - عَدُوبَات

Ranidae (S). Ranidés (F). Ranidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قاذبة من لة الحيديات ومرقبة
السويبات وريقة التراوات أي عذبات القلب || أجسامها
وأولها كثيرة العدد متشرة في جميع أصقاع العالم القديم
والجديد || أجسامها متفردة القبة تتميز بمساواة سطح ضلعي
قوسها الصدري في مركز تلاقيها ، ويجعل فقرة العنق من
التسويات المنظمة الجانية . فكوكها العليا مسنة . أصابع
قوائمها الخلفية مفيدة بحطاب لاقامي الرسابة || أشهر
أجسامها المدلول أي الضفدع .

١٨٠١٨ - هَدْمُون *
Adimonia (S). Adimonia (E).

جنس حشرات غاصلة من مفصليات الأرجل وفصيلة
الغشاريات . أنوعها المعروفة نحو ٣٠ أصلها مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة . تأليف الجراحي والحقل والنباتات
المشبية من الأوراق إلى الزهور والجذور والجلبوع ||
أجسامها متوسطة القد . أنثاها أكبر جرمًا من ذكورها
وأفتح لونًا وأصغر ظفرًا إذ أنه لا يلبس كلال البين
عند الاناث . أنثاها متباينة الألوان يكثر فيها الأسود
والأصفر القاتم والجذري السابق || أعرف أنوعها وأشهرها
الاناثان التاليان :

١٨٠١٨ - هَدْمُون سُرُوي

Adimonia rustica (S). Adimonia rusticus (F).
يعتبر من أخصاف الكفيلة لأن يلبس الأوراق التي تلتصق
بسطح التربة . لونه إلى السرة القاتمة ، أصغر المراج عند
الذكر ، بأحد عند الأنثى .

١٨٠١٩ - هَدْمُون عَتِيد

Adimonia tenax (S). Adimonia obtus (F).
يعتبر من أخصاف الكفيلة لأنه يلبس كل ما استطاع إليه
سبيلًا من أجزاء النبات . ثوبه إلى الجذوة يزدهر عند الذكر
ويبتع عند الأنثى .

١٨٠١٩ - هَدْمُون *
Eudynamis (S). Eudynamis (E).

جنس طير من فصيلة القيتريويات . أنوعها المعروفة عشرة
موطنها يمتد من إيران إلى الهند والصين واليابان ||
أجسامها رفيعة تقطع من ٣٥ إلى ٤٠ سم . أجسامها كبيرة
ذلفة . أذناها مسطحة ، متباعدة الأطراف . مناقبها
ضلعية معتقة الخاطم العليا الشارة ، جالسة السفل .
سقطها معتدلة الطول . صوتها ملطقة يختار ماسح اسرط لا
ريش فيه || قويا الجراد والخشرات والبرية والنبور ||
أعرف أنوعها وأشهرها العنيس الشرقى .

١٨٠٢٠ - هَدْمُون شَرْقِي * ، قَوَال

Eudynamis orientalis (S). Eudynamis orientalis (F).
سمي قوالًا لأن صياحه يشبه القول . طائر من العنيس .
موطنه يمتد من الهند إلى إيران || جسمه وثيق القوام يطول
نحو ٤٠ سم . ثوب الذكر إلى البود الأصفر الملبق
الأسفر . ثوب الأنثى إلى الخضار اللامع المرقش بالأبيض .
سقطه البين سوداء اللون عند الشفق || يألف الإحراج
المبشرة الأجار . قوته الخشرات والجراد والبرية
والبلور || طيراه سفيف وتصعد ببطء . شوطه قصير
المنى || أنثاه لا تمش بل تقع البيض في أعشاش



عَدْمُون



عَدْمُون شَرْقِي



عَدْمُون

- Impennés (F). **عُدَيْمَات الرِيَش** ١٨٠٥٢ - Lenticelle (F). Lenticel (E). **عُدَيْمَة** ١٨٠٣٢ -
 Impennates (E). **عُدَيْمَة** ١٨٠٣٣ - Lenticulaire (F). Lenticular (E). **عُدَيْمَة** ١٨٠٣٣ -
 فنة من البليز فضائلها قليلة العدد تتميز بأرياشها الخاصة
 ويقتصر اجتماعها الوضعية الشكل المستعارة الى التجديف
 في الماء بدلاً من الطيران في الفضاء . أشهر أمثلتها البطريرق
 والطريرق .
 Abranchiate **عُدَيْمَة اخْتِلَافِيَّ** ١٨٠٣٥ -
 Amécabole (F). **عُدَيْمَة التَقَوُّر** ١٨٠٥٣ - Essangus (F). Bloodless (E). **عُدَيْمَة الدَّم** ١٨٠٣٦ -
 Ametabola (E). **عُدَيْمَة التَمَر** ١٨٠٥٤ - Acéphale (F). Acephalous (E). **عُدَيْمَة الرَأْس** ١٨٠٣٧ -
 Acarpe (F). **عُدَيْمَة التَمَر** ١٨٠٥٤ - Acarpous, barren (E). **عُدَيْمَة الطعم ، قَث** ١٨٠٣٨ -
 تمت تعريفي يطلق على النباتات التي لا ثمر لها .
 Insipide (F). **عُدَيْمَة الطعم ، قَث** ١٨٠٣٨ -
 Tasteless (E).
 Aptère (F). Aptera (E). **عُدَيْمَة الجَنَاح** ١٨٠٥٥ - Anadytre (F). **عُدَيْمَة العَصَد** ١٨٠٣٩ -
 Aptale (F). **عُدَيْمَة الساق** ١٨٠٥٦ - تمت تعريفي يطلق على كل حشرة جلادة عديمة اللحم .
 Acaule (F). **عُدَيْمَة الساق** ١٨٠٥٦ - Acaulous, stemless (E). **عُدَيْمَة الفكر ، لا تفكر** ١٨٠٤٠ -
 تمت تعريفي يطلق على النباتات التي ليس لها سوق ظاهرة
 أو التي سطحها جلدة . أما عديمة السوق بتتأ من نقص المقر .
 والتي ساقها قصيرة جداً فهي النجمة .
 Invertébré (F). Invertebrata (E). **عُدَيْمَة الفكر ، لا تفكر** ١٨٠٤٠ -
 هي الحيوانات التي لا فقر لها . ولانفاريات هي :
 الالوالي والاسفنجيات والمحيوانات والشوكيات والديدان
 والرخويات والمفصليات .
 Cudrania (S). Cudrania (F). **عُدَيْمَة** ١٨٠٥٧ - Invertébré (F). Acotyldone (E). **عُدَيْمَة الفلانة ، لا تفكر** ١٨٠٤١ -
 جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة التوتيات . أنماطه
 قليلة العدد ، مهددة بالقر . جميعها سرولية تملو من ٦
 الى ١٢ م . سطحها لمراد فناء . أوراقها عابطة ، متعاقبة ،
 بيضيه أو مفضضة التصل المماس البشرة الفلانة المشعة .
 ازدهارها ثنائية المسكن ، ثمارها حمر اللون .
 Palourde (F). Clam (E). **عُدَيْمَة** ١٨٠٥٨ - Acotyldone (F). Acotyldone (E). **عُدَيْمَة الفلانة ، لا تفكر** ١٨٠٤١ -
 كل صنفه مأكولة كالحمار والحيه وغيرها تدعى طينة .
 Adhars **عُدَيْمَة كَرِي ، عُدَيْمَة** ١٨٠٥٩ - Apometastome, Apomastostome (F). **عُدَيْمَة الفلانة ، لا تفكر** ١٨٠٤٢ -
 المفاري أو المبردة حمة كياكب في آخر الحفرة .
 Achiromatique (F). **عُدَيْمَة اللون** ١٨٠٤٥ -
 Achromatic (E). **عُدَيْمَة اللون** ١٨٠٤٥ -
 Aplanental **عُدَيْمَة النضيمَة** ١٨٠٤٦ -
 Aglyphodontes **عُدَيْمَات الأَعْدَاد** ١٨٠٤٧ -
 حيوات خبيثة منها فصيلة النملين وفصيلة الأسليات .
 Apodes, Gymnophiones (F). Apodas, footless (E). **عُدَيْمَات الأَرْجُل** ١٨٠٤٨ -
 رتيبة من السفنجيات .
 ١٨٠٤٩ **عُدَيْمَات الأَمْدَاف** -
 Aplacophores (F). Aplacophora (E). **عُدَيْمَات الأَمْدَاف** ١٨٠٤٩ -
 شعبة من الرخويات الرابطيات الالوالي . اجنسها وانواعها
 المعروفة نحو ٢٥٠ .
 Aplanipteroides **عُدَيْمَات الجَنَاح** ١٨٠٥٠ -
 طبقة حشرات من شعبة الحمدليات تشمل رتيبة واحدة
 تدعى القذائيات . فضائلها عديدة ، أشهرها البرغوثيات
 أما اجنسها وانواعها لكثيرة العدد جميعها من الحشرات
 الناقبة المماصة الصغيرة القند .
 Anoures (F). **عُدَيْمَات الذَنَب** ١٨٠٥١ -
 Anouros (E). **عُدَيْمَات الذَنَب** ١٨٠٥١ -
 اطلب يتر .



ملطوط

Fritillaria lutea (S). **١٨٠٧٤ - عَرَكَو أَصْفَر**
Fritillaria jauno (F).
 نوع من المرار. اوراقه العليا متعاقبة ، ضيقة ، سنائية .
 شراخه يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. زهره وحيدة كبيرة
 القذ. لونها الی الصفار الكبير يعلو تعلو تقطع بنفسجي .
 ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

Fritillaria persica (S). **١٨٠٧٥ - عَرَكَو الْعَجَم**
Fritillaire de Perse (F).
 نوع من المرار دوصت غليظة متراكبة الاسقاط اللينة .
 شراخه يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه صغيرة .
 سنائية ، متعاقبة ، بحرية النصل ، تركب الشراخ بكما .
 ازهاره عقدية التجميع ، صغيرة القذ ، عريفة الرائحة ،
 لونها الی البنفسجي الازرق المواج || ازهاره يستمر
 من نيسان الى ايار .

١٨٠٧٦ - عَرَكَو الْعَبَّاء ، نُؤْيِب المُرُوج
Fritillaria meleagris (S). *Fritillaire pintade*, *Pintade*,
Damier, *Tulipe des prés*, *Œuf de vanneau* (F). *Chack-*
ered lily, *Checkered tulip* (E). *Echte Schachblume*
 (D). *Fritillaria meleagris*, *Meleagride* (I).
 نوع من المرار الجري اوراقه متعاقبة تطول من ٨ الى
 ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. شراخه الزهري يعلو
 من ٢٠ الى ٥٠ سم. ازهاره تطول من ٣ الى ٥ سم. لونها
 الی الحمرة البنفسجية يعلوها تقطع ابيض . ضروره
 الترييبنة مدينة فارها لون الزهر || يستمر من يسله
 بدس سلقه ، مادة نشوية مأكولة تشبه البطاطا .

١٨٠٧٧ - عَرَكَو عَرِيض الَورَق
Fritillaria laeifolia (S). *Fritillaire à feuilles larges* (F).
 نوع من المرار اوراقه سنائية النصل مستعرضة . شراخه
 يعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. زهرته كبيرة القذ وسيدة . لونها
 الی الحمرة الخمرية الموجهة بالاصفر || ازهاره يستمر
 من نيسان الى ايار .

١٨٠٧٨ - عَرَكَو قَيْصَرِي *Fritillaire impériale* (F).
 نوع من المرار يعرف باكليل الملك ، الحلب .

١٨٠٧٩ - عَرَكَو مُدْهَب *Fritillaria aurea* (S).
Fritillaria dorée (F).

نوع من المرار اوراقه العليا متعاقبة او ضخمة التجميع ،
 خطية النصل . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. زهره
 تطول نحو ٣ سم. لونها الی الصفار الاغصير المذهب المواج
 يعلو تقطع حنطي || ازهاره يستمر طويلا شهر نيسان .

١٨٠٨٠ - عَرَكَوَسَة * *Ophidium barbatum* (S).
Ophidie barbu, *Donzelle* (F).

مسكة بحرية يروض من فصيلة الجيريات شالكان الزعنفت.
 اصلها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي ||
 جسمها نصل الشكل ، معتدل التليط ، قارب الشبه
 بالثقب ، يطلو نحو ٢٥ سم. ثوبها الی المرجاني القضي
 المواج يعلو في الظهر تمسح ازرع ويعلو في الجانبين
 تحفة زرقاء حمراء . رأسها اسفلي الشكل ، ذات الحلق .
 زعانفها الظهرية والذيلية والشربية متباعدة تشكل زعنفة
 واحدة . زعنفتها الحوضية طامسة . فكها الاسفل يتأخر
 عن الاعلى ويعمل اربع عذبات دقيقة مستطيلة || لحمها
 متوسط الصنف ، مأكول .

طويلا يراوح بين ١٤ و ١٦ م. رؤسها العلويان الی
 الحلقه الصدرية تمررها جد سود . رؤسها السفليان الی
 الحلقه القصبية || ريقاتها تلو حمراء اللون ثم تتحول الی
 الزردي وتنتهي بالاحمر ولذا يسمونها الليندان الحمر . لها
 جيلان في السنة . يلبها النشوي تقصيه كغادوة تحت
 لها بعض الاثيار اغصنها الكرمية . تظهر القراشات في
 الربيع وتضع مكنها حل البرام الزهرية والورقية فينقب
 من ريقات تركب تلك البرام || وفي جيلها الثاني الذي
 يبعثها حادة في تحور تمت الاثبات مكنها حل النار وينها
 الضنب فينقب من ريقات دقيقة تغسل النار من حيث
 نقلت قسطها وتقيم حتى تنسلخها الاخير ثم تتركها
 وتنتج نحو اللها حيث تحشى وتصلو الی غادوات .

١٨٠٦٦ - عِدْق، نُوْرَة *Corymbe* (F). *Corymb* (E).
 شكل من اشكال ازهار يكثر في الفصيلة الوردية
 كازهار الاجاص والطلع .

١٨٠٦٧ - عِدْقِيَّات *Corymbifères* (F).
Corymbiferous (E).

سبط من فصيلة المركبات الابوية الزهر . ومنتمى
 توصف به النباتات الضيقة الازهار .

١٨٠٦٨ - عِدْقِي *Culture non irriguée* (F).
Dry-farming (E).
 كل نبات لا يسقي الا المطر . غلاظة زنة . الحقله الزنة
 هي الحقله المروية .

١٨٠٦٩ - عَرَ النخل * *Graphiola phenicis* (S).
Graphiole des dattiers (F).

رسم نظري سيبه فطر مجعري من فصيلة المريات ودية
 الصمغيات || يصيب غصن النخل فينبو كانها جريه
 لانه يربها ينشع صفة الشكل بنية اللون يعلوها عند
 عورها الاصغر ، المنخفض الارتكاز ، غيط دقيق مركب
 يحمل غيرات قنطر || يقال لنشع المصاة هذا الجسم
 ثقلة معرا || يكاثف باستمال بائل يورده المخلو من ٢
 الى ٢,٥ ٪ .

١٨٠٧٠ - عَرَاب *Graphiola* (S).
 « شجر يفتل من لحاء الحبال . الواحدة حراية . تأكله
 القردة » (اللسان) .

١٨٠٧١ - عَرَادَة *Sauterelle femelle* (F).
Female locust (E).
 الجرادة الانثى .

١٨٠٧٢ - عَرَكَو *Cri de l'autruche mâle* (F).
Cry of the male ostrich (E).
 صوت الطير

١٨٠٧٣ - عَرَكَو * ، **فريتيلاريا ، حَشِيْشَة الْحَجَل**
Fritillaria (S). *Fritillaire* (F). *Fritillary* (E). *Schach-*
blume (D). *Fritzellaria* (I).

جلس نباتات دوصية برية و تربيتية من فصيلة الزنبقيات.
 ازهارها جرسية الشكل ، معتقة ، متدلية ، يجمعها شراخ
 تكلمه قصب من الازراق للسنه المتراكبة . انولمه المروفة
 نحو ٣٠ . مصارة يسلها جحالية المادة ، حازمة الطعم ،
 مسهلة وقد تصعب سامة عند الاكثار منها || شهر ازهاره
 ما يتبع .



مر النخل



مرار



عرانة

Agropyrum juncaum

نجير ، سيلين

Herniaria maritima

نومان بحري

Kochia arenaria

هيشم الرمال

٢ - نباتات الأثرية الرملية للبحر

Spergularia campestris

أبر غلام حقل

Arabis arenosa

أبرس دلي

Agrostis alba

أدرا أبيض ، نجير أبيض

Vicia lachryoides

بالقة جلبانية

Scleranthus annuus

حشيشة القناويل الحولية

Scleranthus perennis

حشيشة القناويل الدائمة

Rumex acetosella

حشيش النخم

Airs caryophylla

عُرطالية قرنفلية

Airs praecox

عُرطالية مبكرة

Draba verna

درابة ربيعية

Vulpia Myurus

ذيل الجرب

Ornithopus sativus

ريدان مرعوي

Spergula arvensis

سبرغولة حقليّة

Spergula vernalis

سبرغولة ربيعية

Carex arenaria

سمادى الرمل

Saxifraga tridactylis

سفرس ثلاثي الأصابع

Ilecebrum verticillatum

شجير

Arrhenatherum elatius

شليم رفيع

Selenia conica

علوك مخروطي الورقة

Eragrostis minor

عزّع صغير

Eragrostis pilosa

عزّع حقلي

Eragrostis major

عزّع كبير

Armaria plantaginina

عيفقان لسوني

Luzula

لزولة

Plantago arenaria

لسان الحمل الرمي

Plantago lagopus

لسان الحمل المقدي

Helianthemum guttatum

مداخن لؤلؤي

Herniaria glabra

نومان امرد

Herniaria hirsuta

نومان مزقبر

Agrostis spica venti

هزنوس

٣ - نباتات الأثرية السبخة وتدعى بحجيرة أو الف المالح

Artemisia maritima

أبست بحري

Silicornia

اشنان (جميع الأنواع)

Salsola kali

حرض

Aster tripolium

خرّام

Suaeda

دلوك (جميع الأنواع)

Inula crithmoides

راسن بحري

Atriplex halimus

سروق بحري

Senecio crassifolia

شرونة لحية الورقة

Glyceria maritima

عشبة الما البحرية

١٨٠٨١ - عَرَاقَة ٥

Thlignotaxie, Thlignotropisme (F).

Thlignotaxy, Thlignotropism (E).

خاصة النباتات المتسلقة اذ تجملها تلتف بسوقها على ساندتها او تلتف بحولها الحظرة او المحجمة .

١٨٠٨٢ - عَرَاقَة ٥ ، نَصَاب

Placier (F).

Town traveller (E).

من عرض الشيء لتصريفه او يمه .

١٨٠٨٣ - عَرَاقَة ٥

Oniscia (S).

Oniscie (F), Oniscia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغطيات الأرجل وقصيلة الخويجات . انواعه المعاصرة المعروفة ستة منتشرة في مجار البلاد الحارة || اصداها شبه يضيئة الشوزن ، لولبية التخديد التانثر ، مستطيلة الانفلاق الطولي للقطب ، قمية الانقلاب المستندة الاطراف .

١٨٠٨٤ - عَرَاقَة الأَثَرِيَّة

Détermination des sols d'après la végétation spontanée

عَرَاقَة الأثرية اسلوب واقفي يقود الى معرفة نوعية الأثرية من نباتها الطوعية ذلك لان لكل تربة نبات تستقر فيها تلقائيا . وقد وضعنا في الجداول التالية اهم هذه النباتات المدلالية واشهرها :

١ - نباتات الأثرية الرملية الساحلية

أثل ، طفاء (عدة أنواع) Tamarix

أريل أحر Statice maritime

حباحب الرمال Linaria arenaria

حشيشة الرمال Ammophila arenaria

سلال القدران Scirpus holoschenus

ذيل الأونب Lagurus ovatus

ذيل الفار البحري Polypogon maritimum

سرغة دونصية Crepis bulbosa

سرمق بحري Honeckienya peplodes

سمادى (بعض أنواع) Carex

شعير الكتبان Elymus arenarius

شنداب بحري Eryngium maritimum

ظهيرة مقدية Mesembryanthemum nodiflorum

عصوية الرمال Phleum arenarium

علد مزدوج السنابل ، عنب البحر Ephedra distachya

غالبون الرمال Galium arenarium

فجيلة الشط Cakile maritima

قردب الرمال Polygonum maritimum

قرنفل الرمال Dianthus gallicus

كتان بحري Linum maritimum

لبلاب بحري Calystegia soldanella

لسان الحمل القثري Plantago coronopus

متيولا مقورة Matthiola sinuata

سبلح (بعض الأنواع) Malcolma



عَرَاقَة

<i>Orchis maculata</i>	مهلبلب أبيض	<i>Plantago maritima</i>	لسان الحمل البحري
<i>Carex</i>	سمادي (بعض الأنواع)	<i>Plantago crassifolia</i>	لسان الحمل لحمي - الورق
<i>Quercus pedunculata</i>	سنتيان مزند ، دور	٥ - نبات الأثرية الصوانية ، بزلح	
<i>Ganista germanica</i>	شيزاء جرمانية		
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماعز	<i>Betula verrucosa</i>	بتولا ثؤلورية
<i>Potentilla tormentilla</i>	عرق انجبار	<i>Campanula persicifolia</i>	جريس دواقمي - الورقة
<i>Fistuca arundinacea</i>	عكروش علباني	<i>Jasione montana</i>	جزيون أزرق
<i>Dianthus Armeria</i>	قرنفل اديريه	<i>Sedum Forsterianum</i>	حي - العالم القزيف
<i>clisium ferox</i>	قصون شكس	<i>Malva moschata</i>	عجبانة سكية ، صغر
<i>Erythraea pulchella</i>	قنطريون اتيق	<i>Erica cinerea</i>	خلنج ربادي
<i>Cerasus padus</i>	كرز عبقودي	<i>Erica scoparia</i>	خلنج سكسي
<i>Lobelia urens</i>	لوبيلية محرقه	<i>Erica ciliaris</i>	خلنج مهدب
<i>Lotus uliginosus</i>	لوتس	<i>Hypericum pulchrum</i>	داذي اتيق
<i>Molinia caerulea</i>	مولينيه ، غرطالية زرقاء	<i>Digitalis purpurea</i>	ديجيتال ابرواني
<i>Scutellaria minor</i>	هرين صغير	<i>Pteridium aquilinum</i>	دشدار
<i>Ulex europaeus</i>	وزال كبير	<i>Ornithopus perpusillus</i>	ريبدان لزق
<i>Ulex nanus</i>	وزال مثلون	<i>Antennaria dioica</i>	ريبل القسط - الشامع

٦ - نبات الأثرية الكلسية

<i>Laburnum anagyroides</i>	ابنوس كاذب	<i>Senecio adonidifolius</i>	شروقة زلفية الورق
<i>Coronilla emerus</i>	امروس الزمارين	<i>Senecio viscosus</i>	شروقة لزجة
<i>Berberis vulgaris</i>	بربريس ، عيد الريح	<i>Genista tinctoria</i>	شيزاء الصباغين
<i>Buxus sempervirens</i>	بقس دائم الخضرة	<i>Potentilla argentea</i>	عشبة القوى القوية
<i>Asperula tinctoria</i>	جروسة الصباغين	<i>Festuca heterophylla</i>	عكروش هاتك
<i>Ophrys</i>	حاجبية (جميع الأنواع)	<i>Veronica verna</i>	فيرونيكا ربيعية
<i>Lavandula latifolia</i>	غزالي ذكورية	<i>Veronica officinalis</i>	فيرونيكا مخزنية ، ليلاب المهبس
<i>Lavandula officinalis</i>	غزالي مخزنية ، خيري البر	<i>Dianthus deltoideus</i>	قرنفل دالي
<i>Lactuca perennis</i>	غس الغالب	<i>Vaccinium Myrtillus</i>	قام آسي
<i>Rhamnus alaternus</i>	زفرين الجرد ، ثيق مترادف	<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	كوسفية حرسية
<i>Hysopus officinalis</i>	زولا	<i>Castanea sativa</i>	كستنة بلولة ، شاهبلوط
<i>Thymus serpyllum</i>	سعر الير ، زمر	<i>Nardus stricta</i>	ناردين المروج
<i>Thymus vulgaris</i>	سعر شامع	<i>Epilobium angustifolium</i>	ند - سنبل
<i>Quercus lanuginosa</i>	سنتيان اذيب	<i>Sarothamnus scoparius</i>	وزال الشيع
<i>Ononis natrix</i>	شبارق ، لتين القدماء	٧ - نبات الأثرية الطينية الرملية	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	شقيق النمان المبثول		
<i>Eryngium campestre</i>	شنداب حقلي	<i>Teucrium scorodonia</i>	اسقودين مائي ، ثوم الحية
<i>Lonicera xylosteum</i>	سرعة الجدي ، الدفلية	<i>Juncus squarrosus</i>	أسل خشن
<i>Vincetoxicum officinale</i>	صقلاب غزلي	<i>Betula pubescens</i>	بتولا زغبية
<i>Crucianella angustifolia</i>	صلبانة ضيقة الورق	<i>Viola canina</i>	بنفسج كلاي
<i>Catananthe caerulea</i>	طلسية ، عتباء زرقاء	<i>Peucedanum gallicum</i>	بوسيدان غالي
<i>Teucrium montanum</i>	طوقريون جبلي	<i>Campanula patula</i>	جريس عريض الورق
<i>Teucrium chamaedrys</i>	طوقريون غزلي	<i>Pedicularis sylvatica</i>	حشيشة القمل الحرسية
<i>Globularia</i>	عينون مبثول	<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتقمية
<i>Geranium sanguineum</i>	غرنيق دموي	<i>Scirpus compressus</i>	حلل ليد
<i>Calamagrostis argentea</i>	غر - ار قصي	<i>Aira caespitosa</i>	غرطالية التمسع
<i>Rubia peregrina</i>	قوة - مرحلة	<i>Hypericum humifusum</i>	داذي رطب
<i>Veronica teucrium</i>	فيرونيكا اتيق	<i>Scorzonera humilis</i>	ديج سفير

<i>Pastinaca sativa</i>	ميسارون كبير	<i>Cornus mas</i>	قرنوس ذكر
<i>Lithospermum officinale</i>	شنجبار غزني	<i>Cirsium acaule</i>	قصوان قرنيش
<i>Saponaria officinalis</i>	صابونية غزنوية	<i>Brunella lyssofolia</i>	قلاع حسل الورق
<i>Potentilla reptans</i>	عشبة القوي المسلحة	<i>Brunella grandiflora</i>	قلاع كبير الزهر
<i>Potentilla anserina</i>	عشبة القوي الورقة	<i>Colutea arboreascons</i>	قصصور شائع
<i>Euphorbia helioscopia</i>	فرييون النجر	<i>Centaurea scabiosa</i>	قطريون اجرب
<i>Euphorbia verrucosa</i>	فرييون مثالي	<i>Andropogon ischaemum</i>	كتيبة
<i>Melampyrum arvense</i>	قرطب الزرع	<i>Carlina vulgaris</i>	كرلين شائع ، زند البید
<i>Erytraea centaureum</i>	قطريون صغير ، مرارة الحنش	<i>Linocyrta vulgaris</i>	لنسير مبدول
<i>Allium ursinum</i>	كرات اللب	<i>Cerasus mahaleb</i>	محلبل
<i>Ononis campestris</i>	لئين الحقل	<i>Sorbus aria crantz</i>	مخلص
<i>Ononis spinosa</i>	لئين شائك	<i>Helianthemum vulgare</i>	مدهاين شائع
<i>Lychnis floe-cuculi</i>	لحنس وردي	<i>Melica dilatata</i>	مشفرة مهبدة
<i>Anthyllis vulneraria</i>	لوتيا نافذة ، حشيشة الجرح	<i>Sedurela montana</i>	ندغ الجبل
<i>Lotus corniculatus</i>	لوطس قرني	<i>Hippocrepis comosa</i>	نمت الفم
<i>Fraxinus excelsior</i>	مرکان شامخ	<i>Sparcium junceum</i>	وزال الشرق
<i>Dipsacus fullonum</i>	مسط القرابي ، شوك الدراج	<i>Ligustrum vulgare</i>	ياسم معروف
<i>Rhamnus cathartica</i>	نبق سهول		
<i>Agrostis canina</i>	نجير كليبي		
<i>Epilobium hirsutum</i>	ند غفائي		
<i>Mentha arvensis</i>	فنع صمغري		
<i>Falsaria vulgaris</i>	ميردان شائع		

٧ - نبوت الاثرية الطينية الكلسية

<i>Cirsium luteolans</i>	أبو سلام ، عشرق
<i>Juncus glaucus</i>	أسل بحري اللون
<i>Aquilegia vulgaris</i>	أكيلاجيا عقابية
<i>Coronilla varia</i>	إمروس اوقش

A - نبوت الاثرية المتخضبة

<i>Achillea ptarmica</i>	أخيلية بقلة الطاس	<i>Sambucus ebulus</i>	ييلسان صغير ، حمان صغير
<i>Myosotis palustris</i>	أكان الفار المتقي	<i>Sonchus oleraceus</i>	تقاف معروف
<i>Juncus</i>	أسل (بعض الانواع)	<i>Bromus asper</i>	قرشول كبير
<i>Viburnum opulus</i>	اللور ثلجي	<i>Campanula trachelium</i>	جريس الست ، قفاز مريم
<i>Equisetum maximum</i>	اسوخ كبير	<i>Campanula glomerata</i>	جريس صمغي
<i>Equisetum palustre</i>	اسوخ متقي	<i>Lathyrus tuberosus</i>	جليان مدرن
<i>Sanguisorba officinalis</i>	بلان غزني	<i>Tussilago farfara</i>	حشيشة السعال
<i>Gaum rivale</i>	جيم بري	<i>Bupleurum falcatum</i>	حليلاب منجل
<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتخضبة	<i>Mercurialis perennis</i>	حليوب مسمر
<i>Scirpus caespitosus</i>	حلل الحصر	<i>Androsaeum officinalis</i>	داذي غزني
<i>Populus tremula</i>	حور ريجراج	<i>Daphne laureola</i>	دفنة عود النار
<i>Scrophularia aquatica</i>	خنأزيرية المتأخ	<i>Aegopodium podagraria</i>	رجبل للمزى ، حشيشة المزى
<i>Scrophularia nodosa</i>	خنأزيرية عقدا	<i>Fagus sylvatica</i>	زان معروف
<i>Pulicaris vulgaris</i>	وراع شائع	<i>Orchis mascula</i>	محلبل ذكر
<i>Stachys palustris</i>	مسلق المتأخ	<i>Orchis latifolia</i>	محلبل عريض الورق
<i>Carex</i>	سمادى (بعض الانواع)	<i>Orchis incarnata</i>	محلبل قزمي
<i>Symphytum officinale</i>	سمفون غزني	<i>Stachys annua</i>	مطاقس حولي
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماعز	<i>Stachys recta</i>	مطاقس سنيلي
<i>Cardamine pratensis</i>	مناب الماء	<i>Carex sylvatica</i>	سمادى حرجبي
<i>Comarum palustre</i>	عشبة القوي المتخضبة	<i>Carex pendula</i>	سمادى مدلى
<i>Schaenus nigricans</i>	عين البقر	<i>Tragopogon pratensis</i>	مسلخيل المارج
<i>Eupatorium cannabinum</i>	غفت ابن سينا	<i>Colchicum autumnale</i>	سورتيان الخريف
<i>Lythrum salicaria</i>	فرنكل مبدول	<i>Iris fastidissima</i>	سوسن متين ، قوسون

بیشة مقطوعة المتوسطة تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها
خلى الصفحة السفلى || ازهار نوربها تمد من ٣ الى ٥
وي صيوانية التجميع بيضاء اللون || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

١٨٠٨٨ - عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق

Spiraea hypericifolia (S). Spirée à feuilles de millepertuis (F).

جنيبة عمرة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة ،
مستطيلة ، مسنة الزام الاخير . نصلها انقب البشرة
ثلاثي المروق او خلسيا || ازهار نوربها تمد من ٥ الى ٧
وي صيوانية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران .

١٨٠٨٩ - عَرَاوَة دُغْلَاس

Spiraea douglasii (S). Spirée de Douglas (F).

جنيبة زينة تملو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية
مستطيلة . نصلها بطول نحو ٨ سم. وهو خلى الصفحة
السفلى ، مشاري الحافة في زامة الاخير || ازهارها
عنفودية التجميع ، وردية اللون القاني || ازهارها يستمر
طوال الصيف .

١٨٠٩٠ - عَرَاوَة زَبَاء

Spiraea pubescens (S). Spirée pubescente (F).

جنيبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. فروها ارجوانية
اوراقها اهلجية مقطوعة القاصدة . نصلها خلى الصفحة
السفلى ، مسن الزايمان الاخيرين || ازهار نوربها متوسطة
العدد ، ضمية التجميع ، لونها الى البياض الاصفر المواج .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩١ - عَرَاوَة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

Spiraea salicifolia (S). Spirée à feuille de saule (F).

جنيبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية تطول
من ٤ الى ٨ سم. نصلها عايق انخسار مسن الحافة يستعمل
في غش الشاي || ازهارها وردية اللون ، خشكوية التجميع ،
هرمية الشكل ، خشكوية بطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٠٩٢ - عَرَاوَة صَبْغِيَّة

Spiraea chinensis (S). Spirée chinoise (F).

جنيبة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مستديرة
مفصصة . نصلها خلى الصفحة السفلى الطويلة اللون .
ازهار نوربها حلقة الاضواء ، متوسطة العدد ، صيوانية
التجميع ، لونها الى البياض الاصفر المروج || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩٣ - عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة

Spiraea filipendula (S). Spirée filipendule, Filipendula (F). Common-dropwort, Italian may (E). Knollenstodesüss, Knolliges Mädesüss (D). Spiraea filipendula, Erba peperina (F).

جنيبة برية طيبة تملو نحو ٦٠ سم. جلوهها عسقولية
عقدية . اوراقها اهلجية ذرية . نصلها مشاري الحافة .
ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون خشكوية التجميع . ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز || عاقلها سائرة الطعم ،
طيبة وندرة البيل .

١٨٠٩٤ - عَرَاوَة كَثْبُون

Spiraea cantoniensis (S). Spirée de Canton (F).

جنيبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ايديسة ، سنانية ،

Veronica beccabunga

Arundo phragmites

Hydrocotyle vulgaris

Cirsium palustre

Cladium mariscus

Alnus glutinosa

Valeriana officinalis

Mentha aquatica

فبرونيكَا قَرَّةَ الْمِين

قصب ، يوس

قصبة الماء الشائفة

قصبان النلقع

كلاديين متقي

مفت غروي

فاريدين غزني

نمغ الماء

٩ - ثبوت الازهرة الطبيعية وهي معظمها نباتات ناقصة

Arnica montana الجبلية

Carex verticillatum

Andromeda polifolia

Viola palustris

Succisa perennis

Erica tetralix

Osmunda regalis

Carex

Salix repens

Sphagnum

Triglochin palustre

Oxycoccus palustris

Gentiana pneumonanthe

Lobelia urens

Menyanthes trifoliata

Drosera rotundifolia

Drosera longifolia

Spiraea (S). Spirée (F).

Spiraea (E).

جلس نباتات برية وزينة وطيبة من فصيلة الورديات .

انواعها كثيرة القند جميعها جنات وبينيات . اوراقها

متعاقبة ، عايلة ، مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها

صغيرة القند ، لا قابلية للشكل والتجميع . اما الاغصانين

في علم النبات فيقسمون انواع العراوة الى ثلاث فئات :

- الفئة الاولى تشمل الانواع ذات الازهار الصيوانية

والمعقودية غير المنشعب . - الفئة الثانية تشمل الانواع

ذات الازهار الملقحي . - الفئة الثالثة تشمل الانواع ذات

الازهار المفكوك والمعقودية المنشعب || اشهر اقواله

الطبية والزيينية ما يبع .

Spiraea cana (S).

Spirée blanchâtre (F).

جنيبة تملو من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها اهلجية الشكل

تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها مسن الزام الاخير ،

خلى الصفحة السفلى البيضاء اللون || ازهار نوربها كثيرة

العدد ، ضمية التجميع ، صغيرة القند ، بيضاء اللون ،

غبراء المواج || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩٧ - عَرَاوَة حَوْشِيَّة الْوَرَق

Spiraea prunifolia (S). Spirée à feuilles de prunier (F).

جنيبة عمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها



عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق



عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة

18102 - **عُرْوَةُ الْمَاءِ** *Naladacose* (S).
Naladacose (F). *Naladacose* (E).
 فصيلة نباتية من فصيلة الفلقية. اجناسها وانواعها نداء
 ١٠٠ جميعا مائية. ازهارها وسيدة الشق || اشهر
 اجناسها دروس الماء.



مرأوة لية النيس

18103 - **عُرْوَةُ الْبَيْتِ**
 هي التيلور الأبيض، اطليه.

18104 - **عُرْبُ** *Cautrier* (F) *To cautieria* (E).
 عُرْبُ النابية : ينمها حل اشجارها ثم كولها.

18105 - **عُرْوَةُ شاحنة** *Voiture agricole* (F).
Farmer vehicle (E).
 حجلة كبيرة تستعمل في نقل الحاصل الزراعي وغيرها
 من سائر الاشياء.

18106 - **عُرْبُج** *Chien de chasse* (F). *Pointier* (E).
 هو الكشم أي كلب الصيد.

18107 - **عُرْبِيد** هو الاربد، اطليه.

18108 - **عُرْبُوب** هو سقا المسابين، اطليه.

18109 - **عُرْبُك** *Urbec* (F).
 حشرة تدمي ولشيت الكربة، اطليها.



مرأوة ملكة المروج

18110 - **عُرْبُون**، **عُرْبُون** *Arrhes* (F).
Earnest, *Deposit* (E).
 هو مبلغ من التقد أو أي عين متغولة يدفعها احد طرفي
 العقد إلى الآخر سادة التمسك.

18111 - **عُرْبُج**
 المربج نوع من الكلاب الاسوية الضامرة الضمر.

18112 - **عُرْوَة** هي المرأة، اطليها.

18113 - **عُرْوَن** *
Myricaria (S).
Myricaire, *Petit tamarisk* (F). *Small tamarisk* (E).
Rispeistrauch (D). *Piccolo tamarisco* (I).

جلس جنبا برية وريينية معمرة من فصيلة الاليتات.
 سقها فرما مستطلة التفتبان الجزوية
 اللين. غراصيبها دقيقة تنمى بالنساق الزهرية || وهو
 من النباتات السبروية التي تعيش في أي مكان كان حتى
 بين الصخور || اعراف انواعها ما يلي.

18114 - **عُرْوَن جرماني** *Myricaria germanica* (S).
Myricaire d'Allemagne (F).

جنبة برية وريينية تنمو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. غراصيبها
 دقيقة تسك نحو ٣ سم. حثايقها الزهرية كبيرة رطلة.
 ازهارها صغيرة القند، ودية اللين، يضاء الملاج.
 ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



عُرْوَن

18115 - **عُرْوَن دَوْرِي** *Myricaria dahurica* (S).
Myricaire de Daourie (F).

جنبة برية وريينية تنمو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم.
 غراصيبها غليظة تسك نحو ٦ سم. حثايقها الزهرية كبيرة
 القند، لينة. ازهارها صغيرة، ودية اللين، مخزوية
 القنابات الخفيفة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

مسفة الزام الاخير || ازهار نوربًا قليلة القند، صيرانية
 التجميع، متوسطة القند، مَرَاكِيَة البتلات المكبية،
 لونها كالبياض الموحج بالأخضر || ازهارها يستمر
 طوال شهر حزيران.

18095 - **عُرْوَةُ لِحْيَةِ النَّبِيِّ** *، **دَقْنُ الْعُرْوِي**
Spiraea aruncus (S). *Spirée de chèvre*, *Barbe de*
bouc (F). *Goat's beard*, *Steeple weed* (E). *Wald-*
geissbart, *Spiertande* (D). *Spiraea spigata*, *Barba di*
capra (I).

جنبية برية طيبة تنمو نحو ٨٠ سم. اوراقها يضيء مطبوعة
 القاعدة تطول نحو ٤ سم. نصلها خاسي المروق، خلي
 المسفة السفلى || ازهارها يضاء اللين، متكونة التجميع
 شكل حثايق يشبه لية النيس || وهي من النباتات
 الطيبة تدر البول وتفيد اوجاع المغاسل والالتهابات.

18096 - **عُرْوَةُ مُجَعَّدَة** *Spiraea bullata* (S).
Spirée à feuilles cloquées (F).
 جنبية تنمو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها يضيء
 الشكل لا قياسية التسنين. نصلها مجعد المسفة، خلي
 البشرة، مَهاوِج اللين || ازهارها ودية، صغيرة القند،
 لينة التجميع، نوربًا خفيفة الشكل || ازهارها يستمر
 طوال فصل الصيف.

18097 - **عُرْوَةُ مَرْيَانَة** *Spiraea bella* (S).
Spirée décorative (F).
 جنبية تنمو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. فروعها غليظة مسفة.
 اوراقها سنائية الشكل، نصلها عايق اخضر ثنائي
 التسنين || ازهار نوربًا خفيفة التجميع، ودية اللين.
 ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

18098 - **عُرْوَةُ مَلِكَةِ الْمُرُوج** *
Spiraea ulmaria (S). *Spirée ulmaire*, *Ulmair*, *Rein-*
des prés (F). *Meadow-sweet*, *Queen of meadows*
 (E). *Echos Mädesüss*, *Weissenkönigin* (D). *Ulmaria*
regina dei prati (I).

جنبية برية طيبة تنمو من ٢٥ الى ١٠٠ سم. اوراقها
 مركبة. وراقها احليبية سنائية. نصلها بارز المروق
 والتسنين. ازهارها يضاء اللين. غصاها المواج، خفيفة
 التجميع || وهي من النباتات التي تستعمل في الطب التجانس.
 نقيها يفيد الاستسقاء والالتهابات والحمايات والسعال.
 ويستخرج من قضبانها اللينة عصارة لزجة صفراء اللين
 تحوي الكثير من الحامض المرادي (acide spiréique).

18099 - **عُرْوَةُ ويلسون** *Spiraea Wilsoni* (S).
Spirée de Wilson (F).
 جنبة تنمو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها زياء اللحاء.
 اوراقها مشرمة، نصلها اغبر اللين، خلي البشرة حل
 صفحي || ازهار نوربًا خفيفة التجميع، قطرها نحو
 ٥ سم. لونها كالبياض الاصفر المولج || ازهارها
 يستمر من حزيران الى تموز.

18100 - **عُرْوَةُ يَابَانِيَّة** *Spiraea nipponica* (S).
Spirée nipponne (F).

جنبة تنمو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها يضيء
 مطبوعة القاعدة، طرفها نحو ٢٠ سم عرضها ١٦. نصلها
 خلي المسفة السفلى للبراء الملاج || ازهار نوربًا كبيرة
 القند، غمية التجميع، صغيرة القند، مستطيلة البتلات،
 يضاء اللين || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

18101 - **عُرْوَات** *Spirées* (F).
 سبط من فصيلة الورديات، اشهر اجناسه المرأوة.

١٨١٢٥ - عُرْجُون *Rafie (F). Grape-stalk (E).*
هو الشقيق من العنب وغيره بعد انتزاع حبه .

١٨١٢٦ - عُرْجُون *عُرْجُون*
شرب من الكفاة قد شرب وهو طيب ما دام غصاً ، وهو كالقطر يابس وهو مستدير .

١٨١٢٧ - عُرْجُون *Rameau (F). Bough (E).*
هو اللتد المحل قبل أن يكون غصناً . ج . عراجين .

١٨١٢٨ - عُرْجُونِي *Ramale (F). Ramal (E).*
نمت تمريني يطلق على كل ما ينشأ في العرجون من ابن وزمات .

١٨١٢٩ - عُرْدَ *عُرْدَ* *عُرْدَ*
حرد النبات ؛ طلع وانتصب واشته .
١٨١٣٠ - عُرْدَ *عُرْدَ*
البرد ؛ الحار في قطع اللحم .

١٨١٣١ - عُرْدَاد *Éléphant de somme (F).*
الرداد ؛ القيل العامل .
Elephant of burden (E).

١٨١٣٢ - عُرْدَمِيَّة *Phallime (F). Phallim (E).*
المرمية عبادة المردم عند الاقدمين كالسوريين والمصريين ولكنكانيين والتبليبيين والاشوريين وعرب الجاهلية واليونان طقوس وثنية قوامها إقامة الشعائر التعبدية امام نصب يبرز الى المردم لاله بمقدم محور الحياه في الكون .

١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصَّنَوْبَرِ الْبَرِّيَّ *Aradus cinnamomeus (S).*

Arade du pin sylvestre (F).
حشرة عاخصة من فصيلة المردوسيات ، جسمها صغير ، مسطحة ، يطول نحو ٤ م . عند الذكر ، ونحو ٦ م . عند الانثى || ثوبها الى الخشنى الا انهم يعدونه مروج برارح من الشجيرة الى الليرة . رأسها مزخرف بتلوينات واطنان . غطتها ينتمن في اعمده لا يتجاوز الحلقة الصدرية الاولى . عيناها جانبيتان . زباناها معتدلا الغلاظة . كوسلها مقطوم القامة والمقدم . حجبها قليلة ، صغيرة . حنجرة الطهران مسنجة بالاخير . ظهراتها اسود العروق ، يلحم البطن دون الحثار . حثار ظهرها اسود التجديع . قوائمها صيرة || تألف للواقع التي يكثر فيها البرد . تعيش على الاهداب .

١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعُكْصِيَّ *Aradus corticalis (S).*

Arade plat (F).
حشرة دامة من فصيلة المردوسيات ، جسمها صغير مسطح ، يطول نحو ٦ م . رأسها مزخرف . عنقها معتدل الطول . غطتها ينتمن في اعمده يمتد حتى الحلقة الصدرية الثانية . عيناها صغيرتان . زباناها معتدلا الغلاظة . حجبها صيرة . ظهراتها ادم الحنجرة ، لا يلحم كامل البطن || رأسها وزباناها الى الخشنى الاسمر . كوسلها رصحنى الى الخشنى المبيج والمخطط بالاسود . ظهرها احر التبيج ، اسمر للتسبيج المتضرر . الصفحة السفلى الى السرة القاعة || تألف للغابات . تعيش تحت قشور الفصص والسديان قوتها المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات *Aradidae (S).*

Aradidae (F). Aradidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة متخلفات الاجنحة وطبقة اصغيات

١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مُرْتَانِي ، جَوْزُ مُجْتَنَح *Pterocarya (S). Pterocaryer (F).*
جس اشجار سرجية وزينية من فصيلة الجوزيات مدها البلاد الاسيوية ، انواعها قليلة جميعها اشجار فرعاء ، دفلة ، كبيرة الحجم وارفة الفل . اوراقها صياغية عابلة مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ مسنة الحافة تشبه لوراق المزان ولذا دعوا الجوز المراني . اما ثمارها فجوزية مجنحة وطدا ايضاً ما جعل بعضهم يسميها الجوز المجنح . للثمرة صغيرة القد ، غلافها الجلدي لاصق بالقشرة الخشبية ، لبانها حنكي اللون يضيي للشكل لا يؤكل .

١٨١١٧ - عُرْكُونُ صِيحِي *Pterocarya stenoptera (S).*
Pterocaryer de Chine (F).
شجرة من المرتين تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها طويلة المائلين ، وريقاتها لسنة طولى من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها ازغب السطحين . ثمارها مجم البتة ، اجنحتها صيقة مسطبة || مدها الصين . اوراقها صياغية .

١٨١١٨ - عُرْكُونُ مُرْتَانِي الْوَرَقِ *Pterocarya fraxinifolia (S). Pterocaryer à feuilles de frêne (F).*
شجرة من المرتين تملو من ١٢ الى ٢٠ م . اوراقها مسطبة المائلين ، وريقاتها نحو ٩ سم . نصلها عايق الصفحة العليا يلمت السفلى . ثمارها مجم البتة ، اجنحتها وافة المرش قليلة الطول || مدها الصين والقوقاس . تستعمل للزينة ، اوراقها صياغية .

١٨١١٩ - عُرْكُونُ يَابَانِي *Pterocarya rhoifolia (S).*
Pterocaryer du japon (F).
شجرة من المرتين تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها جلدية النصل الاصفر اللون ، صفحته العليا ملساء البشرة اما السفلى فزياة . ثمارها مجم الجوز الصغير . مدها اليابان وقد انتشرت زراعتها الزينية نظراً لقربها شكلها ولانسداد اوراقها .

١٨١٢٠ - عُرْكُونِيَّة *Arctobotrys intermedia (S).*
Arctobotrys à parfum (F).
لبات طيري سرجي ممر من فصيلة القشديات . منته بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية اعصها اغتد وجاليا . ويؤرخ كتابات صناعي لاستثمار طهر || يستخرج من اثماره دهن طيري فاخر الصنف شائع الاستعمال في الهند وجنار واثار الاطوار الاسيوية .

١٨١٢١ - عُرْكُونِيَّة *Artemia (S).*
Artémie (F). Artemia (E).

دوية من القشريات الدنياه عيشوييات الاطراف . تعيش في المناطق الحارة البينة حيث للملحة لا تقل عن ملوحة البحر وقد تفترها || جسمها ادم الحماض . عيناها مزفتان . زباناها مسطولين عند الذكر . ارجلها الصدرية صغيرة للشكل .

١٨١٢٢ - عُرْج *Boiserie (F). Halting, Limplig (E).*
حطب يحل بواكم اللواب فلذا كان مقطاً اعتبر من الصيرب المبلطة لليع .

١٨١٢٣ - عُرْجَاك *العرجاد هي النسيج ، الطبا .*

١٨١٢٤ - عُرْجُك *Rameau tortueux (F).*
Tortuous bough (E).
هو اللتد العادم الاستقامة الكثير التاربج والقد .





عردیل اریه

Alarich

١٨١٤١ - عَرَصَبْ

العرش بمجموعه كواكب صنادق تقدم اليك الاخر.

١٨١٤٢ - عَرَصَبْ التُّرْبَا

بمجموعه كواكب بالقرب من الثريا.

١٨١٤٣ - عَرَصَبْ عُرْشُكْ هو ورد اهدت، امله.

١٨١٤٤ - عَرَصَبْ مُتَقَلِّبْ هـ

Orsodacne variabilis (S).

Orsodacne variable (F). *Orsodacne variabilis* (E).

حشرة خاضعة ومفترسة من فصيلة الساريليات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها فصح الارباع بينه من الشرق الاصل الى اوروبا واسريكة الشجالية. تألف البراري والمناطق والحقول المزروعة. يختصها تميش على اوراق النباتات من الذكورة وعلى اثمار الصيوانيات. يرقاتها تلتهم الاوراق والبراعم في اطفالها. جسمها صلب رقيق بطول من ٥ الى ٨ سم. ثوبها مغلب الالوان تغلب فيه الشحنة الحنطية الملوح مع اسوداد الرأس. رأسها مستد الجرم. عيناها كيريتان جاحستان. زباناها خيطان خفيا. خلفها مخروطي مزق الطرف. ظهرها مستدير المؤخر للامح. غذاها مستطال الصلابة، متناجحت التحيز الخفيف. ارساها رباعية المغل الظاهرة. ارجلها رقيقة وحيدة في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. تسرع في التبار. تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع. تنجح الممكن على فصال الاوراق. وجمعتها عند ادراكها الكاك الجسوري بطول نحو ١٢ سم. وبقية دقيق الجرم، شبه اسطواني الشكل، سداسي القرواجب النحيلة، اكهب اللون، اسمر الرأس. في طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما يتفتق في الجذالة فتن صلبة من المواد النباتية والثرابية المسجوة بالريال.



عرصول



عرصد مغلب



عرصت جعدي



عرصت شرقي



عرصت شتقوره

١٨١٤٥ - عَرَصَبْ *Ajuga, Bugula* (S). *Bugle* (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة الشفويات. انواعها المعروفة قليلة منها بعض اصناف حوض البحر الابيض المتوسط. تتميز انواعها بفخامة سيللاتها المكشورة الشكل. بعض انواعها ينبت طبيعياً في الجرد القبنانية.

١٨١٤٦ - عَرَصَبْ جَعْدِي هـ

Ajuga lva (S). *lvetta musquée, lva, Petit-lf* (F). *Herb lvy, Musky bugle* (E). *Ivygünel* (D). *Bugula musciata, Erba lva* (I).

عشبة معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها كاملة مستطيلة، سفة الحافة. ازهارها ارجوانية اللون، عتقيدية التجميع. اوراقها وازهارها وجميع اجزائها مسكية الملمس النقيع. ازهارها يستمر طوال شهر نيسان.

١٨١٤٧ - عَرَصَبْ شَرْقي هـ

Ajuga orientalis (S). *Bugle d'Orient* (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. سيقانها مستطيلة الرقب الصوري الشكل. اوراقها بيضية لسة. ازهارها سنبلية التجميع، زرقاء اللون يملوها مواج وودي. تنابها مفضضة وسنة الحمار. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٨١٤٨ - عَرَصَبْ شَتَدْ كُورْ هـ

Ajuga reptans (S). *Bugle rampant* (F). *Bugle weed Common bugle* (E). *Kriechender Günsel, Lorenzkraut* (D). *Bugula, Lorenzia, Soldola* (I).

عشبة معمرة غليظة الاربوة. سيقانها جفيرة مفادة تملوها

الجنح. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. اجناسها صغيرة، مبطلية. رؤوسها مزخرفة. انطماها صغيرة، محضبة. قرونها الاستشعارية رباعية الفصل. قواياها صغيرة. ارساها ثنائية المغل. جميعها خاضعة او دامة تموش على اوراق النبات او على المواد النباتية المنحلة.

١٨١٣٦ - عُرْدِيلْ أُرْدِي هـ

Adelocera murina (S).

Adelocera gris souris (F). *Adelocera murina* (E).

حشرة خاضعة ومفترسة من فصيلة الساريليات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها فصح الارباع بينه من الشرق الاصل الى اوروبا واسريكة الشجالية. تألف البراري والمناطق والحقول المزروعة. يختصها تميش على اوراق النباتات من القوتية وبها البقول التي تغلفها على غيرها. يرقاتها تميش في التربة، نحو اربع سنوت لا كمال دورتها الحياتية. تغتلك مجلور الزروع والبقول والنباتات التزينية والاشجار المثمرة وتقتسر اسابيع بعض الحشرات وكزيرة ذوات الاجنحين. جسمها متوسط القد، اهليلجي الشكل، يطلو من ١٢ الى ١٨ سم. ثوبها ال السرة المابقة يملوها زغب اخضر يصل الى القرن. رأسها مستعرض الشكل. عيناها مخروطي. فكهاا خليجان زباناها خيطان. ظهرها مستدقان صامحتان. كرسها قليل الاسدياد. ارساها خاضعة المغل، حمية الخالب. الاثني اثنى قدامن الذكر واكد ثوبا مسه واقصر زبانا واضخم بعضا. جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر تموز. تسرع في التبار وتبيت في الليل. تنس على الارض بقعة واذا وقعت على ظهرها تلتفك لاستعادة وضعها الطبيعي.

١٨١٣٧ - عَرَصَبْ *Gastridium* (S). *Gastridie* (F).

جنس نباتات عشبية برية معروفة من فصيلة النجيليات انواعها المعروفة قليلة منها بعض اصناف حوض البحر الابيض المتوسط. تتميز انواعها بفخامة سيللاتها المكشورة الشكل. بعض انواعها ينبت طبيعياً في الجرد القبنانية.

١٨١٣٨ - عُرْشُكْ، عُرْشُكْ هو ابن عرس، امله.

١٨١٣٩ - عُرْشُكْ *Ortizelux Melifreni* (S).

Ortizelux de Melifren (F).

طائر وحيد الجنس والرتع من فصيلة الزرقائيات. موطنه مناطق افريقية الاستوائية يجمو في طلب القوت. يألف غشاف جمادي الماء والبيجرات والمستنقعات. قوته الحشرات والديدان وبعض الاشباب اللاتية. ملجته الحياتي جماعي. جسمه صلب رقيق، رشيق القوام، مغلف الرأس. صفيير المنقاد للذهب الطرف. جناحاه كيرتان لاحسان. ذنبه مستدير الطرف. ثوبه الى الشحنة الموحدة بالابيض. رأسه كسني القرن. عيناها مكشطان. حمراء الى البياض الحامي. منقاد ورساه الى السرة الحنطية. يثن انحوصه في التربة بين الاشباب الرقية. الاثني تحفن رسدها من ٤ الى ٥ بيضات. تربيعها يستمر نحو ١٥ يوما. الذكر يزلن لها الغداء.

١٨١٤٠ - عُرْشُكْ

هي فصيلة السوريات. املها.



عرصف شيا



عرصن



عرطس ملئس



عرطون

١٨١٥٨ - عُرُفَت شَيْءٌ Artanthe (F).

نوع من الناموس. جنبة معمرة من فصيلة الغلغلليات
أوراقها طيبة رائحة وبهم من يستعملها مضغاً. راجع
ناموس غيبق الورق.

١٨١٥٩ - عُرُطَيْتَا هو السكك، اطله.

١٨١٦٠ - عُرُطُون مُتَقَسِّس ° Athous obscurus,
Athous haemorrhoidalis (S). Athous confus.
Taupin confus (F). Athous obscurus (E).

حشرة مؤذية ناعمة مقرنة من فصيلة السوسيات ورتبة
مخيدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى معظم
الاصقاع الاروبية. تألف المهاجرات والحلقات المتزايدة
والادغال والاصراج. خنافسها تعيش على بقايا الاثمار
وأوراق القراص والحرفش. يرقاتها مؤذية تقضم جلود
التجليات والبقول والبطاطا والشديد وتقتصر كل ما
تستطيع من الحشرات || جسمها متوسط القد بطول من ١١
الى ١٤ م. ثوبها ملتبس اللونان، اسود الرأس والكسول،
احمر البطن، كشي الغفران، اسمر الجرايز. راسها
صغير الجرم. زباناها عظيمان، مستطيلان. صمناها
صغيرتان بارزتان. ظهورها متصابيح التميزر الفدي
القلاب. ارسافها خالصة المنقش تتميز باستطالة الفتحة
الاولى وبقصر الرابعة || الانثى تدعى عرطوية وهي امير
قدماً من الذكر وأكد ثوباً منه واقصر زبناً || جعلها
ربامي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى
تموز. تسرح في النهار وزييت في الليل || البرقة بظنية
النمو تملك الكمال الجسوري بمرر ثلاث سنوات فيصبح
طولها نحو ٢٧ م. ثوبها الى الصفرة الصنائية يعلوها
موجع امفر.

١٨١٦١ - عُرُطُون ° Orthonyx (S).

Orthonyx (F). Orthonyx (E).
جنس طير من الجوارث رقيقات المنقش وفصيلة المانوريات.
انواعه المعروفة اربعة موطنها استراليا وزيلندة الجديدة.
تألف الاصراج والفايات العاتية الانحجار. ملجئها الحايطة
زويبي. قوتها الحشرات والنمل والبار واليزور || اجسامها
متوسطة القد، ريشة القرون تملل من ٢٤ الى ٣٢ م.
رؤوسها مستدلة الجرم. مناتيرها رقيقة صغيرة. اجنتها
مستديرة. اذنانها مستطيلة، مقطوعة الاطراف. اثنائها
متباينة اللونان تكثر فيها الكهكة الخنطية الحامض والمزقة
السراء. جميعها مرقوشة الدراء والجناح والذنب || تدش
اعشاشها في الادغال القليلة الارتفاع من سطح الارض.
الاناث تحضن رسلها من بيضة الى يفتشون في مرتين
او ثلاث مرات في الحول. الترخيم يستمر نحو ثلاثة
اسابيع. الذكور تلين الحايطة والغذاء.

١٨١٦٢ - عُرُطِيل ° Eroteylos (S). Eroteylos (F).

جنس حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرن
وفصيلة الميرطيليات. انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في
مظم مناطق البلاد الاستوائية || اجسامها فيه بيضية
الشرنق، بحبة الصفحة العليا، تطلو من ١٠ الى ١٥ م.
الانثى ملونة، زاهية الخصب وسنها المؤذرة والمجذبة والبيضة.
تعيش على جميع انواع العطور اغصانها اللينة التركيب.

قصدان ترتفع من ١٠ الى ٣٠ م. أوراقها للقرصية مدجة
بالجوي والاسفر الاسفنج المالح. ازهارها عتقودية
التجميع زرقاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى
تموز.

١٨١٤٩ - عُرُصَف شَيْءٌ * Ajuga chia (S).
Bugle chia (F). Chia bugle (E). Chia Günsel (D).
Ajuga chia, Bugula chia (I).

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٤٠ سم. أوراقها الجذعية
الفلل مستطيلة. عتقودها الزهري يمتد على طول الساق.
ازهارها زرقاء اللون. قناباتها صغيرة كثية || ازهارها
يستمر من ايار الى آب.

١٨١٥٠ - عُرُصَف صَوْبِي ° Ajuga chamaepitys (S).

Ajuga chamaepitys (S). Bugle petit-pin, Chamépi-
cys, Ivette (F). Ground pine, Yellow bugle (E).
Gelber Gümsel, Ackergömsel (D). Bugula irvat-
etica, Campizlo (I).

عشبة حولية تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها ثلاثية للشرم المدهي.
ازهارها صفراء اللون ستلية التجميع || ازهارها يستمر
من نيسان الى تشرين الاول.

١٨١٥١ - عُرُصَف صَوْبِي ° Ajuga pyramidalis (S).

Bugle pyramidal (F).
عشبة معمرة تملو نحو ٢٥ سم. ساقها مفصلة زباد اللحم.
أوراقها مستطيلة، نصلها متصبع الصفحة المابقة
الحضار البحري. ازهارها عتقودية التجميع المحري الشكل،
لونها الى ازرقه البنفسجية || ازهارها يستمر من نيسان
الى آب.

١٨١٥٢ - عُرُصَم Streptosolen (S).

Streptosolène (F).
جنس نباتات جنسية زبينية معمرة من فصيلة الباذنجانيات.
سوقها فواهد تملو من ١٠٠ الى ٣٥٠ سم. أوراقها ابيدة،
كاملة، بيضية الشكل، نصلها غلي البشرة حل صفحتيه.
ازهارها يرتقالية اللون، حلقية التجميع، تاجية الارتكاز.
ثمراها جزوية القد، بيضية الشكل، مقطوعة القلب،
لية السوف. يزورها حنسية صغيرة، رقيقة، حنطية
اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع.

١٨١٥٣ - عُرُصَم ° Sidérodendron (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الفويات، انواها قليلة
المد منها بلاد الحارة. سوقها فواهد تملو من ١٢ الى
٢٥ م. ازهارها متقابلة اعليلية مستطيلة. ازهارها
عتقودية التجميع، تاجية الارتكاز، ثمراها عنبة.
اشعاشها ناعمة الرقة، ثقيلة الوزن، شديدة الصلابة،
خرية اللون، فاعرة الصنف، تستعمل في الصناعات
الخشبية.

١٨١٥٤ - عُرُصَم Lastuda

المساة البكائة بين ميق معين وسط الاستواء.

١٨١٥٥ - عُرُصَم Offe, Proposition (F).

Offe, Proposal (E).
هو طلب ابرام عقد يتفق مع الشروط المقروضة.

١٨١٥٦ - عُرُصِي Accidental, Fortult (F).

Incidental, Casual (E).

١٨١٥٧ - عُرُطَب هو القطريون الكبير، اطله.

مستطيلة، رملية، متدلية. اهدابها فلسية، ذرية متقابلة. ثمارها جزوية اللون، عتية الشكل، قطرها نحو ١٠ م. اغشائها صناعية شائعة الاستعمال.

١٨١٦٩ - عَرَبُورُ رَقِيع (F). *Genévrier de Tauride*. هو الزأب، اطلبه.

١٨١٧٠ - عَرَبُورُ مَسِينَة (F). *Genévrier rabine*. هو الايل، اطلبه.

١٨١٧١ - عَرَبُورُ سُورِي * و دَقْرَان
Juniperus drupacea (S). *Genévrier de Syrie*, *G. drupacé* (F). *Syrian juniper* (E). *Syrtscher Wacholder* (D). *Ginepro di Siria* (I).



عرب سوري

شجرة وشية الشكل سبروتية مبلولة تملو من مترين الى ٢٠ م. غرايبها وبناتها قصيرة ذركية. اهدابها تطويل ١٢ الى ٢٥ م. وتعرض من ٣ الى ٥. نصلها بحري الصفحة العليا، اخضر القفل. ثمارها نوية الشكل قطرها نحو ١٥ م. لونها الى الارجواني اللامع اللؤلؤ اللامع.

١٨١٧٢ - عَرَبُورُ شَالِع *
Juniperus communis (S). *Genévrier commun* (F). *Common Juniper* (E). *Wacholder*, *Mechandelbaum* (D). *Ginepro* (I).

جنية سبروتية ترطب في الارضية الكلسية تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ م. غرايبها فارقة. بناتها اسطوانية. اهدابها خيطية تطويل من ٨ الى ١٥ م. ثمارها عتية الشكل ولقده تلبو متدلية ثم تزد مع الاذلاكي وتتمثل في تطهير حلة مستحضرات منها الكحولية كالبل والليتر وسها الكنسرو كالشوكروت.

١٨١٧٣ - عَرَبُورُ عَال *
Juniperus procera (S). *Genévrier élevé*, *G. d'Afrique* (F). *Uganda juniper* (E). *Afrikanischer Wacholder* (D). *Ginepro abissino* (I).

شجرة سبروتية مهدا الحيفة وقد عت زراعها شطوط حوض البحر المتوسط. ساقها منتصبة فراء تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. غرايبها متدلية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها صفية حامدة التسنين. ثمارها مستدرة صغرة قطرها نحو ٥ م. لونها الى الخلفي الاصفر. اغشائها صناعية جيفة الصنف.



عرب شائع

١٨١٧٤ - عَرَبُورُ فِيرَجِينَة
Juniperus virginiana (S). *Genévrier de Virginie*, *Cédro de Virginie*, *C. rouge* (F). *Red juniper* (E). *Virginischer Wacholder* (D).

شجرة سبروتية متدلة كبيرة لحد تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اغشائها ليفية الانتساب. غرايبها رملية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها غرزوية الشكل لونها الى الخضار الازرق القمايق يفرح منها عت للسر عوف كويه مسجن. ثمارها ييفية الشكل تطويل نحو ٧ م. وتعرض نحو ٥. لونها الى البسجي المائم. اغشائها صناعية جيفة الصنف حراء اللون.

١٨١٧٥ - عَرَبُورُ فِينِيكِي
Juniperus phoenicea (S). *Genévrier de Phénicie*, *Morven*, *Lyden*, *Sabine maritime* (F). *Phoenician juniper*, *Arabian juniper* (E). *Phönizischer Sadebaum*, *Rotfrüchtiger Wacholder* (D). *Ginepro fico* (I).

شجرة سبروتية صغرة لحد تملو من ٤ الى ٨ امتار.

١٨١٦٣ - عَرَبُورِيَّات *
Erotylide (S).

Erotylides (F). *Erotylides* (E). فصيلة حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرون. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متباينة لحد والشكل، منها البيضاء والاهليجية والاسطوانية. تطول من ٤ الى ١٦ م. انوعها جيلة الخصاب الزأبي الاسفع اللؤلؤ. قوتها الاستشارية مؤلفة من ١١ فصلة، الفصل الثالث الاخير ديبسية الشكل. اربابها خامسة القفل. القفلة الرابعة شديدة الصغر لكاد لا تظهر. اشهر اجناسها العرمول والعطخرف.

١٨١٦٤ - عَرَبُورُ * فِينُورِي
Juniperus (S). *Genévrier*, *Genèvre* (F). *Juniper tree* (E). *Ge-meiner Wacholder* (D). *Ginepro* (I).

جنس نباتات حرجية وزيتونية من السرويات. انواعها عديدة، منها الاجمار والشجيرات والجنات، جميعها ابيدة. بناتها منتصبة لا شمية. اوراقها عتية غرزوية الشكل او سرشبية. اثمارها وسيدة المسكن. ثمارها عتية لحد والشكل، حلوة الحام، عطرية العرف يستخرج منها بالقطر بعد التخضير قندي مقوم ينشط الباه ويكر البول. اغشائها صلبة. عصارتها عتية بحورية سرية الجفاف. اعرها واشهرها ما يتبع.

١٨١٦٥ - عَرَبُورُ الْبُخُور *
Juniperus thurifera (S). *Genévrier à l'encens*, *G. porte-encens* (F). *Incense juniper* (E). *Weihrauchwacholder* (D).

شجرة سبروتية صغرة لحد تملو ٥ امتار. غرايبها منفردة الزوايا. بناتها اسطوانية. اهدابها فلسية ذرية متقابلة، لونها الى الاجمار البحري الاسفع اللؤلؤ. ثمارها عتية قطرها نحو ١٠ م. لونها الى الزرقاء الختلية. يستخرج منها بالخر مادة عطرية تستعمل استعمال البخور.

١٨١٦٦ - عَرَبُورُ الشَمَال *
Juniperus occidentalis (S). *Genévrier d'Occident* (F). *Western juniper*, *Sierra juniper* (E).

شجرة سبروتية تعيش في جميع الاربة والمواقع تملو من ٣ الى ٢٠ م. غرايبها جامدة منتصبة. بناتها اسطوانية. اهدابها ثلاثية الصنف، فلسية، ذرية، يفرح منها عت للسر عوف اغاذ وانثبي الرائحة. ثمارها زرقاء اللون، عتية الشكل قطرها نحو ٨ م.

١٨١٦٧ - عَرَبُورُ الصِين *
Juniperus chinensis (S). *Genévrier de Chine* (F). *Chinese juniper* (E). *Chinesischer Wacholder* (D). *Ginepro cinese* (I).

شجرة سبروتية كبيرة لحد تملو من ١٥ الى ٢٥ م. اسرارها عديدة، اشهرها المذبة والقضية. جميعها زيتونية سرية النمو. غرايبها جالسة منفردة. بناتها اسطوانية منتصبة. اهدابها غرزوية ثلاثية التجميع تطويل من ٨ الى ١٢ م. نصلها اخضر اللون، ابيض المختار. ثمارها تنسجبة اللون، طليقة البثرة، ييفية الشكل تطويل نحو ١٠ م. وتعرض نحو ٧.

١٨١٦٨ - عَرَبُورُ خَرُوع *
Juniperus flaccida (S). *Genévrier flaque*, *G. pleureur* (F). *Drooping juniper* (E). *Trauerwacholder* (D). *Ginepro piangente* (I).

شجرة منتصبة لحد تملو من ٨ الى ١٠ امتار. غرايبها

ولا شك . وقال أبو حنيفة : إن العرقية أصلها واسع يأخذ قطعة من الأرض تنبت لها قصبان كثيرة بقدر الأصل وليس لها ورق له نكهة إنما هي عيدان دقاق وفي أطرافها زرع يظهر في رؤسها شيء كالشعر أصفر ، وهو مثل قعدة الإنسان بيض إذا يبس وله ثمرة صفراء والأبل والقم تآكله ويلبها ويأبسا ويليه شديد الحمرة . فيقال كان غيته غرام عرقية . || والعرق جنس نباتات برية وتزيينة من فصيلة البرديات . أنواعه المعروفة لا تقل من ٢٥ من فصيلة جنات وبجيرات . أصنافها بلاد الشرق وأروية . سيقان قصيرة معطها حرايط وبعضها شائك . أوراقها بسيطة ، كاملة ، تصلح لمشاربة الحافة ، جامدة النسيج ، مزينة الصفحات السفلى . أزهارها عديدة الأضدية ، صغيرة القد ، مستديرة البتلات ، نورية التجميع أو فردية . ثمارها نورية تحوي من ٢ إلى ٥ بذور . عُرْق || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع :

C. horizontalis	عرقية أفقية
C. frigida	عرقية الثلج
C. Zabeli	عرقية ذابل
C. tomentosa	عرقية زبده
C. melanocarpa	عرقية سوداء الثمر
C. salicifolia	عرقية سورية الورق
C. simoni	عرقية سيموني
C. microphylla	عرقية صغيرة الورق
C. racemifolia	عرقية عنقودية
C. multiflora	عرقية كثيرة الأزهر
C. lucida	عرقية لامعة
C. vulgaris	عرقية مبلولة
C. acuminata	عرقية مدببة
C. disticha	عرقية مزدوجة التصليف
C. rotundifolia	عرقية مستديرة الورق

١٨١٨٧ - عُرْقُط Acacia orfex (S).
١٨١٨٨ - عُرْقُط Acacia Froskall (F).
نوع من السنت وهو جنبة شائكة تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم . فروعه سريعة كثيفة متشعبة . أوراقه مركبة ، وريقاتها بيضية صغيرة القد شاسية الخضار . أزهارها صفوية التجميع ، زهرته صفراء اللون || أصنافه الجزيرة وسائر البلاد العربية . يصلح للزينة ولسياجات . الواحدة عرقطة .

١٨١٨٨ - عُرْقُط
« دودية لا خير فيها تذكر فحرب أنها لا تبول إلا فحرفت ببولها إلى صوب القبلة وألحيت تأكلها » المديري .

١٨١٨٩ - عُرْقُط Orphie (F) Garfish (E).
سمكة بحرية تسمى عرقان ، أطلبها .

١٨١٩٠ - عُرْق Arak
شراب مسكر يصطنع من كحول العنب مع الاتينون .

١٨١٩١ - عُرْق Sueur, Transpiration (F).
Sweat, Transpiring (E).
سائل تنفصه مسام الجسم وتفرزه بعض الغدد الخاصة .

غراسيها متفرجة جامدة . بناتقها اسطوانية . أهدابها سداسية الصف ، غرزية الشكل ، كثيفة التجميع ، متراكبة . ثمارها عنية ، قطرها نحو ١٥ م . لونها اللحمية اللونية اللامعة || يستخرج منها بالخر أجود أصناف البخور العربي .

١٨١٩٦ - عُرْقُ كَادِي *

Juniperus oxycedrus (S). Gendvriar oxycedrus, Oxycedrus, Cade, Cadier (F). Prickly cedar, Sharp cedar (S). Zader Wacholder (D). Ginepro ost-cedro (I).
شجرة سرورية مبلولة تملو من مترين إلى ثمانية أمتار . غراسيها منتصب ، بناتقها اسطوانية دقيقة . أهدابها عروية الارتكاز تطول نحو ١٦ م . نصلها أخضر الصفحة العليا ، أبيض السفلى التي يتوسطها خط أخضر . ثمارها جزوية اللون حصى الشكل ولقده || يستخرج من غصنها بالقطش زيت الكاد وهو دهن أسود اللون شديد اللعالية يستعمل في معالجة الأمراض الجلدية .

١٨١٩٧ - عُرْقُ عَرِيقَة Genièvre (F). Juniper-berry (E)
هي ثمرة العرعر

١٨١٩٨ - عُرْقُ Odeur (F). Odour (E).
العرق : الرائحة أو غلبة أو منته وأكثر استعماله في الطبية .

١٨١٩٩ - عُرْقُ، عَصَاكَة Coutume (F). Custon (E).
في البلدان القنانية المستعملة من التقاليد والمعادن .

١٨١٨٠ - عُرْقُ Criniera (F). Mane (E).
جاء شعر السق في الخيل والبغال والحمير .

١٨١٨١ - عُرْقُ
هو شجر الأترج . ج عُرْق وأحرف .

١٨١٨٢ - عُرْقُ الأسد Zosma
عرق الأسد نجم ثير من كوكبة الأسد الأصفر . ويدعى صميرة الأسد والحزنة .

١٨١٨٣ - عُرْقُ الدبلك
صبة تزيينية تسمى صينة خلية ، أطلبها .

١٨١٨٤ - عُرْقُكاه هي الفصيح المصطفة ، أطلبها .

١٨١٨٥ - عُرْقُكاه * Acrida (F). Acrida turrita (S).
حشرة كبيرة القد من فصيلة الجراديات . أصنافها البلاد الحارة . تألف المواق الربطية حيث يكثر الشب . الأكر منها يطول من ٣٠ إلى ٤٥ م . والأثني من ٥٥ إلى ٧٥ م . رأسها مخروطي الشكل . زياتها صمغتنا القلادة مستعانة الطرف . قوائمها مسطبة . ظهورها في الأكر يطول نحو ٤٠ م . وفي الأثني ٧٢ م . فوهها الل خضار الموش والمنش بالمنطلي .

١٨١٨٦ - عُرْقُك * Cotonéaster (S). Cotonéaster, Quince leaved medlar, Rockspray (E). Steinkugel, Quizenmispel, Zwergmispel (D). Cotogastro, Cotonastro (I).
جاء في اللسان : « عرق من النبات سهل سريع الانقياد واسخه عرقية . وقيل هو من شجر الصيف وهو لين أغبر وله ثمرة عشاء كالحلك . وقال أبو زياد : العرق طيب الريح أغبر إلى الخضرة وله زهرة صفراء وليس له حب



عرعر كادي



عرقان



عرقج

ساقها فروعاً . أزهارها بيضاء اللون ، جميلة الشكل ، عتقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، منتصبة || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عرق الدم

١٨٢٠٢ - **عرق الذهب المخزني** *
Uragoga ipecacuanha, Caphazis ipecacuanha, Psychotria ipecacuanha (S), Psychotrie ipecacuanha, Ipecacuanha, Ipeca du Brésil (F), Ipecacuanha (E), Ipecacuanhapflanze (D), Ipecacuanha (I).

نوع من عرق الذهب وهو عشبة ليفية صغيرة الغد تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أصلها البلاد الحارة الرطبة . يستخلص من جذورها العقيلة ، الحليمة ، البهية ، مادة قلوية صافية تحتوي نحو ٢٪ من عنصر الأمتين (Emetine) الشائع الاستعمال الطبي .

١٨٢٠٣ - **عرق السوس** هو السوس ، اطبله .



عرق الذهب

١٨٢٠٤ - **عرق السوس البري**

هو الاسرافالوس عرق السوس ، اطبله .

١٨٢٠٥ - **عرق التجيل** هو البغن الأحمر ، اطبله .

١٨٢٠٦ - **عرق القسا**

Nerf sciatique (F), Ischiatic nerve (E).

١٨٢٠٧ - **عرق إنجبار** *

Potentilla erecta, P. tormentilla, Tormentilla officinalis (S), Potentille tormentilla, Tormentilla officinale (F), Blood-root, Tormentil, Septfoil (E), Blutwurzfingerkraut (D), Potentilla tormentilla (I), نوع من عشبة القترى وهو نبات عشبي طلي مداد من فصيلة التيليكاتيك يكثر في الغابات والرمالي . جذابه تاجية ، صفراء اللون . أزهاره زنادية فردية غليظة انقطة الانتشاب . ساقه فروعاً .

١٨٢٠٨ - **عرق مديني** هي هدابة للدينة ، اطبله .

١٨٢٠٩ - **عرقكة** ، **عرقكة** Collet (F), Neck, Louse of the tree التي تتشب منها الدروق . Collar (E).

١٨٢١٠ - **عرقكة** Filare (F), Filaria (E). هي الهداية ، اطبله . اما البرقة فهي تسمية الدكتور حبيب صندر .

١٨٢١١ - **عرقكة** هو الخضض ، اطبله .



عرق الذهب الهزني

١٨٢١٢ - **عرقص** *

Sciophila (S), Sciophile (F), Sciophila (E).

جنس حشرات من فصيلة العرقصيات ورتبة ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، نجمية ، تغطي من ٤ إلى ٦ مم . رؤوسها صغيرة ، شبه موزانية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عند التفتين . قرونها الاستيعادية عيطية مركبة من ١١ فصلة . ملساها رباعية العقول . مراشفتها ضليمة . كواسلها بيضيه . بطنها موزنية . أنوثها ملونة . رؤاشها قسطانية التخصيب ، قواشها الوسطى والخلفية مهدبة الطنائب ، مجهزة بمناسخ ذرية || تألف الثنابات والمناقص الرطبة . أسارمها نجاية او عاردة تميش تحت لحاء الأشجار او عل الفطور .



عرق انجبار

١٨٢١٣ - **عرقصون** هو جلمم الحبيبة ، اطبله .

١٨١٩٢ - **عرق** ، **ولتين** ، **وريد** ، **ودج**

Veine (F), Vein (E). عضو وحياتي من اعضاء الجهاز الدوري في الجسم .

١٨١٩٣ - **عرق** Nerve (F), Nerve (E), Nerve (E).

عضو وحياتي ثانوي من اعضاء الجهاز الدوري الثاني مركزه الرئيسي في نصل الورقة ينشعب عن ضلعها .

١٨١٩٤ - **عرق** هو السلاة ، اطبله .

١٨١٩٥ - **عرق أبيض**

Veine blanche (F), White veins (E).

رسم ونمى الوبال الاقتصادية تسببه حشرات الترييس والفيزيد التي تركب اوراق التبغ تقطع الخشب وتنتص عصارة الخلايا واللصع الناتج ولا تترك حل نسيج النصل بمحاذاة النصل والدروق والثرابين سري اليافا عليلية جامدة مبتورة لا مناعة عندها تحميها من عث الامراض الفطرية ولا طلاقة نشوية فيها تحميها من متابة نشاطها الحيوي || يتكاثر هذا الورم بالقتض على الحشرة التي تسببه وذلك فور ظهورها على الاوراق . راجع ترييس التبغ .

١٨١٩٦ - **عرق أبيض**

هو الجزر الأبيض ، اطبله .

١٨١٩٧ - **عرق أكور** هو عود الودج ، اطبله .

١٨١٩٨ - **عرق الحلاوة**

هو الصابونية الخزنية ، اطبله .

١٨١٩٩ - **عرق الدم** * ، **دموية**

Sanguinaria canadensis (S), Sanguinalra du Canada (F), Blood-root, Red puccoon, Blood-wort (E), Kanadisches Blutkraut (D), Sanguinaria del Canada (I). نبات شبيهي جلدوموري ممر وسيد الجنس والتدر من فصيلة المشخاشيات . جذابه غليظة عقدية مادة غزيرة العصارة اللبنيية الحمراء اللون . اوراقه فردية تلتشب وسيدة عند كل عقدة يطولها شراخ . وهي عميقة ، كفية ، خاسية او سداسية الفصوص المسننة الحافة || تصلها الى الخصار البصري يطولو مواج آخر . شاربضة الزهرية تملو نحو ١٥ سم . وهي فردية الزهرة التي تألف من ٨ إلى ١٢ بتلة بيضيه الشكل بيضاء اللون || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار . وهو من النباتات الصناعية الطبية والثرينية وذلك لان صمارة الثبائية تتصلب في صباغ الالفة ولا يجمع اجزائه من الجذور الى الورقة والزهرة تتصلب طبيا كعوم او مخدر .

١٨٢٠٠ - **عرق الذهب** *

Psychotria (S), Psychotrie, Psychotrie (F), Psychotrie (E), Breckkraut, Brechpflanze (D), Psicotria (I). جنس نباتات برية من فصيلة القرويات أصلها البلاد الحارة . أنواعها عديدة جميعها جنبات وجينيات منتصبة السوق ، اوراقها متعاقبة معتقة كاملة . أزهارها عتقودية التجميع او تاجية الارتكاز . ثمارها عشية جلدية يابسة . له نواتج مشهوران واحد طبي وآخر زراعي .

١٨٢٠١ - **عرق الذهب الأبيض الزهر**

Psychotria leucocapala (S), Psychotrie leucocapala (F).

نوع من عرق الذهب وهو جنبية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم .

فردية التجميع ، أبيلية الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها المرقون الهزلي .

١٨٢٢٢ - عُرْفُونٌ مَعْفَرَنِي * Euphrasia officinalis (S). Euphrasia, Euphrasia, Casselunettes, Luminet (F). Euphrasy, Common eye bright (E). Echter Augengrost (D). Eufrasia, Spezza occhiali, Luminella (I).

نوع من المرقون وهو نبات عشبي يري حولي شبه طفيل لانه يركب بجذوره جنود النباتات الاخرى || اقلبه حوس البحر المتوسط ، اوراقه صغيرة لثقة متعاقبة نصلها مشاربي الحافة منصف التسين . ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره تنطق الورد وجع التهابات العين .

١٨٢٢٣ - عُرْقِيل
Jaune d'oeuf (F).
Yolk of an egg (E).
هو صفار البيض .

١٨٢٢٤ - عُرْم
Œufs de gangas (F).
Eggs of the Pin-tailed grouse (E).
المرم : ييش القطا .

١٨٢٢٥ - عُرْمٌ ، قَارِصٌ ، أُصِير يَاسِير
Carissa (S). Carisse (F). Carandas plum (E). Carisse (D). Carissa (I).
جنية معمرة برية طيبة من سبط المرميات وفصيلة القديليات . اصطناعها الهند ويبيض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . ساقها فراء . فروصها سرعية شائكة . اوراقها سائفة متعاقبة . ازهارها حشوكية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، بيضاء اللون || ازهارها ديمية يستمر من ايار الى تموز .

١٨٢٢٦ - عُرْمَاضٌ ، عُرْمَضُ
طحلب كانه نسيج العنكبوت . واللفظ الاخضر الذي ينتفي الماء .

١٨٢٢٧ - عُرْمَةٌ *
Georgyria (S). Géorgyria (F).
جنس حيوان من فصيلة اللخديات . اولاهه ثمانية . اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . اوتواها الى السرة . وروسها مستديرة ، قفاهها مقطوعة ، قوسها خريزية . اذنانها لا قوية ، قوائمها قصيرة ، اظافيرها قوية ، اذنانها غصبل شعر تملو جدها || اناها تضع من جبرون الى اربعة . تألف الهام والاراضي الرملية الشجرية . اجسامها متوسطة المق . انفاها طويلة عسرة كثيرة القوة ، قوائمها جلود ولها وشكير النبات .

١٨٢٢٨ - عُرْمَةٌ ، عُرْمَةٌ
Meule (F). Stack (E).
الكس من الحصيد يرم ويحفظ ريبا يدرس .

١٨٢٢٩ - عُرْمَصُ
Salpichroa (S).
Salpichroa, Œuf de coq (F).
جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الباذجانيات . انواعه عديدة جميعها سرورية . سوقها فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروصها سرعية . اوراقها اطلبية مستديرة القناعة ، صغيرة لثقة ؛ نصلها نامج التسيج ، خلج المجلس جميل الخضار . ازهارها محورية الارتكاز ، جليجية الشكل ، بيضاء اللون . ثمارها جوزية الشكل والقد ، لية السوداء ، فراء اللون .

١٨٢٣٠ - عُرْمَضُ
المرمض : كل حجر لا يمش ابدأ .

١٨٢١٤ - عُرْمُصِيَّات *
Scrophillidae (S).
Scrophillidae (F). Scrophillidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجسامها وانواعها المرموقة عديدة منتشرة في سبط اقطار العالم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٦ سم . وروسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . صيوتها صغيرة ، متتابعة عند التسين . قرونها الاستعمارية خيطة ، مركبة من ١١ فصلة . مرادفها وبلاسها متدلة الطول . قوائمها الخلفية مستقيمة الافخاذ || تألف الرياض والغابات والحراج . يرقاسها تدبش على الاشجاء النخرة وتحت القشور || اشهر اجسامها المرقص والميكوبية والية .

١٨٢١٥ - عُرْمُطٌ مَعْفُوج *
Oreolia cristata (S).
Oreolia huppé (F).
طائر وحيد الجنس والذعر من فصيلة المرمديات ورتبة الجروم سنات المنقار . يآلف الغابات والاحراج . ملجته انميائي جاعي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات ولآبار القبانة واليزور || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه جميل الالوان المتداخلة . راسه معتدل الجرم المنس الخضار الاسفم ، تملو ، عند الذكر ، قزعة شراعية الشكل حيلة اشجار اللهب . رفاقه وجناحه وذنبه الى الخضار الامس يملو مواج يراوح بين الشبهة والزرقة . زوره الى الياس الجاعي . امل صدره الى الحمرة الجوزية . يعل الى الصفرة يملوها مواج يراوح بين الشبهة والخضرة || يذنبه منه الى الادخال المستقيمة . الاثنى تحسن بمداوة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات .

١٨٢١٦ - عُرْمُوبُ
Jarrez (F). Hough, Hock (E).
عفس من امضاء القروان في الدواب وهو ما ضم ملش الساق والرقب من مؤخرها .

١٨٢١٧ - عُرْمُوبُ الرَّمِي
Arkeb
عربوب الرامي كركب نثر من برج الرامي . مركزه على الساق اليسرى وهو الاوله من المرمدين .

١٨٢١٨ - عُرْمُوبُ القَطَا
ساقها . وهو ما يبالغ به في القص يقال يوم اقصر من عربوب القطا .

١٨٢١٩ - عُرْمُوكَةٌ
المرقوقة نجان متشعاع من كوكبة القوس الاعظم .

١٨٢٢٠ - عُرْمُوكُلُ
Duchesnea (S). Duchesnea (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد جميعا قريبة الشبه من الشبلك . سوقها مدادة تطول من ٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متعينة مستطيلة المائلين ، نصلها مفصص الضفحة . ازهارها الى الصفرة اللحية . ثمارها جلوية التركيب ، شليكية القد والشكل ، حمار اللون ، مأكولة ، لكنها عادمة النكهة والرف .

١٨٢٢١ - عُرْمُوكُلُ *
Euphrasia (S). Euphrasia (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ٢٠ منظمها من اشاب المناطق الحارة . اوراقها صغيرة متعاقبة منفة الحافة . ازهارها



عُرْمُوطٌ



عُرْمُونٌ



عُرْمُونٌ غُرْنِي



عُرْمَةٌ



عرو



عرو النمل



عرون



عروسة



عروسة القراص

١٨٢٤٠ - عُرُوش *
Epi de maïs (F).
Maize head, Maize ear (E).
عور اسطواني الشكل غليظ القدر تركز سوله على صفوف متناوبة حبوب القدر الصفراء .

١٨٢٤١ - عُرُوشَة *
Cilo (S). عُرُوش الحوت *
Cilo (F). Cilo (E).
جنس دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الازبل وفضيلة المرصيات . انبواها المرفقة عشرة منتشرة في المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط || ملجتها الحياني بجاني . اسرايسا تند بضعة ملايين || اجسامها صغيرة عادمة اللثاف الصلبي شبه وشية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . افواها حلقة بزرالده غروبية نابضة . زانفها زويية القصبي في الفت . انواها عديدة منها الازرق والبنيجي والجذوي والاحمر || الحيتان تتدح اسرايسا وتلقها بشرامة .

١٨٢٤٢ - عُرُوشيات *
Clonidae (S).
Clidées, Clonidées (F). Clonidées (E).
فضيلة دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الازبل مريانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || تتميز باجسامها الصغيرة القشة وشية الشكل وبملامها الهجبة الاطراف وبخلها من اللثاف الصلبي || اشهر اجناسها المرزونة .

١٨٢٤٣ - عُرُوشوم *
Champignon (F).
Mushroom, Fungus (E).
هو كل فطر تام الخلفة بين الباق والكمكة .

١٨٢٤٤ - عُرُوشَة *
Pérénne (F). Perennial (E).
صفة نباتات المعمر . وقد تستعمل يعني المفسرة الانقراض في النبات الذي لا ينضج للاصالح الزمني المويوت . ضحفا بالمنى الاول حولي . وبالمنى الثاني حابل وثانفس ونيفس .

١٨٢٤٥ - عُرُوش الماء *
Naiade, Nais (F).
Naiad, Water-nymph (E).
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . افواها المرفقة ١٠ جميعها من نباتات المياه العذبة . سوتها منشبة قصفة . اوراقها رقيقة شائعة . انماها ثنائية الشكل ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع . الكدرية منها قريبا مدادة والاثوية مبيض || يبي من نباتات القمرودية في المساك الاستوائية لانها تدخل في فدا . بعض الاصاك انصها الشوط .

١٨٢٤٦ - عُرُوش النيل *
هو لولس النيل ، اطليه .
١٨٢٤٧ - عُرُوشَة البجر *
هو السحل المنطع ، اطليه .

١٨٢٤٨ - عُرُوشَة القَرَص *
Eurrhyncha urtica (S). Eurrhyncha de l'ortie,
Teigne des orties (F). Eurrhyncha urtica (E).
حشرة مزوقة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنسة . موطنها بعض اقالم البلاد المدة الحارة من الشرق الاوسط ولروبية . فراشها واشنة قريبا رقيق الازداد . غاضقة تركب اوراق القراص والشعيرات اربعة والزراعية تقتل الارواق وتقم في داخلها || جسمها بطول ١٠ م . ١٢ م . بطولها تراوح من ٣٠ الى ٢٤ م . رأسها صغير الحجم ، قصير الخلم . عينها زويتان ، صغيرتان .

١٨٢٣١ - عُرُوش *
Rafle (F). Grape-stalk (E).
المروش والممشوش هو المتد انترع عنه .

١٨٢٣٢ - عُرُوش *
Congre commun (F).
سمكة بحرية تسمى زرقية مبلولة ، اطلبها .

١٨٢٣٣ - عُرُوشيات *
Carissées (F).
سبط من فصيلة العذقيات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها جنبا وجنبايات فراء شائعة ، اشهرها الهرم .

١٨٢٣٤ - عُرُوش *
Forme cartilagineuse (F).
شكل من الزيدات وهو انتفاخ عظمي قاس يترى في المنفعة الجانية من اطرة الحافر .

١٨٢٣٥ - عُرُوش *
سَلَة زراعية *
Sétoie, Sétouie (F). Sétoie, Sétouie (E).
نبات عشبي علفي معمر من فصيلة القتريات القرارية . جلوره وثدية قوية تكثر في الارض من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . سوله تخينة جولة تطول من ٥٠ الى ٧٥ سم . اوراقه متعاقبة مركبة ، وريقتها بيضية الشكل كثيرة العدد ، انغاره منبيلة التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية ، مستطيلة الزناد ، ودية اللول ، مسحة العرف ، مشيرة الرقيق يحرسها الشحل . ثماره يزور مفلحة خطية اللول ، بارزة الزراكش ، عبينة الاطراف ، لا تحافظ على طاقها الابائية اكثر من سلتين || وهو من نباتات التي تجود في جميع الاثرية ولا تحصى سوى الرملة المادعة الانساج .

١٨٢٣٦ - عُرُوش القتر *
سَلَة عريف النيك ،
سَن العجوز
Onobrychis cristagalli (S). Sainfoin crête de coq,
Hérission (F). Cock's head, Medick vetch (E).
Hahnenkamm (D). Cresta di gallo (I).
نوع آخر من اللرن وهو من نباتات العلفية المحلية التي تحتش مرة واحدة . ساهله الظرية مديرة قلقد ، حربية الشكل ، مستطيلة الزناد ، يزوره خنلية اللول العباب ، كثيرة التماريع والزراكش القائرة || يجود في جميع الاثرية ولا يحصى الزراعة العلية .

١٨٢٣٧ - عُرُوش *
هو لولس النيل ، اطليه .
١٨٢٣٨ - عُرُوشيات *
Cracidae (S).
Cracidae (F). Cracidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات ، اجناسها خمسة طيرها تنسوة الجشة ، مستطيلة الشكل ، قوية المتقار الاجسن ، زرقية الرأس ، مديرة الاجنسة ، مستطيلة الذيل . اجناسها المشهورة ثلاثة النفاذ والغزان واشكس .

١٨٢٣٩ - عُرُوشَة *
Télotisme (F). Telocism (E).
المرنة حالة الصلبة ونداها في العصور الفياح .

١٨٢٥٦ - عُرُونَانُ السَّيْضِ Gymnogyne (F).

Gymnogynous (E).
نمت ترميفي يطلق في علم النبات على كل زهرة عريانة للبيض .

١٨٢٥٧ - عُرُونَانَاتُ Pterotracheidae (S).

Pterotracheidae (F). Pterotracheidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مَيْمَةٌ ، اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || معظم انواعها عديم الصفات والقليل منها يحمل امصدافاً لتلصق الاشياء || اعرف اجناسها واشهرها المرينات والشفاة والفردوة والنبلة .

١٨٢٥٨ - عُرُونَانَاتُ الْأَسْكَانِ Gymnodontes

Gymnodontes (F).
مركبة اسماك من الطليات تنتمي الى رتبة ملحويات الفك . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة تجمعها فصليات الفصحيات والفطقيات .

١٨٢٥٩ - عُرُونَانَاتُ الْبُورُورِ Gymnospermes (F).

Gymnospermes (E).
اسم قلمي باديات الزهر في النبات .

١٨٢٦٠ - عُرُونَانَاتُ الْخَيْشُومِ Nudibranches (F).

Nudibranchiata (E).
صف حيوانات من الرخويات المدلية .

١٨٢٦١ - عُرُونَانِيَّةُ Pterotrachea (S).

Pérottrachée, Firole (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة المرينات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ، يكثر وجودها في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها عريانة مستطيلة حلزونية شفاة تنتهي باذناب متعاقبة الطول دقيقة الاطراف . زعانفها صغيرة ورتبة التجميع . افواهها خشبية . خياشيمها قريبة الانقسام تلاصق القلوب في مجموعة واحدة مركزها تحت البطن .

١٨٢٦٢ - عُرُونَانِيَّةُ كَيْسِ الْبُرُوقِ Gymnosporange

Gymnosporange (F).
هي الفطور الطليقية التي لا ينفذ اكياس بعضها شفاء او لحاف .

١٨٢٦٣ - عُرُونَانِيَّةُ Imperata (S). Impératè (F).

جنس نباتات عشبية ، مبرية ، مرغوبة ، من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || جميع انواعها خشبية . عصفها ضيق ، متوسط الطول . سنبليها مركبة ، صغيرة .

١٨٢٦٤ - عُرُونَانِيَّةُ Ctenolabrus (S).

Céanolabre (F). Ctenolabrus (E).
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الكيديات انواعها المعروفة قليلة . جميعها صغيرة القد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . ومنها نوعان مسرحها البحر الابيض المتوسط .

١٨٢٦٥ - عُرُونَانِيَّةُ سَوْتِي Ctenolabrus Iris (S).

Céanolabre Iris (F). Ctenolabrus Iris (E).
سمكة من العريس اعطائها بعض مناطق البحر الابيض

زبانها عيطيان . ملمسها دقيقان . مرفقها معتدل الجرم . جوشها ونباتها الى الاسف الموج || رواشتها الى البيض الناجي يعلو تقيج وزركشة متداخلة الاربدة والاصفر والاحمر القفي || لها جبل واحد في الحبل . تظهر القرافة في اباد وتقيج حتى آب . تسرح في النهار || الانثى تنح للمكن مباحداً على الصفحات العليا من مصال الارواق || الفطور الاسروي يستمر نحو ٢٨ سبوعاً ولسنة مت بلوغها الاذكاء تمام طول من ١٢ الى ١٤ م . جسمها اسطواني الشكل ، اغبر اللون ، اسمر الموج ، تملوه ثلاثة صفوف قاذبة من الحلب القصير ولها جوي اللون . رواجاها البطنية مجهزة بكلايب صغيرة حادة الاطراف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متينة الحلب تسحب السرعة بين طيات الارواق المفتولة .

١٨٢٦٩ - عُرُونُ الصَّبَاغِينَ* ، عُرُونُ صَفَرٍ ، بَلَكَةُ الْخَطَايِيفِ ، مِيرَان

Chelidonium majus (S). Grande chélidoine, Eclaire, Herbe aux hirondelles (F). Celandine, Swallow-wort, Greater celandine (E). Gemeines Schellkraut, Schellkraut (D). Chelidonia majus, Celadonia, Erba nocta (I).

نبات عشبي بري مدمر من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه مركبة مفردة بحرية اللون . ازهاره كبيرة اللد ، طويلة الزناد ، لونها الى الصفار الزاهي || يكثر وجوده قرب البيوت الريفية وفي السياجات . صصارته لينة كايوة صفراء اللون تقضي على القليل . يهبط من اوراقه عند فركها رائحة لازمة تأخذ بالانف والحلق . ويستخرج منه صباغ اصفر مرغوب فيه .

١٨٢٥٠ - عُرُونَانَاتُ Graphiolaceae (S).

Graphiolacées (F). Graphiolaceae (E).
فصيلة الفطور العزمية من رتبة التعاليات . تتميز بعضها الرسيد الخلية ، اما بعضها فتتألف الجيلة شفي الانقسام .

١٨٢٥١ - عُرُونَانَاتُ Inermis (F). Thornless (E).

نمت ترميفي توصف به الاحياء النباتية العادمة الشوك والرشب .

١٨٢٥٢ - عُرُونَانُ الْجَيْمِ Gymnosoma (F).

Gymnosomata (E).
نمت ترميفي يطلق في علم الحيوان على كل جسم عديم الكساء .

١٨٢٥٣ - عُرُونَانُ الْجِلْدِ Gymnodermate.

Gymnoderme (F). Gymnodermosus (E).
نمت ترميفي يطلق في علم الاحياء على كل حيوان مكشوف الجلد .

١٨٢٥٤ - عُرُونَانُ اللَّذْيَلِ Gymnure (F).

نمت ترميفي يطلق في علم الحيوان على كل ذيل عديم الورب او الحلب او الحراشف .

١٨٢٥٥ - عُرُونَانُ السَّاقِ Gymnocaulis (F).

Gymnocaulous (E).
نمت ترميفي يطلق في علم النبات على كل ساق عادمة الارواق .



هروق الصباغين

18771 - عَرَيْسٌ صَخْرِيٌّ *
Anarrichus lupus (S).

Anarrichus, An. loup (F).

سمكة بحرية يعيش من شائكيات الزعانف وصيصة الجفريات
 مجلها المناطق الباردة والمعتدلة الحارة من المحيط الاطلسي .
 قلي تقرب من المحاجر . اسرابها متوسطة العدد || جسمها
 شبه اهليجي الشكل ، كبير القند ، بطول نحو ١٤٠ سم .
 رأسها انطس . شفتها رطب الانفراج . اسنانها كبيرة
 بجادة الاطراف . عنانها صغيرتان ماصتان . جلدها عديم
 السهف يحجب السطح . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة .
 زعنفتها الذيلية صغيرة مدببة الطرف || ثوبها الى الخضر
 البحري القاتم يميلو تجلج معترض اسمر تشد سمرة في
 الرأس وأعلى الظهر || لحمها جيد الصنف ويطبخها مرغوب
 فيه .

18777 - عَرَيْنٌ *
Antre du lion (F). *Lion's den* (E).

الرين والعرين : مأوى الاسد .

18778 - عَرَّافٌ * ، اَنْفُسُ *
Euphonia (S).

Euphonia (F). *Euphonia* (S).

جنس طير من فصيلة التتريات . انواعه المعروفة نحو
 ٢٤ : جسمها من طيور امرىكة الوسط والجنوبية . تألف
 القنابات والحراج . نظامها الحيائي بحلي . اسرابها متطاوعة
 العدد || اجسامها صغيرة القند ، عياله ، بطول من ١٢
 الى ١٦ سم . مثليتها غروبية صغيرة . اجنتها معتدلة
 الجسم . انقائها معتدلة القند ، مقطوعة الاطراف . اسرافها
 دقيقة . اصابعها صغيرة . اولياها بجلة الاوران الساطعة
 يكثر فيها الازرق والاصفر || تمييز بكرة قفريها
 المستحب الانعام . جميعها تعيش في الغار والبيادر .
 اخلاقتها رضية . معط انواعها يألف القفص ويحب التقرب ||
 تكثر احشائها في الاشجار الفتاة المعتدلة الارتفاع من سطح
 التربة . انثاهي تقصع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمتابعة
 الذكور نحو ١٤ يوما .

18779 - عَرَّاقٌ *
Esacus (S). *Esacus* (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة الزرقائيات . يتميز بفضفه
 وبسرعة حده . موته مناطق الهند والافانك وايران . يألف
 المنابع والقيعان ويضاف اليه وكثبان لربل . ملجته
 الحيائي بحلي . جواماته قليلة العدد . قوته الحشرات
 والديدان والفاصيص || جسمه بطول نحو ٢٨ سم . يتميز
 بكبر مقناده المركب من جزئين ، جزء صغير يمتد من
 القاعدة حتى ثلثي المقناد ويبرز قرني يكون الثلث الاخير .
 جناحه ذات الطرف يلسف الذنب . ذنبه غروبي الشكل ،
 قصير . ثوبه العلوي الى الوردية السمر يميلو مزاج اسمر .
 رأسه اشد سمرة من ردهاء . عنانها مقلتان بخط ابيض يمتد
 كالماجب حتى القفن . زورده واظفك الى القبرة . حده
 وبلته الى الشبهة . مقناده وساقه الى الكهبة السمره .

18780 - عَرَّالَان *
Rectrices caudales (F).

المرالان : الريشتان الثنائيتان في طرف ذنب العقاب .

18781 - عَرَّابٌ *
 هو الايروس البطر ، اطلبه .

18782 - عَزْبِيَّة *
Ferre (F). *Farm* (E).

العزبة كلمة مصرية ترادف مزرعة . ولزراعة هي كل
 ارض زراعية موصولة بالحفود يستثمرها صاحبها او يؤجرها
 بقدر .

المتموسط اخصها المناطق الثيالية || جسمها صغير القند
 بطول نحو ١٣ سم . ثوبها الى الحمره الزاهية . زعنفتها
 سود || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

18766 - عَرَيْسٌ صَخْرِيٌّ *
Ctenolabrus
rupestris (S). *Ctenolabrus des rochers, Ronqué* (F).
Ctenolabrus rupestris (E).

سمكة بحرية يعيش من الراس . اصلها من سطر التاليم البحر
 الابيض المتوسط . سرجهها حشاش الحماجر والنفث ||
 جسمها اهليجي الشكل . معتدل التبطيط ، بطول نحو
 ١٥ سم . ثوبها الى الصبهة الوردية يميلو مزاج اخضر
 ومشرع غسوط متطيلة قاطبة . رأسها غروبي الشكل ، مدبب
 انطس . فكاهها صغيران . شفتها قليل الانفراج . عنانها
 كبيرتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامتساوية
 الارتفاع . زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها متوسط
 الصنف ، مأكول .

18767 - عَرَيْسٌ الْوَرْدَانِي *
Platyphylle (F).

Platyphylous (E).

18768 - عَرَيْسٌ الْبَيْتَالِي *
Platypétale (F).

Platypetaleus (E).

18769 - عَرَيْسَاتُ *
Plathelminthes, *Platodes*, *Platyhelminthes* (E).

Vers plats (F). *Platyhelminthes* (E).

شعبة الديدان الراض . تشمل ثلاث رتب : التريليات
 والمتقنات والمهزئات .

18770 - عَرَيْسَةٌ ، مَعَرَوْسُ *
Pétion (F).

Pestion (E).

كتاب يرفع الى السلطات العامة يعرض فيه رأيا أو طلبا
 أو شكوى .

18771 - عَرَيْسَةٌ الْمَدَكَةِ *
Platygaster (F).

جلس حشرات مفيدة من عشائيات الاجنحة تعيش يرقاتها
 حل اسارع بفض الحشرات المضره قضيتها .

18772 - عَرَيْسَةٌ *
Testacelle (F). *Snail-slug* (E).

تدعى في لبنان و بزاك حيران و جنس دوبيات من فصيلة
 المريطيات . انواعها قليلة العدد ، اصلها حوض البحر
 المتوسط . وهي من الدوبيات النافعة المفترسة التي تلهم
 الديدان على اختلاف انواعها .

18773 - عَرَيْسَتِيَّاتُ *
Testacellidae (S).

Testacellidae (E).

فصيلة دوبيات من الرضويات المدميات الارجل الرئوية
 الشبثانية . اجسامها وانواعها عديدة . اشهرها العرية .

18774 - عَرَيْسُ الْوَرُوجِ *
 هو الساهر ، اطلبه .

18775 - عَرَيْسَةٌ ، عَرَيْسَةٌ *
 عَرَيْسَةٌ ، عَرَيْسَةٌ *
Platycerus (S). *Platycre* (F).

جنس حشرات كبيرة القند من مدميات الاجنحة . انواعها
 عديدة . اصلها اسراج البلاد المعتدلة الحارة . اجسامها
 غليظة ، قرونها الاستمدارية صفحية الشكل ، اولها
 الى السواد الباهم الاسفح الملوحي || يرقاتها تتركب اوراق
 الاشجار الحرجية قضيتها .



عَرَيْسٌ صَخْرِيٌّ



عَرِيَّة



عَرَيْسَةٌ



عَرَّاقٌ



عَرَّالَان



عَرَّابٌ

يألف الثنايات ويقترّب من الاماكن الآهلة ولا يتعدى على الانسان. ملجته الحياقي زوجي || جسمه ابيض اللون ورشيها ، يطول نحو ١٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٩٠ سم. رأسه صغير الحجم. اخذاه صغيرتان ، صغيرتان. عيناها صغيرتان. سباله كثيفة مستطيلة. فترته قصيرة الثوب. ثوبه الى الكفة الحمراء المولج يمين في الظهر ويذو في الصدر والبلع. ويجعل غدة ادرية المركزة تفرز مادة كبريتية الرائحة. الانثى تضع ثوباً من الذكر || يتسلق الاشجار غنقة ويهدو على الارض بسرعة. قوته الطير والمناظر وكل ما استطاع اليه من الحيوان.

١٨٢٩٨ - عسّاكة كبيرة *

Leucospis gigas (S). *Leucospis géant* (F). حشرة من العساكيات كبيرة القد. موطنها بعض اقطار البلاد الحارة والمشمخة نحو المعتدلة || جسمها مستطيل الشكل ، مثل الجوشن ، يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى السواد اللامع تملو خطوط عريضة صفراء كاربينية المولج رأسها شبه مخروطي الشكل. زباناها خيطيان. قوائمها مستطيلة. سكتة الطنايب. اجنتها غشائية ، ضيقة ، قليلة المروق والاصاص. اشترها مستطيلة ، منثقة تستقر عند الاستراحة في اخدود يقطب الظهر حتى الجوشن || تنطفل على الزنايب والزرايط فترز اشترها في جهل الخشاء مها كان صلباً ومثنت المكن في البدا وعليها.

١٨٢٩٩ - عسّاكيات *

Leucospidae (S). *Leucospidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة. انواعها عديدة جميعها نافعة تنطفل على الحشرات الضارة من ذوات الجناحين || حشراتها متوسطة القد وكبيرة تطول من ٧ الى ١٥ سم. اجسامها غشيمة ملونة ، رؤوسها مخروطية. زباناها خيطية. قوائمها طويلة. سكتة الطنايب. مرزاتها مستطيلة ، حادة منثقة نحو الظهر عند الاستراحة || اشهر انواعها العسّاكة الكبيرة.

١٨٣٠٠ - عسّالة

هي غشاية النحل ، اطلها.

١٨٣٠١ - عسّاكة *

Morphogenèse (F). *Morphogenesis* (E). العسامة مجموعة للنوايس التي تتحد وتتحكم شكل النج والاضياء في كل جسم حي منذ ابتداء تطويرة.

١٨٣٠٢ - عسّب

هو الاربوس العطر ، اطلها.

١٨٣٠٣ - عسّيب

Sperme du chameau (F). *Sperm of the camel* (E). شلغ النحل من الابل.

١٨٣٠٤ - عسّب ، عسّيب

هو في النبات القدر الذي يتحمل بجميع صفات الضرب المثالية المطولة.

١٨٣٠٥ - عسّبار *

Proteles cristatus (S). *Protète à crête, Loup fouisseur* (F). *Aard-wolf* (E).

حيوان من اللوامس وسيد الجنس والنوع يشبه الضبع المخذعة لكنه اصغر منها جثة واثق ثوباً وأخشن صوفاً. اعطاه البلاد الافريقية ، يسرح في الليل ، قوته الجيف وكل ما استطاع اليه سيلاً من صابر الحيوان والطير.

١٨٢٩٧ - عزّة

Bichette (F). *Little hind, Young hind* (E).

هي بنت الظبية حتى افرقتها من امها.

١٨٢٩٨ - عزّور ، عزّير

الزور واليزير : هو ثمن الكلا به الحصيد. تقول : حل اخذت حيزر هذا الحصيد اي حل اخذت ثمن مرادها.

١٨٢٩٥ - عزّور

Terra compacta (F). *Compact soil* (E).

المرز : الارض السليبة الرميّة السيل.

١٨٢٩٦ - عزّوف

هو الحمام الطوراني ، اطلها.

١٨٢٩٧ - عزّوق

Sarclage (F). *Weeding* (E). سرت القشرة السطحية من القرية بالمزق الآلي او اليدوي وذلك لتنظيف التربة باقتلاع الاصشاب الضارة ولتخريب انابيب الاستلاب نمّاً لتبشر الماء.

١٨٢٩٨ - عزّوك

Isolément (F). *Separately, isolation* (E).

فصل الحيوان المريض عن السليم.

١٨٢٩٩ - عزّوك من الروصاية

Déstitution de la tutelle (F). *Dismisal of the tutelage* (E). تجريد الوصي من مهمة الروصاية التي استندت اليه.

١٨٢٩٠ - عزّومة *

Energide (F). *Energid* (E). الزومة محيط غليوي يشتمل على نواة ومنطقة زكينة تنتمل بتوجيهها.

١٨٢٩١ - عزّويل

Pigeon mâle (F). *Pigeon male* (E). الذكور من الحمام.

١٨٢٩٢ - عزّوؤ

Imputabilité (F). *Imputability* (E). هو القول بان فلاناً فعل فلهة مبنية مادياً وادبياً.

١٨٢٩٣ - عزّوق

الزوق : حل القسق المادم للاب وهو دياغ.

١٨٢٩٤ - عزّيب

راجع شعة وجيرة.

١٨٢٩٥ - عزّيزّاه

هي الجشنة ، اطلها.

١٨٢٩٦ - عزّيم *

Azimus (S). *Azime* (F). جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الثنايات. انزاهه المعروفة عديدة منها المناطق الاستوائية من البلاد الاسيوية والافريقية || سيقانها سريعة او ملتفة. اوراقها منثقة ، متعابلة. نضالها اهلبيجية الشكل ، جميلة الخضار اللامس. انزهارها ابيض وهامس الارنكساز ، عشقوي التجميع. انزاهها صغيرة يضاء اللون او ودية ، عطرية الدرف الخالط.

١٨٢٩٧ - عسّاس *

Cryptoprocta ferox (S).

Cryptoprocta féroca, Foussa (F).

حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات. موطنه جزيرة مفسكر. يعتبر اكبر غزاري الجزيرة. مسرعه دجوي.



عزيم



عسار



عسّاكة كبيرة



عسبار

١٨٣١٢ - **عُشْبُونٌ** * Phyllostachys (S).

Bambou (F), Bamboo (E).

جنس نباتات قصية بزية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وصليبة التبليات. أنواعه عديدة ترطب في الأربة القليلة الانتاج ، السيفة النور ، الضوية ، القالية ، القرطية . اشهرها ما يتبع .



صرب

١٨٣١٣ - **عُشْبُونٌ أَسَدٌ**

Phyllostachys nigra (S), Bamboo noir (F), Black bamboo (E), Japanese Blattschere (D), Bambie nero (I).

نوع من العشون يطول من المترين الى السبعة امتار . سيقه بكاملها مع سلاسلها وصبرها الى السواد اللامع . اوراقه طول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . نصلها مائل للصفحة العليا ، ازغب السفلى ، مذهب الخافق . ينبت من النباتات البروية القليلة المتطلبات . يفضل الأربة الخفيفة الرطبة .

١٨٣١٤ - **عُشْبُونٌ أَمْرَ**

Phyllostachys aurea (S), Bambou doré, B. jaune (F), Yellow bamboo (E), Gelbe Blattschere (D), Bambie giallo (I).

نوع من العشون يطول من ٤ الى ٥ امتار . سلاسله مقعرة قصيرة ، صبره بارزة مقعرة . انتاده عديدة ، دقيقة ، متشعبة . اوراقه طول من ٧ الى ١٤ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل للصفحة العليا خلى السفلى || وهو نبات سبروي ينبت ويحيد في جميع الأربة .



صربوة مرققة

١٨٣١٥ - **عُشْبُونٌ بَنَفْسِي**

Phyllostachys violascens (S), Bambou violacé (F).

نوع من العشون يطول من الثلاثة الى الست امتار . سيقه بكاملها بنفسجية اللون . اوراقه طول من ٥ الى ١٨ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها مسن الحافة || زراعتو تتطلب بعض العناية ، يرغب في الأربة الغنية الانتاج والرطوبة . الزائرة المواد الضوية .

١٨٣١٦ - **عُشْبُونٌ بَيْشِي**

Phyllostachys ruicollis (S), Bambou petit-houx (F).

نوع من العشون يطول من ٤٠ الى ٩٠ سم . سلاسله تنمو خضراء اللون ثم تصفر . اوراقه طول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مستدير القامة ، ذلق القصبة . وهو نبات سبروي يحيد في جميع الأربة القليلة والمتوسطة الانتاج .



عشرون

١٨٣١٧ - **عُشْبُونٌ زَبَرَجَدِي**

Phyllostachys viridilutescens (S), Bambou vert glaucescent (F).

نوع من العشون . يطول من ٥ الى ٦ امتار . سلاسله متوسطة الطول ، خضراء اللون . صبره بارز اسود . اوراقه طول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا خلى السفلى || وهو نبات سبروي ، زراعتو كثيرة الانتاج لكنه ينشئ الجفاف .

١٨٣١٨ - **عُشْبُونٌ كَسْتِيلُون**

Phyllostachys castillonis (S), Bambou de Castillon (F).

نوع من العشون ، يطول من ٣ الى ٥ امتار . سلاسله متخلفة الخضرة والصفرة . اوراقه طول من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها منشدي الحافة يطول وتضع اصغر ودي || ينبت من النباتات البروية التي تحيد في جميع الأربة الممكن زرعها .

١٨٣١٦ - **عُشْبَر ، عُشْبُون** Chien-loup (F).

Wolf-dog (E).

سلالة من الكلاب تتميز بسلطها وبقابليتها الى اقتباس ما يطلب منها .

١٨٣١٧ - **عُشْبِي** Pileostegia (S), Pileostégia (F).

جنس جنبات كزيتية معمرة من فصيلة السبسيات ، أنواعه قليلة العدد ، سيقها زرجونية طول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها كاملة ابيضة سنانية اتصال الجملد الصفعة وهي حاضرة مرة تدلوي بها الجراحات . ازهارها صيروانية التجميع ، يضاء اللون ، سلاسلها غيبية الشكل بارزة || ازهاره يستمر طوال الصيف .

١٨٣١٨ - **عُشْبِيد** هو اللهب ، اطلبه .١٨٣١٩ - **عُشْد** هو البير ، اطلبه .١٨٣١٩ - **عُشْرَابٌ** * Butalis grisola (S).

Butalis gris (F), Brown fly-catcher (E).

طائر من الصوارب من فصيلة المنابيات . موطنه جميع المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى واروبة . يألف جميع الاماكن القريبة من الماء || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى الوردية . جبهته ورأسه مرقوشان بالاسود . ويعمل في جناحه بعض التسنجج الابيض . ثوبه السفلي الى البياض اللامع . منقعه صدره واظلامه مرقوفة بالاسود . منقاده وحفة صبه الى السواد الخالك . ساقه واصابعه الى السمرة السوداء . ثوب الاذن عادم التسنجج في الجناح || طيرانه خفيف الحركة رشيقا . وينتقل على الارض بلقاقة . قوته الحشرات من الذباب الى الفراش والياسيب ولا ينف عن التار السنية اليانعة || يدفن حبه بين الاضغان . الاثني تضع في اوائل حزيران من ٤ الى ٥ بيضات متحصنا بجانبه الذكر نحو ١٤ يوما .

١٨٣١١ - **عُشْرُوبَةٌ مَرْقَقَةٌ**

Notodonta zizac (S), Notodonta zizac, Zizag.

Bols veiné (F), Notodonta zizac (E).

حشرة من فصيلة الشرسليات وزيتة غرشيات الاجنحة . طولها معظم الاضغان المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاراضي واروبة . فرائشها واقعة قريبا رقيق الانتاج . سرقتها تميش على اوراق الخور والصفصاف || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ سم . بسلطها نحو ١٢ سم . رأسها صغير الجرم ، بني اللون . عيناها صغيرتان . زناناها مشطيان مزروجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جنشيتها الى البني الخفي الموج بسلطها الى البني الاصفر المواج . ورضعها الاماكن الى الخفي المتفاوت السرة تملوه مشطيات بنية ونسوط وعروق سمراء اللون . ورضعها الحفليات الى البياض البني المواج . اهدابها جانبية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . كسرج في الليل . تعامل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع ويضع للكن مساعدا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو ٣١ سم . جسمها مائل انتشار اكعب الابن اسود التحول . مستطيل الرأس ، مستضيق البطن حتى السكة السابعة ثم يضيق تدريجيا حتى الشرج الذي ينشئ بزاويتين صغيرتين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي فسم صلبة تحميها السرة تحت القشور او في شقوق الحاء .

١٨٣١٩ - عَسْفُوس مَأْكُول

Phyllostachys mitis (S). *Bambou comestible* (F).
نوع من العسفس، يملو من ٨ إلى ١٢ م. قطر ساقه
يراوح من ٥ إلى ٧ سم. سلاحياته مستقيمة صفراء اللون.
أوراقه تطول من ٨ إلى ٩ م. وتعرض نحو ٢ م. نصلها
أخضر الصفحة العليا، أزرق السفلى. اماليجه الفتية
مأكولة تستعمل اصحاب الحلوى || يرغب في الأتربة
الدبالية للتمسوة الانتاج والرطوبة.

١٨٣٢٠ - عَسْفُوس مَعْلَق

Phyllostachys narmorea (S). *Bambou marbré* (F).
نوع من العسفس، يملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ م.
سلاحياته تنحنية مشوكة بالرمادي. أوراقه تطول من ٧
إلى ١٢ م. وتعرض من ١ إلى ٢ م. نصلها حافى الخضار
يملو تقطيع اغبر يالوت || يرغب في الأتربة الرملية
او القليلة للانتاج الفتية الرطبة.



عسفس

١٨٣٢١ - عَسْفُوس

Isotoma (S). *Isotoma* (F).
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة العسفسويات. انواعه
المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ إلى ٤ م. ألوانها
سوية اللون منها الاسود والاعضر والاحمر. رؤوسها
نحسة. بطنها اعليجية الشكل و مبرة الحلب. جهازها
التفريضي نشيط || أشهر أنواعه العسفس الاعضر (*Isotoma*
viridula) الذي يكثر وجوده على الطحالب ونحسها.

١٨٣٢٢ - عَسْفُوسِيَّات

Isotomidae (S). *Isotomidae* (F).
فصيلة حشرات قافزة، دامت وقارعة من رتبة الكهلديات.
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم
اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١ إلى ٤ م.
رؤوسها شبه بيضية اللون. افانها وتكثيرها لاطة.
حيروا زئيمية. قرونها الاستشعارية قصيرة، رباعية الفصل.
صودرها ثلاثية الحلقفات. تتميز بقصر مقدم الجوشن
المامد الحلب. بطنها سداسية السكر مجهزة بجهاز تفريضي
نشط. مكانتها ثنائية أو ثلاثية الانسان. قوامها نحسية
تلتهب باظفار مجنحة سادة || أشهر اجناسها العسفس.



عسفس وراثجية

١٨٣٢٣ - عَسْفُور

Eschra (S). *Eschire* (F). *Eschra* (F).
جنس حيوانات طليعية من فصيلة العسفسريات. انواعه
المعروفة قليلة العدد منتشرة في أكثر مناطق البحر الابيض
المتوسط || مستعمراتها مغمورة قليلة الغور، من ٣٠ إلى
٥٠ م. تحت سطح الماء. جميعها متشعبة منتفخة المحيطات
التيالية الطبقات.

١٨٣٢٤ - عَسْفُورِيَّات

Escharidae (S). *Eschariidae* (F). *Escharidae* (F).
فصيلة حيوانات طليعية بحرية اجناسها وانواعها الممارسة
قليلة العدد مطنها يعيش في مجار البلاد المعتدلة الحارة ||
تتميز بفوقاتها الدائرية وياثكها القدسية المحصورة.



عسفسو درامه

١٨٣٢٥ - عَسْفُوب

Grappellotta. *Grappillon* (F). *Small bunch of grape* (F).
عسفوب صغير منفردا كان أو متصلا بملاق غيره.
ج صلاب.

١٨٣٢٦ - عَسْفُود

Asperococcus (S). *Aspérocoque* (F). *Asperococcus* (F).
جنس نباتات بحرية من اخليات السمر. انواعه المعروفة
عديدة منتشرة في جميع مجار البلاد المعتدلة الحارة ||
كلالها صغيرة وقصيرة. أوراقها قدية، حلالية التركيب.
مراجها اطول حامشية تحت امتداد النصال || تعيش على
الصخور المصورة.

١٨٣٢٧ - عَسْفُود

Chapeau, Péridium (F). *عَسْفُودَان*
Pileus, Peridium (E). عسفسان الفطر: اعلاه رؤسه.

١٨٣٢٨ - عَسْفُودِيَّة

Escallonia (S). *Escallonie* (F). *Escallonia* (F).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية، من فصيلة
السفريسيات. مهدها بلاد الشيلي. سوقها فناء ترتفع من
متر إلى ثلاثة امتار. أوراقها ابيدة ومتعاقبة، مسنة
الخفاف. ازهارها لاقياي الشكل والتجميع. ازهارها
ملونة || انواعها المعروفة قليلة، أشهرها التالية.

١٨٣٢٩ - عَسْفُودِيَّة رَائِحِيَّة

Escallonia filineta (S). *Escallonie résineuse* (F).
نوع من العسفسويات. ساقها تملو من مترين إلى ثلاثة امتار.
أوراقها صغيرة تطول نحو ٤ م. وتعرض نحو ٢ م.
نصلها جلدية، جرداء، مسنة الخفاف، لامعة الخضار.
صفتها السطلي مبرة الغدد الرائحية. ازهارها بيضاء
اللون، بحورية الارتكاز، صغيرة القد، قطرها نحو
٨ م. || تنويرها صيفي.

١٨٣٣٠ - عَسْفُودِيَّة عَفْرَة

Escallonia pulverulenta (S). *Escallonie pulvérisée* (F).
نوع من العسفسويات. ساقها تملو من متر إلى مترين.
أوراقها اعليجية، مقلوبة. نصلها خلية البشرة، عفرة.
ازهارها صغيرة القد، وديدة اللون أو بيضاء، تتجمعا
متعاقبة طرفية الارتكاز متدلية || تنويرها يستمر طوال
شهر تموز.

١٨٣٣١ - عَسْفُودَة دَرَامَة *

Acronycta leporina (S). *Acronycta leporina* (F). *Acronycta leporina* (F).
حشرة من فصيلة العسفسيات ورتبة حشرقيات الالجنة.
موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط.
قراشها واسعة قوتها رقيق الازهار. سرقتها تعيش على
أوراق الاجمار الوريفة || جسمها مستدل اللق يطول نحو
١٦ م. يسطها نحو ٤ م. رأسها كبير الجسم. عينها
كبيران. زباناها خيطيان مستطيلان. جروشها سحري
اللون. بطنها إلى الزرقه تملوها خسة عسفسو متعرجة سمراء
اللون || روشناها الامامية إلى الزرقه الباهتة يملوها تقطيع
اسود وزرقه حلالية الشكل. روشناها الخلفية إلى الخيطي
الاصفر الملوحي || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل
الاولي في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تشرح
في الليل. تتألف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح
المكن لتطأ على الصفحات السفلى من نصال الأوراق ||
المرقة تطول نحو ٣ م. جسمها اسطواني الشكل، مالى

دَرَامَة *

حشرة من فصيلة العسفسيات ورتبة حشرقيات الالجنة.
موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط.
قراشها واسعة قوتها رقيق الازهار. سرقتها تعيش على
أوراق الاجمار الوريفة || جسمها مستدل اللق يطول نحو
١٦ م. يسطها نحو ٤ م. رأسها كبير الجسم. عينها
كبيران. زباناها خيطيان مستطيلان. جروشها سحري
اللون. بطنها إلى الزرقه تملوها خسة عسفسو متعرجة سمراء
اللون || روشناها الامامية إلى الزرقه الباهتة يملوها تقطيع
اسود وزرقه حلالية الشكل. روشناها الخلفية إلى الخيطي
الاصفر الملوحي || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل
الاولي في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تشرح
في الليل. تتألف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح
المكن لتطأ على الصفحات السفلى من نصال الأوراق ||
المرقة تطول نحو ٣ م. جسمها اسطواني الشكل، مالى

انهارها متقوية التجميع . عصارة ساقها تشفى من الجرب وتستعمل في تنظيف الآسنة الصلبة .

١٨٣٣٧ - عَصَلَجُ الْفَنَائِي

Leontice chrysogonum (S). *Leontice chrysogone* (F). نوع من الصلج الطبي البري والبرزي . ساقه تملو نحو ١٥ سم . أوراقه وريشة الشكل ، ورقها اصليجية ثلاثية او خاسية التفصيص ، تصالها بحري اللون . انهاره ال صفار اللحي يحلها خراج دقيق مسط || انهاره يصل في أيار .



صفودة هزيلة

١٨٣٣٨ - عَصَلَجُ الْأَسَد * ، راحة الأسد ، خميرة الذكر ، وكف

Leontice leontopetalum (S). *Leontice pied-de-lion*, *L. commun*, *Leoneur* (F). *Lion's-tear*, *Lion's-turnip* (E). *Echte Löwenblatt*, *Löwentrappe* (D). *Leontice pied de lion* (I). نوع من الصلج وهو نبات عشبي طبي بري يملو نحو ١٥ سم . أوراقه مركبة ثنائية التليث . ورقها بيضية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، مشرطة الطرف . انهاره صفر اللون . انهاره يحصل في أيار .

١٨٣٣٩ - عَصَلَجُ الْفَنَائِي

Leontice altaica (S). *Leontice de l'Altaï* (F). نوع من الصلج البري والبرزي . ساقه موقفة ، تملو نحو ١٢ سم . أوراقه مركبة ورقها اصيحية الشكل او متساوية القد . انهاره كبريتية اللون كيفية التجميع . انهاره يستمر طوال شهر نيسان .



صلج الاسد

١٨٣٤٠ - عَصَلَجُ * *Felis pardalis* (S). *Ocelot* (F). *Tiger-cat*, *Leopard-cat* (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه شاسع الاطراف يمتد من امريكا الشمالية الى المكسيك والبرازيل . يألف الاخراج . ملبته الحياتي زويبي || جسمه اخيف القوام رشيقيها يطلو من ١٢٥ الى ١٥٠ سم . ما فيه اللذب الذي يطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسه مستد الجرم . اذناه صغيرتان ، مستقرتان . عيناه صليتان ، حادتان . ثوبه الى الصهوة الحمراء الحواج يملوها تنير اسود ورقشة سمراء وتتشيز حنطلي . ذنبه عشاري الاطواق السود || مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى فحة الليل ومن الصبر العميق الى بزوغ الشمس . يتسلق الاجنبار بشفة السنور ويعود على الارض بسرعة الخيل . قوته الطير والابايل والقردة والخناثيس والجرذان || عمل الاث يوم نحو ٧٥ يوما تقص في نهايته من جروين الى ثلاثة جراء بقي مع ولديها نحو ستة اشهر .



سنان

١٨٣٤١ - عَصَلُوجُ *Brindille* (F). *Sprig*, *Twig* (E).

قصب دقيق قصير امس طوله من ٥ الى ٢٠ سم . ينهي غالبا برعمة او ببرام عمرة || والصلوج في الفرف الحريبي هو القصب البقيق على الفسمن او الفت .

١٨٣٤٢ - عَصَلَات

Melanthaceae (S). *Melanthaceae* (F). *Melanthaceae* (E). فصيلة نباتية من مزدوجيات اللقطة مستقلة الفصائل . اجنتها وانولها قليلة العدد جميعها جيجيرات وينبتات معمرة ابيدة الورق .

القتار . ثوبا الى الربة الخضراء تملوها سمة خطوط مزدوجة ، قاطبة ، جزوية . رأسها الى الجوزة القائمة . مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقفي ضمن صلبة تحبكهما السرة بين لاه الاجنبار .

١٨٣٣٣ - سُقُودَة هَزِيلَة * ، اَكْرُونِيَكَا هَزِيلَة *

Acronycta strigosa (S). *Acronycta strigosa* (E). حشرة من فصيلة النكتيات ورقية عرشيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المحتلة الحارة من الشرق الاوسط والافد واربدة . فراشها جاربة قوتها رقيق الاطار . سرقها تمش على أوراق العرود والفرخ || جسمها صغير القد ، هزيل . يطلو نحو ١٥ سم . يستلها نحو ٢٩ سم . رأسها مستد الجرم ثني اللون . عيناه كبريتان . زباناها جوشيات . جوشها ويصل الى اثني الاكلف الحواج || رواشها عنه الشقين الى اثني الاكلف تملوها في الزوج الاسامي بقعة قاعدية صفراء واخرى حثارية سمراء وتجليع وتنظيف وزرقة الى البني الاشقر . وتملوها في الزوج الخلفي نقطة قاعدية صفراء وبعض الزرقة السوداء . اهدنها الى الصصرة || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الفراشة في ايار ويلقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاطل يمد ظهروها بنحو ستة اسابيع وتحت الممكن لطفها على الصفحات السفلى من تصال الأوراق || السرعة تطلو نحو ٢٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس القشار . ثوبا الى اصخفي الاسمر تملو اطراف بنية . رأسها شديد السرة اصفر الحواج . مدنها الى اثني . وراجها الى السرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما يتقفي ضمن صلبة مثنية الحبلك تتسجها السرعة بين لاه الاجنبار او تحت القشور الصلفة .

١٨٣٣٤ - عَصَلَجُ * أَوْي *Miel* (F). *Honey* (E).

مادة سكرية يصنعها النحل من رقيق ويضرب الانهار والبار والارواق ليصنعها ويحفظها في تخاريب سلسة خاصة ، يستعملها من الشبع وينطلى بقرقة رقيقة شفافة شبيهة المادة تمنع عنها الفساد || اجود الصل طمعا وراحة ما كانت عنبه الصسر والخرام ويصا اليان والوجع واللين والبرن والخلعوق والتفل والسنت || اما حصوص تركيه المادي فهو :

فلوكوز وفليزوز	٧٠ %
سكاروز	٥ %
ماء	٢٢ %
موت وديسترين	٢ %
مواد صمغية ومعدنية	١ %

١٨٣٣٥ - عَصَلَجُ ، نَاجِم *Scion* (F). *Scion*, *Shoot* (E).

الصلج هو القصب الثاني على الطعم قبل بلوغه الحيل . وقد يكون برأيا فينسى اذ ذلك ناسجا . ج صاليج || ويقال صلبت الشجرة اذا اخربت عبالجها .

١٨٣٣٦ - عَصَلَجُ

Leontice (S). *Leontice*, *Patte de lion* (F). *Leontice*, *Lion's-tear* (E). *Löwenblatt*, *trapp* (D). *Leontice* (I). جنس نباتات صغولية طيبة من فصيلة البرباريسيات . انهاره ٦ عساقها معمرة ، سوكها حولية ، أوراقها مركبة .

١٨٣٤٩ - عَمِيَّات * Combrées (F).

سبط من فصيلة الأليليبات، أشهر نباتاته السهم.

١٨٣٥٠ - عَمِيَّيَات * Osmylidæ (S).

Osmylidæ (F). Osmylidæ (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرات الأجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم القطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || أجسامها متوسطة الحجم، تكثر فيها الاستطالة. بسطها تراوح من ٣٢ إلى ٤٨ سم. رؤسها شبه اسطوانية الشكل. عيونها كبيرة جاحضة. قرونها الاستشعارية غليظة مستطيلة. أجناسها مزعزعة ومبيجة بالأصفر وهي كبيرة، لاحقة، شبه متساوية بين الزوجين. جلونتها الاستطالة عند الراحة. بطونها شبه اسطوانية الشكل. أثوابها مزودة بالأصفر والأصفر والوردي والأخضر || تألف طبقات مجاري السام حيث تكثر الاحتباب || أنثاها تنجح المكان على نصال الأوراك. يرقاتها مفترمة، قاذبة توش في البر وفي الماء || أشهر أجناسها السليل.

١٨٣٥١ - عَمِيَّان * Périthœ (F). Perithœum (E).

هو ثلاث الثمرة في الفلور وهو الثمرة الفلورية التي تحسن الاتراك. ج. إصان.

١٨٣٥٢ - عَمِيَّان * Cira (F). Beeswax (E).

١٨٣٥٣ - عَمِيَّان * هو الشمع السلي. ج. هاشم السلي.

١٨٣٥٤ - عَمِيَّان * Lepidodactylus (S).

Lépidodactyle (F). جنس حشرات من فصيلة السويديات. أنواعه ١٠. أجسامها صغيرة القند، طولها يراوح من ٦ إلى ٧ سم. أثوابها بين الصفار والخضار تعلوها نمشة حمراء أو سوداء. ج. هاشم.

١٨٣٥٥ - عَمِيَّان * Lepidæ (S).

Lépides (F). Lépidæ (E). فصيلة حيوانات زسافة من رتبة الظفانيات. أجناسها وأنواعها عديدة أجسامها صغيرة القند، رباعية الأليل، خنسية الأصابع المبطنة المصممة || أشهر أجناسها السويدي.

١٨٣٥٦ - عَمِيَّان * Issus (S). Issa (F). Issus (E).

جنس حشرات ناسفة من فصيلة السويديات. أنواعها المعروفة متوسطة العدد أصغلتها بعض مناطق البلاد الباردة ويعظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة القند، مستطيلة الرؤوس، ناشرة الجناح والعيون، صغيرة القرون الاستشعارية، مستطيلة القوائم المسننة الشائكة. أجناسها مستعرضة، مشبكة، لاحقة، شفافة. ألوانها متباينة الألوان، تكثر فيها السمرة على اختلاف مناطقها التي تراوح من الشفافة إلى الحمرة الوردية والخضار الزيتي || قوتها النسخ تنمعه من الأوراك.

١٨٣٥٧ - عَمِيَّان * Issus coleoptratus (S). Issa des chènes (F).

شجرة ناسفة من فصيلة السويديات. جسمها صغير القند، طولها نحو ٧ م. || رأسها مستطيف، خطها ذرب.

١٨٣٤٣ - عَمِيَّان * زَهْرَةُ السَمَل Melianthus (S).

Mélianthus (F). Mélianthus, Fleur de miel (F). Melianthus, Honey flower (E). Honigblume (D). Fior di miele, Melianta (I).

جنس ثمرات ونباتات طبية وزيينية من فصيلة السمليات. أنواعها قليلة العدد صغيرة القند. أوراقها متعاقبة مركبة وثرية التجميع. أزهارها خنسية لا تلياسة الشكل، خنسية القصل اللانتمادية، رباعية البتلات والامدية. احادية الياض. ثمارها جرداء مفصلة رباعية القربقات، وهي فواحة العرف الطري، خنسية الرسوق السكري الأصفر اللون الذي يستمر من أبيض حلابات الأمراض الصدرية. اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

١٨٣٤٤ - عَمِيَّان صَغِيرَة Melianthus minor (S).

Mélianthus minora (F). جنبة سبروتية صغيرة تعلو نحو ١٥٠ سم. ساقها جرداء أوراقها صغيرة القند. أذنياتها سائلة. وريقاتها ٧ أو ٩ وهي شقيقة النسل للمشاري الحافة. أزهارها خنسية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. لنها إلى السرة الخنسية بلونها مزاج أسفح || أنزهارها يستمر من آب إلى ايلول.

١٨٣٤٥ - عَمِيَّان مُسَدَّدَة Melianthus comosus (S).

Mélianthus chevelu (F). جنبة صغيرة القند تعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها مسطحة. أوراقها صغيرة مستعرضة مهدلة. وريقاتها خنسية دقيقة. أزهارها خنسية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. بتلاتها رتقالية اللون، خنسية القفاضة حر التجميع || أنزهارها يستمر طوال فصل الخريف.

١٨٣٤٦ - عَمِيَّان مُسَطَّيَة Melianthus pectinatus (S).

Mélianthus pectiné (F). جنبة سبروتية تعلو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها جرداء جالسة. أوراقها متوسطة القند. أذنياتها سائلة. وريقاتها سنانية النصل، خنسية الصفحة السفلى قد من ١٣ إلى ٢١. أزهارها خنسية التجميع، تاجية الارتكاز، أرجوانية اللون || أنزهارها يستمر من أواسط آب إلى أواسط تشرين الأول.

١٨٣٤٧ - عَمِيَّان هَرَمِيَّة Melianthus major (S).

Mélianthus majeure, M. pyramidalis, Pimprenelle d'Afrique (F).

جنبة جالسة تعلو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقها جرداء متعرجة. أوراقها كبيرة. أذنياتها متدنية. وريقاتها لاحقة قد ١١ أو ١٣ أو ١٥ نصلها بحري اللون بالغ التسنين. أزهارها خنسية التجميع، هرمية الشكل، تاجية الارتكاز. لنها إلى الحسرة الباقية || أنزهارها يستمر طوال فصل الخريف.

١٨٣٤٨ - عَمِيَّان * Combretum (S).

Combret, Chigomier (F). Vegetable-glus plant (E). Langfaden (D). Combrete, Combrato (I).

جنس نباتات حرجية من السمليات وفصيلة الأليليبات. أنواعها نحو ٨٠ منها الأشجار والشجيرات والجنات. أطلابها البلاد الاستوائية. قفورها نحوي بعض السواد الصمغية الراتنجية القابضة. بزورها دعنية يستخرج منها زيوت مأكولة.



عَمِيَّان



عَمِيَّان



عَمِيَّان

اللون ، غبراء الجدار . تركيب الارزاق في حورما الهالي الذي يستحق الارزاق بضم ط ضبط التصل وتلك الصفات والانتاج دون ان تسي الى نحو قببات .

١٨٣٦٤ - عُثَّ ، عُثَّيْن ، مُوَكِّعَة

Nid (F), Nest (E).
الشي موضع حفر ينش الطائر يحضه من دقاق الحطب ويختلف الحشائش والنبات فيثبته في الثبر . وان كان في جبل او عمارة فهو وكروك ، اما اذا كان في الارض فهو انصوص وادي . ج عشش وأعشش وعشقة .



عصية البنج

١٨٣٦٥ - عُشَاوِي الْأَقْسَامِ
Décatoine (F), Decatome (E).
ما كان مقسماً الى عشرة اجزاء .

١٨٣٦٦ - عُشَاوِي الْأَوْجَعِ
Décadétre (F), Decahedral, Decahedron (E).
من الحاد ما كان عشاري الابهة او التواءد .

١٨٣٦٧ - عُشَاوِي الْفَصْلِ
Décamère (F), Decamere (E).
ما كان مركباً من عشر فصل .

١٨٣٦٨ - عُشَاوِيَات الْأَرْجُلِ
Decapoda (S), Décapodes (F), Decapods (E).
اسم تمريني يطلق على القشريات وعلى الرغويات الرأسيات الارجل الرباعيات الحشوشم .

١٨٣٦٩ - عُشَاوِيَّة الْمِدَكَاتِ
Décagyna (F), Decagin (E).
من الازهار ما كان وزيمها مؤلف من عشر مغلفات .

١٨٣٧٠ - عُشَاكَة ، زُوغُونِيَّة
Zoogonia (F), Zoogony (E).
المشاة علم يسمي في تطور الحوران .

١٨٣٧١ - عُشَاكَة : المشاة : اصل السلف .

١٨٣٧٢ - عُشَب
Essarter (F), To clear, To grub (E).
اقتلع الاشجار المفسدة من الرية .

١٨٣٧٣ - عُشْبَة
Herbe (F), Herb, Grass, Wort (E).
الشيبة ج . عشب وأعشاب . كل نبات رغو مومي الساق والارزاق اللدورية .

١٨٣٧٤ - عُشْبَة الْأَكْرِيقِ هي البقية ، اطليا .

١٨٣٧٥ - عُشْبَة الْأَبْرَاقِ هي البقية ، اطليا .

١٨٣٧٦ - عُشْبَة الْبَرَاقِثِ
هي يزو تفلوا ، اطليا .

١٨٣٧٧ - عُشْبَة الْبَلُورِ
هي القفيرة البلورية ، اطليا .

١٨٣٧٨ - عُشْبَة الْبَوَاكِرِ
هي شبيشة الحطاف ، اطليا .

١٨٣٧٩ - عُشْبَة الْبَوَاكِرِ الْمُقَدَّاهِ
هي الحنازيرية المقداه ، اطليا .

١٨٣٨٠ - عُشْبَة الْبَكَارِ هي الفسبة ، اطليا .

حيثما كبريتان . زوانها قصيران ، نحيلون . كوسلها مزواني صغير . حيثما تماثل الكوسل شكلها بقداً . ظهرتها يرمي الشكل ، لاحت ، شارب ، بطنها غروطي . قوامها مسلة الظنايب الخلفية || ثوبها الى الحطلي الاثخن يملو تنسج كسني في الرأس والكوسل والحلقة والظهران والقوائم . بطنها الى الحطلي الاسمر || تألف حراج السديان والتمس . قوامها نسج الارزاق .

١٨٣٥٨ - عُصَوِيَّات

Isidae (S), Isidés (F), Isidæ (E).
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطيفة فضليات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، لاقبسية الشكل ، متصلة التصليد . رؤوسها غليظة ، مخرمة المقع . اطلامها ذرية متصلة الطول . كوسلها صغيرة ، شبه هربية الشكل ، جالسة التلويد . اجنحتها مشبكة ، ملوطة ، لاحقة . بطونها غروطية الشوزن او سنالية . قوامها قوية ، مستطيلة ، فضلية الظنايب الخلفية المسنة الخلفان الخارجية || اشهر اجناسها الموس .

١٨٣٥٩ - عُصُوف

Coré (F).
نمت تمريني توصف به البزوغ الشديدة السورة .

١٨٣٦٠ - عُصَوِيَّات

Eurytomidae (S), Eurytomides (F), Eurytomidæ (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة الصغيرة اجناسها وانواعها قليلة العدد منها النافعة التي تتطفل على الحشرات الضارة بينها الخافضة للوزية التي تتطفل على التيجليات || حشراتا صغيرة القد طول من ٢ الى ٤ مم . اجسامها مستطيلة . بطنها ضامرة . مرزاتها فضية . زوانها الانثيرة عحرانية الشكل || اشهر انواعها يصوم التيجليات .

١٨٣٦١ - عُصِيل

Verge de l'éléphant (F), Verge of the elephant (E).
السول : قضيب الفيل ج . عَصَل .

١٨٣٦٢ - عُصِيْمَة الْبَنْج ، * ، زَالِيَّة الْبَنْج

Pseudomonas tabaci (S), Feu sauvage, Feu rouge, Rouille brune (F), Wild fire, Wild fener (E).
وصم يكبري فتلاك سريع المبدؤ يترى البنج في المشاتل وفي الحقل || الامال الواسم بكثيره في قضيبية اسطوانية دقيقة ، طولها يراوح من ١٤٠ الى ٢٨٠ ميكرون وعرضها من ٥٠ الى ٧٥ ميكرون تحمل في احد قطبيها ثلاث حديدات سولية يراوح طولها من ٢٥٠ الى ٧٠٠ ميكرون || مظهره الخاريسي ، على اتصال الارزاق ، يقع مستديرة لا قياسية الحجم تبسو صفراء اللون ثم تتحرف الى السرة وتنتهي باللباس || يكثف وقتاً بتطهير رية المشاتل ويظهر البذار بملوح الفرمول او محلول نيزرات القفصة المركز ١ / ١٠٠ على ان لا تفوق مدة نقع البذار في المحلول ١٥ دقيقة .

١٨٣٦٣ - عُصِيْمَة مُزَوَانِيَّة

Pseudomonas angulata (S), Maladie des taches anguleuses, Feu noir (F), Angular leaf spot, Black fire (E).
وصم يكبري شديد البقع قليل الانتشار يركب البنج في الحقل بعد دخوله في الدور الثاني من شامعه || مظهره الخاريسي يقع لا قياسية الحجم . مزوانية الشكل ، موداه



عصية مزوانية

اللبن، خلية اللحاء. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات. نصلها ايليجي الشكل، سنن الحافة، خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها عابية اللون، ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٥ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّة *

Potentilla pulcherrima (S). *Potentilla superba* (F). عشبة معمرة تملو من ٣ الى ٥٠ سم. ساقها منتصب. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات. نصلها ابيض الصفرة السفل، اغضر العليا. ازهارها الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٨٣٩٦ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصُّفْيَةِ *

Potentilla argyrophylla (S). *Potentilla argyrophylla* (F). عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها السفل ثلاثية التركيب، ووريقاتها خلية البشرة، نضية اللون، ناعمة للمس. ازهارها صفراء اللون، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٧ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَبِيرَةِ الرَّوْمِيَّة

Potentilla grandiflora (S). *Potentilla à grandis fleure* (F). عشبة معمرة مبلولة تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. ووريقاتها مسنة الزام الثالث والرابع. ازهارها غنية التجميع، زنادها يحمل من زهرتين الى خمس كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة المابقة للامعة || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٨٣٩٨ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَلْبِيَّة

Potentilla fruticosa (S). *Potentilla frutescens* (F). عشبة لينة معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها خلية اللحاء طحلاد اللون. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات الايليجية الشكل. نصلها خلي البشرة، ناعم للمس، ازهارها خضية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٩ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُنْتَصِبَةِ

Potentilla ambigua (S). *Potentilla ambigua* (F). عشبة معمرة منتبسة الساق. اوراقها ثلاثية التركيب جامدة النصل. ووريقاتها الوسطى مستطيلة مسنة الزام الاخير. ازهارها فردية، طويلة الزناد، صفراء اللون. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨٤٠٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُنْتَصِبَةِ

Potentilla erecta (S). *Potentilla dressée* (F). عشبة معمرة زينة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ووريقاتها خاسية مستطيلة، نصلها جامدة الصفرة مزبر البشرة السفل. ازهارها الى الصفار الكبريتي الزاهي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٤٠١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الرَّوْمِيَّة *

Potentilla anserina (S). *Potentilla anserina*, *Herbe aux oies* (F).

عشبة طيبة معمرة مبلولة ترطب في المراتع الغلظية الرطبة. تطلو من ١٥ الى ٥٠ سم. ساقها منبسطة تفرش عند كل عقدة. اوراقها ثلاثية السفل المتقابل. ووريقاتها تعد من ١٥ الى ٢٥ نصلها خلي البشرة، غضي المواجه. ازهارها كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٨٣٨١ - عُشْبَةُ الْجَيْلِد

هي الشهيرة بالبردية، اطباها.

١٨٣٨٢ - عُشْبَةُ اخْلِيُون

هي اخليون، اطباها.

١٨٣٨٣ - عُشْبَةُ الدَّابَّاحِيْن

هي الدبابين، اطباها.

١٨٣٨٤ - عُشْبَةُ السَّعْ

نبات من القند، اطبا كرد.

١٨٣٨٥ - عُشْبَةُ الطَّحَلِك

هي الطحريقين الاسفر، اطباها.

١٨٣٨٦ - عُشْبَةُ السَّلَق

هي الزغلية، اطباها.

١٨٣٨٧ - عُشْبَةُ الْقَرَارَه

هي حشيشة القرقراء، اطباها.

١٨٣٨٨ - عُشْبَةُ الْحَمَل

هي الماتق الجبل، اطباها.

١٨٣٨٩ - عُشْبَةُ الْهَوَكَة

Herbe aux écus (F). عشبة يقال انها طيبة تدر البول. تدعى حشيشة القمر الحوكية، اطباها.

١٨٣٩٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى ، بُونْتِيْلَا، بُونْتِيْلُون

Potentilla (S). *Potentilla* (F). *Potentilla* (E). جنس نباتات عشبية طيبة مدادة معمرة من الفلوريات. انواعها عديدة. اوراقها مركبة، ازهارها مبيطة الزناد، غظطة التجميع. مظهرها يري وتضبي وبضها طيب يستعمل في عدة مستحضرات وعلاجات مقوية || اصرف انواعها واشهرها ما يتبع.

١٨٣٩١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَبْيَكَة

Potentilla speciosa (S). *Potentilla élégante* (F). عشبة زلفية معمرة تملو من ١٠ الى ٣٥ سم. اوراقها ثلاثية التركيب. ووريقاتها مزفيرة النصل المسن الحافة، الاغضر الصفرة العليا، الحلي السفل النضية المواجه. ازهارها ثلاثية او خاسية التجميع، متوسطة القند، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٣٩٢ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْيَهْدَاء *

Potentilla alba (S). *Potentilla blanche* (F). عشبة معمرة جبلية مبلولة. ساقها تحلة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها السفل خاسية او سباعية التركيب. ووريقاتها خلية النصل تمام المسن الحافة. ازهارها نورية التجميع، طويلة الزناد، بتلاتها يرتقالية القناعة والوسط، حاجية الاطراف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٣٩٣ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَدْمَوِيَّة

Potentilla aconitifolia (S). *Potentilla rouge sang*, *P. sanguine* (F). عشبة معمرة زلفية اعضاء تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها مكبية دموية اللون كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٨٣٩٤ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّة *

Potentilla rupestris (S). *Potentilla des rochers* (F). عشبة معمرة مبلولة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. تربد بين الصخور وعلى اطراف الاراضي الملاحية. ساقها جرد



عشبة القوي البيضاء



عشبة القوي الصفرة



عشبة القوي القنطرة



عشبة القوي النضية



عشبة القوي الرومية

١٨٤٠٢ - عُشْبَةُ الْمَسْك * ، أَدُو كَسَا

Adoxa moschatellina (S). Adoxe, Herbe au musc, Moscatella (F). Hollow-root, Moschel, Musk-root (E). Echtes Bismkraut, Moschus-Kraut (D). Erba del muschio, Mucacella (I).

نبات عشبي طلي، جلوسري، وحيد الجلس والفرع من فصيلة الفويات، وأوراقه قرصية الانتشاج، مركبة، مستطيلة الماعيل المنصبة، ثلاثية القنصوص، نصلها مفرد المنصبة الحولية البثرة. أزهاره نورية التجميع مستطيلة الزناد، خضابية البتلات الوردية اللون || جلوسري ولوراته وأزهاره فواحة الرائحة الطرية المسكية وهي طيبة جزيلة النفع مضادة للشيخ.

١٨٤٠٣ - عُشْبَةُ الْمَن * ، غَلْيُورِيَا (S). Glycoria (F).

جلوس نباتات عشبية من فصيلة التنبليات. أزهاره نحر ٣٠ سقفا منصبة بجواه تنبي بطا كل سقيلة. أوراقها صفيية الشكل كآوراق الخنطة. منها أنواع طافية مزروعة غنية بالمواد النشورية ومنها أنواع منتقية بألفها لمن السال الذي يذوق سنانها عند انتصاف النهار في أحر أيام الصيف فيترك عليها مادة لزجة سكرية الهضم مأكولة.

١٨٤٠٤ - عُشْبَةُ الْهِنْدِيَّةِ فِي الْجَبَلِ الْعَلِيِّ ، اَطْلِيَا .

١٨٤٠٥ - عُشْبَةُ بَرِّيَّةٍ فِي الْأَرَالِيَا الْعَالِيَةِ ، اَطْلِيَا .

١٨٤٠٦ - عُشْبَةُ حَمْرُوكَ فِي أَبُو غَلَامَ ، اَطْلِيَا .

١٨٤٠٧ - عُشْبَةُ مَقْدَسَةٍ فِي الْقَيْسِيْنَ ، اَطْلِيَا .

١٨٤٠٨ - عُشْبَةُ هِنْدِيَّةٍ فِي الزَّيْنِ ، اَطْلِيَا .

١٨٤٠٩ - عُشْبِيٌّ ، حَشِيشِيٌّ (F). Herbaceous.

تمت تسميته يطلق على النباتات ذات السوق اللينة التي تكون صلابها دين صلابة النباتات اللينة.

١٨٤١٠ - عُشَّة

الشج : الشجرة النيقة القصبان المنطرة .

١٨٤١١ - عُشْقَار * ، اَسْتَارْتَا (S). Astarte, Astarté (F). Astarte (E).

جلوس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وقصيلة المشتاربات. أزهارها المربعة ٢٠ منها النائرة والماصرة . الماصرة منتشرة في جميع بحار البلاد القاروة || أصدانها صلبة ، يكثر لها الشكل السيلوي . مصاروبها متساوية الأطراف ، دقيقة التسنين الخاطري ، ويلجا تحزير طويي تحيل يستمر حتى اللنة . ماعيا ثنائية ، طليقة ، مستطيلة ، الأوابا زاهرة ، يكثر فيها الأحمر والوردي || تمشي عدوية في الروال المعمرة باللاء.

١٨٤١٢ - عُشْقَارِيَّات * ، اَسْتَارْتِيدَا (S). Astartidae (F). Astartidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم . أحليها وأزهارها قليلة العدد ، منها النائرة التي تمتد متحزباتها من الأراضي السيلورية إلى الثالثة ومنها الماصرة المنتشرة في جميع بحار البلاد القاروة || أصدانها صلبة الجسم ، صيلورية الشكل ، متساوية المصارع ، دقيقة التسنين الخاطري || أعراف أجسامها وأزهارها المشتار.

١٨٤١٣ - عُشْقَرَّة *

Dianella (S). *Dianella* (F). *Dianella* (E).

جلوس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الزنبقيات . منتبها ثنائية وبض مناطق استرالية . أوربها راقية . أوراقها متقابلة ، ثنائية الصف ، غيبية الشكل ، أبيض ، داخمة الأخضر . أزهارها حثولي التجميع . أزهارها متدة الحجم ، سداسية البتلات النبطية النجبة الشكل ، البتنية المروق . سداسية الاسدية المنصبة الأطراف || تزود للزوين . قروب في الاثربة الموصلة الاندماج للوراة العناصر الغذائية والنشورية || أشهر أنوارها المعروفة الأرابية التالية :

١٨٤١٤ - عُشْقَرَّة تَسْمَانِيَّة *

Dianella caesarea (S). *Dianella de Tasmanie* (F). نوع من العشقة . منتبها جزيرة تسمانية . تملو من ١٢٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها تطلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم . أزهارها حثولي التجميع ، كبير الله ، كثير الفروع والقص . أزهارها إلى الزرة الزاوية . ثمارها حنية ، زرقاء اللون ، متدلة || تنويرها صلي .

١٨٤١٥ - عُشْقَرَّة زَرْقَاء * ، *Dianella caerulea* (S). *Dianella bleue* (F).

نوع من العشقة . منتبها بعض مناطق استرالية . تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها كثيرة العدد . صفيية الشكل ، تطلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم . أزهارها حثولي التجميع قليل الانفرج . قصير القنوع . أزهارها إلى الزرة المابقة الجسلة . ثمارها دبية متدلة || تنويرها يستمر من آذار إلى حزيران .

١٨٤١٦ - عُشْقَرَّة صَقِيلَةِ الْوَرَق *

Dianella laevis (S). *Dianella à feuilles lisses* (F). نوع من العشقة . منتبها بعض مناطق استرالية . تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها صفيية الشكل ، صقيلة المنصل ، شديدة الخصار ، تطلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم . أزهارها حثولي التجميع ، هريي الشكل . أزهارها إلى الزرة الساجنية . ثمارها حنية ، ليلكية اللون ، متدلة || تنويرها ديبلي .

١٨٤١٧ - عُشْقَرَّة مُنْقَعَةُ الْوَرَق *

Dianella revoluta (S). *Dianella à feuilles enroulées* (F). نوع من العشقة . منتبها استرالية . تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها صفيية الشكل ، جامدة التسج ، مالة الخفاف ، ملقة ، تطلو من ٧٠ إلى ٨٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ٨ سم . أزهارها حثولي التجميع . أزهارها إلى الزرة السيلورية . ثمارها حنية زرقاء اللون || تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

١٨٤١٨ - عُشْد * ، *Séquelle* (F). *Gang, Crew, Set* (E).

الشد ما يحل بالانسان من طة سبها مرض أصابه أو حليها جراحية أجريت له .

١٨٤١٩ - عُشْر *

Dime (F). *Tithe, Dime* (E). نوع من جزء من شرة يقطع من انتاج الأرض ويذوق إلى ولي الأمر غريبة عن الأرض .



عشبة المسك



عشبة المن



عشقة تسمانية

الزهرية رجلة مستطيلة || ازهارها يستمر من آب ال
تشرين .

١٨٤٧٨ - **عُثْرَة مَبْدُولَة *** ، **قُسُوس مُسَكَّن**
Hedera helix (S). Lierre commun (F). Hedera, common ivy (E). Gemeiner Efeu, Epheu (D). Edera, Ellera, Verna, Verola, Vite nera (I).

جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٢ الى ٣٠ م .
اوراقها لا تليسه الشكل ينقلب لها الاطليسي . مالحق
ازهارها واحدا خلية البشرة طملاء اللون . ثمارها نوية
تجمل ال السرة المابقة || ازهارها يستمر من ايلول ال
تشرين .

١٨٤٧٩ - **عُثْرُون** .
Arbre sec (F). Dry tree (E).
الشعرى هو الشجرة اليابسة .

١٨٤٣٠ - **عُثْرِيَّات ٥** .
Pyrénomycètes (F).
فضيلة لطور مجهرية تنتمي ال مرتبة الفطريات ورتبة
الزقيات تتميز بمق جانب من التكاثر او بالانقلاب بوغ
واحد من الزق وذلك بعد تمام ادراكه . اما اصنافها
بسيطة وله تكون فردية او مركبة || اجناسها وانواعها
عديدة يجسمها ثلاث عائل وهي السخاقيات والسنانقيات
والبيانيات .

١٨٤٣١ - **عُثْرِي**
Cri de l'hyène (F).
Cry of the hyena (E).
الشعرى : صوت الضبع .

١٨٤٣٧ - **عُثْرِيَّي * عُثْرِيَّي**
Agapornis (S).
Agapornis, inséparable (F). Love-birds (E).
طائر وصيد إجلس وتزوج من زنايف البهجات . موطنه
يشمل جميع مناطق افريقية الوسطى وجزيرة مدغشكر ||
يألف القفص لكنه لا يعيش الا ذكرا وانثى . تربيته
منتشرة في جميع انصار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة لانه
يشقى البرد || جسمه صغير اللد ، ذلق القلب والجناح ،
مستفاد عريض وقصير . لونه جميل الالوان المتراكبة فيه
الاسمر والاخضر والاصفر والبنفسج والقرنبي والمغفوف
والخمس والبنار الناصجة || الانثى تلدغن عشها في تجويف
جلع . حضنتها تزاوج من ٣ ال ٤ بيضات ترخها نحو
١٥ بيضا .

١٨٤٣٣ - **عُصَا اللّهُب** هو قصب اللب ، اطله .

١٨٤٣٤ - **عُصَا الرّاعي**
Houtetia (F). Crook (E).
مصا رأسها اجوف كاللمعة يستعملها الراعي لقلع الحجارة .

١٨٤٣٥ - **عُصَا الرّاعي**
هي القرد نبات بري وتربي ، اطله .

١٨٤٣٦ - **عُصَا الرّاعي الزّيناء** هي الدار ، اطله .

١٨٤٣٧ - **عُصَا هِرْمِس** هي الحلوب ، اطله .

١٨٤٣٨ - **عُصَا عُقُوب** هو القربونه السبيلة ، اطله .

١٨٤٣٩ - **عُصَاب ، مَسْوَك الرّاعي ، شُطْرَج**
Lepidium (S). Passerage (F). Dittender (E). Senf-
kraut (D). Lepidlo, Peparella (I).
جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة الصليبيات .

١٨٤٣٠ - **عُثْر**
Calotropis (S).
Calotrope, Calotropis (F). French cotton, Mudar
plant (E). Wehre mudarypflanze (D). Calocrope (I).
جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الصقلابيات . انواعه
عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنات . لحاء جلورها
مقوية ومرونة . اصلها الجزيرة وبعض المناطق الاسيوية
والافريقية الحارة || جلد عته في القاموس : « العثر
شجر فيه حراق لم يفتح الناس في ايجده مته ويحرق في
الحقاد ويخرج من زهره ريشه سكر وفيه مرارة » . وقال
ابو حنيفة : « العثر من الضياء وهو من كبار الشجر .
وله صمغ حلو وهو عريض الورق صلبا في الساء وله
سكر يخرج من شبيه وبواضع زهره » . وفي الصالح :
« وعرته نفاضة كنفاعة القناد الاسفر » || الواحدة
عشرة والجمع عثر وعثرات .

١٨٤٣١ - **عُثْرِي** يعرف باي سلام ، اطله .

١٨٤٣٢ - **عُثْرَكَة** .
Préfoliation, Vernation (F).
Vernation (E).
هي الترتيب للتعمر اي انتظام الاوراق داخل البرقة
الورقية .

١٨٤٣٣ - **عُثْرِيَّات ٥**
Circosaceae (S).
Circosacées (F). Circosaceae (E).
فضيلة نباتية ، كانوا يصورتها في التصنيف السابق
كسبب من فصيلة الاعدريات ، وهي من ذوات الفلقتين
عديدة القعالات . اجناسها اوبية وانواعها نحو ٣٦ ||
نباتاتها عشية ، منها الحولية والمعمرة والسمرة ، اصلها
بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . اوراقها بسيطة ،
متعاقبة او متناوبة . ازهارها خشوية رباعية الكثر .
ازهارها سبيل التجميع ، تاجي الايتكاز .

١٨٤٣٤ - **عُثْرِيَّي**
Décimal (F). Decinal (E).
لست تعريني يطلق على الفليات والسابات المرتكزة على
عشرة .

١٨٤٣٥ - **عُثْرَكَة**
Hedera (S). Lierre (F). Ivy (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاراليات . انواعها نحو
٦٠ جميعها ليفة خشبية عارية الخشورية . مظهرها بري
وبعضها زراعي تربي . سيقانها تتساق بواسطة افطارها .
اوراقها متعاقبة متعقبة جالدية الصل ايده . ازهارها عشوية
التجميع وعوري او ابلي الايتكاز . ازهارها صغيرة اللد
بيضاء اللون || اوراقها طيبة ويستخرج من سيقانها عصارة
صمغية مقوية وهيجية || اشهر انواعها التريينية ما لي .

١٨٤٣٦ - **عُثْرَكَة كَلَشِيد**
Hedera colchica (S).
Lierre de Colchide (F).
جنية جادسة ليفة متسلقة تطول من ٥ الى ٢٥ م . اوراقها
ثلاثية او خماسية التفصيص ، نصلها يطول نحو ١٢ سم .
ويبرز نحو ١٠ مالحق ازهارها واحدا كثيفة الحرائش
الاصفر اللون || ازهارها يستمر من تموز ال ايلول .

١٨٤٣٧ - **عُثْرَكَة كَنَارِيَّة**
Hedera canariensis (S). Lierre des Canaries (F).
جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٣ الى ١٥ م .
اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص ، كبيرة اللد ، تلبية
الشكل تعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . مالحق ازهارها واحدا
سرخسية اللد ، نجمة الحرائش الطملاء اللون . عشيقها



عُثْرَة مَبْدُولَة



عُثْرِي



عصاب عريش الورق

1٨٤٤٧ - **عُصَابَة مَعِدِيَّة**
 Suc gastrique (F).
 Gastric juice (E).
 سائل حامضي التركيب ، يحوي بعض الصفات والكولوريدات القلوية والمضخات ، يفرزه غشاء المعدة ، يصلح خاصة لحضم المواد الآسية .

1٨٤٤٨ - **عُصَابَة مِعْرِيَّة**
 Suc intestinal (F).
 Intestinal juice (E).
 سائل حامضي التركيب ويختلف متابة على المصارة المدية في حضم الطعام واستخلاص موائه الغذائية .

1٨٤٤٩ - **عُصَابَة نَوِيَّة**
 Suc nucléaire (F).
 Nuclear sap (E).
 راجع سائل نووي .

1٨٤٥٠ - **عُصَابَة**
 Balles, Ecates (F). Shell, Pod (E).
 هي مجسم الصفات والصفات التي تغصّل من الحلب عند الدّراس .



عصاة متوجّهة

1٨٤٥١ - **عَصَاة**
 Oshya (S).
 Oshya (F). Oshya (E).
 جنس حشرات من فصيلة التّهرطيات وريقة عديدات الاجنحة . انواعها المعروفة تسم متشرة في جبال البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التّسطيط ، تقطّل من ٦ الى ٩ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاضلاع . عينها بارزة . تلتقيها متوسطة القفّة . ملاسها النّكّية كبيرة . قرونها الاستعمارية خيطية ، سنّة . كواسلها مقببة الشكل . بطونها مستديرة المخرّص . احمادها تلتصّل البطن باستثناء الطرف المستدير . قوائمها نسيطة . تتميز بانفخات قوائمها الخلفية الثلاثة الضخمة . اثنائها ملونة || الحشرة الجملانة واسعة وشاحنة . اما البرقة فشكارة او فاجحة .

1٨٤٥٢ - **عَصَابِي**
 Scaré pourpré (F).
 سمكة بحرية تدعى دقة البحر ، اكلها .



عصاة

1٨٤٥٣ - **عَصَال**
 Cébélépyris (S).
 Cébélépyris, Echenilleux (F). Cébélépyris (E).
 جنس طير من الجوارث وفضيلة المذبابيات . هذه بعض مناطق البلاد الانريزية . انواعه قليلة العدد . قوته الحشرات اعصها الاساريح والبرقات ولا يصف من القار التناضجة من برّة وزارعية || جسمه متوسط القفّة . ذنبه وتاجه الريش المستطيل ، القارق الطرف . بعض ارياش اثنيتي جادة التركيب مدببة الاطراف الشاككة || ثوبه متباين الالوان . رأسه احمر . عساره الى السرة العابقة . سباله اسود . ظهوره الى الرقة الخنطية المواج . جناحاه الى السوداء الاسفم . صدره ويكّ ويؤخر ظهوره وقاعدة ذنبه الى الرقة الخنطية المؤشّة بالاسود || يدنّ عشه في الاشجار القريبة . الاثن تخفّن نحو اربع بيضات ترعيها ينشر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الاثن دون الذكر الذي يؤن لها الطعام .



عصا

1٨٤٥٤ - **عَصَاة**
 Immunologie (F).
 Immunology (E).
 علم يبحث في مقاومة الجهاز الضوي الحي لتدنيات الاوصام المختلفة .

1٨٤٥٥ - **عَصَابِي**
 Immunologique (F).
 Immunologic (E).
 تمت ترميزي يطلق عل ما هو مختص بالصاعة .

انواعه نحو ٧٠ اصنافا جمع البلاد المعتدلة الحارة . جلدورها وشية مدادة . سبها دقيقة منتصبة . اوراقها معتقة و متناقية ، نصلها سبك الصفة ، سرح البشرة . انزعارها متكرري التجميع ، طرفي الاوتكان . انزعارها صغيرة القند يضاد اللون او صفراء . حملوها غريزية . اشهر انواعه العصاب العريش الورق .

1٨٤٤٠ - **عُصَاب عَرِيش الرِّفِّ**
 Lepidium latifolium (S). Grande passerage, Moutarde des anglais, Cresson || argas feuilles (F).
 Pepperwort, Green mustard (E). Pfefferkresse (D).
 Lepidio ibride, Erba mostarda (I).
 نوع من العصاب وهو عشية برية طيبة مدمرة حيلولة في الاساكن الظليلة المشية . ساقها تلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها ثلثية الشكل . انزعارها صفراء اللون . متناقها الطيبة كثيرة وهي مفيدة لاداء الحفر ويقلل انا تنفي من الكلب .

1٨٤٤١ - **عُصَابَة ، حَوَقَت**
 Heterodon (S).
 Hétéron (F). Heterodon (E).
 جنس حيات بيوضة من فصيلة الحششيات عداوات الاخايد والصوم . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصنافها بعض المناطق الحارة من المالكين القديم والجديد و جميعها صغير القند اطولها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . اثنائها مبطقة او مبلّقة او مجذّعة بالاسود والجووي والاحمر . رؤوسها شبه عقرطية الشكل و رقيقة الخاطم . اذناها مسطقة الاطراف || قوتها الحشرات والورديات والضفادع والظنساء والقران والصفافير ويضيها || اعرف انواعها والظهورها العصابة المتوجة .

1٨٤٤٢ - **عُصَابَة مُتَوَجَّهَة ، حَوَقَت مُتَوَجَّه**
 Heterodon diadema (S). Hétéron diadème (F).
 نوع من العصابة . مبطية بلاد الجزائر والمغرب . تألف للبراري والادغال . قوتها الحشرات والورديات والظنساء والقران || جسمها يطول نحو ٥٠ سم . رأسها شبه عقرطية الشكل . ربيع الخلم . عينها صغيرتان ، ماحتان . ثوبها الى الصبغة يعلوها تمصيب اسود يمتد من الرأس الى طرف اللّنب . عصبه رأسها تمتد الى الجبهة فتبدو كالتاج . يطها الى السرة الخنطية || تتميز من الحيات المفيدة الارؤذية .

1٨٤٤٣ - **عُصَادَة ، قَرَابَة**
 Consanguinité (F).
 Consanguinity (E).
 طريقة اصطفاة خاصة باصلاح القتل او بتكثيف بعض الصفات الميزة قولها تساهل الاقارب المختبة دون مراعاة درجات اللّنب .

1٨٤٤٤ - **عُصَابَة**
 Jus (F). Juice (E).
 ما عصر من الثّار ومخلط الاعضاء النباتية .

1٨٤٤٥ - **عُصَابَة التَّبِيع**
 Jus de tabac (F).
 Juice of tobacco (E).
 نقيع اوراق التبغ وهو غني بمادة النيكوتين المتصر القلوي الثمال في التبغ . يشتمل في مكافئة الحشرات اعصها الارق .

1٨٤٤٦ - **عُصَابَة خِلَوِيَّة**
 Suc cellulaire (F).
 Cell-sap (E).

Plante volubile (F). **عَصْبِيَّة ، عَصْفِيَّة** - ١٨٤٧٣

Voluble plant, Twining plant (E).

كل نبات عارض يلتف على غيره .

١٨٤٧٤ - **عَصْبِيَّة السُّوس** هي الشَّم ، اطبخه .

١٨٤٧٥ - **عَصْبِيَّة التَّلَب**

هي المِثْرَاقِيُون المعروف ، اطبخه .

١٨٤٧٦ - **عَصْبِيَّات الجَنَاح** Neuroptera (S).

Névroptéroïdes, Névroptères (F). Neuroptera (E) Netzflügler (D).

طريقة حشرات من شعبة الحسدليات تشمل ثلاث رتب وهي سادات الاجنحة وشارفات الاجنحة وشبكيات الاجنحة . اما فصائلها وابناسها وانواعها فكبيرة العدد جميعها من الحشرات الثلاثة || تحليتها : حشرات تامة التطور مجتمعة ، اجنحتها غشائية متشابهة . رؤوسها وزناهما كبيرة للقد . استطاعها قارضة . ارساغها خاسية العقل . ملاسها الشعرية جذعة . رقائقها مفرطة قوة التأثير .

١٨٤٧٧ - **عَصْبِيَّة الأَجْنَحَة** Névroptère (F).

Neuropteral (E). هي كل حشرة تنتمي الى طبقة عصبيات الجناح .

١٨٤٧٨ - **عَصِيد** Sperme animal (F).

Animal sperm (E).

المعد هو التليغ اي افراز اللقد للتناسلية عند ذكور الحيوان .

١٨٤٧٩ - **عَصْر ، عَصْرَة ، عَصْرَة**

Expression, Pressurage (F). Expression, Pressing (E). هو كبس الشيء لاستنزاف مصاره .

١٨٤٨٠ - **عَصْر** Epoque, Période (F).

Epoch, Period (E). أنه من الزمن .

١٨٤٨١ - **عَصْر الجليد** Période glaciaire (F).

Ice age (E).

١٨٤٨٢ - **عَصْر العَنَب** Foulage (F). Fulling (E).

بحق العنب واستخراج مصاره . ومنهم من قال هرس العنب .

١٨٤٨٣ - **عَصْر حَجَرِيّ** Age paléolithique,

A. de la pierre taillée (F). Palaeolithic age (E). هو للزود الطراني ، اطبخه .

١٨٤٨٤ - **عَصْفُوس ، عَصْفُوس** Coccys

طرف اللب وقد شاع اسناده الى طرف ألية النعم . ج صاصص .

١٨٤٨٥ - **عَصْف ، قَرْف** Ecimage (F).

Topping, Pollarding (E).

اقتطاع بعض فتن النبات انصها الفتن الهامة . ومنها تكون الناية من المصنف اقتطاع الاثمار فهو الخصى .

١٨٤٨٦ - **عَصْفَة** Pame (F). Blade (E).

ورقة الزرع وبظم النباتات التجيلية . ج صصف .

١٨٤٨٧ - **عَصْفَة الخَمَر** Bouquet (F). Aroma (E).

ريح الخمر . يقال ان الخمر صفة مستحبة .

١٨٤٥٦ - **عَصَب** Nerf (F). Nerve (E).

هو الوحدة التي يتكون منها الجهاز العصبي في الجسم الحيواني . وظيفته تنظيم وتكوين عمليات الجسم والسيطرة عليها واغضاضها الى مختلف اجسامه . ج اصصاب .

١٨٤٥٧ - **عَصَب** Nervure secondaire (F).

Secondary nerve (E).

هو في اوراق النباتات الوعاء التنسي الواصل ما بين الفرق والثريران . اما ترتيب اوعية الورقة فهو غلب فرق وصعب وثريران || والصعب في روائش بعض الحشرات يحتل المرتبة الثانية بعد الفرق .

١٨٤٥٨ - **عَصَب**

الصعب ضم اخر تراه في الاقن عند غلب الشمس . يقال صعب الاقن اي اخر .

١٨٤٥٩ - **عَصَب** راجع اسطرافالوس نلوس .

١٨٤٦٠ - **عَصَب** Bistournage (F). Castration (E).

طريقة في الحصاد تقتل فيها حيال الحصى ولا تسلفقتصر وتتلاني .

١٨٤٦١ - **عَصَب بَصَرِيّ** Nerf ophthalmique (F).

Ophthalmic nerve (E). هو الصبب المختص بالبرصر .

١٨٤٦٢ - **عَصَب حَرَكِيّ** Nerf moteur (F).

Motor nerve (E). كل صعب اختصاصه الحركة .

١٨٤٦٣ - **عَصَب حِسِّيّ** Nerf sensorial (F).

Sensory nerve (E). هو الصبب الذي ينتمي الى جهاز الحس .

١٨٤٦٤ - **عَصَب حَنَجرِيّ** Nerf laryngé,

N. laryngien (F). Laryngeal nerve (E).

كل صعب نحاس بالحنجرة .

١٨٤٦٥ - **عَصَب رِئَوِيّ** Nerf pulmonaire (F).

Pulmonary nerve (E). الصبب المرتبط بالرئة .

١٨٤٦٦ - **عَصَب سَمْعِيّ** Nerf acoustique (F).

Acoustic nerve (E). الصبب الخاص بجهاز السمع .

١٨٤٦٧ - **عَصَب سَنَجيّ ، عَصَب نُجْرُوِيّ**

Nerf alvéolaire (F). Alveolar nerve (E).

الصبب الخاص بنخاريب الانسان .

١٨٤٦٨ - **عَصَب شَمِيّ** Nerf olfactif (F).

Olfactory nerve (E). الصبب الخاص بجملة الشم .

١٨٤٦٩ - **عَصَب عَصْدِيّ** Nerf brachial (F).

Brachial nerve (E). الصبب الخاص بالبرص .

١٨٤٧٠ - **عَصَب قِرحِيّ ، عَصَب مُخِيّ**

Nerf crânien (F). Cranial nerve (E).

الصبب الخاص بالجسم .

١٨٤٧١ - **عَصَب مُبْعد** Nerf abducteur (F).

Abducent nerve (E). كل صعب اختصاصه الابعاد .

١٨٤٧٢ - **عَصَب بَصَرِيّ** Nerf optique (F).

Optic nerve (E). الصبب المختص بالبرصر .

١٨٤٩٨ - **عُصْفُورٌ** هو نمرط الصباغين ، اطليه .
Uriner (F). To urinate (E).
عسل الكلب والقاتب : بال .

١٨٤٩٩ - **عُصْفُورٌ** Oiseau (F). Bird (E).
قال حزة : سمى عصفورا لانه يصي وفر . والعصفور اسم
شامل لجميع الطيور الصغيرة لقدم . الاثنى صفورة والجسج
عصائير . قال الشاعر :

« كصفورة في كنف طفل يسومها
سبحان الردى والطفل يلهو ويلعب »

١٨٤٩٠ - **عُصْفُورُ الثَّيْنِ** Bec-figue (F).
اسم شائع يطلق على بعض العصائير من أكالات ثنتين
كأبي قلنسوة وغيره .

١٨٤٩١ - **عُصْفُورُ الْجَنَّةِ** هو الخفاف ، اطليه .
١٨٤٩٢ - **عُصْفُورُ الشَّوَلِ** Prunella (S).
Accenteur (F). Accenteur (E).

جنس عصائير صغيرة اللون من الجواثم . أنواعه قليلة العدد
اكثرها الى الصلحة تدبر وتسر وتزهر وتنبع مع مختلف
الانواع . اصغرها منسقة بالابيض . اجنسها موشة
بالاسمر . مناقيرها دقيقة قوية . ارساغها حبيبية الجلد .
قوتها الحشرات والهورام والبرزور البرية . ا لحرف انواعه
واشهرها ما يلي .

١٨٤٩٣ - **عُصْفُورُ الشَّوَلِ الْجَنَّتِيِّ** Prunella collaris (S). Accenteur alpin, Pagot (F).

طائر آبد طولوه نحو ١٨ سم . يتنمير بتجميع جناحه ويباض
عنه وطرف ذنبه . يألف الجبال . قوته الحشرات والهورام
والسناكب والديدان والآبار النووية الحرجية ويزور البساتين
البرية اصغرها الشوك الى يثمن في الارض وبين خثايف
العصفور . الاثنى تتنوع من ٥ الى ٦ يبيضات على مرتين
في السنة تحضنها بتغذية الذكر من ١٣ الى ١٤ يوما .

١٨٤٩٤ - **عُصْفُورُ الشَّوَلِ الصَّغِيرِ** Prunella modularis (S). Accenteur moucheté, Ac. mouchet, Mouchet chanteur, Traine-bulison (F).
Hedge-sparrow (E).

طائر آبد طولوه نحو ١٥ سم . ثوبه عادم البياض تملوه
مشعة صناعية وتزين اسمر . يألف الحدائق والادغال
والسيابجات واحراج الصنوبر والتنوب . قوته الحشرات
على اختلافها والبرزور البرية والفراولة . يثمن في
الادغال والاشجار الفتان . الاثنى تضع من ٥ الى ٦ يبيضات
على مرتين في السنة المرة الاولى في ايار والثانية في تموز .
الحسن يدوم من ١٣ الى ١٤ يوما وقته يشترك فيه الذكر .

١٨٤٩٥ - **عُصْفُورُ قَارِي** Oiseau-souris (F).
طائر يدعى الخنثور ، اطليه .

١٨٤٩٦ - **عُصْفُورُ مَائِي** Oiseau-diamant (F).
طائر من فصيلة الصرديات يدعى رنقش ، اطليه .

١٨٤٩٧ - **عُصْفُورٌ** Organe copulateur (F).
Copulatory organ (E).
شوار ذكر كل حشرة مجنحة واخصها الجراد .

١٨٤٩٨ - **عَصَلٌ** Scorpiole (F). Scorpioid (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله شكل ذنب العقرب
بالانتواء والتحمين .



عصفور الشوك الجبلي



عصفور الشوك المصري



عصاة الشرق

١٨٥٠٤ - **عَصَلَةٌ بَحْرِيَّةٌ الْوَن** Rhododendron fulgens (S). Rosage éclatant (F).

شجيرة سبروتية كبيرة لقدم تملوه من ٣ الى ٦ اشجار . ساقها
قرعاء فتاه . اوراقها بيضيه الشكل ؛ نصلها يطول نحو
١٣ سم . صلحت البليا غشيرة اللون ماله اما الغسل
فحنطية ندية وقلية . نوربها تقسم من ١٥ الى ٢٠ زهرة
اروبوانية اللون ، زاهية المواج ، صغيرة لقدم . ا زهرارها
يستمر طوال شهر ايار .

١٨٥٠٥ - **عَصَلَةٌ بَحْرِيَّةٌ الْوَن** Rhododendron hypoglucum (S). Rosage glauque (F).
جنبة سبروتية جميلة للشكل تملوه نحو ٣٠٠ سم . ساقها
وفروها قليلة الزغب . اوراقها اعليجية تطول من ٥ الى
٧ سم . نصلها جامد الصلصة ، اطراف البشرة ؛ بحري
الخصفر . نوربها صبروانية الشكل تقسم من ١٠ الى ١٦
زهرة متوسطة لقدم لونها الى البياض الباهي تملوه نمشة
سمره . ا زهرارها يستمر طوال شهر ايار .

من ٣ الى ٤ سم. صفحت العليا لمساء البشرة خضراء اللون . صفحت السفلى خلية ، فلسية ، خضراء المواجه . نوربًا خفيفة الشكل عديدة الازهار الصغيرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. لونها الى الياض الناصع || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٥١٣ - عَصَلَة صَفْرَاء

Rhododendron lutescens (S). *Rosage jaunâtre* (F). جنبة صبروتية اللد تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة اوراقها سنائية ذرية . نصلها يطول نحو ٦ سم. صفحت السفلى طلاء اللون ذهبي الحراشف المبشرة . نوربًا تقص من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر من شباط الى اذار .

١٨٥١٤ - عَصَلَة صَوْبِيَّة الزَهَب

Rhododendron lanatum (S). *Rosage laineux* (F). شجرة صبروتية تملو من ٢ الى ٦ اثمار . ساقها ورفوها واثانها كثيفة الزغب المستطيل العمودي الشكل . اوراقها اعليجية مقطوعة . نصلها يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وهو خالي البشرة على صفحته . نوربًا تقص من ٦ الى ١٠ اثمار لونها الى الصفار الباهت تملو بمشة خراء . ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٨٥١٥ - عَصَلَة عَطِرِيَّة

Rhododendron fragrans (S). *Rosage parfumé* (F). نجلة صبروتية تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة . اوراقها صفيرة اعليجية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، اصفر السفلى الفلسية الحراشف . نوربًا طليقة تقص من ١٢ الى ١٥ اذرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. رزها مستحب الرائحة لونها الى الصفار الباهت || ازهارها يدم طوال شهر نيسان .

١٨٥١٦ - عَصَلَة قَاصِرَة *

Rhododendron calophytum (S). *Rosage superbe* (F). شجرة صبروتية جميلة الشكل المزدني المقطوع . تملو من ٨ الى ١٥ م. عروقها واثانها مسرة . اوراقها سنائية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى ، زغبه ليد التجسيم ، اصفر اللون . نوربًا تقص من ٥ الى ٧ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم. لونها الى الحمرة القاتية الزاهية || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

١٨٥١٧ - عَصَلَة كَرْوَلِينِيَّة

Rhododendron carolinianum (S). *Rosage de la Caroline* (F). جنبة صبروتية متوسطة اللد تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها غروبية الشكل قصيرة البقعة المنببة . نصلها يطول من ٥ الى ٧ سم. صفحت السفلى خلية البشرة طلاء اللون . نوربًا تقص من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الودي الالاع المواجه || ازهارها يستمر من ايار الى سبزان .

١٨٥١٨ - عَصَلَة كَلِيفُورِنِيَا

Rhododendron californicum (S). *Rosage de Californie* (F). جنبة صبروتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها سنائية ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. نصلها اطحل الصفحة

١٨٥١٦ - عَصَلَة جَرَبِيَّة

Rhododendron campanulatum (S). *Rosage campanulé* (F). شجرة جاحدة تملو من ٤ الى ٥ اثمار . اوراقها بيضبة الشكل مستديرة الطرفين . نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم. وهو اخضر الصفحة العليا اطحل السفلى . نوربًا كبيرة اللثة ، كثيرة الازهار الجرسية . قطر الواحدة منها يراوح بين ٢ و ٢ سم. لونها الى الالبيض يطلو موجه ليكي وستار اخضر || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٥١٧ - عَصَلَة خَمَلِيَّة

Rhododendron villosum (S). *Rosage velu* (F). شجرة صبروتية صغيرة اللد تملو من ٥ الى ٦ اثمار. ساقها ورفوها مالة للحاء . اثانها واثانها اوراقها طلية . اوراقها بيضبة الشكل مقطوعة القفاحة ، مذهب القفحة . نصلها خالي البشرة على صفحته طوله يراوح بين ٥ و ٨ سم. نوربًا تقص من ٣ الى ٥ اثمار كبيرة اللد لونها الى الحمرة البنفسجية || ازهارها يستمر طوال الربيع .

١٨٥١٨ - عَصَلَة ذَهَبِيَّة الزَهَر

Rhododendron aureum (S). *Rosage jaune d'or* (F). نجلة صبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة ، رزها للحاء . اوراقها سنائية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. نصلها فلسي الصفحة السفلى . نوربًا تقص من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٢ سم. لونها الى الاخضر الذهبي الجليل || ازهارها يديمي .

١٨٥١٩ - عَصَلَة رَعِيَّة

Rhododendron maximum (S). *Rosage élevé* (F). شجرة صبروتية جميلة الشكل شاملة الاستعمال التريبي . تملو نحو خمسة اثمار . اوراقها خفيفة ذرية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحته . نوربًا حلقة الشكل ، حللية الزناد والمالين والالاع ، حلدية الازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونها الى الودي يطلو توش اصفر ومشة خراء ومشة خضراء . ازهارها يستمر من ايار الى سبزان .

١٨٥١٠ - عَصَلَة زَيْتُونِيَّة الْوَرَق

Rhododendron oleaeifolium (S). *Rosage à feuilles d'olivier* (F). نجلة صبروتية متوسطة اللد تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها فضي اللون اخضر الحار . نوربًا تقص بفض الازهار الودي ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم. ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٥١١ - عَصَلَة سَمِرْنُوف

Rhododendron Smirnowi (S). *Rosage de Smirnow* (F). جنبة جاحدة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها سنائية مذببة تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها اصفر القسطم ، ذات الحروق ، خالي الصفحة السفلى ، مالى العليا الزاهية الاخضر . نوربًا تقص من ٣ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٣٠ و ٨ سم. لونها الى الودي يطلو موجه ليكي || ازهارها يستمر طوال شهر سبزان .

١٨٥١٢ - عَصَلَة صَغِيرَة الزَهَر

Rhododendron micranthum (S). *Rosage à petites fleurs* (F). جنبة صبروتية صغيرة اللد تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورفوها غليظة . اوراقها سنائية الشكل ، نصلها يطلو



عَصَلَة قَاصِرَة

الشكل، ليد الارتكاز. تكثر في المروج وفي منظم الأراضي الرطبة من أقاليم البلاد المتحدة.

١٨٥٢٦ - عَصَافَةُ الرُّوجِ *



عصاة مشكة

Phleum pratense (S). *Piéole des prés*, *Massacca*, *Timothy* (F). *Cat's tail*, *Herd's grass*, *Timothy grass* (E). *Timotheeschrysz*, *Timotheegrass* (D). *Codolina*, *Foco del prati*, *Erba di Timoteo* (I).

لشجر أنواع العسوية وأصنبا علفاً وأورثا إنتاجاً جيد في المراعي بالاشتراك مع الفحل ويختلف النباتات القزنية. يرغب في الأقاليم المعتدلة والأترية الجبلية الرطبة المنخفضة والانتعاج. تشبه الصفات تتعلم بالأوراق والقمم.

١٨٥٢٧ - عَصَافُ ، عَصَافُ *Juteux* (F). *Juicy* (E). كثير العسور أو الرب.

١٨٥٢٨ - عَصَافُ ، عَصَافُ *Moët* (F). *Musc* (E). سائل سكري يستخرج من بعض الفلر كالمنب والفتح ، الخ.



عصاة الروج

١٨٥٢٩ - عَصَافُ الحَصِيرِ *Verjus* (F). *Verjuice* (E). عصير حب الثوب في طوره القشوي المغمسي. يستعمل في تحميص الثريات السكرية وفي صناعة الخردل. وقد يضاف لك العسر التزويد حوضتها لو دعت الحامية.

١٨٥٣٠ - عَصَافُ الدُّبِّ هو القلب الفلاح ، أطليه.

١٨٥٣١ - عَصَافُ الدَّنِّ *Cuvée* (F). *Tubful* (E). هو ما يستخرج البذن من عسور.

١٨٥٣٢ - عَصَافُ *Ligularia* (S). *Ligulaire* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المريكبات. أنواعه كثيرة العدد ، منها منظم اصقاع العالم. سقفا فردية متصصة تنمو بالأزهار. أوراقها جلدية الانتعاش كبيرة القلعة. أزهارها وريشي التركيب سبلي أو مفردية للتجميع. قنابات ثلاثية وسيدة الصف || يرغب في المواقع الرطبة والأترية المنخفضة التركيب الحكي || أعرف أنواعه وأشهرها ما يجمع.



عصاف الحجاب

١٨٥٣٣ - عَصَافُ الحجاب *

Ligularia divorum (S). *Ligulaire des coqueux* (F). نوع من العصاف للممر. ساقه زياة مفردة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه شبه مستديرة الشكل طولها نحو ٥٠ سم. وبزهرها ٤٥ سم. أزهارها حشركلي التجميع. وريشاته الزهرية كبيرة القلعة حشلية الإقراص يرتقالية اللسان، قناتها براوح بين ٩ و ١٢ سم || تنوره يستمر من آب إلى أيلول.

١٨٥٣٤ - عَصَافُ بَحْرِيّ القِنِّ *

Ligularia glauca (S). *Ligulaire glauque* (F). نوع من العصاف للممر. ساقه سرسة تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه قلبية الشكل تطلو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. نصلها باهت الحضار سميك الصفعة. أزهارها سبلي التجميع وريشاته الزهرية ذهبية اللون || تنوره يستمر طوال شهر تموز.



عصاف بحري القن

١٨٥٣٥ - عَصَافُ سِيرِيَّة *Ligularia sibirica* (S). *Ligulaire de Sibérie* (F). نوع من العصاف للممر. ساقه سرسة تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه كبيرة القلعة تطلو نحو ٤٠ سم.

السل ، اخضر العليا ، تخزن النسيج . نوريتها تنم من ٢ إلى ٧ أزهار ، قطر الواحدة منها براوح من ٥ إلى ٦ سم. نوريتها إلى الإرجواني المنش بالقزوي || أزهارها يستمر طوال شهر أيار.

١٨٥٣٩ - عَصَافَةُ مُسْتَدِيرَةِ الرُّوجِ

Rhododendron rotundifolium (S). *Rosage à feuilles rondes* (F). جنبة سبروتية تملو نحو ثلاثة أمتار. أوراقها مستديرة الشكل قلبية القاعدة تطلو نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ١١ نصلها بحري الصفعة السفلى ، اخضر العليا. نوريتها تنم من ٨ إلى ١٢ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. نوريتها إلى الوردية الزاهي || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٨٥٤٠ - عَصَافَةُ مُشْرَكَةٍ *

Rhododendron hirsutum (S). *Rosage hérissé* (F). بجلة عسوية القلعة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. مالها ورفوها دقيقة. أوراقها بيضيه الشكل ، مقعولة القاعدة ، مدينة المشاكلة. نصلها على البشرة تطلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. لوله إلى الحضار الزاهي. نوريتها تنم بفسف الأزهار الصغيرة القلعة الوردية اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٨٥٤١ - عَصَافَةُ مُلْتَبِجَةٍ

Rhododendron ambiguum (S). *Rosage ambigu* (F). جنبة سبروتية كبيرة القلعة تملو نحو ٣٠٠ سم. انتعاشها ضمية الانتعاش. أوراقها أحليجية الشكل ، نصلها تطلو من ٥ إلى ٧ سم. بشرته بجلة الحضار اللامع تملوها نمشة خفيفة سمراء. نوريتها تنم من ٥ إلى ١٥ أزهار جرسية الشكل ، كبيرة القلعة ، قطر الواحدة منها نحو ٥ سم. نوريتها إلى الحضار اللينوني || أزهارها يستمر طوال شهر نيسان.

١٨٥٤٢ - عَصَافَةُ مُشْتَكَاةٍ

Rhododendron insignis (S). *Rosage remarquable* (F). بغيرة جادة عسوية الشكل تملو من ٣٠ إلى ستة أمتار. أوراقها سنائية تطلو من ٨ إلى ١٢ سم. نصلها جميل الحضار اللامع البشرة. نوريتها تنم من ٨ إلى ١٠ أزهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٤ و ٥ سم. نوريتها إلى الأبيض الموشح بالوردية || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

١٨٥٤٣ - عَصَافَةُ مُهْدَبَةٍ

Rhododendron ciliatum (S). *Rosage cillé* (F). بجلة كبيرة القلعة سبروتية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها سنائية الشكل ، خفيفة النصل ، مدينة الزام الأخير ، طولها نحو ٥ سم. صفحتها العليا ناعمة البشرة الاخضر اللون. صفحتها السفلى غدية ، مبرقعة ، مهدبة ، طحله اللون. نوريتها تنم من زهرتين إلى ست أزهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٤ و ٥ سم || أزهارها يستمر طوال شهر نيسان.

١٨٥٤٤ - عَصَافُ *Vent violant* (F). *Strong gale* (E). عَصَافُ

الصوف والعصاف الربيع الشديدة.

١٨٥٤٥ - عَصَافَةُ ، ذَيْلُ القِنِّ

Phleum (S). *Piéole*, *Phéole* (F). *Cat's-tail grass* (E). جنس اعشاب مرعوية برية وزراعية من فصيلة النجيليات ، أنواع المعروفة ١٠. بعضها شائعة. سقفا دقيقة متصصة. عصفها سنائي مستطيل. أزهارها سنائي التجميع ، اسطواني

ذهيما الحلقة المطوقة بالابيض . زعنفتها الظهريه مستطيلة قاطبة . زعنفتها الخشبية خط من المناخس اللويه . زعنفتها القبلية حلالية الطرف || لحها متوسط الصنف ، مأكول .

1٨٥٤٥ - عُصْبَاكَة ، أَلْبَيْدَاد Alidade

جهاز التشخيص يستعمل في الملساة وهو مركب من مسطرة لها مصوّتان شاقوليتان موجهتان بالتوازي مع حافة طرفها .

1٨٥٤٦ - عُصْأَر Loranthus schimperii (S).

نوع من الحاصل يزرع للزّين . راجع حصال .

1٨٥٤٧ - عُصَاة

النضار: كل شجر يعظم وله شوك . وما صغر من شجر الشوك فهو الغص . وما ليس بغص ولا عصاة من شجر الشوك ، فالشكامي والحلاوي والحاذي والكتب والساج . الواسعة عصاة وضّية .

1٨٥٤٨ - عُصَاكَة Organisme (F).

هي الجهاز الضوئي الذي يميز الاجسام الحية من الجاهل .

1٨٥٤٩ - عُصَايِي ، مُعْتَقِي ، مُعْتَوْن

Organisé (F). Organie (E).

1٨٥٥٠ - عُصْبُ البشب : هو المبل عند طلوع قرنه .

1٨٥٥١ - عُصْبَة * ، عُصْبَةُ الْيَسْكَار

Silphium (S). Silphe, Plante au compas, Silphide, Silphie, Silphion (F). Compass plant, Bastard chrysanthemum, Polar plant (E). Geschlitzte Tassenpflanze (D). Silfo (I).

جنس نباتات جنية زينة ممرّة من فصيلة المركبات . انواعه ١٢ ، اصلها المالح . سطفا دماغة صابرة رائحة . اوراقها خضراء زينة . ازهارها زينة التجميع . ازهارها زينة كبيرة القذ صفراء اللون . زهورها مفلطحة ومجمدة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

1٨٥٥٢ - عُصْبَة ثَلَالِيَّة الْوَرَق

Silphium trifoliatum (S). Silphe à feuilles ternées (F). جنبة ممرّة تمل من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها اسطوانية تتميز بفرازة مادتها الراتنجية . اوراقها خضراء زينة التركيب ، صفراء النصل ، طولها نحو ١٦ سم || رؤسها الزهرية متوسطة المدد قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم ، لونها الى الصفرة || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

1٨٥٥٣ - عُصْبَة رَاتِنْجِيَّة

Silphium terebinthaceum (S). Silphe térébinthacé (F). جنبة زينة ممرّة تمل من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها تتميز بفرازة مادتها الراتنجية . اوراقها خضراء زينة التركيب ، بيضيه الشكل ، قليلة القواعد ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، طولها نحو ٣٠ سم . وتقرض ١٥ سم . || رؤسها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

1٨٥٥٤ - عُصْبَة مَحْرُوقَة

Silphium perfoliatum (S). Silphe perfolié (F). جنبة ممرّة تمل من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها رباعية التضلع . اوراقها متعاقبة مدعومة الاذنين التي تبدو مقعرة كالكتب توصلها الاذنان || رؤسها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

وتقرض نحو ٣٠ . رؤسها الزهرية ذهبية اللون ، سليلية التركيب ، قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم . لسنتها ثنائية التفرع تبدو كأنها مزوجة || تنوره يستمر من تموز الى آب .

1٨٥٣٦ - عُصْبَيْف كَبِير الْوَرَق

Ligularia macrophylla (S). Ligulaire à grandes feuilles (F).

نوع من العصيف الممر . ساقه زيا تمل من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه احليجية الشكل طولها من ٤٠ الى ٥٥ سم . نصلها الى الخضار الازرق المالح . ازهاره سليل التجميع ، رؤسها الزهرية كبيرة القذ ، عطية الاقراص ، صفر السنتات || تنوره يستمر من تموز الى آب .

1٨٥٣٧ - عُصْبَيْف يَابَانِي Ligularia japonica (S).

Ligulaire du Japon (F).

نوع من العصيف الممر . ساقه سرط تمل نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القذ سباحية او تساعية التفرع . نصلها طابق اخضر سبك الصفرة . ازهاره عشوي التجميع . رؤسها الزهرية صفر الاقراص ، حر السنتات ، كبيرة القذ ، قطرها نحو ٩ سم || تنوره يستمر طول فصل الصيف .

1٨٥٣٨ - عُصْبَيْفَة Glume (F). Husk, Chaff (E).

قناة تحيط ببنتية النجيليات وما عصيفتان لكل سنيلة .

1٨٥٣٩ - عُصْبَيْفِيَّة عَصِيْلِيَّة في البها ، اعطبا .

Sclerospora (S).

جنس فطور مجهرية من عماره السنتيات وضعية السنتيات . يتميز بقصر خيوطه البنية وقلة تشعبها وكبر بيضيات واستدارة مرافقها || انواعه الممرقة قليلة اشهرها عصيل النجيليات .

1٨٥٤١ - عُصْبَيْف النجيليات *

Sclerospora graminicola, S. macrospora (S).

فطر مجهرى من العصيل يتميز بلسودا يبيضاته الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نحو ٦٠ مي . || تركيب شرائف الحنطة والذرة وقد يتعداها الى الازرار . ظهوره الحادوي سقم واصفرار ثم تبقي اتصال وقد يؤدي الى الجسنة وانعاص الازرار .

1٨٥٤٢ - عُصْبِيْم Feuilles des arbres (F). Leaves (E).

العم : هو ورق الشجر .

1٨٥٤٣ - عُصْبَا ، عُصْبِي Lotir (F).

To divide into lots (E).

قسم الارض الى عدة حصون .

1٨٥٤٤ - عُصْبَايَة لَيْفِيَّة *

Lapidopus argentatus (S).

Lépidope argenté, Argentin (F). Argentine (E).

سمكة بحرية مقعرة يبيض من فصيلة السيفيات شائعة الزمان . اصلها اقراص ونفاق البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم كمثل السيف يطول نحو ١٤٠ سم . لونها الى الازرق بعلها موج ودي وشقة فضية تتخللها نقط ذهبية . رأسها وظهورها امبق خضابا من ابطلها وبطنها || رأسها شبه اسفين الشكل مستطيل الطول . شفتها كبير . اسناتها كبيرة القذ منها الثابتة والمسرعة والذرية والمنعقة || ميناها كيرتان



عصيل النجيليات



عصاة فضية



عصبة

وفلسطين . يكثر قرب الحقول المزروعة والبراريات . ياتمس قوته في النهار . جسمه دهليز قسيمة عديدة الانفاق يتجزئ فيها ما استطاع من حورب .

Muscle

١٨٥٦٦ - عَصَلَة
جسمه نسيج عضوية ليفية تتميز بنفاستها الانقباضية والانتفاضية . تقسم عضلات الجسم الحوياني التي يبرف عنها بالجهاز العضلي الى ثلاثة اقسام : قسم العضلات الارادية او العضلات الخطة التي يسيطر عليها الجهاز العصبي فتنتفخ وتنقبض بشكل الارادة . وقسم العضلات غير الارادية او العضلات للماء اي غير الخطة وهي التي لا تأتمر بالأارادة كعضلات الجهاز الهضمي والأوعية الدموية . قسم قسم عضلات القلب وهي من العضلات الخطة الارادية التي تتميز باستمرار الحركة طوال الحياة .



مضروط

١٨٥٦٧ - عَصَلَة بِاسِيَة Muscle extensor (F).
Extensor muscle (E).

١٨٥٦٨ - عَصَلَة بَطْنِيَة Muscle abdominal (F).
Abdominal muscle (E).

١٨٥٦٩ - عَصَلَة جَنَاحِيَة Muscle alaire (F).
Alary muscle (E).

١٨٥٧٠ - عَصَلَة حَاجِيَة ، عَصَلَة كَامِيَة Muscle corrugateur, Sourcilier (F).
Corrugator muscle (E).

١٨٥٧١ - عَصَلَة حَرْقِيَة Muscle iliaque (F).
Iliacus muscle (E).

١٨٥٧٢ - عَصَلَة عَدِيَة Muscle malsaire (F).
Malaris muscle (E).

١٨٥٧٣ - عَصَلَة ذَاكِرِيَة Muscle circulaire (F).
Circular muscle (E).

١٨٥٧٤ - عَصَلَة رَاكِيَة Muscle releveur (F).
Levator muscle (E).

١٨٥٧٥ - عَصَلَة قَرْجِيَة Muscle anal (F).
Anal muscle (E).

١٨٥٧٦ - عَصَلَة صَدْرِيَة Muscle pectoral (F).
Pectoral muscle (E).

١٨٥٧٧ - عَصَلَة عُدِيَة Muscle temporal (F).
Temporal muscle (E).

١٨٥٧٨ - عَصَلَة عَامِرَة Sphincter

١٨٥٧٩ - عَصَلَة مَذَاة ، عَصَلَة مُبَدَاة Muscle protractor (F).
Protractor muscle (E).

١٨٥٨٠ - عَصَلَة مُبَعِدَة ، عَصَلَة قَابِيَة Muscle abducteur (F).
Abductor muscle (E).
عضلة مبعدة عضواً عن محور الجسم .

١٨٥٨١ - عَصَلَة مَخْطَطَة Muscle strié (F).
Striped muscle (E).

هي كل عضلة في الجسم يسيطر عليها الجهاز العصبي فيسير انتفاضا وانتفاضا .

١٨٥٨٢ - عَصَلَة مَذَارِيَة ، عَصَلَة مَلَاغِي Muscle orbiculaire (F).
Orbicular muscle (E).

١٨٥٥٥ - عَصَلَة مُشَرَّمَة Silphium laciniatum (S).
Silphe laciné (F).

جنية معمرة تعلق من متر الى مترين ساقها حلوية غشقة . اوراقها لافحة متعاقبة دائمة الاتجاه نحو الشمال . نصلها مشرق الصفة ، تشريحه يبلغ الضلع || وريستها الزهرية كبيرة القذ ، ثقلها يراوح بين ٨ و ١٢ سم . لها الى الصغار الكبريتي الزاقي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٨٥٥٦ - عَصَلَة Lot
هي الحصة او السهم او النصيب وهي القطعة من الشيء او الجزء منه : ج عضون .

١٨٥٥٧ - عَصَلَة Emondage (F).
Pruning, Lopping (E).
تقليم الفروع والاضبان الكبيرة التي تثبت على السوق .

١٨٥٥٨ - عَصَلَة Bras (F). Arm (E).
من اعضاء قوائم الدواب الامامية . ج اعضاء وأضد .

١٨٥٥٩ - عَصَلَة زُنْدِي ، عَصَلَة مِرْقِي Brachio-cubital, Huméro-cubital (F).
Humero-cubital (E).

١٨٥٦٠ - عَصَلَة كُغْبَرِي ، عَصَلَة كُغْبَرِي Huméro-radial (F).
Humero-radial (E).

١٨٥٦١ - عَصَلَاتُ الْاَرْجُل Brachipoda (S).
Brachipodes (F). Brachipoda (E).

شعبة من صف الشيا الهيداني .

١٨٥٦٢ - عَصْرِي Guimauve officinale
هو الخبيز اخضر زهره قاني الحمرة تسود منه جملات اللقوب اذا اكثله .

١٨٥٦٣ - عَصْرُوط * Calotes (S).

Calote, Lézard-artequin (F).
جلس عظام من فصيلة الحردنيات . اناؤه ٢٥ اصطانا البلاد الحارة الاسيوية . تتميز باستطالة اذنانها البتيفة وبقدورها على الاستطوان (الماتنة) || تألف الاذغال والنايات والحراج . قوتها الحشرات .

١٨٥٦٤ - عَصْرُوطُ مِلَان * Calotes varicolor (S).
Calote varicolore, Lézard-artequin varicolore (F).
Versicolour calotes (E).

حيوان يبيض من لطفاء وفصيلة الحردنيات شارات الانسان ، مكسبات الالسة ، ورياضيات القوائم ، خناصات الاصابع || جسمه يطول من ٢٧ الى ٤٠ سم . ثوبه الى اليردة الخنطية تلوها رقة سمراء . قوته جمدة بالاسمر . وهو كسائر انواع جنسه يتميز بالشدة فياثن المحيط الذي يوجد فيه || ياتلف الاذغال والحراج المبصرة الانجار . يعيش ذكراً واثني من اواسط الربيع حتى اواخر الخريف .

١٨٥٦٥ - عَصَل * Psammomys obesus (S).
Psammomys obesa (F).

حيوان لين قافص من فصيلة القاربات . وسيد الجنس والنوع . شكله شكل الجرذون ، طوله نحو ١٩ سم . وذنبه ١٤ ، ثوبه الى اليردة الصهباء . موطنه دبال مصر وسيناء



مضروط ملوان



مضل

البرية تستغرق ٢٤ ساعة و ٥٠ دقيقة . اما دورته الفلكية حول الشمس تستغرق نحو ٨٨ يوماً || يقال ان حجمه لا يفوق بطن من جرم الارض وهو يرى دائماً مغشوراً بنور الشمس نظراً لقربه منها . ويقال انه لا يوجد حول سطحه غلاف جوي وان حرارته تبلغ نحو ٢٥٠° مع || اما المتجملون فيدعونه منافقاً لكونه مع السد سداً ومع الناس نحساً .

١٨٥٩٩ - عَطُوف هو التاردين الاقليبي ، اطبه .

١٨٦٠٠ - عَطُوط * Telophorus (S).

Télophore (F), Telophorus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجوارثم مشروبات الخاتير وفضيلة الصرديات . اصطناع تمت من افريقية الجنوبية الى الاستوائية والشرقية . وهو من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجئه الحيائي زبجي الا في زمن التقطاع . قوته الحشرات والوديات الصغيرة والبروزر والثار || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . منقاده مستدل الجرم . ضليح . جناحاه متوسطا القد . ذنبه مستدل الطول ، مستدير الطرف . ثوبه الملوي الى الخضار الالاس ، اطراف ابطاهه واطراف رقاله الى الحمرة الاريموانية . ثوبه السفلي ، من الفزور الى الافنيك ، احمر القين صناعي المربع . منقاده جهوري . ريشاه واصابعه الى * السرة القائمة || يدثن عشه في الاشجار الرقيقة . الاثني تحضن من ٤ الى ٦ بيضات . التريشم يشر نحو ١٥ يوماً تقوم بها الانثى دون الذكر الذي يثمن لها الغذاء والحماية .

١٨٦٠١ - عَطُاسِي * Faunistique (F), Faunistic (E).
كل ما له صلة بالعلم وبالحيوانات الداجنة في كورة معينة .

١٨٦٠٢ - عَطُاس ، عَقُص Tanin (F), Tannin (E).
مادة حامضة قابضة توجد في النسجة بعض النباتات . حصرها الفعال يدعى الطان . والطمان يختار من المغويات الطبية الصنية وهو يستعمل في الدبابة .

١٨٦٠٣ - عَطُوب هو القطع ، اطبه .

١٨٦٠٤ - عَطُوب ، عَطُوبُ النلية الطويلة المتق .

١٨٦٠٥ - عَطُر Essence (F), Species, Attar (E).
سائل طيار طيب الرائحة يكون بحالة شيفات في خلايا النبات او في قوتلها وبيورها الخاصة .

١٨٦٠٦ - عَطُر هو البهون المر ، اطبه .

١٨٦٠٧ - عَطُر القنداح ، دهن القنداح ، نيرولي Neroli (F), Neroli (E).
عطر يستعمل عليه من تقطير زهر التارنج الذي يدعى قداساً .

١٨٦٠٨ - عَطُر جَعْدِي هو الحيازة الجسدية ، اطلبا .

١٨٦٠٩ - عَطُوف Vipère (F), Viper (E).
الانثى الكبيرة القد .

١٨٥٨٣ - عَصَلَة مَرْقَبَة ، عَصَلَة قَالَة

Muscle adducteur (F), Adductor muscle (E).
عضلة مرقبة مضوا الى محور الجسم .

١٨٥٨٤ - عَصَلَة مَقْتَصَة Muscle constrictor (F), Constrictor muscle (E).

١٨٥٨٥ - عَصَلَة مَسَاء Muscle lisse (F), Skin muscle (E).
هي العضلة غير الخططة التي لا تؤثر فيها الإرادة او الجهاز العصبي .

١٨٥٨٦ - عَصَلَة هَدِيَّة Musc ciliaire (F), Ciliary muscle (E).

١٨٥٨٧ - عَصَمَكُورِي Micro-organisme (F).
هو كل كائن حي متناهي الصغر . ويدعى قفطور ، اطبه . اما كلمة عصمكري فن وضع المجمع العلمي في مصر . ج . عصمكريات .

١٨٥٨٨ - عَفُوف Organe (F), Organ (E).
جزء من كائن مركب ، ويوجد له لازم او ضروري . ج . اعضاء .

١٨٥٨٩ - عَفُوف التَلَكِيح ، عَفُوفُ Organe copulateur, O. de copulation (F), Copulatory organ (E).

١٨٥٩٠ - عَفُوف سُبَاكِي ، عَفُوف وِدَاكِي Organe carotide (F), Carotid organ (E).

١٨٥٩١ - عَفُوف شَمِي Organe olfactif (F), Olfactory organ (E).

١٨٥٩٢ - عَفُورَة Fissiparité (F), Fissiparism (E).
المضوة والتضفية ، التناسل بالاتقسام الى شطرين كما هي الحال عند الاولاي والكتيريات .

١٨٥٩٣ - عَفُورِي Organique (F), Organic (E).
نمت تعريف توصف به اعضاء والاجسام والمواد المضوية من اي فئة كانت .

١٨٥٩٤ - عَقِيد Effouillure (F), Stripping off the leaves (E).
ما انتزع او اسقط من الورق .

١٨٥٩٥ - عَقِيدَة * Palmette (F), Palm-shaped (E).
شكل من اشكال تقلم الاشجار المشرفة .

١٨٥٩٦ - عَقْ Fente longitudinale (F), Longitudinal slit (E).
العد : الشق طولاً . انعطاف الخشب : الشققة طولاً .

١٨٥٩٧ - عَقَار Strombus lantiginosus (S).
نوع من الدلاع يكون منه انظار الطيب .

١٨٥٩٨ - عَقَارِد Mercure (F), Mercury (E).
كوكب سيار من الخس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي وهو اقربها من الشمس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء تبلغ نحو ١٩٩٥٠٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية



عَصِيد



عَطَا

Tige volatile (F).
Volatile stem (E).

هي الساق التي تنطف وتلتف حل دعامتها .



عُطُوف نَتَاق

Vrille (F). **عُطُوفَة ، حَالِيْق ، لُزْبِيْة**
Yendril (E).

ورقة تحولت الى حرق لين التركيب اسطويلى الشكل ، مستطيلة ، يمكن الثبات من التقلص والتقلص كما في الكروية وغيرها .



عُطُوب

Aetophorus imperialis (S). **عُطُوفُور**
Aetophore imperial (F).

حشرة ذاتة من فصيلة السلكيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألفت المقاصب والمناقص التي يكثر فيها الاصل لانها تعيش على المواد النباتية المتحللة تحت التقيب والاصل المطروح ارضا . جسمها مستطيل الشكل ، مغطى الجرم ، بطول نحو ١٢ سم . زياتها غيلاني . كويلها منزلي الشكل . ثوبا الى الصفرة الصنابية المواج بملها في ظهورها خمس نقط سود . ظهورها لا يلحف كامل الجسم .

Hédéracé (F). **عُطُفِي ، تَبَلَاي**
Hederaceus (E).

نمت ترميقي توصف به السوق النباتية اللدادة او اللسلفة الليلية الشكل .



عُطُود

Otolithus (S). **عُطُوط**
Otolithe (F). **عُطُوطِيَة**

جنس اسماك بحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصلها بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد ، مستطيلة لذلك الاسفل ، مقعرة الزعانف الظهرية الشائكة ، عمودية التيلية . الثوبا الى الجلود بملها مواج اخضر يثير عنه البطن ويسمر في الظل . لحوبها جيدة الصنف مغروبو لها .

Faune (F). Fauna (E). **عُطُ**
انظم هي مجموعة حيوانات كورة او قطر او حبة جيولوجية .



عُطُور

Faune abyssale (F). **عُطُ لُجِيَّة**
Abyssal fauna (E).

مجموعة الحيوانات البحرية على اختلاف رتبها وعضائها وابتناسها التي تعيش في المناطق العميقة من البحر .

Faune aquatique (F). **عُطُ مَاقِيَّة**
Aquatic fauna (E).

مجموعة الحيوانات المائية التي تعيش في منطقة بحرية عاصة او معينة .

FaunIQUE, FaunIQUE, **عُطُفِي**
FaunIQUE (F). FaunIC (E).

نمت ترميقي يطلق على ما هو خاص بالعلم .



عُطُيط

Milieu climatique naturel (F). **عُطُن**
Natural habitat (E).

هي البيئة المناخية الطبيعية الخاصة بالحيوان او النبات ج اسطان .

١٨٦١٠ - **عُطُوف نَتَاق** * ، **بَحَاغ** ، **بَرَاقِي**
Sedodon haemachata (S). Cobra cracheur, Haemachata, Serpent cracheur (F).

حية سرلودة سامة من العظوفات امانيات الاخاديد مشهورة بقلقت معها مع العلم في وجه من تميزه مهاجرا . جسمها متوسط الشخانة بطول نحو ٦٥ سم . ثوبا الى الصفرة الخفيفة المواج بملها من عنقاها الى طرف ذنها تجتمع جميع جلوي متعرج وسطوط دقيقة متكررة ومتضاربة سوداء اللون . رأسها لوزي الشكل . عنقاها مستطيلة ، عيناها مستديرتان قزميتان . عدد اسنانيا ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و٢٦ في الاصل من اصلها عقاقطان امانيات دريتان لامتزكتان . بيابها الشتوي يستمر نحو حبة اشهر . تبلغ كامل نموها بمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة . تعتبر من الثعابين الشديدة الاذى .

Ectropius (S). **عُطُوفُور**
Ectrople (F). Ectroplus (E).

جنس اسماك بحرية وبحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلها اغوار انهر الهند . اجسامها بيضية الشوزن ، مبطلة ، متعرجة ، بطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل ، صغيرة الاضلاع . عيونها صغيرة ناضرة . زعانفها الظهرية مستطيلة عشارية الاضلاع والمناقص الحادة تقابلها الشرجية المائلة شكلا وقدا . الحوضية صغيرة مزوانية والبطنية كذلك . الذيلية مستعرضة مقطعية . اذنيها الى انصار البحرية يملو تجتمع متعرج بنسجي اللون . ونها انواع مرقوشة بالقضي واخرى فضية البطن . لحوبها مأكولة مغروبو فيها .

Erythrurus (S). **عُطُورْد**
Erythrure (F).

جنس صغافير صغيرة القد من الجروام مخروطيات الشاثير وفصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الفزابع . ملجها الحياتي جماعي اسرابها تمد اكثر من مة زوج . اجسامها صغيرة مكنكة قريبة الشبه بالنوري الا انها قصيرة الاذناب المقنونة . اذنيها الى الكعبة بملها مواج اخضر او اشقر . بطونها الى القنرة . ونها نوع ثلاثي الالوان الزاخرة يكثر وجوده في غابات تيمور .

Chloranthe (F). **عُطُورُور**

جنس نباتات جينية وعشبية معمرة من فصيلة الطورديات . انواعها المعروفة عديدة اصلها بعض المناطق الاستوائية والحارة من القارة الاسيوية . اوراق زانها جميع الاتواح عطرية العرف المسحب . وينهم من استعمل الازراق استعمال التنوع والشاي .

Chloranthaceae (S). **عُطُورُورِيَّات**
Chloranthacées (F). Chloranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلظن عديدات القمالات مرتفعات المنبس . اجناسها وانواعها عديدة فيها الاشجار والشجيرات والنباتات والاشواب . اصلها المناطق الاستوائية والحارة من الهند الى جزر المحيط الهادي الى اسركية الجنوبية . ثوبا اوراقها بسيطة متعرجة . اذناها سبيلة التسجع . ثامها لوزية ، متدلية ، صغيرة التيط الملوخ بملقة آمية متسكة . اشهر اجناسها الطورود والاسكرين .

مختلفة الأسياح والالوان ، تطلب فيها الاستعانة والاشكال المتسجمة والالوان الخضر النحاسية الالامه || جميعها مفيدة صغيرة قوتها الحشرات والحوام .

١٨٩٣٦ - عَظَامِيَة الحَيَظَان

Lézard des murailles (F).

هي حمية الحيطان ، اطليا .

Lézard vert (F).

١٨٩٣٧ - عَظَامِيَة خَضِرَاك

هي حمية خضراء ، اطليا .

Lézard agile (F).

١٨٩٣٨ - عَظَامِيَة رَشِيكَة

هي حمية رشيقة ، اطليا .

Lézard vivipare (F).

١٨٩٣٩ - عَظَامِيَة وَلَوْد

هي حمية ولود ، اطليا .

Azara microphilia (S).

١٨٩٤٠ - عَظَر

Azara à petites feuilles (F).

شجيرة برية ورديتين من فصيلة التوتيايات . مهددة بالحدوث ، ساقها غراء تملو من ٤ الى ٦ م . فروجها متعاقبة الكثيف ، ساقها غراء تملو من ٤ الى ٦ م . فروجها متعاقبة مزدوجة التوتيايات . اوراقها ابيدة متعاقبة معتقة صغيرة القد تطلو من ٢٥ الى ٣٠ م . تصلها جامد الصفة ، رمي الشكل ، سنن الحافة . ازهارها عطرية العرف ، صغيرة القد خضراء اللون ، محورية الارتكاز . ثمارها غنية ، برتقالية اللون || تنموها يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

١٨٩٤١ - عَظَل

هو الوصمة ، نبات عشبي من الصليبيات . وهو اسم عدة صيغيات ذرق انحصار الوصمة والنبات ...

١٨٩٤٢ - عَظَلِيم

هو غرطر الصفاين ، اطليا .

Os (F), Bone (E).

١٨٩٤٣ - عَظَم

نسيج شام صلب يتكون منه الهيكل العظمي الحيواني وهو مركب من اربع طبقات : - (١) الطبقة الخارجية المرونة بالسماق وهو غشاء ليفي غالف - (٢) الطبقة القشرية الشديدة الصلابة - (٣) الطبقة الداخلية الهشة المعروفة بالانفجيرية - (٤) الحافة وهي المادة البنية التي تملئ شجيرات الطبقة الانفجيرية ومن اسماها الرم والتملي . والنظام تتعمل في عدة صناعات اهمها صناعة الاسنة القصورية كما تدخل في غذاء الحيوان والطير .

Os spongieux (F).

١٨٩٤٤ - عَظَم اسفنجي

Spongy bone (E).

Fémur (F).

١٨٩٤٥ - عَظَم الفخذ

Femur, Thigh-bone (E).

اقوى عظام الجسم واسهلها ، يتألف من العظم الطويل يحده من طرفه الاصل الدور وتوابعه ومن طرفه الاصل فتو ، الفتحة او الفتحة .

Bréchet (F).

١٨٩٤٦ - عَظَم القَص

(E) Breast-bone

هو الجوشور ، عظم صدر الطير .

Scapulum (F).

١٨٩٤٧ - عَظَم الكتف ، عَظَم لَوْرِي

Calcaneum (F).

١٨٩٤٨ - عَظَم الكَعْب ، عَظَب

Heel-bone (E).

Echusa (S).

١٨٩٢٦ - عَظُوز *

Echusa (F), Echusa (E).

جنس دوبيات بحرية من قشريات عشاريات الابريل قصار الليل فضيلة اللباليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطيا عبار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها ينج لا تقرب الشطوط الا في زمن التسرع || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، متراكبة للتويات المدية الاطراف . تتميز بالانجاس القرمط المويدي بين قوائمها ، زويان كبيران مستطيلان ، وزويان صغيران . ملاصقا قصيرة ، شديدة القس . حيثما دوبيية . اولياها الى الخضر الازرق تملو ساجه حراء . قوائمها الكبيرة وملصقا مطوقة بالاصفر والوردي .

Don (F).

١٨٩٢٧ - عَظِيَّة ، تَحَلَّة

هي الحبة على اختلاف اشكالها .

Androcée (F), Andracium (E).

١٨٩٢٨ - عَظِيل

هو جهاز التذكير في النبات ، واسع جنس .

Filago (S).

١٨٩٢٩ - عَظِيم *

Filago, Filago, Herbe à coton (F), Horsetail, Cotton rose cud-weed, Cud-weed (E), Schimmlkraut (D), Filago, Filonia, Camapicchio, Erba da Cotone (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات الشجريات . انواعه المعروفة لا تجوز الالبانية جميعها نباتات مجلية غرام . اوراقها عطرية . ازهارها وردية كثيفة التجميع يطولها عند الادراك زغب ابيض اللون يشبه لطف القطن . قالوا انها لا تنمو من المنافع الطبية لكنهم اهلوا ذكرها .

١٨٩٣٠ - عَظَاء

اسم تعريفي شامل يطلق على معظم الزسولات التي كلتها الى رتبة لفظيات .

Sauriens, Lacertilien (F).

١٨٩٣١ - عَظَالِيَّات

Saurians (E).

رتبة العظاء وهي حيوانات زحافة بيوضة عادمة الدم . مفترسة قوتها الحشرات والحوام . فصائلها ٢١ ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صماء الاذن ، جليزية الصدر ، رباعية القوائم او ثنائيتها او عادمها . اجسامها مستطيلة ، اجسامها حشوية ، اجناسها متحركة || اشهر فصائلها الجروديات والحربويات والحزدييات والمنجويات والحزقيات والمستقرديات والسليبيات والسويديات والهيرشويات والقافرات والقهرقيات والورليات والورقيات .

Carpe (F).

١٨٩٣٢ - عَظَم المِغْم

Carpus, Wrist (E).

Iles (F), Ila (E).

١٨٩٣٣ - عَظَم حَرَكِيَّة

le Lézard (F).

١٨٩٣٤ - عَظَامِيَة

العظامة كركية تجود شمالية المبح مركزها بين كوكبي الدجاجة والاراء المسلسلة || جميعها قليلة العدد بعضها ملون لونها من المرتبة الرابعة .

١٨٩٣٥ - عَظَامِيَة * ، صَافِيَة ، صَحِيَّة

Lacerta (S), Lézard (F), Lizard (E).

النظاية والظامة والظامة ج عطاء وظايا وظايات ، جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات . انواعه عديدة



عظيم



عظاية

18166 Saurographie, Saurologie (F). **عَفَفَنَة** °
Saurology (E).
الطبعة علم يبحث في الطائيات على اختلاف فصائلها وأجناسها.

18167 Saurographique, Saurologique (F). **عَفَفَنِيَّة** °
Saurologic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمعنة.

18168 **عَفَار**

شجر يشند منه الزناد كاللرخ. قال أبو حنيفة: «آخرني بعض الإعراب أن العفار شبيه بشجرة التبرء ونورها أيضا كنورها وهو شجر حوكر. ولذلك جاد الزناد. واحدة عفارة.»

18169 **عَفَاكَة**

Poudreuse (F). Powdery (E).
أداة خاصة تدر بولسها مختلف المساحق الحشورية والقاطورية المستعلة في مكائسة الحشرات والقطور والأصنام.

18170 Noix (F). Walnut (E). **عَفَاكَة**
المفاتيح في الجوزة للأكلية. ج. مفاز.

18171 Capsule de coton (F). **عَفَاكَة** ، **بَيْتَم**
Nut of the cotton (E).
المفازة والكنبة. ج. مفاز وكناج، ج. جراه القطن المروقة مائياً يجوز القطن أو لوز.

18172 Traitement curatif (F). **عِفَاف**
Curative treatment (E).
العفاس ج. فمسات هي العلاجات الشافية في الحيوان والنبات.

18173 Fulgula (S). **عِفَاف**
Fulgule, Nyroca, Canard plongeur (F). Nyroca (E).
جنس طيور مائية من عائلة العفافيات وفضيلة البطيات. أنواعه عديدة جميعها من القواطع. أجسامها ربة قدرها قدر الريشة الصغيرة. مناقبها مبطنة مريضة القاعة. أفراسها بلقاء اللون فيها الأبيض مع الرمادي مع الأحمر والأزرق والبنفسجي والأسود. ذكورها أكبر من أنثاهما وأكبر حجماً منها. قوتها الأسماك الصغيرة والقشريات وكل ما هو صغير. في الماء تنقبض بالطنس. وهي تغفل المياه البحرية على السطحة || تدفن في الأسر والقبس على ضفاف البحيرات. أنثاهما تضع من ٨ إلى ١٠ بيضات تحضنها وحدها من ٢٢ إلى ٢٣ يوماً.

18174 **عِفَافُ الْبَلَق** °
Fulgula marila, Nyroca marila (S). Fulgule à collier, F. milouina (F). Scamp (E).

نوع من العفاس طولها نحو ٥٠ سم. أخضر الرأس، مطوق العنق، أسود الجوز والذنب، أبيض البطن، سحلي المنقاد، أحر العين، أصفر الرجل.

18175 **عِفَافُ أَيْبَس** ° ، **عِفَافُ كَبِير**
Cangula glaucion, C. hyemalis (S). Fulgule de milouen, Garrot vulgaire (F). Several duck (E).

نوع من العفاس يطول نحو ٦٥ سم. رأسه ورؤوسه ال. اللون. سائر جسمه إلى البياض الناصع. منقاد أسود. يألف مياه المناطق الباردة والمستعلة.

18169 Ischion (F). Ischium (E). **عَظْمُ الْمَعْدَنَة**
Vomer **عَظْمُ الْمَيْكَمَة** ، **مَيْكَمَة**

18169 Os parietal (F). **عَظْمُ جِيدَكِرِي**
Parietal bone (E).

18169 Os cotyloide (F). **عَظْمُ حَقِي**
Cotyloid bone (E).

18169 **عَظْمُ حَلَزُونِي** ، **عَظْمُ مَقْنُون**
Os turbine (F). Turbinal bone (E).

18169 Os scapuloide (F). **عَظْمُ زَوْرَكِي**
Scapuloide bone (E).

18169 Os temporal (F). **عَظْمُ صُدْهِي**
Temporal bone (E). هو الجزء المحيط من عظم القفص.

18169 Diaphyse (F). **عَظْمُ طَوِيل** ، **مُشَاش**
Diaphysis (E).

18169 Os coracoide (F). **عَظْمُ فَرْأَكِي**
Coracoide bone (E).

18169 Os membraneux (F). **عَظْمُ غَشَائِي**
Membranous bone (E).

18169 Osteolith (F). **عَظْمُ مَحْتَجِر**
Osteolith (E).

18169 Ethmoide (F). **عَظْمُ مَنَحَلِي**
Ethmoid (E).
العظم المنحلي أو العظم القربالي أو العظم المنحلي هو ركيزة الأنف في الجمجمة.

18169 Os sphenoide (F). **عَظْمُ وَتَدِي**
Sphenoide bone (E).

18169 Osseus (F). **عَظْمِي** ، **عِفَافِي**
Bony, Osseous (E).
نعت تعريفي يوصف به ما هو كالعظم طبيعة أو تركيباً أو شكلاً.

18169 **عَظْمِيَّاتُ الْعَفَاف**
Télostéens (F). Téléostei (E).

صنيف من الأسماك يشتمل أكثرها. أجناسه وأنواعه عدة إلا أن جميعها ثنائيات الفصائل ونفسها خمس زنب، هي: عصفليات الحياض، شالكات الزمات، مفتحات المائنة، ملبيجات الفك، سلاوات.

18169 Osteoglossinidae (S). **عَظْمِيَّاتُ الرُّؤُوس**
Osteoglossinidae (F). Osteoglossidae (E).

فصيلة أسماك نهريّة من كاتلات النظام تكتيز برؤوسها المنحنية بمصانع عظمية المادة. أجناسها وأنواعها ثلثة العدد منتشرة في بعض أنهر وبحيرات البلاد الآسيوية والأفريقية والأمريكية.

18169 Ostéine, Ostéine (F). **عَظْمِين**
Ossein, Ossein (E). العفاس الحلاقي الموربد في العظم.



عفاس أبلق



عفاس أبيض

١٨٦٨٥ - عَفَّاصُ Bouchon (F). Stopper (E).
عمام القارورة . عَفَّاصُ : سدا بالعفاس .

١٨٦٨٦ - عَفَّافِيَّاتُ Paléodictyoptères (F).
Paléodictyoptera (E).

طبقة حشرات من شعبة السرنجيات وطائفة المجتحات أصلاً .
أنواعها وأجناسها وفصلاتها عديدة تنضم إلى ثلاث رتب
السرماطيات والزهريات والقروديات . جميعها من مخلوقات
الزمنة النادرة . أحاديثها تتناول من أواسط إلى أواخر
الابح الأول ، جميع حشراتنا كبيرة القصد وبعضها
مستفسم .

١٨٦٨٧ - عَفَّافَةُ Epiphila (S).
Epiphila (F). Epiphila (E).

جنس حشرات فراشية من فصيلة البشوريات ورتبة
حرفشيات الاجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة القصد اعطيات
بعض جبال امريكا الجنوبية || فراشاتها واثمة قوتها
رسق الاذعار البرية . اساريها خاضعة تعيش على اوراق
النبات || اجسامها معتدلة القصد طولها من ١٦ الى ٢٠ سم .
سبطها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ سم . رؤسها صغيرة ،
ملونة . عيونها نافذة ، كبيرة . قرونها الاستشعارية
صوليانية . مراشفها دقيقة . جوافها وبطنها مزينة او
خالية . جميعها ملونة . رواشها غصية متراكبة الاالوان .
معظمها يجمع الزوج الاسامي المنطق بالابيض وبعضها
يجمع الاسامي والخلفي || اعراف انواعها واكثرها انتشاراً
المقاتلة المستعينة (Epiphila dilecta) .

١٨٦٨٨ - عَفَّافُ الرَّصْع Loque, Pourriture du couvain (F). Rag, Breeding-
cells rot (E).

وصم جرثومي فتاك يصيب الملية يترى رصع النحل يفتقي
عليه || يكافح لانتفاع اقسام الخنازيب المصابة وينقل
النحل الى قدير او غلية نظيفة ويطهره .

١٨٦٨٩ - عَفَّافُ اللفة «مكة جرداء يضاء صغيرة مطبوخها كالراز» .

١٨٦٩٠ - عَفَّافُ Duodenum
الفتح : ما يتصل بالطعام اليه بعد المعدة ، وهو لسباع
كلها بمنزلة المسارين لفوات الف والفتل التي تلوي
اليها الكرش ما دفعت . ج افطاج وطعجة .

١٨٦٩١ - عَفَّافُ ، لَيْهِيْدُ Lagopède (F).
Lagopus (E).

جنس طير من عائلة الخرسيات وفصيلة الطيوريات .
انواعها ١٤ معظمها قطبي يالغ اسراج الجبال العالية .
ثوبها غطف الالوان . رأسها كاسي الريش . اجنحتها
قصيرة شبه مستدرة . اذنيها قصير مستدير يتألف من
١٤ ريشة . ارباضها كاسية شخخالها . ج عفدان .
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

١٨٦٩٢ - عَفَّافُ أَبْكَمُ Lagopus mutus (S).
Lagopède muet, L. des Alpes, L. ptarmigan (F).
Ptarmigan, Willow grouse (E).
طائر من القصد ، طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه عديد الالوان ،
دائم التغير ، يتبدل كل شهر ، تتلف فيه الصهبه والخضرة
والبياض ، قوادمه واذنيكه وباطن سقطه سود || موطنه

١٨٦٩٦ - عَفَّافُ أَشْهَبُ Nyroca ferina (S).
Fuligule milouin (F). Pochard (E).
نوع من العفاس يطول نحو ٤٧ سم . رأسه معتد الى الشبهة
المائلة ، جنيحو وذنيته الى البراد القنسي ، سائر اشهب
الجل . عيانه الى الحرة . متقاده سطلي .

١٨٦٩٧ - عَفَّافُ مَتَوَجَّعُ ، وَتَسُ Netta rufina (S). Fuligule roussâtre, Brante roussâtre,
Stiffleur huppé (F).

نوع من العفاس طوله نحو ٥٥ سم . رأسه اصهب اللون
متوشش الريش . عنقه وجنيحو ويكته وذنيته الى البنفسجي
اللامع . جناحاه الى العترة ، مناكبه ييض . عيانه
وربلاه ومتقاده الى الحرة .

١٨٦٩٨ - عَفَّافُ مَعْمَرِي Fuligula cristata, F. nyroca (S). Fuligule morillon,
Sarcelle d'Egypte (F). Tufted duck (E).

نوع من العفاس طوله نحو ٤٢ سم . رأسه اخضر اللون
اسمع للمواج . جسده رمادي التوب . جنيحو الى البنفسجي
اللامع . عيانه الى الحرة ، متقاده الطحل ، ربلاه الى الحرة
الاحتلية .

١٨٦٩٩ - عَفَّافِيَّاتُ Fuligulines (F).
عاز طير العفاس من فصيلة البليات .

١٨٦٨٠ - عَفَّافُ Ovaritis (S).
جنس فلور مجهرية من الطليسات وفصيلة الطليسات .
انواعه عديدة معظمها طفيل لا مؤذي . جرابه الكتيبي
مجداني الشكل ، فمي التجميع . كتالده فضيصة او
اهليجية . مشبهه علوي الانتساب يركب السرق والاوراق
يفرقح التلج واليشرة .

١٨٦٨١ - عَفَّافُ الْحَفَافُ ، عَفَّافُ اوبليكا Ovaritis obliqua (S).

فلور مجهرية يصيب اوراق الحفاس فيلويها || مظهر
الخارجي يقع مستديرة فسيمة قطرها من ٦ الى ١٥ سم .
تركب نصل الاوراق على صفحتها العليا . تيفر سمراء
اللون ، حراء الحالة ثم تنصرف الى السمرة الكالفة التي
يصفها اليباس .

١٨٦٨٢ - عَفَّافُ الْوَرُثُ ، عَفَّافُ كَرَرِيْ Ovaritis asphaeroides (S).

فلور مجهرية يترى وريقات الوراث فيلويها || مظهر
الخارجي يقع سم تركب النصل على صفحته العليا قديب
يباس البثرة يقابلها على الصفحة السفلى ندف غلي ،
ايض للون تفرزه المسام المويضة .

١٨٦٨٣ - عَفَّافُ الْبَيْمُونُ Ovaritis citri, O. Briosi (S).

فلور مجهرية يصيب ثمار البيمون الحافض في قشورها
فيلويها || مظهر الخارجي يقع رباعية او يضاء اللون
تركب قشرة الثمرة قبل اكثال نموها فتشوها وتصلها .

١٨٦٨٤ - عَفَّافُ التَّحْجِيلُ Ovaritis pulchella (S).
فلور مجهرية يركب اوراق التحجيل على اختلاف انواعه .
مظهر الخارجي يقع صئيرة ، مستديرة ، مبيضة ، غبراء
اللون ، تملو النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة
السفلى ندف غلي اطبل للون .



عَفَّافُ أَشْهَبُ



عَفَّافُ مَتَوَجَّعُ



عَفَّافُ مَعْمَرِي



عَفَّافُ الْحَفَافُ



عَفَّافُ الْبَيْمُونُ



عَفَّافُ التَّحْجِيلُ



عُذَّةٌ أَبَكَم

الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها شبه بيضية اللون ، طولها من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم ، قليلة التفريز ، يلمعها خلف الكويل. قرونها ناشرة. تأكلها حقلية. كولها مستقيمة - معتدلة الاحديداب. احادها لائحة - نخلة التحديد القاطب. قوائمها نطيقة. انوثها متباينة الخشب تكثر لها الحوة ثم الصمغ فالعرة || الحشرة الجملنة ناقصة - سريعة الحركة ، تألف ضفاد بجاري الماء الصلب ، خاصة الضفاد الرملية حيث تنسج بسرعة. القيرة الناجمة وبهضها خاضل.

١٨٧٠٠ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Omophronidae (S).

Omophronidae (F). Omophronidae (E).



عُذَّةٌ أبيض

فصيلة حشرات من رتبة غدييات الاجنحة - اجسامها وانواعها المرفوقة عديدة منتشرة في معظم المنطقة الشمالية وفي افريقية والهند || اجسامها شبه بيضية اللون. رؤوسها صغيرة. قرونها الاستشعارية عجيبة ، مركبة من ١١ فصلة. مقدم جونها يلفظ سطور اليريد. حلة البلورة مقوية. كولها شبه منقعة الشكل. مستقيمة القاطبة. احادها نخلة التحديد القاطب الذي يد ١٤ او ١٥ اغصداً. قوائمها نخلة ، معتدلة الطول || مكها شبه اسطوانى الشكل ، تحته افراديا في التربة. يرقاتها سلمية اسطوانى الشكل. قوائمها سداسية القليل. سوداها مرطبة تنحدر في التربة داخل رواق انثوي الشكل || تعيش على ضفاد بجاري الماء. سطم اجناسها خاضل وبهضها مفترس والقيرة كذلك لكنها لا تسرح في النهار || اشهر اجناسها المُفترسون.

١٨٧٠١ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Pulverulent (F). Pulverulent (E).

لها ويص يدل على الزغب الخمل الذي يثني بعض الاجزاء الباقية والحوارية.



عُذَّةٌ

١٨٧٠٢ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.



عُذَّةٌ

١٨٧٠٣ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

١٨٧٠٤ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

١٨٧٠٥ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

١٨٧٠٦ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

١٨٧٠٧ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

١٨٧٠٨ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

١٨٧٠٩ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات. تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية.

الجبال العالية والقمم الرقيقة. قوته الاشعاب والجذور والبرام والارواق والثمار والحبوب حل اختلافا || ينش في الخلع. اثناء تبيض من ٨ الى ١٠ يبيض.

١٨٦٩٣ - عُذَّةٌ أبيض ° Lagopus albus (S).

Lagopus albus (F). White grouse (E).

طائر من العفد ، طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع ، اياهه واذنيكه الى السمر. اما ثوبه الصيفي الرسمي فالى الصبغة والصفرة والجودة يطوى توضح اسمر ومواج اسفح || موطنه المناطق الشمالية. قوته المواد النباتية على اختلافها ويبيض الحشرات || اثناء تبيض من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بنواوبة الذكر في حش تدته في بعض الجنبات القناد دائما بانها الجنوب.

١٨٦٩٤ - عُذَّةٌ إكوكسية ° Lagopus sooticus (S).

Lagopus sooticus (F). Red grouse (E).

طائر من العفد ، طوله نحو ٣٧ سم. ثوبه الشتوي البني واحد. يكثر فيه الياض ، قوامه وياهه واذنيكه نحو السمر القسبة || موطنه شمالي انكلترا ، يأتف المنطق والبحيرات ، قوته الاشعاب والارواق والبرام والثمار والحبوب || ينش عشه في الخلع ، اثناء تبيض من ١٠ الى ١٢ بيضة.

١٨٦٩٥ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Anchomenus (S).

Anchomenus (F). Anchomenus (E).

جنس حشرات مجهرية للسرح مفترسة نافعة من فصيلة الاجنحة وفصيلة السلوكيات. انواعه المرفوقة عديدة منتشرة في سطم المناطق المعتدلة الحارة والمشرقة نحو الباردة || اجسامها صغيرة طولها من ١٢ الى ١٧ سم. انوثها مبظلمة مابقة الالوان السوية. يكثر لها الاسود والكشبي || يرقاتها مفترسة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة.

١٨٦٩٦ - عُذَّةٌ Sanglier (mâle) (F).

Wild boar (male) (E).

هو ذكر الخنزير الوحشي. ج حفار واحفار.

١٨٦٩٧ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Camall (F).

هو ريش عتق الديك وتفرق ايضاً بالبالل (Hood (E).

١٨٦٩٨ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Aphrophora corticea (S).


Aphrophora des écorces (F).

حشرة من فصيلة السركوبيات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القند وطولها من ١٠ الى ١٢ سم. || ثوبا متراكب الاسفر والخطي والاسود والالافر. رأسها حلالي الشكل ، اصفر اللون ، أسود الجبهة. عظمها لثاني الاجزاء اسود. عينها كيرتان. زباناها قصيران. كولها مبعج بالاسمر والاسود. حبيبتها صغيرة. ظهورها كامل الحنجرة ، لاسف ، ستملي اللون يطوى مبعج اصفر وزغارف بنية وسود. ووشها غشائيان. ينشها الى الخنطى الاسمر. قوائمها مبلقة || مسرهما سراج الصنوبر. تعيش بين القشور وتحتها. يرقاتها غاصلة تعيش على اوراق الاشعاب.

١٨٦٩٩ - عُذَّةٌ رُيَّاتٌ ° Omophron (S).

Omophron (F). Omophron (E).

جنس حشرات نافعة من فصيلة المفرونيات ورتبة غدييات الاجنحة. انواعه المرفوقة عديدة منتشرة في بعض المناطق



عُذَّةٌ

- 18710 - **عَفْثَةُ حَشَرِيَّة** (F). *Entomocécide*.
بثرة تشبها الحشرات عند لمسها أوراق النبات.
- 18711 - **عَفْثَةُ سَلَكِيَّة** (F). *Nématocécide*.
تفشم في لسج النبات سببه بعض الحشرات السلكية.
- 18712 - **عَفْثِيَّات** (F). *Gallicoles*.
هي الأبرات فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة.
- 18713 - **عَفْثِيَّة ، قِنْفِيَّة** (S). *Cynips*.
جنس حشرات من فصيلة الأبرات. واسع آفة.
- 18714 - **عَفْط ، عَفِط** (F). *Ebroisement*.
نثر الشاء بأنفها أو حشاش المامز.
- 18715 - **عَفَن ، عَفْنَة** (F). *Chandraseure*.
فساد من تثرة أو طبرها يصيب المأكول والبار والمسالل والجوهر.
- 18716 - **عَفِن ، مَتَعَفِن** (F). *Chanci, Mold*.
ما هو مصاب بالطن.
- 18717 - **عَفْنُوس الصَوْنَر** (S). *Aphanus pineti*.
حشرة غاشلة من فصيلة الطرائث ورتبة غشائيات الاجنحة. جسمها مستطيل الشكل ، مبطط ، يطول نحو 8 م. رأسها شبه مخروطي الشوذن ، أسود اللون. خطمها مستدل الطويل ، أسود. عيناها مخروطان. زباناها مستطيلان. كسولها ملعب النصف الخلفي ، أسود النصف الامامي ، يطوي في كل من جانبيه نقطة سوداء تاتم القاطعة. حجبها مزراية ، سوداء ، يطويها خطان طحليان. بطها أسود اللون ، أبيض الحدار. قشراتها أكبر. قوائمها مسنة الثنايب لا مسرها غابات الصنوبر. تتركب ازمار ولوراك النباتات البرية.
- 18718 - **عَفْثِيَّات** (F). *Mucorinodes*.
فصيلة فطور مجهرية من رتبة النطريات ورتبة البيضيات.
- 18719 - **عَفَر** (F). *Anon*. *Am's foal*.
ولد الحمار والأثنى عفرة. ج. عفاء.
- 18720 - **عَفْصُوس** (S). *Aphycus*.
جنس حشرات نافعة من فصيلة الثرائيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة. انزاعه المروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق البلاد الحارة. جميعها تنطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين والمرفوفيات || اجسامها مسطرة اتقد تطول نحو 1 م. رؤوسها نصف دائرية الشكل. قرونها الاستشعارية غريبة. جوافها اسطوانية. بطونها قصيرة ، مخروطية المؤخر ، مهدبة التراج. مرزاتها قصيرة. اثوابها ترازوم من الوردى الى البني. اجنتحها موهجة بالأزرق القاتح.
- 18721 - **عَفْصُوتَة** (F). *Pourriture*.
اسم شامل يطلق على عدة اوصام تصيب النبات بمختلف اعضاء سبها فطور مجهرية مختلفة.
- 18722 - **عَفِير** (S). *Amphicyllis*.
جنس حشرات من فصيلة اليبديات ورتبة غشائيات الاجنحة. انزاعه المروفة قليلة العدد اصلاها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صلبة ، محدودة ، نصف كروية الشكل ، تطول نحو 2 م. رؤوسها مستعرضة. صوبها قليلة البروز. تآثيرها يذكوها قياسية ، ملاسها الفكية قصيرة. قرونها الاستشعارية صوبانية. كواسها مستعرضة. الجحاده لاسفة. قوائمها ذبيلة ، مهدبة. اثوابها لامة يكثر فيها الجروي والامود البنفسجي المواج والكتشي الاسف || تموش على الفطور وعلى الاعتشاب السائرة الى الانحلال.
- 18723 - **عَفِين** (F). *Ptomaline*.
عنصر قلوي التتركيب ينجم من انحلال المواد العضوية. ج. حشبات.
- 18724 - **عَفِي** (F). *Jauge*.
سفرة مستطيلة في الارض توضع فيها الفراس المقلوعة من المشتل ريثما تدرس في مستورها.
- 18725 - **عَقَاب** (F). *Halgia*.
العقاب كوكبة نجم شمالية الميخ. مركزها بين كوكبة حور وسبة وكوكبة الدلجين. عدد نجومها 15 اشهرها «البشر» او «النسر الغائر» الذي يولجسه النسر الواقع من كوكبة القيثارة. نجم «الشاهين» و «ذئب العقاب» و «انور الظليين» في ذئب العقاب.
- 18726 - **عَقَاب** (S). *Aquila*.
جنس طير من الكولاس وفضيلة السمقرقيات يشغل اقل الجوارح واحدا واحدا بأسا وأيسها مزاجا واحدا بصرأ وارسها طرائقا || انزاعه حدبية جميعها مسرورة ، قوية الخالب الحادة ، قصيرة الناصر ، بحجة البهائر اللرية. تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا مضها الجوع. تدن اركانها في قم الجبال بين الصخور الناتئة او في قنات الانجهار البسقة. انائها تقع من وقتين الى اربع رنات تحضها وحدا نحو 6 اسابيع || قيل فيه : العقاب سبه الطيور والنسر حريقها. كنيته ابو الاشيم وابو الحجاج وابو حسان وابو الدهر وابو الحيم. والاثني ام الحواح وام الشمور وام طلبة وام لوح. من اسمائها : سهم لقرة وعقار منرب || اشهر انواعه ما يتبع :



مثيل

١٨٧٣٨ - عقاب مُسَيَّرَة ، عقاب البادية ، خُدَّارِيَة

Aquila pennata, A. minor, A. nipalensis (S). *Algue botté, A. nain, A. des stappes* (F). *Steppe eagle, Booted eagle* (E).

طائر من العقاب الصغيرة لونه ، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١٢٠ وهو أبيض السطحين والظهر والذنب ، أبيض المنكبين والصدر والرجل || أصلها البلاد الحارة والمعتدلة يحويها باستمرار وهو لا يفرق الأسراج الكثيفة والبادية لكنه لا ينظم من ورود مجاري للذ || والعقاب المسيرة تألف الحيلة الجمادية سرها يراوح بين ثلاثة وتسعة أزواج . تصيد القوامش والبرقش والقرزور والفرغ . أثناء تحضر مرة واحدة في السنة من وفنتين إلى ثلاث وفنات.



عقاب ذهنية

١٨٧٣٩ - عقاب مؤزَّرة

في السويد ، طائر من العقاب ، اطلها .

١٨٧٤٠ - عقابية . *Biogenèse* (F). *Biogenisis* (E). نظرية بيولوجية تأسس النظرية القائلة بالتنازل الذاتي . عودها أن كل كائن حي يتولد من كائن حي آخر .

١٨٧٤١ - عقابدة . *Insolubilité* (F). *Insolubility* (E). صفة الاشياء التي لا تنحل .

١٨٧٤٢ - عكَّار هو اسمر ، اطلها .

١٨٧٤٣ - عكَّار ، عَيْن ثَابِتَة

Immeuble, Bien-fonds (F). *Real, Real property, Estate* (E).

في مال لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته أو بخصيصه والأعيان الثابتة تصنف إلى أربع فئات : || الأولى : الأموال الثابتة بطبيعتها وهي التي لا يمكن نقلها من مكانها بحكم طبيعتها كالأرض والشجر والمنازل || الثانية : الأموال الثابتة بالخصيص وهي بطبيعتها أعيان متحركة إلا أن مسلحها الحقها بين ثابتة فأصبحت لقوانين صفة الثبوت . الثالثة : الأموال الثابتة بالانقضاء أو بالتصليب وهي حقوق تنصب حل من ثابتة غير حق الملكية || الرابعة : الأموال الثابتة بقرار المالك وهي حقوق متحركة يفرض عليها مسلحها صفة الثبوت مجازاً بقراره .

١٨٧٤٤ - عكَّار مُرْتَقِق *Fonds dominant* (F). العقار المرتفق أو المضمون هو الذي يتفرض من الارتفاق .

١٨٧٤٥ - عكَّار مُرْتَقِق بِهِ *Fonds servant* (F). العقار المرتفق به أو الخادم هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر .

١٨٧٤٦ - عكَّار

العقار : عشية ترتفع قدر نصف القامة وقره كاليندق وهو عضو البيت ولا يأكله شيء حتى أنك ترى الكلب إذا لايه يموي ، ويسعى عقار ناعمة . وتامة امرأة طبعته ربيد ان يقبض البليغ بناتلته فأكلته فقلها (السان) .

١٨٧٤٧ - عكَّارِي *Foncier* (F). *Landed* (E). كل ما له صلة بالعقار كالصرف العقاري والقصرية العقارية الخ .

١٨٧٣٠ - عقاب البادية

في العقاب المسيرة ، اطلها .

١٨٧٣١ - عقاب البحر

في الموريتانيا ، سمكة من الشفنيات ، اطلها .

١٨٧٣٢ - عقاب البحر الجفَّاعَة

Mourine commune (F).

في الموريتانية للملولة ، سمكة بحرية ، اطلها .

١٨٧٣٣ - عقاب الفخ

في القسيطة الثالثة ، اطلها .

١٨٧٣٤ - عقاب ذهبيّة * ، عَجَزَة ، لَمَاعَة

Aquila fulva, A. chrysaetos (S). *Algue doré, A. royal, A. ferve* (F). *Golden eagle* (E).

طائر من العقاب وهو أجملها قدراً وأضخمها حجاً وأندما بأسا وبسطاً . طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطه مقنطه نحو ٣٠٠ سم. لونه إلى الصبغة الخطية يطولها توشح اسمر . رأسه مغطى ذهبيا الريش . أما باطن مقنطه فذهبي البياض . زيكاه كدراء اللون . ذنبه إلى الصبغة الاسمر يطولها تجميع متفرس || تألف الجبال الشاهقة للنبهة ، تثنى وكها في صدره الصنوبر الثابتة أو في أمالي الاشجار الكبيرة الباسقة . أثناء تبيض مرة في السنة نحو ثلاث وفنات تحضها وحدها نحو ستة أسابيع || وهي تصيد كل ما دب وطار واستطاعت إليه سيك . وقد تفضل الشفولة والبول والمعزاة وأحلب ثم الثعلب والكلب والقرزور والسنور . لكنها لا تنف من البيل والارباب والسمور والقتلذ والقتان والفرغ وأحلب الخ .

١٨٧٣٥ - عقاب رَحْمَاء في الرخاء ، اطلها .

١٨٧٣٦ - عقاب سَعَّاعَة * ، عَجَز الأَرَب

Aquila clanga, A. naris (S). *Algue criard* (F). *Spotted eagle, Rough-footed* (E).

نوع من العقاب كبير الجف ، طوله نحو ٧٢ سم. وبسطه مقنطه تفوق ٢٠٠ سم. توشه إلى السمر الموشحة يطولها مولج اسمر يزيد على اسوداداً || أصلها امال القدم وهي من الطيور الآتية التي لا تهجر حليها إلا عندا شتداد الحر في ابلان الصيف لتعود إليه عند قدوم الشتاء كما تألف مجاري الماء وترطب في الاماكن الرطبة || أثناء تحضر وفنتين مرة واحدة في العام وحضها يفوم ستة أسابيع . وهي من الطيور الثالثة الواجب حمايتها لأنها تقضي حل جميع القوامش والزناجات بما فيها الاناعي .

١٨٧٣٧ - عقاب قَيْصَرِيَّة * ، عَجَلَة ، عَجَابِيَّة مَلَك المَعْيَان

Aquila imperialis, A. heliaca (S). *Aigle impérial* (F). *Imperial eagle* (E).

طائر من العقاب كبير الجف ، طوله يراوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. وبسطه مقنطه من ٢٤٠ إلى ٢٦٠ سم. توشه أصدا الصبغة ، اسفر المولج . ذنبه متجاسق الريش يطول توشح مريض لا يقابل الشكل والحجم || وهو من القوامش التي تجرب الما . يألف الأسراج والسهول ولا يخشى الاماكن الأكلة . يفتن وكته في فنان الاشجار الرطبة أو في صدوح الصنوبر النابتة . أثناء تحضر وسبعما مرة في العام من وفنتين إلى ثلاث وفنات || يصيد الارابل والياور والثعلب وكبير الطير ويقضي حل جميع القوامش من أي نوع كانت.



عقاب سَعَّاعَة



عقاب قَيْصَرِيَّة

الشكل . أذنابها مجدانية . أثوابها مبقعة تكثر فيها الكلبة الصفراء يملؤها تنقيج أخضر بنفسجي المواج .

18754 - **عَقَان** ، **مَلَخ** (F). Dragon (F). Sucker (E).
قضيبي ينمو من برعة عرضية ناشقة على أرومة أو جذل بعض النباتات الملقحة .

18755 - **عَكِب** (F). Calcanéum (F).
هو مؤشر القدم .

18756 - **عَقَب** (F). To vary or rotate (E).
رتب الزراعات الحقلية على طريقة دورية تماثلية وفقاً للمواعيد خاص يعرف بالدورة الزراعية .

18757 - **عَقَبَان** (F). Algues, Aquilans (F).
Eagles, Aquila (E).
عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ثمانية أجناس وهي العقاب والهوك والنس والتففة والدلفون والبعق والبيضة والسرنيث . جميعها كبيرة الجثة قوية المنسر الجالس الانتصاب الاسمين البهرة الشديدة الانعكاف الحادة الطرف .

18758 - **عَكِيي** (F). Calcanéen (F). Calcanéal (E).

18759 - **عَكِي** (F). Biogène (F). Biogen (E).
نمت ترميمي يطلق على ما يحدث الحياة أو ينشأ الخصائص الحيوية ويهضها .

18760 - **عَقِصَة** ، **عَقِصَة** (F). Variété (F). Variety (E).
هي القرب ، أطلبه .

18761 - **عَقْد** ، **قَوْس** (F). Cintre (F).
Arch, Curve (E).
هو القوس الخشبي الذي يستعمل لبناء المقعد عليه وهو البناء على شكل قوس .

18762 - **عَكِيد** (F). Trachelospermum (S).
Trachelosperme (F).
جنية عارضة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقها متعاقبة معتقة ايضاً . نصلها يفي الشكل ذرب الزايم الاخير يطول نحو ٧ سم . ويبرش ٤ . وهي طيبة نائمة تلحم المرحج بصرته ويدين زائل || ازهارها يهض اللون ، عرقية الرائحة ، حلقية التجميع ، تاجية الارتكاز . ثمارها جراء اسطوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم . زورها مستقيمة القنطرة البورية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

18763 - **عَكِد** (F). Nouaison (F).
راجع انتقاد . هو في النبات بدء تكوين البزرة بدء اتصال البويض البيضية أي بدء اخصابها .

18764 - **عَقْد** ، **عَمَل** ، **تَصَرَّف** (F). Acte (F). Deed (E).
هو الابانة التي تنشأ آثاراً قانونية وقد صار تدوينها في وثيقة كتابية تثبت صحتها .

18765 - **عَقْد** (F). Contrat (F).
المقد والتمتاق هو توافق الإرادة بين اثنين أو أكثر على انشاء التزامات فيما بينهم .

18768 - **عَقَاصَةُ الْعَنْبِ**

هي أدويس الكربة ، أطلها .

18769 - **عَقَاصَة** (F). Dent canine de la vipère (F).
Canine tooth of the viper (E).

هي التيب المدية الطرف ، الانبوية أو المتحدة التي تستعملها الأفعى لبع السم . ج عقاف .

18770 - **عَقَاصَةُ الْوَرْد** (F). Argyploce ochroleucana (S).
Argyploce du rosier, Tordeuse du rosier (F).
Argyploce ochroleucana (E).

حشرة من فصيلة الفانلات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأدنى الى اوروبا . فراشها صفة تميش على غزونها الاماني . سرقتها خافضة تميش على اوراق الورود بعد ان غطقتها بوشاح من التماس . جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ٨ سم . يستطاع قنارح من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدل الحجم ، صغير الخطم ، للشهب اللون ، سيوري المواج . عيناها زرقائتان ، صغريتان ، نازرتان . زياتها غيظيان . ملاسها الفكية والقفوية صغيرة . مرشها جعدة . جوشها ويطنها الى الشبهة . روشتها الاماميان الى النحلة الزائرة يملوها تجنح اشهب تكتنفها ماجة زرقاء . روشتها الخلفيان الى الشبهة السوداء احداها صافية || لها جيلات في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر نيسان وفراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار . والاني تلقى المكان مباحداً او لقطاً صغيرة وتربة المدد تفلها مادة غريبة تقبها على الصفحات العليا من نصال الازوار || بالور الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثمانية اسابيع ويستمر في الجيل الثاني نحو ١٧ اسبوعاً ويتغذى على الازوار التي تغتنفها السرقعة وتميش في داخلها على الخشب والصمارة || السرقعة عند الادراك التام تطول نحو ٢٠ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستطيف الوسط ، اخضر اللون ، اصفر المواج ، يملو في كل سكة من سكم البطن طوق من التورق السيد الخشبة بالهلب . رأسها وذوقها الصغرية الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٠ اسبوعاً ويتغذى ضمن وثقة مفتوحة كالبق ، وشبكة بخيوط حريرية المادة .

18771 - **عَقَاق** ، **عَقَق** (F). Gestation (F).
Pregnancy (E).
المَعَقَّ والمَعَقُّ : الحمل عند الحيوان عامة وعند ذوات الحافر خاصة . والحامل من ذوات الحافر تدعى المَعَقَّق ج عَقَق وعَقَقاق .

18772 - **عَقَاقِير** (F). Drogues (F). Drugs (E).
ما يتناول به من الادوية . وقال الجوهري : العقاقير اصول الادوية .

18773 - **عَقَام** (F). Piaturus (S).
Piature (F). Piaturus (E).
جنس حيات خبيثة سامة من اساميات الاغاديد وفصيلة الهيدرويات . ازواؤه المعروفة قليلة المدد اصطناعها بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مبطلة مستطيلة ، تطول من ١٢٠ الى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة شبه مخروطية



عَقَاقَةُ الْوَرْد



عَقَام

18779 - **عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ** (F). **Contrat à titre onéreux**

هو ما أخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما أُعطى .

18780 - **عَقْدُ الرِّعْدِ ، مَتْرُوعُ الْعَقْدِ**

Avant-contrat (F). Advance contract (E).

هو الاتفاق اللفظي المنقذ مع تحديد المسؤولية المتقاة
على تحقيق الاتفاق للقول .

18781 - **عَقْدُ الرُّكَالَةِ ، تَوْكِيلٌ ، وَكَالَةٌ**

Mandat (F). Mandate (E).

عقد يُعْطَى به المرء غيره أن يدل به باسمه شيئاً له . أما صيغ
الوكالة فمفيدة منها العامة والخاصة والصريحة والضمنية
والتفريعية والتبائية .

18782 - **عَقْدُ بَيْعٍ تَامِيٍّ**

Contrat pignoratif (F). Pignorative contract (E).

عقد القراض على شكل البيع بالوفاء ببيع به المقرض
مقارناً إلى المقرض ولكنه يحفظ بمجازة المقارن البيع وبيع
سواءً المقرض فوائده فخره .

18783 - **عَقْدُ تَبَادُلِيٍّ ، عَقْدُ مَلْزُومٍ لِلطَّرِيقِ**

Contrat synallagmatique (F). Indented deed (E).

هو الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق
الأخر كعقد البيع فانه يتقابل فيه التزام البائع بنقل
ملكية المبيع وتسليمه . والزام الشاري بدفع الثمن وتسليم
المبيع .

18784 - **عَقْدُ تَبَرُّعٍ** (F). **Acte à titre gratuit**

على قضائي قوله تملك حق أو مال بلا بدل يؤخذ أو
معاوضة تشترط .

18785 - **عَقْدُ تَبْعِيٍّ** (F). **Contrat accessoire**

Accessory contract (E).

هو ما كان تابياً لقد أصلي قائم قبله كالكفالة والرهن .

18786 - **عَقْدُ تَحْفِظِيٍّ ، عَمَلٌ تَحْفِظِيٌّ**

Acta conservatoire (F). **Acta conservatoire**

عمل يراد به إنقاذ مال من خطر ملحق .

18787 - **عَقْدُ تَرَافُضِيٍّ** (F). **Acte consensual**

Consent deed (E).

هو العقد الذي يكفي لانقضاء الإيجاب والقبول بين
المتعاقدين مهما كانت طريقة إجراءه .

18788 - **عَقْدُ تَوْكِيدٍ** (F). **Acta confirmatif**

Confirmative deed (E).

عقد قانوني يُزِيلُ به عاقبة عيوباً كانت لصيقة بعقد
سابق .

18789 - **عَقْدُ جَامِعٍ** (F). **Contrat collectif**

Collective contract (E).

هو الذي ترتب فيه أفراد جماعة معينة بمجرد رضاهم متوحداً .

18790 - **عَقْدٌ حِكْمِيٌّ** (F). **Quasi-contrat**

Quasi contract, implied contract (E).

العقد الحكمي أو شبه العقد تسمية تطلق على الالتزامات
التي يتكبد صاحبها أعمالاً إرادية غرضية لا ينتج منها تمهيدات
التغير كالمفاداة ودفع غير المستحق ، الخ .

18791 - **عَقْدٌ عَلَى التَّخْفِيفِ**

Acte à titre particulier (F).

هو تملك عين أو امتياز مملوكة أربابها .

18792 - **عَقْدٌ احْتِيَائِيٌّ** (F). **Contrat aléatoire**

Aléatory contract (E).

ويدعى عقد المخاطرة أو عقد الفرو . عقد يشترط فيه
للمتعاقدين أو أحدهم سخطاً من الرّيح أو أمناً من الخسارة
إذا وقع حادث غير مفسق الحدث .

18793 - **عَقْدٌ إِدَارِيٌّ** (F). **Contrat administratif**

Administrative contract (E).

هو كل عقد تنفذه الإدارة في سبيل إنجاز أعمال عامة
أو خاصة مروها للخدمة العامة أو الخاصة .

18794 - **عَقْدٌ أَوْسَمِيٌّ** (F). **Contrat solennel**

Solemn contract (E).

هو الذي لا يكفي لانقضائه اقتران القول بالإيجاب بل
لا يكون صحيحاً إذا لم تتيج في تكوينه مراسم خاصة
حددها القانون .

18795 - **عَقْدٌ اسْتِثْنَائِيٌّ**

Fiducie

عقد يلتزم به مشتري العقار ظاهراً بأن يرد له البائع
شيئاً يليه له بالاتزامات التي قطبها على نفسه نحو .

18796 - **عَقْدٌ إِسْتَادِيٌّ** (F). **Acta attributif**

Attributive deed (E).

هو عقد موضوعه نقل حق إلى شخص أو استئذنه إليه .

18797 - **عَقْدٌ أَصْلِيٌّ** (F). **Contrat principal**

Principal contract (E).

هو ما كان مستقلاً عن عقد آخر كالبيع والإيجار .

18798 - **عَقْدُ الْإِدْخَانِ** (F). **Contrat d'adhésion**

Adhesion contract (E).

هو عقد وضع شروطه الجبرية مقدماً أحد أطرافه ليشتمل
بها مع كل من يرغب في التعامل معه .

18799 - **عَقْدُ التَّبَرُّعِ** (F). **Contrat à titre gratuit**

Gratuitous contract (E).

عقد يولي به أحد الطرفين للطرف الآخر فائدة بلا عوض .

18800 - **عَقْدُ التَّرَافُضِيِّ** (F). **Contrat consensual**

Consensual contract (E).

هو الذي يكفي لانقضائه اقتران القول بالإيجاب .

18801 - **عَقْدُ الْجَبَرُوتِ** (F). **Vipère commune**

Common viper (E).

حيّة خبيثة سامة تسمى أنثى مذنوبة . أظلمها .

18802 - **عَقْدُ الْخَطِيطَيْنِ**

عقد الخطيطين كوكب ثير من الرشاء . اظلم رشاء .

18803 - **عَقْدُ الْعَمَلِ** (F). **Contrat de travail**

Labour contract (E).

هو اتفاق الذي يرصد امرؤ به لشامله ومعارفه على خدمة
امرؤ آخر فيسمل تحت اشرافه مقابل جمل يلقى أجره .

وهو في الفرق الشائع التماثل الذي يشمل مجموعته المامل
لدى رب العمل .

18804 - **عَقْدُ الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ**

Contrat collectif de travail, Convention collective de travail (F). Collective contract of labour (E).

هو اتفاق جامع يرم بين رب العمل أو عمالته وبين عملي
أحدى النقابات . موضوعه تنظيم شروط العمل التي تحمّر
على أساسها العقيد الفردية بين رب العمل وأعضائه هذه
النقابات .

١٨٨٠٦ - عقدة عتاكورية، عقدة دربية

(في السلمة ، اطليا .

١٨٨٠٧ - عقدية

بكتيرية مستديرة الشكل تعرف بالسحبة ، اطليا .

١٨٨٠٨ - عقرب ، قسطل

Scorpio (S). Scorpion (F).

العقرب الذكر والانثى من السواج عقارب. ومنه التخصيص يقال للذكر عقربان وللانثى عقرباء وعقربة || والعقرب جنس دويبات خبيثة سامة من فصيلة الشبديات ورتبة المبريات. انواعه عديدة مختلفة الاحجام والانوان. طولها يراوح بين ٢ و ١٥ سم. جميعها دسوية تسرح وتسي في الليل وتختبئ في النهار. تحمل في طرف ذنبها ابرة منقطة، سادة الحمة، جوفاء. تتصل بها غدتان تفرزان مادة قلووية سامة. وهي تستعمل ابرتها للدفاع عن النفس او لتخدير وقصص فريستها من السطاة الصغيرة.

١٨٨٠٩ - عقرب أسود ، عقرب أصفر

الذئب

Euscorpion flavicauda (S).

Scorpion noir, S. à queue jaune (F).

Black scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. جسمه صغير القد، اسود اللون، اسير الذئب الحظي المواج. بطنه مسكي التركيب مفلطح الشكل ينتهي بذئب مضطرب الشخانة، سداسي السكم، يحمل في اوله مبطان مفلغان الشوار الجنسي ويحمل في طرفه شوكه منقطة سادة جوفاء يستعملها في بث سمه. حياته مركبتان فحياتها البحر القصير المبال. مقبناه الفلكيان كبيراً الجرم. مبطانه دقيقا الانسان التي يبلغ عددها عشرة ازواج عند الذكر و١٢ زوجاً عند الانثى || الذكر اصغر قدماً من الانثى، يطول نحو ٣٥ سم. اما الانثى فتطول نحو ٤٥ سم || مسرحة دسوية. قوته الحشرات المختلفة الاجناس وكنها ويرقاتها || الانثى تساقط بصر ثلاث سنوات وتعيش نحو خمس سنوات. اما الذكر فيعيش الى حين يحكم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات المؤذية الفارة.

١٨٨١٠ - عقرب أصفر ، شيدع أصفر

Buthus australis (S). Buthus jaune, Scorpion

jaune (F). Yellow scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات، موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمه كبير القد، اصفر اللون الباهت. بطنه مفلطح ينتهي بذئب مضطرب سداسي السكم. شوكه قوية منقطة جوفاء سادة الحمة. لحيته مؤلة. سمه شديد الاذى || عيانه مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات. مقبناه الفلكيان مسننا الحلقة للامثلة. مبطانه كثير الانسان التي تبطل عند الذكر ٣٠ زوجاً. وعند الانثى ٣٢ زوجاً || الذكر اصغر قدماً من الانثى، يطول نحو ٦٥ سم. وتطول الانثى نحو ٨٠ سم. مسرحة دسوية. قوته كل ما دس واستطاع اليه سبلاً || الانثى وتضع شبيحة تعيش نحو ست سنوات وتساقط بصر سنتين. الذكر يعيش الى حين يحكم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات الشديدة الاذى والضرر.

١٨٨١١ - عقرب اكمة ، رشك

Bellisarius (S). Bellisar, Scorpion aveugle (F). Blind scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. موطنه

١٨٧٩٢ - عقد على الشئ

Acte à titre universel (F).

هو تلك بعض اموال شخص او كلها بلا تعيين ولا تخصيص.

١٨٧٩٢ - عقد عيني

Contrat réel (F).

Real contract (E).

هو الذي لا يتمد إلا بتسليم المقيود عليه كالدوية

والنقض ورهن الحياة.

١٨٧٩٤ - عقد غير مسمى

Contrat innommé (F). Unnamed contract (E).

هو الذي لم يخصص القانون باسم معين بل أخضع لشروط واستكامه لقواعد العامة المقررة لجميع المقيود.

١٨٧٩٥ - عقد قوري

Contrat instantané (F).

Instantaneous contract (E).

هو الذي يكون تنفيذه فوراً بدأ به متى شاء ذلك المتعاقدان.

١٨٧٩٦ - عقد قضائي

Contrat judiciaire (F).

Judiciary contract (E).

هو الذي يفقه انصرم امام القاضي خلال الدعوى

ليفوضا به موضوعاً متنازعاً فيه.

١٨٧٩٧ - عقد مبادعة

Contrat commutatif (F).

Commutative contract (E).

هو الذي يعد المتعاقدان فيه معنى الزام كل منهم فيعرف لمصلحة ما اعطى والاخذ ما اخذ سواً لو تفاضلا.

١٨٧٩٨ - عقد مزدوج الطرفين

Contrat bilatéral (F).

Bilateral contract (E).

هو ما عقدته ماعدان بالرضا والاتفاق.

١٨٧٩٩ - عقد مسمى

Contrat nommé (F).

Named contract (E).

هو ما اخضعه القانون باسم معين كالبيع والمقايضة والشركة والوديعة والمارية.

١٨٨٠٠ - عقد مأكولة

Acte à titre onéreux (F).

عقد لا يمد بفادة على المقيود له الا اذا قدم بدلاً عنها.

١٨٨٠١ - عقد ممتد

Contrat successif (F).

Successive contract (E).

هو الذي يشترق تنفيذه مدة من الزمن كالاجارة وعقد العمل والبيع بالتقسيط الخ.

١٨٨٠٢ - عقد منفرد

Contrat unilatéral (F).

Unilateral contract (E).

هو الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب واحد. كالمارية فان على المستجير ان يردحها وليس على المجير اي الزام.

١٨٨٠٣ - عقد ناجز

Contrat en mains (F).

Contract in hands (E).

من عقد البيع التي لا يترتب فيها حل الشاري اي نفقة من تقاضات التصريح ورسوم التسجيل، بل تكون كلها على البائع.

١٨٨٠٤ - عقد كاه

Loupe, Noué (F).

Wen, Knob, Knot (E).

المقطة والسيرة تنوع خشبي في سوق بعض الانجار.

١٨٨٠٥ - عقدة



عقرب اسود



عقرب اصفر



عقرب اكمه

جميعها مفعولة : سوفها مدادة . اوراقها متعلقة كاملة .
انديارها فردية ، محورية ، مستطيلة الزوائد صفراء اللون .
تمامها متفدية محددة وصحبة الطرف ، قلبية الشبه من ذنب
المقرب وين اسراج بعض الحشرات || امروف انواعها
للبلولة هي :

S. muricatus (S). Scorpione petite (F). عقربية صغيرة
S. varicellatus (S).
Scorpione grosse (F).
S. sulcatus (S). Scorpione rayée (F). عقربية ملتمة ، ودية
S. subvillosum (S). عقربية ودية ، ملتمة
Scorpione velus (F).



عقرب حنطي

١٨٨٢٠ - عقرب طبل
Eléphanté pleine (F).
She elephant with young (E). أنثى الفيل الحامل

١٨٨٢١ - عقفس

Pterocéphale (S).
Pterocéphale (F).
شجرة ممررة زياد من فصيلة البتسليات . ملتقى فروع .
فروعها غطاء ملتوية . اوراقها متعلقة ، معتمة ، اجاسية
الشكل . لصلها جامد النسيج ، لونه الى
الخضار الاصفر . انديارها محورية كبيرة اللثة ، انديا
ال البتسليتي تملو شتحة ودية .

١٨٨٢٢ - عقفصة
Pointe de la feuille (F).
Point of the leaf (E). في طرف نصل الورقة للمب .

١٨٨٢٣ - عقفسي هو البيق ، اعليه .



عقربية

١٨٨٢٤ - عقفص ، كنفش
Pica (S). Pie (F).
Magpie (E). Estorn (D).

جنس طير من فصيلة القرابيات . انزله حنيفة ، اصنافها
المال . انديارها بقاء . انديارها طرية . امروها عقفصة .
قوتها الحشرات والجرب والنيار ويبيض الصائير . وين
طابعها اختلاط كل ما يهر نظرها . تألف الحادق
والانبات القريبة من الممران . تقف في الانجار الرمية .
اندياها تبيض من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها رسدا نحو ٣
اسباح || ولده اعطفها في سبب تسميت عقفصا فقال
المجاسط لاته ينق قراعه كسائر القران ويقل اشتقاق
من صوته . قال الشاعر :

اذا ياربك الله في طائر فلا ياربك الله في العقفص
طويل الذناب قصير الجناح حي ما يجد غلفة يرق
يقلب عينيه في رأسه كأنها قنطرة تريق

١٨٨٢٥ - عقفص أزرق

Pica cyaneus, Cyanopica cyaneus (S). Pie bleue (F).
Blue magpie (E).

نوع من العقفص طوله يراوح بين ٣٥ و ٤٠ سم . ثوبه
ازرق اللون ابيض . رأسه الى السواد القاتم . رسدا الى
السرة الخلفية . يألف الحادق والنبات والاسراج .

١٨٨٢٦ - عقفص معروف
Pica caudata (S).
Pie vulgaire, P. bavarde (F). Common magpie (E).

نوع من العقفص طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه القرمز اللون ابيض .
مقاروه ورسدا الى السرة القاتمة . يألف الحادق والنباتات
القريبة من الممران . وهو مهيول في جميع بلاد الشرق
الواسط وينتشر من الطيور المؤدية للفتنة .

١٨٨٢٧ - عقفص

Orcha (S). Orcha (F).
الرسدة عقفا وهي جنبة صغيرة اللثة من فصيلة السنايات .



عقفص أزرق



عقفص معروف

البلاد الحارة من العالم القديم . يألف المغاور والكهوف
والالاية القديمة . مسرعه دجوي . قوته الحشرات ويكسها
والذباب والحرث تقوده اليها حاملة اللحم ثم السع || جسده
صغير اللثة يطول عنه الذكر نحو ٢٥ سم . يطول عنه
الانثى نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السرة الخلفية . بقله مفلطح
سكني التركيب ينتهي بذب سداسي السكني يحمل في طرفه
شولة جوفاء حادة الحمة يستعملها في بث سم لتخدير
فريسته والزيد من الحياة || عيناه مركبتان عادتا البصر
لذلك يدعى العقرب الاك || الانثى تمش نحو خمس سنوات
اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقفي عليه .

١٨٨٢٢ - عقرب البحر

هو الجلاج ، من الاسماك البحرية ، اعليه .

١٨٨٢٣ - عقرب الماء هو سرطان البحر ، اعليه .

١٨٨٢٤ - عقرب حنطي ، شيدع حنطي

Buthus occitanus (S). Buthus brun, Scorpion
brun (F). Brown scorpion (E).

نوع من المقرب ينتمي الى فصيلة الشبهيات . موطنه جميع
المناطق الحارة من العالم القديم || جسده مستوط اللثة ،
حنطي اللون ، مفلطح البطن . ذنبه مستوط اللثة ،
سداسي السكني يحمل في طرفه شولة جوفاء حادة الحمة .
عيناه مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات لكنها ضعيفا
البصر تقصير المجال . ميفط الذكر مركبان من ١٨
زويجا من الاناث . اما ميفط الانثى فن ٢٠ زويجا ||
الذكر يطول نحو ٥٠ سم . والانثى من ٦٠ الى ٦٤ سم .
مسرعه دجوي قوته الحشرات وكل ما دب || الانثى
تمش نحو ست سنوات . اما الذكر فيعيش حتى القيام
بمصلحة الكوم || ينتشر من اللوييات الشديدة الانثى
والضرر .

١٨٨٢٥ - عقربان

Scorpion (mille) (F).
Scorpion (male) (E).
ذكر المقارب يعيش الى حين يكوم الانثى حيث تقفي
عليه .

١٨٨٢٦ - عقربيات

رتبة دويبات خبيثة من التكبويات . ضالها سبع
عقرفة الاشكال والاجسام والالوان . اشهرها فصيلة
الشبهيات التي تحوي المقارب .

١٨٨٢٧ - عقربيات الماء

Nepidae (S).
Nepidae (F). Nepidae, Water scorpions (E).
Wasserskorpione (D).

فصيلة من بق الماء التابعة الى رتبة نصفية الاجنحة .

١٨٨٢٨ - عقربيات كاذبة

Pseudoscorpionides
رتبة من التكبويات . اجنحتها وانواعها عديدة تجتمع
الى فصليتين . حشرات عديمة الدم ، صغيرة اللثة ، مبطلة
الاجسام ، مستطيلة الاراس .

١٨٨٢٩ - عقربية ، ذنب العقرب

Scorpiurus (S). Scorpione, Ornithose, Chenille,
Chenillette (F). Scorpion's tail, Casapillar plant (E).
Raupenkraut, Raupenklee (D). Coda di scorpione (I).

جنس نباتات عشبية برية مدادة من فصيلة القرنيات
الفراشية . انديارها عذيفة مهدا حوض البصر المنطوق .

قوائمها نشطة . ثوبها الى البني الاسفع المواج || تألف الثعالب التي يكثر فيها الزئان والملي. (ف) مرقاة تميش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة .

١٨٨٣٣ - عَقَقِيدِيَّات (S). Eucnemididae (E).
Eucnemididae (E).

فصيلة حشرات من عُمَدِيَّات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التطبيع ، تطير من ٤ الى ١٢ م. وروسيها مستعرضة التفنق ، عيونها بارزة . تأثيرها ودياسها نظامية . قرونها الاستشعارية متباينة الاشكال منها الخيطية والشعوية والمسننة والمنشارية ، جميعها مؤلفة من ١١ فصلة . كرواسلها لاقامية ، يكثر فيها التريب . اتحادها لاشعة . قوائمها نشطة . ارساغها خاسية القليل . اولها ملونة || تألف الثعالب . مظهرها دجوي المسرح . جميعها خاسية ودامنة . يرقاتها مرقاة تموش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة || أشهر اجناسها الميقتيد .

١٨٨٣٤ - عَقُوبَة (F). Peine (F). Penalty (E).
في الاقتصاص من المجرم باسم المجهج .

١٨٨٣٥ - عَقُوبَة (F). Correa (S). Corréa (F).
جلس نباتات برية ورتيبين من فصيلة السذابيات . انزاعه قليلة جميعها نجيرات صغيرة القند تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ م. سطوها فرعا زياه . اوراقها ابيدة متقنة متعابلة . نصلها اهلجيلي الشكل ، جامد التسنج ، خلي الصفعة السفل . انزاعها يبقية ، وديعية البتلات المنصعة ، ثمانية الاسدية . اولها زاهية بها الياض والوردي والفسفي والاحمر || انزاعها يستمر من نيسان الى تموز .

١٨٨٣٦ - عَقُوق (F). Pleine (F). Full (E).
العقوق هي الاثني الحامل من ذوات الحافز والظلف خاصة ج عَقُوق وِعَقَان .

١٨٨٣٧ - عَقُوبَان (F). Or natif (F). Native gold (E).
هو الذهب الصرف الطبيعي .

١٨٨٣٨ - عَقُوب (F).
هو المرة الروداء ، اطلبها .

١٨٨٣٩ - عَقِيد (F). Insoluble
نمت تمريني يطلو على كل مادة لا تلوو وصل كل عمل حساني وما اشبه لا ينحل .

١٨٨٤٠ - عَقِيد (F). Plinthe (F). Plinth (E).
سطح مربع في قاعدة حرد او في تاجه .

١٨٨٤١ - عَقِيد هِنْدِي (F).
هو الكركم الهندي ، اطلبه .

١٨٨٤٢ - عَقِيس (F).
هو السيرة الزياه ، اطلبها .

١٨٨٤٣ - عَقَقَانِيَّات (S). Calotermitidae (S).
Calotermitidae (F). Calotermitidae (E).

فصيلة حشرات قارضة دجوية من رتبة العققانيات . انواعها عديدة جميعها غليظة الرووس ، قوية المشافر ، عادمة اليرانيخ . قوتها المواد المضوية والسيلولوزية . نياكها رداء

بائها فرعا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م. اوراقها لاشعة متعاقبة سنانية الشكل . نصلها بطول نحو ١٥ م. وهو جامد الصفعة ، خلي البثرة ، جنثيلي العرف . انزاعها متفوي التسنج ، محوري الاوتكار . انزاعها صغيرة القند ، صفراء اللون . اوراقها غزيرة للمادة الجمالية القتالة تقتل القلة والبقرة ، تؤذي الحمر ولا تفسر بالابل .

١٨٨٤٨ - عَقَقَانِيَّات (S).
Eucnemidae (F). Isoptera (E).

رتبة حشرات قارضة صغيرة الجسم ، مستطيلة الشكل ، غليظة الرأس ، قوية المشافر الحادة ، طويلة الاجنحة صند وجوها . نظامها الاجتماعي والاقتصادي نظام النمل . نبي نياكها تحت الارض وقوتها وداخل الاشعاب . اشهر فصائلها : الارضيات والعققانيات .

١٨٨٤٩ - عَقَلَة ، قَسَلَة ، قَتَم ، عَقَب (F).
Bouture (F). Slip (E).

فصيص او جزء من قضيب يفصل عن النبات ويفرس . والفعل تقع على اشكال خطفة اعصها :

عَقَلَة برعية او زيمية (F). Bouture à oeil (F).
Slip for bud (E).

عَقَلَة جذرية (F). Bouture par racine (F).
Slip by root (E).

عَقَلَة جمروية (F). Bouture de rhizome (F).
Slip of rhizome (E).

عَقَلَة ديبوية (F). Bouture à talon (F).
Slip at butt (E).

عَقَلَة لندية (F). Bouture par rampeau (F).
Slip by bough (E).

عَقَلَة عخلية (F). Bouture à crosse (F).
Slip for cutting (E).

عَقَلَة ورقية (F). Bouture par feuilles (F).
Slip from leaves (E).

١٨٨٤٠ - عَقَم ، عَقَر (F). Stérilité (F). Sterility (E).
العدم والقعم : حال الاثني التي لا تحمل .

١٨٨٤١ - عَقَقَنْصَة (F). Volucella (S). Volucella (F).
جلس حشرات من فصيلة السرفديات . الوامع عديدة . طوطا يراوح بين ١٢ و ١٨ م. تتميز بسمرة طيراتها واصفرار انوارها المحملة واللبنجة بالاسود والياض . يرقاتها قاتية الجلد ، كثيفة الغلب للسطل . مظهرها يمش على في ووسع الزناير . واثرها قاطد وما اشبه . اشهر انواعها :

عَقَقَنْصَة زياه (F). V. bombylians (S).
Volucelle bourdon (F).

عَقَقَنْصَة خالطة (F). V. pellucans (S).
Volucelle transparente (F).

عَقَقَنْصَة مغلطة (F). V. xomaris (S).
Volucelle zonée (F).

١٨٨٤٢ - عَقَقِيد (S). Eucnemis (S).
Eucnemis (F). Eucnemis (E).

حشرة وجيلة الجلس والروع من فصيلة العققانيات ورتبة عُمَدِيَّات الاجنحة . اعطائها بعض مناطق اوروبية الشمالية والوسطى وديال الشرق الاقصى || جسمها صغير القند ، مستطيل الشكل ، قريب اليه بالسائل . تأثيرها ودياسها الفكية رأسها صغير . صيغها بارتزان . تأثيرها ودياسها الفكية مستقلة الجسم . زياناها مشعيل . كرواسلها شبه مربع الشكل . غداها لاحتقان يملوها تحفيد تحيل قاطب .



مقنصة زياه



مقنصة شفافة



مقنصة مغلطة

١٨٨٥١ - عِكْبِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ

Tridacanta pilosa (S). *Ephémère veuve* (F).
عشبة ترينينة معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أزهارها شطبية
فرداء. أوراقها لائقة متعاقبة. تصلها صني الشكل،
خلي البشرة حل صفحته يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض
أزهارها ٢ سم. أزهارها كثيرة العدد ليلكية اللون || أزهارها
يستمر من حزيران إلى تشرين الثاني .



عقيلان

١٨٨٥٢ - عِكْبِيَّةٌ فَرَجِيَّةٌ

Tridacanta virginiana (S). *Ephémère de Virginie* (F).
عشبة سرودية معمرة ساقها متعقبة فرداء تملو نحو ٦٠ سم.
أوراقها لائقة متعاقبة : تصلها ضيق الصلصلة مدلب
المقصعة يطول نحو ٣٠ سم. ويعرض من ٢٥ إلى ٣٠ سم.
أزهارها جملة الشكل تعرض نحو ٣ سم. الوانها تختلف
باعتلاف الضروب فيها الأزرق والبنفسجي والأبيض
والوردي والاحمر || أزهارها يستمر من أيار إلى تشرين .

١٨٨٥٣ - عِكْبِيَّةٌ وَدِّيَّةٌ

Tridacanta rosea (S). *Ephémère rose* (F).
عشبة سرودية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ضيقة
التصل عددة تطول نحو ١٨ سم. يعرض من ٢ إلى ٣ سم.
أزهارها وردية اللون مستطيلة الزناد || أزهارها يستمر
من حزيران إلى تشرين الثاني .



عقبة

١٨٨٥٤ - عِكْبِيَّةٌ
Génophère (F).
تختلف أشكال الافتمالات البنيية التي تملو حل عكر
موصوف معين .

١٨٨٥٥ - عِكْبِيَّةٌ
Araignée (mâle) (F).
Spider (mâle) (E).
ذكر النكبوت .

١٨٨٥٦ - عِكْبِيَّةٌ
Commutatrica,
Permutatrica (F). *Rotary converter*, *Rectifying*
commutator (E).
المكاس جهاز خاص يسمح بتحويل التيار الكهربائي
من متواصل إلى تناوبي والمكس بالمكس .

١٨٨٥٧ - عِكْبِيَّةٌ
Toile d'araignée (F). *عكاش*, *Eekash*,
Cobweb, *Spider-work* (E).
العكاش والمكاش العكاشة : بيت النكبوت .



عكابة

١٨٨٥٨ - عِكْبِيَّةٌ
Orbitelle, *Orbitolaire* (F).
نمت ترميني يطلق حل العكاش التي تسج عكاشها
كالشعاع . نواسه سهل الانكسار ، جيد الحانة ، شديد
القة ، يستعمل في تعديد القلائس المجهرة .

١٨٨٥٩ - عِكْبِيَّةٌ
Cosmopolite, *Cosmopolitan* (E).
حفة المدينة الجملة من كل طوائف البشر وصفة من
لحب جميع البلدان وأهلها ومن اعتبر العالم كوكبه أو
من كان العالم كله كيمض الحيوان والمير والنبات .

١٨٨٦٠ - عِكْبِيَّةٌ
هي الجنسة ، أطلبا .

١٨٨٦١ - عِكْبِيَّةٌ
Pollen récolté (F).
جدرات الوبع يحج بها التحل عمل اسراغها وسبقها
واقتناها تجمعلها في الشهد .

وانفاق دومايز قنينا بالطين في التربة وعلها وروق الاخشاب
التي تفرعها || تعيش في النظام . نظمها الاجتماعي
والاقتصادية قريبة الشبه من نظم النحل والاسل ، فيها الملكة
البيوض والذكر الكامل والجند والمال الخانث || أشهر
أنواعها :

عقيلان *
Reticultermes lucifugus (S).
Termite lucifuge (F).

عقيلان اصفر العنق *
Calotermes flavicollis (S).
Termite à cou jaune (F).

عقيلان احمر *
Hodotermes ochraceus (S).
Termite ocre (F).

١٨٨٤٤ - عَفِيفَةٌ *
Gryphaea (S).
Gryphée (F). *Gryphceae* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة الحماريات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في البحر
الايوني المتوسط وفي بعض مناطق الاطلسي || أصدانها
تصنف مستوية الشكل ، متعقبة القدم ، لاسنوية
المصاريع ، كبيرة اليسارية صغيرة اليمينية || أنواعها
الماكولة عديدة أشهرها المعقبة المقرنة (*G. angulata*) .

١٨٨٤٥ - عَفِيفٌ ، عَفِيفٌ
Agave
حجر كريم من مركبات المرو (الكوارتز) المختلطة ببعض
الكسيد الحديدي التي تصبغها بالوانها المتخلبة القائمة بين
الاصفر والاحمر .

١٨٨٤٦ - عَفِيفٌ يَمَّانُ
Onyx
نوع من البلق الجبل الصنف يتميز بخطوطه المتوازية
الترتيب المشتركة المركز .

١٨٨٤٧ - عِكْبِيَّةٌ
Commelinaceae, *Commelynaceae* (F). *Commelin-*
naceae (E).

هي فصيلة الزولانيات من وحيئات الفلقة . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد . اصلها البلاد الحارة والاستوائية .

١٨٨٤٨ - عِكْبِيَّةٌ *
Tridacanta (S). *Tridacantie*, *Ephémère* (F). *Com-*
mon spider-wort (E). *Tagblume*, *Dreimasterblume*
(D). *Efemero* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة العكبليات . انواعها
عديدة معظمها بر ي وبضها ترابي . أزهارها حامية ثلاثية
الفصل والبتلات ، سداسية الالوية ، خلية الاقدام || أشهر
انواعها ما يلي .

١٨٨٤٩ - عِكْبِيَّةٌ الرِّوِيَّةُ
Tridacanta fluminensis (S). *Ephémère de Rio* (F).

عشبة سرودية ترينينة معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها
بيضية مستطيلة . تصلها عاقب الخضار حل صفحته البلياء ،
بنفسجي الصفحة السفلى . أزهارها كثيرة العدد ، يضاء
اللون ، عصارتها قابلة الحطب || أزهارها يستمر طوال
السنه .

١٨٨٥٠ - عِكْبِيَّةٌ يَبْدَهَةُ الزَّهْرُ
Tridacanta albiflora (S). *Ephémère à fleurs blan-*
ches (F).

عشبة ترينينة مركنية معمرة . سوقها مسطحة تنفرض عند
كل مفدة . أوراقها بيضية الشكل ، قلبية القاطعة ،
مدنية المقصعة ، تصلها جميل الخضار الزلفي . أزهارها
قليلة العدد يضاء اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى
تشرين الثاني .

١٨٨٦٧ - عُكْبَر مُقْتَدِد

Microtus oeconomus (S). *Campagnol économe* (F). نوع من العُكْبَر ، موطنه البلاد الروسية ، طولهُ نحو ١٢ سم. وذنبه ٤ ، جسمه اسطواني الشكل مقبضه مقطوم الطرف ، اذناه مستديرتان صغيرتان . ظهره الى الصهبة السراء الباقية . ايلاده الى الصهبة الصفراء بطنه ابيض اشقر || يعيش جماعات كثيفة العدد وهو من العُكْبَر القاطنة التي تجوب البلاد في طلب الحبوب والحبوب والحبوب التي تجوز في طلب الحبوب والحبوب والحبوب في الشتاء عند الانواع العادية التي الشتوي .

١٨٨٦٨ - عُكْبَرَات

Arvicolinés (F). العُكْبَرَات او قُرَان الزرع عارة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة القُارِيَات . اجناسها وانواعها عديدة موطنها العالم . جميعها صغيرة القامة ، اجسامها ريمية . رؤوسها مخروطية غليظة . مقاضها مقطومة . آذانها مستديرة بارزة . اذنانها صغيرة كاسية || اُعرف اجناسها العُكْبَر واللمين والسفة .

١٨٨٦٩ - هَيْكْد

Baie de sorcière (F). *Witches broom* (E). فصة من الانثان الكثيفة التجميع تشبه المكسكة تسبها بعض لطور التفرية . راجع تفرية .

١٨٨٧٠ - هَيْكْدِيَّة

Nid d'araignée (F). *Nest of spider* (E). المكسكة كشكش ليد النواس ، جرابي الشكل ، ينسجه المنكسكات حيث يقع للاستراحة فيه .

١٨٨٧١ - هَيْكْدَا

Base du coeur (F). *Base of the heart* (E). هي قاعدة القلب .

١٨٨٧٢ - هَيْكْر

Génosype (F). *Genosype* (E). هو الذي يمثل نتيجة عمل الجين في التركيب الخلوي وهذا ما يحصل التركيب العكري مثلاً لنبوة الصفات الوراثية .

١٨٨٧٣ - هَيْكْر ، كَيْمَاءُ الْمَاء ، قَسْطِلُ الْمَاء

Traps (S). *Macre*, *Châtaine d'eau*, *Truffe d'eau*, *Tribule*, *Cornuelle*, *Echarbot* (F). *Water chestnut*, *Water caltrop* (E). *Echte Wassernuss* (D). *Tribolo aquosum*, *Castagna d'acqua* (I). جنس نباتات عشبية ، صقلية ، مائية ، حولية من فصيلة الاغديات . انواعه الزراعية ثلاثة ، اوراقها كبيرة القامة مستطيلة الزناد فصلها منسبي الشكل متشاري الحافة . زهورها فردية محورية فضاء اللون . ثمارها جوزية شاذكة ، متباينة الاشكال ، كستنية اللبب المأكول .

١٨٨٧٤ - هَيْكْر أَبُو شَوْكَتَيْن

Traps bipinosus (S). *Macre à deux épines*, *Singhara* (F). نوع من العكر الشري تكثر زراعته في الهند والهند الصينية . ثماره كثة الشكل ثنائية الفصل الجالسة الخشبية الحادة الشوكية . دقيق لبابها يستعمل في تحضير بعض الحلويات .

١٨٨٧٥ - هَيْكْر أَبُو قَرْيَيْن

Traps bicornis (S). *Macre bicornis*, *Ling*, *Ling Kio* (F). نوع من العكر الشري تكثر زراعته في الصين حيث يستعمل في معظم المأكولات . ثمرته تشبه رأس الكباش بقرينه للثقبين سجمها سجم الكستنة . لبابها جيد الصفت وهذا ما يجعلها تحتل المركز الاول بين انواع العكر .

١٨٨٦٢ - عُكْبَر

Microtus, *Arvicola* (S). *Campagnol* (F). *Vole*, *Field-mouse* (E). جنس حيوانات لبونة قاضية ، من العُكْبَرَات وفصيلة القُارِيَات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القامة تتميز بفرازة ثمرها . انثاها تقصع من ثلثات الى اربع مرات في السنة كل مرة من ٤ الى ٦ ادوارس تيسر وتكسب يد بعضها بلسون وتشرح في طلب قوتها بمرسة اسابيع || قوتها الحبوب والحبوب ومختلف المواد النباتية انحصارها لاه الاجشور في الشتاء عند الانواع العادية التي الشتوي .

١٨٨٦٣ - عُكْبَر مُصَمَّر

Microtus glareolus, *Arvicola glareolus* (S). *Campagnol fauve*, *C. des grèves* (F). نوع من العُكْبَر ، طولهُ نحو ١١ سم. وذنبه ٤ ، ثوبه الى الصخرة يمتد مع اقترابه من تيج الظهور وينصرف الى الياض عند الصدر والياض || يأنف المزوج والحقل والاحراج والافلاخ والحداق . يعيش جماعات كثيفة العدد تلج بعض الاوليف || قوته الحبوب والثمار والحبوب والكتسنة والحبوب واه الاجشور عند الجوع .

١٨٨٦٤ - عُكْبَرُ الْبَر

Microtus terrestis, *Arvicola terrestis* (S). *Campagnol terrestre* (F). نوع من العُكْبَر ، موطنه الشرق الاوسط ، طولهُ نحو ١٨ سم. وذنبه ٧ ، جسمه اسطواني الشكل مقبضه مقطوم الطرف . اذناه مستديرتان كبيرتان . ثوبه الى الصهبة النبراء يمتد قليلا مع اقترابه من الظهور ويبيض عند البطن . يأنف الحقل والمراعي ومختلف الاشجار ويجاري الماء . قوته المواد النباتية على اختلافها من الحبوب الى الثمار والحبوب واللباء وكما القصب .

١٨٨٦٥ - عُكْبَرُ الْحَقْل * ، قَارَةُ الْبَيْط

Microtus arvalis, *Arvicola arvalis* (S). *Campagnol des champs* (F). نوع من العُكْبَر ، موطنه فسح الاربياء يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اردية ومن البلاد المصرية حتى امالي السودان . جسمه اسطواني الشكل ، طولهُ يبلغ ١١ سم. وذنبه ٣ ، ثوبه الى الصهبة الصفراء ، بطنه الى الياض التي . ملب جرمزه ابيض . مقبضه متدل الكتيبي . اذناه مستديرتان صغيرتان || يأنف الحقل والمراعي والاحراج والحداق ويجاري الماء والمستقعات . يعيش على السواحل البحرية وفي الجبال حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . يركض بسرعة يحمي السير ويحسن السياسة لكنه اخفق التسلق بطنه || قوته جميع المواد النباتية مما كان صمها وزهرها .

١٨٨٦٦ - هَيْكْرُ قَلَزَب *

Microtus amphibius, *Arvicola amphibius* (S). *Campagnol amphibie*, *C. aquatique* (F). *Water rat*, *Water vole* (E). *Wasserratte*, *Mollmaus* (D). نوع من العُكْبَر ، طولهُ ١٦ سم. وذنبه ٨ ، جسمه ضم الحية . مقبضه ذات الشكل . اذناه كبيرتان . ثوبه الى الصهبة السراء يمتد مع اقترابه من تيج الظهور وينصرف الى الثيرة عند الصدر والى الياض عند البطن وتوالي الجراب . يأنف ضفاف البحيرات والانهر ويجاري الماء . يسبح ويطنس ويسلق الاشجار . قوته الحبوب والحبوب والحشرات والقشريات والاسماك الصغيرة .



عُكْبَر اصغر



عُكْبَر الحقل



عُكْبَر قَلَزَب



عُكْر اَبُو قَرْيَيْن



عُكْرُ أَبُو قُرُونٍ



عُكْرُ أَحْمَر



عُكْرُ الْمَرْج



عُكْرُولُ مَلَوَق

الانسياب . تعيش في الماء ولا تطفو على سطحه إلا عند الحاجة إلى تجديد الهواء إلى جسمها كبير القند يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . ثوبها إلى السرة القصية يبلغها مروج أخضر . كسولها وظهورها مغطيان بخار أصفر . وأصبا مستعرض الشكل ، قصير السطح . فكاهها قوالب . حينها كيرتان زائها مقيقان ، مستطيلان . غوارها مستدير الطرف اللاصق . جرابها صفراء اللون تتميز بغير الزوج الخلفي المبط الساق والارياض المدة لتجديد . أرسافها خالية النمل || الاثني أكبر قند من الذكر وأبنت ثوباً منه وأبلغ تفهيداً في غصنها || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في أوائل الربيع وتعيش حتى أواسط الخريف . قوتها كل ما تفسر لها من الحيوانات الدنيا التي تقتنصها في الماء || الاثني تجمع المكان في لبر على صفحات الأوراق التي تلتصق التراب . يتخفى ولكن يند منه نحو ثلاثة أسابيع عن يرقات مدوية الشكل ، حمراء اللون ، سود قرؤوس ، كثيفة الخلف تسمى إلى الماء بعد التفقس يربون وهي كالحشرات الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تفسر لها من الحشرات الدنيا والأولاد .

١٨٨٨٤ - **عُكْرُولِيَّاتٌ** (Dytiscidae).
Dytiscidae (F). Dytiscidae, Predaceous diving beetles (E). Schwimmkäfer (D).

فصيلة حشرات قاذمة ، مائية من رتبة غدييات الانجسة . اجنساها وانواعها المروفة عديدة ، معظمها من حشرات مياه المناطق الحارة . تألف النائم والاهوار والبيمرات والأبهر الرائدة المياه ولا تطفو على سطح الماء إلا عند الحاجة لتجديد الهواء إلى اجسامها متفاداة القند ، منها الصغيرة اللقينة التي تطول نحو ٢ سم . ومنها الكبيرة المستفصنة التي تطول نحو ٤٠ سم . جميعها يضيئة الشكل ، معتدلة الاحدياب . تتميز بجرابها الخلفية المبطلة الارياض المدة للسياحة . ارساف الجراب الامامية ، عند الذكور ، مجهزة بصاحب تمكثها من التفتش بظهور الاثنت عنه الكوم . وهي لا تخرج من الماء الا في زمن التمكنة او عند الانتقال إلى مكان إلى مكان تفسر اذ ذاك في الليل || البرقة كالحشرة الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تفسر لها من الحيوانات الدنيا || أشهر اجنساها المكنزول والذريقول والمندريوس والفراس .

١٨٨٨٥ - **عُكْسٌ** ، قَدْرِيَّيْمٌ ، قَرْقِيْدٌ (Marcottage (F). Layering (E).
اسمى طرائق تكثير النبات تقوم بمجي الصن وندته في التربة دين فصله عن امه الى ان تبرز له جذور فيفصل ويفرس .

١٨٨٨٦ - **عُكْسُ التَّنَوُّجَةِ** (Dénitrification).
Dénitrifying (E).
تحويل يحصل في بعض الاربة الرطبة بتأثير جراثيم خاصة تحول النترات الى نيتريت فامونيك فازوت وهو بذلك يكون عكس التجربة ومنه ضرر كبير لان النترات القرب تفيض واسهل امتصاصاً من النيتريت .

١٨٨٨٧ - **عُكْسِيْن** (Invertin (F). Invertin (E).
خيرة العكس تمكس السكروز فيصير غلوكوزاً .

١٨٨٨٨ - **هَيْكَم** (Envelope (F). Envelope (E).
العكَم الغلاف . ج امكَم ومكَم .

١٨٨٨٧ - **عُكْرُ أَبُو قُرُونٍ** * (Trapa natans (S).
Macro commune (F).

نوع من العكر الجليل يعيش في جميع مناطق البلاد الحارة والمتعددة . ثمارها مأكولة تستعمل مسلوكة أو مشوية بني بصحم الكماء تحمل أربعة قرون متقابلة ذرية سادة شاذكة .

١٨٨٨٧ - **عُكْرُش** (Festuca (S). Fétuque (F).
Festuca grass (E). Schwingel (D). Festuca (I).
جنس نباتات عشبية مرعوية حولية أو مدمرة من فصيلة النجيليات . انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اعشاب كثلية تنمطها للماشية من الخيل الى الماعز . وقد قيل فيه :
« اعلقت حمارك عكرشا حتى يحيد ويكشاه »

وهو من النباتات التي ترعب في الاربة المنتجة الحافظة على رطوبتها || أشهر انواعها المرعوية التي تزرع في المروج والمراعي الثلاثة التالية :

عُكْرُش أَحْمَر * (Festuca rubra (S). Fétuque rouge (F).
عُكْرُش الْمَرْج * (Festuca pratensis (S).
Fétuque des prés (F).
Festuca elatior (S).
Festuca élevée (F).

١٨٨٨٨ - **هَكْرُشَة** (Hase (F). Doe-rabbit (E).
هي انثى الارانب .

١٨٨٨٩ - **هَكْرُشِيَّاتٌ** (Festucaceae (S).
Festucacées (F). Festucaceae (E).
سبط من النجيليات يشمل عدة اجناس وانواع ، اشهرها العكرش . معظمها نباتات عشبية برية وبعضها علمي ، يزرع في المراعي .

١٨٨٩٠ - **هَكْرَمَة** (Pigeonne (F).
هي الحامة ، أنى الحام . اما الاكبر فهو المزنط والمخيل .

١٨٨٩١ - **هَكْرِيْز** * (Aldryson (S).
Aldryson (F). Aldryson (E).
نبات عشبي ممر من فصيلة الخلدات . منته بعض الاثام البحر الابيض المتوسط . ساقه فارقة خلية الماء ، تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه معتقة ، متعالية ، كلوية الشكل ، جميلة الخضار المزاجي . ازهاره متفردية التجميع . ازهاره صفراء اللون .

١٨٨٩٢ - **هَكْرِيْسُ أَسْوَدَ** * (Xylodoris aser (S).
Xylodoris noir (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القترسيات . جسمها شديد الصفر يطول نحو ٣ سم . ثوبها إلى السرة القطنانية ، يهت في البطن ويصق في الرأس والكتول والحجفة والمجنين || رأسها محرم . خطمها معتدل الحجم . حينها صفيرتان . كسولها عمودي . حجبها حمرة . حجبها صفيرتان . روشناها اخضران . قوائمها دقيقة ، حمراء اللون || تألف حراج العشور وتعيش بين الثشور وتحتها . قوتها الحشرات والحوام .

١٨٨٩٣ - **هَكْرُولُ مُطْرَقٌ** * (Dytiscus marginalis (S). Dytique marginé (F).
Dytiscus marginalis (E).
حشرة مائية قاذمة من فصيلة العكروليات ورتبة غدييات الانجسة . تألف المناطق والفران ويجاري المياه البليطة

Sarcoptes (S). Sarcopte (F). ١٨٨٩أ - عَكْل
Sarcoptes (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة الجربيات ورتبة القُرَدِيَّات
انزاعه عديدة جسمها صغيرة القد، ذرية، مؤذية عابطة.
بعضها يحدث الجرب في الإنسان والحيوان || يكاثف
بإستعمال مركبات الكبريت .

١٨٨٩أ - عَكْل مُلْتَس * ، جَرَب مُلْتَس
Sarcoptes laevis (S). Sarcopte lisse (F).

نوع من الجرب يركب بصل أرياش الطير فيسبب قسوطها.

١٨٩٠أ - عَكْل قُمْلِي * ، جَرَب قُمْلِي، جَرَب
Sarcoptes scabiei (S). نَاشِف

Sarcopte de la gale, Acara de la gale, Gale sèche (F).
Iech-mite (E).

نوع من الجرب الشائع يتطفل على النمل والأبل والبق
والنمل والماعز فيؤذيها في جلودها ويسبب لها الحكاك
والقشر والشحار .

١٨٩٠أ - عَكْل مُتَكَلِّب * ، جَرَب مُتَكَلِّب
Sarcoptes mutans (S). Sarcopte changeant (F).

نوع من الجرب يتطفل على أرساغ الطير اخضعها الداجنة
فيؤذيها ويشوها .

١٨٩٠أ - عَكَلِيَّة
Empequeustae (F).

هي الصارة جهاز ميكانيكي يصم ويبلب الأشياء .

١٨٩٠أ - عَكَلِيَّة *
Bionomie (F). Bionomics (E).

علم البيئة الخارجية ويدعى تأثيرها في الكائنات الحية .

١٨٩٠أ - هَلَاج
Traitement (F). Treatment (E).

هو الدواء المُستعمل في مكافحة مرض معين أو وسم مقدر .

١٨٩٠أ - هَلَاجَات شَالِيَّة ، أَدْوِيَّة
Traitements curatifs (F). Curative treatments (E).

هي الادوية الناجمة المستعملة للشفاء من علة بدت أو
لقضاء على حشرة ظهرت . راجع فاس .

١٨٩٠أ - هَلَاجَات وَكَلِيَّة
Traitements préventifs (F). Preventive treatments (E).

هي الادوية التي يحسن إستعمالها وقائية من مرض يمتنى
وقوعه أو لاجتناب وسم مرتقب .

١٨٩٠أ - هَلَس *
Chélat (F).

الطلس مركب عضوي يمكنه اختلاط مع المادان الثرية
من تكوين تآلف عنصري يقوم بالانحطاط دون ان يترك
سيرة التشيل النهائي .

١٨٩٠أ - هَلَس *
Olace

جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الهلاليات .
انواعه المعروفة ٢٥ منها معظم المناطق الحارة والاستوائية
من العالم القديم واسرائيلية || الجهر انواعه هلاس مرتدب
(Olace de Ceylan) اوراقه مأكولة وتطبخ كالمكرفوف
وفيهر .

١٨٩٠أ - هَلَسِيَّات *
Olaceaceae (S).

Olaceacées (F). Olacaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلغلتين مستقلة الفصائل مرتفعات
المليض . اجناسها المعروفة ٢٦ اما انواعها تنمو ١٧٠ ||

١٨٨٨أ - عَكْسَةُ أَيْفَ *
Mycetophila elegans (S). Mycetophilie élégant (F).

حشرة لارؤية من فصيلة العكسيات . جسمها صغير القدر
يطول من ٢ الى ٦ سم . رأسها صغير . عيناها بارزتان .
زباناها غليظان . ثوربا الى الصفرة الصتائية . ودونها
الى الصفار الباهت . قوائمها كبيرة . غنايبها مجهزة
بمتناسخ حادة || مرتعها الغابات . الاثقب اكبر كدأ من
الذكر ، تنجح مكبتها في سرق الفطور وفي نكاحه فينتف
من يرقات تنميش على الفطور حتى طور الكمال .

١٨٨٩أ - هَكْسِيَّات *
Mycetophilidae (F). Mycetophilidés (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد . معظمها من علم الاقاليم المعتدلة
المتحركة نحو البادية . مرتعها الغابات حيث تكثر الفطور ||
اجسامها صغيرة . نحيلة . رؤوسها صغيرة مثنية . عيونها
زمنية . قرونها الاستشعارية غليظة ، تعد من ١١ الى ١٧
فصلة . اعطامها فياجة . قوائمها مستطيلة . غنايبها مجهزة
بمتناسخ نشطة || يرقاتها شبه اسطوانية الشكل ، بيضاء
اللون . جميعها خاملة أو دامتة . خادراتها طليقة لا تنمن
في التربة لكنها تلتصق بشده رقيق .

١٨٨٩أ - هَكْنَكَة
هي سوتيان الجبل ، اطبل .

١٨٨٩أ - هَكْبُوب *
Gundelia tournefortii (S).

Gundéle, Gundélie, Accoub (F).

نبات عشبي بري شوكي معمر ويصد الجلس والقرع
من فصيلة المركبات . احطان بلاد الشرق الاوسط يكثر
في المناطق البرية الجبلية . وهو بقلة نادرة لا تتحلل من
بعض الفيتامينات والناصر المفيدة . فلانها مأكولة تستعمل
مطبوخة .

١٨٨٩أ - هَكْرَعة
Racine de la queue (F).

اصل ذنب الدابة حيث حري من الشعر من مغز الذنب .

١٨٨٩أ - هَكْكِيس *
Ixa (S). Ixa (F). Ixa (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات حشرات الاربل ،
قصار الذيل وفصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة
العدد اصلها بحر البلاد الحارة || اجسامها صغيرة طليقة
من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٥ الى ٦ سم . تتميز
بامتداداتها الجانبية الاسطوانية الشكل الهزلية الأطراف
الدنية . ارجلها نحيلة مستطيلة . ملاصقها كفة دقيقة
الأطراف || انوثها الى السمرة المتفاوتة الشدة والملاجات
الحطية والزمنية .

١٨٨٩أ - هَكْكِيس *
Achronique, Acronyque (F). Acronychal (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نجم أو كوكب عندما يكون
مركزه في الفضاء مائكا الشمس فيظهر عند غروبها
ويغرب عند شروقها .

١٨٨٩أ - هَكْكِيس ، دَرِيْنَكَة ، وَكَلِيَّة
Marcotte (F). Layer (E).

النصن الذي يمسك أو يدرج أو يرفع .

١٨٨٩أ - هَكْكِيس الكَرْمَة ، وَكَلِيَّة الكَرْمَة
Provin (F). Layer of a vine (E).

سرع الكرمة الذي صار تدريجه .



عَكْسَةُ أَيْفَ



هَكْبُوب



هَكْكِيس



عَلْ اَمْلَس



عَلْ قَلْ

١٨٩٢٠ - **عَلَش**

الطراد والائل والحاج والبيت والكوش جميعها من العَلَش .
ج أعلات (اللسان) .



علائش

١٨٩٢١ - **عَلَج**

Onagre gros et gros (F).
هو الحمار الوحشي السمين القوي .

١٨٩٢٢ - **عَلَجَان * ، عَلَج**

Arundinaria (S).
Bambou (F). Bamboo (E).
جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات
وصيلة النجيليات . أولوه عديمة زغب في الأربة الرملية
النبالية الرملية . أشهرها ما يلي .



علائش

١٨٩٢٣ - **عَلَجَان لَمَاع**

Arundinaria nitida (S).
Bambou luisant (F).
نوع من العُلجان يطو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . سلاحيته
إلى الجذوة البنفسجية . صبره عليه الاقنان . أوراقه تطول
من ٦ إلى ٨ سم . نصلها مائل للبرشة جبل الخضار القزافي
اللاصق || يرطب في الأربة القليلة الاندماج الوفرة للمواد
المضوية .

١٨٩٢٤ - **عَلَجَان مَشْبَك**

Arundinaria tessellata (S). Bambou à réseau (F).
نوع من العُلجان يطو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقه
ذقنة الزمان الاخضر تطول نحو ٤٥ سم . وتفرس نحو ١٠
نصلها جبل الخضار يحيطه اطراف اصفر ويحمل حل صفحته
السفل خطين اقشرين متوازيين مع الصلغ || يرطب في
الأربة الرملية النبالية الرملية .



علائش

١٨٩٢٥ - **عَلَجَان مَوْشَح**

Arundinaria veitchii (S). Bambou penché (F).
نوع من العُلجان يطو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . سلاحيته
اسطوانية . صبره عديمة مفتحة . أوراقه معتقة تطول
من ١٢ إلى ١٥ سم . وتفرس نحو ٣ . نصلها أخضر الصفحة
العليا أحمر السفل يحيطه اطراف اصفر || يرطب في الأربة
الخفيفة القليلة الرملية .

١٨٩٢٦ - **عَلَجَان نَحْلِي**

Arundinaria palmata (S). Bambou-Palme (F).
نوع من العُلجان يطو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . سلاحيته
اسطوانية . صبره عديمة مفتحة . أوراقه معتقة تطول
من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وتفرس من ١٠ إلى ١٢ . نصلها أخضر
الصفحة العليا يجرى السفل || يرطب في الأربة الرملية
النبالية الرملية .



علائش

١٨٩٢٧ - **عَلَجَان وَشَح**

Arundinaria humilis (S). Bambou de fortune (F).
نوع من العُلجان يطو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . سلاحيته
اسطوانية خضراء اللون . صبره دبئية . أفاده قليلة . أوراقه
مبشرة تطول من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها مائل البرشة
جبل الخضار || يرطب في الأربة الرملية القليلة الاندماج
الغنية بالمواد المضوية .



عُلجوم

١٨٩٢٨ - **عُلْجُوم * ، ضِفْدَع الجبل ، ضِفْدَع**

Bufo (S). Crapaud (F). Toad (E).
جنس حيوانات دوداء صغيرة القذرة قاذرة من فصيلة
النجيليات ورتبة عديمات الاقنان . أولوه نحو ٨٠
منتشرة في جميع العالم تتميز من الضفادع العادية بقصر

جميعها اشجار وشجيرات . أصلها بعض اصقاع البلاد
الحارة والاستوائية من العالم القديم . سبطا رقيقة ، قرماء .
أوراقها متعاقبة ، كاملة . أنظرها عتقوية التصبح أو
فردية || أشهر اجناسها العلاس .

١٨٩١٠ - **عَلَش * Sardinella surita (S).**

Allache (F). Allache (E).
سكة بحرية قريبة الشبه بالسردين من فصيلة الصافييات .
أصلها بحار البلاد الاستوائية والحارة وبعض مناطق البحر
الايض المتوسط . سرورها الافواض والتفاف والحيادح .
سرهما كثير العدد كالسردين || جسمها احليبي الشكل
يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم . فمها مائل ورفيق . زعنفتها
الظهرية مقعرة الطرف وقرب من الرأس من زعنفة السردين .
زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح . نوحا إلى الرعدة
الزرقاء يملؤها موج لضي يمين عند الظهر . يطن إلى
البياض القضي المائجة || لحمها مأكول متوسط الصنفت .

١٨٩١١ - **عَلَاط**

Facis latérale de l'encolure (F).
صفحة المتق في الباب والمراشي . والملائدان صفحتا
المتق من الجانبين || بين الحامة طرفها في صفحي عتقها .
ما أصل علطيا || وعلط الشمس هو الذي يترأى كائنات
منها كانه غيب .

١٨٩١٢ - **عَلَاط**

في (F).
الخط الدقيق . يقال أصلي الأربة بلطاليا اي يمتطيا .

١٨٩١٣ - **عَلَاق**

Elyme des sables, Oyat (F).
هو الهوس الكتيان ، اطلبه .

١٨٩١٤ - **عِلَالَة ، عَشَق ، ذُتْب**

Pétiole (F). Petiole (E).
جزء دقيق من الورقة يحمل النصل فينبغ اليه بالنسخ الجبال
ويقتل النسخ الكامل . وهو صلة الوصل بين الورقة والقصو
النباتي الذي يرتكز عليه .

١٨٩١٥ - **عَلَاك**

هو الخيش ، اطلبه .

١٨٩١٦ - **عَلَام**

Amande du narprun (F).
Buckthorn almond (E).
لب جسم البني .

١٨٩١٧ - **عَلَام ***

Accipiter majus (S).
Epervier majus. Grand épervier (F). Greater
sparrow-hawk (E).
طائر من البواشق ، طوله نحو ٤٠ سم . ويصطه ٨٥ سم .
جسمه رقيق القوام . ثوبه جل التوش . صدره أبيض الرقعة
الغبراء المظلمة بالاصو || خلفه خلق البواشق الا أنه
احمر مزاجيا وأشد بطلما من سائر انواع جنسه . وهو من
الفواشق التي تجرب العالم القديم ولا تقم في الشرق الاذف
اكثر من خمسين يوما في السنة .

١٨٩١٨ - **عَلَامَة**

هي السمة ، اطلبه .

١٨٩١٩ - **عَلَب ***

Tragelaphus euryceros (S).
Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaphi,
Bongo (E).
نوع من الجليل وهو اكبرها قداً وقرناً وانسبا قالاً واسمها
انتشاراً . ثوبه كيت اسمر يملوه تجديد ابيض ورتقة صفراء
كسائر انواع جنسه . الاكثر امين لونا من الاثني || أصلها
فصيلة الارباء تمتد من بحيرة تشاد إلى كيريه والغانين .

١٨٩١٨ - **عَلَامَة**

هي السمة ، اطلبه .

١٨٩١٩ - **عَلَب ***

Tragelaphus euryceros (S).
Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaphi,
Bongo (E).
نوع من الجليل وهو اكبرها قداً وقرناً وانسبا قالاً واسمها
انتشاراً . ثوبه كيت اسمر يملوه تجديد ابيض ورتقة صفراء
كسائر انواع جنسه . الاكثر امين لونا من الاثني || أصلها
فصيلة الارباء تمتد من بحيرة تشاد إلى كيريه والغانين .

١٨٩١٩ - **عَلَب ***

Tragelaphus euryceros (S).
Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaphi,
Bongo (E).
نوع من الجليل وهو اكبرها قداً وقرناً وانسبا قالاً واسمها
انتشاراً . ثوبه كيت اسمر يملوه تجديد ابيض ورتقة صفراء
كسائر انواع جنسه . الاكثر امين لونا من الاثني || أصلها
فصيلة الارباء تمتد من بحيرة تشاد إلى كيريه والغانين .

١٨٩١٩ - **عَلَب ***

Tragelaphus euryceros (S).
Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaphi,
Bongo (E).
نوع من الجليل وهو اكبرها قداً وقرناً وانسبا قالاً واسمها
انتشاراً . ثوبه كيت اسمر يملوه تجديد ابيض ورتقة صفراء
كسائر انواع جنسه . الاكثر امين لونا من الاثني || أصلها
فصيلة الارباء تمتد من بحيرة تشاد إلى كيريه والغانين .

Bufonidae (S).

١٨٩٣٢ - عئجويئات

Bufonidae (F), Bufonidae (E).

فصيلة حيوانات من لمة الرئيات ومرتبة السوطيات ورتبة البرمائيات أي عديمات الذنب || أجناسها المعروفة ثمانية وأولها ١٣٠ منها القاذرة والمائية والبرية الجلمة والشاحبة. أصابها نوع أصناف استثناء جزيرة سنغافورة وبعض جزر المحيط الهادي || جميعها عديمة الأسنان. السنبها الفيلينية الشكل، فقاها الانامية المتقدمة عادمة الضلوع. أما التتو الضامي الذي يمتد من قفلة الصدر ويغطي فئتين التمدد. أصابع قوائمها الانامية طويلة. أما أصابع قوائمها الخلفية فبقيدة عظام لاقامي الذي لانه يختلف مع الأجناس والألوان || أعرف أجناسها وأشهرها العلجوم.

Ephedra (S), Ephèdre (F).

١٨٩٣٤ - عئد

جس نباتات معمرة برية من فصيلة العئديات. أنزاهه المعروفة ٢٠. جميعها جنات فراء عئدة. طول من ١٠٠ إلى ٤٠٠ سم. فروعه متعاقبة ثنائية أو ثلاثية الالتشاب. أوراقها صغيرة متعاقبة تركب القعد. أزهارها وريسة المسكن، الأكثرية منها فردية أو ثنائية التجميع، أسما الانثوية فضلية. ثمارها عئنية. مهدا شواطيء بحار البلاد الحارة والمتندلة. أعرفها وأهمها العئد المزروع السائبل.

١٨٩٣٥ - عئد مؤدوج السئابل * عئب البحر

Ephedra distachya (S), Ephèdre distique, Raisin de mer (F), Sand cherry, Ses grape (E), Gewöhnliches Meertrauben (D), Uva di mare (I).
نوع من العئد، موئل شواطيء البحر المتوسط، عئته طول نحو ٢٥٠ سم. سئابل أزهار الانثوية مؤدوجة التجميع. ثماره عئنية، صغيرة القد، حاضرة الطعم، مأكولة، لا تخلو من بعض النافع الطبية وتستخدم في عدة شرايات قئدية مقوية.

١٨٩٣٦ - عئدوس الزوال * ٥

Alydus calcaratus (S), Alyde des genêts (F).

سفرة خافضة من فصيلة الكوربيات ورتبة عئطفات الاجسمة. جسمها مسط، مئتر الملب بطول نحو ١٢ سم. رأسها شبه يئني الشوزن، أسود اللون. عئطها متد الطول. صئاه صئوتان، نافرزان. زباناها مسطيلان. كئولها مسطلي اللون، أسود الرباط بالراس. صئبتها صغيرة، مؤدوجة، شديدة السرة. ظهريها الى الخلفي الاقير. بطها احمر، جؤوي الخثار المشقق بالحنطي. الصفصة السفلى من بطها الى السواد. قئشرايا شفاف. قوائمها متكافئة الملب || مسرحها البراري. تركيب العئيد من النبات احصها القريبات الفراقية ومنها الزوال.

Gnetaceae (S).

١٨٩٣٧ - عئدييات

Gnétiacées (F), Gnetaceae (E).

فصيلة نباتية من ربيانات البؤور. أجناسها ثلاثة : العئد والبرجرج والوعئس.

Alliment (F), Food (E).

١٨٩٣٨ - عئس

هو العئد، أو الطبع.

قوائمها. اجسامها طول من ١٥ الى ٣٥ سم. تبلغ كامل نموها ونشائها بمرحس سنوات. انيابها عئطلة، ثؤلوية الجلمة، تحمل بعض اللند القاذرة. سئالها كرية الرائجة كارية تنفسها ورتقها دفعا عن النفس.

١٨٩٣٩ - عئجوم أخضر *
Bufo viridis (S).
Crapaud vert (F), Green toad (E).

نوع من العلجوم القاذرة. أصلانه جميع الاصقاع المتندلة الحارة من المال القديم || جسمه متوسط القد بطول نحو ١١ سم. عئد الذكر ونحو ١٥ سم. عئد الانثى. جلمه كثير التبول الصغيرة تتخللها بعض اللند القاذرة. سئالها كرية الرائجة كاري بقله العلجوم دفعا عن النفس || رأسه قصير. عئاه كيرتان. فة واسع الشفق. فكاه عادت الأسنان. أصابع قوائمها الانامية طويلة. أما الخلفية فبقيدة عظام يكئفئ الزام الاال || ثوبه الى السرة الزيقية المواج طلعها رقيقة حراء ومرتجة خضره يطبقها الاسود || مسرحه دجوي. قوته الحشرات وما استطاع من الزحافات || الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ١٢٠٠ دحلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يختبر من الحيوانات النافعة لانه يقضي على الكثير من الحشرات والجران والديدان.

١٨٩٣٠ - عئجوم البئر

Boudroie (F).
هو الكوكج، جنس اسماك بحرية. أو الطبع.١٨٩٣١ - عئجوم جئير *
Bufo marinus (S).
Agua, Bufo géant (F), Giant toad (E).

نوع من العلجوم. أصلانه امريكة الجنوية والوعئس. جسمه كبير القد بطول نحو ٢٥ سم. عئد الذكر ونحو ٣٥ سم. عئد الانثى. جلمه متعل وتعلو غند قاذرة، سئالها كرية الرائجة كاري. رأسه غليظ وقصير. عئاه كيرتان، جاسطتان. عئطه واسع الشفق، مقطوع الطول معلو بمن عئطي المادة يمتد من طرف الخط الى سئوى العين. فكاه عادت الأسنان. أصابع قائمته الخلفيتين مقيدة عظماب يكئفئ الزام الاال || ثوبه الى السرة الخلفية معلو مواج أخضر ورقيقة سواد تتخللها الذيرة || مسرحه دجوي. قوته الحشرات والزحافات. الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ دحلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يختبر بئيقه الفصاج الشبيه بمواء الكلب.

١٨٩٣٢ - عئجوم مئدول *
Bufo bufo (S).
Crapaud commun (F), Common Toad (E).

نوع من العلجوم. أصلانه جميع اصقاع البلاد المتندلة الحارة من المال القديم || جسمه متوسط القد بطول نحو ١٥ سم. عئد الذكر ونحو ١٤ سم. عئد الانثى. جلمه كثير التبول يتخللها بعض اللند القاذرة، سئالها كاري الرائجة || رأسه قصير. عئاه كيرتان-جاسطتان. عئطه واسع الشفق. فكاه عادت الأسنان. أصابع الخلفية وائرة العظماب. ثوبه الى الخضار الاسمر يطلو مواج زئني ورقيقة كستئبة || مسرحه دجوي. قوته الحشرات والزحافات والديدان || الانثى تقرأ من ٤٠٠٠ الى ٧٠٠٠ دحلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يألف حياة الاسر ويمتد بحاسة التوجه. يختبر من الحيوانات النافعة.



علجوم أخضر



علجوم جئير



علجوم مئدول



عئد مؤدوج السئابل



عئدوس الزوال

الاستعمارية خطية طويلة . مرزاتها قصيرة مدببة . رقاتها عادمة الابريل البطنية ، مزدوجة التقويس الماكس الذي يشبه الكلاب .



علة الاجاص

١٨٩٤٥ - **عُكْسَال** * (F). *Phalaropus* (S).
طائر وحيد الجنس والنوع من حمارة البطاليات . طوله نحو ٢٢ سم . ظهره الى السرة الصهباء يعلوها مزيج اسود . راسه وصغره الى السرة . زروه ابيض . عتقه وصدره الى الصهباء الرادية . بطنه وخوابه واثنيها يهض . جناحه ضيق ذئق ، اسود الظاهر ، ابيض الباطن . ابطاره وقوامه صفر الخمار . منقاره مستطيل احمر اللز . اسنانه قوية اصابعه مفصصة الخياط || الاثني اسنن قدام من الاكبر واقل ثلوثين . ثمن بين الاضباب قرب الماء . تبيض ٤ يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوما .



علة الزرع

١٨٩٤٦ - **عُكْسَالِيَات** (F). *Phalaropodini* (F).
حمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض القواطع . اجناسها وانواعها قليلة . اجسامها صغيرة القدر . مناثريها مستطيلة . اسنانهها قوية ، اجسامها مفصصة الخياط || رتادها خطوط الجدار وضفاف الجحيرات . تقضي نصف اوقاتها حائمة على سطح الماء ولتصنف الآخر في الاجواء وحل الحصى . قوتها القشرية والرخويات والخرافيت والاسماك الصغيرة والحرايز ويبيض الاضباب || لها جيلسان : اللعالم والحطاف .



عسوط جلع

١٨٩٤٧ - **عُكْسَل** * ، **عُكْسَلَة** (S). *Melanocorypha* (S). *Calandra* (F). *Calendra* (F).
جنس طير من فصيلة القتريات . انوعه ٩ ، اطلسها البلاد الاسوية والافريقية والارودية . جميعها غريبة الرأس ، مستطيلة الجناح ، قصيرة الذنب ، دقيقة الرسع ، قوية المنقار . انثياها الى الصهباء الخيطية تعلوها ريشة صبره . تأثف الحقل المنزوية والمراعي والرباق . ثمن في المراعي وبين الزروع . انثياها تحضن وضعها من ٤ الى ٥ يبيضات || اعرف انواعها واشهرها :



ملال

عسل الحشيشة (S). *M. albiterminata* (S).
عسل الهند (F). *Calandra d'Abysinie* (F).
عسل روسيا (F). *M. maxima* (S). *Calandra de l'inde* (F).
عسل زنجي (F). *M. tatarica* (S). *Calandra de Russie* (F).
عسل معروف (F). *M. negra* (S). *Calandra negra* (F).
M. calandra (S). *Calandra commune* (F).



عسل

١٨٩٤٨ - **عُكْسَان** (S). *Tapiscia* (S).
جنس نباتات تزيينية مسرة من فصيلة النسيات . انواعه قليلة جميعها شجرية تملو من ٦ الى ٨ انتار . اولقاتها حاملة ، مركبة ، ورية . وريقاتها خاسية او سباحية اللند . نصلها يبيضي الشكل ، ظلي القناعت يعلو من ٦ الى ١٣ سم . صفحته العليا غضراء اللون اما السفلى لصلها . ازهاره متكونة التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون ، صغيرة القدر ، قواصة البرف الطري .

١٨٩٤٩ - **عُكْسَان** (F). *Affener* (F).

١٨٩٢٩ - **عُكْسَس** * ، **سِف** * (S). *Cephus* (S).
الرأسية علة . جنس حشرات من فصيلة العليسات . انوعه عديدة . اجسامها نحيلة مستطيلة . وريثها شفافة ، كثيرة المروق . قروتها الاستعمارية خطية ، رقاتها دقيقة الجسم كالأبنة الشكل ، عادمة الابريل البطنية . اعرف انواعه واعرفها علة الاجاص وعلة الزرع .

١٨٩٤٠ - **عُكْسَسَة الاجاص** * ، **سِف** * (S). *Janus compressus* (S). *Cèphe du poirier* (F). *Janus compressus* (S). *Birnentriebwespe* (D).
حشرة من العلس ، طولها يراوح بين ٦ و ٨ سم . جسمها اسطواني الشكل . جوشها اسود اللون تعلوه مشعة صفراء . يعلوها الى الصفرة البرتقالية . تظهر في الربيع وتجمع مكانها في لحاء الاقان يفتن من رقات تلمد الكثير والحشب فضله وتسبب ذبول التوايح وموتها .

١٨٩٤١ - **عُكْسَسَة الزروع** * ، **سِفَة الزروع** * (S). *Cephus pygmaeus* (S). *Cèphe pygmée*, *Cèphe du blé*, *C. des chaumes* (F). *Wheat stem sawfly* (E). *Getreidehalmwespe* (D).
حشرة من العلس ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . جسمها نحيل البنية ، اسطواني الشكل . نوبها الى السرة ، يعلوها جلعج بالا صفر . تمتع مكانها في قصب الزروع فيقتف عن رقات تدخل القصب وترعى لب الكمار فتضع اللعج من السنايل التي تبيض وتلوي || تكلف بتقلاص وسرق الجلمل لانها تبيت فيه ضمن رقائق صغيرة وشمة الشكل .

١٨٩٤٢ - **عُكْسَسَة** * ، **مِيزَان الارتفاع** (F). *Altimètre* (F). *Altimeter* (E).
جهاز يمين رماء بالموقع بالنسبة الى سطح البحر اي ارتفاع المكان من مرمى مياه البحر .

١٨٩٤٣ - **عُكْسُوط مُجَدَّع** * (S). *Chilochoorus* (S). *Chilochoorus bipustulatus* (F). *Chilochoorus bipustulatus* (E).

حشرة خاتلة آفة ناعمة من فصيلة الصمقيات ودية مندعات الاجنسة . تأثف غايات الصنوبر واخرابه . خناضها وريقاتها تبيض على الارق الذي يركب الصنوبر || جسمها صغير القدر يعلو من ٤ الى ٥ سم . نوبها الى السواد الباقين . غذائها لثايات البقج النباتية . واسها مستدل الجرم . عيناها كيرتان . زبائنها صقيان . فكها ضليمان . ظهورها مستدير الاطراف اللاتعة . غذاءها شديدة الصلابة كيثفت النمل . اوساها رباعية العلق || اجسامها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من يائها الشتوي في نيسان . تسرح في الجدار رتيبت في الليل || البرقة سريعة النمو شبه اسطوانية الشكل تعلو عند الادراك اتمام نحو ٧ سم . نوبها الى السرة النحسية يعلوها حل اغبر || اما غنصها الجبل الثالث فانها تقضي فصل الشتاء مختفية تحت الحجارة ولا تخرج من مكانها الا عندما تدب الحرارة في اواسط شهر نيسان .

١٨٩٤٤ - **عُكْسِيَات** * (F). *Cephidae* (S). *Céphidés* (F). *Cephidae*, *Stem sawflies* (E). *Halmwespen* (D).
فصيلة حشرات من رتبة شحاتيات الاجنسة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها نحيلة مستطيلة ، قروتها

١٨٩٥ - عكف

هو المادة أو المواد الغذائية التي تقدم الحيوان في سبيل حفظ حياته. ونمو جسمه وإنتاجه || يختلف الملف باختلاف نوعه وما يحويه من عناصر وبنواد غذائية يمكن هضمها وتحويلها في الجسم || ولما كانت الغاية من الملف

اصحاب المراهق قرب الازهر
 اصحاب المراهق السجوة
 اصحاب المروج الهادية
 اصحاب المروج المروية
 اصحاب المروج عند الازهر
 شيوخ عند الاسبال
 شيوخ اثناء الازهر
 شيوخ بالغ
 دوسر
 مدخن
 دكتور مكبح قبل الازهر
 دكتور مكبح اثناء الازهر
 زهرة صفراء كلفة امريكية
 زهرة صفراء كلفة اروية
 زهور (عبراني) عند الازهر
 زهور ومن اثناء الازهر
 زوان ايطالي اثناء الازهر
 زعيم قبل الاسبال
 زهرة سكرية
 مصفوية المروج اثناء الازهر
 صمير عند الاسبال
 صمير عند الازهر
 هل المروج الطري
 هل المروج قرب الازهر
 هل المروج اثناء الازهر
 هل اصبح قرب الازهر
 هل احسن اثناء الازهر
 هل قريزي اثناء الازهر
 هل ايض قرب الازهر
 صفة طرية
 صفة قرب الازهر
 صفة الازهر
 قرب الازهر
 قرب الازهر
 اثناء الازهر
 بيان رموي قرب الازهر

1371	1300	2387	2399	431	232	230	730	1321	238	230	230
1371	237	2372	238	831	237	232	230	130	130	230	231
1371	137	2381	237	237	232	230	230	237	238	230	231
437	137	2387	237	737	232	232	230	832	237	230	137
1371	137	2379	232	130	232	230	237	1238	238	231	230
830	132	2389	237	230	232	137	238	830	230	237	137
100	137	2370	232	730	232	830	132	237	137	237	237
1237	231	2308	237	1237	238	232	1837	232	137	232	237
1371	137	2377	239	238	232	231	1327	238	232	232	237
232	232	2387	237	238	231	237	231	737	237	137	237
1007	238	2389	230	237	232	130	238	1007	237	237	230
1237	130	2387	237	230	232	130	237	1237	239	230	237
237	237	2387	231	737	230	237	230	237	132	137	237
431	237	2387	231	737	237	130	237	1002	230	137	137
1007	130	2372	232	232	237	138	231	1137	237	231	237
1007	137	238	230	232	237	138	231	1130	237	239	237
1132	137	2380	237	237	230	231	737	1137	130	232	230
1137	132	238	239	230	230	231	230	1007	239	230	237
831	237	2379	237	238	237	137	737	837	130	231	137
1230	130	2379	238	1131	230	137	137	1237	130	231	237
237	130	238	231	732	237	138	237	838	230	230	137
1130	137	2379	732	1131	237	130	237	1138	230	237	137
100	231	2372	231	130	232	232	231	237	237	237	137
1007	137	2387	230	737	230	230	237	830	237	232	137
437	137	2387	237	737	232	237	230	432	237	232	137
239	137	2387	239	230	230	232	230	737	237	237	137
237	130	2379	230	230	232	137	737	230	237	238	138
430	130	2381	230	237	230	231	737	730	237	238	138
838	139	2388	237	237	230	238	237	837	238	232	138
837	237	2387	230	237	232	237	230	237	238	237	138
431	137	2379	239	737	232	237	738	437	238	230	232
832	130	2372	230	237	232	237	237	837	238	239	232
430	139	2380	230	737	232	237	230	239	237	237	139
237	137	2377	237	238	237	737	239	237	230	230	230
737	130	2388	137	237	232	230	237	230	237	231	139

لغة جزء من العلماء المذكور بحري ما قلده

مادة العلماء	عناصر عام								عناصر منهضة			الحق العلماني بالنسبة الى النشأ	مادة آسية منهضة في مادة جزء	القيمة العلمية منهضة في مادة جزء
	مادة جاءة	مادة أزوية	مادة دعوية	مادة غير أزوية	خلاصات	سليزر	مادة أزوية	مادة دعوية	خلاصات	مادة غير أزوية	سليزر			
نظم	٨٦٠	١٠٥	٢١٠	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
نظم السليم	٨٤٥	١٠٥	٢١٠	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
نظم الخردل	٨٥٠	١١٠	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
نظم الزوال	٨٥٠	٩٠	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
نظم السفين	٨٥٠	٢٠٥	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
ورق القراميس	٨٨٦	١٨٢	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
ورق سوق الجنبل	٨٩٤	١٢٥	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
شمن الطامنا	٩٠٠	٩٤	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
ورق الانجار المنيرة	٨٤٠	١٠٥	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
(في الاواخر تموز)														
ورق الحور في تشرين الاول	٨٤٠	١٠٥	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
ورق الكرامة في الحريف	٨٨٠	١١٤	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
ورق الاكاسيه في الحريف	٨٧٦	٩٨	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
شمن الطوطم	٨٧٥	١٢٧	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	
ورق التبردار	٨٨٠	١٥٩	٢٠٥	٣٠٥	٢٢٢	١٠٥	٦٢٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٧٢	٢٧٢	

٤ - في الفقه

قش الخندروس	٨٥٧	٢٧	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الشمر العربي	٨٥٧	٢٥	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الشمر الشري	٨٥٧	٢٢	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الطوطم	٨٥٧	٢٨	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الدخن	٨٥٠	٢٢	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش القردة الصفراء	٨٥٠	٥٠	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الارز	٨٦٨	٥٥	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش التيلم	٨٥٧	٢٢	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الخنقة	٨٥٧	٢٥	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش القليل المصري	٨٦٦	٨١	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الحصن	٨٦٤	٩٠	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش البالية	٨٦٧	٩٠	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش القيس	٨٤٠	١٢٩	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش القوس	٨٤٠	٦٥	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الفضل المغربي	٨٤٠	٩١	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الكرسه	٨٤٠	٦٢	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الصويحه	٨٤٠	٢٢	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الجلبان	٨٥٢	١٢١	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش التتم	٨٤٠	٤٨	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش الخشاش	٨٤٠	٦١	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
قش السليم	٨٤٠	٢٥	١٠٤	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨

٥ - عصافه الحبوب

القله	٩٤٣	٢٩	٢٩	٣٥٧	٢٥٨	١٥	٤٤٠	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨
الخندروس	٨٥٧	٢٥	٢٩	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
الشمر	٨٥٥	٢٩	٢٥	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
الخرفاط	٨٦٢	٥٠	٢٥	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
الدخن	٨٨٠	٤٨	٢٥	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨
القله الصفراء	٨٦٩	٢٥	٢٩	٣١٨	٤٤٠	٨٥٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٢٢٨	١١٨	٢٢٨	٢٢٨

ملحة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماحية الغذاء	عناصر عام										عناصر منضمة			الحقن الطبي النسبة الى النشا	مواد أخرى منهضة في مئة جزء	القيمة الطبيعية في مئة جزء
	مواد جافة	مواد الزيتية	مواد دهنية	مواد غير الزيتية	سليلوز	مواد دهنية	مواد غير الزيتية	مخاليصات	سليلوز	مواد جافة	مواد الزيتية					
الارز (السلط)	٩٠٠	٣٧	٤٤	٣٢٧	٣٨١	٩٠٠	٣٧	٤٤	٣٢٧	٣٨١	٩٠٠	٣٧	٤٤	٣٢٧	٣٨١	
الشيلم	٨٥٧	٣٥	٤٣	٢٩١	٤٤١	٨٥٧	٣٥	٤٣	٢٩١	٤٤١	٨٥٧	٣٥	٤٣	٢٩١	٤٤١	
الحنطة	٨٤٠	٤٧	١٧	٣٧١	٣٧١	٨٤٠	٤٧	١٧	٣٧١	٣٧١	٨٤٠	٤٧	١٧	٣٧١	٣٧١	
الفاصوليا واللوبيا	٨٥٠	١٠٧	٢٠	٣٢٥	٣٢٥	٨٥٠	١٠٧	٢٠	٣٢٥	٣٢٥	٨٥٠	١٠٧	٢٠	٣٢٥	٣٢٥	
الحمص	٨٦٠	٩٨	١٢	٣٢٧	٣٢٧	٨٦٠	٩٨	١٢	٣٢٧	٣٢٧	٨٦٠	٩٨	١٢	٣٢٧	٣٢٧	
البنس	٨٥٠	١٨٣	١٨	٣٨٤	٣٨٤	٨٥٠	١٨٣	١٨	٣٨٤	٣٨٤	٨٥٠	١٨٣	١٨	٣٨٤	٣٨٤	
الترس	٨٥٠	٦٨	٧	٤٥٥	٤٥٥	٨٥٠	٦٨	٧	٤٥٥	٤٥٥	٨٥٠	٦٨	٧	٤٥٥	٤٥٥	
الاصحبه	٨٨٠	٦٣	٥٥	٤٢٥	٤٢٥	٨٨٠	٦٣	٥٥	٤٢٥	٤٢٥	٨٨٠	٦٣	٥٥	٤٢٥	٤٢٥	
الكافيه	٨٥٠	١٠٩	٢٢	٣١٨	٣١٨	٨٥٠	١٠٩	٢٢	٣١٨	٣١٨	٨٥٠	١٠٩	٢٢	٣١٨	٣١٨	
القمح	٨٦٨	٤٦	١	٣٥٤	٣٥٤	٨٦٨	٤٦	١	٣٥٤	٣٥٤	٨٦٨	٤٦	١	٣٥٤	٣٥٤	
الكتكان	٨٨٤	٣٥	٣٤	٣٥٥	٣٥٥	٨٨٤	٣٥	٣٤	٣٥٥	٣٥٥	٨٨٤	٣٥	٣٤	٣٥٥	٣٥٥	
السلمج	٨٤٠	٣٥	١٦	٣٤٤	٣٤٤	٨٤٠	٣٥	١٦	٣٤٤	٣٤٤	٨٤٠	٣٥	١٦	٣٤٤	٣٤٤	

٦ - في الجوز والسائل

١٩٠	١	١٠٠	-	١٨٩	-	١	١٧	٢١٥	١	٢١	٢٥٥	١	١٩٠
١٢٧	١	١٠٠	-	١٢٥	-	١	٩	١٣٩	١	١٦	١٧٠	١	١٢٧
١٩٨	١	١٠٠	-	١٩٧	-	١	٨	٢١٩	١	٢١	٢٦٠	١	١٩٨
٢٤٨	١	١٠٠	-	٢٤٦	-	١	٣	٢٧٣	١	٢٥	٢٢٠	١	٢٤٨
٣١٥	١	١٠٠	-	٣١٣	-	١	٩	٣٤٨	١	١٦	٣٨٤	١	٣١٥
١٧٧	١	٩٥	-	١٨٤	١	١	٧	٢١٧	١	٢٢	٢٦٥	١	١٧٧
٦٨٨	١	١٠٠	-	٦٨١	-	١	٥	٢٢٣	١	٢٤	٢٨٠	١	٦٨٨
٦٧	١	٩٠	٦	٦٥	-	١	٢	٧٢	١	٢٣	٢٢٠	١	٦٧
٨٧	١	٨٧	٧	٨٩	١	١	٨	١٢٣	١	٢٢	١٣٠	١	٨٧
١١٦	١	٨٦	٨	١٢٥	١	١	٩	١٢٣	١	٢٢	١٦٨	١	١١٦
٥٠	١	٧٤	٣	٦٤	-	١	٩	١٠٠	١	٢١	١٥٥	١	٥٠
٧٤	١	٧٠	٣	١٠١	-	١	٨	١٠٦	١	٢١	١٣٥	١	٧٤
٦٣	١	٧٢	٣	٨٣	-	١	٩	٨٧	١	٢١	١٢٠	١	٦٣
٤٦	١	٧٧	٣	٥٥	-	١	٨	٦٥	١	٢٠	٨٥	١	٤٦
١٦٤	١	٩٢	٢	١٥٨	-	١	٧	١٦٩	١	٢٢	٢٠٤	١	١٦٤
١٥٨	١	٧٥	٥	٢٠٣	-	١	٩	٢١٤	١	٢٢	٢٥٠	١	١٥٨
٤٨	١	٧٨	٤	٤٥	-	١	٨	٥٩	١	٢٢	٩٢	١	٤٨

٧ - في الحبوب والثمار

٧٤٢	١	١٠٠	١	٦٠٥	٣	٧٧	١٩	٧١٢	٣٨	٩٦	٨٨٩	١	٧٤٢
٥٢١	٧٢	١٠٢	٦٨	٤٤١	١٠	٨٢	١٥٥	٥٢٢	٤٤	١٠٩	٨٦٣	١	٥٢١
٧٤٣	١٠٠	١٠٠	١٢	٦٠٠	١٩	١١١	٢٦	٦٥٢	٢٧	١٣٩	٨٦١	١	٧٤٣
٧٢٠	٦١	٩٩	١٣	٦٤٢	١٩	٦٦	٢٩	٦٧٨	٢١	٩٤	٨٥٧	١	٧٢٠
٧٥٨	٩٥	٩٩	١٢	٦٦٧	١٦	٦٣	٢٧	٧٠٢	١٨	٨٧	٨٥٧	١	٧٥٨
٦٦٤	٦٥	٩٧	٢٢	٥١٧	١٧	٧١	٦٥	٦٢٧	٢٥	١٠٢	٨٥٧	١	٦٦٤
٥٩٧	٧٢	٥٥	٢٦	٤٤٨	٤٠	٨٠	١٠٣	٥٨٢	٤٨	١٠٣	٨٦٧	١	٥٩٧
٦٣٤	٥٦	٩٦	٢١	٥٠٦	٢٥	٦٢	٨١	٦٢٢	٤٢	٨٢	٨٦٧	١	٦٣٤
٥٤٨	٩٢	٩٢	٢٧	٣٧٠	٤٦	١٠٢	١٥٠	٤٩٩	٤٢	١٢٧	٨٦٧	١	٥٤٨
٥٩٧	٧٤	١٥٥	٢٧	٤٥٨	٣١	٨٠	٨١	٦١٢	٢٩	١٠٦	٨٧٥	١	٥٩٧
٨١٥	٦١	١٠٠	١٢	٦٥٧	٣٩	٧١	٢٢	٦٩٢	٤٤	٩٩	٨٧٠	١	٨١٥
٨٢٠	٥٥	١٠٠	٧	٧٥٨	٨٢	٨٨	١٥	٧٨٠	٤٦	٧٧	٨٧٤	١	٨٢٠
٧١٣	٨٧	٩٥	١٠	٦٢٩	١١	٩٦	١٩	٦٩٥	١٧	١٥٠	٨٦٦	١	٧١٣

ذره

خنثري

خنثري مقشور

شعير (معدل وسطى)

شعير كبير الحب

شعير مبطل الحب

خرطال (معدل وسطى)

خرطال مقل الحب

خرطال مبطل الحب

دخن

ذره صفراء (معدل وسطى)

ارز مقشور

شيلم (معدل وسطى)

المحة جزء من الغذاء المذكور بحوي ما قدره

مادة الغذاء	عناصر عام								عناصر متوسطة			الحقن الغذائي بالصبة الى النشا	مواد أخرى منهجة	مادة الغذاء في مئة جزء
	مواد جافة	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى	مواد أخرى				
شليم بصل الحب	٨٦٦	٩٢٢	١٥٥	٧٢٦	١٦٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
شليم بصل الحب	٨٦٦	٩٢٢	١٥٥	٧٢٦	١٦٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
قمح (بصل وبصل)	٨٦٦	١٢٦	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
قمح عجل الحب	٨٦٦	١٠٨	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
قمح بصل الحب	٨٦٦	١٤٢	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
قمح	٨٥٧	٢٥٤	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
حب	٨٦٦	٢٢٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
عدس	٨٦٦	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
برسيم أصفر	٨٦٦	٣٨٣	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
برسيم أزرق	٨٦٦	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
برسيم أبيض	٨٦٦	٢٩٤	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
كرشة	٨٦٦	٢٢٦	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
رييدان رمعي	٨٦٦	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
صوبية	٩٠٠	٣٢٢	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
باقية	٨٦٦	١٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بزر القطن	٩٠٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
فستق سوداني	٩٣٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
قنب	٩١٥	١٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
لفسان	٩٢٣	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
كشان	٩٢٩	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
شيشان	٩٢٨	١٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
جوز الهند	٩١٦	١٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
سلمج	٩٢٧	١٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
سمسم	٩٤٥	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
طونكين	٩٢٦	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
لحم	٩٠٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بلوط غير مشقور	٨٥٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بلوط مجفف غير مشقور	٨٥٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بلوط مشقور	٨٥٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بلوط مشقور ومجفف	٨٥٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
عزروب	٨٥٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
يقطين	١١٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
شاهيلوط الحصان غير مشقور	٥٠٨	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
شاهيلوط الحصان غير مشقور	٨١٢	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
شاهيلوط الحصان مشقور ومجفف	٤٩٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بزر شولدر طلي	٨٦٦	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
بزر شولدر سكري	٩٠٠	٢٥٥	١٥٥	٧٢٦	١٢٦	٧٢٦	٠٩٦	١٦٦	٠٨٦	٠٩٧	٧٢٦	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠

٨ - في الحالة والسالة والا كسية

١ - الصناعات المطعنة

٢٥٨	٢٣	٠٧٠	٩٤	٢٠٩	١٢٢	٤٨	٣٧٦	٣٤٢	١٨	٨٠	٨٤٤
٥٥٢	٩٩	٠٩٤	٢٧	٣٢٠	٣٤	١١٣	١١٣	٥٠	٤٥	١٥٢	٨٨٠
٦٤٩	٢٠٦	٠٩٨	١٩	٣٠٠	٦٨	٢٤٤	٤٨	٣٨٣	٨٤	٣١٨	٨٨٠
٧٠٣	٥٩	١٠٠	٤٥	٦١٧	٤٥	٦٨	٧٢٦	١٩	٨٦	٨٥٣	٨٥٣
٢٠٧	١٠٣	٠٩٥	٢٥	٤٤١	٣٥٨	١١٨	٥٢٥	٤٢	١٥١	٨٧٨	٨٧٨

لغة جزء من الغذاء المذكور بحري ما قدره

مادة الغذاء	عناصر خام				عناصر منضمة				الحقن الطافي بالنسبة إلى الغذاء	مادة آخرة منضمة إلى الغذاء	النسبة إلى الغذاء
	معدل	معدل	معدل	معدل	معدل	معدل	معدل	معدل			
سنت الحمص	٨٨٠٠	٣٠٢	١٠٢	٤٤٧	١٦٠٦	٢٠٥	٤٠٤	٢٢٣	١٠٧٠	٤٠	٣٠٨
نخالة الحمص	٨٨٣٣	١٦٨	١٠٧	٤٦٢	١٠٩٢	٨٠	٢٤٦	١٠٠	٩٦٠	٩٧	٤٣٥
دقيق الحمص	٨٩٠٤	٢٣٠	٢٠	٥١٠	١٨٥٣	٧٠	١٠٣	٣٠	٩٦٧	٣٠٦	٦٨٨
قشور القسطنطيني	٨٩٠٩	٧٢	٢٩	١٨٥	٢٠٦	٢٠٨	٧٢	٢٠	١٠١	٢٠	١٠
نخالة القسطنطيني	٨٩٥٥	٢١٨	١٨٠	٢٤٧	١٦٠٣	١٦٠٣	١٦٠٣	٩٧	٩٦٣	١٥٣	٧٣٧
نخالة الشعير	٨٩٥٥	١٤٨	٣٠٦	٥٧٦	١٠٣٢	٢٧	٤٢٠	٢٠	٩٦٣	١٠٨	٥٧٥
دقيق الشعير	٨٩٦٨	١٢٣	١٠٦	٦٥٤	١٠٣٢	٣٠	١٠٣	٢٠	٩٦٣	٩١	٦٧٣
عصارة الخمرطال	٨٩٦٠	١٠٦	٠	٤٤٨	—	٢٠	—	١٠٧	١٠٦	—	١٨٣
دقيق الخمرطال الحمص	٩٠٠٠	١١٧	٤٧	٥٢٤	٨٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٣٨٣	٩٦٣	٧٠٦	٥٥٩
دقيق الخمرطال الناعم	٩٠٠٠	١٦٢	٦٦	٥٤٥	١٠٣٢	٤٠	٤٢٠	٣٧	٩٦٧	١١٠	٦٤٢
نخالة الخمرطال	٩٠٠٤	٧٠٦	٢٠٧	٥٣٨	٢١٦٦	٢٠٨	٢٠٨	٣٧٥	٨٠٠	٢٠٤	٤٥٣
نخالة الدرة الصفراء	٨٧٥٥	٩٠٦	٣٠٦	٦١٥	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٣٢٠	٩٦٥	٥٧	٤٤٧
دقيق الارز	٨٧٤٠	١٢٠	١٢٠	٤٠٤	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٣٦٢	١٠٠	٦٠	٦٨٤
دقيق الشيلم	٨٧٤٠	١٤٥	٢٠٨	٦٣٥	٢٠٦	١١٠	١١٠	٦١٦	١٠٠	٩٠٩	٧٧٥
نخالة الشيلم	٨٧٥٥	١٦٧	٢٠١	٥٨٠	١٢٠٦	٢٠٨	٢٠٨	٤٢٠	٧٧٩	١٠٨	٤٦٩
دقيق الحنطة	٨٧٤٠	١٤٣	٣٢	٢٢٩	١٢٣	٢٠٨	٢٠٨	٥٢٢	١٠٠	١١٠	٧٣٠
نخالة الحنطة الناعمة	٨٧٤٨	١٥٥	٤٠٨	٤٠٤	١٢٩	٢٠٨	٢٠٨	٤٠٥	١٠٠	١١٠	٤٨٠
نخالة الحنطة الخشنة	٨٧٤٨	١٤٣	٤٠٢	٥٢٢	١١٣	٢٠	٢٠	٣٧٧	١٠٠	٩٠٨	٤٢٦

ب - الصناعات الغذائية

سنت البطاطا الطرية	١٤٠٠	٠٦	—	١١٥	—	—	١٥	٨٠٨	٠٢	٠٩٥	٨٠٦
سنت البطاطا الجافة	٨٦٠	٤٣	٠١	٦٨٢	—	—	٨٠٨	٠٢	٠٩٥	—	٥٠٩
ثقل الدرة الصفراء الطرية	٢٤٨	٣٠٦	١٠٦	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	١٠٢	٠٩٢	٢٠٢	١٩٥
ثقل الدرة الصفراء الجافة	٨٧٢	١٤٠	٥٧	٦١٣	٤٢٣	١٨٠٨	٢٠	٠٦٩	٠٩٠	١٠٢	٦٥٠
ثقل الدرة الصفراء	٩١٠٩	٢٣٧	٢٠	٥٦٨	٦٨	١٨٠٩	١٠٩	٤٧١	٠٩٠	١٨٤	٦٣٨
سنت الارز الطرية	٤٤٧	١٢٦	٢٠	٢٨٧	٢٠٦	١٠٢	٢٠٨	٢٦٠	٠٩٢	٨٥	٣٢٨
سنت الارز الجافة	٨٦٠	٢٦٢	٢٠	٥٥٢	١٠٢	٢١٥	٢٠	٠٢٣	٠٩٠	١٦٣	٦١٤
ثقل الحنطة الطرية	١٥٤	٢٠	٠٩	١٠٥	١٠٦	١٠٦	٠	٩٠	٠٩٠	١٢	١٠٧
ثقل الحنطة الجافة	٨٧١	٨٧	١٠٧	٧٤٦	٢٠٨	٦٠٧	٠٩	٦٥٧	٠	٠٨٨	٦٤٤
سنت الشونيز الطرية	٧٠	٠٦	—	٤٧	١٠٢	—	٠٢	٤٠	٠٩٤	٠٢	٥٠
سنت الشونيز المصنوع	١٥٠	١٢	٠١	٩٠	٢٠	٧٧	٠	٨٥	٠٩٤	٠٦	١٠٦
سنت الشونيز المطبوخ	١٠٠	٢٠	٢٠	٧٢	٢٠٢	٥٠	٠	٤٤	٠٩٠	٢٠	٦٥
سنت الشونيز الجاف	٨٨٨	٨٠	٠٦	٥٨٥	١٢٦	١٠٢	—	٤٠٤	٠٧٨	٢٠٦	٥١٩
دبس الحماض	٧٨١	١٠٥	—	٦٠٤	—	٤٠٤	—	٤٠٤	٠٨٧	—	٤٨٠
سنت سيدة	٩٠٠	٨٧	٢٠	٦٠٨	١٣٨	—	٠٢	٥٢٠	٠٨١	٢٠٧	٥٠٥
سنت سكرية	٩١٨	٦٠٧	٠٤	٦٨٩	١٢١	٢٠٤	—	٥٨٧	٠٨٠	٢٠	٥٥٢

ج - الصناعات التصديرية

ثقل الجمة الطرية	٢٢٨	٥٠	١٠٧	١٠٦	١٠٦	٢٠٧	١٠٦	٦٠٦	٠٨٦	٢٠	١٢٧
ثقل الجمة الجافة	٩٠٥	٢٠٦	٧٠	٤٢٢	١٥٩	٤٢٢	١٥٩	٢٠٢	٠٨٤	١٣٧	٤٨٤
ثقل التفاح الجاف	٩٢٢	١٩٥	٧٠٢	٤٨٢	١٤٦	٢٠٨	١٤٦	٢٩٠	٠٨٤	١٢٩	٤٣٣
ثقل التفاح الجاف	٨٩١	١٥٢	٦٠٨	٣٩٧	٢١٠	٤٧	٤٢	٢٠٦	٠٨٢	٢٠	٢٨٧
سنت الخشخاش	٨٧٩	٤٩٢	٢٩	٢٠٤	٠١	٤٢٧	١٠٢	٢٤٨	—	٤٠٠	٦٥٠
ثقل البطاطا الطرية	٥٧	١٠	٠١	٣١	٠٦	—	٠٦	٢٢	٠٩٢	٠	٢٠
ثقل البطاطا الجافة	٩٠٠	٢٤٢	٣٧	٤٠٨	٩٥	١٢٢	٩٥	٢٠٤	٠٩٠	٩٤	٣١٢
ثقل الدرة الصفراء الطرية	٨٧	٢٠	٠٩	٤٥	٠٨	١٢	٠٨	٣٢٢	٠٩٠	١٠	٥٥
ثقل الدرة الصفراء الجافة	٩٠٠	٢٧١	١٢٦	٣٥٦	٩١	١٨٢	١٢٠	٢٥٢	٢٥٢	١٥١	٦٠٦
ملح أخضر	٥٢٠	٦٥	١٢	٣٨١	٤٨	٢٠	١٠	٣٣١	٠٩٠	٢٩	٣٩٩
ملح جاف	٩٢٥	٩٥	٢٥	٦٩١	٩٠	٧٠٦	٩٠	٦٠١	٠٩٦	٥٧	٧١٠

١٨٩٤ - عِلْمُ الْبَحَارِ ، عُضَامَةُ ٥

Océanographie (F). Oceanographie (E).
علم يبحث في علم البحار ونبوتها وما هي عليه من مختلف الأحوال الطبيعية .

١٨٩٥ - عِلْمُ التَّارِيخِ الطَّبْعِيِّ ، عِلْمُ الْمَوَازِيدِ

Histoire naturelle (F). Natural history (E).
علم يبحث في وصف الأسماء وتصنيفها .

١٨٩٦ - عِلْمُ التُّرْبَةِ ، أَغْرُولُوجِيَّة

Agrologie (F). Agrologie (E).
دراسة التربة حكمياً وكبائرياً وبيكانيكياً وبيولوجياً .
وهو أيضاً دراسة الأثرية الزراعية وصلاتها بالزروع .

١٨٩٦ - عِلْمُ التَّصْنِيفِ

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).
هي للتدقيق ، الطبلى .

١٨٩٨ - عِلْمُ التَّعَاجِبِ ، تَرَاتُولُوجِيَّة

Tératologie (F). Teratology (E).
علم يبحث في أسباب غرائب المخلوقات ومن دواهيها .
كالإندماج في العوارب والشملة في النبات والأغراب الخ .

١٨٩٩ - عِلْمُ الْفُتَيَّاتِ

Mammalogie, Mammologie (F). Mammalogy (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في الثدييات دون غيرها .

١٨٩٧ - عِلْمُ الْحَشَرَاتِ ، أَنْثُولُوجِيَّة

Entomologie (F). Entomology (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في تصنيف الحشرات ونبوتها وأطوارها وطبائنها وأضرارها .

١٨٩٧ - عِلْمُ الْحَفَرِيَّاتِ التَّحْدِيْمَةِ

Paléontologie (F). Palaeontology (E).
هو الإحاطة ، الطبلى .

١٨٩٧ - عِلْمُ الْحَيَّاتِ ، حَيَّاتِيَّة ٥

Ophlographie, Ophlogologie (F). Ophlography, Ophlogology (E).
علم يبحث في وصف الحيات وتصنيفها .

١٨٩٧ - عِلْمُ الْحَيَّاتَانِ ، زُولُوجِيَّة

Zoologie (F). Zoology (E).
فرع من التاريخ الطبيعي أو علم المواليد يبحث في الحيوان .

١٨٩٤ - عِلْمُ الْحَيَّاتِيَّاتِ الْفَرَاغِيَّةِ ، زُولُوجِيَّة

Zoologie agricole (F).
Agricultural zoology (E).
الدراسة المفصلة الوافية لجميع الحيوانات المفيدة والمضرة بالزراعة .

١٨٩٥ - عِلْمُ الْخَمَرِ ، صَهْبِيَّة ٥

Oenologie (F).
Oenology (E).
دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعها وتخليطها وحفظها وإمرارها الخ ...

١٨٩٧ - عِلْمُ الْخَيْلِ ، خَيْالِيَّة

Hippologie (F).
Hippology (E).
علم يبحث في الخيل يشمل كل ما ينص به من جميع الوجوه .

١٨٩٥ - عُفْ ، عُفْ

العنف والعنف : غير عاني ورقة الكلب يتبع ويحفف ويطيح به الدم عوضاً عن الخل (١ م).

١٨٩٥ - عُفْطَاس * Ablépharus (S).

Abléphare (F). Ablépharus (E).
جنس زحافات صغيرة من العظائيات وفصيلة السقنقوريات.
أنواعها المبرزة قليلة العدد أسكنها المناطق الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة ، مستدلة التخلية ، تقطع من ١٥ إلى ١٥ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . حوضها صغيرة عادمة الحواجب . أذنانها دقيقة || جميعها ناضجة ، قشياً البدنان والحشرات .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * هي السفة ، الطبلى .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * هي ثغيل الحقل ، الطبلى .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * هو الجلع ، الطبلى .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * Hirudo (S).

Sanguis (F). Leech (E).
علقة ج علق : اسم شامل يطلق على اجناس وأنواع كثيرة من الملق الماسر . يعيش في الماء ، قوته الدم يمتصه شيئاً يستطع .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * Hoemopsis vortex (S).

Sanguis du cheval, S. verte, Vortex (F).
علقة صغيرة القند أسفينة الشكل غصراء اللون ، تعيش في الماء ولقوس وقد تركب الحيوان إذا اقرب منها وهي تؤذي الخيل إذا دخلت أفراسها وطلقت في استنكها لذلك يحسن أنزاعها عند رؤيتها قبل تقلم شرها .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * Sanguis picicole (F).

علقة صغيرة القند تحيلة الجسم تعيش على مختلف الأسماك البحرية والبرية تمتص الدم وقد تسبب الموت .

١٨٩٥ - عُفْطَاس * Anlostoma (F).

علقة صغيرة القند أسفينة الشكل سمراء اللون ، تعيش في المياه العذبة تركب الأسماك والقشريات .

١٨٩٦ - عُفْطَاس

نبت قشبية مذاق صر وضها يتخذ من المكائس ويشرب طيبته لاستسقاء (اللبان) .

١٨٩٦ - عُفْطَاس * Hirudineae (S).

Hirudineae (F). Hirudineae (E).
طائفة من الديدان الحلقية لها رؤيتان أغرطوبيات والحنكيات أكثرها من القوديات ثنائية ومنها الأرضية التي تعيش على الأجار . مهبط المناطق الاستوائية . تتميز بأجسامها المستطيلة الأسطوانية التي تبدو كأنها خالية من الرؤوس قشياً المواد الحيوانية . مظهرها ماسر يمتص الدم .

١٨٩٦ - عِلْمُ الْأَحْيَاءِ ، عِلْمُ الْحَيَاةِ

هي البيولوجية ، الطبلى .

١٨٩٦ - عِلْمُ الْأَصْدَافِ ، كَنْخُولُوجِيَّة

Conchyliologie (F). Conchology (E).
علم يبحث في الأصداف والغار وأشباهها .



عُفْطَاس



ملقة



ملقة الخيل



ملقة نهريّة

والتماز والفيزيولوجية . وعلم النبات الخامس الذي يبحث في التحلية والتصنيف والجغرافية وتختلف العمليات والتأثيرات الزراعية والعلمية والصناعية .

١٨٩٩٢ - علم النبات البحرية ، فيكولوجية

Phycologie (F). Phycology (E).

١٨٩٩٣ - علم الفسح ، إستولوجية ، تساجية

Histologie (F). Histology (E).

علم يبحث في التسج الضوئية والحلايا النشوية في الأحياء .

١٨٩٩٤ - علم النواة ، كاريولوجية

Caryologie (F). Karyologie (E).

١٨٩٩٥ - علم الهواء ، علم طبقات الهواء

Aérolgie (F). Aerology (E).

١٨٩٩٦ - علم أمراض الحيوان

Zoopathologie (F). Zoopathology (E).

١٨٩٩٧ - علم حياة النبات

Phytobiologie (F).

Phytobiology (E).

١٨٩٩٨ - علم قوة السوائل

Hydrodynamique (F). Hydrodynamics (E).

هو علم قوة الموائع من مائية وغيرها .

١٨٩٩٩ - علم وصف النبات

Phytographie (F).

Phytography (E).

رابع نملة .

١٩٠٠٠ - علمانية

Sécularisme (F).

Secularism (E).

العلمانية مذهب فلسفي إنكليزي ينفي الفكرة الدينية في

المسار البشري .

١٩٠٠١ - علمية

Scientisme (F). Scientism (E).

العلمية مذهب فلسفي يعلن التفوق المطلق العلم في كل شيء .

١٩٠٠٢ - علمية

في المنطق . أما كلمة علمية فهي من وضع الأديب

مصطفى الشهابي .

١٩٠٠٣ - علم

Hippotragus, Egcoceros (S).

Hippotragus, Egcoceros (F). Sable antelope (E).

جنس حيوانات لبونة نملة وبانية الإخلاف من بقرة

الوش . أنطاط الحالية ثلاثة جميعها كبيرة القدر قرية

الشي من الارح . قربها طوية حديده كالتسيف العربية

وهي في الذكور أكبر مما هي عليه في الاناث . اذناها كبيرة

مستطيلة . اذناها قصيرة أو متوسطة القدر . اعطائها البلاد

الافريقية . تأوي القبانى والبروج والارحاج . تعيش

بهاجات متوسطة العدد ابلها براوح بين ١٠ و ٥٠ ،

ولها طوب ذكر مانع رائحة من الذكور ال الحسة

ذكور ياقنة لا تحبس بعد . اما الذكور المستقل

من القطعان وتجمع ال بعضها أو تعيش على انفراد .

١٩٠٠٤ - علم لزرق

Hippotragus leucophaeus (S). Hippotragus leuco-

phus (F).

نوع من العلوب وهو اكبرها جنة وانها قوفاً واجلها

شكله يملو نحو ١٦٥ سم . ثوبه ال قزقة اللامعة .

رأسه اسود الجبهة واليالة العريضة . مسرله كل اللياض

١٨٩٩٧ - علم الدواجن ، دجاجة

Zootechnie

علم يبحث في أنسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها

وطرق استغلالها الخ...

١٨٩٩٨ - علم الزراعة

Agronomie (F).

Agronomy (E).

هي العلوم الزراعية أو الأخرى هي دراسة قواعد الفنون

الزراعية التي تسمح بتطبيق العلوم على الزراعة .

١٨٩٩٩ - علم الزواحف ، زحفية

Erpétologie, Herpétologie (F). Herpetology (E).

علم يبحث في وصف الزواحف وتصنيفها وأحوالها

الطبيعية .

١٨٩٩٠ - علم الشرايين

Artériologie (F).

Arteriology (E).

١٨٩٩١ - علم الصحة

Hygiène (F). Hygiene (E).

علم يبحث في حفظ الصحة ووقايتها .

١٨٩٩٢ - علم الصخور ، صتامة

Pétrographie (F). Petrography (E).

علم يبحث في الصخور وتركيبها .

١٨٩٩٣ - علم الصناعات الزراعية ، فيكتولوجية

Technologie agricole (F).

Agricultural technology (E).

درس جميع الوسائل العلمية والعملية المختصة بالصناعات

الزراعية كصناعة السكر والكمون والتبغ والخمر

والجبن .

١٨٩٩٤ - علم الطير ، طيريات

Ornithologie (F). Ornithology (E).

علم يبحث في الطير من جميع نواحيه العلمية والتأثيرية

والاقتصادية .

١٨٩٩٥ - علم الفلد

Adénologie (F).

Adenology (E).

١٨٩٩٦ - علم الكائنات

Ontologie (F).

Ontology (E).

علم يبحث في الكائنات وباعيتها .

١٨٩٩٧ - علم المعادن ، معدنيات

Minéralogie (F). Mineralogy (E).

١٨٩٩٨ - علم المتعولات

Métaphysique (F).

Metaphysics (E).

علم يبحث في اصول المبادئ وفي الملل المبرجة الاول .

١٨٩٩٩ - علم المفاصيل

Arthrologie (F).

Arthrology (E).

١٨٩٩٠ - علم الميكروبات ، ميكروبيولوجية

Microbiologie (F). Microbiology (E).

علم يبحث في تصنيف الميكروبات ووصفها وخصائصها

وبزائها وأضرارها وكيفيةها .

١٨٩٩١ - علم النبات ، بوتانيك ، فينتولوجية

Botanique, Phytologie (F). Botany, Phytology (E).

درس العلوم الطبيعية الذي يتناول النبات وهو قسبان :

علم النبات العام الذي يبحث في الفلزبة والايستولوجية

٣٠٠ منها الحولية والمولدة والمصرة . أصنافها نسبة الإرباء تشمل جميع الاسماع المتعددة الحرارة . معظمها بري وبعضها زينة وطي . سقيا فراءه . اوراقها كالمسة ، متعاقبة ، سائفة النصل . ازهارها مستطيلة الزناد ، لائسامة التجميع والارتكاز || أشهر انواعها ما يتبع .

١٩٠١٣ - عَلُوكُ أَحْمَر * ، سِيلَان طَائِي ، صَمْنَع الدَّيَاب

Silene armeria (S). *Silène à bouquet*, *Astrape-mouche* (F). *Common catchfly* (E). *Gartenimkraut* (D). *Silene a mazetti*, *Aschiappa mosche* (I). عشية حولية برية طيبة مبلولة . ساقها فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها حاشنة . نصلها يقني الشكل جامد الصفة ، عايق الخضار . ازهارها طليقة التجميع ، حمر البلات || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٠١٤ - عَلُوكُ أَخْضَرُ الزَّهَر * ، سِيلَان أَخْضَرُ الزَّهَر

Silene viridiflora (S). *Silène à fleurs vertes* (F). عشية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها عشية . اوراقها سائفة . ازهارها ابطية الارتكاز . بتلاتها ثنائية التجميع خضراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٠١٥ - عَلُوكُ بَحْرِي ، سِيلَان بَحْرِي

Silene maritima (S). *Silène maritima* (F). عشية برية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . مهدا شطوط المنسط ، ساقها ليفية فراء . اوراقها بيفية الشكل ، بحرية اللون ، ازهارها حشكرية التجميع . بتلاتها الى الياض الاصفر اللؤلؤ || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول . يقال انها طيبة تنقي المدة والامعاء .

١٩٠١٦ - عَلُوكُ سَحْلَبِي * ، سِيلَان سَحْلَبِي

Silene orchides, *S. stocion* (S). *Silène orchidées* (F). عشية حولية تربيتية مهدا الشرق اليرسط . ساقها فراء زياء زينة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها صلبة الشكل ، شبيقة النصل الخليل البشرة . ازهارها ودية اللون . بتلاتها مقنطية الاطراف المسنة الملقوة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٠١٧ - عَلُوكُ شَفْطَل * ، سِيلَان شَفْطَل

Silene schafsa, *S. inflata* (S). *Silène schafsa*, *S. enflé*, *Behen blanc*, *Cornillef* (F). *Bladder campion*, *White bottle*, *White ben* (E). *Kropfalmkraut* (D). *Bubbline*, *Mazzettini*, *Strotoli* (I).

عشية ردية معمرة تملو من ٨ الى ١٥ سم . ساقها وطرصها نخيلة . اوراقها بيفية الشكل طويل من ١٠ الى ١٥ سم . ازهارها حراء اللون او بيفاء ، بتلاتها مقنطية الاطراف المسنة || ازهارها يستمر من آب الى ايلول . وفي من البتات العلية . يقال انها تنقي المدة والامعاء .

١٩٠١٨ - عَلُوكُ هَدِيمُ السَّاق

هو حشيشة الدباب ، أطبا .

١٩٠١٩ - عَلُوكُ فَرَنْسِي * ، سِيلَان الدُّبَاب ، لُسَيْعَة

Silene gallica (S). *Silène de France*, *S. à cinq plaies* (F). *Little brown pigs*, *Small flowered catchfly* (E). *Französisches leimkraut* (D). *Silene cinque plaies*, *S. salvatico*, *Mazzettino* (I).

نبات حشيشي طيبي عول ، ساقه فراء زياء تملو من ٣٠

الايبر || موته احراج وبراعي الترانسفال . إجله قليل لمدد يراوح بين ٥ و ١٥ فرداً .

١٩٠٠٥ - عَلَبُ اسُود * ، أَبُو عُرْفُ الاسُود

Hippotragus niger, *Egoceros niger* (S). *Hippotragus niger*, *Egocère noir* (F). نوع من العلب كبير الجثة يملو نحو ١٢٥ سم . قرنه بطول ١٠٠ سم . وهو غليظ الانتشاب ، ذيب الطرف ، حدي الجسم ، سالى الزناد الاخير . ثوبه الى السود اللامع . يملو بفسراء وجليه يمش . موته فسوح الارباء يتد من الجبهة الى الترانسفال . إجله يراوح بين ٢٠ و ٤٠ فرداً .

١٩٠٠٦ - عَلَبُ أَفْئِر * ، أَبُو عُرْفُ الْأَفْئِر

Hippotragus equinus, *Egoceros equinus* (S). *Hippotragus chevalin*, *H. équin*, *Egocère chevalin* (F). نوع من العلب كبير الجثة ، جسمه يملو نحو ٢٢٦ سم . ويعمل نحو ١٥٠ . قرنه لا يفرق عن قرن العلب الاسود شيكاً . ثوبه الى القيرة السوداء ، ياض رأسه قليل الانتشار ، جبل التضخيم ، يكتنف العين من مقدمها ومؤخرها . موته فسوح الارباء يملو من صفات بحيرة فيكتوريا . نيزار الى اطراف السنغال || إجله لا يقاسي المدة يختلف باختلاف اصنافه وسلالته ، يراوح بين ١٠ و ٥٠ لقرأ .

١٩٠٠٧ - عَلَهَج

Eomecon (S). *Eomécone* (F). ينبت نباتات عشية معمرة من فصيلة الحشائشيات . انواعه قليلة العدد ، سقيا فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها قلبية الشكل ، مستديرة القامة . نصلها صمغ الصفة ، مسن الحافة ، جبل الخضار الزاهي . ازهارها ابطية وصاية الارتكاز ، قطرها نحو ٥ سم . لون بتلاتها يختلف باختلاف الانواع منها الياض والودي والبني والورج . اما اسديتها ففسر || ازهارها يستمر ثلاثة شهور تمتد من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

١٩٠٠٨ - عَلَهِيْز *

Pteropaea (S). *Pteropaea* (F). جنس حشرات ذرية من فصيلة الجربيات ودية القراديات انواعه عديدة تستغل حل الخيل والتمز والابقار والارانب تقسب لها الجرب الربط (*Oale humide*) الذي يكتلغ باستعمال بعض الادمان الكبريتية التركيب .

١٩٠٠٩ - عَلُو * ، لَزْنَاع

Hauteur (F). المسافة السويدية من القامة الى القمة .

١٩٠١٠ - عَلُوب * هو سد الحصر ، اطبا .

١٩٠١١ - عَلُوكُ *

Desmodus (S). *Desmoda* (F). *Desmodus* (E). جنس غفافيش من فصيلة الورقيات . انواعه قليلة العدد . اجسامها صغرة طولها يراوح بين ٧٥ و ٨٠ سم . وبعضها من ٣٥٠ الى ٣٦٠ سم . فرائطها اسفينة قصيرة . ازوارها الى الرتبة العلواء الصناعية . جلودها خلية اللمس . موطنها يمم المكسيك والبرازيل والشيلى . تعيش منفردة . ذكورها تقرب انثاهي عند الكرم فقط . قريبا الدم تمصه ايما استطاعت . تألف الاشجار الحرجية وابقاب الصنوبر .

١٩٠١٢ - عَلُوكُ ، سِيلَان ، سِلْنُوس ، تَمَنُوكَة

Silene (S). *Silène* (F). *Campion*, *Catchfly* (E). *Leimkraut* (D). *Silene* (I). جنس نباتات عشية من فصيلة القرنفلات ، انواعه زما



علب اسود



علب افير



علز



علوك احمر



علوك اخضر الزهر



علوك سحلبى



علوك شفعة

الى ٥٠ سم. اوراقها اعطليبية الشكل مستطيلة الزام الاخير
نصلها خلى البشرة اللزجة. ازهارها صغيرة لثقة و رودية
اللون. حلقية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى
آب.

١٩٠٢٧ - عَكِيث

المليث : ان يخلط الشير بالبر الزرارة ثم يصفان
ويصفان مما .

١٩٠٢٨ - عَكِيث

المليث تبث يرقم به ويصف منه الرق (المان) .

١٩٠٢٩ - عَكِيث

مكة بحرية تسمى عطيط ، اطبا .



عكك فرنسي

١٩٠٣٠ - عَكِيث

جنس اشجار ونباتات برية و زينة من فصيلة المشرقات.
انواعها المعروفة اربعة اوراقها مثاقية عابطة. ازهارها
عقودية التجميع تاجي الازتكاز. ازهارها عادة البتلات
سباعية الالدية و سبعة المياس مزدوجة فربلت
المبيض || اعرفها واشهرها العطيط القاري .

١٩٠٣١ - عَكِيث قَارِوِي

نوع من العطيط، مهدد بلاد ايران . ثمرته تملو من ٦
الى ١٢ م. اوراقها عابطة تشبه اوراق تطلو من ٤
الى ١٠ سم. نصلها جامد التسج خلى العروق. ازهارها
تفسجية اللون يعلوها مواج زقوي. ثنائياتها خلية .
اسديتها الى الحرة القانية || ازهارها يستمر من نيسان
الى ايار.

١٩٠٣٢ - عَكِيث

هي القنبلة السوداء ، اطبا .

١٩٠٣٣ - عَكِيث ، عَكِيد ، عَكِيظ

نبته الملف قبل تقديده الى الحيوان قد يكون ان يخلط
الحبوب المحرقة مع الخلطة والكسب والتين الخ. او
يقطع الاعشاب والكلأ كالقصيل والقصب . او بتشيق
الجذور والمسائل كالجزر والفتولدر والبطاطا الخ.



عكك نجيل

١٩٠٣٤ - عَكِيث

هو الصوج ، اطبا .

١٩٠٣٥ - عَكِيثَات

سبط من فصيلة الورديات يدعى المومبيات .

١٩٠٣٦ - عَمَّات

العماء السحاب المرتفع الكثيف .

١٩٠٣٧ - عَمَّاتٌ فَيْجَةٌ

Amata phagea (S). Amata phagea (E).

حشرة من فصيلة العنايات ونية حشرليات الاجنحة .
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة .
فراشتها جارية قوتها رقيق الالوان . مرتبها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود
عيناها كبيرتان . زباناها خيطان . شفها مستطيل .
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة للسواء المواج يتخللها في الفروج الاسامي رقة
من ست بقع ويختلها في الفروج الخلفي بقعة يشه
وتفطان || وراثن الاثى الى الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة

١٩٠٣٨ - عَمَّاتٌ فَيْجَةٌ

Amata phagea (S). Amata phagea (E).

حشرة من فصيلة العنايات ونية حشرليات الاجنحة .
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة .
فراشتها جارية قوتها رقيق الالوان . مرتبها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود
عيناها كبيرتان . زباناها خيطان . شفها مستطيل .
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة للسواء المواج يتخللها في الفروج الاسامي رقة
من ست بقع ويختلها في الفروج الخلفي بقعة يشه
وتفطان || وراثن الاثى الى الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة

١٩٠٣٩ - عَمَّاتٌ فَيْجَةٌ

Amata phagea (S). Amata phagea (E).

حشرة من فصيلة العنايات ونية حشرليات الاجنحة .
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة .
فراشتها جارية قوتها رقيق الالوان . مرتبها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود
عيناها كبيرتان . زباناها خيطان . شفها مستطيل .
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة للسواء المواج يتخللها في الفروج الاسامي رقة
من ست بقع ويختلها في الفروج الخلفي بقعة يشه
وتفطان || وراثن الاثى الى الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة

١٩٠٤٠ - عَمَّاتٌ فَيْجَةٌ

Amata phagea (S). Amata phagea (E).

حشرة من فصيلة العنايات ونية حشرليات الاجنحة .
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة .
فراشتها جارية قوتها رقيق الالوان . مرتبها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود
عيناها كبيرتان . زباناها خيطان . شفها مستطيل .
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة للسواء المواج يتخللها في الفروج الاسامي رقة
من ست بقع ويختلها في الفروج الخلفي بقعة يشه
وتفطان || وراثن الاثى الى الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة

١٩٠٤١ - عَمَّاتٌ فَيْجَةٌ

Amata phagea (S). Amata phagea (E).

حشرة من فصيلة العنايات ونية حشرليات الاجنحة .
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة .
فراشتها جارية قوتها رقيق الالوان . مرتبها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود
عيناها كبيرتان . زباناها خيطان . شفها مستطيل .
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة للسواء المواج يتخللها في الفروج الاسامي رقة
من ست بقع ويختلها في الفروج الخلفي بقعة يشه
وتفطان || وراثن الاثى الى الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة

١٩٠٤٢ - عَمَّاتٌ فَيْجَةٌ

Amata phagea (S). Amata phagea (E).

حشرة من فصيلة العنايات ونية حشرليات الاجنحة .
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة .
فراشتها جارية قوتها رقيق الالوان . مرتبها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود
عيناها كبيرتان . زباناها خيطان . شفها مستطيل .
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة للسواء المواج يتخللها في الفروج الاسامي رقة
من ست بقع ويختلها في الفروج الخلفي بقعة يشه
وتفطان || وراثن الاثى الى الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة

الى ٥٠ سم. اوراقها اعطليبية الشكل مستطيلة الزام الاخير
نصلها خلى البشرة اللزجة. ازهارها صغيرة لثقة و رودية
اللون. حلقية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى
آب.

١٩٠٢٠ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene compacta (S). Silene compacta (F).

حبة زينة حولية ، مهدد الشرق الاوسط . ساقها فرما:
تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اعطليبية الشكل متدخعة
الناطقة و ذوية الزام الاخير المذهب النعسة . نصلها
جامد التسج ، بحري اللون. ازهارها حامية الازتكاز، حلقية
التجميع ، لينة . بتلاتها فضية الشكل و رودية اللون .
ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٠٢١ - عَكُّكٌ مُزْهَرٌ ، سِيلَانٌ مُهْدَبٌ

Silene hispida (S). Silene hispida (F).

حبة حولية يونانية المهد، ساقها فرما تملو من ١٥ الى
٣٠ سم. اوراقها ثنائية التصل خلية البشرة . ازهارها
عقودية التجميع ثنائية الانقسام و رودية اللون || ازهارها
يستمر طوال فصل الربيع .

١٩٠٢٢ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٣ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٤ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٥ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٦ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٧ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٨ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٢٩ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٠٣٠ - عَكُّكٌ كِيدٌ ، سِيلَانٌ كِيدٌ

Silene astarte (S). Silene astarte (F).

حبة سبروتية معمرة ، مهدد حطاب مغربية وهي من
النباتات القائمة الاعتقال الزيتي . ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون ، حلقية التجميع .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .



عمات فيجة

ال ١٠٠ سم. أوراقها قرصية الالتشاب خفيفة ذرية
تطول من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. وتعرض من ١ إلى ٣ سم.
نماتها استغنية الصفحة || أزهارها حامية الارتكاز
مخلفة للإبران واشكال التجميع || اشهر انواعه الزينية
الناتج الصواني .

١٩٠٩٣ - عنبّار صيواني *

Butomus umbellatus (S). *Butome en ombelle*, *Jonc fleuri* (F). *Flowering rush*, *Lily grass* (E). *Doldiger Wasserliesch*, *Blumen-Rohr* (D). *Butomo*, *Biodo*, *Giunco fiorito* (I).

نوع من النبات وهو نبات متعقي سبروتي مسمر. أوراقه
تطول من ٨٠ إلى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٢ سم.
شراخه الزهري يطول نحو ٨٠ سم. أزهاره صيواني التجميع.
أزهاره كثيرة العدد وريدة الفصائل والريشات ، قطر الزهرة
الواسعة نحو ٣ سم || أزهاره يشتر من حزيران
إلى آب .

١٩٠٩٤ - عنبّاريات *

Butomaceae (S). *Butomacées* (F). *Butomaceae* (E).
فصيلة نباتية من سيدات القلفة بلورها عادمة الأسبن .
اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها متعقية او مائية .
اشهر اجناسها النبات .

١٩٠٩٥ - عنبّاسه *

Porthetis elephas (S). *Porthète* (F).
نوع من الجناب من مستقيات الاجنحة وفصيلة المراءيات.
اصطفا جميع المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها
كبير القدر يطول نحو ٤٥ سم. عند الذكر ، ويطول من
٧٠ إلى ٧٥ سم. عند الانثى . نوبها الى الكهبة السمره .
راسها كبير الحجم . زناهاها لافندي الشكل . كويلها
مبين القدر ولحم الحمار النجسي يشرف على قمة الرأس .
قوائمها الحلقية كبيرة ، مستطيلة ، مفشارية القنايب ،
معدة لقفز || تجرب المراعي والمواقع الرطبة حيث تكثر
الامشاب . مسرها نهاري . تظهر في حزيران وتبقى
حتى اواخر آب .

١٩٠٩٦ - عنبّاسر *

Eléments (F). *Elements* (E).
الناصر هي المواد البسيطة التي يعتبرها العلم الحالي غير
قابلة التجزئ . الايسط || يعرف منها نحو ٩٠ تقسم الى
ثنتين : فئة الناصر الفلزية المعروفة بالمعادن وفئة الناصر
اللافلزية .

١٩٠٩٧ - عنبّاسر غذائية *

Eléments nutritifs (F). *Nutritive elements* (E).
هي الناصر التي يتركب منها غذاء النبات والناصر
الغذائية تقسم الى اربع فئات : - الاول : الناصر
الرئيسية وهي الآزوت ، فوسفور والبوتاس .
الثانية : الناصر الاولية وهي الكالسيوم والمغنيزيا والحديد
والكبريت - الثالثة : الناصر الثانوية وهي الصوديوم
والسليسيوم والكلور - الرابعة : الناصر الثالثية وهي
البورون والمغنيزيا والنحاس والزنك والارنيك والرصاص الخ .

١٩٠٩٨ - عنبّاق

النجم الحثالي ، أي الذي يلي الثقله ، من كوكبة بنات
نمش الصغرى . والى جانبه قاتل صغير وزائيه ايضا عناق
والى جانبه الصليق وهو سهى والثالث الحور .

١٩٠٩١ - عنبّيس *

Aphoticus (F). *Aphotic* (E).
عيس م . حيمه . تمت تعريفه يطلق في الجيولوجية ،
على كل منطقة عادمة التنور كجبة البحر البعيدة التنور .

١٩٠٩٢ - عنبّيق

Via

١٩٠٩٣ - عنبّاب *

Zizyphus seiva, *Z. vulgaris*, *Rhamnus zizyphus* (S).
Jujubier, *Gingecoller* (F). *Jujube tree*, *Zizyphus*, *Indian jujube* (E). *Jujubebaum* (D). *Giuggiolo* (I).
شجرة شمرة شائكة من فصيلة التيقيات . أوراقها عابله ،
متعاقبة ، صغيرة ، بيضه ، لامعه ، مسنة . ثمارها صغيرة
القد ، صفراء اللون ، عبقورية التجميع . ثمارها زيتونية
الشكل والرائحة ، لمساء البشرة ، عناية اللون عند النضج ،
مأكولة ، لها الى البياض الاصفر وهو كثير المنافع
الصحية ويقيه الصدر .

١٩٠٩٤ - عنبّاب بريّ هو الفضال ، اطلبه .

١٩٠٩٥ - عنبّابة

Jujube (F).
ثمرة العنباب وهي مأكولة جزيلة الطعم الصحي وتفيد
الصدر .

١٩٠٩٦ - عنبّاج السرمق *

Pennis quadrata (S).
حشرة من الجنابيات ، طولها نحو ٣ سم . جسمها بسيط
الشكل المستطيل . نوبها الى الخنثى الاخير . بطنها يندبها
الى الحشرة || تظهر الحشرة الكاملة في نوبان فتكروم
وتضع مكنها في ايار على مختلف اوراق السرمقات وانحسا
الشوننر فيقتل بعد مضعه بامبوين || اجبالها الحولية
تراوح من اثنين الى ثلاثة . رفاقها نمة تنحصر حصاده
الاوراق فتضميها ويحبسها وقد تنخر الجلود لتصلها .

١٩٠٩٧ - عنبّاج الشوك *

Tingis cerat (S). *Tingis des chardons* (F).
حشرة من الجنابيات ، طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم .
نوبها حنثي اللون يطول تسليح وتكطيط . منها اسود .
تعيش على مختلف انواع الشوك ونباتات فصيلة المركبات .

١٩٠٩٨ - عنبّاج ملتحق *

Goldene maculé (F).
حشرة من البيريات تدعى بيري ملتحق ، اطلبها .

١٩٠٩٩ - عنبّاجيات *

Tingidae (S). *Tingidae* (F). *Tingidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد . تتميز بصغر فعا وبروانها الفصدية
التركيب ، الشبيكة الرئوي . ارساغها ثلاثية الفواصل .
امتلاكها لاصلة تنور في اعماق عميقة || جميعها من
الحشرات الخاملة تعيش على اوراق ثنيات وجنود .

١٩٠٩٠ - عنبّال

Cocher (la) (F).
الناتج كوكبة مجرم شمالية الموضع تدعى ذو الامة ، اطلبها .

١٩٠٩١ - عنبّاز هو القلق الحشي ، اطلبه .

١٩٠٩٢ - عنبّار

Butomus (S). *Butome* (F).
جنس نباتات مسمرة من فصيلة المناريات . انواعه قليلة
نحو خمسة : ثلاثة منها متعقية واثنان مائتان . جلورها
جلودرية مدادة . سورها شمراعية متعقبة تنمو من ٥٠



عنباب



عنباج السرمق



عنباج الشوك



عنباب صيواني



عنبابة

١١٠٩٩ - عُتَاق الْأَرْض

عتاق الأرض نجم من كوكبة المرأة المسلسلة .

١١١٠٠ - عُتَاق الْأَرْض *

Lynx caracal, *L. melanotis* (S). *Lynx caracal*, *L. a. oreilles noires* (F). Caracal (E).

ومن اسمائه : اللغظ والنمجل والنجيل والفراتق . نوع من اللوش من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس . موطنه فصيح الإرياء يمتد من تركيا إلى سورية والجزيرة والبراق وأيران والأندلس وألمند ومن الحيشة إلى أفريقيا الشمالية . وهو كبير الجثة رقيق العظام ، طوله يراوح من ٧٠ إلى ٩٠ سم . ارتفاعه ٥٥ إلى ٥٥ سم . أما ذنبه فين ٢٢ إلى ٣٥ سم || ثوبه يخطف باللبسة إلى البلاد التي يعيش فيها وهو دائماً سوي اللون المرقوش بالأصفر الاسمر والاسمر الجازري . بهله إلى البياض الاسفر . أذناه كبيرتان ذلعتان طولهما خمسة من الشعر الاسود المنقصب || يألف الكهوف والأدغال وأحراج السنط والقمرو .

١١١٠١ - عُتَاقِيَّةٌ فِي الْقَضَابِ ، أُطْلِقَ .

١١١٠٢ - عُتَاقِيَّةٌ ، رُتَبَاتُ . *Aranides* (F). *Aranida* (E).

رتبة من الشكبيوتيات فصائلها وأجناسها كثيرة العدد ، أشهرها الشناكب المرفقة .

١١١٠٣ - عُتَاقِيَّةٌ ذَيْبِيَّةٌ فِي الْخَنَزَقِ ، أُطْلِقَ .

١١١٠٤ - عُتَاقِيَّةٌ ، عُتَاقِيَّةٌ . *Aranides* (F). *Eutacidae* (E). *Cobwebby* (E).
نمت وصفي يطلق في بعض اجزاء النبات التي تشبه الشناكب أو شها .

١١١٠٥ - عُتَاقِيَّةٌ . *Râne* (F). *Rain* (E).
هو سير اللجام .

١١١٠٦ - عُتَاقِيَّةٌ

Impotencia sexualis (F). *Sexual impotence* (E).
خلل في الجهاز العصبي يمنع الحيوان عن أداء فريضة الكوم الطبيعية . وهي كثيرة في الذكور قليلة في الاناث .

١١١٠٧ - عُتَاقِيَّةٌ . *Rabin* (F). *Grapes* (E).
ثمر الكرمة . ج . أعقاب والأحادية عنب .

١١١٠٨ - عُتَاقِيَّةٌ الْبَحْرُ .
هو اسماء المزدوج السنايل ، أطلقه .

١١١٠٩ - عُتَاقِيَّةٌ الْبَحْرُ . *Raisin de table* (F). *Table grapes* (E).

هو العنب المأكول من أي شرب كان تمييزاً لأصناف الحور والكحول .

١١١١٠ - عُتَاقِيَّةٌ الْبَحْرُ . هو الفتاة ، أطلقه .

١١١١١ - عُتَاقِيَّةٌ الْحَيَّةُ . هو الفاسر السوداء ، أطلقه .

١١١١٢ - عُتَاقِيَّةٌ الْبَحْرُ . هو البيران ، أطلقه .

١١١١٣ - عُتَاقِيَّةٌ الْبَحْرُ . هو البرق ، أطلقه .

١١١١٤ - عُتَاقِيَّةٌ الْبَحْرُ . هو كركوب كير . أطلقه .

١١١١٥ - عُتَبَرُ الْفَرْكَبِ . هو المسفرة ، أطلقه .

١١١١٦ - عُتَبَرُ الْفَرْكَبِ

هو التوارية للكتية ، أطلقه .

١١١١٧ - عُتَبَرُ الْفَرْكَبِ . هو البياض ، أطلقه .

١١١١٨ - عُتَبَرُ . هي الأتج ، أطلقه .

١١١١٩ - عُتَبَرُ . *Ambass* (S). *Ambasse* (F). *Ambassis* (E).

جنس اسماء بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة القرعيات . أنواعها المرفقة ثلاثة ، أصلاتها أخوار مصبات الأنهر المحتية || أجسامها أحليجية الشكل ، صغيرة القند ، أطولها تراوح من ١٢ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقطوعة الاغصان ، كبيرة العين الجاحضة . زعانفها الظهرية شبه هرية الشكل . زعانفها الذيلية غاية . أنفها تراوح من الحطلة اللحية المالح إلى الحطلة الغضبية || حولها فاعرة الصفن مرفوق فيها .

١١١٢٠ - عُتَبَرُ . *Ambre* (F). *Amber* (E).

مادة راتنجية بحرية صلبة تقع في عدة أشكال واللوان انصبا الاصفر والاشهب .

١١١٢١ - عُتَبَرُ *

Physeter (S). *Cachalot* (F). *Spermwhale* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحيات ذات الأسنان . أجسامها حادة المقع ، وشمية الشكل ، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م . رؤوسها ضخمة ، محيطها يراوح بين ٧ و ٩ أمتار . أسنانها كبيرة القند ، صفراء اللون . طول بدن الواحدة نحو ٢٤ م . وضع زرعها من ٥ إلى ٦ سم . أولادها إلى الحطلة الرصاصية الزرقاء اللون ، تتبع مع القربان من الفهر وقبعر عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش بجماعات كبيرة ، سرها يمد من عشرة أزواج إلى مئة زوج .

١١١٢٢ - عُتَبَرُ بُولِي . هو حب السك ، أطلقه .

١١١٢٣ - عُتَبَرُ دُمَاعُ *

Liquidambar (S). *Liquidambar* (F). *Sweet-gum tree* (E). *Amberbaum* (D). *Liquidambar* (I).

جنس أشجار برية وزراعية من فصيلة القنليات . النوع قليلة ، سوقها جالسة منتصبية ضخمة . أوراقها حاملة ، كبيرة القند ، معتقة ، متعاقبة ، مدببة المنصوص . أزهارها وحيدة المسكن ، قنية التجميع . ثمرها جراد سباعية الاغنية ، يزورها صفيرة مجنحة || يستخرج من خام سوقها ، بالخر ، مئة عنبرية ذكية اللون ، طيبة ، حرة الاستعمال تلشت الشيق وتقوي البقاء || أشهر أنواعها الثلاثة التالية .

١١١٢٤ - عُتَبَرُ دُمَاعُ أَمْرِيكِي ، عُتَبَرُ سَاكِلِي ،

Liquidambar styraciflua (S). *شجرة الميعة* .

Liquidambar à styrax, *Copaine d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanischer Amberbaum* (D). *Storax liquida* (I).

شجرة هرية الشكل تملو من ١٥ إلى ٤٠ م . أصلاتها البلاد الأمريكية . أوراقها خالية تقصيص خلية الاغصان ، شابقتها الزهرية صفراء اللون ، غصنها المالح . ميعتها فاعرة الصفن شاملة الاستعمال .



عتاق الأرض



عنبس



عنب



عنب دماع

المروفة قليلة العدد اصطلاحاً بعض اصقاع المالن القديم والجديد . ترب في المايق الرطبة انحصا حواشي المناق ويجاري الماء || سيقها لينة او خشوية ، منطبعة ، فراء اورلقها صغيرة ، متماعقة ، منطبعة ، منطبعة ، فراء لينة || انوارها مرطبة مستطيلة المايق ، رباعية الاطراف ، بيضاء اللون . ثمارها عنية ، مكورة ، حراء اللون ، حامزة الطعم قبل النضج التام || ثمارها الناضجة ترب .

١٩١٣٣ - عَبُوت ٥
Tricholoma (S).
Tricholome (F).

جلس بطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات . انواعها المروفة زهاء ٤٥٠ . اصطلاحاً معظم اقاليم مناطق البلاد المختلفة الحارة . يودها ابيض اللون . اطرافها حادة الاطراف ، منطبعة لبد التجميع وبعضها قارق . تعيش على المواد النباتية المنحلة . معظم انواعها كامن الصنف .

١٩١٣٤ - عَبُوت اَبَس ٥
Tricholoma album (S). Tricholome blanc (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه منطبعة القاعدة ، فراء اللون . اروسوت بيضاء ، عاجية المايق ، قطرها نحو ٩ سم . اطرافها متقاربة بيضاء اللون .

١٩١٣٥ - عَبُوت اَخَر لَامِع ٥
Tricholoma rutileum (S). Tricholome rutilant (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد على جلوع الاشجار النخرة . ساقه الى الخضرة الصفراء المايق . اروسوت حراء اللون يطولها مويج اسطع ، قطرها نحو ١٥ سم .

١٩١٣٦ - عَبُوت جَبَّار ٥
Tricholoma colossus (S). Tricholome géant (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في الغابات . ساقه ضخمة ، سمراء اللون . اروسوت كبيرة ، قطرها نحو ٢٠ سم . لونها الى الشقعة السمراء يطولها مويج اصفر .

١٩١٣٧ - عَبُوت دَكَمِي ٥
Tricholoma columbetta (S). Tricholome petite colombe (F).

نوع من العنبوت المأكول . يوجد في الغابات ومراج السديان . ساقه بيضاء تملوها ، عند قاعدتها ، رقة غصراء . اروسوت بيضاء اللون او وردية ، قطرها نحو ٨ سم .

١٩١٣٨ - عَبُوت رَكِيح السَّاق ٥
Tricholoma stricipes (S). Tricholome à pied étancé (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في المراعي والغابات . ساقه رقيقة متصببة لونها الى البياض الاخير . اروسوت مظلمة الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض المايق .

١٩١٣٩ - عَبُوت صَابُونِي الرَّاكحة ٥
Tricholoma saponaceum (S).
Tricholome à odeur de savon (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في الغابات والمراج . اروسوت لاقباسة القطر ، مظلمة الشكل ، لونها الى الربعة الخضراء المايق ، طعمه ورائحته كصابون .

١٩١٢٥ - عَبُوت دَّمَاع شَرَقِي
Liquidambar orientalis (S). Liquidambar oriental (F).
شجرة كبيرة القدر تملو من ١٥ الى ٢٥ مترًا . اصطلاحاً بلاد الشرق الاوسط . اورلقها خالصة التفصيص . فصوصها قليلة الشكل ، عادمة التنتين . نصلها مائل البشرة يصفر عند الاضواء دون ان يكتنفه الاحرار المهيود . شبايقها الزهرية بيضاء اللون يطولها مويج اسفر || ميتها غزيرة للمادة متصلة الصنف .



عبرة

١٩١٢٦ - عَبُوت دَّمَاع فُرْمُوزَا
Liquidambar formosana (S). Liquidambar de Formose (F).

شجرة كبيرة القدر تملو من ١٥ الى ٢٥ م . اصطلاحاً الصين واليابان . اورلقها ثلاثية او خماسية او سباعية التفصيص . فصوصها مسطحة المائلة . اصقلها ورويقها خلية البشرة . شبايقها الزهرية بيضاء اللون يطولها مويج وردي || ميتها غزيرة للمادة متصلة الصنف .



عبلس

١٩١٢٧ - عَبُوت كَسْمِيرِي هُو التَّيرْدِيَاءُ الطَّيْبَا
Succinea (S).
Ambretta (F). Succines (E).

جنس حوانات قازية وبيرة من الرغويات مديات الاجل وفضيلة الخرزويات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . بعضها قارب ويمش على النباتات المائية وبعضها بري ويمش بين الطحالب قرب صفات مجاري الماء || اصقلها شبه بيضية الشوزن ، صغيرة القدر ، رمية القوالب ، دقيقة الاطراف المزلزة || تتميز بدم اصقلها استقبام الاجسام .



عنبت
احمر لامع

عنبت
ابيض

١٩١٢٩ - عَبُوتِيَت
Physcariidae (S).
Physcariidae (F). Physcariidae (E).

فصيلة حوانات بيرية لبونة من مرتبة مَحَلَّات الاسنان وردية الخرزيات || اجناسها المروفة ستة منتشرة في جميع اقطار المناطق المعتدلة الحارة . مطبها الحياتي جامي . اجسامها تجد من ١٥ انزواج الى ١٥٠ زوجاً || اجسامها ضخمة ، شبه وشية الشكل ، قطرها ٣ انسا الى ١٨ مترًا || اعرف اجناسها العنبر والاسطم والرمية .



عنبت
دلي

عنبت
جبار

١٩١٣٠ - عَبُوتِيَرِين
Ambréine (F).
العنبرين مادة بيضاء تستخرج من العنبر الاشهب ، عادمة الرائحة والطعم ، لا تلوذ في الماء ، تلوذ في الكحول والايتر .

١٩١٣١ - عَبُوتِيَس ٥
Anableps (S).
Anableps (F). Anableps (E).

جنس اسماك بيرية سرلوقة من مفتوحات المثانة ليات الزعانف وفضيلة البنيان . انواعها المروفة قليلة العدد اصطلاحاً اهر امريكا الاستوائية . تعيش في المايق التي يقل فيها انسياب الماء وتكثر فيها النباتات المائية . اجسامها شبه وشية الشكل تملو من ٢٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها صغيرة وزعانفها كذلك باستثناء الخوضية والذيلية الكبيرة القدر الشانية الشكل || ويتميز العنبرين بينية الكبريتين المفسوتين ، اقنبا ، الى قسم علوي يشاهد ما يجري فوق سطح الماء ، وقسم سفلي يشاهد تحت سطح الماء .



عنبت
صابوني الرائحة

عنبت
رقيق الساق

١٩١٣٢ - عَبُوتِيُوب
Oxycoccus (S). Oxycoccus (F).
جنس نباتات مدادة مصرعة من فصيلة الملتحيات . انواعها



عنثوث قاروس

ويجدها في المناطق والنيانج || اجسامها متفولة القد ،
يكثر فيها الصفر . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متفولة
عنه الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ،
مركبة من ١٦ فصلة . مرافقها قصيرة ، ملاصقة مستطيلة ،
رباعية العقلى . كواسلها عمودية . بطونها مغنية الشكل .
رواشنها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها مستطيلة ||
يرقاتها ديدانية الشكل ، تعيش كامل طورها البرقي في المنقح
الشجر اجناسها المنبيل .

١٩١٤٦ - عتثي .
Baccifera (F). Bacciferous (E).
كل نبات عتثي الشكل .

١٩١٤٧ - عتثي .
Ural
تمت تفرعي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالنمب .

١٩١٤٨ - عتثي .
Bale (F). Berry (E).
القشرة العتثية كمرعة عتثية غير متفولة لا نواة لها بل تحوى
زرة واحدة بذور كالتنية .

١٩١٤٩ - عتثي .
Impotence (F). Impotence (E).
عجز ذكر الحيوان من القيام بوظيفته التناسلية .

١٩١٥٠ - عتثي .
Stalle (F). Stall, Box (E).
الحطيرة من خشب تمل الكليل .

١٩١٥١ - عتثية .
Entada (S).
Entada (F). Entada (E).
جس نباتات عمرة برية وتربانية من فصيلة القرنيات
وسيط السطيات . انواعها المعروفة مشرة منها الشجيرات
والجنيات المتسلقة . منبها الاسفاح الحار . اوراقها
مقابلة مركبة ريشية شعبة . ازهارها ستابل متتابة
مقنونة التجميع ثنائية الارتكاز . ازهارها صيرة القد
متتابة ، ليفة ، صفراء اللون . ثمارها بذور طيبة مقينة
تغلغلها مادة غطائية لزجة تشمل في الهند لتنظيف شعر
الرأس .



عتثية

١٩١٥٢ - عتثي ، عتثي .
Aisle (F). Robber-By (E).
جس حشرات قاتصة مفترسة من فصيلة العتثيات .
انواعها عديدة مظهرها متوسط القد جزيل النفع بقضي
على الحشرات الضارة || اشهر انواعها ما يتبع



عتثر الشراطي

١٩١٥٣ - عتثر الشراطي .
Philonox siliceps (S).
Aisle des sables (F).
حشرة من العتثيات ، طولها يراوح بين ١١ و ١٤ م .
نورها حنطي اللون ، الجمل المراج . عيونها خضراء ،
حلب جسمها واربطها بيض . تكثر في الاماكن القاحلة
وفوق دبال الشراطي من ايار الى ايلول . تقترس مسا
استطاعت قصه من الحشرات .

١٩١٥٤ - عتثر السكاسكس .
Machimus pyraea (S). Aisle pyraea (F).
حشرة من العتثيات ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٥ م .
نورها الى السرة . حلقها ابيض اللون . تكثر في الاماكن
الطليقة . تقترس السكاسكس للاباب .



عتثر النحل

١٩١٥٥ - عتثر النحل .
Dasygogon teutonius (S).
Aisle teuton (F).
حشرة من العتثيات ، طولها يراوح بين ١٢ و ١٦ م .
جسمها اسود اللون ، جوشها اصفر . يكثر ويوجد في

١٩١٤٠ - عتثوث قاروس .
Tricholoma
aquestre (S). Tricholome aqestre (F).
نوع من العتثوث المأكول . يوجد في سراج العتثويات .
اوسمته الى الصفار المنش بالاسمر ، قطرها نحو ٨ سم .
اطرافها الى الصفار اللامع .

١٩١٤١ - عتثوث كبريتي اللون .
Tricholoma
sulfureum (S). Tricholome couleur de soufre
نوع من العتثوث الكاكن الصف . يوجد في الغابات .
اوسمته كبريتية اللون ، قطرها نحو ٤ سم . اطرافها
متباينة . رائحة تشبه رائحة الفانز .

١٩١٤٢ - عتثوث مدع .
Tricholoma
portentosum (S). Tricholome pretentieux (F).
نوع من العتثوث المأكول . يوجد في الغابات . اوسمته
الى الوردية السمره بطولها مروج بنفسجي ، قطرها نحو
٩ سم . اطرافها الى البياض الاخير .

١٩١٤٣ - عتثوط الخسكان .
Clyra seraphacidis (S).
Clyre des sureaux (F). Clyra seraphacidis (E).
حشرة واسمة غاصلة من فصيلة الخساريات ورثة مفيدات
الاجنة . تألف البراري والمواقع الرطبة ومغلفات مجاري
الماء . عتثاتها تعيش على اثمار الخان والصفصاف .
يرقاتها تعيش على صفت التيجليات واوراق الصفصاف
والخان || جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ٩ م . نورها
برتقالي اللون اسود الرأس والتفتيح الكليل والتجديد العتدي .
راسها صغير الحجم . عتثاتها صغيرتان ، زبانا خيطيان .
ظهورها ثنائي التجديد رباعي النقط اسود . غمداهما متشابهة
التعزيز ، اللثقي . اسرافها رباعية العقلى الظاهرة || لها
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل
حزيران ويقتى حتى اواخر تموز . كسر في النهار ويبيت
في الليل || البرقة عنه بطولها الادراك الشام طول نحو
١٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقوس ، اسمر
سداسي الراجب ، حنطي اللون ، اصفر المراج ، اسمر
الرأس والراوجب || طور الاكمال الذي يتفقي في القرية
يشتد نحو اربعة اسابيع .

١٩١٤٤ - عتثول .
Psychoptera (S).
Psychoptère (F). Psychoptera (E).

جس حشرات من فصيلة العتثويات ورثة ذوات الجنحين .
انواعها المعروفة عشرة اجسامها بمس مناطق البلاد المعتدلة
الحارة والمنسرة نحو البرادة || اجسامها تطول من ٧ الى
١٢ م . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، مقاربة عنه
الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١٦
فصلة . مرافقها قصيرة . ملاصقة شديدة الطول ، رباعية
العقل . كواسلها عمودية . بطونها مغنية الشكل . رواشها
قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها بالغة الطول ||
تألف المناطق ومغلفات مجاري الماء ، قوتها رقيق الانهار .
يرقاتها دامتة تعيش كامل طورها البرقي في المنقح والاسمال
على المواد النباتية المنحلة .

١٩١٤٥ - عتثويات .
Psychopteridae (S).
Psychopterides (F). Psychopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجنحين . اجسامها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اسواق العالم . يكثر



منر زُبُورِي



عتيل



عتيل نقيط



عتيد



منجد جميل



عنجنوس

ايار الى آب . تقترس معظم عشائيات الاجنحة اخصها النحل وهي بلك تختلف من ريفاتها النافسة .

١٩١٥٦ - عُنْتَر زُبُورِي *

Asilus crabroniformis (F). *Asile frolon* (F).
حشرة من العُنْتَرِيَّات ، طولها يراوح بين ١٦ و ٣٠ سم .
نوبا الى الجفوة السوداء . رأسها أصفر . زياتها الى
السود . اربطها الى الصبغة الصنائية . مسرعا الحقل
والبياتين . تكثر من حزيران الى ايلول . تقترس الذباب .

١٩١٥٧ - عُنْتَرِيَّات *

Asilidae (S). *Asilidae* (E).
فصيلة حشرات قانصة مقترسة من رتبة ذوات الجناحين .
اجناسها وانواعها عديدة جميعها متوسطة الحجم ، قوية الاربيل
الزبد ، مستطيلة البطن ، غليظة الصدر والرأس والمخونات ،
قصيرة العظم ، قوية التآكير ، نشطة الحركة ، سريعة
الطيران || مكنها ونحي الشكل ، اخير اللون ، تمتح
بدون انتظام على الاغصان والاشجار وشايل الزروع
وانصاف الشجر واُزراقها وفي الزبل والبن || ريفاتها
عناشيه ، دامت به تكون تعيش في الرية
تفضل الدبال والرمال ويكثر وجودها تحت الحطب اللدن .

١٩١٥٨ - عُنْتَلَة *

Gonomothylus (F). *Gonomothylus* (E).
تصاب فريزي ، ذكور انفاله ضحية اما اناته فتفتره .

١٩١٥٩ - عُنْتِيل * ، نُهَيْد *

Trochus (S). *Trochus*, *Topp-shell* (E).
جلس حيوانات مجرية من الرغويات منيات الاربيل
وصيلة العنثليات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد
أصلها بمجر البلاد الحار . تعيش على الصخور المعروفة
قرب الشواطئ || اصداها غروطية كبيرة القشـ حيلة
الزوايق الحاربية ، ولؤلؤة المسحات الداخلية . اجناسها
عازلة كبيرة . رؤوسها صغيرة ثنائية القواس المربعة .
اربطها مهدية الحمار . اصداها قزينة المادة || اصداها
صناعية ولوحها مأكولة .

١٩١٦٠ - عُنْتِيلِيَّات ، نُهَيْدِيَّات *

Trochidae (S). *Trochidae* (F). *Trochidae* (E).
فصيلة حيوانات مجرية من الرغويات منيات الاربيل
اماميات الخياش . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد
أصلها بمجر البلاد الحار || اصداها غروطية شبه حورية
الشكل متباينة الاجسام والقوايق الحاربية . صفاها
داخلية مائلة ناعمة ولؤلؤة اما الحاربية فمشقة || اعرف
اجناسها واشهرها العنليل .

١٩١٦١ - عُنْتِيلِيَّات *

Anabacidae (S). *Anabacidae* (F). *Anabacidae* (E).
فصيلة طير من الجواث منيات المتأثير . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد شائعة الانتشار في معظم اقطار البلاد
الاستوائية والحارة || اجناسها رفيقة ، متوسطة القد او
صغيرة متقلدها مستطيلة قليلة التقوس . اذنانها مستطيلة
رتاجية الرئال .

١٩١٦٢ - عُنْتِيل نَقِيط *

Melanotus robustus (S). *Melanotus robustus* (F).
حشرة ناعمة مقترسة من فصيلة السالوات ورتبة منهدات

الاجنحة . تألف الحقل المزودة والادغال . عنافها
تعيش على اوراق النباتات البرية . ريفاتها تركب جلور
النباتات الحولية من الاغصان البرية الى الدرة وديار
الشس والبطاطا والشولنر والجزر ولا تمت من الحشرات
الدنيا فتفترسها || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى
١٧ سم . قويا الى الكسبية اللامع . رأسها متوج بانوار
حلالي الشكل . فكها كيربان . زياتها عيطيان . عيناها
صغيرة . ظهورها بلخ التحزيز الفضي . اسرافها خامية
الشفل || جيلها رهاهي الحقل . تظهر الحشرة الجبلدة في
اوائل ايار ويقتى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل .
تسافد في حزيران . اناثها قزرة انابيب المكن تحت حلاء
الاجبار او في سراديب الحشرات الحاشية او في الرية ||
البرقة عند بلوغها الادراك انتام تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .
جسمها سلكي الشكل ، اصفر اللون امير الموج .

١٩١٦٣ - عُنْتِد *
Raisin sec (F). *Raisin* (E).
هو الزبيب وقيل الاسود من الزبيب .

١٩١٦٤ - عُنْتِد * ، شَوْلَة بَيْطَهَاء ، لُبَانَة

Euphorbia resinifera (S). *Euphorbia à résine*, *E. résinifère* (F). *Euphorbium*
gum-plant (E). *Wolfsmilchgummi* (D). *Euforbo* (I).
نوع من الفربيون وهو نبات لحمي برقي مسمر يعلى من
٥٠ الى ٢٥٠ سم . غصاها سفلة ربابية الزوايا ، لونا
الى الاخضر اللامع الاطلس الموج . لباته غزيرة المادة
الجسالية الشديدة التفاعلية الشائعة الاستعمال الطبي .

١٩١٦٥ - عُنْتِد جَمِيل * ، بَيْت النَقِيط

Euphorbia pulcherrima, *Poinsettia pulcherrima* (S). *Euphorbe superba*, *E. écarlate*, *Fille de consul* (F). *Poinsettia*, *Easter flower*, *Flame-leaf* (E). *Weihnachtsstern* (D). *Poinsettia* (I).
نوع من الفربيون وهو جنبة زرقية معمرة تاجو من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقه حراء اللون غنية التجميع مشقة ||
نصلها يضيي بشكل ، اذني القاعدة ، ذوب الزام الاخير .
ازهاره نجمة الشكل ، كبيرة القد ، ارجوانية اللون || يتكاثر
بالعتيل . يرب في المواعيد الدافئة وفي الارربة المتوسطة
الانساج العميقة الدور .

١٩١٦٦ - عُنْتِيل ، عُنْتِيل * ، عُنْتِيل

جلس حشرات من فصيلة العنثليات ، اطلب منجل .

١٩١٦٧ - عُنْتُوج *
Courcier (F). *Charger* (E).
الجواد الصبور الرائع من عيل الميدان .

١٩١٦٨ - عُنْتُوس * ، حَالِيَش ، حَالِيَش ، حَرَالَة

Gryllotalpa gryllotalpa, *Gr. vulgaris* (S). *Courtillière*
Taupe-grillon, *Taupeette* (F). *Mole cricket* (E). *Maul-*
wurfsgrille (D).
حشرة دجوبة مقترسة من فصيلة الجديديات ورتبة مستنقيات
الاجنحة . طولها عند كمال بلوغها اي بعد انسلخها
الخامس لا يقل عن ٥ سم . قويا الى السرعة الكسبية .
ظهورها خلي النفاش . طبها الى الجفوة . رأسها غروطي
الشكل ، شديد الانساق يرتكز على حلقة صدرية شبه
أسطوانية . عيناها غرزيتان بارزتان . زياتها عيطيان
محينا الطرف . جوشها وظهورها مفلغان بقشاه واق صلب .
قوائمها ست . قامتها الى الامامتين مسلمات بمبروتين
مستنيتين تحفر بها الرية || تألف الارربة الرطبة .

تعيش في دهايز ملحية تسربها في جميع الاجتماعات. حياتها طول من ٢٢ الى ٢٤ شهراً تمر في اثنائها بحس استلخات || قوتها البهائم والحشرات والجذور التي تبتدع طريقها || اغراضها كثيرة لانها لا تقتصر على الدورات والجذور التي تلتهمها بل تتصلها الى جميع الشئ التي تحلل رتبها قوتها وتعيشها || اثنائها اكبر قدماً من ذكورها وهي تحت مكثها الذي يراوح حده بين ٣٠٠ و ٥٠٠ في الربيع والخريف وفي اجسام حده في التربة في اعقاب تراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. مكثها ابيض اللون الملبس الشكل بطول من ٢ الى ٣ سم. وهو يتقشف بعد متحه بنحو ٢٠٠ ساعة || تكاثرها باستعمال اسد الحراشير الفعالة كالأ كروبيد وفيلوبليكات البارود وغيرها.

١٩١٦٩ - عُنْجَبُولُ الْبَطَاطَا * ، لَاحِظَةُ الْبَيْعِ

Phthorimaea operculella (S). Taigne de la pomme de terre, Mineuse des feuilles de tabac (F). Potato tuberworm (E). Kartoffelmotte (D).

فراشة صغيرة ابيض من فصيلة العنكبليات . طولها نحو ٨ سم . يسقطها تراوح بين ١٦ و ١٨ سم . وراثتها ضيقة طحالها اللون ، وراثتها الاماميان ميمتان بالاسمر والخلفيان بهديا الخمار || مكثها ذري الله ، كروي الشكل ، اسمر اللون . رقتها خيرا الجسم ، وردية المواج ، طولها نحو ١٠ سم. خادتها بنية اللون تلصق فيلمة حورية النوس تقسم بين الارزاق الجافة المتساقطة على التربة او في الخافان بين طيات الاكياس وطيا || اغراضها بالغة لان اجسامها الحولية عديدة تراوح بين ٦ و ٧ وأكثر ولان رقاتها تامة تركيب البطاطا والباذنجان والتين والبنجور . انما يتعدى في الورقة التي تلتهمها ويعد الى الساق التي تلتها ويتهي بالدرجة التي تقربها وتصلها تعيش على ما تحو به من مواد نشوية || وتغلب اوراق التبغ لانها تلتهمها وتسرب نسيجها بين البشرون ليهو شتالاً خالياً من المواد الثابتة المذرة . تكاثره مند ظهورها باستعمال اسد الحراشير الفعالة المركزة على اليرودتين .

١٩١٧٠ - عُنْجَبُولُ الْخَبِيبِ * ، طَبُور ،

الْوَيْتْ ، حَنْطَبُ الْحَصَةِ

Stecrogra caraealis (S). Aleute des céréales (F).

Grain moth (E). Geckaidemotte (D).

فراشة صغيرة ابيض من العنكبليات . طولها نحو ٦ سم . يسقطها تراوح بين ١٢ و ١٤ سم. جسمها وراثتها الاماميان الى الطحلة الربداء تلونها صفرة طويها وراثتها الخلفيان الى البصرة ، اعداجها وصاصة || مكثها ذري الله ، بيضي الشكل ، يرتقال اللون . رقتها خيرا الجسم طولها نحو ٥ سم. خادتها حطية اللون تكن في النخيلة التي تنسجها داخل الحية || اغراضها محصورة بما تسبه اليرقة من صطب في الحبوب المخزونة لانها تنقبها وتعيش . داعلها على المواد النشوية .

١٩١٧١ - عُنْجَبُولُ الْخَنْ * ، دَوْدَةُ قَرْطَفَلِيَّة

دَوْدَةُ الْفَرْزِ الْقَرْطَفَلِيَّة

Platyedra gossypiella, *Gelechia gossypiella* (S). *Platyedra*, *Géléchie* du coton, Ver rose du cotonnier (F). Pink bollworm (E). Rotar kapselwurm, Baumwollmotte (D).

الحشرة الكاملة فراشة صغيرة ابيض من فصيلة العنكبليات . طولها يراوح بين ٧ و ٢ سم. يسقطها نحو ١٥ سم. جسمها

حطية حلق . وراثتها الاماميان الى الصلبة الصنافية يطوها عنه قاطعتها وفي طرفها تدبج اسمر تظل حمرته مع ابتاده . وراثتها الخلفيان الى الكهبة الربداء تلونها مشقة فضية . اما الابدان فرصافية اللون || مكثها ذري الله ، بيضي الشكل ، للارزاق اللون عنه وضعه ثم يبرق ويخضر ويستقر على الارزاق القزلي ، تنسج الاثني فرداً او مجموعاً على اي جزء من النبات || رقاتها تدريجياً الى ان تنشر على القزلي . رأسها كسني اللون دوقها الصبورية بنية زائفة اما النشوية لملقة . ظهورها اخر الفن جوي التبج . مدنها اسفر حطية . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم || خادتها صفرة ، طولها نحو ٦ سم. فيها التي تلونها باية صفراء . صلحتها رقيقة ناعمة نسجها كالتنوس || رقاتها تركب القصيلة الخازية انصها القطن . تعيش في يد همداء على البرام النشوية تنسجها وتقات من محروياتها ثم تنابع عملها في الكتانج لتسهم اليرود ، في الطوايز النشوية الاولى ، قبل جها لهاها ولا تنأخر عن قرض القطن الجديد قبل اكمال نمو وصلاته .

١٩١٧٢ - عُنْجَبُولِيَّات *

Gelechiidae (S).

Géléchiidae (F). *Gelechiidae* (E).

فصيلة حشرات مؤذية من رتبة شربليات الاجنسة . اجناسها واثولها زهاء ١٥٠٠ جميعها صغيرة الحجم . وراثتها مستطيلة ملونة وبنيية الأطراف . حادها الخلفي مذهب الحلق . ملاسها الشفوية طويلة ذرية ملتوية نحو البلاء . قرونها الاستطمارية غليظة حبيبة . مكثها ذري الله ، لاقياس الشكل والتجميع . رقاتها ملونة ، صفرة ، وبيضة ، سرية الحركة ، غاصلة ، تركب الازداد والثار والحبوب

١٩١٧٣ - عُنْجَبِيل *

Trachypetura (S).

Trachypetura (F). *Trachypetura* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البشليات انواعها المعروفة نحو ١٠ اسماها بحار البلاد الحارة من الماين القديم والجديد . اجسامها مدونة الشكل مسطحة . تنسج رعاتها المسطحة الانقباسية كما يبرق في الرم . اثراها ثنائية اللون يطوها تدوير جوي وهي فضية الشط الاصل عاجية الشط الاسفل

١٩١٧٤ - عُنْجَبِيلِيَّات

Tentoidae,

Trachypetridae (S). *Tentoidae*, *Trachypetridae* (F).

Tentoidae, *Trachypetridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من البطليات شاتكات الزغافن . اجناسها واثولها المعروفة متوسطة البدن يكثر وجوها في بحار المناطق الاستوائية || اشهر اجناسها العنكبيل وكشرايط والقوت

١٩١٧٥ - عُنْجَبِيل

العنكبيل حشر من العصافير (بحر المحيط) .

١٩١٧٦ - عُنْجَبِيلِيَّات *

Indris brevicaudata (S).

Indris à queue courte (F).

حيوان لبن وسيد الجنس والنوع من البشويات . موطن جزيرة مدغشكر . يألف الكنايات الربوة . ملجته الجاني . جماعته تد من حمة الى عشرة ازواج || جسمه اعيف الشكل يبرق نحو ١١٠ سم. وهو اكبر اجناس البشويات . شكله وانما قرب القبي بشكل الانسان . ثوبه



عنكبول البطاطا



عنكبول الحبوب



عنكبول الثقل



عنكبيل



عنكوس

Bukkum-wood (E). Sapanbaum, Rotes Brasilienholz (D). Brazilletto dell'Indie (I).

نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تملو نحو ٨ أمتار. أوراقها مركبة عابلة، وريقاتها سنائية صغيرة. أزهارها عشوية التجميع، برتقالية اللون، غائقة البرق السطري. اشخاصا شديدة الصلابة، قوية المخلات، جيدة الصنف. خشبها أحمر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٥ - عَندَم قَلَح * ، أَطْمُوذ ، بَندُقي هِندي

Cassipouia bonduc (S). Césalpinie bonduc, Bonduc, Chiquier, Chiquier, Chicot du Canada (F). Bonduc, Nicker tree, Gray bonduc (E). Nickerbaum, Gemeiner Schlüsselbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

نوع من العندم شجرته سبروتية قليلة الشوك تملو من ٣ إلى ٥ أمتار، أوراقها مركبة، وريقاتها بيضية النصل. أزهارها عشوية التجميع صغيرة القند، صفراء اللون. ثمارها طيبة وصابغة حواء الخشب، اشخاصا صلبة متينة جيدة الصنف.

١٩١٨٦ - عَندَم هِندي *

Cassipouia pulcherrima, Poinciana pulcherrima (S). Césalpinie superba, Flamboyant, Poincillade magniflora (F). Indian flower-fence, Peacock flower (E). Paradisblume (D). Poinciana Indiana (I).

نوع من العندم الزينة. شجرته شائكة، رقيقة، تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها مركبة عابلة، وريقاتها احليجية صغيرة. أزهارها كبيرة القند، حواء اللون، عطرية العروق، هريسة التجميع || أزهارها يستمر من حزيران الى أيلول.

١٩١٨٧ - عَندَم مَيَات

Cassipouia (S). Césalpinie (F). Césalpinie (E).

سبط من فصيلة القرنيات، أجناسه وأنواعه زهاء ٦٠ فيها الأشجار والشجيرات والجنيات البرية والصناعية. أشهر أجناسه العندم.

١٩١٨٨ - عَثرُوسِ أَمَلَس * ، أُنُورُوسِ أَمَلَس (S).

Anacardium occidentale (F).

حشرة دامت من فصيلة المروسيات. جسمها صغير بسيط. يطول نحو ٥ م. عند الذكر رفيع ٧ م. عند الانثى || ثوبها الى الجوزة. ظهورها كامل الحنجية، بنفسجي اللون، اسود المواج، ورشها شفاهان. رأسها مكور. غصنها صغير، طليق. عيناها صغيرتان، عنقها قصير. كوسلها مقطوم القاعدة والطرف. حنجتها نصف دائرية. ظهورها يلفح البطن دون الحمار. حمار ظهرها يملج بالاسود. قوائمها صغيرة || تألف البراري الغلة. تعيش تحت القشور وفي الجحالة من المواد النباتية المنسلة.

١٩١٨٩ - عَثرُوسِ ، عَثرُوسِ (F). Capella (E). عَثرُوسِ

النم نجم من كوكبية مسك الأعنة. مركزه على المرقق الاسير. يستمر من نجوم البعرة الاول. يمد من الارض نحو ٥٠ سنة ضوئية.

١٩١٩٠ - عَثرُوسِ ، عَثرُوسِ (F). She-goat (E). عَثرُوسِ

الانثى من الماعز او انثى الكيس. ج. أمز وعوز وصناز.

١٩١٩١ - عَثرُوسِ

Ibis هو الخراس، اطليه.

الى السرة السوداء. رأسه وكشاه وظهوره وساعده وفخذه الى السواد القمعي. اذناه كبيرتان كاسيتان. جبهة وبعدها وصقة الى الكهبة. بقاء وريلاه سود. ذنبه شديد التقصر، يطول نحو ٥ م. || الانثى ثنائية الثدي، عجلها يولد نحو ١٥٥ بيضا تضع في تمامه جرأوا واحدا ترضعه نحو ثلاث اشهر || قوته الجار والتمتات والجبلور يسى انثيا في اقل من القرب الى القبر ويبعث في التبار حل انصاف الاشجار الرزمة الورقة النمل.

١٩١٧٧ - عَندَك * ، عَندَك * Bas ventre (F).

Lower part of the abdomen (E).

المنطقة اسفل البطن.

١٩١٧٨ - عَندَك * ، عَندَك * Chant du rossignol (F).

نغريد العندليب.

١٩١٧٩ - عَندَك كَيب * ، عَندَك كَيب * Luscinia megarhynchos (S).

Rosignol chanteur (F). Nightingale (E).

طائر من الخراز وصيلة الحفليات يتميز بحسن صوته وبقوة صوته وانسيام انغامه. طوله نحو ١٥ سم. ثوبه الى السرة الشفراء. يمين عند الراس والظهر ويبيض عند البطن || يسكن في الغابات يحب البلاد في طلب الرزق والمعيشة والرفق. يافت الحداث والفتيات والادغال. قوته الحشرات والديدان والنمل || يمش في العوج والجنيات التنا. الاشكاله. انثاه تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٣ الى ١٤ بيضا.

١٩١٨٠ - عَندَك كَيب اليابان (F). Rosignol du japon

طائر ياباني المهد جميل الثوب، يدعى بَندُقي، اطليه.

١٩١٨١ - عَندَم * ، عَندَم * Cassipouia (S). Césalpinie (F).

جنس نباتات. برية وزراعية تربيتية من فصيلة القرنيات. انواعه نحو ١٠ منها الاشجار والشجيرات والجنيات. اشخاصا ناعمة الرقة، صلبة العود، فاعرة الصنف، شائعة الاستعمال ويستخرج منها صبغات حمراء وصفراء فيها تصلح في تخفيف السموم والقطن || أشهر انواعه مايتج.

١٩١٨٢ - عَندَم بَرَازِيلِي ، عَندَم بَرَازِيلِي Cassipouia echinata (S). Bois du Brésil, B. de Fernambouc (F). Brazil-wood, Brazilletto-wood, Lima-wood (E). Brasilbaum, Brasilienholz (D). Brasile rosso, Legno del Brasile (I).

نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تملو نحو سبعة أمتار، أوراقها مركبة عابلة. أزهارها الى الصفرة. اشخاصا شديدة المخلات، فاعرة الصنف. خشبها اصفر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٣ - عَندَم مَعَالِي * ، فُولَكَة

Cassipouia coriaria (S). Dividivi (F). Divi-divi tree, American sumach (E). Divi-divi-strauch (D). Sommaco d'America (I).

نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تملو نحو ٥ أمتار. أوراقها مركبة عابلة. وريقاتها بيضية الشكل صغيرة القند. أزهارها متوسطة الحجم، عشوية التجميع. اشخاصا جيدة الصنف صناعية. غلاه صفها وأعوها دباغة وصابغة.

١٩١٨٤ - عَندَم مَعَالِي * ، بَكم هِندي

Cassipouia sappan (S). Césalpinie sappan, Bois de sappan, Brésillet des Indes (F). Sapan-wood tree,



عندليب



عندم سَازِي



عندم صِيان



عندم قَارَح



عندم هِندي



عتر الماء



منز



عسل



عسل



عنصيف

Micro-élément (F). عُنْصُرٌ مَكْرِي ١٩٢٠٢

Micro-élément (E).

هو كل عنصر غذائي جزئي النسيب يسبب اعتداله أو شذائه في التربة ما يدمره الجبن أو العوز الذي تظهر حوارضه في النباتات والحرار.

١٩٢٠٣ - عُنْصُرَةٌ هي للملح اللهب ، املابه .

Rachal عُنْصُرِي ١٩٢٠٤

نمت تعريفي توصف به الاجناس المتحدرة من اصل واحد.

Scilla (F). عُنْصُل ١٩٢٠٥

هو الاشكيل نبات دوسفي طوي ، املابه .

Scilla d'automne (F). عُنْصُلٌ جَرَسِي ١٩٢٠٦

هو اشكيل الخريف ، املابه .

Jacinthe sauvage (F). عُنْصُلٌ مَنَحْنَر ١٩٢٠٧

هو اشكيل القاب ، املابه .

Jacinthe étoilée (F). عُنْصُلٌ تَجَسِي ١٩٢٠٨

هو الاشكيل التجسي ، املابه .

١٩٢٠٩ - عُنْصُلٌ * ، جَوَلَنُ المَرْجُ عُنْصُلٌ

Endymion (S). Endymion, Agraphide, Jacinthe des prés (F). Blue hyacinth (E).

نبات يصل من فصيلة الزنبقيات . مهد بايات البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروپة . اوراته مستطيلة ميّانية التصل الجليل الخضار . غمراته اموج الانتصاب ينتهي بشلة من الازهار المتناوبة المحتبة الحريف ، الجيلة الشكل ، السداسية البتلات الزرق || تنوره ربيعي .

١٩٢١٠ - عُنْصِيف * Felicia (S).

Félicie, Piquereux bleue (F). Blue daisy, Blue Marguerite (E). Felicia, Kapaster (D). Felicia (I). جنس نباتات برية وريينية من فصيلة المركبات. انوامه عديدة منها المشية والليبية واخرية والمصرة . اوراتها لا قياسية الارزكان . ازهارها محتلة الاولان ينظ فيها الازرق . سطها نبات سرويي ينش ويحد في جميع الاربة || اشهر انوامه التريينية ما يلي .

١٩٢١١ - عُنْصِيفٌ سَمَنَحُورِي

Felicia collettii (S). Félicie azurée (F).

عشبة ليفة ممررة تفلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراتها متعاقلة ، لاطلة ، بيضيه الشكل ؛ نصلها خالي البشرة ؛ ملتص الاطراف . ازهارها حالية الارزكان ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، سمنحية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف وانحريف .

١٩٢١٢ - عُنْصِيفٌ لَطِيف Felicia tenella (S).

Félicie délicate (F).

عشبة ممررة تفلو نحو ٣٥ سم. اوراتها متعاقبة غشيلة ؛ نصلها حاد الشام ، خالي البشرة ؛ يلمت الخضار . ازهارها حالية الارزكان ، فردية التجميع ، لها بين الازرق والبياني || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Cigogne noire (F). عَنَزَر ١٩١٩٢

هو اللقلق الاسود ، املابه .

١٩١٩٣ - عَنَزَرُ المَاء * ، قَنَزَر Balistes (S).

Baliste (F). Trigger-fish (E).

جنس اسماك بحرية من رتبة ملحويات الفك . انوامه عديدة . اصطناعها جمار مناطق البلاد الحارة . جميعها من الاسماك المأكولة تتميز بشكلاها البيضية المبطلة العادية الاثاق . رؤسها مسطحة زعنفتان مهازية الشكل مدينة الطرف متشفر وتلتصق عند الحافة .

١٩١٩٤ - عَنَزَرُ المَاءِ المَلُون Baliste caprique (F).

سمكة بحرية حمراء قَنَزَرُ المنوط ، املابه .

١٩١٩٥ - عَنَزَرَب ، عَنَزَرُ ب هو سمك اللك ، املابه .

١٩١٩٦ - عَنَزَرُوت Astragale (F).

هو الاسطرغالوس ، املابه .

١٩١٩٧ - عَنَزَرُ * Eragrostis (S). Eragrostide,

Eragrostis (F). Love-grass, Tickle grass (E). Grasses Liebesgras (D). Eragrostis, Gramignone (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات وفصيلة النجيليات انوامه عديدة نحو ٢٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها حولي وبضها ممر . يكثر ويوجد في المراعي الطوبية وفي الاراضي نخيلة . صفها مشويب التصل ، خيطي الزايم الاخير . ازهارها عقيدي متعصب . رعاها الماشية وتسن عليها .

١٩١٩٨ - عَنَزَرِيَّة هي التث القسي ، املابه .

١٩١٩٩ - عَنَس * Aquile sudaux, Uroetux sudaux (S). Uraète, Uraète sudacieux (F).

المنس ، جمه عناس وينس ، طائر وحيد الجنس والزوج من عمارة العتيان وفصيلة الصقريات . كبير الجثة طوله نحو ١٠٥ سم . وبسطه ٢٦٠ سم . منسر قوي البرة الحادة . ذنبه زناهي الريش مقطوم الطرف . ثوب السرة الخطية تملوا مشعة من السبهة يتخللها ثوب من السرة الجلورية السوداء المالح . عناء غفريرينا اللون . منسر ومخاله صفر || عيشته جبابية ، سر به يعل . زوجين الى خمسة ازواج . يأنف الجبال وكسول والاسراج . قوته كل ما استطاع اليه ميكن من الحيوان والطير والزمخافات والاسماك . يرب في الثم والمنازل والطيال ولا ينف من الجيف || يلدن وكنه في الانهار القريبة الثانية . انناه تحسن رسدنا زنتين كبيرتين طول الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم . ويرضعها من ٦ الى ٧ سم . وهو من العتيان التي تألف حياة الاسر بسهولة .

١٩٢٠٠ - عَنَص Myrobahn ailé (F).

هو الاطليح الجنب . من النباتات اللبية ، املابه .

١٩٢٠١ - عُنْصُر Elément (F). Element (E).

هو التثريف الوسي لكل مادة بسيطة لم يتعطل منها . حتى الآن ، مواد ايسل منها .

١٩٢٢٢ - عَنْقُودَانَةٌ كَثِيْمَةُ السَّيْبَةِ

Liatris pycnostachya (S). *Liatride à épi dense* (F).
بمجة زرقانية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. اورقها السفلى
خامسة أو سباعية المروق المروق طول نحو ٣٠ سم. وترى
١٥ سم. اورقها العليا خطية التصل الذرب الجامة. ازهارها
روبيات صغيرة متتامة كثيفة تتجمع ارجوانية اللون.
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٩٢٢٣ - عَنْقُودَانَةٌ تَجْيِيزِيَّةُ الْاَوْرَاقِ

Liatris graminifolia (S). *Liatride à feuilles de graminée* (F).
بمجة زرقانية تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. اورقها نجمية
صغيرة الشكل، خفيفة النسل. ازهارها روبيات صغيرة
متتامة، متجمعة، يضاء اللون أو حرجاء || ازهارها
يستمر من آب الى ايلول.

١٩٢٢٤ - عَنْقُودٌ *
Lucanus (S). *Lucane*,
Cerf-volant (F). *Stag-beetle* (E). *Hirschkäfer* (D).
يقال للآكل عظماء والآن عظماء، جلبى شحرات ثالثة
من فصيلة العنقوديات. الذكر اكبر قدماً من الانثى وهو
كبير الحجم، غليظ الرأس، عظم التأثير، مستطيل
الزبان، كسبي الاخاذ السفلى المولج. اما الانثى صغيرة
الحجم والرأس والتأثير. اتخذا الى السمرة المابقة المادمة
المولج || البرقة غشاء اللون، عمودية الشكل، تمشي
على جلود الاشجار اليابسة.

١٩٢٢٥ - عَنْقُودٌ الصَّخْرَافِ

Dorcas des saules (F).
هو الدرقس، الحلبه.

١٩٢٢٦ - عَنْقُودِيَّاتٌ *
Lupanidae (S). *Lucanidae* (E).
فصيلة شحرات ثالثة من رتبة عحميات الاجنحة. اجناسها
وانواعها عديدة تمشي على جلود الاشجار اليابسة تحت
لقها وفي محيط انتشار جلودها. اكثرها صغيرة ومتوسطة
القد وبعضها كبير جداً يراوح طول بين ٧٠ و ٨٠ سم.
انواعها مخططة الااليان يلب فيها الاسود والكسبي المايق.
قرونها الاستشارية ورقية الشكل، حشائية المفاصل.
روئوسها مستعرجة، اتخذا سلبية، اجناسها قوية.
ذكورها اكبر حجماً من انثاهما واخص جفء واغلف اعضاء
وتأثيراً.

١٩٢٢٧ - عَنْقُودَةٌ *
Interligne (F). *Space-lins*, *Lead* (E).
المنقة في المسافة بين غصلي الزرع.

١٩٢٢٨ - عَنْقُودَةٌ *
Turbine
دولاب مائي محرك محوره عمودي أو ممتد. والمنقة
اشكال اسمها استمالاً:
T. radiale (F). Radial T. (E). عنقة شعاعية
T. hydraulique (F). Hydraulic T. (E). عنقة مائية
T. axiale, T. parallèle (F).
Axial T., Parallel T. (E). عنقة محورية
T. mixte (F). Mixed T. (E). عنقة مختلطة

١٩٢٢٩ - عَنْقُودٌ *
هو عنق الارض.

١٩٢٣٠ - عَنْقُودٌ *
هو السلق، الحلبه.

١٩٢١٣ - عَنْقُودٌ مُتَحَكِّسٌ (S). *Felicia reflexa* (F).
Félicie réfléchée (F).

عنقة سمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اورقها متتامة،
معتقة، بيضة الشكل، ذلقة الزايم الاخير. تصلها
جميع النقت، مالى البثرة، معتق الطرف، يلمت
الخطار البصري. ازهارها حامية الارتكاز، فردية التجميع
حرجاء اللون || ازهارها يستمر من شباط الى ايلول.

١٩٢١٤ - عَنْقُودٌ *
هو السون البصل، الحلبه.

١٩٢١٥ - عَنْقُودٌ *
Anthestia (S). *Anthestie* (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات. انواعه
المعروفة قليلة المند اعطائها البلاد الحارة || والعنقود من
النباتات الطويلة على الساحل اللياني. مثالبه عكركية
التجميع عطفية بتقنيات دقيقة تحملها كالفصية.

١٩٢١٦ - عَنْقُودٌ بِئَالٌ *
Onitis belial (S). *Onitis belial* (F).

حشرة جملة نالمة من فصيلة الجمليات ورقية ملبفات
الاجنحة. تألف المزارع والبساتين والبراري وكل مكان
يكثر فيه الخثي والورث والبلع || جسمها متوسط القد
يطول من ٢٠ الى ٢٦ سم. لونها الى السواد اللامع. رأسها
يلسني الجرم، قصير الازار والمخ. زباناها صغيران،
صغريا الاطراف. حشاه صغرتان. ظهورها مضطوم
الطرف، لا يلمس كامل البطن. خداهما خديتان المصلاية،
قليلتا التحزير || الانثى اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً
منه || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة
في احوال الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. سرسها
دجوي || والبرقة منه ادراكها الكمال الجسوري تطول
الشكل، فليح التأثير، قصير الراجب، الحبر الابن،
اسود الرأس || طود الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع.

١٩٢١٧ - عَنْقُودٌ *
المنق: تلير النبات من الحرج.

١٩٢١٨ - عَنْقُودٌ *
Sauterelle malle (F).
He locust (E).

المنقب الذكر من الجراد. ج. عنقود.

١٩٢١٩ - عَنْقُودٌ *
بيت المنكوب.

١٩٢٢٠ - عَنْقُودَانٌ *
Liatris (S). *Liatride* (F).
جنس نباتات عشبية سبروتية سمرة من التفشيات ولبيلة
المركبات. انواعه عديدة مظهرها بري وبعضها ترابي.
جلودها دوصية كروية. سوقها بسيطة جملة. اورقها
عصية الشكل متتامة. ازهارها سليل التجميع. يزورها
قزمية اللثة || احرف انواعه واشهرها ما يلي.

١٩٢٢١ - عَنْقُودَانَةٌ اَلِيَّةٌ *
Liatris elegans (S).
Liatride élégante (F).

نوع من العنقودان وهي بمجة زرقانية تملو من ٦٠ الى
١٢٠ سم. اورقها مستطيلة التصل، خفيفة الملمحة
الجملة. روئوسها اعليبية الشكل. ازهارها ارجوانية.
ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول.



عنقود بئال



عنقود ذكر



عنقود انثى

اربعها نائكة . اوراقها مركبة ، عابطة ، ورتبة التجميع . وريقاتها مسابية او تساعية العدد ، نصلها يبني الشكل ، ذلك الزايم الاخير ، سنن الحافة ، عاتق الحصار على صفته العليا يات على السفلى . ازهارها منتصبة متحيلة للتجميع . ثمارها جرداء حواء اللون ، ثلاثية القلق .

Grappe, Racème (F).

١٩٢٥١ - عَفْشُود

Bunch, Racem (E).

شكل ازهار بسيط غير محنود تكون فيه الازهار ذاتاثر محنود على علاقات قصيرة متساوية الطول متمركزة على محور مشترك . مثاله عَفْشُود النبق والكشمش .

Uviforme (F).

١٩٢٥٢ - عَفْشُودِي

Grape-shaped (E).

نمت ترميفي يطلق على ما كان شكله كعَفْشُود النبق .

Racémeux (F).

١٩٢٥٣ - عَفْشُودِي الشكل

Racemose (E).

ما كان ترتيبه او تجميعه شبيه بالمعقود .

Enicurus (S).

١٩٢٥٤ - عَفْشُور

Enicura (F), Enicurus (E).

جنس طير من الجولام سنيات المناظير وفضيلة الثمرات . انشور المعروف نحو عشرة . اصلها من تحت من الهند الى ماليزيا وجاوا . تألف الغابات وصفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والنباتات || اجسامها رفيقة مهاد تغطي من ٢٠ الى ٢٧ سم . تتميز باذنانها المستطيلة القارعة . اوراقها مائلة بالاسود الاصفر اللامع والابيض الناصع || تدنو امشاشها في الفاصح تقيها في صرور الصقور القرية من مجاري الماء . انثاها تحسن من ه الى ٧ بيضات على مرتين في الحبل . الذكور تناوب الاثان في الترخيم .

Spermophagus

١٩٢٥٥ - عَفْشُوس ناهم

sericeus (S), Spermophagus soyeux (F).

Spermophagus sericeus (E).

حشرة واضحة حابية من فصيلة المندوسيات ورتبة مملحات الاجنسة . تألف الموات التي يكثر فيها الابلاب . غناشها تمش على ازهار النباتات المختلفة الاجناس والنباتات . يترافها تمش ضمن كابر الابلاب || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . ثوبا الى السواد البوروي يطلو خل كثيف اذهب . رأسها مستدل الجرم . جناها صغيران . زباناها صغريتان . فكها ذريان . ظهراها لا يلفظ كامل السكة الشرجية . ارسافها رباعية المعقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في البهار . تتلفد بعد ظهورها بنسو ١ يوما . تمتع الممكن ميحاذيها على الكابر تتلفه مادة غروية لاصقة || البقرة عنه بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ سم . جسمها مقوس الشكل ، نولي للوراجب ، حطلي اللون ، اغير المراج ، اسود الرأس || طور الاكامل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينغفي ضمن صلبة تغلق عند انطلاق الحشرة الجملانة .

Aniloca (S).

١٩٢٥٦ - عَفْشُوس

Aniloca (F), Aniloca (E).

جنس دويبات بحرية من عشريات متقاربات الابلاب وفصيلة التريوسيات . انواها المروعة قليلة اعطائها اليسر

بعضها مهذب الاطراف . ملاسها نحيلة او شامرة . كولسلها شبه مكورة . شيفانها منبسطة تلحف الازنة . بطنها انائية الشكل . وراشها صغيرة ، شخافة || يرقانها صغيرة ، وشمة الشكل ، مجرة يتأثير ثالثة تكتمها من الصقل على التناكب || اشهر اجناسها المعتد .

Béryclides (F).

١٩٢٤٤ - عَفْشُودَات

Beryclidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزمانف ، اجناسها وانواعها عديدة موطنها مجار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد ما كولة تتميز بالوانها الزاوية الالوان ، بكبر عينها المستمرة . زباناتها الظهرية للامانة الشكل وزباناتها الشرجية الغارقة || اعراف اجناسها واشهرها المعتد والسفوق والجليل واللبيرة .

Verge de l'âne (F).

١٩٢٤٥ - عَفْشُور

هو جردان الحمار .

١٩٢٤٦ - عَفْشُورَة انثى الباشق .

١٩٢٤٧ - عَفْشُورِيَة

Argonauta (S), Argonauta (F), Argonaut (E).

جنس حورلات حلاية رأسية الازليل من الاغشيطيات . انواعها عديدة منتشرة في جميع مجار البلاد الحارة . تتميز بالفارح الشكل الناصع الذي يبدو بين الذكور والاثان . ذكروها صغيرة القد اغشيطية الشكل حادة الصفة قصيرة الملاصق باستثناء الرأس المستطيل . انثاها مستدرة الشكل نصفية اللولاف الصدي التركيب الرقيق الصلبة . اشهر انواعها المعروفة :

Argonauta argo (S).

عَفْشُورِيَة المنصوب

Argonauta tuberculata (S).

عَفْشُورِيَة المجلد المهندي

Empusa (S).

١٩٢٤٨ - عَفْشُوس

Empuse (F).

جنس حشرات من فصيلة السرغيات ورتبة مستنجات الاجنسة . انواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . اخلاقتها اخلاق الشرعيف اما اشكالها فغريبة .

١٩٢٤٩ - عَفْشُوب السند يان

Oncopeltis lenio (S).

Oncopeltis des chènes (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنسة . جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ سم . || ثوبا متباين الالوان بين النقتين . فهو عند الذكر اسود الرأس والكول والحبيطة ، جلوي الظهران ، اسمر البطن والقوائم . وهو عند الاثان جلوي الرأس والكول والحبيطة ، اخضر الظهران ، حطلي البطن والقوائم || رأسها مستعرض ، قليل التتو . سطحها مستدل الطول . جناها كبيرتان . زباناها نحيلتان ، صغيران . كولسلها مستطيل الشكل . حبيتها كبيرة ، حمرة . ظهراها كامل الحنية ، لاصق وروشان غشائيان ، شفافان . قوائمها نقيقة ، كثيفة . اطلب الشالك || تألف اجمار السنديان والبصص اينا كانت . قوتها القس تحصد من الازواك .

Euscaphis (S), Euscaphis

١٩٢٥٠ - عَفْشُود

جنس نباتات معمرة من فصيلة النبتات . انواعها قليلة العدد معظمها بري وبعضها زرعني . جناتها ومجراتها تملو من ٢٠٠ الى ٦٠٠ سم . فروصها وانثاها غليظة ،



(ذكر) (انثى)
عَفْشُور



عَفْشُور



عَفْشُور



عَفْشُوس ناهم



عَفْشُور

Analges (S).

Analge (F). Analges (E).

جنس حشرات جلدية من الحليمان وفصيلة الجربيات .
أنواعها المعروفة قليلة المدد جميعها صلبة الجسم ، مؤذية .
تتطفل على الكثير من الطيور اعصها الجربا .

١٩٢٦٧ - عُنْجَة هو الحاصل ، اطليه .

١٩٢٦٨ - عُنْجَة أُرُوْبِي هو الباتيه ، اطليه .

١٩٢٦٩ - عُنْجَة Palmetta, Cordon horizontal
هي شكل من اشكال العنكبوت الاقوي يستعمل الحولة لبعض
انواع الانهار للتمسك بالقوة الانتفاخ رغبة بهم في الحصول
على ثمار باكرية .

Vrillé (F). Bored (E).

١٩٢٧٠ - عُنْجَة نمت وصني ثباتي على شكل غاصص من الانوار يشبه
الحائق او السلفه .

Loranthaceae (S).

Loranthaceae (F). Loranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات التلقين . انواعها المعروفة زهاء
٥٠٠ تنتمي الى سبطين : سبط الحاصلات الذي يتميز
بازهاره الوردية الشق . وسبط البقيات الخشري الانهار .
جميع نباتاتها طفيلية تركب فروع واصفا الانهار فخرشب
فيها مرافقا وتعيش على ما تنميه من السطح . بعضها
مدادة طفلة . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، بيضية التصل
الجلدي التسج . ثمارها صنية بدنية الصعير .

Staphylin (S). Staphylin (F).

١٩٢٧٢ - عُنْجَة انسبة جميعا لآفة . جنس جنات برية زراعية تزينة
من فصيلة المنهيات . انواعها عديدة . اوراقها مركبة متعاقبة
مائلة ، ازهارها عقدية او حشوية التجميع طويلة الزناد .
ثمارها جرد كروية الشكل ، يزودها صنية صلبة جامدة .
يستخرج منها زيت للذئ الطعم مأكول || أشهر انواعها
سما يتبع .

١٩٢٧٣ - عُنْجَة الصين Staphylin holocarpa (S).
Staphylin de Chine, S. à capsule antérieure (F).

شجرة جامدة ، تلوم من ٥ الى ٧ امتار . اوراقها مركبة
ثلاثية . ورققاتها اعليجية التصل ، تطلو من ٦ الى ٩ سم .
ازهارها عقدية متدلية يشاهد اللون . ثمارها جرد اعليجية
الشكل مقنونة الطرف || ازهارها يستمر طوال شهر
ايار .

١٩٢٧٤ - عُنْجَة اليابان Scaphylin bumida (S).
Scaphylin du japon (F).

جنية سبروية تلوو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها مركبة
ثلاثية ، ورققاتها اعليجية التصل ، مسنة الحافة ،
حشوية الانسان . ازهارها عقدية التجميع متدلية .
ثمارها جرد ثنائية الفلق المتعاقبة || ازهارها يستمر طوال
شهر حزيران .

١٩٢٧٥ - عُنْجَة يُونْتَدو Staphylin bolanderi (S).
Staphylin de Bolander (F).

شجرة سبروية تلوو من ٣٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها
مركبة ثلاثية . ورققاتها بيضية التصل ذلقة الزام الاخضر ،
تطلو نحو ٦٥ سم . ازهارها عقدية ، متدلية ، وردية
اللون ، خضراء التصل . ثمارها جرد متساوية الطرف
والعرض || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

الايض المتوسط || اجسامها صغيرة لثة اعليجية الشكل
تطلو من ٥ الى ١٢ مم . اجسامها مجوزة بصفة ماسة ||
تتطفل على الاسماك تختصق بها ولا تقارنها .

Collaire (F).

Pertaining of the neck (E).

١٩٢٥٧ - عُنْجِي نمت لتريني يطلع على كل ما له صلة بالمشق .

Cervical

١٩٢٥٨ - عُنْجِي

Araignée (F). Spider (E).

١٩٢٥٩ - عُنْجِيوت جنس دويبات من رتبة العناكب او الرتيلاوات . انواعها
عديدة متباينة الاجسام والاسحاب والاشكال والالوان .
ذكر المنكبوت يسمى عنكبوت والانثى عنكبوت . ومن اسمائه
العنكبوت والمعنكبوت والمكب . ج عناكب وعنكبوتات وعناكب .
وقد جاء ليدفع الزيان :

وهي ان بيت المنكبوت يوصق

رفيع اذا لم تقص فيه الحوائج

١٩٢٦٠ - عُنْجِيوت المنازل * فُدَس

Tegenaria domestica, T. parietalis (S). Tégénarie,
Araignée domestique (F). House-spider (E).
Winklapinne (D).

نوع من العنكبوتات المألوف بكثرة في المنازل الالة والحربة
طوله نحو ٩ سم . ثوبه الى الحولة الحولية . يله الى اليافس
تطلو زراكل مابقة السرة . شمه لقي الارتكاز ينسجه
في الزوايا .

١٩٢٦١ - عُنْجِيوت يبي

١٩٢٦٢ - عُنْجِيوت سَلْمُطَرِي راجع عشوية التيه .

Araignée labyrinth (F).

١٩٢٦٣ - عُنْجِيوت سَلْمُطَرِي راجع ذفوة الانهار .

Araignée crabe (F).

Arachnida (S).

Arachnida (F). Arachnida (E).

صف حيوانات صغيرة دابة يشمل العناكب والقاربان
والقمل والقراد ، الخ .

Adenostyles (F).

١٩٢٦٤ - عُنْجَة جنس نباتات شجيرة معمرة من سبط النفيشات
الركبات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي ،
تتميز بها كبر الكبرية الحجم . بعضها تلوو من ٦٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، متعاقبة ، نصالها قليلة الشكل ،
فضفاضة الصغرة ، خلية البشرة . ازهارها عديدة الازويجات ،
وردية اللون . بلورها صغيرة لثة ، وتدنية الشكل ، قنطرة
القنسة .

Inachus (S).

Inachus (F). Inachus (E).

١٩٢٦٥ - عُنْجَة جنس دويبات بحرية من التفريعات عشاريات الازيل
قصار الذيل وفصيلة الامجيات . انواعها المعروفة قليلة المدد
اسطها يحار البلاد المعتدلة الحرارة والمتفرقة نحو الباردة ||
كاشكها كشكك بفن العناكب . دروعها محرمة ثمانية
التشوير ، كيفة الحلب البقيق . ثمارها مثقوبة قصيرة .
ارجلها مستطيلة . ملاطها فضلية . انواعها الى السرة
المختلفة الماهات .



عنكبوت المنازل



عنكبوت



عُنْجَة

بحري السفلى ، حثايقها نحاسية صغيرة اللثة || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٧٨ - عُنْبِيَّة مَبْدَلَة

Parthenocissus vitacea (S). *Parthénocissée commune*, *Vigne vierge commune* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها نحاسية الوريقات . نصلها سنانية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . حثايقها بحورية الارتفاع ، متقابلة مع الاوراق . ازهرارها مفترية . حبا اسود اللون ، ازرق المواج . ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٧٩ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Parthenocissus quinquefolia (S). *Parthénocissée grimpante*, *Vigne vierge grimpante* (F).

جنبة عارضة مسلسلة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها باعثة الخضار ، خلة البشرة على سطحها . حوايقها ثنائية الصف ، سداسية او سباعية الخيوط المحضة . حثايقها طرفية كبيرة اللثة || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٨٠ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Crotophaga (S). *Ani* (F). جنس طير من المتسلقات وفضيلة التفويجات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يحد من امريكا الاستوائية الى الوسطي || ملجئها الحياتي جاعي اسرابها متفارقة العدد . تألف النابات والحياتي وتقرب من الاسماك المأخولة ولا يبتعد عن طعام البقر لانها تنظفها من دوي القرد والطح والتمر وغيرها من الحشرات الجذابة || قوتها جميع انواع الحشرات العذبة والحلينة . تتميز بخلقة المتفاد الذي لا يقل طوله عن طول الرأس . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنانها مسطلة . ريشها لبد التجميع . اوضاعها نشطة . اصابعها قوية بصوت الاطاني || وين مزيانا ان الاثلاث قرح البيض في حاضن كبيرة تقديمها بالاشتراك مع الذكر في اعمال الانجاب الدائمة . تاري من ٥ الى ١٥ اثنى || اهرق انولمه واشهرها النومان التالي :

١٩٨١ - عُنْبِيَّة السَّامِيب * عُنْبِيَّة صَغِير

Crotophaga minor (S). *Ani des savanes* (F).

نوع من النعيس قريب اليه بالحقن باستثناء المتفاد . موطنه امريكا الاستوائية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وبسطه نحو ٥٠ سم . لونه الى الزرق العابقة البنفسجية المواج . متفاده وزقده وقامتاه الى السواد القاتم . حلقه حية شهاد اللون || سره كبير البد . قوته الحشرات .

١٩٨٢ - عُنْبِيَّة الشُّورِي * عُنْبِيَّة كَبِير

Crotophaga major (S). *Ani des palétiériers* (F).

نوع من النعيس كبير اللثة موطنه امريكا الوسطي . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . بسطه نحو ٦٠ سم . لونه الى الزرق العابقة . صدره اخضر المواج . ذليه بنفسجي . متفاده وزقده وقامتاه الى السرة السوداء . حلقه عية صفراء اللون || قوته الحشرات وبعض الثمار الياينة .

١٩٨٣ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Euonice (S). *Euonice* (F).

جنس دوبيات بحرية من اللحيات وفضيلة النعيبات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها دويبة الشكل ، سلقية التركيب

Staphylea colchica (S). *Staphylé de Colchide* (F).

جنبة سبروتية تملو نحو ١٥٠ م . اوراقها مركبة ثلاثية او نحاسية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ملس الصفة ، جميل الخضار . ازهرارها عقنودية ، منتصب ، يفضاء اللون . ثمارها جرداء مستطيلة || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٩٨٤ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Staphylea pinnata (S). *Staphylé penné*, *Patanotrier*, *Faux pistachier*, *Nex coq* (F). *Common bladder nut*, *Anthony nut* (E). *Echte Pimpernuss* (D). *Staphlodendro*, *Nesotagilato*, *Fussaria*, *Falso pistachio*, *Noce di St. Antonio* (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من ١٥٠ الى ٥٠٠ م . اوراقها مركبة نحاسية او سباعية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ضيق الزام الاخير ، سنن الحافة ، يطول نحو ١٣ سم . ويعرض ٥ . ازهرارها عقنودية ، منتصب ، يفضاء اللون . ثمارها جرداء متساوية الطول والعرض || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٩٨٥ - عُنْبِيَّة كَلْبِيَّة ، عُنْبِيَّة امْرِيكِيَّة

Staphylea trifolia (S). *Staphylé d'Amérique* (F). شجرة جادسة ، تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م . اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها اهليجية النصل المستدير القاطعة ، للمشاري المغلة || ازهرارها عقنودية التجميع ، قصيرة اللثة ، يفضاء اللون . ثمارها جرداء كروية مسطيلة . ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٩٨٦ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Staphyleaceae (S). *Staphyléacées* (F). فصيلة نباتية من ذوات الفلتيين حليمة المتالات . اجنحتها وانواعها كثيرة العدد قريبة للشيء من السبنتيات . ازهرارها خلية الاجزاء . ثمارها حقة . يزورها نية الشكل صغرية . اشهر اجناتها ثلاثة : النمة والقمقوت والمملنان .

١٩٨٧ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Parthenocissus (S). *Parthénocissée* (F). حرة من الجفنة العلاء . انواعها المعروفة ثمانية . جميعها جنات سبروتية عارضة . اوراقها كلفة ثلاثية او نحاسية التجميع الاسمي . تتميز بحولتها الحسية الاطراف وبارزها لادم الحواقي || الواسلة منها عنية . اشهرها ما يتبع .

١٩٨٨ - عُنْبِيَّة اليابان

Parthenocissus tricuspidata (S). *Parthénocissée du Japon*, *Vigne vierge du Japon* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ٥ الى ١٠ أمتار . اوراقها كلفة عادية التجميع ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها بيض اخضر الصلحة البليلا للالسة اللامعة ، اثير السفلى العملية البارزة المرقق ثم ينحرف الى الحرة التي تمة في الحريف . ازهرارها مفترية . حثايقها كبيرة اللثة ، كثيرة الحب || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨٩ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Parthenocissus himalayana (S). *Parthénocissée de l'Himalaya*, *Vigne vierge de l'Himalaya* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ٣ الى ٦ أمتار . وريقاتها ثلاثية اهليجية . الوسطي منها تطول نحو ١٢ سم . نصلها مدبب النمة ، بارز المرقق ، جروي الصفة العليا ،



عنبة مسلسلة



عنيس الشوري



عنيس

Echter Brandschopf, Hahnenkamm (D). Sclamito cressa di gallo, Fior di velluto (I).
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلُو مِنْ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَم. أَوْرَاقُهَا كَبِيرَةٌ لَقَدْ أَحْلِيْلِيَّةِي الشَّكْل. نَصْلُهَا تَصْنَعُ الصَّفْحَةَ ، غَاثَ الْبُرُوقِ ، خَلِي الْبُشْرَةِ ، يَجْلِسُ الْخُضْرُ الْفَادِي . سَهْلَتَا الزَّهْرِيَّةُ خَلِيَّةُ الْمَسِّ ، لَا قِيَاسِيَّةَ الشَّكْلَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِإِنْخِلَاطِ الْأَصْرَامِ ، يَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَبِيُّ وَصُورُ الْبَقْلِ وَالْبَيْنَكُورِيِّ . أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .

Colonia argentea (S). **حَبَسَة لُفْيِيَّة** *
Cálisis argentea (F).
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة هَرْمِيَّة الشَّكْلَ تَعْلُو مِنْ ٤٠ إِلَى ٥٠ سَم. سَلَقُهَا مَرْمَرَةٌ مَشْمِيَّةٌ . أَوْرَاقُهَا خَفِيفَةُ الْكَمَلِ ، خَلِيَّةُ الْبُشْرَةِ . أَنْزَعَارُهَا يَضَاهِي الْوَلْنِ ، سَهْلَتَا التَّجْمِيعِ ، غُرُوبِيَّةُ الشَّكْلِ . سَهْلَتَا تَطْلُو نَحْوَ ٨ سَم. ٥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .



مَهْنَة خَلِيَّة

Aolement (F). Ripening (E). **حَبَسَة**
فَايَةُ نَمُوِّ الْقَتْنِيَّانِ فِي الْكَرْمِ وَالْأَشْجَارِ .

١٩٢٩٩ - **عَوَّارٌ ، وَاعِي الشَّجَاهِ**
le Bouvier (F). Boctes, the Hardsman (E).
الْعَوَّارُ وَالْبَشَّارُ وَاعِي الشَّجَاهِ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءَ لَكَرْكِيَّةٍ شَبَالِيَّةٍ تَقَعُ بِالْقَرْبِ مِنَ الْقَنْبِ . مَرْكَزُهَا بَيْنَ الْعُلْوِ وَالْقِسْبَانِ . حُدُودُهَا اثْنَانِ وَمِثْرَتَانِ فِي الصُّورَةِ وَوَاحِدٌ خَارِجِيَّهَا . وَهِيَ صُورَةُ رَجُلٍ يَدُهُ الْيَمْنَى مَصَا ٥ وَتَقْسِي الْعَرَبُ التَّجْمِيعَ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ الْفَنْطَرِيَّيْنِ . وَالَّذِي عَلَى الْمَتَكَيْنِ مَصَا الْقِسْبَانِ . وَالَّذِي عَلَى يَدِهِ الْيَسْرَى وَعَلَى السَّاعِدِ مِنْ هَذِهِ الْيَدِ وَمَا حَوْلَ الْيَدِ مِنَ الْأَتَمِّ وَوَلَدِ الْقِسْبَانِ . وَهَكَذَا أَيْضًا الْإِتَارُ وَوَرَقُ الْإِتَارِ أَوْ الْخُزْرُ . وَالْخَارِجُ فِي الصُّورَةِ تَحْتِ أَحْمَرٍ نَبْرٍ بَيْنَ لَفْظِيَّةٍ يَدِي وَالسَّيِّدِ الرَّابِعِ . وَالسَّيِّدِ يَحْسِي مَرْدُودًا حَاسِبًا السَّيَّاهِ وَحَاسِبًا الشَّكْلَ لِأَنَّهُ يَرَى أَبَدًا فِي السَّيَّاهِ لَا يَلْبِثُ تَحْتَ شُعَاعِ الشَّمْسِ ٥ وَالْعَوَّارُ أَيْضًا مَثَلُ مَنْ مَنَازِلَ الْقَمَرِ الشَّامِيَّةِ يَنْزِلُهَا الْقَمَرُ فِي الْيَلَةِ الثَّالِثَةِ حَشْرَةً . وَفِيهِ الْعَوَّارُ يَدِي فَرَعُ الْدَلْوِ الْمُخْضَرِ .

١٩٣٠٠ - **عَوَّارٌ ، فَيْسَاحٌ ، وَصَوَّعَةٌ**
Jappement (F). **وَصَوَّعَةٌ**
Yeipung (E).
صَوْتُ الْكَلْبِ وَاللَّهَبِ وَمَا أَشْبَهَ .

١٩٣٠١ - **عَوَّارٌ** هِيَ الرُّوَاكُشُ أَسَدُ قَسَمِي الْبَلَدِ .
١٩٣٠٢ - **هَوَاكُزُ تَنْسَلِيَّةٍ**
Conduits génitaux (F). **هَوَاكُزُ تَنْسَلِيَّةٍ**
Genital ducts (E). هِيَ الْمَسَالِكُ التَّنْسَلِيَّةُ فِي الْحَيَوَانِ .



مَهْنَة خَلِيَّة

١٩٣٠٣ - **عَوَّارٌ ، مَعْلُومٌ**
Avaries (F). **مَعْلُومٌ**
Damage, Average (E).
الْمَوَارِيثُ تَقْدِيرُهَا تَكُونُ عَاصِيَةً وَبِئْسَ وَشَرَكَةً وَرَوَادُهَا مَعْلُومٌ بِبَعْضِ الْبَشَائِعِ أَثْنَاءَ تَقْلِيْبِهَا بِجَرٍّ أَوْ بِرَأٍ .

١٩٣٠٤ - **عَوَّارٌ ، عَوَّارِي**
الْبُورُ وَالْمَوَارِي : جَبْرَةٌ يَنْطَلِقُ جَبْرُوتُهَا قَتْلُهَا ثُمَّ تَبْسُ ثُمَّ تَلْدِي ثُمَّ تَحْمِلُ إِلَى الْأُجْيَةِ إِلَى مَكَّةَ خُبْرًا وَبَحْثًا سَهْلًا غَاثًا (الْهَادِي) .

١٩٣٠٥ - **عَوَّارٌ** هُوَ سَمَاءَةُ الْعَرَبِ ، أَطْلَبُهَا .

سَمَطِيَّةٌ ، وَرُوسُهَا صَنِيعَةٌ ، خَاسِيَةُ الْوَلَسِ الْبَقِيَّةُ .
أَوْرَاقُهَا تَصْمَلُطَانِيَّةُ الْإِلْوَانِ الْبَيْدِ ٥ أَشْهُرُ أَنْوَاعُهَا مَشْنِيَّةُ الْمِحْبِطِ الْمَشْنِيَّةِ الَّذِي يَنْبَغُ طَوْلُهَا نَحْوَ ١٥٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٣ سَم. ثُمَّ عَسِيَّةُ الْمَتَوَسُّطِ الَّذِي يَنْبَغُ طَوْلُهَا نَحْوَ ١٥٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٣ سَم. ثُمَّ الْفَيْسَاحَةُ الْيَمْنَانِيَّةُ الَّتِي يَكْثُرُ جَبْرُوتُهَا فِي الْبَحْرِ الْبَاسِطِ الْمَتَوَسُّطِ وَهِيَ لَا يَنْتَبِزُ طَوْلُهَا ٦٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٢٥ سَم. .

١٩٢٩٩ - **عَبَسِيَّة** *
Psyche (S).
Psyché (F). Psycho (E).
يَجْلِسُ حَيَوَانَاتُ بَحْرِيَّةٌ مِنَ الرُّغُوبِيَّاتِ تَجْمَعُ الْإِبْرِيلَ وَفَيْسَلَةَ الْأَوْرُوبِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ ثَلَاثَةٌ أَطْلَبُهَا مَطْنُ الْمَنَاطِقِ الشَّامِيَّةِ مِنَ الْمِحْبِطِ الْإِطَالِي . أَسْرَابُهَا شَدِيدَةُ الْكَثَافَةِ وَفَارَةُ الْبَدَدِ ٥ أَصْدَافُهَا خَشَائِطُ ، شَقَائِقُ ، جَرَابِيَّةُ الشَّكْلِ ، مَدْبِيَّةُ الْإِقْطَابِ ، مَقْصَاوِيَّةُ الْمَصَارِيحِ ، مَحْدَلَةُ التَّبْطِيطِ . أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ ، تَنْبِيَّةُ الْوَلْنِ . زَمَانَتُهَا أَقْفِيَّةُ الْإِتْشَابِ ، مَهْدَبَةُ رَاقِيَّةُ السُّطُوحِ الْمَسْطِيَّةِ ، مَقْطُوبَةُ الْأَطْرَافِ ، مَهْدَبَةُ الْخِتَارِ .

١٩٢٩٠ - **عَبَسِيَّاتٌ** *
Eunicidae (S).
Eunicidae (F).
فَيْسَلَةُ دَوْبِيَّاتٍ بَحْرِيَّةَةٍ مِنَ الْخَلْقِيَّاتِ الْكَاثِفَةِ أَوْ الْجَوَاكِيَّةِ . أَجْسَامُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ كَثِيرَةٌ الْمَدَدُ مَشْتَرِكَةٌ فِي جَمِيعِ بَحَارِ الْعَالَمِ ٥ أَجْسَامُهَا حَلَقِيَّةٌ مَرْكَبَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا التَّبْطِيطُ ، تَعْلُو مِنْ ٧ سَم. إِلَى ١٥٠ سَم. ٥ أَشْهُرُ أَجْسَامُهَا الْفَيْسَلَةِ .

١٩٢٩١ - **عَبَسِيَّةٌ** هِيَ الرَّجَبِيَّةُ ، أَطْلَبُهَا .
١٩٢٩٢ - **عَبَسِيَّةٌ** *
Uniola (S). Uniola (F).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَشْنِيَّةٍ ، بَرِيَّةٍ ، مَرْعَوِيَّةٍ ، حَوْلِيَّةٍ أَوْ مَعْرَةِ مِنْ فَصِيلَةِ التَّجْلِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ سِتَّةٌ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَسْبُوبِيَّةٌ مَشْنِيَّةٌ يَمْتَدُّ مِنْ أَيْرَانَ إِلَى الْخَنْدِ فَالْمَصِينِ . وَثَلَاثَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ مَشْنِيَّةٌ يَمْتَدُّ مِنَ الْأَرِبَتَيْنِ إِلَى الْمَكْسِيكِ ٥ جَمِيعُهَا مَرْعَوِيَّةٌ شَكْلُهَا قَرِيبُ الشَّجَرِ بِالْمَكْرُوشِ .

١٩٢٩٣ - **هَيْدَانٌ**
Caution, Garantie (F).
Security, Garantie (E).
هُوَ الْكَفَالَةُ أَوْ الْفَضَالَةُ الَّتِي تَقْدَمُ تَقْلِيْبًا لَلْهَيْدِ .

١٩٢٩٤ - **هَيْسَكَةٌ**
Colonia (S). Cálisis (F).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَشْنِيَّةٍ حَوْلِيَّةٍ تَرْبِيَّتِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْفَيْسَلِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا قَلِيلَةٌ ، أَطْلَبُهَا الْبِلَادُ الْخَسَارَةُ . أَوْرَاقُهَا مَسْقَةٌ مَتَاعِيَّةٌ ، أَنْزَعَارُهَا سَهْلِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، لَبَدَةٌ ، مَرْمَرَةٌ ، لَا قِيَاسِيَّةَ الشَّكْلِ ٥ أَحْرَفُ أَنْوَاعُهَا وَأَحْمَرُهَا مَالِي .

١٩٢٩٥ - **هَيْسَكَةٌ جَوَاكِيَّةٌ ، هَيْسَكَةٌ هَوُطُنٌ**
Cálisis huttoni (S). Cálisis, de Java, C. de Hutton (F).
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلُو مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٠ سَم. أَوْرَاقُهَا يَضَاهِي ذَلْفَةً ، نَصْلُهَا أَحْمَرُ الْوَلْنِ يَنْطَلِقُ مَرَّاجَ لَزْرَقِ . سَهْلَتَا الزَّهْرِيَّةِ أَسْطَافِيَّةُ الشَّكْلَ لَبَدَةٌ . أَنْزَعَارُهَا حَرُّ الْقِتَاعَةِ ، يَبْسُ الْأَطْرَافِ ٥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .

١٩٢٩٦ - **هَيْسَكَةٌ خَمَلِيَّةٌ** * ، **عَوَّارٌ الْدِيلَكُ** ، **جَلْ**
Colonia cristata (S).
Cálisis crête de coq, Crête de coq, Passe-va-lours (F). Cock's comb, Coxcomb, Woolflower (E).
جَلْ

تميش حل الرمال فيها . قوتها الحويثات والخشرات والنباتات . تتميز بسرعة الانتقال والانتفاخ في الرمل || أشهر أجناسها الحوير والجلبسيم .

١٩٣٢١ - عَوَلَك السِنْدِيَان * ، عَوَلَك شَرِيف *

Anthaxia nobilis (S). *Anthaxie noble*, *Anthaxie des chènes* (F). *Anthaxia nobilis* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبقيات ورتبة سمندلات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الانجار . خنافسها تميش حل بتلات الازهار وعلى الاوراق الفتية . يرقاتها تسردب لحاء الافناد شكرها || جسمها صغير القليل من ٩ الى ١٥ مم . قوتها الى الخضار الاسفج الجليل . الاثى اصفر قدأ من الذكر وتسمى باحمار الكوسل الذي تقطعه في وسطه من الرأس الى الجناحة جعدة شفرها عابطة . رأسها مستدل الجرم يفرز بمطمة تحت الكوسل . حينها كيرتان . زباناها خيطيان . غذاءها قليتا التميزر ، ارساغها جاملتا القشار الصلب الذي لا يحترق الدويون . ارساغها خماسية المقل || جيلها الحولي واحد . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواسط تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها التام تطول نحو ٢٥ مم . جسمها سمكي التركيب ، مستطيل المقدم ، مستطيل المؤخر ، ثني الين ، كسني الرأس والشرج ، ضلع التأثير الضيق . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائلة قرنية منشبة الى شطرين || طور الاكمال الذي ينتهي في آخر نلق تحفره البرقة ، يستمر نحو ١٥ يوما .

١٩٣٢٢ - عَوَلَك لَمَاع * ، عَوَلَك نِيدُول *

Anthaxia nitidula (S). *Anthaxie luisante* (F). *Anthaxia nitidula* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبقيات ورتبة سمندلات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . تألف الجبال والحدائق والبراري . خنافسها تميش حل اوراق نباتات الفصيلة الوردية ، يرقاتها تسردب افناد واغصان الانجار الفصيلة ذاتها كانتفاح والاباص والمشمش والغورخ والزعرور والقور والورد والشرين || جسمها صغير القليل من ٥ الى ٧ مم . قوتها اغضر الظفران ناري الكوسل والرأس ، اسمر البطن والجرايز والزياني . رأسها صغير الجرم يفرز بمطمة تحت الكوسل . حينها كيرتان . زباناها خيطيان || غلوانها ذلق المؤخر اللاحت المستدير الطرف غذاءها متباينة التميزر اللقيق . ارساغها خماسية المقل || الاثى اصفر قدأ من الذكر واجبت قوتها منه والقصر زبانا || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اوائل تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || تترك البرقة لكامل المجموعي في اواخر شهر كانون الاول . فيصبح طويلا عند ذاك نحو ١٢ مم . جسمها متناح الحيد ، مستطيل المقدم ، كامن للمؤخر المستطيل ، اغبر الين ، اسمر الرأس والشرج . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائلة قرنية جزلة فائقة الطول || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوما وينتهي فسن صليجة خاوية النشاء .

١٩٣٢٣ - عُرُود أَحْمَر

Armérie (F).

هو البيقان ، اعليه .

١٩٣٠٦ - عَوَارِض جَوِّيَّة

Perturbations atmosphériques (S). *Atmospherical perturbations* (E).

اضطراب سير الحوادث الطبيعية الجوية بسبب بعض العوامل الطارئة الخلة .

١٩٣٠٧ - عَوَالِب

هي العنايت ، الحويثات التي تميش حل المشب .

١٩٣٠٨ - عَوَارِش

الموشر : قوائم وريش الطائر وكذلك الأعشار .

١٩٣٠٩ - عَوَامِة

Flooteur (F). *Water-gauge* (E). اسطوانة صغيرة من خشب السنديان توضع على المياه الجارية لقياس سرعتها نصيبها .

١٩٣١٠ - عَوَامِل التَغْدِيَّة

Facteurs trophiques (F). *Trophic factors* (E).

١٩٣١١ - عَوَامِل تَنُوعِيَّة

Facteurs ecologiques (F). *Ecological factors* (E).

١٩٣١٢ - عَوَامِل جَوِّيَّة ، عَوَامِل مَنَامِيَّة

Facteurs climatiques (F). *Climatic factors* (E).

١٩٣١٣ - عَوَامِل مَاحِدَة

Facteurs inhibiteurs (F). *Inhibitory factors* (E).

١٩٣١٤ - عَوَامِل مُحَدِّدَة

Facteurs limitateurs (F). *Limiting factors* (E).

١٩٣١٥ - عَوَالَة * ، سَمْتَنُوس *

Sminthus (S). *Sminthe* (F).

جنس حيوانات لينة قافسة من فصيلة البربويات . اوله عديدة ، موطنها البلاد الاسوية والاروبية جميعها صغيرة . القند تطول من ٦ الى ٨ سم . واذناتها كذلك . اوقاها الى الكية تسمر وتبقى مع اقترابها على ثيج الظفر وتصر وتبيض عند البطن . اذناها حشرقية اطوالها تمد من ١٤٥ الى ١٧٠ . قوتها الاحشاب والجذور .

١٩٣١٦ - عَوَالِد *

Sous-produits (F).

By-products (E).

هي المواد الثانوية الممكن استعمالها او استخلاصها بعد تصنيع المواد الرئيسية . مفرها عائدة .

١٩٣١٧ - عَوَالِد

العوائل اربعة كواكب في وسطها كوكب يدعى الربح . والعوائل تنتمي الى كوكبة الثنين .

١٩٣١٨ - عَوِيَّة

هي الافرنجية ، شجرة من السرويات ، اعليها .

١٩٣١٩ - عَوِيَّر

جرو القهد لا يزال برقة امه .

١٩٣٢٠ - عَوِيَّرِيَّات

Ocypodidae (S). *Ocypodidés* (F). *Ocypodidae* (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشرييات عشاريات الارجل ، قصيرات الليل ، لامسوايات للالاط || اجناسها وانواعها الحرة متوسطة البد . اصحابها شطوط بحار البلاد الحارة .



عَوَانَة



عَوَلَك السِنْدِيَان



عَوَلَك لَمَاع

Wurz (D). Acoro, A. vero, Canna odorifera, Calam aromatico (I).

نبات عشبي جنموري معمر من فصيلة القنطاريات. جذاميره مدادة. ذكية الرائحة تستعمل في الطب وتدخل في تحضير بعض الطيوب. أوراقها صفية الشكل جامدة متصل متصبة. شراخيه ينتهي بضمه من الإزهار الخشوية. وهو من نباتات السطور القديمة التي ورد ذكرها في التوراة. يستعمل في معالجة الرمد والقرات العصرية. ويقال إن جلوره مقوية للأعصاب.

١٩٣٥ - عَوْدَلْ ، مَيْلَلْ

Métamère (F). Metamere, Somite (E).

نمت تعريفي يطلق على بعض أعضاء الجسم المتساوية المتتابعة كما هي الحال في سحج المفصليات.

١٩٣٦ - عَوْدَكَة ، مَيْلَلَة

Métamérie (F). Metamery (E).

صفة الأعضاء أو الأجزاء المتعددة.

١٩٣٧ - عَوْرَوْرْ هو إلقاء البري ، أطلبه .

١٩٣٨ - عَوْرْ

Carance (F). Deficiency (E).

شاقة أو عارضة بسبب نقص في تمثيل عنصر غذائي تقتصر إليه التربة أو يفترق إليه مظهر الحيوان.

١٩٣٩ - عَوْصَجْ ، عَلِيْقْ ، بَاطْشْ ، شَوْكَلْ

Rubus (S). Ronce (F). Bramble (E).

جس نباتات دظلية برية وزراعية من سبط الوردليات وفصيلة الورديات. أولها زهاء ٢٠٠ مشفرة في جميع أصناف العالم. مظهرها بري وبهش زرامي. ثمارها مجاميل مأكولة تسمى «المقنع» وله ترب أو يستخرج منها بعم التحضير وتظهر تقاديد كحولية لليلة العلم. لشور أنولمه ما يتبع.

١٩٤٠ - عَوْصَجْ أَخَرُ الْمَتَبْ

Rubus phanicolatus (S). Ronce à poils rouges (F).

نبات دخل معمر ازنب الماء، أحسن الشوك. ساقه قرمراء تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه ثلاثية التخصيص، يفضية الشكل، خلية البشرة || أنزواره متعدي التجميع، ليد الإزهار الوردية اللون. ثماره لذيذة الطعم والمعرف بتقالية اللون.

١٩٤١ - عَوْصَجْ أَسْوَدْ

Bourgane (F).

هو لثيق الأسود ، أطلبه .

١٩٤٢ - عَوْصَجْ أَصْفَرْ

Rubus xanthocarpus (S). Ronce jaune (F).

نبات دخل سبروتي معمر أحسن الشوك. ساقه قرمراء مدادة. أوراقه مركبة ثلاثية الورديات للسنة الحارة. أزهاره نورية التجميع ، يضاء اللون. ثماره سكرية الطعم عادمة العرف ، صفراء اللون.

١٩٤٣ - عَوْصَجْ الشَّكَلْ

Rubus occidentalis (S). Ronce d'Occident (F).

نبات دخل معمر أحسن الشوك. ساقه قرمراء متطيلة السروع تملو نحو ٣٠٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية أو خمسية الورديات. نصلها من الحافة ، أخضر الصفعة العليا ، احمل السفلى الخلفية البشرة || أنزواره نوري التجميع . أزهاره متطيلة الأمن ، يضاء اللون. ثماره الال سوداء اللامع .



عود الأنبياء



عود الحية



عود الرج

١٩٣٤ - عَوْدُ الْأَنْبِيَاء * ، هَبَاكْ مَحْزَنْزِي

Guslacum officinale (S). Galac officinal, Bois de galac (F). Officinal guslacum gum tree, Liguon-vitae (E). Guajakbaum, Pockholzbaum (D). Guslaco officinale, Gelsomino, Legno santo (I).

نوع من التانيك وهو شجرة متوسطة القد من فصيلة القنطاريات. أصلها البلاد الأمريكية. أوراقها مركبة متقابلة. وريقاتها أبيضه ، شفعية ، يفضية النصل الجامدة للصفحة، المايق الخشام . أزهارها أبغية الإرتكاز ، نورية التجميع ، زرقاء اللون . ثمارها جلدية اللب . يزورها صفراء اللون ، هدنية الباب || خشبها نام الزرقه ، شديد الصلابة قليل الوزن ، فاعصر الصنف وله يستخرج منه بالتقطير مادة رائحية ، ورائحتها رائحة اللوز المر ، تستعمل في عدة مستحضرات طبية أعصها علاجات السفلس .

١٩٣٥ - عَوْدُ الْبَرَقْ هو التقطيل ، أطلبه .

١٩٣٦ - هَوْدُ الْحَيَّةِ *

Ophioxylon serpentium (S). Ophioxyle, Ophioxylon, Serpentina (F). Serpentina, Serpent wood (E). Mardervurzel, Schlangenholz (D). Serpentina, Legno serpentino (I).

جنية برية من فصيلة الفطريات منبها الهند . ساقها قرمراء . أوراقها أبيضه ، متقابلة ، اهليجية النصل ، معققة . أزهارها نورية التجميع ، تاجية الإرتكاز || يستخرج من جذعها ويظهرها عصارة مضادة لم ألهات ويصالح التئال .

١٩٣٧ - عَوْدُ الْفَيْفَرْ

هو الزايرن اللبناني وهو يشبه الفبق . أطلبها .

١٩٣٨ - عَوْدُ الرِيحْ هو البرباريس ، أطلبه .

١٩٣٩ - عَوْدُ الصَلْبِ هو القلواني ، أطلبه .

١٩٣٠ - عَوْدُ الطَّيْبْ هو الأندروج ، أطلبه .

١٩٣١ - عَوْدُ الْقَرَحْ

Anascyle pyrethra (F). هو الماقر قرمراء ، أطلبه .

١٩٣٢ - عَوْدُ الْمَاءْ هو صفصان الماء ، أطلبه .

١٩٣٣ - عَوْدُ النَّدْ ، عَوْدُ هِنْدِي ، أَغْلَاجُونْ

Excoecaris agallocha (S). Agalloche, Arbre aveuglant, Bois d'Aloès, Bois de Calambac (F). Agallochum, Indian aloe tree, Calambac tree (E). Agallochaubbaum, Alderholzbaum (D). Agallocha, Calambucco, Falambo (I).

شجرة برية صابرة القد من السويبات تكثر في الحد الشرقية وسرنديب . تنبت عند مصب الأنهر وفي الإخوار التي تنمها المياه الحارة والبحرية . عصارتها حارة كارية نقطه منها تبيض اللبن وتطلمها . خشبها رائحي المادة مرغوب فيه . يستخرج منه أدهان عطرية تدغل في صنعة الطيوب وأخرى طبية تدغل في عدة مستحضرات وعلاجات. اشتعال خشبها ويعدنا حطري البية ، فإع الرائحة الذكية الانحدادة .

١٩٣٤ - عَوْدُ الْوَجْ * ، عَرَقْ أَكْوَرْ ، وَجْ ، قَعْبُ الذَّرِيَّةِ ، لِيَكْرَ

Acorus calamus, A. aromaticus (S). Acoro, A. vral, Calamus, Roseau odorant (F). Sweet-flag, Sweet-sedge, Myrtle sedge (E). Echter-Kalamus, Acorus

أزهاره بيضاء اللون ، ثنائية التجميع أو فردية ، عورقة الاوتكاز ، مستطيلة الاذن ، ثماره الى السواد البنيغسي . يزود من اجل ثوله المستحب العلم الشائع الاستعمال .

Rubicole (F). ١٩٣٥٣ - **عَوَسَجِي**
نمت ترميني يطلق على كل حشرة تعيش على العوسج .

Cricerelle commune (F). ١٩٣٥٤ - **عَوَسَق**
هو الماسوق ، اطلبه .

Perotis chlorana (S). ١٩٣٥٥ - **عَوَسَقِدْ أَصْفَر**
Perotis jaune (F). **Perotis chlorana (E).**

حشرة خاضعة خاشية من فصيلة الزنتوبيات . اطلانها حطم اصقاع الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية وافريقية الشمالية . تألف البرادي والخرق والموتق التي يكثر فيها الفز والخرور . خنافسها تعيش على ما تقتسمه من نصال الورد . يرقاتها تعيش تحت القلف والعماء دون ان تتصل على الشكر ويهي ترطب في الفز والخرور والخرق والخرق . جسمها متوسط القد ، احليجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الصفار الخطي المراج . رأسها صغير الحجم ، يذود بحمته تحت الكبريل . زباناها غطيان ، منشوبا الشكل . كسلها محنود الصلصة . الاثني اكبر قدما من الذكر والقصر زبانا واكث ثوبا || حيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى اوائل تموز . تساقط بعد ظهورها باسبوع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تتطور ببطء ويبلغ طولها عند الادراك الثام سم ٢٤ . وهي مرقاة ، جسمها سكري التركيب ، مستطيل القمد ، كامن الخصر ، حنلي اللون ، اسير الرأس والخرق . وين ميزانها انها تسجل عند مؤخر سكتها الحادية عشر زائدة قرنية شبيهة بالملحة لتتقي بطلاث اصابع || تتسلل اليرقة في طور الاكامل عند منتصف نيسان وتظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار .

Venturia (S). ١٩٣٥٦ - **عَوَسَقِب** ، **تَبَكْ**
جنس فطور مجهرية من السخايات وفصيلة المشويات . اصحابها مستديرة متخلفة السام الحامطة باطار من الحلب الاسمر اللون . تكاثرت ضصوصة بتكاثر غيلية . وبها اصفر اللون شفي التركيب لتصله وبيرة متمزعة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

Venturia pirina, Fuscladium pirinum, F. virescens, Megadadosporium pirinum, Cladosporium pyrom, C. dentriticum (S). **Tavelure du poirier (F).** **Pear scab (E).** **Birnenschorf (D).**

فطر مجهرى شديد الاذى يصيب الاجاص في اوراقه وفناده وثماره || مظهره الخارجي يختلف باختلاف الجو والنبات . وهو في اليرقة يقع بين لا قرنية الشكل والحجم تركب النصل على صفحته السفلى والعليا || وهو في الانثان والافناد والافضان يقع قرنية لا قرنية الشكل تسلب البشرة والخرق والشكر || اما في الثار فهو يقع تحتها الاشكال لونها الى البشرة تركب البشرة تتحور الى سفن لب صلب يتسع بيرة ويمتلئ البيرة فيهب تشقيها || اضراره جسيمة لانه يطبل هيكل الشجرة بعد ان يسبب يباس الانثان والافناد ويعد ان يقتضي على

Framboisier (F). ١٩٣٤٤ - **عَوَسَجَ إِيدَه**
هو القرايبوز ، اطلبه .

Rubus malifolius (S). **Ronce à feuilles de pommier (F).**
نبات دغلي معمر شائك . ساقه فروع فله مستطيلة السروح ، تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه بسيطة تقاسية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ || ازهاره عقودي التجميع ، صغير القد ، عاصي الازهار البيض الصغيرة الامن . ثماره الى الحمرة البنيغسية .

Framboisier (F). ١٩٣٤٦ - **عَوَسَجَ جَوِي**
هو القرايبوز ، اطلبه .

Rubus spectabilis (S). ١٩٣٤٧ - **عَوَسَجَ رَشِيْق**
Ronce élégante (F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه متراكبة الفروع والانثان تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته سنائية مدنية ، نصلها خلي البشرة ، يسارز السروح || ازهاره ثنائية التجميع أو فردية ، كبيرة القد ، جميلة الحمرة الزاهية . ثماره صفر أو حر .

Rubus crataegifolius (S). **Ronce à feuilles d'ubépine (F).** ١٩٣٤٨ - **عَوَسَجَ زَهْرَوِي الْوَرَق**
نبات دغلي معمر شائك . ساقه فروع فله تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ضرورية الشكل ، ثلاثية أو خاشية التفتصص الاسماري || ازهاره عقودي التجميع كثير الازهار الوردية المنشة . ثماره برتقالية اللون مستحبة العلم .

Rubus fruticosus (S). **Ronce commune, R. sauvage, R. frutescent (F).** **Common bramble, Black-berry (E).** **Brombeerstrauch (D).** **Rovo, Rogo, Roveto (I).** ١٩٣٤٩ - **عَوَسَجَ شَاكِب**
نبات دغلي شائك معمر مهبل يكثر في الاماكن الرطبة . ساقه فروع متدلية . اوراقه مركبة . صاليهه الفتية الثنائية طيبة قابضة . ثماره غولية مأكولة مستحبة العلم .

Rubus odoratus (S). ١٩٣٥٠ - **عَوَسَجَ عَطِير**
Ronce odorante (F).

نبات دغلي عاصم البتوك معمر . ساقه فروع متعصبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشية التفتصص ، نصلها يعرض من ١٠ الى ٣٠ سم . وهو خلي البشرة على صفحته || ازهاره عقودي التجميع . عاتليه مستطيلة ، متشعبة ، كثير الثبر . ازهاره كبيرة القد عطرية البرق ، حراء اللون . ثماره سائرة العلم شديدة الحيرة .

Rubus deliciosus (S). **Ronce à mûres délicieuses (F).** ١٩٣٥١ - **عَوَسَجَ لَدِيد الشَمَل**
نبات دغلي عاصم البتوك ، سرح ، معمر . ساقه فروع متعصبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشية التفتصص . نصلها يعرض من ٦ الى ٧ سم . وهو خلي البشرة على صفحته . ازهاره كبيرة القد ، يضاء اللون ، فردية التجميع ، مستطيلة الاذن الحمر . ثماره غولية بنفسجية اللون لذينة العلم والبرق .

Rubus procumbens (S). ١٩٣٥٢ - **عَوَسَجَ مَدَاك**
Ronce rampante (F).

نبات دغلي سرودي معمر . ساقه فروع مفلجة . اوراقه ثلاثية أو خاشية التفتصص ، غصراء البشرة الملامدة الحمل .



عوسج شائع



عوسد اسفر



عوسج الاجاص

النَّار ٥ يكالغ باستمال احدى الادوية الفطورية واعضاها سالل بربود على الوجه التالى : - ١) قبل الايلال بمعدل يراوح بين ١ و ٢ ٪ - ٢) بعد سقوط التوجعات الزهرية بالمسرع بمعدل ٠,٨ ٪ - ٣) بعد المكافئة السابقة بثلاثة اسابيع يضاف اليه ١ ٪ من الزرنيخات.

١٩٣٥٨ - عَوَظَبُ النَّقَّاح ٥، تَبَعُغُ النَّقَّاح

Venturia inaequalis, Venturia chlorospora mail, Fusicidium dendriticum, Napsicadium soraneri (S). Tavelure du pommier (F). Apple scab (E). Apfel-schorf (D).

فطر مجهرى واسع الانتشار شديد الاذى يصيب التفاح في جميع اقسامها الهوائية ٥ مظهره الخضرى خلفى بالنسبة الى البشر المتعار، فهو على الورقة يقع سمر لا قلبية تركب شملغ التصلل يورقه في الصفة العليا ٥ وهو في الاصلان والانتاد يقع قرصية لا قياسية الشكل تلمط القشرة والشكير اما في الثمار فهو يقع بقع مستديرة يملوها سفن ليه تراس مشقق صلب للمادة اسمر اللون ٥ اضراره جسيمة لانه يطمب هيكل الشجرة بهد ان يقتضي على ثمارها يكتام باستمال احدى الادوية الفطورية القليلة المتصر التناسي.

١٩٣٥٩ - عَوَظَبُ الْحَمْرُوز ٥، تَبَعُغُ الْحَمْرُوز

Venturia populina, V. tremulae, Didymosphaeria populina, Pollichia elegans, Napsicadium tremulae, Fusicidium radium, Stigmia radiosa (S). Tavelure du peuplier (F). Poplar scab (E).

فطر مجهرى يصيب الحموروز فيفيذه. مظهره الخضرى يقع مقرة الزوايا تركب الاوراق واللواقي فيفيذ يسبح التصلل وتقدير الاوراق الى الاصيل الياكر ثم تلمط التواقي فتصعبها وقد تسبب يباسها ٥ يكالغ بقلع التواقي الموربة وسرقها مع الاوراق المساقلة.

١٩٣٦٠ - عَوَظَبُ الدَّوَسَر ٥، تَبَعُغُ الدَّوَسَر

Venturia graminicola (S). Tavelure du fromental (F). False oat scab (E).

فطر مجهرى تركب الدوسر فيفيذه. مظهره الخضرى يقع مستطيلة تركب الشرائف وقد تندهد الى السنايل وذلك ان ظروف خاصة وموامل جوية معينة ٥ اضراره زهيدة ان انحصرت الاصابة بالشراف وجسيمة اذا زلت بالسنايل. مكامنه جديده لكنها مكلفة. لذلك يجدر الاقلاع من زرع الدوسر في تربة يكثر فيها العوذب.

١٩٣٦١ - عَوَظَبُ الزُّهْرُوز ٥، تَبَعُغُ الزُّهْرُوز

Venturia crataegi, V. chlorospora, Megaladosporium crataegi, Fusicidium crataegi (S). Tavelure du faubépine (F). Hawthorn scab (E).

فطر مجهرى يطمب الثمار ويؤذي الاوراق ٥ مظهره الخضرى يقع لا قلبية الشكل والمجمع تصيب الثمار فتصلها وتركب نصل الاوراق على صفتها السفلى فتقذها. اضراره محصورة على انتشاره على الثمار ٥ يكالغ باستمال احدى الادوية الفطورية.

١٩٣٦٢ - عَوَظَبُ الصَّرْبَرَة ٥، عَوَظَبُ الصَّرْبَرَة

Venturia inaequalis cinerascens, V. aucupariae, Fusicidium orbiculatum (S). Tavelure du Sorbier (F). فطر مجهرى واسع الانتشار قليل الاذى يقدم من

الاصبال ولكنه لا يؤثر في ادراك الثمر ٥ مظهره الخضرى يقع تظهر في الربيع على صفة التصلل العليا عند انتكاب البروق ثم تمتد وتنتسج الى ان يستقر لونها على السمرة ويليه يباس النسيج ٥ اضراره عمودة الملوقة بسية لا تستجب للعناية.

١٩٣٦٣ - عَوَظَبُ الصَّفَصاف ٥، تَبَعُغُ الصَّفَصاف

Venturia chlorospora, Fusicidium salicidarium, Septogium salicidarium (S). Tavelure du saule (F). Willow scab (E).

فطر مجهرى يركب جميع انواع الصففاف فيفيذ الاوراق ويصلب الاقان ٥ مظهره الخضرى يكون على شكلين : اما يقع صغيرة لونها الى السمرة تركب نصل الاوراق الفتية على صفتها السفلى في اوائل الربيع ثم تمتد الى الاقان فتصلها وتصبب يباس نولها. ولما يقع سمر الاقان زام التصلل الاخضر على صفتيه وجانبى الصلع ثم تنتشر على الصفة ٥ يكالغ بقطع الاقان الموربة وسرقها مع الاوراق.

١٩٣٦٤ - عَوَظَبُ الْكَرَز ٥، تَبَعُغُ الْكَرَز

Venturia cerasi, Asceroma cerasi, Fusicidium cerasi, Megaladosporium cerasi, Cladosporium cerasi, Acrosporium cerasi (S). Tavelure du cerisier (F). Cherry scab (E).

فطر مجهرى يصيب الثمار ليصلها ويصيب الاقان والاوراق فيفيذها ٥ مظهره الخضرى يكون : في الثمار قروح مبيضة تطرأ من ١ الى ٢ سم. تتصلل الى يقع سمر مهدبة الاطراف تتسع من كبر حجم الثمرة ٥ وفي الاقان قروح صغيرة مرسوفة بدون انتظام تتصلل بسرعة الى يقع طبل مرامسة قرصية ٥ اما في الاوراق فانه يقع مهدبة تركب نصل الصفة السفلى ٥ اضراره محصورة على انتشاره على الثمار ٥ يكالغ كثير من العوذب.

١٩٣٦٥ - عَوَظَبُ الْكُرَّان ٥، تَبَعُغُ الْكُرَّان

Venturia fraxini, Fusicidium fraxini (S). Tavelure du frêne (F). Ash scab (E).

فطر مجهرى قليل الاذى يركب الاوراق فيصيب سقوها. مظهره الخضرى يقع صغيرة تبلو على الاوراق مقرة الزوايا طحلاء اللون ثم لتسع وتنتشر ويستقر لونها على السمرة فتسبب جفاف النسيج ويليه ٥ اضراره عمودة لا تستلزم المكافئة.

١٩٣٦٦ - عَوَظَبُ، عَفِيفَة. Osmanthus (S).

Osmanthus (F). Devil wood (E). Amerikanischer Ölbaum (D). Osmante (I).

جنس عجيرات ونباتات برية وزراعية من فصيلة القرظيات. انواعه المعروفة ٨ منها الشرق. اوراقها ابيدة، ممتدة، متقايلة، زيقوية الشكل او زيقية. نصلها جلدي الصفة جبل الخضار. ازهارها غبي التجميع، عويرو الارتكاز، ازهارها رباعية القرطب، ثنائية الالوان، صغيرة القد، يفضاء اللون، ذكية اللون المستعب. تستعمل في تجميل الشاي ٥ اشهر انواعه الزراعية الصناعية ما يلي.

١٩٣٦٧ - عَوَظَبُ أَسْوَد Osmanthus Delavayi (S).

Osmanthus du Père Delavay (F). جنبة سبريتية حفلة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فرونها واقلتها مراكية. اوراقها يضيئة الشكل تطل نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفة، منشاري الحافة. زهرها مستطيلة الانبوب قصيرة الفلق. ثمرتها زرقاء اللون، سمر المروج. ازهارها يستمر طوال شهر نيسان.



عوطب النقاق



عوطب الحور



عوطب الزمرور



عوطب الكرز



عوطب الكرز على الثمرة

١٩٣٧٦ - عُوفُكُ

Fuirens (S), *Fuirens* (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السديديات . أنواعه المعروفة نحو ٤٢ مظهرها نباتات البلاد الحارة والاستوائية || يوجد فيها لبثان المربب الأزرق (pubescent) ينبت بهس أسنة الصوط حيث لا تنقطع البروية . قصبة ساقه مستطيلة ، بسيطة ، عادية المقد ، زهاء البشرة .

١٩٣٧٧ - عُوفُكُ الأُدْعَالُ *

Boarmia cinctaria (S).
Boarmie bandée (F). *Boarmia cinctaria* (E).
حشرة من فصيلة الأزيات حرشفيات الاجنحة . موطنها الاسواق الممتدة الحرارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية قويا رقيق الازهار . سرقيها تعيش على اوراق النباتات البقلة || جسمها متوسط القد ينمو نحو ١٢ مم . بسيطها نحو ٢٨ مم . رأسها اقشبه اللون . عيناها كيرتان . زباناها شطيان مزدويان عنه الذكر ، عيناها عند الانثى . جوشها وبقها الى الشبهة || روشناها الاماميان الى الشبهة السوداء المزاج يتوسطها بقعة بيضاء وتعلوها سريجة وزوطة كستنية . روشناها الخلفيان الى الشبهة الخطية تعلوها زركشة كستنية وتضيق اسم || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن ميساجيا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٢٦ مم . جسمها شبه اسطواني للشكل ، مالمس القشار . قويا الى الاغضر البشري يطوح خسة خطوط قاطبة كستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

١٩٣٧٨ - عُوفُكُ التَّوَسَج *

Boarmia repandata (S).
Boarmie recroussée (F). *Boarmia repandata* (E).
حشرة من الازيات حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق الممتدة الحرارة من سويس البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قويا رقيق الازهار . سرقيها تعيش على اوراق المروج والبرسيم || جسمها متوسط القد ، ابيض ، يطول نحو ١٩ مم . بسيطها نحو ٤٨ مم . رأسها احمر اللون . عيناها كيرتان . زباناها شطيان عند الذكر ، عيناها عند الانثى . جوشها وبقها الى الخططة السوداء المزاج || روشناها ، عند الشقين ، الى الخططة الخطية يطولها في الزوج الامامي تضيق اسم ويتسطو سريجة كستنية . ويعلوها في الزوج الخلفي تضيق اسم اريد وزوطة حنارية سمراء || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن ميساجيا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٨ مم . جسمها اسطواني للشكل ، مالمس القشار قويا بماتن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو يراوح بين الاغضر البشري والاسمر الجوزي المزاج تطول ثلاثة خطوط قاطبة . جسمها شديدة السمرة . رأسها جزوي اللون . رواجيبها البنية الوسطى ماصة مما يجد بها الى التقير والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

١٩٣٧٨ - عُوفُكُ بُهْشِي *

Osmanthus aquifolium (S). *Osmante à feuilles de houx* (F).
شجرة سبروتية دخلة تعلو من ٣ الى ٦ امتار . فروجها وانفانها سراكية . اوراقها بهشية الشكل تطول نحو ٥ سم . نصلها جامد الصلصة يحمل في كل شطر من شطريه ثلاثة اسنان او اربعة . جميعها غليظة للقاعدة مدبة الطرف . ازهارها خافتة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



عُوفُكُ بُهْشِي

Osmanthus fragrans (S). *Osmante odorant* (F).
شجيرة بحداسة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروجها وانفانها منسجمة الارتكاز ، معتدلة الكثافة . اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها جامد الصلصة ، لاص البشرة ، حسن الحافة . زهرها قصيرة الاثيوب ، كثيرة الفلقة ، فواصة العرف المستحب الاخذ || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .



عُوفُكُ

Osmanthus armatus (S). *Osmante armé* (F).
شجيرة سبروتية دخلة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها سنانية ذرية تطول نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصلصة ، حسن الحافة ، شالك الاسنان والصلصة . ازهارها حرة مستطيلة المالبق ، متدلية || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .



عُوفُكُ

Theropithèque géloée (F). *عُوفُكُ*
فرد من فصيلة الحبرسيات مشهور باسم جلادة . اطلبه .

Wahlwischele * *عُوفُكُ*
جنس نباتات مسرة عارضة من فصيلة اللبديات . أنواعه المعروفة ثلاثة اصلها البلاد الاستوائية . سرقيها وفروجها معتدلة . اوراقها متطابقة ، قلبية ، مستطيلة ، جامدة اتصل المالمس البشرة . ازهارها رسيمة المسكن . ثمارها حنكية . بزورها مأكلية . صدارة سويها لينة مرطبة . لحاء فروجها صناعية لتسجية .

Microclima (F). *عُوفُكُ* ، *مُتَبَخ* *
Microclima (E).
هو المناخ الموسمي وقد يختلف من المناخ القلبي . ويستر الموكل من البومل الرقسية في التوجيه الزاوي اثنائي وفي مكافئة الحشرات .



عُوفُكُ الادخال

Ctena (S). *عُوفُكُ* *

Ctena (F). *Ctena* (E).
جنس حناكب صغيرة من فصيلة الدكيديات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اصلها البلاد الحارة والممتدة الحرارة . تعيش في الاودية والهايزن || اجسملها صغيرة القدة . بطونها ليلية الشكل . رؤوسها تركب صغروا وتقلدها قليلا . جرابها مستطيلة ، تحيلة الاطراف . اثوابها الى الصفرة البهجة بالاحمر والاسمر . رؤوسها قوامية الاطواق السود .



عُوفُكُ المروج

Entrecien (F). *عُوفُكُ* ، *صَيَاكَة* ، *تَعَهْد* *
Keeping, Preservation (E).
القيام بالمحافظة على سلامة الشيء .

ظواهرها اصفر تملو رقعة كستية وتمشع بني. ووشانها غشائيان. الصفة العليا من بطنها صفراء توسيطها بقعة سوداء. الصفة السفلى حمراء || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٦ - *Serpent court* (F). *Short snake* (E). **عومج**. الحية القصيرة الخليفة

١٩٣٨٧ - *Synergie* (F). *Synergie* (E). **عومرلة**. تاملون عدة اعضاء لقيام بوظيفة.



عولة خسير

١٩٣٨٨ - **عوميات**. *Notonectidae* (S). *Notonectidae* (F). *Notonectidae*, *Back swimmers* (E). *Rückenschwimmer* (D).

فصيلة حشرات مائية من رتبة غنظيات الاجنحة ولبقة تصفيات الجناح. اجناسها والوانها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، قلب فيها الاستطالة. رؤوسها مستعرضة. اعظامها صغيرة. عيونها كبيرة جاحقة. فرونها الامتصاصية صغيرة ، رباعية الفصل. كواسلها شبه متساوية الطول ولعروض. جانبيها مزوانية ، لاقامية الجسم. ظواهرها كادى الخنجرية الففروية. وراشها ، عند وجوها ، شفافة ، كبيرة. معدة السباحة باكتاف تقمية الاوتكار ، مهيبة. قوائمها المائية الزاكية. جميعها ترمح على ظهورها. قوتها كل ما تستطيع قصه من حشرات وسرديات وطوام.

١٩٣٨٩ - **عومج**. القلبية لتامة الخلق التي في حقورها غشطان سوداوان.



عوش

١٩٣٩٠ - **عوهق**. *Scopus umbretta* (S). *Ombrette* (F). *Umbrette*, *Hammer-head* (E).

طائر من فصيلة القليقيات وحيد الجنس والنوع. اطلانه الاولاد الارافية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه كبير الجرم. متوج القفا بكفة صغيرة. متفاده غرزي الشكل ، غليظ القفص ، منتفج المقلط العلوي || يتميز بقصر عنقه الذي يبعده من سائر اجناس فصيلة || ثوبه الى السمرة النابضة الجذوية المزاج. بطنه اقل سمرة من ظهره. مناكب جناحيه والحوالي والاباهر والكل شديدة السمرة الجذوية السفاه. ذنبه قصير القد ، مستعرض الشكل. حذقة منه غرزية اللون. متفاده اسود. رجلاه الى السمرة النابضة || يألف النياض ويجاري الماء والمتاع. قوته الاستملاك والحيات والزورخ والسماء والبقاع وقرونويات والديدان || مسرعه من القجر الى الشروق ومن العصر الى الغسق || يدفن عنه في السط. اثناء تقص اربع فيضات تحضنها بتأثير الاكر نحو ثلاثة اسابيع ، تقف الجلابيط عادمة الزغب وتبقى في العش بعدة ابوها الى ان تكسي اي بحر خسة اسابيع.



عويسق

١٩٣٩١ - **عوهقان**

السيفقان كوكبان الى جنب الفرديق على نسق طريقهما لما يلي القطب.

١٩٣٩٢ - **عويسق** * ، **عويسكة** ، **صكر الجراد** *Tinnunculus cenchris* (S). *Crécairelle crécorine*, *Crécairelle*, *Créserine* (F). *Lesser kestrel* (E).

طائر من الصقريات وهو نوع من الماوسق صغير القد

١٩٣٩٩ - **عولق** * . *Diphylla* (S). *Diphylla* (F). جنس غفاش من فصيلة الفويات. وحيد النوع. موطنه البرازيل. جسمه صغير القد ، أبيض. طوله نحو ٧٠ سم. بطنه ٣٠٠ م. فوطته اسفينة قصيرة. ثنائيا ثنائية مدبية حادة. ثوبه الى الصبغة الصفانية يملو مزاج اسفر. يعيش بجاهات قليلة العدد. قوته البند يمسه ايها اسفل. يألف الاجمار الحربية اللغة والفلور والكهوف.

١٩٣٨٠ - **عولكة خمير** *

Ouroperia Gambir (S). *Ouroperia Gambir* (F). خميرة حرجية من فصيلة الفويات. منتجا يتد من الهند الى ماليزيا || ساقيها منتصبة فراء تملو نحو اربعة اشرار. اوراها متباعدة ، معتقة. نصالها احليمية الشكل ، مدببة الاطراف ، نازحة الفضلوع والعروق. انزهارها رؤسي التبعج ، ابلي الاوتكار. انزهارها صغيرة مستطيلة الكلوس ، خالصة البلات الصفراء ، غائقة العرف المانوس || يستخرج من مرقها بالخر صارة رائحية قابضة تستعمل استعمال الكافور.

١٩٣٨١ - **عولقيات** * . *Vampyrellae* (S). *Vampyrellae* (F). *Vampyrellae* (E).

فصيلة تطور مجهرية من رتبة السرديات ورتبة البيضيات.

١٩٣٨٢ - **عولقة**. *Cogia brevicaeps* (S). *Cogia à tête courte*, *Cachalot nain* (F).

نوع من العبر وهو من الحيتان الصغيرة القد ، طوله نحو ثلاثة اشرار. ثوبه الى الزرقة السمراء. موطنه المحيط الهادي واشيط الهندي والبحر الاحمر. سره كثير البدد يراوح بين ٥٠ و ١٥٠.

١٩٣٨٣ - **عومكة بحيرية اللون** *

Notonecta glauca (S). *Notonecta glauque* (F). حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٠ م. رأسها مستعرض ، بحري اللون. خطمها فسيط. ميناهما كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران ، نجيلان. ظواهرها بحري اللون يملو تمشج اسمر. ووشانها غشائيان ، شفافان. بطنها اسود الصلصة العليا ، بحري السفل. حمار بطنها متكاثف الملب || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٤ - **عومكة خضراء** * . *Notonecta viridis* (S). *Notonecta vert* (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٤ م. ثوبها اخضر اللون. رأسها مستعرض. خطمها قصير. ميناهما كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران. حيفتها مزوانية سوداء. ووشانها كيرتان غشائيان. حمار بطنها مرقش بالاسود || تعيش في المياه الراكدة.

١٩٣٨٥ - **عومكة دكسة** *

Notonecta maculata (S). *Notonecta maculé* (F). حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٦ م. رأسها عريض ، اسفر اللون. خطمها قصير. ميناهما كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران ، نجيلان. كويلها اسفر اللون تملو تمشة سمراء لاشواوية الكثافة. حيفتها مزوانية ، كستية اللون.

١٩٣٩٩ - عَوَيْتِيَّةٌ مَسْرُوكَةٌ

Gibberella baccata, *Calonectria varians*, *Fusarium fructigenum* (S).

فطر مجهرى يركب عدة أجسام مشعة وسريعة انصهار اللينين الخامس واليوسى والكرو والذراق والتفاح والاصاص والزيتون والورد والسنب والصفصاف والصفراء والورد والخن واليوكا || يصيب ثمار الكرو والذراق والتفاح والاصاص فيطعمها من البشيرة الى البرة المفالة . مظهره الخارجى بقعة صفية سمراء اللون تتسع وتكون في الثوب . وهو في اللينين الخامس واليوسى يقع سم مسطيلة ، تركب الجذوع والسوق تنسب الصرم || وهو في الجز والزيتون والورد يقع خضيرة مستديرة لونها الى السواد اللامع تنسب للسواد وتقرحه || اغزاره منطوية بطروقة البرة وموزرة العوامل الجوية || يكافح كثيره من الفطور

١٩٤٠٠ - عَيْبَيبُ هو الانسداد ، اطله .

١٩٤٠١ - عَيْبَيبَكَة (F). Tide (E).

حركة دورية تأخذ مياه البحر فترتفع وتنخفض مرتان يومياً في اوقات شبه معينة لتتصودة . استمرارها يدم ١٢ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ اما انخفاضها وتقلصها فيدم الجز والتقيص || ارتفاع مياه الله في البحر الابيض المتوسط يراوح من ١٠ سم الى ١٠٥ سم . وارتفاعه على شواطئ الاطلس يراوح من ٣ امتار الى ١٣ متراً || اما انقراض المياه وارتفاعها يدمها فاته منطوية بحدار الشمس وبمنازل القمر الذي يمتد في الجاذبية .

١٩٤٠٢ - عَيْبَيبَكِي (F). Synodic (E)

نمت تعريفي يطلق على الدورة الكاملة التي تقوم بها الكواكب بالنسبة الى الشمس . فالدورة القمر السابعية تستمر ٢٩ يوماً و١٣ ساعة و١٣ دقيقة من الدورة الفلكية .

١٩٤٠٣ - عَيْبَيبَر (F). Titre (E).

هو مقدار العنصر الحر العرف الذي يحويه مادة معينة . فتركيب مثلاً سبزو حيار ٨٥ منه ان هذه المادة تحوي ٨٥ ٪ من الكحول || وهو أيضاً مقدار المعدن الثمين من ذهب او فضة الذي يوجد في العملة المسكوكة او الخلل . ومن هذا القبيل قولهم ذهب حيار ثمانية عشر ابي بالنسبة الى اربعة وعشرين من الذهب الحر .

١٩٤٠٤ - عَيْبَيبَكَة هِلَالِيَّةٌ

Substitution alimentaire (F). *Allimentary substitution* (E).

البياضة الغذائية او عياضة الاغذية هي تبدل بعض الاكلات بغيرها بشرط ان تحوي الوحدات الغذائية نفسها .

١٩٤٠٥ - عَيْبَيبُ (F). Faut, Defect (E).

التقصير او الوصمة في الشيء .

١٩٤٠٦ - عَيْبَيبُ رَاجِعٌ أَسَدُ

١٩٤٠٧ - عَيْبَبُ الوَكْرُ *Tendon failli*, *Nerf-ferrure*

اقتراب وتر الوظيف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . وهو من عيوب الخيل .

١٩٤٠٨ - عَيْبَبُ بَيْبَعِ الرَّدِّ ، عَيْبَبُ مَيْبَعِ اللَبِيعِ

Vice rédhibitoire (F). *Redhibitory defect* (E).

عيب شرعي يجعل البيع غير قابل للاستعمال او يحد من

طوله نحو ٢٢ سم . لونه الى الجوزة السوداء ، انحر الرش ، اغصن القلود والاباهر والكل || قبه الجنادب والملاء ، يكثر حيث يحل الجراد وقد يرافقه في رحاله .

١٩٣٩٣ - عَوَيْتِيَّاتٌ ، لُبُوثٌ عَفِيرِيْن

Myrmecoleonidae (F). *Myrmecoleonidae* (E).

نصيلة حشرات من عصبيات الجناس . اجناسها وانواعها عديدة ، قربتها الانتشارية قصيرة مثالية . اناتها تتجمع مكانها في القباب والربل ويتغذى من حليص . فضة الجفة ، قوية التأثير ، كثيفة الحلب ، تنحرف في البرة ، حل برات اللد ، حراً صغيرة قمية الشكل يسقط فيها النمل وتغرسه .

١٩٣٩٤ - عَوَيْتِيَّةٌ هي الحيوان الرتي ، اطله .

١٩٣٩٥ - عَوَيْتِيَّةٌ

Gibberella (S). جلس فطور مجهرية من المتاحيات ونصيلة المشطيات . اجناسها شعبة الانتشاب اليوسى . قصها اسم اللوب يطول مراح ازرق || طويها اللوبى كلور الكن . يطها اهلبي مستعمل جديد الاضية المتساوية للوبرة الانقسام المتعرج || انواعه عديدة منها اربعة مؤذية وهي ما يتبع .

١٩٣٩٦ - عَوَيْتِيَّةُ الثَوْتِ

Gibberella moricola, *Fusarium lateritium*, *F. urticarum* (S).

فطر مجهرى يصيب افتاد الثوت فيؤذيها . مظهره الخارجى يقع قرحة لا تلتئم لونها الى البرة السوداء تلو فتور الانداد تنسب ذليل الاوراق ثم يماسها ويهاش التقصيص والانتداد يدم اسرار خشبها || يكافح بقطع الاغصان المبرودة فور ظهور المرض ثم تطهيرها بأحد الفطور القاتل المركزة على التماس .

١٩٣٩٧ - عَوَيْتِيَّةُ الزَّرْعِ

Gibberella zea, *G. subnietzi*, *Fusarium graminearum*, *F. roseum*, *F. rostratum* (S).

فطر مجهرى يصيب ٢٦ نوعاً من البات تنسب الى عدة فصائل . اجناسها الحنطة والشيطان والشعر والارز والذرة . كما انه يركب جذور البطاطا واللوبيا ويصيب مشاتل البنود ويؤذي الكتان والقنب والفجل والخيار والفول . مظهره الخارجى مقيم يحل بالزروع وبالنباتات المائلة فيؤخر نموها او يموت وقد يصيب عدم الاسبال او الاسبال الابيض الخالي من الحلب || اغزاره منطوية بعمى انتشاره الماتك الى وطرية البرة وملوحة العوامل الجوية || يكافح بطهير البذار .

١٩٣٩٨ - عَوَيْتِيَّةٌ حَرَّارَةٌ

Gibberella moniliformis, *Ustilago tritici*, *Fusarium moniliforme* (S).

فطر مجهرى يركب عدة نباتات اجناسها تنسب السكر والارز والذرة ولا يحد من الحنطة والشيطان والشعر . مظهره الخارجى على تنسب السكر خطوط حر تلو القصبة عند طرفها يتألفها يقع سم تركب نصل حصف الناي فتقوى . وهو على الارز يقع حر تركب حصف الساق في ابان عيبا تنسب نحوها واسطعائها غير الطبيعية ثم ذبوا قبل الاسبال او قبل الاضرار . وهو على الذرة يقع حنطة تركب الجذور فتضلل وتنب اصفرار الاوراق وذبولها || يكافح بطهير البذار وباحتجاب الموانع الرطبة والازرة المكتوية القوية الانعلاج .

استعماله فيجوز حيث الشاري فسح البيع وسالبي البائع بالتدريس || والمربوب التي يعتبرها لثانين ميسرة لرد هي : القناد والنسقة وقائع الحنبرة للزبن والقرعة والعرج القديم المتوار والوارد للمايد وباد الخنازير .

١٩٤٠٩ - عَيْتُون * (F). Altonia (S). Altonia

جنية برفة وثريبتية من فصيلة السبديات . مهدبا بعض مناطق افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريبتية في معظم القنار الممتدة الحارة || ساقها قصيرة قرمء . اوراثها معتقة ، ضنية التجسيم ، ستانية النصال الفسيقة . ازهارها جميلة الشكل ، ليلكية اللون ، خاصة البيلتات ، كثيرة الاسدية ، عادمة العرف .

١٩٤١٠ - عَيْتَام (F). Platane

العيلم هو الدلب . واسدته ميثامة .

١٩٤١١ - عَيْتُون * (S). Clambus

(F). Clambus (E).

جنس حشرات من فصيلة العيشيات ودية لمعديات الاجنسة . انواعها المعروفة ستة منتشرة في بعض مناطق البلاد الممتدة الحارة || اجسامها شديدة الصغر لا تتجاوز ١م . رؤوسها كبيرة . عينها صغيرة ، بارزة . قاذورها وفكوكها نظامية . قربنها الاستعمارية غريبة . كواسلها مستعرة . امحادها لاسعة قوائمها نشيطة . اولياها وحيدة اللون السوي وهي الى القشرة او السمرة || تعيش حل المواد النباتية المختصرة وفي الاعشاب النخرة وفي القروث والخثي .

١٩٤١٢ - عَيْتُونِيَّات * (S). Clambidae

(E). Clambidae (E).

فصيلة حشرات من لمعديات الاجنسة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع القنار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، لا تتجاوز ١م . رؤوسها كبيرة . عينها صغيرة ، بارزة . قاذورها وفكوكها نظامية . قربنها الاستعمارية سداسية الفصل . كواسلها قصيرة مستعرة . امحادها لاسعة . اوسافها وديعة البقل || تعيش في التدي البتالي وفي الاعشاب النخرة وفي القروث والخثي وفي جميع المواد النباتية المختصرة || لشهر اجناسها العيشون .

١٩٤١٣ - عَيْشُون * (F). Scardinius

(F). Scardinius (F). Red-eye

سمكة من السبديات . تعيش في المياه العذبة لا فارق متعدها بين البسيرة والنهر والجور . اقلها البلاد الميادية والنسقة الحارة || جسمها اعليجي الشكل ، مستطال التبطيط ، بطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . سهفا مستدير كبير . يربوا الى الخضار الزرق المزاج يدي في الظهر ويزهر في الجالين . وينصرف الى القفي في البطن . رأسها مستطال الحجم ، قصير الخلف ، صغير الشفق . عينها مستديرة ، صغرتان ، جميلة الحمرة القرمزية || زفافها ودية اللون حمراء المزاج ، الظهيرة ودية مزوانية الشكل ، تملو مؤخر الظهر . الذيلية فارقة || لحمها كامن النصف ، قل من يربف فيه .

١٩٤١٥ - عَيْد

العيد : حجر جبل ينبت عينا نحر الفوام لمر لا ورق له ولا نور ، كثير اللحاء والمعد يفسد بلماحه المرح الطري فيلثم (اللسان) .

١٩٤١٦ - عَيْدَان الحية (F). Ophiocten

سبط من فصيلة العنليات . اشهر نباتات عود الحية .

١٩٤١٧ - عَيْدَانَة

هي كل شجرة سلية قديمة لها عروق نافذة الى اللاء (اللسان) .

١٩٤١٨ - عَيْدَس عَيْدُون * (S). Idus vulgaris

(F). Idus common (F).

سمكة نهريه يروض من مفتوحات اللانة وفصيلة السبليات . اصطنها معظم النهر وبحيرات الشرق الاذلي واروية || جسمها اعليجي الشكل ، بطول نحو ٣٠ سم . رأسها مستطال الجرم ، مخروطي الشكل ، قصير الخلف ، صغير الشفق . قوائم الى الركة السمر السمر المثلج تشبه سمرة في الظهر وتنف في البطن . زفافها مستطال الاجسام ، الظهيرة واحدة شبه هرية الشكل . الذيلية فارقة || لحمها متوسط النصف ، مأكول .

١٩٤١٩ - عَيْدَشُون * ، عَيْدَشُون (F). Iguana

(S). Iguana (F). Iguana (E).

جنس حيوانات زسافة من فصيلة العيشيات . انواعها المعروفة اثنان يتمايزان بذكر الحية واصطنها التي تراوح بين ١٢٠ و ٢٠٠ سم . اصطنها وتيج ظهورها منقطه يجار من الحلب غصوري التركيب ، مشطي الشكل ، أسود اللون . اثنائها الى الزرق الخضراء يطولها وتيج وتيج وتيج تراوح الزوايا من الصفرة الى السود || وما من الحيوانات الخافضة الحاشرة التي تائف لغطاف الانهر ويجاري للاء . تعيش حل الايجار . لحمها مأكولة ويروضها كلك .

١٩٤٢٠ - عَيْدَشُونِيَّات * (S). Iguanidae

(E). Iguanidae (F). Iguanidae (E).

فصيلة حيوانات زسافة من ربة العنليات السيميات الاسنة ، الرباعيات القوائم ، المستطيلات الانذاب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطنها البلاد الحارة . لشهر اجناسها العيشون .

١٩٤٢١ - عَيْدَكَة * (F). Isogamie

(E). Isogamie (F). Isogamie (E).

العيدة ايحي طرائق الانسان الشقي ؛ تتميز حدافيا بمساواة النامات الزوانية الذكرية والانثوية .

١٩٤٢٢ - عَيْدَم * (F). Isogamie

(E). Isogamie (F). Isogamie (E).

هو اللادن الاكري ، اطلبه .

١٩٤٢٣ - عَيْتَر هو الضلع ، اطلبه .

١٩٤٢٤ - عَيْتَر ، حَكَر الشبسي (F). Baudet

(E). Baudet (F). Baudet (E).

هو الحار اللبل للتعصب الصالح لقر حل الحجير واللاتن . ج امبار وبار وبيور وبيورة .

١٩٤٢٥ - عَيْتَر

العير : الايل . وقال ابو الهيم : العير كل ما يتير عليه من الايل والحجير والبلال فهو عير .



عيتون



عيتون



عيس بلبل



عيتون

cile (F). Jerusalem sage (E). Jerusalemssalbei (D).
Salvia arborea, S. di Gerusalemme, Salvione (I).
بججة سريوية معمرة تملو من ٧٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها
خشيشية. فروعها فرقة متبادعة كثيفة الزغب القطني
الشكل واللون. أوراقها احليجية النسل، خلية البشرة
ازهارها الى البياض الاخير. قناباتها مزينة بدماء اللون.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. يقال انها من
النباتات الطبية النافعة.

19435 - عِثْرَاوَة مُدَحَّجَة *Phlomis aurea* (S).
Phlomis dorée (F).
بججة سريوية معمرة مزينة بكثيفة الخجل الاصفر. تملو من
٧٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها سنانية الشكل مقطوعة الطرف.
ازهارها الى الصفار المذهب الموجج || ازهارها يستمر
طوال فصل الصيف.

19436 - عِثْسِي *Dromadaires blanchâtres* (F).
Whitch dromedary (E).
البس : الايل البيض يتخالط بياضها شي من الشقرة.
واحدنا أحمر والاثنى عيساء.

19437 - عِثْسَاء *Sauterelle femelle* (F).
العِثْسَاء : الجرادة الاثني.

19438 - عِثْسِرَاك *Arctostaphylos* (S).
Busserole, Bousserole (F).
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخنجات. انواعه
عديدة جميعها بري. سيقانها خفيفة ممددة. فروعها
متعصبة. أوراقها كاملة صغيرة لينة معتقة مضطوبة القاعده
مسئلة النسل. ازهارها متفرقة التجميع. ثمارها حنينة
للشكل حراء اللون او سواد || اشهر انواعه عيسران
عنب الدب او عنب الالب.

19439 - عِثْسِرَاك عِثْب الدب* *Arctostaphylos uva-ursi* (S).
Busserole raisin d'ours, Raisin d'ours, Busserade (F). *Bear-berry, Bear's grape, Uva-Ursi* (E). *Gemeine Bärentraube* (D). *Uva ursina, Eva ursina, Orsella* (I).

نوع من العيسران ساقه ممددة، فروعها تملو نحو ٣٠ سم.
أوراقها كاملة أبيضه. نصلها جامد الصلابة مائل البشرة.
ازهارها وردية اللون. عقيقها الزهري يضم من ٥ الى
١٢ زهرة. ثمارها حنينة حراء اللون يقال ان الالبية تأكلها.

19440 - عِثْسِكَاك *هو الاشقيال النجمي*، اطلبه.

19441 - عِثْسُوسُ رُبَاعِيّ البَجَج*

Allonyx quadrimaculatus (S). *Allonyx à 4 macules* (F). *Allonyx quadrimaculatus* (E).
حشرة واسعة قاذصة من فصيلة الزوحنيات وردية ممددات
الاجنحة. موطنها بطن اقاليم حوض البحر الابيض
المتوسط. خنافسها تعيش على رقيق اوراق النباتات الطرية
التي تكثر في غابات الصنوبر واخراجه. يرقاقها مقرنة
تقضي على امساح الحشرات الماشية التي تركب الصنوبر ||
جسمها صغير لينة يطول من ٤ الى ٦ سم. لونها اسود
الراس والجن والظهران، احمر الكويل. غلظراتها لثاني
التبقيع القندي الابيض. زباناها صولجانيان. عيناها
بارزتان. ارسافها خاسية القتل. || الاثني امير قدأ من
الذكر ولهت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جبل واحد

19442 - عِثْرُ السَّراة
طائر كبيكة الحماة قصر الرجلين مسروبا اصفر المتقار
اكمل العينين صافي اللون الى الخضرة اصفر البطن وما
تحت جناحيه وباطن ذنبه كانه يرد شي. يزعمون انه
يأكل التين والخبث. ج. مبرود السراة (السان).

19443 - عِثْرُ قَبِيَّان *هو سار قبان*، اطلبه.

19444 - عِثْرُون* *Irena* (S). *Irkne* (F). *Irena* (E).
جنس طير من الجوارح نباتات للتأثير وفصيلة الاكروريات
انواعه المبروقة ثلاثة اعطائها تمتد من الحد الى المازية
والقلايين. تألف الاذغال والبراري. قوتها الحشرات
والقوديات من المناكب الى المقارب والوزغ والظا
الصنيرة || اجسامها ريمه تطول من ١٨ الى ٢٢ سم.
متنقدها خفيفة. اجنتها معتدة الطول، ذلقة الاطراف.
اذنابها مقلوبة. اثوابها تراوح من الرمكة السواد الى السواد
للحمار || تدن اشعثا في الاشجار الماتية عند اقتناص
الافصان او الااناد. اناثها تحضن نحو اربع بيضات
على مرتين في الحول. الذكر توكين لها الحماة والنفاد.

19445 - عِثْرَاوَة ، فُلُوس *Phlomis* (S).
Phlomis (F).

جنس نباتات برية وريزينة من فصيلة الشفويات. انواعه
عديدة جميعها احشاب ونباتات. منها اقلع البحر المتوسط.
أوراقها حنينة لينة. ازهارها خلفة الاوان لها الابيض
والاحمر والوردي والاصفر || اعرف انواعها واشهرها مالي.

19446 - عِثْرَاوَة الخجل *Phlomis agraria* (S).

Phlomis des champs (F).
بججة معمرة مزينة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقها بيضية
الشكل، قلبية القاعده. ازهارها ضية متبادعة كالمنقيد.
عقبها تملو نحو عشر زهرات بنفسجية اللون. قناباتها
فضل كروية غرضية الشكل || ازهارها يستمر من
حزيران الى آب.

19447 - عِثْرَاوَة سَامِيَة *Phlomis samis, Phlomis superba* (S). *Phlomis de Samos, Ph. superba* (F).

بججة تريزينة معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. أوراقها
بيضية الشكل، قلبية القاعده. نصلها مائل البشرة
خلى الصلابة السفل. ازهارها سلبية التجميع متبادعة
الرصف. ثبلو صغراء اللون ثم تنصرف الى الحمر.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19448 - عِثْرَاوَة عِثْقُولِيَة *Phlomis tuberosa* (S). *Phlomis tubéreuse* (F).

بججة سريوية تريزينة معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم.
جلودها صقلية كروية الشكل. أوراقها قلبية النسل.
عقيقها الزهري يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. ضباته الزهرية
عديدة، الواحدة منها تجمع من ٢٠ الى ٤٠ زهرة، لونها
الى الحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19449 - عِثْرَاوَة لَرَجَك *هي الاذية*، اطلبها.

19450 - عِثْرَاوَة مَحْشُونِيَة ، فُلُوس *Phlomis fruticosa* (S). *Phlomis sous-ligneuse, Ph. de Palestine, Sauge on arbre, Bouillon blanc de Si-*



عِثْرُون



عيسران عنب الدب*



عِثْسُوسُ رُبَاعِيّ البَجَج

اجناسها وانواعها عديدة تكثر في البلاد الحارة والاستوائية.
بجملتها قنصة. احرف انواعها واشهرها اليفس .

١٩٤٤٨ - عَيْقُفَان * عود اجتر ، أرميريا

Armeria (S). Arméria, Armérie (F). Thrift, Pink (E).
Granello (D). Armeria (I).

جنس نباتات عشبية معمرة برية طيبة وزراعية تزيينية
من فصيلة اليرسماقيات. انموذج عديمة سيقان شراعية
تحمل الازهار تملو من ١٠ الى ٦٠ سم. اوراقها صفية
الشكل ، مختلفة الاشجام وبعد السروق. ازهارها كثيرة
الالوان فيها الالبيص والوردي والبيجي والاحمر والاربعوني
والجلوي || ازهاره يستمر من الشهور الى الاربعة
شهور.

١٩٤٤٩ - عَيْقُفُ Taxus
وقد يأتي بمحاني مختلفة اخضها البصر والمعدل .

١٩٤٥٠ - عَيْقُفُ Rivage (F). Bank, Side (E).

العَيْقُفُ : ساحل البحر والشاطئ . وصفة النهر
تسمى عيقة . ج عيقات .

١٩٤٥١ - عَيْقُفُ

هي الركة اي ساحة المزروعة او المزرب وكل فناء من
الارض احتجزت جوانبه الاربية .

١٩٤٥٢ - عَيْقُفَان

نبات كالفرنج له سفة كسفة القضاء (اللسان) .

١٩٤٥٣ - عَيْقُفُ ، عَيْقُفُ

Spermatophore (F). Spermatophore (E).

ج عياكم . البركية حق صغير اشد لياحي الشكل قدس
قدر بزة الفيل او بزة الكتان يلف رية من الشلق
عند ذكور بعض الحيوانات الزاحفة والقزابة والعدنيات
الرئوية والراسيات الاربل الخ ...

١٩٤٥٤ - عَيْلَاءُ * Ila (S). Ila (F). Ila (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الاربل
قصيرات الذليل وفضيلة القشريات . انواعها المروقة قليلة
العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتلة الحارة || اجسامها
صغيرة نصف كروية الشكل ، مخدبة الظهر ، منبسطة
البطن ، مفرقة المقدم والعقب ، مخرجة الاظفار ، سادة
التأثير ، قوائمها دقيقة مستطيلة باستثناء الزوج الاساسي
المستفخم ، الكثير الملاحظ المسنة لشفاير الداعلية ||
انواعها عديمة تكثر فيها الجلود والجلوة والبجوة والبشجبة والسمره
الحديدية المولج .

١٩٤٥٥ - عَيْلَاءُ Hyala (mala) (F).
Hyala (male) (E).
الصبي الذكر .

١٩٤٥٦ - عَيْلَاءُ

العيلم اسم الضفدع والبر الكثرة الماء او للسمه . ج عيال .

١٩٤٥٧ - عَيْلَاءُ Cei (F). Eye (E).

هي عضو البصر في الحيوان . تتكون من المقلة والجفون
والجهاز العصبي والاصحاب البصرية .

في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل شهر ايار
وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار وتبيت في
الليل || البرقة التي تبلغ الكمال الجسدي بمر ستة اشهر
تستعمل الى حورية في اوائل شهر نيسان . جسمها عند تمام
ادراكها يطول من ٧ الى ٩ سم . وهو مدني الشكل ،
مستطيل المقدم والراس ، مسطح الطرف اللذان ، سداسي
الرواجب ، ضلع التأثير ، اسير اللين ، اسير الراس .

١٩٤٥٨ - عَيْشُومُ Phellodendron (S).

Phellodendro (F).
جنس اشجار برية وزرنيحة من فصيلة الباليات . انواعها
قليلة ، اعجازها سرسة ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها
متشابهة مركبة ريشية حايلة . ازهارها حشركي التجميع ،
طري الارتيكار . ازهارها صغيرة القد صغرية الحرف عديمة
الفصل والبذلات والاسدية .

١٩٤٥٩ - عَيْشُومُ Broomallies (F).

Bushes, Brushwood (E).
الموج والنباتات البقلة الشائكة التي تعيش بين الاشجار
الحرجية .

١٩٤٥٩ - عَيْشُومُ ثَلَاثِي البَيْعُ *

Macrostagon tricuspidata (S). Macrostagon
tricuspidata (F). Macrostagon tricuspidata (E).

شجرة واحة شافرة من فصيلة الزناليات وربة مندبات
الاجنحة . تألف جميع الاماكن التي تكثر فيها الازهار
والزناوير والشفاير . تنافسها تعيش على ازهار الصوليوات
والشفايرات . يرقاتها تعيش على جذب الزناوير من النسوة
الى الشفور والهدور || جسمها صغير القد ، يطول من
٧ الى ١٠ م . لونها متعادل الالوان اسها وكسولها
ويطها الى الحمرة الجاذبة . صدرها الى السرة السوداء
وخدما الى الحمرة الصائبة يعلوها ثلاث بقع سود . اسها
صغير الجرم زيانا عيطوان . عينا صغيرتان . لملها
مغلقة ، ريشتها شفاغان ، بارزان تحت الظهران || لها
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر
ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافه
في اوائل تموز . الانثى تهريق المكن ميحادي قرب عشاريات
الزناوير على النبات والحجارة والترية || البرقة عند الادراك
التام تطول نحو ١٦ م . جسمها بسيط الشكل ، سداسي
الرواجب ، ضلع التأثير الفكية ، حشني اللين ، اسير
الراس والرواجب والشرج || طول الكمال الذي يستمر
نحو ٣٥ يوما ينتفي في التربة تحت الجملانة .

١٩٤٥٩ - عَيْشُومُ Liza (F). Smooth (E).

الشجر البعل ما كانت لحاء سوكه واخصانه سرسة ناعمة
البشرة .

١٩٤٦٦ - عَيْشُومُ * Belostoma (S).

Belostoma (F).
جنس حشرات قزابة من فصيلة البليفيات . انواعها كثيرة
تلقه اعطائها البلاد الاستوائية . تعيش في مائتها وانواعها
بجملها مفرقة كبيرة القد طويلا يراوح بين ٦ و ٨ سم ،
قربها الحيوانات الدنيا والحشرات المائية . لسها مخز عيف .

١٩٤٦٧ - عَيْشُومُ * Belostomatidae (S).

Belostomatidae (F). Belostomatidae (E).
فصيلة حشرات قزابة من نصفيات الاجنحة المختلفة .



عصم ثلاثي البعج



عيس



ميفقان



علاء

١٩٤٧٨ - عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، مَسْرَطَةٌ

Echantillon (F). Sample (E).

Rhynopomus (S).

Rhynopomus (F).

جنس غفائيش من حارة الريمات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . اوراقها من الريادي الاصل الى الكستاني الاسمر . رؤوسها صغيرة ، اذناها كبيرة ، فرائسها ذلقة ، زوائدها منحنية اسطوانية متراكبة . اذناها مسطلة دقيقة || موطأها مسطح الاجزاء ينبت من الرقيقة الثابتة الى الشرىة ويحوض البحر الاخر ويرتدب والته . يكثر ويوجد في وادي النيل . تعيش منفردة او جماعات متوسطة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات حل اختلاطها . تألف الكهوف والمغاور وراقب الصخور وتجاوذاً الانجار .

١٩٤٨٠ - عَيْنُون (F). Globularia (S).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة البينونيات . انواعها المعروفة ١٢ لها الاشباب والجنبايات اللينة الحشوية . اوراقها بسيطة ، القرصية منها ضيقة التجميع والشراعية متعاقبة . اثمارها رؤوسية كروية الشكل قريبة الشبه من اثمار المركبات . لها الى الزرقاء زهر ورقيق حسب الالوان || وهو من النباتات التي ترطب في الاراضي الصخرية وتجد في الارربة الكلسية .

١٩٤٨١ - عَيْنُون عَيْطَلِي الزَهْر

Globularia trichosantha (S). Globulaire à fleurs filiformes (F).

نوع من البينون وهو عشية برية وتربينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم . اوراقها القرصية اطولجية الشكل ، وحيدة الشكل ، ثلاثية الايمان . اوراقها الشراعية سنائية التصل متعاقبة . اثمارها كبيرة القد مستعرضة البتلوات المحيطة التلصص .

١٩٤٨٢ - عَيْنُون عَيْطَر

Globularia alypum (S). Globulaire alype, Alype, Herbe terrible, Séné sauvage (F). Globularia, Alype globe daisy (E). Strauchartige Kugelblume (D). Globularia alypum, Erbe terrible (I).

نوع من البينون وهو عشبية جبلية ، معمرة ، برية وتربينية اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، ملقحة الشكل ، جامدة التصل . رؤوسها الزهرية لاطعة ، حطرية العرف المستعجب . وهو من النباتات الطبية البديدة المتألف يوجد بين الصخور وفي المراتل القاحلة وادج السراخ واطراف الغابات .

١٩٤٨٣ - عَيْنُون عَيْطَل (S). Globularia nudicaulis (F).

Globulaire à hampes nues (F).

نوع من البينون وهو عشية جبلية ، معمرة ، برية وتربينية تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها قرصية ، ضيقة التجميع ، كبيرة القد ، مقنطرة القاعدة ، عادية التبيين . شراخها عيطلي اللساء . رؤوسها الزهرية كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٢ و ٣ سم .

١٩٤٨٤ - عَيْنُون قَلْبِي الْوَرَق

Globularia cordifolia (S). Globulaire à feuilles en cœur (F).

نوع من البينون وهو عشية جبلية معمرة برية وتربينية تملو نحو ١٥ سم . اوراقها قرصية ، ضيقة التجميع ، قليلة الشكل ، ثلاثية التبيين العلوي . شراخها حادم الازراق ، ازغب اللساء . رؤوسها الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم .

١٩٤٨٥ - عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، عَيْنِيَّةٌ

Source (F). Spring (E). عَيْنِيَّةٌ

مياه تخرج من جوف الارض وتساب على سطحها .

١٩٤٨٦ - عَيْنٌ

والخامس من كل شيء . وقد شاع استعمال لفظة عين للدلالة على الاموال الثابتة فقط .

١٩٤٩٠ - عَيْنٌ (F). Wild oom (E). Bousis sauvages

العين : بشر الوحش .

١٩٤٩١ - عَيْنٌ اَذْكِيَّةٌ

Schipulair (nail)

زعمة ثالوية تظهر في ابط الازنة .

١٩٤٩٢ - عَيْنُ الْاَمْعِ

Bourillon

فمعة في اسفل سرح الكرة تفتتح وتقلع اذا جد .

١٩٤٩٣ - عَيْنُ الْبَرْ

Schaenus (S).

Choin (F). Bog-rush (E). Koptied (D). Sceno (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السعديات . انواعها عديدة بعضها متني وبعضها ينبت في الاراضي الرطبة . اوراقها صلبة الشكل جامدة التصل تشبه اوراق الاسل .

١٩٤٩٥ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس الحربي ، اطبه .

١٩٤٩٦ - عَيْنُ الْبَرْ

هو اتوان السباغين ، اطبه .

١٩٤٩٧ - عَيْنُ الْبَرْ

عين البندوب نيم نير من كوكبية برج اثود .

١٩٤٩٨ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس الصبي ، اطبه .

١٩٤٩٩ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس الدليك هو الفشم ، اطبه .

١٩٤٩٠ - عَيْنُ الْبَرْ

هو عباد الشمس ، اطبه .

١٩٤٩١ - عَيْنُ الْبَرْ

هو البجربة ، اطها .

١٩٤٩٢ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الغفيس نبات من السعديات ، اطبه .

١٩٤٩٣ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الاتومان الاسفر ، اطبه .

١٩٤٩٤ - عَيْنُ الْبَرْ

هو اذان الفار ، اطبه .

١٩٤٩٥ - عَيْنُ الْبَرْ

Opale, Œil de chat (F).

Opal (E).

سبح كريم كثير الالوان . ويلى ايضاً سحر لبي .

١٩٤٩٦ - عَيْنُ صَحْصُوحَةٍ

Corps certain (F).

Certain matter (E).

هي مادة الشيء التي تلمس وترى .

١٩٤٩٧ - عَيْنُ مَرْكَبَةٍ

Œil composé (F).

Compound eye (E).



عين

جنبي خشيب. جميعها تريينية وأكثرها يستعمل لاستخراج الطر. طرعا دمن اصفر اللون ، فليح العرق الاخذ يخل في سمانه مطعم الطوب || اشهر انواعه الرئيسية التي تحدث منها جمع الفروص المعروفة وبدا استجد من اسرام ، هي ما يتبع .

١٩٤٩٥ - عَيْنُونُ الْمِطَر ، عَيْنُونُ لَنْتَكِي

Pelargonium capitatum (S). *Pelargonium rostr.* *Garranum rostr.* (F).

عشة ممررة زباد اللحاء ، ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة ومفرقة ، تصلها هليي البشرة ، وردي الالوان عند اللس . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، وردية اللون ، ارجوانية التجميع ، فرائح الرائحة العطرية || ازهارها ربيعي . زراعتها صناعية يستخرج من ورقها وازهارها عطر الوردي .



عينون مبول

١٩٤٩٦ - عَيْنُونُ إِهْلِييْ أَوْرَق

Pelargonium oblongatum (S). *Pelargonium à feuilles oblongues* (F).

عشة نيمية ممررة صفولية الجشنة ، حاملة الساق ، مديدة القروص تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل ، ذرية الزايم الاخير || ازهارها ال البيضاء الاصفر يعلو تزيق اخر || ازهارها صيفي .

١٩٤٩٧ - عَيْنُونُ بَهِي

Pelargonium fulgidum (S). *Pelargonium declatant* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة ، ساقها لينة نامية اسطوانية زباد اللحاء تملو نحو ٧٥ سم. اوراقها مفروقة ، خلية البشرة الغضبية المواج . ازهارها نورية التجميع مستعرضة البتلات العادة التطريش والتكريم ، الارجوانية اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .



١٩٤٩٨ - عَيْنُونُ ثُنَاكِي الْوَيْن

Pelargonium bicolor (S). *Pelargonium bicolor* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها مفروقة ، غرطية ، مسنة . ازهارها حاملة العرق الطري ثنائية اللون البنفسجي والاسمر الكسبي || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

عيون التجليات (١)

١٩٤٩٩ - عَيْنُونُ جَعْدِي

Pelargonium crispum (S). *Pelargonium crispum* (F).

عشة ممررة زباد اللحاء ، ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة متجمعة ، تصلها غشوراللس فليح الرائحة الترجالية . ازهارها مسطوية الاذن والبتلات الوردية اللون ، الارجوانية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عيون التجليات (٢)

١٩٥٠٠ - عَيْنُونُ حَبَاب

Pelargonium gibbosum (S). *Pelargonium gibbosum* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورديها غليظة العند . اوراقها بحرية اللون ، مفصصة ، غرطية القصص . ازهارها ال الصفراء الخضراء المواج السوية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

١٩٥٠١ - عَيْنُونُ سِنْدِيَاكِي الْوَرَق

Pelargonium quercifolium (S). *Pelargonium à feuilles de chêne* (F).

عشة ممررة ذكية العرق . ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مستطانية الشكل متجمعة الاطراف .

١٩٤٩٥ - عَيْنُونُ مَبُول *

Globularia vulgaris (S). *Globularia commune*, *G. vulgaris*, *Marguerite bleue* (F). *Blue daisy*, *Globe daisy* (E). *Kalk-Kugelblume*, *Blaue Kugelblume* (D). *Margherite azurra*, *Vedovella turchina*, *Morine* (I). نوع من البنون وهو عشة برية ممررة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها القرصية خماسية المروق ، لا قابلية التكرج . ازهارها الشراعية سائبة التصل ، عابكة الخمار . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، مشرة البتلات المقصصة . وهو نبات متغله الماشي لفيدها ولا يخلو من بعض الخواص الطبية التي تنفع الصدر والحم .

١٩٤٩٦ - عَيْنُونِيَّات

Globulariaceae (S). *Globulariaceae* (F). *Globulariaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين متحدة الفعالات مرتجلة الميخ .

١٩٤٩٧ - عَيْنِي ، عَيْنِي

Identique (F). *Identical* (E).

١٩٤٩٨ - عَيْنِيَّة ، تَمُودَج

Spécimen (F). *Specimen* (E).

١٩٤٩٩ - عَيْنِهْرَان

Gorilla (male) (F). *Gorilla* (male) (E).

هو ذكر النورلا اي الفول ، ج حايبر .

١٩٤٩٠ - عَيْنِي

Chocard des Alpes (F). الميخ م. عيقة هو زمث الجرود ، طائر من الغربان ، اطلبه .

١٩٤٩١ - عَيْنُون

Eau douce (F). *Fresh water*, *Soft water* (E).

يقال لعين المذبة عين عَيْنُون وَيُقَالُ لعين الماخلة عين زَيْنُون والعيون هو الليل الذكر .

١٩٤٩٢ - عَيْنُونُ هَم

Epithelo جنس فلور مجهرية من السناخيات وفصيلة السناخيات كندبر يونانية مهدبة تبتدئ رمية يضاه اللون ثم تجمد وتضفر وتضفر على الحفرة التاربية . اهدابها اصاسها . يوطها شيطي شفاف لا يخلو من بعض النقط السمية للبرقة . ازهاره قليلة منها نزع واحد شار يعلو عيون التجليات .

١٩٤٩٣ - عَيْنُونُ التَّجِيلِيَّات ٥٠٠ مَفُول

التجليات

Epithelo typhina, *Sphacela typhina* (S). *Quenouille des graminées* (F). *Cattail fungus of grasses* (E). *Erstickungs-schimmel der Gräser* (D).

فلر مجهرية يركب بعض التجليات البرية والمعلقة فليطيا . مظهره الخارضي غلاف ابيض اللون ثم يرتقالي يمتلئ كالم الفم من السيرة الى انتساب نعل الصفه . يظهر في حزيران ويبتدئ خليا رنيا ثم يكتف ويصلب فيسب ذبول الصفه ويرسل نحو الماء والازهار || ومنه من قال انه يؤذي الحيل والابقار التي تأمله مع الملف المصاب به .

١٩٤٩٤ - عَيْنُون

Pelargonium (S). *Pelargonium*, *Pétarionier* (F). *Pelargonium* (E).

جنس نباتات عطرية ممررة من فصيلة الفرنجيات . انواعه نحو ١٥٠ وضروبه زباد ٥٠٠ مظهره ليني وبضها

نصلها خلى البشرة، حطري العرف الاخاذ المستحب .
ازهارها صوانية التجميع ، صغيرة القند ، متساوية البتلات
الوردية اللون || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

١٩٥٠٨ - عَيْتُونٌ قَدَفُ الْقَطَنِ

Pelargonium tomentosum (S). *Pelargonium tomentoux* (F).

عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو
١٠٠ سم . اوراقها حلوة . نمتية العرف ، مستديرة الشكل ،
متجمعة ، مبهمة التفصيص . نصلها خلى البشرة وهو ابيض
الحمل الكثيف المستطيل . ازهارها الى البياض الاغبر
يملو تدرجاً وسطى قافى الحمرة || ازهارها يستمر من
نيسان الى حزيران .

١٩٥٠٩ - عَيْتُونٌ

التيق ويصغى رقيب القُرْبِيَّةِ نيم من كركبة مسك الامة .
مركزه على المكتب الايسر . يعتبر من نجوم العبة الاول
يعد من الارض نحو ٤٥ سنة ضوئية .

Hydrophasianus chirurgus (S). * *عَيْتُونٌ* . ١٩٥١٠
Hydrophaisan de Chine, Chirurgien, Pans (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من طوالب الساق وفصيلة التفلقيات
اعطاه تحت من الهند الى الصين ويترى الزوايج وسرديب .
يألف طغاف الجيرات والاحوار والمناقع . قوته الزغويات
والبلابيط . جسمه كبير القند يطول نحو ٥٠ سم . عند
الذكر نحو ٥٥ سم . عند الانثى . رأسه ويقدم عنقه وأعلى
جوشه الى البياض الناصع . مؤخر عنقه الى البياض
الاصفر يفصله عن بياض المقدم خط اسود . ظهره وذنبه
الى السمرة الزرقاء المائلة بظلالاً موجاً ارجوانى . جوشته
الى السمرة السوداء . جناحاه الى البياض المائج باستثناء
القوائم السود . حلقة حنث حنطية . متقاسده اوراق
الانتشابه ، اخضر الملقط . رمداه الى الخضار البشري ||
يفلن عنه في عقال الارز او حل اوراق النيلوفر وبغيرها
من الاوراق التي تملأ سطح الماء . الانثى تضع من ٣
الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

Ochne (F). ١٩٥١١ - عَيْتُونُ التَّمَرِ
هو الحزبيل ، اطلبه .

١٩٥١٢ - عَيْتُونٌ لَدَوِيَّةٌ ، عَيْتُونٌ عَرَبِيَّةٌ
Sous-yeux (F). *Sub-eyes* (E).
زيمات تنمو حول الزيمة الاصيلة فتخلطها اذا تلتفت .

Ommatidle (F). ١٩٥١٣ - عَيْتُونَةُ
Ommatidium (E).

العينية ، عند المفصليات ، هي العين الصغيرة البسيطة
التي تألف من مجموعها العين المركبة .

ازهارها وردية اللون جميلة وديجة بالاحمر || ازهارها
يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٢ - عَيْتُونٌ عَشِيٌّ

Pelargonium peltatum (S). *Pelargonium terra* (F).
عشبة معمرة لينة الساق المارسة المشقة . فروعها مخلفة
متدلية تطول نحو ١٠٠ سم . اوراقها خاسية التفصيص ،
خلية البشرة . ازهارها كبيرة القند يفسله اللون او حمراء .
ازهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٣ - عَيْتُونٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

Pelargonium grandiflorum (S). *Pelargonium à grandes fleurs* (F).

عشبة معمرة مزفيرة اللحاء . ساقها منتصبية ، لينة ،
عشبية ، جامدة ، تملأ نحو ٤٠ سم . اوراقها قلبية او
كلوية الشكل ، خلية البشرة ، بحرية اللون . ازهارها
كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٧ الى ٨ سم . لونها الى
البياض الملبح بالاحمر والبشبيسي || ازهارها يستمر
طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٤ - عَيْتُونٌ مُجَدِّعٌ

Pelargonium cordatum (S). *Pelargonium cordé* (F).
عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو
٧٥ سم . اوراقها حادة العرف ، قلبية الشكل ، مسنة
الحافة . نصلها ازغب البشرة ، اطبل اللون . ازهارها
كبيرة القند ، وردية اللون الملبح بالاحمر || ازهارها
يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٥ - عَيْتُونٌ مُخَطَّلٌ

Pelargonium zonale (S). *Pelargonium zoné* (F).
عشبة معمرة مزفيرة اللحاء . ساقها منتصبية ، لينة ، جامدة ،
تملأ نحو ١٠٠ سم . اوراقها سطحية التفصيص . نضوية
الحط الاسمر الكسبي . ازهارها نورية التجميع ، ضيقة
البتلات المستطيلة ، لوناً يراوح من البياض الى الارجوانى
والقرنيزي || ازهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٦ - عَيْتُونٌ مَشْرُومُ الْبِتَلَاتِ

Pelargonium schizopetalum (S). *Pelargonium à pétales déchiétés* (F).

عشبة معمرة عشقية الجنتية . ساقها لحية غليظة تملأ
من ٣٥ الى ٥٥ سم . اوراقها مفصصة وشرة للتصل .
ازهارها مسطحة الاذن ، مسترفة البتلات المشروية .
الصفراء اللون ، الحافة بالاحمر || ازهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

١٩٥٠٧ - عَيْتُونٌ مَعْتَظَرٌ

Pelargonium odoratissimum (S). *Pelargonium très odorant* (F).

عشبة معمرة سرحة . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو
٥٠ سم . اوراقها مستديرة ، شبه قلبية ، مبهمة التفصيص .



عُيُونٌ عَشِيٌّ



عُيُونٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ



عُيُونٌ مُخَطَّلٌ



عَيْقُ

غ



١٩٥١٩ - غَدَّاسُ الْمَسَرِّ - Gadus aeglefinus (S).

Egle fin, Morue noire (F).
نوع من الغداس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٤٠ و ٧٥ سم . اصطناعه شطوط بحار العالم القديم وهو لا يتنفس المياه الاقليمية لانه يعيش على اعماق يراوح بين ٢٠٠ و ٥٠٠ م .

١٩٥٢٠ - غَدَّاسُ اطْحَل - Gadus luscus (S).

Gede tacud, Baraud, Godde, Mollet (F).
نوع من الغداس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم . يتكاثر في البحر المتوسط . سره كبير القمد . يألف المياه الاقليمية التي يراوح عمقها بين ١٠٠ و ٣٠٠ م .

١٩٥٢١ - غَدَّاسُ الْعُمَق - Lota molva (S).

Morue barbus, M. longue, Molva (F).
نوع من الغداس الكبير القد . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . اصطناعه معظم بحار العالم . يألف الاماكن البعيدة للزور التي يراوح بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م .

١٩٥٢٢ - غَدَّاسُ صَغِير - Gadus minutus (S).

Gade capelan, Capelan (F).
نوع من الغداس صغير القد . طوله يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم . سره كبير . القمد محبوب معظم البطار . يألف المياه الاقليمية .

١٩٥٢٣ - غَدَّاسِيَّات ، غَدَّاسِيَّات - Gadidae (S), Gadidae (F), Gadidae (E).

فصيلة اسماك من المسارات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بمساقط اجسامها النحيلة الحوافش الرقيقة الناعمة . اصطناعها معظم بحار العالم . تألف الحياة المجاهية . سرها يعد بعض ثنائيات الاولوف || اشهر اجناسها : الغداس والنبر والبقلة والنفلان واللط .

١٩٥١٤ - غَابُ الْبَحْرِ * ، غَابِيَّة - Millepora (S), Millepore (F), Millepore (E).

جنس مديخ حجري من فصيلة الغابيات . انواعه الممرية قليلة البعد . اصطناعها بحار البلاد الحارة . جميعها قريبة الشبه من المرجان يتكاثر فيها اللزج الرخامي الاصفر المبرج والاحمر الباهت والاصفر الحطلي .

١٩٥١٥ - غَابِيَّة - Futale, Bois (F).

Forest of high trees (E).
الغابة هي الاجرة او الحرجة التي سوكت اشجارها فبسقت وداحت وصارت صالحة للصناعة . ج غاب وقبابات . وهي بمثابة الشامل مجموعة نباتية تميزت ببيئتها ومختلف نباتاتها الطولية .

١٩٥١٦ - غَابِي - Forestier, Sylvicole (F).

Pertaining to forests, Living in woods (E).
ما كان مختصاً بالغابات .

١٩٥١٧ - غَابِيَّات - Milleporidae (S).

Milleporidae (F), Milleporidae (E).
فصيلة مديخ حجرية تعيش وتتكاثر في بحار البلاد الحارة . اشهر اجناسها غاب البحر .

١٩٥١٨ - غَدَّاسُ * ، غَدَّاسُ ، غَدَّاس - Gadus (S), Gade, Morue (F), Cod, Codfish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الغداسيات . لحونها ما كوكلة ويستخرجون من اكبادها زيت السمك || انواعه عديدة تتميز باجسامها الاقليمية الشكل التي يراوح طولها من ١٥ الى ١٥٠ سم . فوكوكها وسيدة القدية الطويلة . حيونها كبيرة جاسطة . اشهر انواعه ما يلي .



غاب البحر



غادس

النبراء. وبعضها مسج بضبوط قاطبة فخرية || هويا
متوسطة الصنف، مأكولة.

Ulmaceae

١٩٥٣١ - غار حاصبيات

هي الانجريات، اطلية.

Lauraceae (S).

١٩٥٣٢ - غاريات

Lauracées (F). Lauraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة الثمرات. انواعها
المعروفة زهاء ٩٠٠ تنتمي الى ٢٤ جنساً تنسب الى ثلاثة
اسباط. جميعها اشجار ونباتات. اشخاصها صلبة صناعية.
اوراقها ابيدة كاملة، بسيطة، متعاقبة، معققة، جامدة
التصل. ازهارها عتقودية او عتقولة او حلقية التجميع،
محورية الاوتكاز. ثمارها زيتونية او نورية الشكل
منها المأكولة والطبية والصناعية.

Trigonellae (F).

١٩٥٣٣ - غاريات

هي الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات.

Agaricus (S).

١٩٥٣٤ - غاريقون

Agaric (F). Agaric (E).

جنس طيور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات.
انواعه زهاء ١٠٠٠، اصنافها العالم على اختلاف اقاليمه
للمنتج من خط الاستواء الى القطبين الشمالي والجنوبي.
يعيش على الزيل والبليل ويغفلت الاعضاء النباتية المنحلة
وتشمل غداه السويق وقلعة الجلود... منطها جمالي يذوي
ويجت وبعضها لهذه الطعم مأكلي || اشهر انواعه
ما يتبع.

١٩٥٣٥ - غاريقون احيد

Agaricus annularis (S). Agaric annulaire, Tête de méduse (F).

نوع من الفاريقون البري المؤذي الجمالي المادة القلابة.
يكثر في غابات واسراج جبال المناطق المعتدلة. يعيش
ويتكاثر على اللحاء والاشعاب السائرة نحو الانحلال.

١٩٥٣٦ - غاريقون احمرش

Agaricus colubrinus (S). Agaric couleuvré, Couleuvrée (F). Toadstool (E).

نوع من الفاريقون البري المأكول. يكثر في اسراج
البلاد المعتدلة. يعيش على مخلف المواد النباتية المنحلة.

١٩٥٣٧ - غاريقون عسكي

Armillaire de miel (F). هو الطرخم، اطلية.

١٩٥٣٨ - غاريقون قتال

Agaricus necator (S). Agaric meurtrier, Morton (F).
نوع من الفاريقون البري الجمالي. مادته القلابة شديدة
الاذى سمية. يعيش ويتكاثر على المواد المصنوعة المنحلة.

١٩٥٣٩ - غاريقون كبريتي

Agaricus sulfureus (S). Agaric soufré (F).
نوع من الفاريقون البري الجمالي المؤذي. يكثر في
الغابات الطليلة. يعيش على المواد العضوية المتخضرة.
لونه الى الصغار الكبيرين بين ويسود عند اكال نمو.

١٩٥٤٠ - غاريقون مخزلي

Polyporus officinalis (S). Polypore officinal (F).
نظر من السميات، يعيش على غدا سويق واغصان الاشجار
الحرجية.

Laurus nobilis (S).

١٩٥٤١ - غار

Laurier d'Apolon, L. franc, L. commun, L. des poètes, L. sauce (F). Laurel, Roman laurel, Sweetbay (E). Edle lorbeer, Eblor lorbeerbaum (D). Alloro, Lauro franco, L. regio, L. poetico (I).

نوع اشجار برية وزيينية من فصيلة الفاريات. ضروره
مدينة. سويتا تملو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها ابيدة
متعاقبة، معققة، متناحية الشكل. نصلها جاكه الصفحة
الامعة، عاين الخضار، يطول من ٥ الى ١٤ سم. ويعرض
من ٢ الى ٥ سم. ازهارها صغيرة القند، فضفية اللون،
عتقولة التجميع، محورية الاوتكاز. ثمارها زيتونية
الشكل والحجم، زرقاء اللون، سواد المواج، يستخرج
منها زيت فاخر الصنف يدخل في صناعة الطوب.
اوراقها فواحة العرف العطري وبني طيبة، نقيها منه
ومعشش اما كثره فمفيدة || وقد مثل النار دوراً مرموقاً
في اثنان الثامر اذ كانت تضطر من اثنائه واوراه
اكاليل الهة الفزاة القاصين.

Persae borbonica.

١٩٥٤٢ - غار اجمر

P. carolinensis (S). Laurier Bourbon, L. rouge, Persée de Caroline (F). Borbon laurel (E).

شجرة برية وزيينية من فصيلة الفاريات. هيكلها جميل
الشكل. ساقها تملو من ٨ الى ١٠ امتار. اوراقها اعليدية
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها
جامد الصفحة القلابة الشديدة الخضار القواسم العرف
المستطب. ازهارها جرسية الشكل، عتقولة التجميع،
محورية الاوتكاز، فضفية اللون، ثلالية التركيب، حلقية
القفل والعتلات. ثمارها حمضية الشكل والقند، زرقاء
اللون، سود المواج، حمر الاذن || وهي من الاشجار
السورية التي تجود في جميع الارضية البقية النور، والمتوسطة
الرطوبة.

١٩٥٤٦ - غار شيعي

Rouge d'Orient (F). هو صصلة الشرق، حبة برية وزيينية.

Persae indica (S).

١٩٥٤٧ - غار هندي

Persée des Indes (F).
شجرة برية وزراعية من فصيلة الفاريات. اشعابها صلبة
تصلح للصناعة. ساقها تملو من ٦ الى ٨ امتار. اوراقها
بيضية مستطيلة، نصلها جامد الصفحة، جميل الخضار
اللاس. ثمارها عناية الشكل والقند، مأكولة، لليلة
الطعم، تنفع الصدر.

١٩٥٤٨ - غار ووردي

هو البصل، اطلية.

١٩٥٤٩ - غاروب

Garot (F). Withers (E).
عشر من جسم الحيوان يكون ما بين التمت والصورة في
الحمل وما بين التمت والسلم في البرير. وهو الذي يقلى
عليه عظام البرير اذا ارسل ليعي حيث شاع ج غراب.

١٩٥٥٠ - غاروق

Sillago (S). Sillago (F). Sillago (E).
جنس اسماء بحرية من شالكانت الزعانف وفصيلة التروغيات
انولها المعروفة قليلة العدد اصنافها تمت من البسر الاجر
الى الخليلج والخليج المغدي || اسجلها مستطيلة الشكل
كبيرة القند، تطول من ١٠ الى ٩٠ سم. وزونها صغيرة
اسفينة الشكل. عيونها صغيرة مائعة. زعانفها الظهرية
الاول شرعية الشكل تحمل شعراً بالغة الطول. زعانفها
الاذلية مقعرة. اثنائها الى الثقفة السوداء او الرمكة



غار



غار احمر



غاريقون اسيد



غاريقون اعرض



غار يقون قتال



غاريقون كبريتي



غاريقون مخزني

١٩٥٦ - غاريقون مريه * ، طرثوث حلو

Agaricus edulis, *A. campestris* (S). *Agaric comestible*, *A. champétre*, *Champignon de couche* (F). *Field agaric*, *Mushroom* (E).

نوع من الفاريقون الأكل المشهور ، واسع الانتشار يزرع في الغامط . اسراره عديدة ، ألوانها مختلفة يكثر لها الاسفر والاسهل .

١٩٥٧ - غاريقونيات

Agaricaceae (S). *Agaricinae* (F). *Agaricaceae* (E).

فصيلة الطيور الفاريقونية من رتبة الثعالب . اجنتها وانواعها عديدة منها المأكولة كالغاريقون ومنها المؤذية زراعيها كالزهر والراسع والسمكة والشمسة والكلوبية والكلبيوب || تتميز بكمال شكل ظهورها التي تتكون من قاعدة كروية تعلوها ساق اسطوانية تكلها ابرسة مستديرة . شبيها غرر اللادة ، ليد التجميع ، واقر الهيف ، يتكاثر ويعد طولا كاعطيان المغفولة تعلوها دامل صغيرة مدسية الشكل تؤلف نواة الفطر وقاعدة الزنكاز .

١٩٥٨ - غاز

هو احد حالات المادة الثلاث . تتميز الغازات من السوائل والاجسام الصلبة بقدرتها المطلقة على التمدد . وهي تثار بالضغط والحرارة ولكل منها وزن وكثافة .

١٩٥٩ - غاز الكربون

ومن اسماه غاز كبريتك وسامس كبريتك ، هو ثاني اكسيد الكربون ، اطلبه .

١٩٥٥ - غاسترولوب * ، بطنية السنتك

Gastrolobium (S). *Gastrolobe* (F).

جنس نباتات جنينية سرولية معمرة من سبط البدلايات وفصيلة الثغريات الفرائية . انواعها الممرقة نحو ٣٠ منها استراليا . مظهرها بري وبشرها ترابي . حياكلها جيلة القلب . سوطها فرخ . اوراقها مستديرة مملعة متقابلية . ازهارها متعديرة التجميع صفراء اللون او حمراء .

١٩٥٦ - غاسول * هو إشناب ابر ساق ، اطلبه .

١٩٥٧ - غاسول التركيبي .

هو الظهرة البهرورية ، اطلها .

١٩٥٨ - غاسول زوي * ، لنباتة شاككة

Euphorbia spinosa, *Tidymallus diffusus* (S). *Euphorbe épineux*, *Hippophaes des grecs* (F). *Hippophaeton* (E). *Pitula* (I).

جنبة برية طيبة من فصيلة البتويات ، صهارتها لبنة سائلة تمرط الشعر وتقطع الثوب . اصلها جبال حوض البحر المتوسط || ساقها خشوية فرخ . فروعها منتصب شاككة . اوراقها حاشنة ، رعيه الشكل ، صغيرة اللد ، جامدة النصل . ازهارها فردية ، حامية ، فراءه اللون . يزورها مسطيلة ، مفلطحة ، متعديرة اللون ، ناعمة القشرة زائدة للنبدة .

١٩٥٩ - غاسول مصري

هو الظهرة البعدية ، اطلها .

١٩٥٠ - غاسيف

Chien de chasse (F).

Sporting dog (E).

الغاسيف هو كلب الصيد من اي عرق كان . ج غشيف .

١٩٥١ - غاطية

الغاطية من الكرم طالت ساقها وصمت وانتشرت .

١٩٥٢ - غاطة *

Galathea (S).

Galathea (F). *Galathea* (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات فصيلة الغاطيات والارجل بين فصيلة السيديات . انواعها الممرقة نحو ٧٠ بعضها نهري والآخر يعيش مع مصبات الانهر . يكثر ويوجد في القل والنبير || اصلها شبه قبة الشكل ، كبيرة اللد ، متساوية المصارع . ضاميا ثنائية ، طليقة ، مستديرة || لها كامة الصنف قل من يربط فيها .

١٩٥٣ - غاطة

هي القزولة ، نبات يشبه المربون . ج غاغ .

١٩٥٤ - غاف *

Prosopis (S).

Prosopis, *Prosopis* (F). *Manguit bean*, *Sorow bean* (E). *Prosopis*, *Abramexelle* (D). *Prosopis* (I).

جنس الشجار ونجيرات برية وزاينية من فصيلة الثغريات الفرائية . انواعها عديدة ، منها اللد . سوطها فرخ شاككة . اوراقها مركبة ، ريشية . وريقاتها لغمية سنائية . ازهارها سبلي التجميع ، عوروي الاذنكاز . ازهارها صغيرة اللد ، خافتة العرف ، مغلفة الاذنكاز . ثمارها قرون رقيقة مسطيلة ، شبه مستديرة . يزورها فضية مفلطحة .

١٩٥٥ - غالفث *

Agrimonia (S). *Algremoine*, *Soubrette* (F). *Agrimonia*, *Cockle bur*, *Liverwort* (E). *Kleiner Odermennig*, *Leberkraut*, *Agrimonia* (D). *Agrimonia*, *Erba da sudata* (I).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البليات ولسيلة القزديات . انواعها قليلة جميعها طيبة تفيد التهابات وشفارة العين || اشهرها الغالفث البليات .

١٩٥٦ - غالفث غولاني *

Agrimonia eupatoria (S). *Agrimonia eupatoria* (F).

نوع من الغالفث وهو نبات طيب يري معمر سليل . اوراقه ثنائية ، حركية ، وريقة التجميع . وريقاته ريشية الشكل ، نصلها بارز الممرق ، سن الحافة . ازهاره سبلية ، حامية ، صفراء اللون ، تفيد شفارة العين والالتهابات اخضاها التهاب الحنجرة .

١٩٥٧ - غالفث ، قاتل الماء ، غركب الماء

Phalacrocorax (S). *Cormoran* (F). *Cormorant* (E).

جنس طير من فصيلة البجيات ودية كليات القدم ، انواعه نحو ٤٠ منها الكبيرة الجثة والمتوسطة . طليط راوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ألوانها عديدة الاذنكاز تكثر لها السمرة الخضراء الملاج . مناقبها جالسة مسطيلة مدبة البهرة الحادة || جميعها من طيور البلاد الباردة ولتندلة تعيش قرب الماء تألف الاسوار والقطوط العسرية . قربها الاسماك الصغيرة . تدن بين المصور وفي الاجار . انبها تنقع من الماء . يبيضات تخضبها بمناوبة اللدكور نحو ٤ اسابيع .

١٩٥٨ - غالفث * ، ديك البحر

Gallicthya (S). *Gal*, *Coq de mer* (F). *Sea-cock* (E).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزمائف وفصيلة الاسقمريات . انواعها الممرقة قليلة اللد ، اصلها بحار



غاريقون مريه



غاسترولوب



غاسول روسي



غاف



غالف



غالفث غولاني



غالف

الى الصفرة الزاحية . يكثر في المروج وفي المراعي الطبيعية . يقال انه يفيد الدود وينشط السنن . وهو ينثر الحليب ويتصل في النباتات الصبغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٦ - غالليون صُنْبِيَّيْ *

Galium cruciata (S). Gailliet crosetta, Calile-lait crosetta, Crosetta (F). Crosswort bedstraw, Maywort (E). Kreuzdabkraut (D). Prtimbroza, Erba croce delle macchie (I).

نوع من الفالليون البري الطبي . ساقه وفروعه واوراقه زباد . ازهاره صفراء اللون دقيقة الزناد . يتصل في النباتات . صباغه احمر اللون .

Gameta (F). Gamete (E).

١٩٥٦٧ - حَمَكَة

هي الجبسية اي الحلية التناسلية البسيطة الجبلية .

Gadoue (F). Night-soil (E).

١٩٥٦٨ - غَالِط

هو البراز او المادة من الاسمدة الضوية للتنشيط الخصبية . متوسط ما يشمل من مواد رئيسية :

٩٠٪ ، ازوت .

٧٠٪ ، حاسن فسفوري .

٢٥٪ ، بوتاس .

Téléologie (F). Teleology (E).

١٩٥٦٩ - هَالِكِيَّة

نظرية لسلفية ترتكز حل الغاية . وكل عمل سببه الهدف .

١٩٥٧٠ - هَالِيْدِيَّة ، * هَنْبَر كَشْمِيرِي ، نَاعُورَة

Gaillardia (S). Gaillardie, Gaillarde (F). Blanket flower (E). Maierblume, Kokardenblume, Burgunder (D). Galierdo (I).

جنس نباتات عشبية زرقونية مصرية من فصيلة المركبات الابرورية الزهر . انواله وفروعه كثيرة العدد . اوراقها متعاقبة صغيرة القد متائلة النصل اللصيق . ازهارها متراكبة الاسرابي والاصفر . زراعتها الزرقونية شائعة ، تصلع في جميع الارربة والمواقع .

Téphrosie toxique (F).

١٩٥٧١ - هَبَادَة

Fish poison plant (E). هي الحوراء المسكرة ، اطباها .

Mespilus pycnoloba (S).

١٩٥٧٢ - هَبَارِيَّة *

Mespilus, Mespilier, Néflier des bois (F). Mespilus(E). Mispel, Mispelbaum (D). Mespilo, Nespelo (I).

نوع من الاكيدنيا البرية من فصيلة الورديات . اطباها بعض جبال اليلد المتدلة الحاراة . يكثر وينمو في ارجاء الكريات ويهي شجرة شائكة تملو من ثمرين الى ستة امتار . اوراقها عاتلة ، اهليجية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ نصليا جامد النسيج ، يارز البروق ، خلي البشرة على صفحت السفلى . ازهارها كبيرة القد ، صفر المأبر ، يفض البتلات . ثمارها بنية اللون ، طيبة المذاق ، حازنة الطعم ، تؤكل بمد المزاراة .

Photophobie (F).

١٩٥٧٣ - هَبَّاش *

Photophobia (E).

نعت تعريفي يطلق كل كل من يخشى النور .

Opatrum (S). Opatra (F).

١٩٥٧٤ - هَبَّاش

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة البشيات . انواله نحو ٣٠ طولا براوح بين ٥ و ٨ سم . ثوابها عاتقة يكثر فيها الاسود والاصفر والابيض . ريقاتها طاملة ، غاشية ،

المنطق الحارة || اجسامها شبه مينية الشكل ، مبطة الجرم ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٢٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها شبه يرمية الشكل ، ساحة الانضمام ، صغيرة الاشداد . زعانفها الظهرية والشرجية متعاقبة يملها مع الزعانف الخوضية بعض الاالياف الحليطة المسطلة الضرورية للمادة . زعانفها القلبية غائرة || لحريها كامة الصنت ، قل من يربب فيها || اعرف انواعها واشهرها الثومان التالي :

١٩٥٥٩ - هَالُ الْمُتَوَسِّط

Gallichthys egypticus (S).

Gal de la mediterrandé (F).

طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الشبهة الفضية . يكثر ويجوده قرب الشطوط المصرية .

Gallichthys major (S).

Gal major (F).

طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الشبهة الذهبية الموج . يكثر ويجوده قرب الشطوط الهندية .

١٩٥٦١ - هَالُ

الغال نبت . والغال ارض مطعنة ذات حجر . ج غلان .

Galium (S).

١٩٥٦٢ - هَالِيُون

Galiez, Calile-lait (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية أو مصرية من فصيلة الفويات . انواله المعروفة نحو ١٥٠ منها البالية والمرحوية والصباغية . ساقها مصلعة رباعية . اوراقها غمية ، متعاقبة ، صغيرة القد ، فيقة النصل ، مدبة المقصة . ازهارها رباعية التركيب ، ابيلة الايتكاز ، مسطيلة الزناد ، يكثر فيها اللون الاصفر || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٥٦٣ - هَالِيُون اَبْيَض ، * هَلِيْكِي ، حَفِيْخَة

الالهي ، يَلَسْكَ ، لَرْنَس

Galium aparine (S). Gailliet aparine, Grataron, Aparine, Kieble (F). Catch-weed, Cleavers, Goose grass (E). Kiebelabkraut (D). Aparine, Asprella, Cappello da signosi (I).

نوع من الفالليون البري الطبي . ساقه فرواه زباد . فروعه دقيقة ، منتصبة ، لينة . اوراقها جامدة النصل ، خلية البترة . ازهاره بيضاء اللون مسطيلة الزناد النحيل .

١٩٥٦٤ - هَالِيُون المتاع

Galium palustre (S). Gailliet des marais, Calile-lait des marais (F). Marsh bedstraw, Water bedstraw (E). Sumpfakkraut (D). Stellina ruvida (I).

نوع من الفالليون المرصوي البري يقال انه ينثر الحليب . يكثر في المتاع ويجوده في المروج الرطبة ، رعاء الماشية بشوة فيسبها ويسمن درها .

١٩٥٦٥ - هَالِيُون حَقِيْقِي ، * هَالِيُون اَصْفَر ،

بَقْلَة اَبْيَن

Galium verum (S).

Galiet jaune, Calile-lait jaune (F). Cheese rennet, Yellow bedstraw (E). Echte Labkraut (D). Gaglio giallo, Erba zoffina, Erba nocca (I).

نوع من الفالليون البري المرصوي . ساقه فرواه . فروعه نحيلة وبعيدة . اوراقه رفيقة النصل الخليلي البشرة . ازهاره



غال



فالليون ابيض



فالليون المتاع



فالليون حقيقي



فالليون صليبي



غارديده

1٩٥٨٥ - غشيس، غشيس Goniozoema (S).
Goniozoema (F). Goniozoema (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات متفرجات الخانة. انزواها المعروفة قليلة البلد جميعها صغيرة القد مستطيلة الشكل، فضية اللون او وردية || اصطناعيا بحار البراد الحارة والمحتلة الحارة اعصها البحر الاحمر والخليج || اشهر انواعها النمس القضي الذي يكثر في المتوسط.



فهارية

1٩٥٨٦ - غشيشة Tenebrio (S). Ténébrion (F).
جنس حشرات خاضعة مؤذية من فصيلة الغشيات. انواعها نحو ٢٠ اشكالها واصحابها واثرها مخلفة. تعيش على بعض المواد النباتية منها الحبوب والبقول والجذور || اعرف انواعها واضرها ما يلي.



غياش الكرمة

1٩٥٨٧ - غشيشة التبيغ Platycaulis gages (S).
Ténébrion du tabac (F).
نوع من اللبشة يحي خنفساء فضية الشكل مقلعة طويلا نحو ١٠ م. ثوبها سوي السوداء فضي المراج الاربع. تركيب شتيل التبيغ القضي تقترض السروق عن سطح الاربع. تكاثرها يستعمل اسد الحواشير الفعالة تظمرا على التربة والنبات.



غير

1٩٥٨٨ - غشيشة الدقيق Tribolium confusum (S). Tribolium confusum, Ténébrion confusum (F).
حشرة من الغشيات صغيرة القد مقلعة طويلا نحو ١٠ م. ثوبها الى الكسبي البانيق يطوي مواج احمر. تعيش على المواد المضوية في المظان وخازن الحبوب والبقالة. ريقها دقيقة، غيرة، مستطيلة، هليبة الجسم تعيش كاشطرة على الدقيق والحبوب المكسورة.



هيوبر

1٩٥٨٩ - غشيشة المظان Tenabrio molitor (S). Ténébrion maunier, Ver de farine (F). Mehlworm (E). Mehlkäfer (D).
خنفساء من الغشيات، جسمها مستطيل الشكل مسطح، طويلا نحو ١٥ م. ثوبها الى البني الاسفع المراج. تعيش في المظان والافران. ريقها تسمى دودة الدقيق.



غير دن

1٩٥٩٠ - غشيشة Pollucida (F). Pollucid (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو نصف خفاف.



غشيشة التبيغ

1٩٥٩١ - غشيشة Pollucidita (F). Polluciditey (E).
اللبشة صفة ما هو غشش او ملبش.



غشيشة الدقيق

1٩٥٩٢ - غشيشات Tenabronidae (S).
Ténébrionidae (F). Darkling beetles (E). Schwarzkäfer, Schattkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ مظهرها من الحشرات غير المؤذية. اشكال غشاشها مخلفة تكثر فيها الاستطالة ويحبذ البقي الاوسد. قرونها الاستعمارية مركبة من ١١ فصلة. اراسعها برلمازها الامامية والوسطى خماسية المقل اما الخلفية فرباعية || تألف الاماكن والمواقع المظلمة واللاضحة وما اشبه. تعيش على بقايا المواد المضوية والنباتية. ريقها دودة الشكل تعيش في التربة على المواد النباتية والمضوية والمنظمة على دور الاغصان. اشهر اجناسها الازيدا والقباش والندبة والفتاش والافيتروفاغوس واللاشوس والميلازيا.



غشيشة المظان

تعيش على جلود بعض النباتات البرية والزراعية اعصها الكرمة || اشهر انواعها غياش الكرمة.

١٩٥٩٥ - غشاش الكرمة

Opotrum sabulosum (S). Opstre sablonnier (F).
نوع من الغشاش طوله نحو ٨ م. ثوبه الى السوداء الداكن. يعيش في التربة الرطبة القليلة الانساج. يركب مع ريقها جلود الكرمة فيؤذيها.

1٩٥٩٦ - غشاش، ريشان Scarus ghobban (S).
Scar vort (F). Ghobban scar-fish (E).
سمكة بحرية من بنات مسكار. توجد في المتوسط وفي بحار البلاد الحارة. ثوبها الى الوردية الخضراء الزاوية. يقال انها لا تتوكل في زمن مرض المرجان لما قد يحويه لحمها من مواد سامة مؤذية.

1٩٥٩٧ - غشيب، غشيب، بليد Fanon (F).
في جلدي تحت عتق البقرة.

1٩٥٩٨ - غشير Martangus (S).
Merlan (F). Whiting (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة النادسيات. انواعها المعروفة خمسة تتميز باجسامها المستطيلة الشكل ويمرلفها النجيلة الرقيقة. غشوها مأكولة. اكبادها وافر الماد الزيتية. جميعها من الاسماك المقترسة النجيلة. تألف السمق وتعيش اسرابا وافر العدد || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

1٩٥٩٩ - غشير المتوسط Martangus punctatus (S).
Merlan pontassou, Pontassou (F). Pollack (E).
نوع من الغشير يكثر في بحار البلاد الافريقية اعصها المتوسط والاطلس.

1٩٥٩٠ - غشير شائع Martangus vulgaris (S).
Merlan commun (F). Common whiting (E).
نوع من الغشير يوجد في معظم بحار العالم. يكثر في المحيط الاطلسي قرب الشواطئ الافريقية والاوربية.

1٩٥٩١ - غشير قشعي Martangus carbonarius (S).
Merlan noir, Charbonnier (F). Coal-fish (E).
نوع من الغشير يكثر في مياه بحار الشمال وفي البحر الاسود وفي المياه الاقليمية المنتجة من اليونان الى لمباته.

1٩٥٩٢ - غشيرة في الارلتيوم، اطبله.

1٩٥٩٣ - غشيرور Endrepanis (S).
Endrepanis (F).

جنس طير من الجوامث ريقها المناقير فضيلة المفترسات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اصطناعيا جزر القليلين || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة المتائدة الرقيقة، صغيرة الارصاغ الدقيقة والاناب المستديرة الاطراف. اولياها تختلف بين الذكور والاناث || اشهر انواعها واجلها ضرور صتير. ثوب الذكر الى الصفار المنحب. جناصاه وذنبه الى البنفسجي. رأسه الى الخضراء الاسفع. قلته الى الحشرة الابرجوانية.

١٩٥٩٤ - غشيرور

Exale factoria (S).
Caille naine (F). Dwarf quail (E).
جنس طير من صابة الجحليات فضيلة الطيوريات. انواعها المعروفة اربعة موطنها الشرق الاقصى. تغني البانيق بشكلها وثوبها غير اشيا اصفر قدا وافتح ثوبا واقل طيرانا، تألف السهول والادغال وتدن في انصوص كالسبان.

١٩٩٠ - عُشْبُ يَفْنَى * رُوِيَاص

Sorber des Indes (F). شَبْرَاءُ الْهِنْد

شجرة من الشبيرة مشهورة باسم عُشْبُ يَفْنَى ، أَلْبَانَا .

١٩٩١ - شَبْرَاءُ الْيَابَانِ

Sorbus japonica (S). Sorbier du Japon (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة حرجية سريرية مبهمة اليابان .
تطول من ٥ الى ١٥ م . اوراقها مفضضة ، بيضيه ، ذلقة .
تطوق من ٧ الى ١٢ م . وتعرض من ٤ الى ٨ م . فصوصها
صغيرة ، ضيقة ، مسنة الحافة . تصلها خالي الصفحة
السفل ، كبير المروق التي يراوح عددها بين ١١ و ١٣
زوياء || ازهارها بيض . ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية
اللون ، منمشة بالانيش .

١٩٩٢ - شَبْرَاءُ امْرِيكَا

Sorbier d'Amérique (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية حرجية وترينية . اصلها
بلاد امريكة الشمالية . تملو من ٤ الى ١٠ امتار . اوراقها
مركبة وترية التجميع . وريقتها اعليانية ذلقة تطوق
من ٢ الى ١٠ م . وعددها يراوح بين ٩ و ١٧ .
ازهارها كبيرة القذ ، غبراء اللون . ثمارها حامزة الطعم .
زاحية الحمرة الاربوانية ، كروية الشكل ، قطرها يراوح
بين ٨ و ١٠ م .

١٩٩٣ - شَبْرَاءُ بَرِّيَّة * ، شَبْرَاءُ مُنْهَضَة

Sorbus torminalis (S). Sorbier torminal, S. alster, Alster (F). Wild service tree, Chequer tree (E). Wilder Elsbeerbäum(D). Sorbezzolo, Ciavardello (I).

نوع من الشبيرة وهي شجرة حرجية سريرية شائعة تملو من
١٠ الى ٢٠ م . اوراقها مفضضة ، مائلة للبشرة ، عديدة
المروق . فصوصها ضيقة لا متساوية السمك . عددها
يراوح بين ٥ و ٩ || يتطاد ازهارها فائقة ، يدها
اللون . ثمارها كروية ، مقطوعة الطرف ، حمراء اللون ،
قطرها نحو ١٥ م .

١٩٩٤ - شَبْرَاءُ ذَرِيَّة

Sorbus cuspidata, Sorbus vestita (S). Sorbier cuspidé (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية برية وترينية ترعب
في الموائل الباردة . تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها
واخضائها وانفادها والفنائها مزينة البهاء ، زفيها لبد التجميع
قطني الشكل والون || اوراقها اعليانية ذرية تطوق من
١٠ الى ٢٣ م . وتعرض من ٤ الى ١١ م . تصلها خالي
البشرة حل صفحتي . حثاره ثنائي التسنين ، حاد التخصيص .
ثمارها كروية الشكل ، مقطوعة القادة والطرف ، ارجوانية
اللون ، صفراء الواج .

١٩٩٥ - شَبْرَاءُ سَوْدَاة الثَّمَر

Sorbus melanocarpa (S). Sorbier à fruits noirs (F).

نوع من الشبيرة وهي جنية سمرة برية وترينية تملو من
١٠٠ الى ١٥٠ م . انتادها وانفادها زياء البهاء . اوراقها
بيضية مستطيلة . تصلها جامد السجج ، مسن الحافة ،
خالي الصفحة السفلي . ثمارها كروية الشكل مقطوعة
الطرفين ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١١ م . لونها ال
السواد اللامع .

١٩٩٦ - عُشْبُ يَفْنَى * رُوِيَاص

Goniosoma sphyraena, Argentina sphyraena (S). Goniosoma argentin, Argentine vulgaris (F). Common argentine, Silver-fish (E).

نوع من البقس . ممكة بحرية يبيض من السلمونيات .
اصلها سطر مناطق البحر الابيض المتوسط || سرسها
الانحوط . لا تقرب من الشطوط والمجاذب الا في زين
التربة القوية يند من اوائل شباط الى اواخر آذار || جسمها
شبه دمي الشكل يميل من ١٥ الى ٢٠ سم . راسها
عروطي القرون . لها واسع القشق الذي ينتهي تحت العين .
زمنها البالية غايقة . سفها كبير القذ ، تلغض تحسه
كل عام . ثوبا فني اللون يلبس كمرق القزول . ظهرها
زلفي الخشدار || لشها عيوط الصفب ، مأكول || تصاد
من اجل الشحاش الاثري الذي يملو جسمها وشانها لانه
يدخل في صناعة تقليد القزول .



عُشْبُ يَفْنَى

١٩٩٧ - شَبْبُط ، شَبْبُط

Javelle (F). Loose shoot (E).

نوع قبضات مجسومة من الزرع المحصد . والنبوط المكمنة

تدعى حلة ، راسها .

١٩٩٨ - شَبْبُط هو البلمد ، أَلْبَانَا .

Fraude, Tromperie (F).

Fraud, Cheat (E).

البن والبن : الخديعة في البيع والشراء .

١٩٩٩ - شَبْبُطَا

Loeochocarpus (S).

Loeochocarpa, Cubé (F).

جنس اشجار وجيرات برية وزراعية من فصيلة القرقيات

القرافية . منبها البلاد الحارة والاشترافية . يستخرج من

جلودها مادة اروتونين التي تستعمل في اعادة الحشرات .

١٩٩٨ - شَبْرَاءُ ، حَرْمِيَّة

Sorbus (S). Sorbier (F).

جنس اشجار وجينات برية وزراعية من فصيلة الورديات

انواعها عديدة مبهمة البهاء . اوراقها عابلة متعاقبة . ازهارها

نورية التجميع . ثمارها تفاسية الشكل . صغيرة القذ ،

مرجانية اللون ، حليزة الطعم ، يستخرج منها بحد التضمير

والقطغير مشروبات كحولية لا بأس بها || اما متوسط

ما يحويه ثمارها من عناصر مفيدة فهو .

مواد ازرقية ٧ %

غلوكوز ١١ %

فصقات ١ %

حامض تفاسي ٠,٦٤ %

فيتامين ث ٢,٥ %

اغشاشا مليئة بجمادة ، ناعمة الرقعة تستعمل في صناعة

التنزيل || اشرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٩٩٩ - شَبْرَاءُ الْحَبَالِيَيْن * ، شَبْرَاءُ السَّمَر

Sorbus aucuparis (S). Sorbier des oiseaux, S. des oiseaux, S. sauvage, Cochéne (F). Mountain ash, Rowan (E). Gemeine Ebersche, Ebersche Vogelbeere (D). Sorbo salvatico, Sorbastrello, Timolna (I).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية برية شائعة تملو من

١٢ الى ١٦ م . انتادها وانفادها ولادها خلية . اوراقها

مركبة وترية التجميع ، وريقتها سنائية ، ذلقة ، مسنة الحافة .

عددها يراوح بين ١١ و ١٧ || ازهارها كروية الرائحة .

لثائية أو ربابية الاقلام . ثمارها ارجوانية كروية ، قطرها

نحو ١٠ م .



شَبْرَاءُ الْحَبَالِيَيْن



شَبْرَاءُ بَرِيَّة

١٩٦٦ - غيرة صوبانية

١٩٦٦ - غيرة صوبانية

Fontinalis (S).

Fontinale (F), Fontinalis (E).

جنس طحالب من فصيلة الصرغيات . انواع المروقة قليلة العدد منها مجاري الماء والنامق في البلاد الممتدة الحرارة . جميعها من الطحالب الشطئية الممرودة . بعضها دقيقة كالسنة فراء . اكبس بعضها تاجية الزركاز .



غيرة مبدولة

١٩٦٦ - شتال

Ecaillure (F), Scaling (E).

انتقال القشور الاممي او الحرفشي الذي يلف الجسم عند بعض الحيوانات انحصار القشوريات .



غيرة

١٩٦٦ - شتراكف

Saurothera (S), Saurochère, Oiseau de pluie (F).

بعضه طائر النبت لانه يشتر بقرع حبل المطر عندما يجهر البطاح الى الغابات والاشجار الكثيفة || جنس طير من فصيلة القيققيات . انواعه الممرودة ستة موطنها يمتد من الهند الى جزر الاكليل . ملجنا الحياتي جملي . جماعاتها قليلة العدد . قشرا الحشرات والطيور والثمار والبروز || اجسامها طولها من ٢ الى ٤ سم . بما فيه الذنب || رؤوسها مستدلة الحصى . متفادها مستطيلة . بيضاء الاخضر . اجسامها زلقة . اجسامها بالغة اللؤلؤ . مستدرة الاطراف ، مجعدة بخلا خطوط سود مستعرضة يتخللها تيجع ابيض . انوارها متراكبة الاذن فيها الاخضر والاصفر والالوان والافبر والابيض والاسود || تنقل احشاشها في الاشجار القريبة . انوارها متحس من ٣ الى ٥ ضلالت . القشور يستمر نحو ١٥ يوما تقوم به الاناث دون الذكور التي تكون لها القلاء .



خزان

١٩٦٦ - شتراكف

Guettarda (S), Guettarda (F).

جنس طيور وتجنبا برية طية من فصيلة القديرات . انواعها الممرودة ١٥ اصنافا بعض المناطق الاستوائية الاسيوية والاربية || بعضها فراء . اوراثها متطابقة ، منقطة ، اخضية . نصالها جامدة بيضاء اللون او متناوبة . انوارها مخدوي الزركاز . انوارها زرقادية ، ثنائية او ثلاثية التجميع ، انبوية الكأس ، فلانة البطلات ، صطرية العرف . ثمارها نوية للافقة . اشهر انواعها الثلاثة التالية :



خزان

١٩٦٦ - شتراكف

G. formosa (S).

قشورها مطهرة تشمل لدل البروج والقروح .

١٩٦٦ - شتراكف

G. dioca (S).

تقع قشورها دافع كسي .

١٩٦٦ - شتراكف

G. umbigua (S).

تقع قشورها مفر منشط .



غنيت

١٩٦٦ - غنيت

Corone cyanea (S).

Gulf-guit bleu, Oiseau bleu (F), Gulf-guit, Blue-bird (E).

طائر من فصيلة المغريات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يالغ الحياة الجماعية . يعيش في الاجراج ويسكن حل الابر التناسية في الجنائن والحدائق || جسمه صغير اللد ، ورطب القوام ، يطول نحو ١٢ سم . لونه جميل

Sorbus umbellata, Pirus meridionalis (S). Sorbier ou ombelles (F).

نوع من الفراء وهي شجرة سبوتية برية وزينة تملو من ٣ الى ٦ امار . هيكلها صوباني الشكل . اوراثها منقسمة مستعرضة طولها من ٥ الى ٧ سم . وتفرس من ٤ الى ٦ سم . نصلها خلى المنقسمة السفل ، حارة ثنائي التنين || ثمارها بيضاء الشكل ، اربوانية اللون .

١٩٦٧ - غيرة شتراكف

Sorbus fenicia (S), Sorbier finlandais (F).

نوع من الفراء وهي شجرة برية وزينة مبدولة فلتنة . ترب في الاقاليم الباردة . تملو من ٥ الى ١٢ م . اوراثها مركبة طولها من ٨ الى ١٦ سم . وتفرس من ٤ الى ٧ سم . نصلها عديد المروق خلى البشرة . اريد الصفحة السفل . ثمارها مأكلة ، قليلة الحشوة ، برفالية اللون ، كروية الشكل ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم .

١٩٦٨ - غيرة مبدولة

Sorbus domestica (S), Sorbier domestique, Cornier (F), Common service tree (E), Echar Spierling (D).

Sorbo domestico, Sorbo gentile (I).

نوع من الفراء وهي شجرة سبوتية برية مبدولة تملو من ٣ الى ١٢ م . براعمها لزينة . اوراثها مركبة وتربية التجميع وريقاتها سائفة ذلقة طولها من ٤ الى ٥ سم . وتفرس من ١٥ الى ٢٠ سم . مدنها يراوح بين ١٥ و ٢١ ، نصلها يحدو خلى البشرة ثم يفقد الحبل مع العمر || انوارها خضراء اللون ، خماسية الاطلام . ثمارها اجاسية الشكل مأكلة ، طولها من ١٥ الى ٣٠ سم . لونها ابيض الصفرة يطولوا توشيح احمر ونفحة سمر .

١٩٦٩ - غيرة صوبانية

Sorbus alnifolia (S), Sorbier à feuilles d'aune (F).

نوع من الفراء وهي شجرة حرجية سبوتية مبدولة الياان . تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراثها بيضبة ذلقة ، ثلثة اوراق الخش . طولها من ٦ الى ٨ سم . وتفرس من ٤ الى ٥ سم . نصلها احمر الصندرين ، متن الحلفة . انوارها بيض . ثمارها بيضبة الشكل ، اربوانية اللون صغر المولج . طولها نحو ١٢ سم .

١٩٦٩ - غيرة

Spore

هي البروز ، اطليه .

١٩٦٩ - غيرة

Sporozoa (F).

Sporozoa (E).

هي البروزيات ، اطليه .

١٩٦٩ - غيرة

Microsporidies

هي البروزيات الطفيلية التي تمشي حل الحشرات والقشريات .

١٩٦٩ - غيرة

Eremobius (S).

Eremobius (F).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة الصليبات . انواعها الممرودة قليلة العدد . جميعها من ثبوت بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || بعضها قصيرة ، فراء ، كثيفة الزغب المستطيل . اوراثها متراكبة ، غنية النصال ، شبه صفيحة الشكل . انوارها صغيرة ، وردية اللون . تنويرها ديبى .

الآرية الجصية وتُزَنّ فيها العسل والطلع || أجسامها قريبة الشبه بأجسام ذكور النحل. قرونها الاستعمارية مسطّلة. ظهورها وبطنها كثيفة الزغب. أظفارها تختلف مع اختلاف الأنواع.

١٩٦٢٨ - عُفْرِي

النثري والعفري من الزرد هو الذي تسميه الساء. ويسمى العفري.

١٩٦٢٩ - عُجُوم

Gobio (S).
Goujon (F). Gudgeon (E).
جنس سمك نهري من فصيلة الشبوبيات. أنواعه قليلة جميعها نهية قوتها الديدان والنباتات والفتريات وهي مسطّلة الشكل والمذاقات. أصلها بمحيطات البلاد الآسيوية والاروپية تنجهرها الى الانهار في زين السرة وقد يكون ذلك في اواسط الربيع ثم تدمج اليها في اواخر الصيف || أشهر أنواعه العجوم الشائع.

Gobio fluviatilis (S).
Goujon commun (F). Common gudgeon (E).
نوع من العجوم وهو سمكة نهية تطول نحو ٢٠ سم. جسمها مسطّيل الشكل، زعانفها كبيرة، عذنيها متدليتان. ثوبها الى الربعة القصية، ظهرها متتابع التجذيع الاصفر. ترطب في المياه العذبة الصافية. سرورها يمتد من ايار الى اواخر تموز. تنحرج بانفائها فوق الصخور فتلتصق بها وتبقى الى ان يتم التفت وقد يكون ذلك بعد السرة باربعة او خمسة اسابيع. لحمها للذيد الطعم مرغوب فيه.

١٩٦٣١ - عُذْكَو * عُذْرُ * تَرْدَبُ المتالع،
عُصْبَا الراعي الزبابة
Polygnum Ispathifolium (S). Renouée à feuilles de patience (F). Pale persicaria, Willow weed (E). Ampferknöterchen, Pfirsichsücher (D). Persicaria, Erba pepe (I).
نوع من القردوب وهو نبات بري متقني ممر. ساقه فروعاً تطول من ٦٠ الى ١٢٠ سم. فروعها دقيقة زباء اللحاء. اوراقه متناهية حافضية الشكل تطول من ٢ الى ٨ سم. نصلها خلى البشرة، اطبل الخصار. ازهاره سنبل التجميع. سناكه تطول من ٨ الى ٨ سم. ازهاره ودية اللون.

١٩٦٣٢ - عُذْكَو *
Aplisus (S). Apliste (F).
سمكة بحرية من شاكيات الزمانات وفصيلة الطرنيحات. أصلها تقتل جمع حبار المناطق الاستوائية وألحانة || جسمها بطول من ٣ الى ٥٠ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها ماصحتان. شفتها متدل الرخابة. عذنيها صغيرتان. ثوبها الى الربعة القصية المتناوبة الامجايات السمر. الذيلية الظهرية كبيرة، مسطّيلة، شاككة المناخس. الذيلية مستديرة الطرف. الثرشية ثلاثية المناخس الحادة. الصدرية مسطّيلة كالجنح وها التناث تسعين بها القفز فوق الماء || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٩٦٣٣ - عُذْكَاف * عُذْكَاف * عُزْوَابُ القيط
Corvus frugilegus (S). Corbeau freux, C. chauve, Freux (F). Rook (E).
غذاف ونداف ج غفغان. طائر من الثريان متوسط الحجم طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السود الاصفر المواج، ريشه يلس بحجرة. منقاره ورجلاه الى الرمادي الاصفر || وهو

اللون الساطع. وداؤه الى الزرقاء الجبلية. جناحاه وذنبه واعل ظهوره الى السود الاسف. عناق قوائمه واباهره الى الصفار الزاهر. منقاره دقيق مسطّيل. حلقه صبه زرقاء اللون. جناحه ذات الطرف. ذنبه قصير الجرم، فارقة الطرف. ريشه دقيق الحبل اللون || طيرانه خفيف الحركة. قوته العسل والحشرات الصغيرة والبار الياينة || يذئن منه في الاجبار القناء الاربعة الفل. الانثى تضع ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

١٩٦٣٤ - عُفَلْ

يقال فتل اخرج اذا كثر فيه الشجر وكثك الحديقة واري مكان كان.

١٩٦٣٥ - عُفْ

نبت يختص به ويؤكل في الجذب. صبه يشبه الجابروس. وهو من تجيل السباغ (السان).

١٩٦٣٦ - عُفْكَه

هو الحسا، اعليه.

١٩٦٣٧ - عُفْكَات * Capito (S). Capito (F). Capito (E).

الاسم العلمي من اللاتيني يعني غليظ الرأس. جلس طير من فصيلة الكشائيات. انواعه المعروفة نحو ١٧ جميعها من حل امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القذ تطول من ١٤ الى ١٧ سم. رؤسها غليظة. منقارها عذريوية الشكل. شليمة. سبالها كثيفة. تتميز بلباين الاتواب بين الذكور والاناث. اثواب الذكور متراكبة الاوتان الجبلية، يكثر فيها الاصفر ثم الاحمر والاصفر والاسفر. الاناث عادمة الاحر كبيرة الاصفر والاصفر اجنتها صغيرة، ذلقة الاطراف. اذناها مسطّية || قوتها الحشرات حل اختلاف فصائلها وانواعها || لثث احداثها في تجلويث الاجبار وصفوها. انثاها تبني من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً.

١٩٦٣٨ - عُفْكَائِيَات * Capitonidae (S). Capitonidae (F). Capitonidae (E).

فصيلة طير من المسفات. اجناسها وانواعها المعروفة مدينة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية والحنة من الملائن القديم والجديد || طيورها صغيرة القذ او متوسطة، جبلية الاوتان للمنطقة والمراكية. تتميز بكثافة سبالها التي تعد، في بعض الاتواع، حتى الزود. منقارها غليظة حبة، عذريوية الشكل. اجنتها مستدلة الطول او قصيرة. اذنيها مسطّوية او مستديرة. قوتها قصيرة، شديدة النشط || طيراتها قصير الشوط. تتساق الاجبار خفة اما انتقائا على الارض فيطير || قدتن امشاتها اما في تجلويث الاجبار او في عاجر تحضرها في التربة || أشهر اجناسها الغنات والبريكان وقاطرطوف.

١٩٦٣٩ - عُفْكَو * Eucera (S). Eucera (F). Eucera (E).

جنس حشرات جارية لاهقة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة الثورليات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتلة الحارة. قوتها رقيق الزمار ويكويها. مليتها الحياتي جماعي، جاعهاها قليلة العدد تختلف من ذكور واناث تملس سوية في سبل الحياة والبقاء. تنهي مشاوتها على الحيطان وتي



غفَات



عجوم شائع



غدار



غفَاة



غذاف

١٩٦٥ - عُدَّة مَسْتَرِيَّة ، عُدَّة مَحْتَرِيَّة

Thymus (F). Thymus gland (E).

هي غدة المتة السفلى في الحيوان .

١٩٦٥١ - عُدَّة مِفَادِيَّة

Glande copulatrice (F).

Copulatory gland (E).

١٩٦٥٢ - عُدَّة شَرَجِيَّة

Glande anale (F).

Anal gland (E).

١٩٦٥٣ - عُدَّة شَعْرِيَّة

Bulbe pileux (F).

Hair-gland (E).

١٩٦٥٤ - عُدَّة صَيَّاه

Endocrine, Glande close (F).

Endocrine, Ductless gland (E).

١٩٦٥٥ - عُدَّة صَنَوْبَرِيَّة

Apophyse (F).

Apophysis (E).

هي التبرنوب ، اطية .

١٩٦٥٦ - عُدَّة صَرَعِيَّة

هي بقعة الكلية .

١٩٦٥٧ - عُدَّة عَجَالِيَّة

Glande périnéale,

G. périnéenne (F). Perineal gland (E).

١٩٦٥٨ - عُدَّة قَلَوِيَّة

Glande alcaline (F).

Alkaline gland (E).

١٩٦٥٩ - عُدَّة كُنُطِيَّة

Glande conglobée (F).

Conglobate gland (E).

١٩٦٦٠ - عُدَّة كِلْسِيَّة

Glande calcifère (F).

Calciferous gland (E).

١٩٦٦١ - عُدَّة لَاحِقِيَّة

هي الغدة الاضافية .

١٩٦٦٢ - عُدَّة لُعَابِيَّة ، لَوْدَةُ الرُّطَب

Glande salivare (F).

Salivary gland (E).

١٩٦٦٣ - عُدَّة لُفَافِيَّة ، عُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة

Glande lymphatique (F).

Lymph gland, Lymphatic gland, Lymphaden (E).

١٩٦٦٤ - عُدَّة مَحْبِيَّة

Glande vitelline (F).

Vitelline gland (E).

١٩٦٦٥ - عُدَّة مُطَاطِيَّة

Glande muqueuse (F).

Mucous gland (E).

١٩٦٦٦ - عُدَّة مَرِيَّة

Glande œsophagienne (F).

Oesophageal gland (E).

١٩٦٦٧ - عُدَّة مَصْلِيَّة

Glande séreuse (F).

Serous gland (E).

١٩٦٦٨ - عُدَّة مَعِدِيَّة

Glande gastrique (F).

Gastric gland (E).

١٩٦٦٩ - عُدَّة نُحَامِيَّة ، عُدَّة بَلْعَمِيَّة

Glande pituitaire, Hypophyse (F).

Pituitary gland, Hypophysis (E).

هي غدة قاعدة اللسان .

١٩٦٧٠ - عُدَّة نَسَالِيَّة

Glande du byssus (F).

Byssus gland (E).

١٩٦٧١ - عُدَّة نَكْفِيَّة

Glande parotide (F).

Parotid gland (E).

١٩٦٧٢ - عُدَّة هَضْمِيَّة

Glande digestive (F).

Digestive gland (E).

١٩٦٧٣ - عُدَّة د

الغدد هو طاعون الايل .

من القواقع يحوي الشرق الادنى واروپة وافريقية الشمالية والشرقية. يأتلف الحقل والسهول المزروعة المبيسة بالاجمار. قوته الحشرات والديدان والحبوب. يكثر منه في الاجمار. اثناء نضج من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وسحما. يصير من البليور الفارة لانه يلتهم البذار ويتقي على الحب الناتش.

١٩٦٣٤ - عُدَّة كَالِه

Anisogamie (F).

Anisogamy (E).

الندافة احدى طرائق الانسال الثنائي و كنديز ، متافياً ، يتباين انقسامات الوراثة الذكرية والانثوية من حيث الشكل والحجم والوتل .

١٩٦٣٥ - عُدَّة

Glande (F). Gland (E).

عضو في الجسم يفرز مواد خاصة كالقلب والغدد والغرق والحليب الخ .

١٩٦٣٦ - عُدَّة اِصْطَالِيَّة ، عُدَّة لَاحِقِيَّة

Glande accessoire (F).

Accessory gland (E).

١٩٦٣٧ - عُدَّة الرِّحِيَّة ، عُدَّة المِعْشَر

Nectaire (F).

Nectary, Honey-cup (E).

عضو غدي يتميز به بعض الازهار يفرز عصارة سكرية تسمى الرحيق او معشَر الزهر يجربها النحل .

١٩٦٣٨ - عُدَّة العَرَكِي

Glande sudorifère, G. sudoripare (F).

Sudoriferous gland, Sudoriparous gland (E).

١٩٦٣٩ - عُدَّة اِنْتِجَامِيَّة

Glande lysigène (F).

Lysigenous gland (E).

١٩٦٤٠ - عُدَّة بَلْعَمِيَّة

هي الغدة التناسلية .

١٩٦٤١ - عُدَّة تَنَسَلِيَّة

Gonade (F). Gonad (E).

Gonad (E).

هي المنسل ، اطية .

١٩٦٤٢ - عُدَّة ثَوْبِيَّة

Glande moriforme (F).

Moriform gland (E).

١٩٦٤٣ - عُدَّة قَدِيَّة ، عُدَّة صَرَعِيَّة

Glande mammaire (F).

Mammary gland (E).

١٩٦٤٤ - عُدَّة حَمَضِيَّة

Glande acide (F).

Acid gland (E).

١٩٦٤٥ - عُدَّة دَبْرِيَّة

Glande uropygiale (F).

Uropygial gland (E).

١٩٦٤٦ - عُدَّة دَرَقِيَّة

Glande thyroïde (F).

Thyroid gland (E).

١٩٦٤٧ - عُدَّة دُهْنِيَّة

Glande sébacée (F).

Sebaceous gland (E).

١٩٦٤٨ - عُدَّة دَمَطِيَّة

Glande uropygiale (F).

Uropygial gland (E).

الغدة السطبية غدة ، مركزها في الزئبق اي القطن ، تفرز مادة دهنية يستعملها الطائر في سفل ريشه . وتسمى أيضاً غدة دبورية .

١٩٦٤٩ - عُدَّة رَحِيْقِيَّة

Glande nectarifère (F).

Nectariferous gland (E).

انواعه عديدة . سوقها فراء . فروها زباد اللحم . اوراقها مسقة ، غنية ، لثائية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل . مقعر الصفحة . انزهارها سبيل التجميع ، طرفي الزركاز . انزهارها عشوية ، صغيرة القد ، صفراء اللون ، خضر الملمع .

Scyllium (S). **عُرَاب** ١٩٦٨٨ -
Roussette, Chien de mer (F). Dog-fish (E).
جنس اسماك بحرية من القرشيات . انواعه المروفة قليلة . اجسامها مسطحة ريشية . جلودها غشيت مدنية الحراشف . لونها مأكلة متوسطة الصفن || اعرفها واشهرها الفراء المنشفة والفراء المدبجة .

Scyllium catulus (S). **عُرَاب هُدْبَجَة** * ١٩٦٨٩ -
Roussette à grandes taches (F). Lesser spotted (E).
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . غطول ثوبها الى الصبغة الصفراء ، يملؤها تديج لا يقاسي الرقعة والقرن تكثر فيه الاستدارة والسواد البنفسجي المزاج .

Scyllium canalicul (S). **عُرَاب مُنْمَلَة** * ١٩٦٩٠ -
Roussette à petites taches (F).
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . غطول نعر ٨٠ سم . ثوبها الى الصبغة المنشفة بالكحبة .

١٩٦٩١ - عُرَابِيَّات ، كُوسَجِيَّات

Scylliorhinidae, Oractolobidae (S).
Scylliorhinidae, Oractolobidae (F). Scylliorhinidae, Oractolobidae (E).

فصيلة اسماك مغترسة من رتبة الاضلاع . اجناسها المروفة قليلة العدد منها البويض والسرايد . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مسطحة وشعية الشكل . اعطائها ذلقة شارب . اسنانها مشاربة حادة تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . تننير بزعانفها الشبكية المملقة اللامعاسوية الجرم اذ يفوق حجم اللقطة العليا ضمت حجم اللقطة السفلى || اشهر اجناسها الفراء والكوسج .

la Corbeau (F). **عُرَاب** ، **عُصْبَاء** ، **يَسْمَانِي** ١٩٦٩٢ -
Corvus (E).
الغراب والنباء الياباني اسمان لكوكبية جنوبية موزكها غلب الباطية على جنوب السبك الاوزل || عدد نجومها سبعة والعرب تسميها حلة « حبر الاسم » او « عرش السبك الاوزل » او « الأحال » . ومن هذه الكوكبية نجمان مزوجتان الاول منها يدعى « حباب » او « سبا » او « مقار » والآخر « ولثاني يدعى « الجبلج » او « جناح الغراب الايمن » .

Corvus (S). **عُرَاب** ١٩٦٩٣ -
Corbeau (F). Crow (E).

سبي غراباً لسواده . ج غرابان واغربة واغرب واغرب واغرب . كتيه ابو حاتم وابو جسدات وابو الجراح وابو سذر وابو زيدان وابو زاجر وابو الشوم وابو غيث وابو القمقام وابو المرقال . ويقال له ابن الارض وابن برع وابن دابة . جنس طير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجوارح . انواعه ١٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . اشهرها الغراب الاسمر والابيض والاصفر والاكمل والاورق والقرع والندفان . معظمها من القواطع وبضها من الاوابد . قوتها الحشرات والديدان والحيوانات والاسماك والقرشيات وبذر القزورع والحبوب النافثة . تمن في الانجار الطويلة . انها تصنع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

١٩٦٩٤ - **عُدَّة تَسْلِيَّة ، عُدَّة شَقِيَّة**
Glandes génitales, G. sexuelles (F). Genital glands, Sexual glands (E).
هي الغدد التي تفرز المواد التناسلية من شلج وبيضات .

١٩٦٩٥ - **عُدْرَانِي ، عُدْرِي ، مَتَعِي**
Palusce (F). Paludal (E).
نمت ترميزي يطلق على كل نبات يعيش في البندان .

١٩٦٩٦ - **هَدَقَة**
Testa
الغلاف الخارجى البيضاء والبزرة .

١٩٦٩٧ - **هَدَقِي**
Pluie (F). Rain (E).
التدق هو المطر فاذا كثر قطره فهو غادق . وغدت الارض : اجلت بالندق فأنعصبت .

١٩٦٩٨ - **هَدَقِي**
Très fertile (F). Very fertile (E).
نمت ترميزي يدل على الفزارة .

١٩٦٩٩ - **هَدَقِي**
Glandulaire, Adénoïde (F).
Glandular, Adenoid (E).

١٩٦٨٠ - **هَدْرِي** *
Limnétique (F).
Limnetic (E).

نمت ترميزي يطلق على كل ما له صلة بالبندان والمنابع والاقوار والبيمرات . كقولك كنبوت الهديرية .

١٩٦٨١ - **هَدَا**
Urine du chameau
الندا هو بول الجمال .

١٩٦٨٢ - **هَدَاك**
Aliment
هو ما به تجمد الجسم والحفاظ عليه وهو جزء للامدة الغذائية الذي يتحول منه الحيوان ، في جهاز الهضم ، الى صالح ينقل الى الدم فيغذي الجسم . وهو من النباتات ما يتحول في الرقعة من نسع صاعد بلعل الى نسع سحوي كاسل . (راجع حلف) .

١٩٦٨٣ - **هَدَامَة**
Brasénia (S). Brasénia (F).
غدامة ج غدم وغدام . نبات وسيد الجنس والنوع من فصيلة النيفيريات . اصلها مناطق العالم القديم . ساقه فراء تكسها غلظة لزبية . اوراقه مسقة ، سنائية تطول من ١٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها ملس البشرة للامسة - آخر الصفحة السفلى وسنار العليا . انزهاره صفيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى اليباض الاخضر || انزهاره يسمر من تموز الى اواخر الخريف .

١٩٦٨٤ - **هَدَدِي ، هَدَوِي**
Festus
الندي والنفوي : كل ما في بطون الحوامل اسمها الناء .

١٩٦٨٥ - **هَدَر**
Abecquer (F). To fond (E).
غر هادار قرنه اي زقه . للفرار : اترق .

١٩٦٨٦ - **هَدَر**
قال الانصري : الفَرَّ طير سود يبيض الرووس من طير الماء . الواحدة غرة . الذكر والاني في ذلك سواء (ابن سيدة) . والفَرَّ الجليل هو الاختنورة ، الحليها .

١٩٦٨٧ - **هَدَرَام** *
Peperomia (S).
Pépéromie (F). Pepper elder (E). Pfeffergesicht (D).
Pope porporino (I).
جنس نباتات حنينة وشبية معمرة من فصيلة النفلليات .



غرَام



غرَام مدبجة



غرَام منشفة

١٩٧٠٤ - **غُرَابِيَّاتُ الْمَنَافِير** (F). *Coracrorantes* (F).
رَبِيَّةٌ مِنَ الطُّيُورِ الْجَوَائِمِ تُشَمَلُ بِمَعْنَى الْقَصَائِلِ . اِشْتَرَاهَا
الْقُرَائِيَّاتُ وَالزُّرُودِيَّاتُ .



غُرَابِ أَبْعَج

١٩٧٠٥ - **غُرَاكَا**
الْقِرَادَةُ ج غُرَاد . غُرَبٌ مِنَ الْكَلْبَةِ (الأسان).

١٩٧٠٦ - **غُرُوكَا ، قَدْرُوكَا** (F). *Interligne* (F).
Space-line, Lead (E).

المُسَاقَاةُ بَيْنَ الرُّبُوعِ وَالرُّبُوعِ أَوْ بَيْنَ السَّرِيفِ وَالسَّرِيفِ
أَوْ بَيْنَ الْخَطِّ وَالْخَطِّ فِي الْفَرَسِ لِلتَّنَقُّصِ الْمُسَطَّرِ .



غُرَابِ أَعْمَم

١٩٧٠٧ - **غُرُوكَا** (F). *Etoile du matin* (F).
Morning star (E).

الْمُتَرَادُّ هُوَ نَجْمُ الصَّبَحِ لَاحَةً يَتَرَى بِطَرْفِ الْفَجْرِ .

١٩٧٠٨ - **غُرَاكِيسِيْلَه** (F). *Gratiola* (S). *Gratiola* (F).
جَنَسٌ مِنْ نَبَاتَاتٍ صَغِيرَةٍ بَرَّةٍ مَمْرَةٍ مِنْ صُفْيَةِ الْخُضْرَانِ بِرَبَاتٍ .
أَنْوَالُهَا نَجْمٌ ٢٠ مُتَشَكِّلَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَصْغَارِ الْمُتَدَلِّهِ الْخُضْرَاءِ .
أَوْرَاقُهَا مُتَقَابِلَةٌ خَاصَّةً ثَلَاثِيَّةٌ أَوْ خَلْسِيَّةٌ الْفُرُوقِ ، أَهْلِيغِيَّةٌ
تُفَصِّلُ السَّيْنِ الْخَافَةِ . أَنْبَاؤُهَا قُرْبِيَّةٌ أَبْيَضَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ الْوَلَدِ
يُغَلِّبُ فِيهَا الْأَصْفَرُ وَالْوَدِيدُ ۥ اِشْتَرَاهَا الْفَرَاوِسُ
الْمُخْزِنَةُ .



غُرَابِ أَعْمَم

١٩٧٠٩ - **غُرَاكِيسِيْلَه مَعْرُوبِيَّةٌ ، حَقِيقِيَّةٌ**
الْمَعْرُوبَةُ ، عَشْبَةُ الْمَعْرُوبَةِ

Gratiola officinalis (S). *Gratiola officinale*, *Herbe*
au pauvre homme (F). *Hedge hyssop*, *Poor-man's*
herb (E). *Echta Gnadenkraut* (D). *Gratiola*, *Piccola*
digitalis (I).

نَوْعٌ مِنَ الْفَرَاوِسِ هُوَ نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ يَرَى مِمْرَ جُلُومِيٍّ
يُمِشِي فِي الشَّتَائِمِ وَجِلْ مُغَلِّبٌ لِمَاءٍ يَمَلُوْنَ مِنْ ٢٠ إِلَى ٦٠ سم .
أَوْرَاقُهَا أَهْلِيغِيَّةٌ صَغِيرَةٌ تُفَصِّلُ . أَنْبَاؤُهَا أَبْيَضَةٌ مُنْقَطَعَةٌ ، صَفْرَاءُ
الْبُيُوتِ ، وَرَدِيَّةٌ صُفْيَةٌ ۥ يُسْتَعْمَلُ كَأَسَدٍ نَافِعٍ مَعَ الْعِلْمِ
أَنَّهُ مِنَ النَّبَاتَاتِ السَّامَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَوْتَ .



غُرَابِ الدَّرَجِ

١٩٧١٠ - **غُرَامُ** (F). *Gramme* (F). *Gram* (E).

وَسْعَةٌ وَوزْنَةٌ ، الْأَلْفُ مِنْهَا يَسَاوِي كِيلُوغَرَامٌ .

١٩٧١١ - **غُرَاكِمَةُ** (F). *Amende*, *Pénalité* (F).
Fine, *Penalty* (E).

جَزَاءٌ لِقَدْ يَفْرَضُ بِصَفَةِ عَقُوبَةٍ .



غُرَابِ لُبْنَانِيٍّ

١٩٧١٢ - **غُرَاكِمَةُ إِجْرَامِيَّةٌ** (F). *Amende de procédure* (F). *Fine of procedure* (E).

نَوْعٌ مِنَ الْعُقُومَاتِ الْمَدِينِيَّةِ تُفْرَضُ لِقَضَائِمِ مِيرِ الْإِجْرَامَاتِ
مِيرًا مُنْتَظَمًا .

١٩٧١٣ - **غُرَاكِمَةُ جِنَاكِيَّةٌ** (F). *Amende pénale* (F). *Penal fine* (E).

عَقُوبَةٌ مَالِيَّةٌ تُكُونُ أَضَائِفًا فِي الْجُنَايَاحَاتِ ، وَأَصْلِيَّةٌ أَوْ أَضَائِفَةٌ
فِي الْجُنْحِ . وَدَائِمًا أَصْلِيَّةٌ فِي الْخَالَفَاتِ ، وَهِيَ تَتَزَمُّ بِالْمُحْكَمِ
عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ إِلَى الْخِزَانَةِ الْمَالِيَّةِ .



غُرَاوِسِيْلَه عُزْنِيَّةٌ

١٩٧١٤ - **غُرَاكِمَةُ هَدَكِيَّةٌ** (F). *Amende civile* (F). *Civil fine* (E).

هِيَ الْقُرَّةُ الَّتِي تُحْكَمُ بِهَا لِسُلْطَى الْحَاكِمِ الْمَدِينِيِّ بِنَاءً عَلَى مَا
نَصَّ عَلَيْهِ الْقَانُونُ الْمَدَنِي .

١٩٦١٤ - **غُرَابِ أَبْعَجٌ ، غُرَابِ الْبَيْتِ ، قَالِي**
Corvus corax (S). *Corneille mantelée*, *C. candrée*,
Corbeau mantelé (F). *Hooded crow*, *Gray-back*
crow (E). *Nebelkrähe* (D).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقَوَامِ . جَسْمُهُ مُتَوَسِّطُ الْقَدِّ ، يَطُولُ
نَحْوَ ٥٠ سم . رَأْسُهُ وَصَدْرُهُ وَبَطْنُهُ وَذَنَبُهُ وَجِلْدُهُ وَرِجْلَاهُ
أَلْوَانُ السُّودِ الْمَائِيَّةِ . تَطِيرُ وَبَطْنُهُ إِلَى الْوَرْدَةِ الْفُضْلَةِ . سَرَبُهُ
كَثِيرٌ الْعَدَدِ . يَأْكُلُ الْخَبْثَ وَالسَّهْلَ وَيُضَلِّفُ الْأَشْيَاءَ
وَيُشَارِبُ الْبَحَارَ .

١٩٦١٥ - **غُرَابِ السُّنَمِ ، غُرَابِ لُوحِيٍّ**
Corvus corax (S). *Corbeus commun*, *Grand cor-*
beau (F). *Common crow*, *Common raven* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَوْبَادِ جَسْمُهُ كَبِيرُ الْقَدِّ ، طُولُهُ نَحْوَ
٦٥ سم . وَبَطْنُهُ نَحْوَ ١٠٠ سم . لَوْنُهُ أَسَدُ الْوَلَدِ السُّوِّيِّ
الْأَبْعَجِ . يَطِيرُ حَوَاجٍ مُتَدَاخِلَةٍ الْخُضْرَاءِ وَالْحُمْرَةِ ۥ يَأْكُلُ
الْأَحْرَاجَ وَالْجِبَالِ . يُمِشِي لَوْنًا مَرْمَعًا نَحْبَهُ مِنْ أَسَدَاءِ
خَيْرِهِ . قُوَّةُ الْخُشْرَاءِ وَالْوَدِيدَاتِ وَالْعِلَاقَ وَالْقُرْآنَ وَالْمُغَادِقَ
وَيُضِي الصَّائِرَ وَالْجُرُوبَ وَالْبُزَارَ الْفَائِضَ .

١٩٦١٦ - **غُرَابِ أَعْمَمٍ**
Pyrrhocorax pyrrhocorax (S). *Corbin crève* (F).
Carrion-crow (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقَوَامِ مُتَوَسِّطُ الْجَدِّ ، طُولُهُ نَحْوَ ٤٢ سم .
لَوْنُهُ أَسَدُ الْوَلَدِ السُّوِّيِّ الْكَلَمِ . مَشَارِبُهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْحُمْرَةِ ،
يَأْكُلُ سَرَبَهُ الْجِبَالِ وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى لَحْمِهِ قَلِيلٌ : هُوَ أَكْثَرُ
مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَعْمَمِ .

١٩٦١٧ - **غُرَابِ الرُّوْعِ ، غُرَابِ أَوْدِيٍّ ، شُوكَلَه**
Corvus monedula (S). *Corbeus choucas*, *Chou-*
cas (F). *Jackdaw* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقَوَامِ صَغِيرُ الْجَدِّ طُولُهُ نَحْوَ ٢٦ سم .
رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ وَبَطْنُهُ إِلَى الْأَسْوَدِ الْقُصْبِيِّ الْإِبْعَجِ . عَقَبُهُ
وَصَدْرُهُ وَبَطْنُهُ إِلَى الْكُحْلِ الْفُضْلَةِ ۥ يُمِشِي جَاهَاةً كَبِيرَةً .
سَرَبُهُ كَثِيرٌ الْعَدَدِ . يَأْكُلُ الْأَحْرَاجَ الْمُبَشَّرَةَ الشَّجَرِ وَالْبُيُوتَ
الْخَرِبَةَ وَالْمَوَاقِفَ الصَّخْرِيَّةَ . قُوَّةُ الْخُشْرَاءِ وَالْوَدِيدَاتِ وَالْجُرُوبِ
وَالْبُزَارِ الْفَائِضِ .

١٩٦١٨ - **غُرَابِ الْقَبِيْطِ** هُوَ الْفُضْلَانُ ، أَطْلَبُ .

١٩٦١٩ - **غُرَابِ الْفَيْلِ** هُوَ وَاقُ الشَّجَرِ ، أَطْلَبُ .

١٩٧٠٠ - **غُرَابِ الْمَاءِ** هُوَ الْبَاقُ وَاقُ الْمَاءِ .

١٩٧٠١ - **غُرَابِ لُبْنَانِيٍّ ، دُمْتُ**
Pyrrhocorax graculus (S). *Corbin chocard* (F).
Chough (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَوْبَادِ صَغِيرُ الْجَدِّ ، طُولُهُ نَحْوَ ٤٠ سم .
قُوَّةُهُ أَسَدُ الْوَلَدِ يَمْلِكُ مُغْشَرَةً وَرَدَةً . مَشَارِبُهُ إِلَى الْصَفْرِ .
رِجْلَاهُ إِلَى الْحُمْرَةِ ، مَوَلَدُ الْبِلَادِ الْأَلْبَانِيَّةِ وَيُجُورُهَا . يَأْكُلُ
الْجِبَالِ فِي الصَّبْرِ وَيُمِشِي عَلَى الشُّطُوطِ فِي لَيْثَاءِ . سَرَبُهُ
مُتَوَسِّطُ الْعَدَدِ . قُوَّةُ الْخُشْرَاءِ وَالْوَدِيدَاتِ وَالْبُزَارِ وَالْجُرُوبِ
الْبَائِضَةِ .

١٩٧٠٢ - **غُرَاكِمِيٍّ**
Consolida (F). *Consolid* (E).

١٩٧٠٣ - **غُرَاكِيسِيْلَه**
Corvidae (S). *Corvidae* (E).

فَصِيلَةُ الْقُرْبَانِ مِنَ الْجَوَائِمِ الْقُرَائِيَّةِ لِلنَّاتِقِ . فِيهَا الْقُرَابِ
وَالْفُضْلَانُ وَالْقَالِي .



غريبوط الصنوبر



غريل



غرة



غرة جميلة

١٩٧١٥ - غرنايت

Granit (F). Granite (E). هو الأمل، صخر بلوري شديد الصلابة متجانس الألوان يتكون من الفلسبا والفلق والرو .

١٩٧١٦ - غرنايتي ، ستاتي ، صواني

Granitic (F). Granitic (E). تمت ترميز ياتلق على ما هو صواني التركيب .

١٩٧١٧ - غروب

هو المحور القراري ، اطلبه .
١٩٧١٨ - غروب
الغرب : داء يصيب الشاة فيتمسك غرطوها ويسقط منه شعر العين (السان) .

١٩٧١٩ - غريمال

Crible (F). Sieve, Riddle (E). مسدة شيق التوابل .

١٩٧٢٠ - غريماليني

Cribiforme (F). Cribiform (E). تفرق الحبوب عن الفتك والاجرام الغريبة .

١٩٧٢١ - غريبكة

Criblage (F). Sifting (E). تفرق الحبوب عن الفتك والاجرام الغريبة .

١٩٧٢٢ - غروبوس

Cymothos (S). Cymothod, Poux de poisson (F). جنس دويبات بحرية من القشريات مساويات الاربيل

وفصيلة الغروبوسات . انواعها المروسة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه مبطلة ، قروية الشبه بالهدية ، طولها من ٣ الى ٥ سم . منها انواع تصقل على الاسماك .

١٩٧٢٣ - غروبوسيات

Cymothoidae (S). Cymothoidae (E). فصيلة دويبات بحرية من القشريات مساويات الاربيل .

اجتناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها اهلجية مبطلة شبيهة باجسام الهدية طولها من ٥ الى ١٠ سم . اخطامها مجهزة بدهة ماسة || بعض اجتناسها يتطفل على الاسماك .

١٩٧٢٤ - غروبوط الحراج

Grypotes silvestris (S). Grypotes des forêts (F). حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنسة .

جسمها صغير القدر يميل نحو ٥ م . || رأسها مستعرض قليل التنع ، اسفر الكون . خطها مثل الطول . عينها كبيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كسلها ينفي الشكل ، اسفر الكون اسفر الفرج . حفيفها مزوانية ، صفراء ، ظهرها كامل الحنجية ، لاحف ، اخضر الكون ، بني الطرف . روثناها عشائيان ، شفافان . بطها الى الحظي الاسمر . قوائمها كثة الملب الشائك || تألف الحراج اخصها حراج الصنوبر .

١٩٧٢٥ - غروبوط الصنوبر

Grypotes puncticollis (S). حشرة من فصيلة الوزيديات صغيرة القدر ، طولها نحو ٤ م . جسمها مثالي الشكل . زباناها خيطية مستطيلة .

توثر الى الصغار الحظي الناقص . مرتها الصنوبر على اختلاف انواعه ، يكثر وجودها من تجوز الى تشرين الاول . اضرارها زهيدة لا تستوجب العناية .

١٩٧٢٦ - غروبيل

غروب من جنس الطائف المشهور وهو ارق النبت واشده سوادا .

١٩٧٢٧ - غروبيل

Cancellaria (S). Cancellaire (F). Cancellaria (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مذيئات الاربيل

وفصيلة الغروبيلات . انواعها المروسة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والطيابية والبيض الاصفر الذي يتناثر المنة ماصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه يضية الشكل او برجية ، ذلقة الاحقاب ، مفضنة الاريلة ، قروية القوقعة ، مشبكة الصفحات الخارجية المبهمة بالالوان العابقة .

١٩٧٢٨ - غروبيليات

Cancellariidae (S). Cancellariidés (F). Cancellariidae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مذيئات الاربيل

مغطيات الخياشيم . اجتناسها وانواعها المروسة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . جسمها زائفة تعيش على التنبوت البحرية || اصداها شبه يضية الشكل ذلقة الاحقاب الهلزنة ، صغيرة الؤلس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الزروس ، ثنائية الؤلس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الاربيل المزوانية الشكل || اعرف اجتناسها الغريبيل .

١٩٧٢٩ - غرة

Sison amomum (S). Sison amome, Berle aromatique (F). Bastard stone parsley, Hedge sions (E). Amomlein, Würziger Herrukümmel (D). Sisons, Amomo falso (I). عشبة برية من فصيلة السيوليات . جذورها وتماها عطرة طيبة ، كانت ولا تزال تستعمل كقوية . منها ينفس مناطق حوض البحر المتوسط . توجد بين الزروع وقرب السباحات ويجري الماء || اوراقها متعاقبة ، مركبة . وريقاتها ودية التجسيم ، مفرسة التصل . ثمارها جراء عديدة مكورة الطرف .

١٩٧٣٠ - غرة

Fulica (S). Foulque (F). Coot (E). اللرة والقرع ج غر . جنس طيور مائية من فصيلة التخلقيات . انواعها ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تتميز بمقاومتها القوية للمدبة الطرف . روثها مذبذبة اللمبة . اجتناسها فاشرة وقصيرة . اذنانها صغيرة مستديرة . جسمها قوي . غالبا مستطيلة || اشهر انواعها اللرة السوداء وللرة المتوجة .

١٩٧٣١ - غرة جميلة

Anthocharis eupheno (S). Anthocharis des crucifères, Aurore de Provence (F). Anthocharis eupheno (E). حشرة من فصيلة الكرونيبات ورتبة حرشفيات الاجنسة .

موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واقعة قتها رقيق الازهار . سرها تعيش على اوراق الصليبيات البرية والزراعية || جسمها مستطيل القد يميل نحو ١٤ م . يسلط نحو ٤٢ م . رأسها اريد . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشها الى الطلحة الرصاصية اللوح . بطها الى الربة السوداء || روثناها الاسمايان ، منه الذكر ، الى الصفرة يملها من الزام الثالث الى الطرف مشمة برتقالية نارية يطلوها اطار اسود .

وراء عند الاثنى الى البياض الاصفر تملو في افرام الرابع شمس طلال يقابلها طلال صغير اسود. ووشاحا الخلفيان ، عند الشقين ، الى البياض الاصفر الموراج تملو رقة طلال خفيفة وست تملو سود هاشية الاركانز || لها جيل واحد في الجيل . تظهر القراشة في نيسان . تسرح في النهار . تعالج بعد ظهورها ستة اسابيع وتصلح للمك قطعاً مستطيلة على اتصال الاوراق || السرة تملو نحو ٣٤ م. جسمها اسطواني الجرم ، مائل التشاير ، يملو حل قصير . ثوبها الى الطلعة السبورية الموراج يملو خطان جانبيين ابيضان وعشرة اطوار خفيفة تتنهي عند اللب . اطوارها الى السرة السوداء . رأسها ومذنها ورواجها الى الربعة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً يتنهي ضمن غشاء متين داخل لفافة من الاوراق المتولدة .



عُرَّة سوداء

١٩٧٣٨ - عُردونية قشمرجيه

Gardénia thunbergia (S). *Gardénia de Thunberg* (F). جنبة جاسدة ، مهدا بلاد افريقية الجبورية . صلبها تملو نحو ٢٠٠ م. اوراقها سائبة الشكل ، مائلها عايق الخضار اللامع . اوراقها طرفية الاركانز . حطرية الواجهة ، ثمانية كتلات البياض ، نوحها اسطواني الاوليوب ، خماسي او سداسي للتشريح الطولي || ازهارها يستمر من كانون الثاني الى اذار .

١٩٧٣٩ - عُردونية وصبايغيه

Gardénia rochmannii (S). *Gardénia de Rochmann* (F). جنبة سرية مهدا بلاد افريقية الجبورية . صلبها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ م. اوراقها احليجية الشكل ، صلبها فسفي الخضار الزاهي . ازهارها متولدة الله ، حطرية الواجهة المشعمة ، سداسية الكتلات البياض || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



فريال المنصف

١٩٧٤٠ - عُردونية كبيرة الزهر * ، عُردونية

Gardénia jasminoides, G. *florida* (S). *Gardénia à grandes fleurs* (F). جنبة سرية شائعة الانتشار التريسي . صلبها تملو نحو ٢٠٠ م. اوراقها احليجية تملو من ٧ الى ٩ م. وتعرض من ٤ الى ٥ م. صلبها جبل اخضر اللامع الزاهي . ازهارها فواصة العرف الطوري ، تبهر بياض اللون ثم تتسرف الى الصلوة وهي كبيرة الحجم قطرها نحو ١٠ م || ازهارها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

١٩٧٤١ - عُردونية مجردة كركه

Gardénia radicans (S). *Gardénia radicans* (F). علة صغيرة الله شائعة الانتشار التريسي . مهدا اليابان . تملو نحو ٦٠ م. صلبها مجردة . اوراقها متالية لامة الفصل . ازهارها فواصة العرف الطوري ، نوحها اسطوانية ، بتلاتها حاجية ، منها البسيطة ومنها المكبة || ازهارها يستمر من اذار الى حزيران .



عردونية كبيرة الزهر

Gordonia (S). *Gordonia* (F). عُردونية جنس نباتات معقدة تتميزت على اسم الشاغل الانكانزي « غردون » وهي من فصيلة الكاسليات . انواعها المرونة ١٠ مهدا الشرق والبلاد الامريكية . منها القوية والارامية والترينيدية . اوراقها ابيدة او مائلة ، متعاقبة ، معققة ، جاسدة لتصل الجملدي . ازهارها فردية التجميع ، لا قياسية الاركانز ، بياض اللون ، مستحبة القرف الطوري || اشهر انواعها ما يلي :

١٩٧٤٣ - عُردونية خضيلة زهر *

Gordonia lasianthus (S). *Gordonia à fleurs velues* (F). نوع من القردونية وهي جنبة سرية شائعة الانتشار التريسي تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م. اوراقها ابيدة سائبة الشكل تملو من ٨ الى ١٣ م. وتعرض من ٣ الى ٥ م. صلبها مائل البشرة ، مشعاري الحافة ، باحت الخضار الفاتح . ازهارها بياض اللون ، كبيرة الله ، قطرها نحو ١٠ م. بتلاتها خلية البشرة . حرفها ذكي الراجعة القرواسة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين الثاني .



عردونية خضيلة زهر

١٩٧٣٢ - عُردونية صؤدكة *

Follica stris (S). *Foulque noire*, F. *morille*, *Macroule* (F). *Common oot* (E).

طائر من القرف ، موطنه فسبح الاجرام يمتد من الشرق الى اربوة وافريقية . يعيش بجاهات كبيرة العدد . سره يشمل عدة مشات . طوله جثة يراوح بين ٣ و ٤٥ م. رأسه مدق الى السواد الباق . ظهروه وجناحه وذنبه الى السواد الرصاصي الموراج . بقلته وخوافيه الى السواد الازرق . جيته غبار الدجج . متقار ودي اللون ، حيتاه قريزيان . ساقاه راديانتان تملوها حلقة مستعرضة جارية اللون خضراء الموراج || يائف التامق والبحيرات . قوته الحشرات والنباتات المائية . يمش في شق يقيم على سطح الماء بين القصب والدار والاسل وما اشبه . انتاه تقص من ٧ الى ١٥ بيضة تحضنها بعدها نحو ثلاثة اسابيع .

١٩٧٣٣ - فريال الصفصاف *

Gracila minuta (S). *Gracila de l'oier* (F). حشرة خالصة من فصيلة القريزيات . طولها يراوح من ٤ الى ٦ م. جسمها مستطيل الشكل سوي اللون الاجر والامر الموراج || تظهر الحشرة الجملدي في شهر تموز وتضع مكبا بعد التماثل ، في خلال شهر آب ، على مختلف البيدات المقطوعة من فضلي القديات وقروديات واعصها الصفصاف والكستناء || يرتقي غبار اللون سمراء الرأس تميل على فتيان ويبدان النباتات المذكورة تصطبها وتمنع استعمالها الصناعي .

١٩٧٣٤ - عُردونية

في الجبتم جنس اشجار من الكلوزيات . *Gezouiller* (F). *To chiep* (E). عُردون الطائر او زرق : يغم صوته وطرب به او معتدل

١٩٧٣٦ - عُردونية

Pharmacologie (F). *Pharmacology* (E). علم اصول الادوية ونظريات قواعدها وطرق استعمالها . *Gardénia* (S). *عُردونية ، عُردونية* *Gardénia*, *Gardénia*, *jardin* (F). *Cape-jasmine*, *Gardénia* (E). *Altgenreiche gardénia* (D). *Gardénia* (I). جنس نباتات برية وترينيدية من فصيلة القويبات . انواعها نحو ٤٠ منها الشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات

اخضتة ، يكثر فيها الطيب الأصفر والسينات الوردية التي تكثر كأساس النوع || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٧٥٠ - حُرْدُونِيَّة يَحْمُورِي

Pyrethrum tchihatchewi (S). *Pyréthre gezonnant* (F).
نوع من القردوب وهو عشبة معمرة عديمة الساق ، خلية الاضواء تملو من ٥ الى ١٥ سم . اوراتها عديمة التفريص . رؤوسها الزهرية فردية للتجميع تقوم على شراخ قروي الانتداب || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٧٥١ - حُرْدُونِيَّة ٥

Garidella (S). *Garidelle* (F). *Garidella* (E).
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مغرية من فصيلة الفقيقيات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منها يتعدى الشرق الاوسط الى اوروبا || سيقانها عديمة الفروع او قليلتها تتنبت بالاشار . اوراتها متعاقبة ، مفصدة الى غرق خلية او شمعية . ازهارها حلالية التركيب . يتلأها كولية الشكل ، متصصة ، صفراء اللون || تنديدها ربيعي

١٩٧٥٢ - حُرْدُونِيَّة

Gardénia (F).
هي القردونية ، اطليا .

١٩٧٥٣ - حُرْدُون

Aldá (F). *Chance* (E).
هو احتمال حدوث شيء غير مضمون .

١٩٧٥٤ - حُرْدُون

هو القلم ، اطليه .

١٩٧٥٥ - حُرْدُون

هو القنداد ، اطليه .

١٩٧٥٦ - حُرْدُونِيَّة

Equisetum (S). *Equiseta* (F). *Horsetail* (E).
هي الكنبات ينبت على شواطئ الأنهار لا ورق له وهو ذو اماسخ الزهرية ، الواحدة في جوف الاخرى فاذا اجتلبتها خرجت كأنها حشاس اخرج من مكلته . ج حُرْدُون

١٩٧٥٧ - حُرْدُون

اسم يطلق على المنتجات القوية وعلى مركبات الحروين التي تستعمل في التبييض الخلوي تحت الجلاء .

١٩٧٥٨ - حُرْدُونِيَّة ٥ ، حُرْدُون ، حُرْدُون ٥

Gallietis barbara (S). *Grison talra*, *Huron*, *Hyrra* (F).
حيوان لاحم مفترس من فصيلة السورديات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى والبارزيل . يألف الاحراج والسحاب الزرقعة المشب . ملجئه الحيواني جامي . جماعته تعد من ٦ ازواج الى ١٢ زوجاً || جسمه ابيض الشكل مستطيل . طوله نحو ١١٥ سم . عا فيه اللب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . رأسه معتل الجرم والخط . عيانه واذناه صغيرتان مستديرتان . سباله معتل الكثافة والطول . قوامه قصير . براءته حادة الاطراف القليلة التجميع . غذاه للشرعية تفرز مادة دهنية سكية العرف . وبره نام وقصير . ثوبه الى الشبهة الممره النسوية || الاثنى تقص من جردون الى ثلاثة اجزاء مرة واحدة في الحول || مسرحه دجوي . يدنو بسرعة جلاء ويتسلق الاجمار بشفة . قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والطيور .

١٩٧٥٩ - حُرْدُونِيَّة زَيَّاه

Gordonia altamaha (S). *Gordonia de l'Altamaha* (F).
شجرة من القردونية تملو نحو ٥ امتار . مهدا البلاد الامريكية . اوراتها حاملة اهلجية الشكل ، مقنطية التاجعة ، طول من ١٥ الى ١٥ سم . وتفرس من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحلفة ، اذنب الصفحة السفلى ، يحمر في الحريف . ازهارها كبيرة القدة مستعرضة ، قطرها نحو ٨ سم . عرقها بتقسيم الفراحة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٩٧٦٥ - حُرْدُونِيَّة محوَرِيَّة الزهر

Gordonia axillaris, *G. axemalis* (S). *Gordonia à fleurs axillaires* (F).
نوع من القردونية وهي جنية سريرية صينية القدة تملو نحو ١٠٠ سم . مهدا الصين . اوراتها ابيدة سنانية التصل . طول من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها حاملة اللون ، كبيرة القدة ، محورية الارتكاز ، ذكية العرف || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الثاني .

١٩٧٦٦ - حُرْدُونِيَّة ٥ ، كالفورنيَّة ، حَشِيَّة الحصى

Pyrethrum (S). *Pyréthre* (F). *Pyrethrum*, *Fever-few* (E). *Bertrame*, *Bertramewurzel*, *Rota wucherblume* (D). *Pietro* (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الانجوية الزهر . ازهاره حديدية تشبه الاكوان منها الطيبة والزيونية والشمعانية التي يستخرج من زيونها بعد طعنها مسحوق جوالي المادة شديد الفاعلية يستعمل في القضاء على الحشرات . ومن قائل ان الانواع الحليية تستعمل في علاج بعض الحشرات اخصها الملوادة . جلورها غزيرة للمادة الفعالة ، شائعة الاستعمال الطبي || شهر انواعها ما يلي .

١٩٧٦٧ - حُرْدُونِيَّة قُرْدُونِيَّة

Pyrethrum cinerariaefolium (S). *Pyréthre à feuilles de cinéraire* (F).
نوع من القردوب وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراتها كبيرة القدة ، قوية العرف ، ثلاثية التفريص . والتسعين ، رباعية العروق المتوازية المخطوط . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فصي اللون . رؤوسها الزهرية كبيرة القدة قطرها يراوح بين ٤ و ٦ سم . زيونها كثيفة القند الدنعية يحمر منها مسحوق القردوب الذي يغسل في تركيب بعض الحواشيل || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٧٦٨ - حُرْدُونِيَّة مشكل

Pyrethrum uliginosum (S). *Pyréthre tardif* (F).
نوع من القردوب وهو بجملة معمرة تملو من ١٥٠ الى ٧٠٠ سم . ساقها قزواء فناء . اوراتها سنانية ذائقة طول من ٦ الى ٦ سم . نصلها لدن الصفحة للتشارية الحلفة . رؤوسها الزهرية صوانية التجميع ، كبيرة القدة ، قطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم . ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٩٧٦٩ - حُرْدُونِيَّة وَدِي

Pyrethrum roseum (S). *Pyréthre rose* (F).
نوع من القردوب وهو نبات عشبي معمر شائع الاستعمال الفرنسي . خضوبه ازهارية زهاء ٧٠٠ تملو من ٣ الى ٧٥ سم . اوراته لا تباينة للتفريص . نصلها ماس البشرة اخضر اللون . رؤوسها الزهرية عديدة الالوان المتباينة



قردوب



حُرْدُون



المحرشاة



فرخار الوزال



فهرست متغیر



غرفه معروف



غریغور



غیر حقون

من الملب النظيف الجامد تحتل مكان الرقة ويطوق من
الريش المتشعث يركب قاعة النقر. ثوبه الى السوداء
اللامع ، يملو توشم ايض منسوب الرقة والحجم .

Numida cristata (S). ١٩٦٧ - غير شير قنبراني
Pintade huppée (F).
مطار من التفرغ. موطنه حوض الزمبيز، يتميز بقنبرته
السوداء وبشبه الأريه الرصاصي اللامع القليل التوشع.

١٩٧٨ - غرغير مستطلس *

١٩٧٦ - **غرغر معزوف** * ، **غرغر شائع**
Numida meleagris (S). Pintade vulgaire, P. commune (F).
 طائر من الغرغر البري والداجن . سلالات عديدة فوارها
 الثوب والحجم وكثرة البيض . منها الأبيض والليلي والآخر
 الاسود والأزبد والمقرش . جميعها سهلة التدجين والربية .
 ولا سلالات تبقيش في السنة نحو ٨٠ بيضة || يتصالب
 مع الدجاج والاحساخ والفلوس . حبه جملة الاشكال
 لا تطفئ من انجاسه القوي المألوف .

Numida vulgaris (5). - **شروغر نسري** ١٩٧٧
 Pincode vaurou, P. royale, P. vulgarine (F).
 طائر من الشروغر، جسمه حجم البجاجة (الكبيرة)، راسه
 ملط الجلد القرمزي اللزق، يحمل عند قنقه طرة
 من الريش الناعم النقيص. جوشه ملتصق برداء
 من الريش الطويل الأزرق المخلع بالابيض. ثوبه ال
 الرتبة الحمراء يسلو ثوبه اليبس || موطنه شالي شرقي
 افريقي.

Numididae (F). **فهريريات** (1931)
Numididae (F). Numididae (E).
فصيلة طير وسيدة الجبل من رتبة الدجاجيات. طيورها
بشرة البنية الجافة، دقيقة اللق، صغيرة الرأس للفرج، قوية
العضلات، مستعدة لاجتاز الامداد الصعبة. تنجس
اللون اللؤلؤ في موطنها الغريبة وأجزاء الجفيرة
كسكنى وبقعها. تأثرت الجفان والرج، أسرارها
متوسطة المد. قوتها الحبوب والذرة والنبات وأغشار.
يحميها الإقليم والصخور التاتية قريبة || أنثا ينش
١٢ بيضة تحضنها وحدها في انصس رصه بالحشيش
والقرف.

Gerrhonotus (S). * شُرَّهَوْر ١٩٧٧
Gerrhonote (F).
جنس حذاء من فصيلة الجمروريات. أنثاه المعروفة نحو ١٠ ، طولها يراوح بين ٧٠ و ٣٠ سم. أنثاها ال السرة يعلوها تجليغ اسود وبقعة بيضاء || موطنها البلاد الحارة. تألف الأماكن الصخرية .

Gorgonia (S). * شُرْعُون - ١٩٧٧
Gorgonia (F). Gorgonia (E).
يبنى حيوانات بحرية ركنية راحته من فصيلة الدفوفيات
أنواع المروقة قليلة العدد لكنها منتشرة في معظم بحار
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة المستعمرة قريبة لشبه

Plantation (F). ١٩٧٥ - نخيل ، نصب
Planting (E). هو زرع النخيل في التربة . وقد يتم على عدة أشكال :
زراعة وبرمات ونخسات .

١٩٧٦ - غَرْسَة ، غَرْيَسَة ، قَصْبَة ، شَنْطَلَة
Plant, Planta (F). Plant, Slip (E).
كل نبات قتي صغير له جالور يمكن نقله وزرعه في
ستقره .

١٩٧٦ - شهر شاميه ٥٠
Anisosticta novemdecim punctata (S).
Anisosticta à dix-neuf points (F). Anisosticta
novemdecim punctata (E).

١٩٧٦ - حُرَّاج ، حُرَّاج
هو البيت الحرام ، أطلها .

١٩٧٣ - هجره غار الزوال ٥٠
٥). Gargare du genit (F).

١٩٧٦ - غره‌لار جبلي
هو اليقضا اليضاء ، اطلها .

١٩٧٥ - هريير ، دجاج فيرعوئي ، دجاج
 سيندي
 Numida (S). Guinea-fowl (E).
 جنس طير من الفرشيات . انواعه خمسة جميعها افريقية
 المهد متشابهة الحجم ، متقاربة الشكل . اجسامها ونية .
 مناقيرها ذرية ، حادة الطرف . اجنتها واذاها قصيرة .
 اقواسها قوية اللون حمراء جميلة .

١٩٧٦ - غور الحبيشة
Numida pitlorhyncha (S). Pintade pitlorhynque,
P. à pinceau, Poule africaine (F).
طائر من الغرير - موطنة أفريقية الشرقية - يتميز بلمة

ثمادها مختلفة الاشكال || اشهر انواعها غشب الانثياء وغشب القديسين والقرند والغلاب .

١٩٧٨٥ - هَرْقَل

غرقك البيشة : مدوت . وبالطبخ فسد ما في جوفه .

١٩٧٨٦ - **هَرْقَلَة** *
Garrulaxe (S). Garrulaxe (F). Garrulaxe (E).

طائر من فصيلة التيتليات لاقتات النمل وربة الجرائم . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى ادفى وافريقية الشرقية والجزيرة ، تجوها ذهاباً واياباً في سبيل المصيف والشتى . تأتف الاذنان والاحراج الميضة الانجبار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم . لونها العلوي الى الشقعة المرمجة بالاسمر . ولها متوج بكشة معتدلة الحجم ، عاجية اللون . عنقها وصدرها الى البياض العاجي . بطنها وزمكاها الى البياض الاخير . متقادح دقيق الحجم ، معتدل الطول ، شديد السرة . عنينا صغيرتان عسلتان . جناحها معتدل الطول ، ذلق الطوف . ذنبها مستدير الطوف . رسفاها دقيقان ، اصفران || طيرانها خفيف الحركة ، بسية القوط . قبتها النمل والاساربع والادبان والثار المتينة || تدنن معها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين من سطح الارض . الاثنى تقسم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

١٩٧٨٧ - **هَرْمِيس** *
Grammistas (S). Grammistas (F). Grammistas (E).

جنس اسمك بحرية من شاكيات الزمانف وقصبة الغريعات . انزومه المروعة قليلة البدن اصطناعها بعض بحار المناطق الحارة اصنعها البحر الاحمر والهند الهندي || اجسامها صغيرة القد ، اعلاجية الشكل ، معتدلة التيطيط ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . اولياها تراوح من الرسكة الى الخصر الامس ، يطولها تحطيط قاطب ثلاثي الخطوط الفضية او الذهبية . رؤوسها كبيرة . اخذاتها رسية الانفراج . حيوتها جاحشة . زعمانفها الظهيرة الاولى شاككة النحاس . زعمانفها القبلية مستديرة الاطراف || لونها كاعنة الصفنت قل من يرشب فيها .

١٩٧٨٨ - **هَرْن**
Corbeau (mâle) (F). Crow (male) (E).

هو الزراب الاكر .

١٩٧٨٩ - **هَرْنَاب** ، **هَرْنَاب** *
Corvultur (S). Corvultur (F). Corvultur (E).

جنس طير من الجرائم سفيات المنائر وقصبة الغريعات . له نوعان ، الزرناب الابيض البق والزرناب الهليلج المتقاد موطنها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . يتميزان بكثر الجسم وارتفاع القوائم وفلاحة المنقذ واسوداق الحنن || قوتها الجيف والظاء والورز والبرذوان والفكران والشفادوع والحشرات والديدان .

١٩٧٩٠ - هَرْنَابٌ هَلِيظٌ لِلنَّادِ

Corvultur crassirostris (S). Corbivau à gros bec, C. d'Abyssinie (F). Abyssinian corvultur (E).

نوع من الزرناب . اصطناعه فصيلة الارباء تمتد من سوس البحر الاحمر الى الكنتو . جسمه كبير القد يطول نحو ٨٥ سم . بسطه لا يقل عن ١٥٠ سم . متقادح ضخم هليلج . ثوبه الى السواد القمعي يطول موج اخضر وزرق .

بمستمرات المرجان . لونه تراوح من الابيض القمعي الى المرجاني الباهت ، ومن الابيض الاطلل الى الاخضر الامس .

١٩٧٧٤ - **هَرْغُونِيَّات** *
Gorgonides (S). Gorgonides (F). Gorgonides (E).

فصيلة حويئات بحرية من الزماريات الملوحيات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها من الحويئات الركبة الرامحة على الصخور احصاها صخور القاع || اشهر اجناسها القرفون .

١٩٧٧٥ - **هَرْف**
Feuilles caduques (F). Deciduous leaves (E).

ورق الشجر حامة وورق الانجبار النقيضة خاصة .

١٩٧٧٦ - **هَرْف** شجر يدغ به (اللسان) .

١٩٧٧٧ - **هَرْفَة التيجاركة**
Chambre de Commerce متعة مؤلفة من مثل التيجار وارباب الصناعات تتعلق بسلامة لدى السلطات العامة وتجمع لم المعلومات الدقيقة من التجارة والصناعة في الداخل والخارج .

١٩٧٧٨ - **هَرْفَة الزراعة**

Chambre d'Agriculture (F). Chamber of Agriculture (E).

غرفة الزراعة ، نوبة تقسم بعض الزراع المستعين لخدمة المصالح الزراعية الوطنية . والفرق الزراعية تابعة الدولة ولها قوانين خاصة .

١٩٧٧٩ - **هَرْفَة المكاسمة**

Chambre de compensation (F). Clearing-house (E). هو مركز ايجاع يثل المصارف ومصارف المصارف لاجراء عمليات مقاضاة التحويلات والاوراق المالية .

١٩٧٨٠ - **هَرْفُو**
Gorfou (F).

جنس طير من مديمات القرش ، كليات القدم ، مشهور باسم طقاف ، اعطيه .

١٩٧٨١ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفِي** ، **قَيْفَة**
Chorlon هو غلاف البيشة الداخلي مركزه تحت القيش .

١٩٧٨٢ - **هَرْفَاء**
Blanc d'oeuf (F). White of egg (E). القزند : بياض البيض غرق المس .

١٩٧٨٣ - **هَرْفَاء** ، **هَرْج**
Nitraria (S).

Nitraria (F). Nitre bush, Salicree (E). Salpêtre-rauch (D). Nitraria (I).

جنس نباتات برية من فصيلة النرقديات . اصطناعه بعض المناطق الاسيرية والافريقية الشمالية والوسطى . انواعها شجيرات وجنبات شاككة او سرسة . اوراقها كاشمة ، متعاقبة جامدة التصل . انزادها بياض اللون ، فردية او عكوكلية . ثمارها حنينة او نوية ، مدبة الطوف ، حر او سيد .

١٩٧٨٤ - **هَرْفَاء يَت** ، **قَيْفَة يَت**

Zygophyllaceae (S). Zygophyllacées (F). Zygophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القضاات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها عشبي وبعضها شجري وجبني . اوراقها لا تقياسية الترتيب والشكل فيها المتعاقبة والمتعاقبة وفيها البسيطة والمركبة . انزادها خمسة التركيب عشوية .



غرلة



هربس



غراب هليلج للنقاد



غرناق عادي

قراء خشوية الساق تلو من ٧٠ إلى ١٠٠ سم. فروصها طليقة التجسيم. أرواقها متعاقبة، لائفة، صلبة. تسلفها سناني الشكل، حطب الصلبة، جامد التجميع، كثيف المسام ولين، لونه أبيض الأصفر. رؤوسها الزهرية مستديرة الشكل، قطرها نحو ٤ سم. ثقلها لسانات كبيرة مستطيلة صفراء اللون. يستخرج منها صارة تقيد ضيق التنفس والالتباس الرئوي.

1947V - غُرُوقَة

Ebourgeoisement (F).

Nipping of buds, D-budding (E).

تقليم أو إزالة للفراخ والإبرام العرضية الزائفة.

1947V - غُرُوقَة هو البرعم، اطيه.

1947V - غُرُوقَة، جيرانيوم

Geranium (S). Géranium, Gérânier, Bec de cigogne (F). Geranium, Shepherd's needle, Crane's bill (E). Storchschnabel, Geranium (D). Geranio, Becco di cigogna, Becco di gru (I).

جنس نباتات عشية عطرة من فصيلة الغرنوقيات. أنواعها عديدة منها البرية والعلوية والزراعية التزيينية. أزهارها غشقة التجسيم والألوان لها الأبيض والوردي والأصفر والبني. تحملها تشبه سننار الفروق أو الرحو. اعرف، أنواعها وأشهرها ما يلي



غرناقية خلية

1948V - غُرُوقَة أرمينية، جيرانيوم أرميني

Geranium armenum (S). Géranium d'Arménie (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية معمرة منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها زهاء الحاء، فروصها زهرية. أرواقها خالصة الأقسام، فصصية متبادلة مسننة الحافة. أزهارها كبيرة القد، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيضاء الشكل، جزوية اللون، بنفسجية اللون، سود البقعة الوسطى إلى أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.



غرناق الجدار

1948V - غُرُوقَة أسمر، جيرانيوم أسمر

Geranium phaeum (S). Géranium brun (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية معمرة منتصبه. ساقها تلو نوع من أرواقها خالصة أو سباعية الأقسام السنانية الشكل، المسننة الأطراف. تسلفها شديد الخشاش. يملو بتقيج اسمر. أزهارها جزوية اللون أو بنفسجية. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

1948V - غُرُوقَة الجندكول، جيرانيوم

Geranium rivulare (S).

Géranium des ruisseaux (E).

نوع من الغرنوق وهو عشية معمرة منتصبه رطب في الأريّة الرملية. ساقها تلو نحو ٤٠ سم. أرواقها سباعية الأقسام المتعاقبة للتفصيص والتشريح. تسلفها خلل البشرة، بجري اللون. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.



غرناق الروابي

1948V - غُرُوقَة الروابي، جيرانيوم حصتي

Geranium collinum (S). Géranium des collines (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية طيبة برية معمرة تملو نحو ٧٠ سم. أرواقها خالصة الأقسام، تسلفها خلل البشرة، يلمت الخشاش. أزهارها مهدبة البتلات لها إلى الأبيض والبني بنفسجي اللون. أزهارها يستمر طوال شهر أيار.

عقبة أبيض القلقن || طباقه وعاداته لا تختلف من طابع وعادات الغرب الاصم إلا أنه أثبت طيرانا وأطول شيئا. وهو صياح، هم، قدر || يثنى وكته في الإذلال ويل الانحمار التمسقة الانقراض. وكته يرتكز على مدافنتي متصانين وهو كالصاج قمتيرا. حياكه قمتيرا دقيقة متداخلة يملوها ثش نام. أثناء تحضن وسدحا ثلاث يضايت بيتا الذكر يثنى لما الغداء.

Corbeau (F).

جنس طير من الغربان يدعى غرباب، اطيه.

1947V - غُرُوقَة، غُرُوقَة، غُرُوقَة

Balaerica (S). Balaerique (F).

جنس طير من الكراكي، موطنها البلاد الافريقية. أنثيا جميلة الألوان الزاهية التزيينية. رؤوسها خلية الريش الاسود المنتصب. تيجانها القنينة ذنية اللون. اعناقها وساقها طويلة. مناتيرها غرنوية الشكل ذلقة. اجنسها مستطيلة متفرجة الزوايا. اذناها قصيرة مقعطة. ارباعها دقيقة صردية || تألف صفات الانهر والبسيرات والاسراج المبعثرة الانحمار. قوتها الحبيب والبار والبرام والحشرات || تدن في افاصيص تحضرها في البرية. انثيا لها حشختان في السن وفي كل حصة يهستان || ولذا الجلس نوصان لا غير الفرقان الطائوسي والفرقان الجادي.

1947V - غُرُوقَة طائوسي، غُرُوقَة طائوسي

Balaerica pavonina (S). Balaerique pavonine, Grupeau, Oiseau trompette (F).

طائر من الفرقان موطنه يمتد من جبال افريقية الوسطى إلى خطوط المتوسط وجزر الباليار || طول نحو ١٠٠ سم. تاج قلته ذهبي اللون مستطيل الريش الجليطي الخرزوني. عسراه وقلته إلى الحرة البانجانية. ثوبه إلى الرنبة، يمتن ويسمر عنه. القنطرة ويدير عنه البطن. جناحه ملحمة بالايض والاسود، مقنطرة وساقه سود.

1947V - غُرُوقَة عادي، غُرُوقَة عادي

Balaerica regelorum (S). Balaerique commune (F).

طائر من الفرقان اصطناعه فسيحة الاجزاء تمتد من افريقية الشرقية إلى الجنوبية. طول نحو ١٠٠ سم. تاج قلته اصفر اللون، ملتح الملوخ، قصير الريش الشهي الجلس. عسراه وقلته إلى الحرة القرمزية. مقنطرة وساقه إلى البصرة. ثوبه إلى الرنبة الرصاصية. جناحه يبيض القوادم، ذلقة اسود.

1947V - غُرُوقَة طيبة، غُرُوقَة طيبة

Grindella (S).

Grindella, Chrysophthalme (F). Grindella (E).

جنس نباتات برية طيبة وزراعية تزيينية من الاسطربية وفضيلة المركبات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منها الاعشاب الحولية والجنات المعمرة جميعها امريكية المنشأ || أرواقها متعاقبة. أزهارها رؤوسية صفراء اللون قريبة القبة بازهار دوار الشمس || اشهر أنواعها وأعرقها التفرندلية الضليلة.

1947V - غُرُوقَة خلية، غُرُوقَة خلية

Grindella robusta (S). Grindella robusta (F).

نوع من الغرنوقية البرية اللبية المعمرة. مهدبة جنس اصطناع امريكية الثالاية انحصا كلفونية والتكسبان والمكسبان. تثبت طويلا في المناطق الباردة || جنيتها

١٩٨١ - غرثوق عطر * ، جيرانيوم عطر ،
إبرة الراعي

Geranium Robertianum (S). Herbe à Robert, Aiguille, Géraniun de Robert (F). Adder's tongue, Herb Robert, Fox geranium (E). Ruprechtstorchschnabel, Robertskraut (D). Geranio Robertino Erba Roberta (I).

نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة برية طيبة طالحة الاستعمال تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مستطبة السلاحيات. اوراقها خاسية أو سباعية الاقسام. ازهارها لاطيحية الانتظام فيها الفردية والثنائية والثلاثية التجميع. لونها الالباض الاخير يملو توشيح ليكي || ازهارها اوراقها عطر يقال انها لا تخلو من بعض الخواص الطبية النافعة.

١٩٨١١ - غرثوق لفي * ، جيرانيوم لفي

Geranium argenteum (S). Géraniun argenté (F). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة مستطبة. ساقها مشدنة تملو من ٧ إلى ١٢ سم. اوراقها خاسية أو سباعية الاقسام الثلاثية التجميع. نصلها خلي البشرة ، ففي المروج ، ازهارها فردية التجميع ، غرطية البتلات الوردية اللون. ازهارها يشمر من حمز الى آب.

١٩٨١٢ - غرثوق كبير الزهر ، جيرانيوم كبير الزهر

Geranium grandiflorum (S). Géraniun à grandes fleurs (F). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة تحيلة انسك متدلية الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. اوراقها مستطبة للمالحق اللدنية الماء ، نصلها خلي البشرة ، بحري اللون ، خاسي الاقسام اللاطيحية التجميع. ازهارها كبيرة القد ، متعادلة الفصل وبتلات. لونها الالبيكي الوردى المروج. ازهارها يشمر من حمز الى حموز.

١٩٨١٣ - غرثوق ملتطح * ، جيرانيوم ملتطح

Geranium maculatum (S). Géraniun maculé (F). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة مستطبة. ساقها مضطمة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها ثلاثية او خاسية الاقسام المسنة نصلها قليل الحسل ، شديد الحفرة. ازهارها منبطة البتلات المستعرضة ، قطرها براوح بين ٣ و ٤ سم. لونها الالبيكي الباهت || ازهارها يشمر من نيسان الى حموز.

١٩٨١٤ - غرثوقيات

Geraniaceae (S). *Geraniaceae* (F). *Geraniaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة. موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية. قوتها الحشرات حل اغتلات انوعها وراكها وبعض الحار المعنية البرية || اجسامها ريمة تطلي من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكبر اذنانها المقطوعة الطرف. اجنسها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة اللب. مثاقيعها شلبية ، مشرودة الاطراف. اثريها متباينة الالوان كثر والتجميع.

١٩٨١٥ - غرنيس *

Agriornis (S). *Agriornis* (F). *Agriornis* (E). جنس طير من الجاثم مشروبات الناقير وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة. موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية. قوتها الحشرات حل اغتلات انوعها وراكها وبعض الحار المعنية البرية || اجسامها ريمة تطلي من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكبر اذنانها المقطوعة الطرف. اجنسها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة اللب. مثاقيعها شلبية ، مشرودة الاطراف. اثريها متباينة الالوان كثر

١٩٨١٤ - غرثوق البرميل * ، جيرانيوم يمسكي
إبرة الراعي

Geranium columbinum (S). *Geranium columbin*. Pied de pigeon (F). Long stalked crane's bill, Pigeon's foot crane's bill (E). Stalstorchschnabel (D). Becco di piccione, Geranio colombino (I).

نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة برية طيبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فراء ، دقيقة ، مستطبة السلاحيات. اوراقها خاسية أو سباعية الاقسام البقيقة ، السنة الحافة ، المنطرية الارتكاز. نصلها حاقن الحصار ، نام الحسل القصير. ازهارها فردية او ثنائية التجميع. وردية اللون ليكي المروج || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية وقد تقيد الصدر.

١٩٨١٥ - غرثوق المروج * ، جيرانيوم مروجي

Geranium pratense (S). Géraniun des prés (F). نوع من الفرنق وهو عشبة برية وردية معمرة. ساقها مستطبة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها ستائسية الاقسام اللاطيحية المد. نصلها خلي البشرة حاقن الحصار البصري. ازهارها مستعرضة البتلات الكبيرة لون الالزر الارجواني التوشيح || ازهارها يشمر من حمز الى ايلول.

١٩٨١٦ - غرثوق دموي ، جيرانيوم دموي

Geranium sanguineum (S). *Geranium sanguin* (F). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة متصبية تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها بزمها طيبة الحاء. اوراقها سباعية الاقسام ، ثلاثية او خاسية للتشريح المستطيل. ازهارها فردية ، دقيقة الامن ، حسكية الفصل ، قلبية البتلات الحمر || ازهارها يشمر من حمز الى ايلول.

١٩٨١٧ - غرثوق رسادي ، جيرانيوم رسادي

Geranium cinereum (S). Géraniun cendré (F). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة مستطبة. ساقها مشدنة تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها خاسية أو سباعية الاقسام الثلاثية القصوص. نصلها بحري اللون ، راند الزهب. ازهارها ثنائية التجميع ، بيضيه البتلات الحمر || ازهارها يشمر من حمز الى آب.

١٩٨١٨ - غرثوق شقاري الورق * ، غرثوق شقاري

Geranium anemonifolium, *G. tuberosum* (S). *Géraniun à feuilles d'anémone*, *G. tubéreux* (E). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة صفولية الاربوية. ساقها تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها خاسية الاقسام تشبه اوراق الشقار. نصلها مالى البشرة مابن الحصار. ازهارها ثنائية التجميع ، مستطبة للمالحق الحليلة الماء. بتلاتها كبيرة لقد حراء اللون.

١٩٨١٩ - غرثوق عريض البتلات ، جيرانيوم عريض البتلات

Geranium platycarpum, *G. ibericum* (S). *Géraniun à larges pétales*, *G. d'ibérie* (F). نوع من الفرنق وهو عشبة معمرة متصبية تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. ساقها بزمها زباد الحاء. اوراقها خاسية أو سباعية الاقسام الاطليحية الشكل ، المنطرية الحافة. نصلها خلي البشرة ، بحري اللون. ازهارها صفولية التجميع. بتلاتها مستعرضة ، مشرودة الاطراف ، زرقاء اللون او بنسجية || ازهارها يشمر من ايار الى آب.



غرثوق البرميل



غرثوق المروج



غرثوق شقاري الورق



غرثوق عطر



غرثوق نفي



عُشْبِيَّة



عُشْبِيَّة الارضِي شوكِي



عُشْبِيَّة الدُّوْل



عُشْبِيَّة الجَنْبِل



عُشْبِيَّة الحَصِيد



عُشْبِيَّة الدُّرَّة الصَّغِيرَة



عُشْبِيَّة السَّمُور

19859 - عُشْبِيَّة الجَنْبِل *
Hypana rostralis (S).
Noctuelle du houblon, Toupet (F).
فراشة صغيرة لثدي طولها نحو ١٢ سم. ثوبها إلى الصهبة
الضبابية الغامقة الملبس. رواشتها مدهية الخواش الغامقي.
لها جيلان في الحول. ريقها تطول نحو ٢٢ سم. ثوبها إلى
الخضرة يميلوها تسليج اسمر. وأنها اسود || تركيب
الجنبيل فؤاديه لثدي الأني.

19860 - عُشْبِيَّة الحَصِيد *
Agrotis sagetum,
قَرَاكُشَةُ الحَصِيد
Euxoa sagetum (S). Noctuelle des molsens (F).
Turnip dart moth (E). Wintersteale (D).
فراشة كبيرة لثدي عمراء اللون مهدية الرواشن طولها نحو ٢
سم. ويصلها ٤ سم. رواشتها الاماميان إلى الصغار الخلفي
أما الخلفيان فالأبيض البياض يتخلله عروق عابقة.
جلبها يستمر نحو الستين. تمتح مكها ابتداء من اوتائل
الربيع ينفتح بعد اسبوعين || ريقها تطول نحو ٥ سم.
وهي شبيهة اللون يميلوها مواج زيتوني وضمان اصفران قاطبان
يتخللها في كل فصل من مفصلها أربع نقط سود.
تركب القمح والسلق والقرن والنباتات المروية والبطاطا
والشندر والكمرة والتبغ والمكثف والجبل القمح ...

19861 - عُشْبِيَّة الدُّرَّة الصَّغِيرَة *
الدُّرَّة الصَّغِيرَة ، دُرَّة الدُّرَّة

Noctua Zeae, Leucanum Zeae (S). Noctuelle du
maïs (F).
فراشة متوسطة لثدي ثوبها إلى الصهبة الوردي الملبس. ألتها
أكبر قدماً وأصغر ثوباً من ذكورها. لها جيلان في السنة.
تظهر في حزيران وفي آب || ريقها عمراء اللون وردية
المواج تطول نحو ٤ سم. تألف الموضع الربطة. تركيب الدرة
وسائر التنبيلات الملقية.

19862 - عُشْبِيَّة السَّكَّت
Noctuelle du seigle (F).
حشرة تدمي حبة الشيلم ، ألتها.

19863 - عُشْبِيَّة السَّمُور *
Panolla piniperda,
P. flammea (S). Noctuelle du pin (F).
فراشة من النسيقات صغيرة لثدي. ثوبها إلى الصرة الخاضعة،
تجيبها وزراكتها الروشنية جيلة الشكل والانتظام.
ريقها غصراء اللون غططها بالأبيض تركيب السَّمُور من
حزيران إلى تموز فلتهم لورولة.

19864 - عُشْبِيَّة النَّصَب
Sésamie (F).
هي النسيقات ، ألتها.

19865 - عُشْبِيَّة النَّصَب *
قَرَاكُشَةُ الحَنْطَلَة

Agrotis tritici, Euxoa tritici (S). Noctuelle du blé
(F). White-line dart moth (E).
فراشة من النسيقات صغيرة لثدي ثوبها إلى اليريدة رواشتها
الاماميان مبقان بالاسمر. جلبها يستمر نحو الستين.
تمتج مكها خلال شهر حزيران ينفتح بعد اسبوعين.
ريقها كبيرة لثدي تطول نحو ٥ سم. ثوبها إلى الصهبة
الخضراء يميلوها مواج أبيض وضمان اصفران يتخللها في
كل فصل من مفصل جسمها أربع نقط سود || تركيب
الحنطة والشيلم والقرن وتختلف النباتات التنبيلية المروية
والمكثف والكمرة.

19866 - عُشْبِيَّات *
Gastrochaenidae (S).
Gastrochaenidae (F). *Gastrochaenidae* (E).
فصيلة حشرات بحرية من الرمويات صليحيات المالحات .
اجناسها وانواعها الممارسة عديدة ، منتشرة في جميع بحار
العالم . أما الغالبة في منتصحات الحديقة المائية ||
اشهر اجناسها المستقاة والرائحة والفتسلة .

19867 - عُشْبِيَّة *
Glycyphila (S).
Glycyphila (F).
جنس طير من الجولام ريقات المتانير فصيلة المتريات .
انواعه المعروفة ١٢ موطها تمتد من جزر الزاب إلى
أستراليا . مدجها الحياتي جامي . قوتها الحشرات الصغيرة
والذباب والحمام وحبس الاضرار || اجناسها صغيرة تطول
من ١٢ إلى ١٥ سم. مناقيرها مقوية . اجناسها تلحف
الافلاك . ألتها غليظة ، طويلة ، مقلوبة الاطراف .
ألتها ملونة جيلة الحجاب الزاهي || لثدي في الاشجار
المعتلة الانفاخ . تحسن مرقان في الحول وفي كل مرة
من ٤ إلى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً
تقوم به الاثني بمناوبة الذكر .

19868 - عُشْبِيَّة
Crépusculaire (F).
Crepuscular (E).
لتمت تعريفه يطلق على كل ما هو مخصص بالقمح .

19869 - عُشْبِيَّات ، نَبَاتِيَّات
Noctuidae, Agrotidae (S). *Noctuidae, Agroti-
dae* (F). *Noctuidae, Agrotidae, Ouleth moths,
Cutworms* (E). *Eulen* (D).
فصيلة حشرات من غططت القرنون وروية حوشفات
الاجنحة . انواعها زهاء ٢٠٠٠٠ مظهرها دجوي وبعضها
يسرح في الليل . اجناسها متوسطة لثدي . قوتها
الاستعمارية مقلوبة الشكل او غليظة || ريقها مالة
البشرة داكنة الاكوان . خادراتها تقم في التربة تلتحف
بجلباب من اللبن .

19870 - عُشْبِيَّة ، نَبَاتِيَّة
Noctuelle (F).
Noctua (E)
اسم شامل يطلق على عدة حشرات افراشة من فصيلة
النسيقات || اشهر النسيقات ما يتبع :

19871 - عُشْبِيَّة الارضِي شوكِي *
Gortyna ochracea (S). Noctuelle de l'aristach (F).
فراشة صغيرة لثدي تطول نحو ٢ سم. ثوبها إلى الصفرة
الذهبية . رواشتها مهدية الاطراف يميلوها زراكتي
وتجاذب متباينة الاوان || ريقها غصراء اللون، سوداء
الرأس تطول نحو ٤ سم. تركيب الارضي شوكي والبطاطا
قلم السورق وتقصي عليها .

19872 - عُشْبِيَّة البَقْل *
Hadena oleraceae,
Polia oleraceae (S). Noctuelle potagère (F). *Bright-
line brown-eye* (E). *Gamüsselle, Salataude* (D).
فراشة صغيرة لثدي طولها القرب مدجبة الرواشن بالخلفي
والاسمر . تظهر من حزيران إلى تموز . تمتج مكها على
لصل الاوراق دون تميز بين الصفحة العليا او السفلى .
ينفتح المكان بعد عشرة ايام من ريقات دقيقة عمراء اللون
تتطور بسرعة من السلاخ إلى السلاخ حتى يبلغ طولها
نحو ٥ سم . ويستمر ثوبها إلى السنة الخضراء الزرقية
المواج || وهي في جميع الموراد البرقية لا تنقطع عن ألتها
اوراق البقول على اختلاف انواعها وضمانها.

الاقليمي الترتيب || ايجالها الحولية ثلاثة تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها غيرة اللون تطول من ٢٢ الى ٢٧ م. تركب البطاطا والجذر والملفوف والكرمة .

١٩٨٧٤ - عشية ملوكة

Noctuelle colorée (F).
حشرة تدمي زبيلة دقيقة ، اطليها .

١٩٨٧٥ - **عسل**
Pédiluve (F).
القتل او شل القوائم عمل قفره الطبية الليطيرة ، قواه شل قوائم الحويان بفض الحاصل الملهوة لاتقاء الحصى القلاعية ويغيرها من الامراض .

١٩٨٧٦ - **فستج**

نبات مثل القنفاء . ترتفع قدر الشبر . لها ورقة لزجة وزهرة كزهره المرو الجبلي (السان) .

١٩٨٧٧ - **فستكة * غلاديشيا**

Gleditsia (S). Févier, Carouge à miel (F). Three thorned acacia (E). Gleditschbaum (D). Gledizia (I). جنس اشجار برية ويزينية من فصيلة القرنيثات القراقية ، اوراقها المشرفة حسة جميعها ثائكة . سوكها متصبية . اوراقها متناحية ، مركبة ، ريشية . ازهارها عمودية الايتكاز . ثمارها قرنية خرونية خشيشة لا تخلو من السكر . يستخرج منها بحد التضمير والتغير قندي كسول لا بأس فيه || اعرف انواع السنو واشهرها ما يلي .

١٩٨٧٨ - **فستكة المتناقع ، غلاديشيا المتناقع**

Gleditsia aquatica, G. monosperma (S). Févier des marécages (F).
شجرة برية ويزينية ترطب في المستنقعات وسائر الاراضي الرطبة . ساقها تعلو من ٦ الى ١٢ م. شوكها دقيق الجسم ، مقطوع القامة . اوراقها مستطيلة . ورققاتها خشية براوح عددا بين ٢٠ و ٧٨ ، نصلها سناني الشكل مالم البشرة || قرنها بيضيه مبطلة تطول نحو ٤ سم . وتقرض ٢ سم . وهي وصيدة البزرة مدعمة الباب السكري . ازهارها يستمر من ايار الى سزيان .

١٩٨٧٩ - **فستكة اليابانية ، غلاديشيا يابانية**

Gleditsia japonica, G. horrida (S). Févier du Japon (F).
شجرة سبروتية تعلو من ٨ الى ٢٠ م. اشراكها متشعبة تطول من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها مستطيلة . ورققاتها تدم من ١٦ الى ٢٠ نصلها اطليحي الشكل ، مقطوع القامة ، مالم البشرة بطول نحو ٥ سم . ويقرض نحو ٢ . قرنها كبيرة القند متبوعة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وتقرض نحو ٦ سم . لبها غزير الماددة السكرية || ازهارها يستمر من سزيان الى تموز .

١٩٨٨٠ - **فستكة ثلاثية الشوك ، غلاديشيا ثلاثية الشوك**

Gleditsia tricantha (S).
Févier à trois épines (F).
شجرة سبروتية برية ويزينية تعلو من ١٠ الى ٤٠ م. ساقها متصبية . اشواكها ثلاثية التركيب سادة الحمة . اوراقها تطول من ١٤ الى ٢٠ سم . وقص من ١٦ الى ٢٤ وريفة نصلها مالم الصقمة عزز اخطار || قرنها صعبه الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . لبها غزير الماددة السكرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٨٦٦ - **فستكة الكلاء ، ثليكة الكلاء**

Neuronis popularis, Eptneuronis popularis, Helio-phobus popularis (S). Noctuelle des fourrages (F).
فراشة صغيرة القند حطية اللون . وروشنا الاماميان الى السرة تمرنها عروق يعض . وروشنا الخليان الى التبره المنطية يحويها حمار مهدب الاطراف . مسرحها جبري يستمر من تموز الى ايلول . الاثني تمتج مكنا على سوق واوراق الاصاب البرية فينقت من رقات دقيقة سرية التطور يبلغ طولها نحو ٤٥ م. في اقل من شهر . ثوبا الى السرة يميلوا من كلي جانبيها ثلاثة خطوط فاحلة صفراء اللون || تخفي في النهار تحت الحماجة وتسرع في الليل قوتها اوراق الاحشاب النجيلية ان برية او مروجية وانحسا الذرة .

١٩٨٦٧ - **فستكة الملفوف * ثليكة الكرنب دودة القتب**

Barathra brassicae, Mamestra brassicae (S). Noctuelle du chou, Brassicaria, Ver du coudr (F). Cabbage moth (E). Kohleule (D).
فراشة صغيرة القند حطية اللون . وروشنا متناخلة الاثاني مبقية ويزركشة . لها جيلات في الحولة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القند تطول من ١٦ الى ١٨ م. تميش على اوراق الملفوف والنس والذرة والبقع وقد تقرض سوق شتول الملفوف نصليا وتقصم اوراق التبع فتشوها .

١٩٨٦٨ - **فستكة حلكاء**

Noctuelle bois (F).
حشرة تدمي اخروفس احلس ، اطليها .

١٩٨٦٩ - **فستكة رمداء**
Acronycta rumicida (S).
Noctuelle cendrée, Cendrée (F). Dark knot-grass moth (E). Ampferseule (D).
فراشة صغيرة القند رمداء الثوب مبقية بالابيض . ايجالها الحولية ثلاثة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القند ثوبا الى السرة العالقة ، طولها براوح بين ١٤ و ١٨ م || تركب الجنبيل والملفوف والاشياك .

١٩٨٧٠ - **فستكة زنجية**

Noctuelle basanée (F).
حشرة تدمي اخروفس زنجي ، اطليها .

١٩٨٧١ - **فستكة عجيبة * ثليكة عجيبة**

Agrocia exclamatoria, Feltia exclamatoria (S). Noctuelle point d'exclamation, N. double tache, Double tache (F). Heart and dart moth (E). Kreuzkrautzackereule, Ausrufungszeichen (D).
فراشة صغيرة القند حطية اللون وروشنا الاماميان الى الشقار الصاني يملوها تبقيع ثنائي الشكل . ايجالها الحولية اربعة اوجسة || يرتبها كدواء اللون تطول من ١٦ الى ١٩ م. تركب القمح والبست والشعير والذرة ويختطف النجيليات المروجية والشندور والبطاطا والملفوف واللفت والكرمة والبقع .

١٩٨٧٢ - **فستكة قلوقة**

Noctuelle ypsilon
هي فراشة البودة القارضة ، اطليها .

١٩٨٧٣ - **فستكة مصاحبة**

Tryphaena prouba (S). Noctuelle proubae, Flancée (F). Common yellow underwing moth (E). Heumittzerchen (D).
فراشة صغيرة القند ، سمراء اللون ، فضية التبقيع اللقيق



عشية القصب



عشية الملفوف



عشية عجيبة



عشية مصاحبة



عشوة

١٩٨٩٩ - عُصَاكِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hyménoptères symphytes (F). Hymenoptera symphytes (E).

رتبة حشرات من طبقة عُصَاكِيَّاتِ الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ٨٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأقسام تراوح بين ٣ و ٤٠ م . جميعها كاملة التطور ، رباعية الأجنحة الثلاثية . عادمة الانفصال الحسري ، بطولها لائحة بحولائها . أعضائها قارضة أو لائحة . ممرات أنثى سبعة كالنفاثات تحترق أصلب الماء وهي تستعملها في الحفر والحز والروث أو أشهر فصائلها : العلبات والخطاريات والنظريبات .

١٩٩٠٠ - عُصَاكِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ الْمُحْصَرَّةِ

Hyménoptères spocrites (F). Hymenoptera spocrites (E).

رتبة حشرات من طبقة عشائيات الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ١٢٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأقسام والألوان . جميعها كاملة التطور . مصورها دقيقة واضحة منها الابنوبية الشكل والوردية . أجنحتها عشائية رباعية . أعضائها قارضة أو لائحة . أشر أنثى سبعة كالنفاثات تستعمل الحفر والحز والروث || فصائلها كثيرة العدد ، أشهرها الأبريات والذخريبات والدلتيكات والذخريبات والنطليات والنطليات والصفريات والنطليات .

١٩٩٠١ - عُصْمِيرِيَّةٌ

Hyperparasite (F).

كل كائن مقلد يمشي على مقلد آخر .

١٩٩٠٢ - عُصْمُوكَةٌ

ثمرة السدر . ج . شمر .

١٩٩٠٣ - عُصْبٌ

هو الاختصاب ، أطلبه .

١٩٩٠٤ - عُصْفَصٌ

Gallinosa (S).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . أنواعها عديدة : جميعها برية . أوراقها متقابلة ، ناعما حادة أو زبابة . أزهارها حامية الإبتكاز ، حديدية الألوان التي تختلف باختلاف الأنواع . وهو جميع أنواعها من النباتات المرصوفة لكنه يعتبر من الاشباه القليلة التي تستوفى الثروة وكثيرة الأزودع والزيادات .

١٩٩٠٥ - عُصْفَنٌ ، تَعَصْفَنٌ

Ebranchage (F).

Pruning, Lopping, Trimming (E).

هو اقتلاع الأغصان وقد يكون السبب حث الشجرة على الارتفاع أو تغيير هيكلها أو تجديد شبابها .

١٩٩٠٦ - عُصْفَنٌ

Branche (F). Branch, Bough (E).

الفنص هو الفرع على الساق غلط أو دق .

١٩٩٠٧ - عُصْفَنٌ تَصْرِيٌّ

Branche frutière (F).

عصن يكون عادة أدق من الأغصان المألوفة الأخرى يحمل الثمر مباشرة .

١٩٩٠٨ - عُصْفَنَةٌ ، عُصْفَنٌ

Ramille (F). Twig (E).

العصنة والعصن هو ما استق من الأغصان بلغ الحول أو لم يبلغه .

١٩٨٨١ - عُصُولٌ

هو إثنان ابوساق ، أطلبه .

١٩٨٨٢ - عُصُولِيٌّ

نبت من السبخ (المان) .

١٩٨٨٣ - عُصِيٌّ

Falsification, Fraude (F).

Falsification, Fraud (E).

خدع الشاري بتبديل ماعية المشتري أو تبديل صفاته . وفي القانون المدني هو الخداع المقرون بسوء نية للاضرار بالغير ككشف البادار والاسمعة والأدوية الخ ...

١٩٨٨٤ - عُصِيَاءٌ ، عُصِيَاءٌ

Tégument, Membrane (F). Membrane, Tégument (E).

ما يغطي أو يلف جسم الحيوان والنبات كالجلك والوبر والریش وأغشاف والماء .

١٩٨٨٥ - عُصِيَاءٌ جَرْئِيٌّ ، عُصِيَاءٌ رَحْمِيٌّ

Membrane germinale (S). Germinal membrane (E).

١٩٨٨٦ - عُصِيَاءٌ خَلَوِيٌّ

Membrane cellulaire (F). Cell membrane (E).

١٩٨٨٧ - عُصِيَاءٌ مَسْتَحِيٌّ ، عُصِيَاءٌ نُحْرَوِيٌّ

Membrane alvéolaire (F). Alveolar membrane (E).

١٩٨٨٨ - عُصِيَاءٌ عُصْلِيٌّ

Myolème, Sarcolemme (F).

كل غشاء يلف العضلات الرئيسية .

١٩٨٨٩ - عُصِيَاءٌ عُصْلِيٌّ

Membrane criblée (F).

Sieve membrane (E).

١٩٨٩٠ - عُصِيَاءٌ عُصْلِيٌّ

Membrane recouvrante, M. tectoriale (F). Tectorial membrane (E).

١٩٨٩١ - عُصِيَاءٌ قَاصِلٌ

Membrane limitative (F).

Limiting membrane (E).

١٩٨٩٢ - عُصِيَاءٌ مُعَاطِيٌّ

Muqueuse, Membrane muqueuse (F). Mucosa, Mucous (E).

سادة غاطية تلتف بغش أجزاء أعضاء الجسم الحيواني .

١٩٨٩٣ - عُصِيَاءٌ مُصْلِيٌّ

Membrane séreuse (F).

Serous membrane (E).

١٩٨٩٤ - عُصِيَاءٌ نَاقِصٌ

Membrane caduque (F).

Deciduous membrane, Decidua (E).

١٩٨٩٥ - عُصِيَاءٌ نُوَوِيٌّ

Membrane nucléaire (F).

Nuclear membrane (E).

١٩٨٩٦ - عُصِيَالِيٌّ

Membraneux (F).

Membranous (E).

١٩٨٩٧ - عُصَاكِيَّاتٌ ، فَطُورٌ عُصَاكِيَّةٌ

Hyménomycètes (F). Hymenomycetes (E).

مجسومة من الفطور العفصية من ذوات اللقعة البورية .

١٩٨٩٨ - عُصَاكِيَّاتُ الْجَنَاحِ

Hyménoptéroïdes (F). Hymenopteroides (E).

طبقة حشرات من شعبة الحسدليات وطائفة أجنحة أصلا . تشمل كل من رتبتي عشائية الأجنحة وعشائية الأجنحة المحصورة . أما أنواعها فنحو ٢٠٠٠٠٠ تنجم في ٩٦ فصيلة .

ظهور اليوم باستعمال سائل يورود الحلق من ١ إلى ١,٥ %

١٩٩١٥ - عُصَابَة
Tamaris de Syrie (F).
هو الأثل السوري شجرته تملو نحو عشرة أمتار اعتشاهما صلبة مغروبة فيها . ج. خضرا .

١٩٩١٦ - عُصَابَة ، دَلْعَان (F).
Glaise, Argile verte (F).
تراب حصالي لا يلبس حر شديد الانساج والصلابة لونه إلى الأخضر الداكن . يستعمل في صناعة الفخار والحلج .

١٩٩١٧ - عُصَابَة *
Paragénézie (F).
Paragenes (E).
النفطية تهجين تكون فيه المحجن حقيرة ان تصالبت فيها بينها وتكون ثلثة أو ثمانية لا تصالبت مع كل من أوروبا .

١٩٩١٨ - عُصَابَة
Pléthore (F). Plethora (E).
النفطية حي فرط النمو في النبات .

١٩٩١٩ - عُصَابِي ، دَلْعَانِي
Glaiseux (F).
Clayey, Loamy (E).
الذي يحتوي على النفط أو الذي يشبه النفط أو الدلغان .

١٩٩٢٠ - عُصَابِي
نوع من الجراد ويسمى الجراد المبارك (السان) .

١٩٩٢١ - عُصَابَان
Avortement (F). Abortion (E).
هو إلقاء الأتني الحامل ولدها لغير تمام .

١٩٩٢٢ - عُصَابَة *
Tunica (S). Tunique (F).
حشية برية معمرة من فصيلة القرنفلانيات . ساقها دقيقة فروعها تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم . أوراقها جذعية الانتشاج .

١٩٩٢٣ - عُصَابَة
فصيلة من نباتات ما كانت أخصان وفائدة أكثر من الدانيون .

١٩٩٢٤ - عُصَابَة *
Polyclade (F).
Polycladous (E).
الفصين من نباتات ما كانت أخصان وفائدة أكثر من الدانيون .

١٩٩٢٥ - عُصَابَة *
Entomosporium (S). Entomosporiose (F).
جنس تطور مجهرية من فصيلة المذكوكت . يكتنفاته مغلفة ، سواد اللون ، فريجة الانفلاق . جولا تحيل الحلقة ، غليظ القاعدة . ثغراته سبية لاسقة ، بويذاته ثنائية الخلية . أشهر أنواعه القشاة اللاتخ .

١٩٩٢٦ - عُصَابَة
Pelouse (F).
Lawn, Greensward (E).
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٢٧ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٢٨ - عُصَابَة
النفرة لبث دقيق الورق الأخضر يفرش الأرض .

١٩٩٢٩ - عُصَابَة
Silicate d'alumine (F).
Silicate of alumina (E).
مركب طبيعي يحوي بعض الألويمين . للظفار كثيرة العدد لا يبالغ لذكرا جميعها إنما تختص منها الفلمسية والميكافا والنفار والكولان .

١٩٩٣٠ - عُصَابَة
Cartilage (F).
Cartilage, Gristle (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يضاء اللون تكثر غمامة عند الحركات العظام .

١٩٩٣١ - عُصَابَة
Cartilage des os (F).
Bone cartilage (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاعة يضاء اللون تكثر غمامة عند الحركات العظام .

١٩٩٣٢ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٣٣ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٣٤ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٣٥ - عُصَابَة
Tyrannus Intrepidus (S).
Tyrannus Intrepide, Pipiri (F). Tyrant, King-bird (E).
طائر من القوط من فصيلة الطيوريات . موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية يرسل منها إلى أمريكا الشمالية في أواسط آذار ويصل إليها في أواسط أيلول . يأت غشاق البعيريات ويحاري الماء ويقترّب من الجنائن والحدائق والبساتين . جسمه متوسط القد يعلو نحو ٢٠ سم . ثوبه متباين الألوان المتخالفة . رأسه وظهوره إلى الأزرق الزرقاء المزاج . ذرو صقلا إلى البياض الناطع . صدره وبطنه إلى الأزرق الشبهاء . ويعلو في كل من صفه شريط يرتقي إلى عتد من قاعدة الحنق إلى الفلق . جناحه وذنبه إلى الأزرق السواد المزاج . ذنبه مستدير الطرف .

١٩٩٣٦ - عُصَابَة
فصيلة طير من الجوارم نباتات المتأثير . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الأمريكية

١٩٩٣٧ - عُصَابَة
أجناسها أمريكا الجنوبية . أجناسها متوسطة القد . متغايرة بطول رؤوسها . أجناسها ذلقة . أذنانها قصيرة متباينة الأشكال . أجناسها دقيقة متحدة اللون . أجناسها ملونة زاهية الخصب . قوتها الحشرات تصل اختلاف فصائلها . أعرف أنواعها وأشهرها العصبوب الجسور .

١٩٩٣٨ - عُصَابَة
Polyclade (F).
Polycladous (E).
الفصين من نباتات ما كانت أخصان وفائدة أكثر من الدانيون .

١٩٩٣٩ - عُصَابَة *
Entomosporium (S). Entomosporiose (F).
جنس تطور مجهرية من فصيلة المذكوكت . يكتنفاته مغلفة ، سواد اللون ، فريجة الانفلاق . جولا تحيل الحلقة ، غليظ القاعدة . ثغراته سبية لاسقة ، بويذاته ثنائية الخلية . أشهر أنواعه القشاة اللاتخ .

١٩٩٤٠ - عُصَابَة
Entomosporium thuenenii (S). Entomosporiose du dattier (F).
آفة لنتل الكاليرا يقع حل البسر فيمنع الإدراك ويسبب التبيس والتثاق . يكافح عند ظهوره باستعمال سائل يورود الحلق من ٨,٠ إلى ١٠ %

١٩٩٤١ - عُصَابَة
Entomosporium maculatum (S). Entomosporiose maculée (F).
فطر مجهرية يسبب ورق الزعرور والأرونة والشملة والأكيدنيا . وقد يسبب في بعض ظروف خاصة الأخصان والآثار غير المرضية لاسمة الشمس . مظهره الخاربي يقع صغرة مستديرة مبرقة على كامل فصل الأوراق ، تبعو بقية اللون ثم تحرق نحو السرة نصب البشرة والنجس المتحارة وتثل التبادل التنسي . يكافح عند

١٩٩٤٢ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٣ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٤ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٥ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٦ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٧ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٨ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٤٩ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٠ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥١ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٢ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٣ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٤ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٥ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٦ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٧ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٨ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٥٩ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٦٠ - عُصَابَة
كل أرض يشعلها العشب الأخضر إن طويها أو مزودها . ج. خضاري .



عُصُوب جُور



نفساء لاطخ



عُصَابَة

١٩٩٣٩ - غُضُرُوفُ الْبَيْدَاءِ ، جُوتِي الْبَيْدَاءِ

Syrhaptes paradoxus (F). *Syrhaptes paradoxus*,
Poule des stappes (F). Black-bellied (E).

طائر من النصف طول نحو ٢٤ سم. يعيش أستراليا كبيرة
تجوب نيازي آسية الشمالية وإكسلي. قَلْبًا حَلَقِي فِي سَمَاءِ لِبْنَانِ .

١٩٩٤٠ - غُضُرُوفُ الثِّبَتِ * ، جُوتِي الثِّبَتِ

Syrhaptes tibetanus (S). *Syrhaptes du Thibet* (F).

طائر من النصف طول نحو ٢٢ سم ثوبه أل البياض .

أَسْرَابُهُ قَلِيلَةٌ الْعَدَدُ . مَوْلُودُهُ مَرْتَمَعَاتِ الثِّبَتِ وَبِجَاهِهَا .



غُضُرُوفُ الثِّبَتِ

١٩٩٤١ - غُضَيِّفَات

Pteroclididae (S). *Pteroclididae* (E).

فصيلة من الطير من رتبة الدجاجيات تعرف بالبطاريق .

١٩٩٤٢ - غُضُنْ

Tunika (F). *Tunica* (E).

Tunika de l'oeil (F). *Gُضُنْ الْعَيْنِ*

Tunika granuleuse (F). *Gُضُنْ حَبَبِيّ*

Granulosa tunica (E).

Tunika adventice (F). *Gُضُنْ عَكْرَجِي*

Adventice tunica (E).

Tunika fibreuse (F). *Gُضُنْ لِيْلِي*

Fibrosa tunica (E).

Tunika moyenne *Gُضُنْ مُتَرَسِّط*

(des artères) (F). *Media tunica* (E).

Tunika muqueuse (F). *Gُضُنْ مُعَاطِي*

Mucosa tunica (E).

Pli déjeté (F). *Gُضُنْ مُتَعَطِف* ، *Gُضُنْ أَعْوَج*

Asymmetrical fold (E).

Saccolaryx (S). *Gُضُرُوفُ*

Saccolaryx (F). *Gُضُرُوفُ*

جنس غلافيش من عارة اليراسات مولده أمريكا الجنوبية

والقريان . أنواعه قليلة العدد تتميز بشباشة رؤوسها وبضعف

أذنائها للمفصلة || يعيش بجماعات كثيرة العدد . يروح

طوال الليل . قوته الحشرات . يألف الأشجار الحرجية .

لا يتنقح الحمار .

Pli thorique (F). *Pli thorique* (E). *Gُضَيِّف*

الثبات الضيقير ما كانت أعضائه غضة ولوراته غضارة

سائلة زاجية . وهو قَلْبًا زَنْزَرُ وَيَشْرِي .

Sistostrema confusum (S). *Gُضَيِّف*

Sistostrema confusum (F).

فطر من فصيلة السحيات . يوجد في غابات الصنوبر .

يعيش بمجموعات متماسكة على المواد النجالية || سالفه قصيرة

حسية متموجة الفرور قبياء اللون . نكتة لائقة ، معدة

الجوانب لونها أل الصفرة يطولها موجاج اسمر || حبيته

جامدة المكسر . يتغذى اللين ، مرة الملكاك ، لا تتركّل .

١٩٩٣٨ - غُضُرُوفٌ حَلَتِيّ

Cartilage cricoide (F). *Cricoid cartilage* (E).

Cartilage costal (F). *Gُضُرُوفٌ ضَلْعِيّ*

Costal cartilage (E).

Fibrocartilage (F). *Gُضُرُوفٌ لِيْلِيّ*

Fibro-cartilage (E).

Cartilage calcifié (F). *Gُضُرُوفٌ مُتَكَكِّس*

Calcified cartilage (E).

Cartilagineux (F). *Gُضُرُوفِيّ*

Cartilaginous, *Gristly* (E).

ما كالت نسجه غضروفية التركيب .

Chondropterygion (F). *Gُضُرُوفِيَّاتُ الرِّعَافِ*

صف اسماك كبيرة القد كالشم تتميز بمخلفها من الهيكل

العظمي . جاعها وبسالتها الفقارية غضروفية التركيب .

فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد تنتمي أل رتبتي:

السفنجيات وكاملات الرؤوس .

Alzooceae (S). *Gُضُرُوفِيَّات*

Alzooceae (F). *Alzooceae* (E).

فصيلة نباتية من مستحلات القمالات . أجناسها وأنواعها

عديدة ، معظمها بري .

Samyda (S). *Samyda* (F). *فُضَيْس*

جنس نباتات برية من فصيلة الفصسيات . أنواعه المعروفة

قليلة العدد ، أعطانها المناطق الحارة من العالمين القديم

والجديد . جميعها شجيرات ونباتات معتدلة الحجم . أوراقها

أبيدة سنجية النصال . أزهارها طرفية الارتكاز ، بيضاء

اللون أو وردية .

Samydaceae (S). *فُضَيْسِيَّات*

Samydaceae (F). *Samydaceae* (E).

فصيلة نباتية من مستحلات القمالات مرتفعات الميضي .

أعطانها البلاد الحارة . أجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها

أشجار وشجيرات منتصبية السوق . قارضة الاغصان . أوراقها

أبيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المتباينة الاشكال ،

مبشرة الغدد الراتنجية . أزهارها مستحبة العرف عديدة

الالوان ، يكثر فيها الالبيض ثم الوردية ثم الاسفر

والاخضر .

Gland (F). *Gُضُنْ*

قيل لي وصفه : « حجر بالمت كالنخل سواه غير أن نواه

مقشر بغير ماء ومن أسفل أل اعلاه صف اخضر . م .

غضفة .

Syrhaptes (S). *Gُضَيِّف* ، *جُوتِيّ*

جنس طير من فصيلة الغضفيات قريب الشبه من الحمام .

يتميز باستطالة ردة قوائم السقط وريشيتين من الاثنيك .

ثوبه أل القهبة الصفراء تملحها رقة حمراء متفرقة . راسه

أل القهبة السهباء . عينه مكحلة بالجلوة . سالفه مسرولة

سحق الخالب || وهو شديد الطرائق . يطير مسافات شاسعة

في طلب الرزق وألله . يقطن في القياقي . قوته الجيوب واليزور

على اختلافها . يعيش أستراليا كبيرة . شته الفصوص ترسمه

الاثنيك على الأرض قرب دغلة أو حويجة تفيض فيه أربع

بويضات صغيرة مرتقة تحضنها ٢٤ يومًا || له نومان معروفان

غضفة البياض وغضفة الثبث .



غُضَيِّف

Argyronète (F).

١٩٩٦٢ - غُطْرُف

هي النسيبة للمالية، اطلمها .

Podicipidae (S).

١٩٩٦٣ - غُطْرُفِيَّات

Podicipidae (F). Podicipidae (E).

فصيلة طيور مائية من رتبة كفيّات القدم تتميز بأجسامها البيضية الشكل . امتلأها دقيقة مسطيلة ورؤوسها صديرة . أذناها هريانة . أرساغها خفيفة ، أصابعها غليظة اعطافها عريضة مبعدة . ريشها ناعم ، حرري ، مصقول . اجنحتها قصيرة ذلقة ، أذناها مشعرة وطلة . أشهر اجناسها الطاس .

Pterocles senegalensis (S). - غُطْرُط

Pterocle du Sénégal (F). Singed sandgrouse (E). قال المصري : و ضرب من الطاس طير الطهور والبطون والابدان سود بطون الاجنحة طول الاربيل والاعتاق لطاف لا تتجمع ارسابا واكثر ما تكون ثلاثا او اثنين الواحدة غطاطة كذا قاله الجاهلي وقال ابن سيده الغطاط القفا وقيل الطاس ضربان فالقصار الاربيل الصغر الاعتاق السود القوادم الصهب الخوازي هي الكديرة والجلوية والوطول الاربيل البيض البطون الدبر الطهور الرئيسة المبيون هي الطاس . وقيل الغطاط ضرب من الطير ليس من الطاس .

Neotragus pygmaeus (S). - غُطْرُف

Guevi (F). حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الغزلان . موطنه يمتد من ليبريه الى افنديه . يأكل الغابات . ملجته الحياني جاسي || جسمه صغير القد بطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع نحو ٤٥ سم . قوائمه دقيقة . القفائمان الاسودتان اقصر من الخلفيتين . ثوبه الى الشحنة السوداء المروج . صدره وبطنه الى البياض الاخير . قرنا الذكر قصيرا دقيقتان . الاثنى جاء ثنائية الاخلاص || يعتبر من اسرع انواع الغزلان وانفرا .

Vipère tigrée (F). - غُطْرُوب

الطرب حية خبيثة تدعى افسى نمره اطلمها .

Vipère noire (F). - غُطْرُوب اَسْوَد

حية خبيثة تدعى افسى سوداء . اطلمها .

١٩٩٦٨ - غُطْرُف الحَمْصِيَّات

Aleurotrachelus citri (S). Aleurode des citruses (F). ويدهي ذبابة الملاح البيضاء . حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . حوريتها بيضية الشكل عمودية الظهر الاسود . حناصرها كفيف الاهداب الشمعية البياض . تركيب جميع انواع الحَمْصِيَّات تنفذيها لأنها تطال الاوراق بد ان تمس صارتها .

١٩٩٦٩ - غُطْرُف الرِّمَان

Siphonius granati (S). Aleurode des granadiers (F). حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . جسمها اسمر اللون ، افسر للمادة الشمعية . تمتص مكثا على الورد البنات الحَمْصِيَّات فيقتف من حوريات مغلطمة اللون الاسمر ، بيضية الشكل ، كفيفة الاهداب الشمعية البياض || تركيب اوراق وانفان الريان والاجاص والسفرجل .

Plicatula (S).

١٩٩٥٥ - غُصَيَّة

Plicatula (F). Plicatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وقصبة القفاحات . انواعها الماسرة المعروفة قليلة العدد منتشرة من المحيط الهندي الى اطراف المحيط الهادي || اصداها صغيرة الحجم ، مروحية الشكل ، متحفة القدم ، شماعة التخديد . لامناوية المصاريع ، المصراع الانسي محذوب الضفحة قليل التخديد || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة القور .

Ganga 'brûlé (F). - غُصَيَّة

طائر من القفا يعرف بالغطاة المصرية .

Podiceps (S). - غُطْطَاس ، غُطْطَاس

Grèbe (F). Grèbe (E). جنس طيور مائية من فصيلة الغططاسيات . انوله نحو ٣٥ اطلمها العالم . جميعها من القواطع . تربط في المياه العذبة . تتميز باسعالها امتلأها غطاطها جالسة . اجنحتها قصيرة ذلقة . يطي تحيد القدم والقص . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات والحشرات والقنفذ والنباتات المائية . تدن في القصب والقرزار والامل حل ضفاف البحيرات والابار || انثا تقص من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبه الذكر مدة ثلاثة اشابيع . أشهر انواعها الطاس الشرج والمطوق والاذن والصنبر .

Podiceps auritus (S). - غُطْطَاس اَدْن

Grèbe oreillard (F). طائر من الطاس متوسط الوجة طول نحو ٣٥ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاهية . غططه اسود الجسم ، اجر اللط . اطلمها فصيلة الارباء تشمل معظم بحيرات الشرق واروبه التي يتفقد اكثرها في كل حبل .

Podiceps minor, P. fluviatilis (S). Grèbe castagneux, Plongeur nain, P. des fleuves... (F).

طائر من الطاس صغير الوجة طول نحو ٢٤ سم . ثوبه متباين الالوان الزاهية . ظهره الى السمرة يعلوها موج زعفراني . صدره الى الوردية السوداء المروج . بطنه اسهب اللون . حقه الى الشحنة الكنتية . زلفه ابيض . غططه اسفر الجسم ، اسود اللقط || اطلمها بحيرات ومنتاق وانهار العالم القديم يتفقد معظمها كل عام .

١٩٩٦٠ - غُطْطَاس مُتَوَجِّع

Podiceps cristatus (S). Grèbe huppé (F).

طائر من الطاس كبير الوجة طول نحو ٥٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الالامية . ظهره الى السمرة السوداء المروج . رأسه متوجج القفف بقشنتين اقنية الاوتكار . محسره ومعه يفسر اللون ، سود اعثار الباعلي ، شقر الاهداب الخارجية . زوره وبطنه وغوايته فضية اللون ، صناعية الرقعة . زلفه وصنابه حر . غططه اسفر الضفحة البليا ، احر السفل ، ابيض اللقط . قاتمته الى السمرة الخضراء . اطلمها العالم يحرب جميع البلاد مستفقا حيائها العذبة .

Podiceps nigricollis (S). - غُطْطَاس مُطْرُوق

Grèbe à cou noir (F). طائر من الطاس متوسط الوجة طول نحو ٣٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاهية ، حقه اسود . بطنه ابيض . وهو يجتنب المناطق الباردة ويحجب مياه البلاد الممتدة دون سواها .



غُصَيَّة



قُطْطَاس مُتَوَجِّع



غُطْطَاس



غُطْرُف الحَمْصِيَّات



غُطْرُف الرِّمَان



غُطُوف السَّيْدَان



غُطُوف اللَّيْلِ



غُطُوف الْقَطَنِ



غُطُوف الْمَلْفُوف



غُطُوف النَّعْنَاع



غُفَّتْ ابْنِ سَيْنَا

١٩٩٨٠ - غُطُوبِيَّة

Hydroble (F). تمت ترميزه يطلق على النباتات والحشرات التي تعيش في الماء.

١٩٩٨١ - غُطُوبِيَّة

Bifora (S). Bifore (F). جنس نباتات عشبية حولية بيرة من فصيلة الخيميات. أنواعها المعروفة قليلة البعد منها ينبت في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق أمريكا الجنوبية. جميعها كزبرية الشكل، مسنجة الزخرفة. أزهارها صيوانية التجميع. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها شبه لبيبة الشكل، مسطحة الجرم، عذدة الوسط المنحرف. أعرف أنواعها وأشهرها التفصارة الخيمية.

١٩٩٨٢ - غُطُوبِيَّة

Bifora caespitosa (S). Bifore caespitosa (F). نوع من التفصارة، عشبية حولية بيرة. طويعة في بعض أصناف لبنان وسورية. ساقها لساء فراء. أوراقها مركبة، ريشية، ثنائية التفرع. أزهارها صيوانية. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها معتدلة التبطيط قريبة الشبه بالخصي.

١٩٩٨٣ - غُفَّتْ

Eupatorium (S). Eupatoire (F). جنس نباتات معمرة من سبط الغنديات وفصيلة المركبات. أنواعها عديدة معظمها بري، وبعضها زرع. ساقها خشوية. أوراقها لاقامية الانتظام والارتكاز منها البسيطة والمركبة ومنها المتعاقبة والمتناوبة. أزهارها رؤسية صغيرة لثقة. يزورها نحلة. يعلوها حلب مسنن. أعرف الأنواع وأشهرها ما يلي.

١٩٩٨٤ - غُفَّتْ ابْنِ سَيْنَا * عَذَّة البَنْت

Eupatorium cannabinum (S). Eupatoire d'Avicenne, E. chanvrine, Chanvre d'eau, Chanvrine, Herbe de Ste Cunegonde (F). Water hemp, Hemp agrimony, Hemp weed (E). Hanfzweed, Wasserhanf (D). Eupatoria d'Avicenne, Canapa aquatica (I).

بجلة سروية مملوءة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها مركبة ثلاثية أو خماسية الورديات المستطيلة. نصلها أصصي الشكل، مسنن الحافة. أزهارها وردية اللون، خماسية أو سداسية الرؤيات الصغيرة. أزهارها يجتمع من محور إلى الأعلى. وهي تتركب في المراتع الرطبة. كانت شائعة الاستعمال الطبي لقيمة الكليك وتستخدم في عدة علاجات لأمراض أخرى.

١٩٩٨٥ - غُفَّتْ أَرْجَوَانِي

Eupatorium purpureum (S). Eupatoire pourpre (F). جنبة سروية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها لسطوانية سرسة. أوراقها السفلى لسمية براوح عذدة بين ٣ و ٦. أوراقها العليا متعاقبة، جميعها مسنقة، سنائية. نصل الحشن اللبس. رؤياتها الزهرية خريسة للتجميع، أرجوانية اللون. أزهارها يستمر من أيلول إلى تشرين.

١٩٩٨٦ - غُفَّتْ أَسْتَر

Eupatorium strorubens (S). Eupatoire brune (F). جنبة سروية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورديها. زراة اللحاء، زغبية جزوي اللون. أوراقها مسنقة كبيرة لثقة تطلو نحو ٣٠ سم. وتعرض من ١٦ إلى ٢٠ سم. نصلها

١٩٩٧٠ - غُطُوبِيَّة السَّيْدَان *

Aleurodes quercus (S). Aleurode des chênes (F). حشرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ٢ مم. نشأت في الصفار الباهت الكثافت المنش بالاسود. حورياتها مسنجة بنقط لامة متناوبة قاطية. وهي تركب أوراق السديان فتؤذيها.

١٩٩٧١ - غُطُوبِيَّة اللَّيْلِ *

Dialeurodes kirkaldyi (S). Dialeurode (F). حشرة صغيرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ١.٥ مم. جسمها اسمر اللون. مكثها أخير. حورياتها تركب الأوراق على صفحتها السفلى وهي صفراء اللون، خضراء اللون، يبيض الأعداب الشمية اللقيقة القصيرة.

١٩٩٧٢ - غُطُوبِيَّة الْقَطَنِ *

Bemisia gossypiperda (S). Bemisia, Aleurode du coton (F). حشرة من الطفريات طلياً نحو ١ مم. لونها إلى الصفرة النضائية العاطية. حورياتها مستطبة الشكل، زيتية اللون، مدرة أخار المنحرف. تركب أوراق القطن والبنندرة وأبدانها.

١٩٩٧٣ - غُطُوبِيَّة الْمَلْفُوف *

Aleurodes brassicae (S). Aleurode du chou (F). Greenhouse white fly (E). حشرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ١.٥ مم. لونها إلى الصفرة تملو رقة سواد. حورياتها مسطبة الشكل، سمر اللون، طليقة النفاصل، تركب أوراق شتل الملفوف في أول عهدا فتؤذيها لشد الانس.

١٩٩٧٤ - غُطُوبِيَّة النَّعْنَاع *

Aleurodes menthae (S). Aleurode de la menthe (F). حشرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ١.٥ مم. اجتمعت بحجبة العروق الوسطى. حورياتها يضيئة الشكل، عذوبة اللون الغليل اللادة الشمية. أهداب حشواتها طليقة، ثنائية التجميع. تركب أوراق النعنع فتؤذيها.

١٩٩٧٥ - غُطُوبِيَّةَات *

Aleurodidae (S). Aleurodidae (F). فصيلة حشرات من رتبة حشائبات الاجنحة. اجتمعتها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة لثقة سريعة الطيران يتركب ويؤذيها في البلاد الزراعية. تتميز برووسها للمسعرية صيرها كبيرة. قرونها الاستشعارية مركبة من عدة فواصل تراوح بين ٤ و ٧. اغطلها بارزة مخفية. جوشها عريضة. بطيها اسطوانية. ارجلها مسطيلة. اجتمعتها كبيرة، مستطبة الأطراف. اجسامها واجتمعتها مغطاة بمادة شمعية طليقة الشكل يبيض اللون. حورياتها مسطبة الجسم، يضيئة الشكل أو مستطبة. ظهورها موشمة بشده شمعي يغطى قدره باختلاف الاجناس.

١٩٩٧٦ - غُطُوبِيَّة فَرْخ البَايِ

١٩٩٧٧ - غُطُوبِيَّة غُطُوبِيَّة

Immerger (F). To immerse (E). انفس في الماء فغمره.

١٩٩٧٨ - غُطُوبِيَّة

الصلط. ج. ضاغط. السائل الاناث.

١٩٩٧٩ - غُطُوبِيَّة

الطلو. الطلوس أو اللذب.

٧ م. ثوبها خطي اللون ، اسمر المواج . ريقها تركب
الصنوبر الممر فتقرض اللحاء والشكير .
Umbra (S). Umbra (F). **هَلاَه** ° ، **شَفْشَف** .
Umbra, Mud-minnow (E).

جنس اسماك بحرية من مفتحات المثانة . اجسامها
احليجية الشكل ، قصيرة ، مقنونة . زعانفها
الظهيرية والشرجية كبيرة الحجم اما الصدرية والبطنية
فصغيرة . فصوصها خشنة متراكبة . اثنيها الى السرة
التيتراد بطولها يتبعج عاقل . اشهر انواعها المروقة اثنتان .
Métal cru (F). Raw metal (E). **هَغْغَل** .
Inertie (F). Inertia (E). **هَغْغَل** .
٢٠٠٠٥ - **هَغْغُر** هو رجب الشمره ، اطلبه .

٢٠٠١٣ - **هَلاَه المتناقع** ، **شَفْشَف المتناقع**
Umbra crameri (S).
سمكة من الفلاد تعيش في البحيرات والمناقع والياه الزاكنة .
طولها نحو ١٥ سم . ثوبها الى السرة الغبراء الباكنة .
تتميز بكثرة تنسلها وقوة احتياكها لقلبات دجبات الحرارة .
Melochria (S). **هَغْغُور** °
Mélochrie (F). Melochria (E).

جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القرقيات . مهدا
بعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة . حولتها طويلة
لانشفية . اوراقها كبيرة قلبية الشكل او احليجية .
ازهارها وحيطة المسكن غطفة الالوان . ثمارها بيضيه او
مستديرة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها انثاليه .
Umbra lilii (S). **هَلاَه ليلي** ، **شَفْشَف ليلي** .
٢٠٠١٤ - سمكة من الفلاد تعيش في بحيرات البلاد الباردة ، طولها نحو
١٢ سم . ثوبها الى السرة الخفيفة يبق عت الظهر .

٢٠٠١٥ - **هَلاَديشيا**
Févier (F).
هي النسوة شجرة من القرقيات القرطانية ، اطلبها .
٢٠٠١٧ - **هَغْغُور مُتَدَلِّي التِمَكَر**

Melochria pendula (S).
Melochria à fruits pendans (F).
نوع من الفُغُور الممر . مهد بعض المناطق الاسيوية .
ساقه متسلقة قصيرة . جنته مدلاة . اوراقه قلبية الشكل ،
ثلثية او خماسية القصص المسنة الحار . ازهارها وسيدة
المسكن ، المتكية منها ضمية التجميع ، المتكية فردية ،
مستطيلة المالحق . لونها الى البياض الاخضر المواج .
ثمارها بيضيه الشكل لونها الى الاخضر الاصفر ، طولها
نحو ٢ سم . ورضها ١ سم .
٢٠٠١٨ - **هَغْغُور مُتَدَلِّي** °
Melochria madraspatana (S).
Mélochrie de Madras (F).

نوع من الفُغُور الحولي . مهد بعض مناطق الهند . ساقه
متسلقة طول نحو خمسة امتار . اوراقه احليجية الشكل ،
ثلثية او خماسية القصص . نصالها قاسية ، مهدبة
الصفحات السفل . ازهارها صفراء اللون ، المتكية منها
ضمية التجميع ، المتكية فردية . ثماره نصف مستديرة
الشكل ، حجمها حجم البرتقالة الصغيرة . قشورها مشامة
بالاصفر والاخر . تتوكل مطبوخة .
٢٠٠١٩ - **هَغْغُور هَاتَكُ الزَّوْن** °
Melochria heterophylla (S).
Mélochrie hétérophylle (F).

نوع من الفُغُور الممر . مهد بيند الى اليابان .
ساقه متسلقة محتلة الطول . اوراقه هاتكة حتيانية الاشكال ،
منها الاحليجية المنصصة ومنها المسنة والسنانية . نصالها
قاسية ، مروقها حاملة يزنق ابيض فضي المواج . ازهارها
ثنائية المسكن ، يضاء اللون . الذكرية طقية التجميع ،
الانثوية فردية . هناك الذكرية رباعية الجيوب .
Périchondre (F). **غِلاف المُضْرُوف**
Perichondrium (E).
٢٠٠٢١ - **غِلاف حَيَوِي**
Biosphère (F).
Biosphere (E).
الغلاف الحيوي اسم يطلق على قشرة الارض السطحية
حيث يعيش الانسان والحيوان والنبات .
Hydrosphère (F). **غِلاف مَائِي**
Hydrosphere (E).
٢٠٠٢٣ - **غِلاف مِحْرَم**
Pericycle (F).
Pericycle (E).

اسم يطلق على التسج الخشبية ، ان في الساق ام في الجذر ،
الكائنة بين الحزم القوامية والشكير .
٢٠٠١٠ - **هَغْغِيل**
Inerta (F). Inert (E).
٢٠٠١١ - **هَغْ** ، **إِعْتِيَاد** ، **إِعْتِيَاد**
Invagination
دخول جزء من تسج في تسج آخر . وهو ان سفل في
المصران كان متحالا .



هَلاَه

٢٠٢٤ - غلاف بكيس

Lithosphere (F).
Lithosphere (E).٢٠٢٥ - غلايتش
Gallitche (F). Gallitich (E).
جنين صناعي صاف يستخرجون منه مادة قاسية كالقطن
كبيرة الاسماح الصناعي .

٢٠٢٦ - غلاك

Gadiculus (S). Gadicle (F).

جنس احساك بحرية من فصيلة الغاديات المسالوات . انواعه
قليلة . اصلاها ببحار البلاد للمتلة الحارة انحصا شرقي
وجنوبي المتوسط || اجسامها صغيرة اللد ، اطليجية
الشكل ، عديمة الزواحف ، سفلية الشفق ، كبيرة العين
المستديرة البارزة || احرف انواعها واشهرها الثلاث اللقي.

٢٠٢٧ - غلاك فيفي

Gadiculus argenteus (S).

Gadicule argenté (F).

سمكة من الثلاث اصلاها بعض مناطق البحر المتوسط . طولها
يراجح بين ١٥ و ١٢ سم . ثوبها وردي اللون . بلبها
وصهرها الى الفضة ، زعانتها ربادية || لحمها مستحب
الطعم .

٢٠٢٨ - غلبول

Galbula (S).

Galbula (F). Galbula (E).

جنس طير من فصيلة الغلبليات ودبة الجوارح وانها
الناثري . انواعه المعروفة ستة جميعها من طيور البرازيل
وفنزويلا || اجسامها ريمية ريشة تطول من ١٨ الى ٢٤
سم . تتميز باستطالة المناديل الهززية الشكل . اجنتها
قصيرة . اذنانها مسطيلة ، راتجة الرقاع . اقرباها متراكبة
الالوان الصفراء المراح . بعض انواعها ابيض الزور ||
تألف النبايات دون سواها ، فونها الحشرات وبعض الثمار
الغنية البرية .

٢٠٢٩ - غلبليات

Galbulidae (S).

Galbulidés (F). Galbulidés (E).

فصيلة طير من الجوارح وانها المتناقلة . اجنتها وانواعها
المعروفة عديدة ، جميعها من طيور البلاد الأمريكية
اشهر اجنتها الجفاري والغلبول .

٢٠٣٠ - غلغة ، لترك

Produit, Revenu (F).

Produit, Revenu, Income (E).

هي الغل أو الربح وقد شاع استعمالها على معاصيل الارض
الزراعية .

٢٠٣١ - غلغوليات

Galtonia (S). Galtonia (F).

جنس نباتات زربية من فصيلة الزنبقيات . مهدسا
افريقية الجنوبية . انواعها المعروفة قليلة . دروسها
مستديرة الشكل . ساقها اسطوانية تطول من ٨٠ الى ١٢٠
سم . اوروقها قرصية الالتشاب ، صفحية ، تطول نحو
٧٥ سم . وتثمر من ٥ الى ٧ سم . تصلها الى الحصار
المابق الاذوق المالح . اثمارها عتيقوي للتجميع يطول
نحو ٣٠ سم . يحمل من ١٥ الى ٣٠ زهرة قمية الشكل ،
كبيرة اللد ، يضاء اللون ، متدللة . تنموها يستمر من
تموز الى ايلول .

٢٠٣٢ - غلث

Criblure (F). Siftings (E).

ما يتغيه الغربال او يبقى بعد الفرلة من حبوب صغيرة
وزرد خربية واجرام . والثالث يصلح طعاما للطيور
الدواجن .

٢٠٣٣ - غلثي

شجرة مرة قيل تمزجا بملك السباع (السان) .

٢٠٣٤ - غلثوق ، غلثساة الورق

Galeruca (S). Galérucque (F).

جنس حشرات من فصيلة النصاريات ودبة مفدمات
الاجنسة . انواعه عديدة جميعها صغيرة اللد ، غليظة
الزباني زاهية الالوان || يرقاتها غاشقة تركب اوراق
النبات فتخونها || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٠٣٥ - غلثوق الدودكار

Galerucella luteosa (S). Galérucque de l'orme (F).

حشرة من الغلثوق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٧ مم .
ثوبها الى الصفراء المختل يطول موج اطول . ارجلها
الحليمة اثنتان || يرقاتها صغيرة اللد تركب اوراق الدردار
تقترض التصل وتقضي عليه .

٢٠٣٦ - غلثوق الشمام

٢٠٣٧ - غلثوق الشيلك

Galerucella tenella (S). Galérucque du fraisier (F).
Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (F).حشرة من الغلثوق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٤ مم .
ثوبها صنتلي اللون ، اغبر المراح . جيلها الحولي واحد .
يرقاتها تركب اوراق الشيلك فتلتهم التسج وتسف من
العروق .

٢٠٣٨ - غلثوق المفتح

Agelastica alni (S).

Galérucque de l'aune (F).

حشرة من الغلثوق طولها نحو ٦ مم . ثوبها الى الزرقة
البنفسجية . وسيدة الجبل الحولي . يرقاتها صغيرة اللد
تميش بجمعة على اوراق المفتح فتلتهم الواحدة بعد
الاخرى الى ان يتم افسادها فتترك الارواق وتستقر
في القرية حيث تتخذ وتبيض .

٢٠٣٩ - غلثوق الترجيس

Malacosoma lusitanica (S). Galérucque des

narcisses (F).

حشرة من الغلثوق طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى الصبغة
الصناعية للبرتقالية . تركب وكثي رايح وانواع الترجيس
والزريق وسائر النبايات السكرية || يرقاتها تميش في
القرية عادمة الاذى .

٢٠٤٠ - غلطي

Gaulth

ساف من الطبقة الباشيرية يعرف بالالبليي ، اطلب .

٢٠٤١ - غلغل

Pivot (F). Tsp-root (E).

الغلغل عرق الشجرة اذا آمن في الارض . ج غلاغل .
راجع جنت .

٢٠٤٢ - غلغو

Galago (F).

حيوان لبين من اليموريات يدعى دغفوس ، اطلب .

٢٠٤٣ - غلغول

Galgulus (S).

Galgule (F). Galgulus (E).

جنس حشرات دامت من فصيلة الاجنسة المختلفة . انواعه
المعروفة نحو عشرة تميش على شفاف المنافع ويجاري الماء
غائرة في الاسماح والاصحال || اجسامها صغيرة اللد ،

غلثوق الدردار



غلثوق الشيلك



غلثوق المفتح



غلثوق الترجيس

٢٠٠٥٤ - **غُلُوْدَسَه**، **قَارِ الْفَيْل** *Golanda*
جس دوبيات لبوة فاقسة من الجزيئات فضيلة الفأريات.
انواعه قليلة مطبوعة افريقية ولحمه صرديدي. جميعها صغيرة
القد. اوراقها الى السمة الممتدة بالاسفر والاسفر بطريا
الى البياض الاقبر. صوفها خشن للمس || تألف
الحقل والمراعي وزراعات الين. قوتها قليل وزيمات الين
اوراقه وقد تهب الرز وتقرنه في اجسامها .



غلف

٢٠٠٥٥ - **غُلُوْدُس** *Glinus (S).*
Gline (F), Glinus (E).
جس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مرويعة من فصيلة
المغريبات . انواعه المعروفة قليلة العدد منبتها حوض
البحر الابيض المتوسط || سقها مستطبة . اوراقها ملوقة
او يصفية مقلوبة . ازهارها ابيض الازكاز . ازهارها
صفراء او بيضاء اللون . تنويرها صيني || اعرف انواعه
غلنوس بشني وغلنوس دقتوني .

٢٠٠٥٦ - **غُلُوْدُس بَشْنِي** *Glinus lotoides (S).*
Gline lotoides (F).
نوع من الغلنوس . ساقه مستطبة ، منقبة ، مستطبة .
اوراقه شبه يصفية التصل . ازهارها ابيض . ازهار بيضاء .
تنويره صيني .

٢٠٠٥٧ - **غُلُوْدُس دَقْتُونِي** *Glinus dictamnoides (S).*
Gline dictamnoides (F).
نوع من الغلنوس يربط في المراتع الرطبة . ساقه متعنية ،
مستطبة . اوراقه صغيرة التصل ، ملوقة . ازهارها صغيرة ،
تينية اللون . تنويره صيني .



غلف

٢٠٠٥٨ - **غُلُوْدُس** *Aglaonema (S).*
Aglaonema (F).
جس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة التلقاسيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اصلاها بعض مناطق الهند وبنور
التراب || سقها قصيرة . اوراقها متعنية ، منقبة ،
محفوفة الاطراف ، سانية التصل المتعنية الاطراف .
ازهارها محوري الانتشاب ، صبي التجميع . ازهارها
صغيرة ، شبه انبوية الشكل . منها الاحمر والاسفر
والوردي . اوراقها فواحة الحرف الطري المشعب ||
تزرع في المراكب الزرين .

٢٠٠٥٩ - **غُلُوْبُولِيْن** ، **غُلُوْبُولِيْن** *Globeline (F).*
Globulin (E).
مادة آسية تكون في كريات الدم .

٢٠٠٦٠ - **غُلُوْبَامِيْن** *Glutamine (F).*
Glutamin (E).
مادة ازوتية تكون في بعض النباتات كالشوندر .

٢٠٠٦١ - **غُلُوْبِيْن** *Glutan*
هي المادة الازوتية في القيق ويتركب الغلوزن من الغلوتين
والجليدين .

٢٠٠٦٢ - **غُلُوْبِيْن** *Gluténine (F).*
Glutenin (E).
مادة ازوتية ثانوية توجد في دقيق الحبوب .



غلوم

٢٠٠٦٣ - **غُلُوْدُمِي** *Glocodes*
جس فلور مجهرية من فصيلة المدركيات . يتميز بخصباته
المحيطة الشكل ، المبشرة او النسية التجميع ، السطحية
الازكاز . انواعه التي هم الاقتصاد الزراعي قليلة اعرفها
غلنوس التفلح .

شبه يصفية الشوزن ، مطبلة الشكل . كثير بينها
النافرة الكبيرة وبمساعدة قوائمها الخلفية التي تمكها من
التفزر . اوراقها مزيج من الشقة والشبهة يطولها تجميع
اسمر وشفة خضراء . قوائمها مطبقة بالاسفر .

٢٠٠٤٤ - **غُلُوْبِيَّات** *Galgulidae (S).*
Galgulidés (F), Galguliidae (E).
فصيلة حشرات من نصفية الاجنحة المختلفة . اجسامها
وانواعها قليلة العدد . اصلاها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة
من القارتين القديمة والحديثة || مطف انواعها يعيش قرب
الماء او متنسأ في الاسفل والاسفل . بعضها خاضل
والبعض الآخر دامن || اعرف اجسامها واشهرها القمل .

٢٠٠٤٥ - **غُلْب** ، **كَرَكُوْمَة** *Scapella, Caralluma (S).*
Scapella (F), Scapella (E).
جس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الصقلابيات .
انواعه نحو ٧٥ جميعها من نباتات المناطق الصحراوية
يقال ان منها الاصيل كان يمش فياني افريقية الجنوبية .
اوراقها سيقان لحية رباعية الاصلع السلة . ازهارها
لحية كبيرة القند تلوح الارواق .

٢٠٠٤٦ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** *Hyménium, Volve (F).*
Hyménium, Skin (E).
غلاف بشري رقيق يحيط ببعض الفطور حتما تكون
في طورها للتوري .

٢٠٠٤٧ - **غُلْبِيْن**
لبت في الماء وقره هريس || وهو ورق الكرم ما دام
حل مجره || وهو الطلح وكل خضرة حل رأس الماء .

٢٠٠٤٨ - **غُلْبِي** *Clé de voûte (F).*
Keystone of a vault (E).
حجر شبه عروطي الشكل يلقن به قوس البقد .

٢٠٠٤٩ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة**
مَحْزَرِي *Vincetoxicum officinal (S).*
Vincetoxicum officinal, Asclapade officinale,
Domphe-venin (F).
Tamapson (E).
Echte Schwalbenwurz (D).
Vincetoxicum, Bozoli (I).
جنية طبية معمرة من فصيلة الصقلابيات . ساقها متعنية
غزرة الصارة الجنية الطبية والمضادة السموم . اوراقها
متعنية ، كاسلة ، احليجية . نصلها شديد الخضرة .
ازهارها حلقة التجميع ، يضاء اللون يطولها حواج فتى .

٢٠٠٥٠ - **غُلْبَة الدَّهَب** هي الحبل ، اطلب .

٢٠٠٥١ - **غُلْبَتَانَز** ، **لَبَنَز** *Galimma*
خيرة لبنة تذيب الجبين في الجبن .

٢٠٠٥٢ - **غُلْبَتُوْر** *Galectoa*
حرب من الفلوكوز يحصل من تحول الينوز .

٢٠٠٥٣ - **غُلْمَة** *Nymphomania (F).*
Nymphomania (E).
ازدياد شهوة الساد في اثاث الحيوانات . اسبابها حديثة
منها حيوية ومها طارئة . فالاسباب الطبيعية تقود معظمها
الى المعرف الدائم . اما الاسباب الطارئة فمعها وفي . والاث
في هذه الحالة تنهي مغلف . راجع اختلام .

Glycérine (F). **غَلِيمَسِين** ٢٠٠٧٦ -

Glycerin, Glycerium (E).

سائل متادل لا لون له يذيب في الماء ويحصل من متبرين المواد الدفنية .

٢٠٠٧٧ - **غَلِيمَسِين** هي البلية ، اطلبها .

٢٠٠٧٨ - **غَلِيمَسِين عَسَلُولِيَّة** *

Apios tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F).

نبات عسلي حادس ممر من فصيلة القرنيات القرشية . جلوره مصقولة ، اجاسية الشكل ، مأكولة . ساقه ماعدة ، مارشة . تطول نحو ٤ امتار . اوراقه مركبة . وريقاته وريّة التجسيم ، يضيئة الشكل ، مستتقة العنقة || ازهاره صطرية الرائحة ، حراء اللون ، ازهاره متاقية محورية الانزكار .

Crasséps (F). **غَلِيظُ الرَّأْس** ٢٠٠٧٩ -

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان او حشرة مستطلة الرأس .

Crassicole (F). **غَلِيظُ العُنُق** ٢٠٠٨٠ -

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان مستطعم المتق .

Crassicorne (F). **غَلِيظُ القرن** ٢٠٠٨١ -

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان مستطعم القرن .

Eudothèque (F). **غَلِيظَةُ** ٢٠٠٨٢ -

الغليظة شفاء داخلى يخلط فص الحنك .

Glycoce **غَلِيكُوز** ٢٠٠٨٣ -

الغليكوز اي سكر النخب مادة يضاء سكرية قابلة للاختبار ككوك في البار والصل ويضرها .

Pipe **غَلِيظِين** ٢٠٠٨٤ -

غليظين ج . غلاظين ، اداة تستعمل لتبطين التبن المفروم .

٢٠٠٨٥ - **غَمَّ ، غَمَل ، غَمَّس**

Ensachage, Capuchonnage (F). Putting a hood (E). تغليف الازهار بالاكياس منفا تبطينها . وتغليف النار لاصانتها . ويقال لليلور والبار الناتجة من هذه العملية بيلور او نمار مدفولة او مدفولة .

Pisford (F). Celling (E). **غَمَّاس** ٢٠٠٨٦ -

هو سقف البيت . ج . اغية واغلا . ويقال غم البيت ويضميه . غطاء بالحطب والطين .

Colymbus (S). **غَمَّاس** ٢٠٠٨٧ -

Piongeon (F). Diver (E). جنس طيور مائية من فتيات القدم مولها بالبلاد الباردة فزع منها في الشتاء نحو الأقاليم المعتدلة . انواعها المرفقة اربعة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة البدن ، جبالسة الجسم ، انزادها رائقة . اجنحتها صغرة . اذنابها جدعة . ارسافها صردية || تألف البعاب والبعيوات ولاظهر على السوء . قتها الاسماك الصغيرة والقرشيات . تدفن في انفيس رتها على الشطوط وصفات الجيبرات واعواد الانهار . اناتها تقص يضتين تمضنها بمنارة الاكوار ثلاثة اسابيع || اشهر انواعها غلام الحسن وغملة القطب .

٢٠٠٨٤ - **غَلِيدُوسُ النَّحْاح** * ، **بَلْطُش دُخَانِي** *

Gloxides pontigena (S). Bloch fumoux, Maladie de la sule (F). Sooty blotch (E).

نطر مجهري يركب اثناد ونمار التفاح والاجاس . مظهره الجارسي على الاثناد يقع للامعان حيث ولوا ، لا قياسية الشكل والحجم ، متجانسة الاتصال تسبب انضداد البيرة ويضف الاذى || وهو على البار يقع سمر لا قياسية الشكل والحجم تركب البيرة تقطوعها دون ان تسطب الب . يتكاثر ويقتل في الاماكن الحارة المرتفعة للرطوبة النسبية . يكاثف بمشاكل علول يورود المركز من ١٠ الى ١٠٠٪ بشرط ان تحصل المكاثفة في امان ظهور اللوس .

٢٠٠٨٥ - **غَلُوسِيَا** اطلب هيدرات الكربون .

Gluadium **غَلُوسِيُوم** ٢٠٠٦٦ -

هو البريليوم ، اطلبه .

Gluoton (F). **غَلُوشُن** ٢٠٠٦٧ -

هو اكثر حيوان من السرمويات ، اطلبه .

٢٠٠٦٨ - **غَلُوشِيَّة** * ، **سَلُغان**

Gloxinia (S). Gloxinia (F). Gloxinia (E). Gloxinien (D). Gloxinia, Ligaria (F).

جنس نباتات عشبية صليبية مسمرة من فصيلة الجسنيديات . انواعها المعروفة ١٢ اما ضربها وبعدها فثلاثة البدن . جميعها زينة . سقها صليبية . اوراقها ممتدة متطابقة كثيرة اثناد . فصلها جيل الحصار ، خل البشر ، بارز العروق والشرابين . ازهارها فردية ، طويلة الزناد ، بقية الشكل ، جيلة الالوان الزاهية .

٢٠٠٦٩ - **غَلُوكُوز** ، **سُكَّر العنب**

Glucose مادة سكرية يضاء قابلة للاختبار ككوك في البار والصل ويضرها .

٢٠٠٧٠ - **غَلُوكُوزِيَا** ، **غَلُوكُوزِيَا** (E). Glucosides (F).

مركبات نباتية تحوي الكثير من الغلوكوز فيستخرج منها .

٢٠٠٧١ - **غَلُوم** *

Galeomma (S). **غَلُومِما** (F). Galeomma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صليبيات الخياشيم واصله للفنشيوات . انواعه للمرفقة متوسطة البدن منتشرة في منط بحار العالم القديم احصاها البحر الابيض المتوسط || اجسامها مسطوقة باصداق شبه هورية الشكل تشب في المسفور البحرية وتمتدق عليها .

٢٠٠٧٢ - **غَلُومِيَّات** *

Galeommidae (S). **غَلُومِيَّات** (F). Galeommidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صليبيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المرفقة من غائرة ومماصرة كثيرة البدن منتشرة في الطبقة البسيانية وفي منط بحار العالم . اصداقها صغيرة ، شبه مستطوية ، ثنائية المصارع عادمة التكتين || اشهر اجناسها الغلوم والسنبيل والميرابية ...

٢٠٠٧٣ - **غَلِيَّادِين**

Gladina (F). Gladin (E). مادة البوليبيدية اي آسية تكون في النقيع .

٢٠٠٧٤ - **غَلِيَّان**

Ebullition

٢٠٠٧٥ - **غَلِيَّاسِيَا** ، **غَلِيَّاسِيَا** (E). Glycidides (F).

اسم شامل لاثباتات الغليسيرين من زيتين وصرغرين ونخلين وزيروها ما يدخل في تركيب الادلان .



غلوس التفاح



غلوكسينية



غلم



غلين صقلية



غامة الحُسن



غامة القطب



عُمر



عُمر



غمر



غمر

٢٠٠٩٨ - غَمْدِيَّةُ الْإِجْنَحَةِ، مُعَمَّكَةُ الْإِجْنَحَةِ

Colobopseus (F). Colopseus (E).
رَبَّةٌ حشرات من طبقة غمديات الجناح . اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠٠ شائعة في جميع اقطار العالم ، جميعها ١٦ لة والمفيد من الفصائل . جميع حشراتا تامة التطور قارضة ، مجتنة . اجنسها مؤلفة من زوجين الزوج العلوي للزوجة بالظهور وهو مركب من عشرين قرين ، ولجانان الزوج السفلي الثنائي التركيب الذي ينفق عنه الطيران . معظمها من الحشرات للقرنة وبعضها ينتمي الى الرقابة الضوية . اولها مغترزة او عاتية ، سورياتها طليقة الاقيد . كلها مكونة من افرادات خاصة تسمى اليها بعض المواد الضوية وعلاها . اشهر فصائلها ، الحبيد من اجناسها وانواعها في لبنان وسائر البلاد العربية ، هي التالية : الطيريات ، الجليات ، التسمقيات ، السالويات ، السرفانيات ، السويات ، الظلاميات ، الانشيات ، السرفقيات ، القزليات ، الكركشيات ، الككبيات ، المتصويات ، التصلصات ، التفرانيات ، والوسيات .

٢٠٠٩٩ - غَمْرٌ

Eprouvette graduée (F).
Graduated gauge (E). ويرمز ايضا بالناطل . ج أحمار .

٢٠١٠٠ - غَمْرٌ

Chao (F). Chao (E).
القمر هو الخولة ، اطله .

٢٠١٠١ - غَمْرٌ ، قَطْرُوسٌ ، قُتْرُوسٌ

Submersion
هو الاسقاء بالنمر أو القطروس .

٢٠١٠٢ - غَمْرُكَةٌ

هو الورس ، اطله .

٢٠١٠٣ - غَمْرُكَةٌ

Zostera (S). Zostère (F).
Eel grass, Turdie grass, Grass warck (E). Zwergeasgras (D). Zostera, Alga del vetral (I).
جس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انواعها المعروفة ثلاثة . سويها مذادة . اوراقها عويطة مستطيلة ، قوامها مخدبة . اطرافها جيبية ، جيبها تغلق من سبائل مكونة من صف واحد من الافراد البسطة .

٢٠١٠٤ - غَمْرُوسٌ

Gemmarus (S).
Gammarus (F). Gammarus (E).

جس حوييات بحرية من القشريات العليا وضيفة القمروسيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها يعيش في بحار وانهر البلاد الباردة . اجسامها مسطحة القد . اطوالها اقواس من ٢ الى ٣ م . زياتها مركبة ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها ملتصق بالراس وينتهي بملاط فكية . الزوجان الثاني والثاني ينتهيان بكلايات قارضة . اشلواها شبيبة الالوان وبها الياض الشفاف .

٢٠١٠٥ - غَمْرُوسِيَّاتٌ

Gammaridae (S).
Gammaridae (F). Gammaridae (E).

فصيلة حوييات مائية من القشريات العليا مزوجيات الارجل اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري وبعض الآخر يعيش في مياه البسيحات والانهر . معظمها من البلاد الباردة . اجسامها شبيبة الاجسام بكثر لها الصدر . جميعها عاتية الصاف . عنيها بسطة . زياتها ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها الصدرية وينتهي بملاط فكية . اشهر اجناسها القمروس .

٢٠٠٩٨ - غَمَاكَةُ الْحُسْنِ

Colymbus stellatus. C. septentrionalis (S). Plongeon cas-marin (F). Red-throated diver (E).

طائر من القياس كبير الجفة طوله نحو ٧٠ سم . راسه ويته الى الرقبة المخلد . ظهره الى السرة القاتمة وكذلك سائر صفته العليا من القطن الى الذنب . صدره ويته واطلاط الى الياض الناصع . غنطه اسود اللون . ينح من البرد من التبال الى الجنوب نحو المتوسط وشاطى لفته .

٢٠٠٩٩ - غَمَاكَةُ الْقُطْبِ

Colymbus glacialis (S). Plongeon imbrin, P. glacial (F). Great northern diver (E).

طائر من القياس كبير الجفة طوله نحو ١٠٠ سم . راسه ويته الى السواد القاتم . بطنه وصدره واسفل عنقه بيض . ابطاه مجنحة ويقتبة بالاسود . ينح من البرد من التبال الى الجنوب نحو الشطوط الاروية .

٢٠٠٩٠ - غَمَالِجٌ

نبات على شكل اللذان ينبت في الربيع .

٢٠٠٩١ - غَمْبُكُورٌ

هو الأريان ، اطله .

٢٠٠٩٢ - غَمْبُورٌ ، رَشِقٌ

Gnatophytium elegans (S).
Gnatophytie élegant (F).

حيران بحري من القشريات حشرات الارجل طول الذيل ينتمي الى فصيلة القزديسات . اطانه البسر الياض المتوسط . جسمه اهلبيجي الشكل ، متطبق الذيل ، يطول نحو ٧ م . متكه قصير القد ، مسن الحمار . ثوبه الى القشرة المنقطة بالاصفر اللحي . يعتبر من الانواع القاصرة الصف المروغب فيها .

٢٠٠٩٣ - غَمْبِيرٌ

Ourosparia gambir (S).
Gambier (F).

شجرة برية مسرة من فصيلة الفويات شبيها الملائير . يستخرج من اوراقها بد قلعها بلماه وعلها مادة صغية رائتية تشبه الكشور لها استعمالها الطبي والصناعي .

٢٠٠٩٤ - غَمْدٌ ، قُطْرُوسٌ ، غَمْدُكُوفٌ

Elytre (F). Elytron (E).

محد . ج أمد . والانحد هي الاجنحة العليا لحشرات ربة غمديات الاجنحة وهي صلبة قرنية المادة ممها حفظ الاجنحة الزليقة المبرودة تحت المروعة بالرواش .

٢٠٠٩٥ - غَمْدٌ

Gaine (F). Sheath, Ocrea (E).

قاعدة ملاقق الورقة وهي تحيط بالساق قليلا وكثيرا وقد تكون طويلة ناسبة في التجليات .

٢٠٠٩٦ - غَمْدٌ مَكَاكِيٌّ

Etui médullaire (F).
Medullary sheath (E).

٢٠٠٩٧ - غَمْدِيَّاتُ الْجَنَاحِ

Colobopseoides (F).
Colopseoides (E).

طبقة حشرات من شبة الحسدليات وثلاثة الاجنحات اصلا . تشمل ربة واحدة تسمى غمفة الاجنحة . شترتها تعرف بالخنفساء او الخنفساء . جميعها عاتس والمدراء لدى حورية جميعها حوريات .



فُشَس



فُشَس دِين



فُشَس لِرَج



فُشَس وُرْدِي



فُشَس



فُشَس

٢٠١٠٦ - فُشَس *
Gamasus (S). Gamaso (F).
جنس قراد من فصيلة الغمشيات . انواعه عديدة جميعها عدا صغيرة القند ، طولها نحو ملليمتر واحد . وهي من الحشرات القاتلة قوتها المواد الضوية المنحلة || تتطفل على الحشرات اغصها تحمية الجناح لتقلها من مكان الى آخر .

٢٠١٠٧ - فُشَسِيَّات *
Gamasidae (S). Gamasidés (F).
فصيلة حشرات من القراشيات . اجناسها المعروفة اربعة اما انواعها فعديدة جميعها صغيرة القند ، طولها رايوح من ١ الى ٢ سم . وهي عدا مائة العين . انواعها سوية الالوان المائلة الى تراوح من الاصفر القاتم الى الاسمر الجوزي || تتطفل على الطير والحيوانات والحشرات .

٢٠١٠٨ - فُشَسِيد *
Gomphidius (S). Gomphide (F).

جنس فطور من فصيلة السميات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهم القليم الصنوبريات في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الجروح واللدال والمواد النباتية المنحلة . بعض انواعه مأكول والبعض الآخر كائن الصف غير مرغوب فيه || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١٠٩ - فُشَسِيد دِين *
Gomphidius glutinosus (S). Gomphide gluant
نوع من الفُشَسِيد المأكول . يعيش في المواقف الرطبة . ساقه مستقيمة ، ديقة النشاء ، صفراء القسم السفلي غبراء العلوي . اروسه كبيرة القند ، شبه قلنسوة الشكل ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الكستني البنفسجي المالح || لحية جامدة ، لذينة الطعم ، مستحبة المذاق .

٢٠١١٠ - فُشَسِيد لِرَج *
Gomphidius viscidus (S). Gomphide visqueux (F).
نوع من الفُشَسِيد الكامن الصف . يعيش في المراعي على الدبال . ساقه معتدلة الثلاثة والارتفاع ، سمر اللون ، صفراء المالح . اروسه لينة ، قلنسوة الشكل ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى المغرة النحاسية المالح . اطرافه الى اللبنة الصفراء المالح .

٢٠١١١ - فُشَسِيد وُرْدِي *
Gomphidius roseus (S). Gomphide rose (F).
نوع من الفُشَسِيد الكائن الصف . يعيش في ارجاج الصنوبر على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة مستقيمة النع ، يضاء اللون ، فراء النشاء . اروسه ثلاثية الفلق قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الوردية الليملي المالح . اطرافه لينة ، لونها الى البياض الافر .

٢٠١١٢ - فُشَسِي *
Rosée (F). Dew (E).
المن هو الندى . تحمت الارض وكها التي فهي عمقة . وحق لذبات هي او فسد من كثرة الانداه عليه . ولكن المكان الذي يركبه الندى .

٢٠١١٣ - فُشَس *
هو الفُشَسِمان عارض يصيب الزرع .

٢٠١١٤ - فُشَس *
Capechonnage (F).
هو اثم ، واجبه .

٢٠١١٥ - فُشَس *
Crossarchus (S). Crossarque, Mangue (F).
جنس حيوانات قرضابة من فصيلة الزباديات . انواعها المعروفة ستة موطنها بعض مناطق افريقية الشرقية والجزائرية والوسطى . تألف الرياش والغابات وفضاف مجاري الماء والقفر . ملينها الحيائي جامعي . جامعاتها تد من ٢٠ الى ٣٠٠ زوج واكثر || اجسامها صغيرة ، شوزها شوزن النمس ، اطولها تراوح من ٦٠ الى ٧٥ سم . بما فيه اللاب الذي يطول من ١٧ الى ٢٥ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عينها واذناها صغيرة مستديرة . اعنتها معتدلة الطول . قوائمها قصيرة ، خاسية الاصابع . اوبارها صغيرة خشية . خضابها اوبارها يختلف مع التروح تكثر فيه الكمية والشبهة والتلجيع المتروض || تعيش في اوجار تحطرها في التربة او في اليعان المهجورة من النمل والارضة . قوتها الحيون والحشرات والثمار والجوهر . اشهر انواعها المعروفة التالية :

فُشَس جَلَد *
Crossarchus fasciatus (S).
فُشَس رَاي *
Crossarque rayé (F).
فُشَس مُعَم *
Crossarchus obscurus (S).
فُشَس مُعَم *
Crossarque obscur (F).

فُشَس شَمْسِي *
Crossarchus gambianus (S).
فُشَس شَمْسِي *
Crossarque de Gambie (F).

فُشَس الصَّال *
Crossarchus somalicus (S).
فُشَس الصَّال *
Crossarque de Somalie (F).

٢٠١١٦ - فُشَسُوج *
Dard (F). Dart, Sténg (E).
ناية او اينة شرة تكون في بعض الانجار اغصها التلغح والاجاس . ج خاليج .

٢٠١١٧ - فُشَسُوط *
Megaspira (S). Mégaspire (F). Megaspira (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات مدييات الاربجل وفصيلة الثاربات . انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطاهم بعض مناطق امريكا الجنوبية اغصها البرازيل || تعيش في المواقف الظليلة الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها اسطوانية ، بربجية الشكل ، مستطيلة ، مقاربة القربة .

٢٠١١٨ - فُشَسُول *
Acantholimon (S). Prickly thrift (E). Sachelgrasnelke (D). Acantholima (I).
ج. خاليل . جنس اشباب برية وزراعية مدرة من فصيلة الرصاصيات . انواعه عديدة ، بعضها مرقعات حوض البعر المتوسط جميعها صغيرة القند ، مثقوبة ، شائكة . اوراقها لا قياسية الشكل . انذارها سلبية التجميع || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١١٩ - فُشَسُول أُنِيَق *
Acantholimon venustum (S). Acantholimon élégant (F).
نوع من الفُشَسُول وهو مجلة سريرية صغيرة القند ، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها منبسطة الصفحة ، حشوية النصل . سبلتها تطول نحو ٨ سم . ازهارها وردية اللون متراكبة || ازهارها يستمر طوال الصيف . وهي من البقول القسمية ، تبكر في اول الربيع وتؤكل مطبوخة .

٢٠١٢٠ - غُملُول سَبْطِي

Acantholimon glutaceum (S). *Acantholimon en dpl* (F).

نوع من الغملول وهو بجملة سريرية صغيرة اللقد، تملو الشوك تملو نحو ١٥ سم. أوراقها هندية الشكل خضراء اللون. سبلتها مسطيلة، أزهارها حر البتلات، بيض الكرويس، سود المروق. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢١ - غُملُول شَكَلَك

Acantholimon scarosum (S). *Acantholimon aculaire* (F).

نوع من الغملول، وهو بجملة سريرية صغيرة اللقد، تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها ريجية الشكل تملو من ٥ إلى ٩ سم. وتعرض عنه قاعدتها نحو ٥ سم. أشواكها كثيرة. سبلاتها تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أزهارها قزوية. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢٢ - هَمَن هُو القم، اطليه.

Goémon (F). *Seaweed* (E).

هو سباد الالغ، اطليه.

٢٠١٢٤ - هَمِيَسَة

Argyroneta (S). *Argyroneta* (F).

جنس حناكب من فصيلة الهنسيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها مائية تعيش في البحيرات والاهوار والانهر. الرافضة المياه. ملاجئها حكاكب من التواس رنية الشكل متينة الحيك تنبها في الاعشاب المائية وتنقل عليها الهواء بواسطة الفتحات التي تجمعها بين حلب صدرها وبطنها كما علت سطح الماء وقاصت. اجسامها صغيرة اللقد، فضية اللون، رصاصية الجرامز الكثيفة الحلب.

٢٠١٢٥ - هَمِيَسَة صَالِيَة

Argyroneta aquatica (S). *Argyroneta aquilica* (F). *Water-spider* (E). *Wasserspinn* (D).

دوية من التناكب الساعية القانصة من فصيلة الهنسيات. موطنها معظم مياه البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها صغير اللقد يطول نحو ٩ سم. عند التكاثر ونحو ١٤ سم. عند التكاثر. صدرها احر اللون اسم الموج. صياها مركبتان زهرتان. شمسها صغيران. فكها مستطيلان. جزامها دقيقة. كيفية الحلب. بطنها بيض الشكل، اخضر اللون، نضي الموج. قوتها الحشرات المائية لتلتفها عاتمة على سطح الماء او فائصة فيه. تتمر نحو ثلاث سنوات وتساقد قبل نهاية اجملها بثلاثة اشهر. تعتبر من الدويات النافعة.

٢٠١٢٦ - هَمِيَسِيَّات

Argyronetidae (S). *Argyronetidae* (F).

فصيلة من التناكب الساعية القانصة وراعيات الروايا والمائتان. اجناسها وانواعها المعروفة اللقد. جميعها صغيرة اللقد تتميز بامتالة حلب جزامها الخلفية. اشهر اجناسها الندية.

٢٠١٢٧ - هَمِيَسِيَّات

الغيشاء احدى الثعابين، من منازل القمر. اطلب شمر شامية.

٢٠١٢٨ - هَمَن

يقال غن- الثعل اذا ادرك ثمره.

٢٠١٢٩ - هَتَّاج

Pitca (S). *Brevo* (F).

جنس طير من الفصليات الجواثم مشروبات المنابر. انواعه المعروفة خمسة اصلها البلاد الاسيوية والافريقية. جميعها صغيرة اللقد، قصيرة القاب، مسطيلة الساق. اشرها مختلفة اللونان. جميعها مطوقة الحامس، منشفة الصدر والبطن. قوتها الحشرات والجزور البرية. تدفن بين الافدال في افاصيص قليلة السمك. حشبتها ازواج من ٥ إلى ٧ يبيضات ترخها الاتي بتناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

٢٠١٣٠ - هَتَّاجِيَّات

Pittidae (S). *Pittidae* (F). *Pittidés* (E).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل وزيقات المنابر. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة المتحررة نحو الاستوائية من العالم القديم. معظم طيورها صغير اللقد وبعضها متوسط ولكها جميعها مسطيلة الساق. تتميز بقلعة الطران وبرصة اللقد والرشاقة واللغة واللذع. تألف الاخراج النحلة وتعيش اسرابا صغيرة ثلثا يتجاوز عددها اربعة ازواج. قوتها الحشرات المختلفة اعصها النمل وبعض الجزور البرية. اعرف اجناسها واشهرها الدجاج.

٢٠١٣٤ - هِنَبَاش

Blaps mucronata (S). *Blaps, Scarabaeus punct, S. funebre* (F).

خنفساء من فصيلة النشبات، طولها يراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. قوتها الى السواد الباقي القشال السودي. تعيش تحت الحجارة وفي الاثنية والتعايير المظلمة. رانها مختلفة كرجية. قوتها المواد النباتية والعضوية المنسقة.

٢٠١٣٥ - هَنَبَاط، صَرَح

Rhinobatis (S). *Rhinobate, Guitare, Violon de mer* (F). *Guitare* (E).

جنس اسماك بحرية ولوية من فصيلة النشباتيات. انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. اجسامها كبيرة، رشيبة الشكل، رؤوسها مسترسفة، منسقة، مطوقة بالزواجل الصمدية، مخروطية الشوزن. افواها سفلى الارتكاز. لشدها كبيرة. اسنانها مسطحة، متكاثفة الرصف. افواها تنطف مع الانواع، تكثر فيها الكهبة الزقية الموج. زعانفها الذيلية غارقة، كبيرة القلق العليا، صغيرة السفلى. سرحها اسلم البواج. ثلثا تشاهد قرب الجامح والسطوط. اشهر انواعها اثلاثة قتالية.

٢٠١٣٦ - هَنَبَاط الجُزُر اليونانية

Rhinobatis colossus (S). *Rhinobate des Iles grecques* (F). *Rhinobatis colossus* (E).

نوع من النشبات. يتكرر في بحر اليونان والجزر. قوته القشريات والرخويات والشوكيات. جسمه وشي الشكل، يطول نحو ١٠٠ سم. رأسه مسطع الجرم، مخروطي الشوزن. عيناه مسطحتان. له سفلى الارتكاز واسع الشدة. ثوبه الى الكهبة الزقية الموج تملوها رقة سمراء في الظهر وشيح ابيض في البطن. لحمه كامن الصف، مأكول.



هَتَّاج



هِنَبَاش



هَنَبَاط الجُزُر اليونانية

او غيرها، وما تبقى فلوته يختلف مع النوع || يمشى اوراقاً كبيرة العدد قوته البلور والحروب احصاها شب الارز .

٢٠٦٤٧ - غُثَيْلُ اسود الزباني *

Podagrica fuscicornis (S).

Podagrica à antennes noires (F).

حشرة غامضة من فصيلة النضاريات ورتبة غديات الاجنحة . تألف البراري حيث تكثر نباتات الفصيلة الخبازية . غثانها تعيش على بتلات الارز . يرقاها تلم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد بطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها ثنائي اللون . رأسها وكوسلها وظهرها وبرامزها الى الحمرة البرتقالية . ظهرها الى الزرقه الصفاه . قليل الاحتياط ، مستدير الطرف اللاصق . زباناها خيطيان اسودان || لها جيل واحد في الحول . تظهر الجملدة في ايار ويبقى حتى ايلول . تمتع الاثنى المكن زبناً تلتصفاً بصلال الاوراق || البرقة تطول نحو ٧ سم . جسمها وشي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصفرة القاتمة بعلوها غطان جانيبان اسودان . رأسها وشربها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة ضمن جراب من التراب والحواد الصخرية والنباتية .

٢٠٦٤٨ - غُثُفُوسُ اقْرَن *٥

Gnathocerus Cornutus (S).

Gnathocère cornu (F). *Gnathocerus cornutus* (S).

حشرة ناعمة ملوثة من فصيلة الغثيفيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يشمل جميع الاقطار المسكونة . تألف مخازن التيق والبقالة وبيوت السكن . غثانها وبقاها تعيش على التيق وبركةا للصنوعة وعلى المراد السكرية والثمار المحففة || جسمها صغير القد بطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى السمرة الكستنية الصنائية المواج ، ذكرورها مجهزة بزوائد رأسية فارقة تميزها عن الاناث وعن غيرها من الحشرات . رأسها مستقيم الهرم مجهز بقرنين متقابلين يكتنفان التأثير الفككي . عينها ناضرتان . زباناها صولطانيان صيران . فكها ذريان . ظهرها لا يلحف كامل السمكة لشرجية . غمداهما متناهما تحزير القاطب والتعطيق التيق || لها جيلان في الحول . تسرح في التراب وفي الليل || والبرقة : عند بلوغها الادراك التام ، تطول من ٦ الى ٧ سم . جسمها اسطواني الهرم . ثوبها الى الصفار الباهت . رأسها الى السمرة . سمكتها الشرجية مجهزة بمرتين ذريين || طور الاكمال الذي يستمر من ١٤ الى ٣٠ يوماً يتقضي طليقاً من كل غلاف .

Hérissonne (F).

She-hedgehog (E).

Lynx caracal (F).

Gongyle ocellé (F).

٢٠١٤٤ - هُتَجَة

هي القنفذة اثنى القنفذ .

٢٠١٤٥ - هُتَجَل

هو عنق الارض ، الحلبه .

٢٠١٤٦ - هُتَجِيل

هو النمساة النرة ، الحلبا .

٢٠١٤٧ - هُتَدُصُولِي * ، زَنْجِي وَزَنْجِيلِي

Hedychium (S). *Hédychie* (F). *Ginger lily, Garland flower* (E). *Schöne krauzblume* (D). *Coronaria* (I). هُتَدُصُولِي هو الاسم الهندي لهذا النبات . جنس نباتات

٢٠١٣٧ - هُتَبَاتُ التُّوسَط *

Rhinobatis rhinobatis (S). *Rhinobate de la Méditerranée* (F). *Rhinobatis rhinobatis* (E).

نوع من الفئاط . اصلها من مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . مسرحه اساطير الهياج . قوته القشريات والرخويات والقشريات || جسمه وشي الشكل بطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . رأسه مبسط الهرم ، مخروطي الشكل . عيناه مسطحتان . فم سفلي الاركانز ، واسع الشفق . اسنانه مسطحة ، متكافئة ، متراسة . زعنفته اللبالية فارقة ، كبيرة الفتلة العليا || ثوبه الى الكهية الزيتية المواج تملحا شحة سمراء في الظهر ، تلبية في البطن || لحمه كامن الصف ، مأكلي .

٢٠١٣٨ - هُتَبَاتُ حَيْدَة

Rhynchobatus djiddensis (S). *Rhynchobate de Djedda* (F). *Rhynchobatis djiddensis* (E).

ممكة من الفئاط . اصلها البحر الاحمر والابحار . مسرحها اساطير الهياج || جسمها شبه وشي الشكل ، مستعرض للقدم ، مستطوق المقعر ، بطول من مترين الى ثلاثة امتار . رأسها مبسط الهرم ، مخروطي الشكل . عيناه مسطحتان . لها سفلي الاركانز ، واسع الشفق . اسنانه مسطحة متراسة || ثوبها الى الربية السمراء بعلوها تبتج اخضر في الظهر وفي الزانفان || لحمها كامن الصف ، مأكلي .

٢٠١٣٩ - هُتَبَاتِيَّات *٥

Rhinobatidae (S). *Rhinobatidae* (F). *Rhinobatidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السنفيات ورتبة الاشفاق . اجناسها وانواعها المروفة نحو ٢٥ جمعا من اسماك بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها وشية الشكل تطول من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم . رؤوسها منبسطة ، مخروطية الشكل ، موطقة باكتاف فارقة ناعمة من تحتها بما بالزانفان الصخرية الرخية . اقولها سفلية الاركانز ، واسعة الاشفاق . حويها سطحية صغيرة . اسنانه مسطحة ، متراسة ، كثيرة العدد . اصنامها الخشوية سفلية الاركانز كالاقلام . زعانفها اللبالية فارقة ، كبيرة الفتق العليا || اعرف اجناسها واشهرها الفئاط .

٢٠١٤٥ - هُتَبُور *٥

Rhamphocerus (S).

Rhamphocère (F).

جنس طير من الجواثم وفصيلة البيرليات . انواعه المروفة ستة اسطانيا سريةكة الاستوائية . ملجتها الجياحي حماني الا في زين القنصاد والحضارة . تألف القباب . قوتها التمل والخرشات الصغيرة والذباب والحرول || اجسامها صغيرة . متناحها مسطحة . اقنابها مخروطية قصيرة . الوابا تراكية الاروان تكثر فيها الشقة والطلمة والشفية . ميونها مكملة حمارها سطوة بالاسود . صدورها موشة || تنثن في الانجار التوسعة الانقاع . انابها تنمع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الترحيم يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الاناث بتناوبة الذكور .

٢٠١٤٦ - هُتَبِيلِي *

Padda, Munia (S).

Padda, Calfat (F). *Padda* (E).

جنس طير من الجواثم الخروطيات المتاخر . انولعه مدينة جميعها اسيرة فاخرية الاصطاف . الوابا متعلقة الاروان المختلفة . رؤوسها سود . حمارها ييض . بطونها وردية



هَبَاتُ التُّوسَط



هَبُور



هَبِيل



هَبِيل اسود الزباني



هَبُور اقْرَن



هَتَدُصُولِي



غدي

اللد يطول نحو ٢٤ سم. رأسه حنوج بقترعة مستطيلة الرئش المنطقت على القفص والعتق. منقاده مخززي الشكل ، قليل الاحديداد . جناحاه مريضان قصيران . ذنبه مستدير الطرف . ساقاه متصلة الارتقا . ثوبه الى الشبية القلوية المواج . قترعة حاصية اللون . جناحاه موشمان بالاسود . قوادمه بعلمة بالابيض . الاثى عادمة القترعة || يدلن اقصومه في القربة بين الحماش المنطقة . الاثى تحضن وسعها من ٣ الى ٥ يفضلت يينا الذكر بين لما الطاء .

٢٠١٥٥ - **عَفْرِثَات** * Rhinchoetidae (S). Rhinchoetidae (F). Rhinchoetidae (E).

فضيلة طير من طولك الساق . اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة البلد جميعها من طيور قلدونية الجندية || اعرف اجناسها واشهرها الفنفوش .



فنفوش

٢٠١٥٦ - **عَفْرِثَات** * Gnathoceros (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحسريجات ، انواعها المرفوعة قليلة البلد . جميعها سيرة اللد فضيلة الشكل طويلا يراوح بين ٣ و ٤ سم . انوارها الى السرة السوداء المواج || يرقاتها مفترسة تدبش على المزاليل لتلهم الحوام ويكن الحماش .

٢٠١٥٧ - **عَفْرِثَات** * Gnathoceros (S).

جنس حناكب ساصبة قاصصة من الزبلاوات وفضيلة النوكايات . انواعها المرفوعة نحو ٥٥ منتشرة في معظم انحاء البلاد الممتدة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة اللد ، متكاثرة الجمل ، ممره اللون . فواقيها مستطيلة ضخامة . تدبش في البراري اللدقة وفي الثنايات . تسرح في الثبار . ضحها ستة لوزية الشكل تشبهها تحت الحجارة وفي تجاويف الاشجار وفي الجافة || قترتها الحشرات الصغيرة ونسبا الثنايات الذي تفطسه على كل حشرة .

٢٠١٥٨ - **عَفْرِثَات** * Gnathoceros (S).

جنس حناكب ساصبة قاصصة من الزبلاوات وفضيلة النوكايات . انواعها المرفوعة نحو ٥٥ منتشرة في معظم انحاء البلاد الممتدة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة اللد ، متكاثرة الجمل ، ممره اللون . فواقيها مستطيلة ضخامة . تدبش في البراري اللدقة وفي الثنايات . تسرح في الثبار . ضحها ستة لوزية الشكل تشبهها تحت الحجارة وفي تجاويف الاشجار وفي الجافة || قترتها الحشرات الصغيرة ونسبا الثنايات الذي تفطسه على كل حشرة .

٢٠١٥٩ - **عَفْرِثَات** * Gnathoceros (S).

هو الكرمية ، اطليا . وسها الحمار والجلية .



نطشوس

٢٠١٦٠ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S). Uropeltis grandis (F). Uropeltis grandis (E).

نوع من الضفائر ، حية يربض جلدة من فضيلة النوكايات . موطنها جزيرة سيلان . طويلا نحو ٦٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، جلد السيف . رأسها صغير . سطحها غروي . عيناها صغيرتان . ذنبها مقطوع الطرف ، ازور الحلف يندو كاهين . ثوبا الملوي الى الصفرة يميلو تدبج لولي اسمر . ابطاها ويندو الى الصفرة الباحة المنشة بالابيض والاخير || تألف المروج والكلبات . قترتها القادر والمظاء والتماين الصغيرة والحشرات والديدان .

٢٠١٦١ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S). Uropeltis grandis (F). Uropeltis grandis (E).

فضيلة حيات يربضة ، جلدة ، عادمة السموم ، لافونية . اجناسها المرفوعة سبعة ، اما انواعها نحو ٩٠ اعطيا تحت من الخليل الى الحد والصفرة جزيرية سيلان وجزر الزانج || اجسامها اسطوانية تطول من ٣٥ الى



غفلة

جلودية مسرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها المرفوعة ٢٥ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . قرية الشب من اللدنا . اوراقها سائمة متعاقبة . ازهارها سنبلي ، حامي ، كبر اللد || ازهارها عديدة الالوان ، انبوية الشكل الثلاثية التفرص يعلما تويع انبوي مستطيل ينثي بثلاث سبلجات ثنائية التخصيص . مايرها عديدة ثملوها سات دقيقة || تجود في جميع الارابة الغنية بالمواد العضوية لكنها تفضي المواق الباردة || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠١٥٨ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

Hedychium coccineum (S). Hédychie écarlate (F). نبات تزييني يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . بما فيه السبلية الزهرية . اوراقه فضيلة حزامية خلية التصل تطول نحو ٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ || ازهارها ابيضاتية اللون ، شريفاتها صغيرة مستديرة ، فضومها سبطية تطول نحو ٣ سم || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠١٦٩ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

Hedychium gardenianum (S). Hédychie de Gardner (F). نبات تزييني يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه فضيلة مستطيلة مدنية الزام الاخير . تصلها مائل البشرة يطول نحو ٥٠ سم || ازهارها صفراء اللون شريفاتها مستطيلة ، مايرها وسامتها حر || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠١٥٠ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

Hedychium gracile (S). Hédychie grêle (F). نبات تزييني يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقه دقيقة نميلة . اوراقه سائبة التصل تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم || سبلته الزهرية متدلية تطول نحو ١٦ سم . لون ازهارها الى الياض الموحج بالاحضر ازهارها يدوم طويلا شهر الجليل .

٢٠١٥١ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة افريقية كانت في الازمنة السليقة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغشقر واستراليا فانشقت وانقسمت من بعدها في الابهاج الثاني واصبحت كما هي الآن .

٢٠١٥٢ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

Ctenodactylus gundl (S). Ctenodactyle, Gundl (F). حيوان لوبن قاضي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدلافينات . موطنه اطراف الصحراء الكبرى من الغرب والقبال . جثته جثة الالب الصغير . يألف المناطق الصخرية الباردة اذناه صغيرتان . ذنبه جفحة كسبية . جزامه وريامة الاسباح انمازرة قوية ذرية . ثوبه الى الوردية السهباء بطة ابيض || قوته الاضباب والجلور .

٢٠١٥٣ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

حجر متبلور ثوري المصدر يكثر في الاراضي الاسلية .

٢٠١٥٤ - **عَفْرِثَات** * Uropeltis grandis (S).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفنفوشيات . موطنه قلدونية الجندية . يألف البراري والاحراج المبشرة بالاشجار . ملجته الخياطي حامي جماعته قليلة البلد . قوته الحشرات واللافويات وبعض الثار الندية والبرور || جسمه متوسط

٢٠١٦٧ - **غُتُوج** *
Melopsittacus undulatus (S).
Melopsitta, Perruche ondulée (F). **Budgerigar** (E).
 طائر وسيد الجنس والنوع من الببغاوات. موطنه بلاد
 أستراليا. تربيته منتشرة في معظم أقطار العالم. يأنف
 القمص لكنه لا يعيش منفرداً وإن عاش فلوثق بمحمد ||
 جسمه صغير اللد مستطيل الذنب الفيلق. ثوبه جميل
 الألوان، متركب الاخضر والاصفر والاحمر والبياض
 في لا ميل له يتحلى اربط الاذواق || قوته اللدن
 والقتيز والثار الناضجة والمفوف وأنس || الاثنى ثدثن
 عشها في تجويف جلع. حشفتها من ٤ الى ٦ بيضات
 تستمر نحو ١٥ يوماً.

٢٠١٦٨ - **غُتُوجَة** *
 في الطير، اطله.

٢٠١٦٩ - **غُتِيَاتِيَت** *
Goniattites (S).
Goniatite (F). **Goniattites** (E).
 جنس حيوانات من الرخويات رأسيات الاريل رباعيات
 الخياشيم وصليبة الثنائيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠
 جميعها من المتحجرات. احاديها تستمر من الحية
 الالفينية الى اواسر الكربونية || اصداها مكورة الشكل
 او مبطلة. قرية الشبه بالثنيات.

٢٠١٧٠ - **غُتِيَاتِيَات** *
Goniattitidae (S).
Goniattitidae (F). **Goniattitidae** (E).
 فصيلة من الرخويات رأسيات الاريل، رباعيات الخياشيم.
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، جميعها من متحجرات
 الحقبة التيفينية والكربونية من الاباج الاول المعروف
 بالقديم || اعرف اجناسها الثنائيات والتكليميت.

٢٠١٧١ - **غُتِيَمَكَة** *
Gouania (S). **Gousnie** (F).
 سمكة بحرية من شالكات الزعانف وصليبة الشطاريات.
 اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها
 صغير اللد، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير
 مستدير الخطم القصير. عينها ماحتان. زعانفها الظهرية
 والشرجية خفيفة، مستطيلة. الذيلية صغيرة، مستديرة
 الطرف. ثوبها الى الشقعة المنطقه بالاحمر || تتميز
 بمحسنتها الطافية الايليبسية الشكل التي تمكنها من
 الالتصاق بالاسر الصغور حيث تكمن واحدة تقوم
 فرائسها.

٢٠١٧٢ - **غُوتَاچِيَات** *
Cryptobranchidae (S).
Cryptobranchidés (F). **Cryptobranchidae** (E).
 فصيلة حيوانات قلزية من صف الصلفحيات ورتبة
 السرفقيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم
 اقطار العالم || جميعها ملققة الخياشيم، قاربة، تمش
 في البر والماء || اجسامها مستطيلة، رباعية القوائم
 والاصابع، اسفينية الفروس، مستديرة الميرون الصغيرة.
 امودها اعدو المستدل || قوتها اللدائن والحشرات
 واللوبيات.

٢٠١٧٣ - **غُوتَاوَكَة** *

Paullinia cupana, **P. sorbilis** (S).
Paullinie, **Guarana** (F). **Guarana** (E).

جنبة عمرة عاشره ملققة من فصيلة البينديات. مهدها
 بعض اصقاع امريكة الجنوبية انحصها البرازيل حيث
 يدعيها « غواركة ». منها الطوري شغلان الامازون

٦٠ سم. رؤوسها صغيرة. اعطائها متباينة الاشكال
 منها المنطقية والمستديرة والخرطوية. ميونها صغيرة. فكوها
 مستنة. اعطائها معدية. اقلها قصيرة. اقلها مرقوشة
 متراكبة الألوان || اشهر انواعها غنفر سيلان.

٢٠١٦٢ - **غُفُفَل** *
Fieraster (S).
Fieraster (F). **Fieraster** (E).
 المنطقه غفل وغفل جنس اسماك بحرية من الملساوات
 انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض مجار البلاد
 الخارصة والمتعددة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط ||
 اجسامها مبطلة مستطيلة كدية الشكل تطول من ١٠ الى
 ١٥ سم. زعانفها الظهرية قليلة العدد، قاطية، تمتد
 من الخلق الى طرف الخيل. اقلها تختلف مع الانواع منها
 الاصفر والاحمر والاصفر والاصفر والاصفر الباهت ||
 تتكفل حل كواكب البحر وثلاثيات البحر وتعيش في
 اقلها الحفصية.

٢٠١٦٣ - **غُفُفُوسِ الْقَتَم** *
Gnophos obscurus (S). **Gnophos obscur** (F).
Gnophos obscurus (E).
 حشرة من فصيلة الافريات ورتبة حشرقيات الاجنحة.
 موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط
 والاندل وادوية. فرائسها جارية قوتها رقيق الازهار.
 سرتها خافضة قوتها اوراق النبات || جسمها نحيل نصيف
 يطول نحو ١١ مم. بطنها نحو ٣٠ مم. رأسها اريد احمر.
 عينها صغيرتان. زعانفها غبيطان. جوتها وبطنها الى
 الرتبة السراء المولج || ورشها الاماميان الى الرتبة
 اعطائها تمسح اكهب وثلاثة عطلوط مغرقة وسط متقطع
 جميعها الى السرة. حادها الخارجي مغرقة سباب الاسنان.
 ورشها الخلفيان الى الرتبة اعطائها غطان مغرقة اسمران
 وسط حادري شديد السرة. حادها الخارجي خامس
 للفروس || لها جليل واحد في الخلق. تظهر الفرائس في
 حمور وثني حتى ايلول. تسرح من السمر الى فحة الليل.
 تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان محادياً
 حل الصفحات السفلى من نصال الاوراك || السرعة تطول
 نحو ٢٤ مم. جسمها شبه مدققي الشكل. ثوبها يلائن
 البيئة التي تعيش فيها وهو يراوح بين الاخضر والاحمر
 والاريد المرقوش بالاسر تملو ثلاثة عطلوط قاطية. جميعها
 الى الجورة. رأسها اسود. راجعها البنية الوسطى ماحتة
 مما يجعلها تنحوس منه الانتقال || طور الاكمال الذي
 يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في الاجلحة ضمن صلبة
 مهدلة الشباك.

٢٠١٦٤ - **غُفُفَم** *
 قال الجوهري: « القتم اسم ملقث موضوع الجنس يقع
 حل الاكوار والاثاث ». ولقتم لا واسد له من لفظه
 والجمع اثمم واغامم وقنوم. اطلب شأن.

٢٠١٦٥ - **غُفُفَمِيَات** *
Ovidae (S).
Ovidés (F). **Ovidae** (E).
 فصيلة من مزدوجات الاصابع المقيرات يقسمونها الى قسمين
 السائبة والمزمنة.

٢٠١٦٦ - **غُفُفَمِيَد** *
Ganyimede (F). **Ganyimede** (E).
 احد اقار المشتري. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون
 الثاني ١٦١٠ دورته الكوكبة حول المشتري تستمر ٧ ايام
 و٤٢ دقيقة ٣٦ ثانية.



غنفرس أتم



غُتُوج



غُتِيَاتِيَت



غُفُفَم

بارزة العروق المتوازية . نصلها مالم بشرة الصفحة العليا ،
خلل الشغل ، طري الرائحة ، يستعمل كالشاي وينشط
الحضم || انزعافها يضاء اللون ، طرية العروق المستطب .
ثمادها اجناسية الشكل تنقل من ٣ الى ١٠ سم . لها اصفر
اللون وقد يكون ابيض او وردي او برتقالي في بعض
الضروب || غروبها مدينة . ثمارها مشطرة على السلسل
اللباني من صور الى طرابلس .



غواطة

٢٠١٧٨ - غواطة نفاحية ، غواطة حنجر

Psidium pomiferum, *P. guayava pomifera* (S). *Goyavier* pomme, *G. rouge* (F). Apple shaped guava, Red guava (E). Apfeltragender Guava, Rote Guava (D). *Guayava rosso* (I).

نوع من الغواطة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٣ الى ٦ أمتار . تميز في غلاف الازرق الرملة والبيضاء . ثمارها نفاحية الشكل مأكلة لثقا اقل جودة واغزر مادة وانتجية من الغواطة الاجناسية .

٢٠١٧٩ - غواطة ٥

Agave

حشرة من الغواطات صغيرة لثقا تنقل مع ريقاتها على دبا الذباب . جسمها منزلي الشكل ، ازرق اللون عند الذكر ، اسود عند الانثى . رأسها مستطيل . زباناها دقيقتان صولجانان . اجنحتها شققة ، قليلة العروق والاعصاب ، تزينة اللون عند الذكر ، وردية عند الانثى . جوفها مسم . بطنها مستطيل مركب من سبع حلقات وربعيات تنتهي بالزوائد التسالسية . اشربتها مستقيمة مدبة الوحز .



غواطة مقطع الشرة

Guano

سماد ازرق في فسفوري حصل من تجميع وتراكم ملح الطيور البحرية رجمة من الزنق في بلاد الفيل وبابرو وغيرها من بلدان امريكا الجنوبية . وهو من انشاد الاسمدة الازرقية وقد وجد حيزه الان بد استنزاف منظم وكماه .

٢٠١٨١ - غواكو اخفاش

Guano de chauve-souris (F). *Guano of flietarmouse* (E).

نوع من الغوانو يوجد في الفاور والكهوف ، يكثر في الجزائر والاندلس .

٢٠١٨٢ - غواكو السمكة

Guano de poisson (F). *Guano of fish* (E).
نوع من الغوانو يصنع بمعالجة بقايا الاسماك بالمخاض الكبريتي .

٢٠١٨٣ - غواويات ٥

Aganoides (S). *Aganoides* (F).

فصيلة حشرات من رتبة شحاليات الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نائمة تنقل على بعض الانواع النباتية اعصابها البنية وصل بعض الحشرات الفاصرة من ذوات الجناتين || حشرات صغيرة لثقا طويلا يروح من ١ الى ٥ ميلتر . اجسامها رجمة . زباناها صغيرة دقيقة . اسرارها رباعية المقل . اثنائها يتاينة الايلوان بين الذكور والاناث || اشهر انواعها الغواطة ذكازك التن .

٢٠١٨٤ - غويرو ٥ ، ميستكوب ٥

Mystacope (S). *Mystacope* (F).

خفاش وسيد الجنس والرقع من عمارة الحشرات . موطنه زيلته الجديدية يتميز بطول جسمه للسليطة التي تمكه



غواوة

وقد انتشرت زراعيا في بعض المناطق الحارة الرطبة ||
ساقها مستطيلة كثيرة الاغصان المتينة . اوراقها متعاقبة ،
مركبة ، وريقة التجميع . وريقاتها اعطليجية النصال
الجامدة ، ناشرة الشغل والعروق . انزعافها عقدي
التجميع ، عوردي الازتكاز . انزعافها يضاء اللون ،
خداية التفصيل ، رداية البلات ، ثمانية الاسدية . ثمارها
جراة عجمرة . ثلاثية الزوايا والثلث المستطيلة تحضم من
عصا الى ثلاث عصيات فيه مكررة الشكل تنقل نحو
١٥ سم . وطه العجيات التي تحوي نحو ٥ ٪ من الكالكين
تستعمل بالتجميع استعمال البين او لتحضير بعض
انواع الشراب المشع الثلث الانتهاك في البرازيل .

Gnass (S).

Gnass (F). *Gnass* (E).

جنس حيوانات بحرية مقوسة من الرغويات واسيات
الانجيل . مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة
الودوسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار
القطبية || اجسامها اسطوانية مستطيلة . زعانفها طرفية
كافية الشكل . رؤوسها شبه مكررة . هوبها ماصة .
جرامزها عجمرة متساوية الطول باستثناء الزوج القيق الذي
يبلغ طوله نصف طول الجسم والاني ينتهي برسي سنانية
الشكل تملوها الكالكين في اقزام الاول ، والهام في
الزائين الثالث والاخير .

٢٠١٨٥ - غواص

Graba (F). *Graba* (E).

هو الغواص من طير الماء وكيفية سيده انه يوصف في الماء
منكبسا بوق شديدة ويمكث تحت الماء بعض الوقت ،
نحو ٨ دقائق ، الى ان يرى شيئا من السمك فيأخذه
ويصمده به || قال بعضهم : رأيت غواصا خاص فقلع
بسكة فله غراب طليها فأخذهما منه ففاس مرة اخرى
وطلع بسكة اخرى فأخذهما منه الغراب ثم الثالثة كذلك
فلما اشغل الغراب بالسكة وثب للغواص فأخذ يرسل الغراب
وفاس به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج هو من
الماء .

٢٠١٧٦ - غواطة ٥

Psidium guayava (S). *Goyavier* (F). *Guava tree* (E). *Groaze gelbe* *Guayava* (D). *Guzajava*, *Paidio* (I).

جنس الشجار وجيترات مشرة برية وزراعية من فصيلة
الاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منها الاسلي امريكة
الاسطوانية وجزر الانجيل . اوراقها كاملة متعاقبة بارزة
العروق . انزعافها عوردي الازتكاز ثنائية او ثلاثية
التجميع . قصيرة الزناد ، خداية البلات البيض . ثمارها
نورية حلرة راتنية مأكلة ورطب || تتكاثر بالبر
والتمثيل والقصم . الفرة الناجية من برة تشر بد فرسها
في مستقرا بادع سنوات ويستمر نموها حتى عمر ١٥
سنة ثم يستمر سللا الى ان تبلغ ٢٥ سنة حيث ينتهي
دور الانحطاط والقماعة || وفي ترب في الاربة
المترصة الانحطاط ثنية بالناسر الثلاثية والاراد البديلة .
اشهر انواعها الزراعية : الغواطة الاجناسية والنفاحية .

٢٠١٧٧ - غواطة اجناسية ، غواطة بيضاء

Psidium piriferum, *P. guayava pirifera* (S). *Goyavier* *poire*, *G. blanc* (F). *Pear shaped guava*, *White guava* (E). *Blaufrüchtige Guava*, *Weisse Guava* (D). *Guajava* *blanco*, *Guayabo* (I).

نوع من الغواطة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٤ الى ٨ أمتار . فرسها رافنداه مسجلة . اوراقها سنانية الشكل



حور

من جمع جنسها في ثنائيا. يطير ويسير على الأرض ويسبق الإخبار بدين تردد || يعيش منفرداً || الذكر لا يقرب الانثى إلا عند الكرم . يسرح في أوائل وواخر الليل . قوته الحشرات . يألف تجاريف الإخبار وأوراق الصنوبر واللغاور والكهوف .

٢٠١٨٥ - حُورَة *
Scolopsis (S). Scolopsis (F).

سمكة بحرية يبيض من شالكات الزمانف وصيلة الفرغيات. أعطانها تحت من البحر الآخر الى المحيط الهندي . قلا تقرب من الشطوط الرملية إنما يكثر وجودها قرب المالحح || جسمها اعليدي الشكل بطول نحو ٢٢ سم . رأسها حدير القدر وسطها كذلك . عينها كيرتان ، جاحطتان . زعنفتها الظهرية وحيدة ، مستطيلة ، متساوية الارتفاع . زعنفتها الخيلية فائقة . ثوبا الى الريكة القضيبة يبقى في الظهر ويسير في الليل . ويصلها ثلاثة خطوط وريدية جانبية قاطعة وسط ابيض القبي السرار تحت من مقدم العلم الى قاعدة الزعنفة الصدرية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٠١٨٦ - حُور تايو
هو الرور : نبات من الخنجنيات ، اطله .

٢٠١٨٧ - حُورَة ثَلَاثِيَة النَط

Limnobia tripunctata (S).
Limnobia tripunctata (F).

حشرة لافظية من فصيلة الغوريات . جسمها صغير القدر بطول من ٧ الى ١٠ سم . رأسها شبه مكور الشكل . زباناها عظيمان ، اسمران . صدرها صناعي طعوب جددة تقسية سمراء . بطها الى السرة الصناعية . زعنفتها ثلاثيا النط السمر || الانثى اكبر قدماً من الذكر . ترز مكنتها في التربة ليخفف من يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة .



غورل

٢٠١٨٨ - حُورَة صَفراء
Limnobia lutea (S).
Limnobia lutea (F).

حشرة لافظية من فصيلة الغوريات . جسمها صغير القدر بطول من ٦ الى ٩ سم . رأسها شبه مكور الشكل . زباناها عظيمان ، اسمران . ثوبا الى الصفرة الصناعية المواج . زعنفتها كيرتان غضبان بالاسفر والوردي والاعضر . مرتعها المالحح الثلثة والحدائق والبساتين || الانثى اكبر قدماً من الذكر . ترز المكان في التربة ليخفف من يرقات تعيش على المواد العضوية والنباتية .

٢٠١٨٩ - حُور تايو *
Limnobiidae (S).
Limnobiidae (F). Limnobiidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المبرقة عديدة ، معظمها من علم الاثام الباردة تعيش على رحيق الازهار والفرزات الاروق . يكثر وجودها في الغابات وقرب مجاري الماء || اجسامها غيلة . رؤوسها مكورة ، صغيرة ، قرونها الاستمدادية غليظة . قوائمها مستطيلة ، قصيرة || يرقاتها خاضعة او داتنة او زائجة . جميعها تنفخ في التربة في زين الاكمال وتلتصق بصلبها فقرز نواصها فعد خاصة في مقدم الجسم .

٢٠١٩٠ - حُور ل *
Aegothales (S).
Aegothales (F). Aegothales (E).

جنس طير من فصيلة البديروسيات . انواعها المبرقة خمسة



عوجمة صغيرة

موطنها بعض مناطق الشرق الاوسط والاهسى . تسرح في الليل وتبيت في التهار على الاشجار || اجسامها مستطيلة القدر بطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها مستعرضة مغلطة . عينها كبيرة . سالما كيفة . مناقبها غروبية الشكل ، واسعة الاشداق . اعناقها قصيرة . اجنحتها متدلة الطول ، ذلقة الاطراف . اغخابها مقلوبة . الثوبا الى الباردة تملونا رقة سمراء وتنسج اسود تحت ح الحراف الابنية || قوتها الحشرات وبعض الثمار والبذور || تدفن في تجاريف الاشجار . اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوية الذكر نحو ١٧ يوما .

٢٠١٩١ - حُورَة صَغِيرَة *

Trachys minutus (S). Trachys menu (F).
Trachys minutus (E).

حشرة خاضعة من فصيلة الزنقينيات ورتبة مفدمات الاجنية . تألف المالحح الربطية وضفاف مجاري الماء . غناتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف . يرقاتها مرقاة تلم تصال الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القدر بطول نحو ٣ سم . ثوبا الى القسرة السوداء يملوها مواج يتنسجي . رأسها غروبي الشكل . عينها كيرتان جاحطتان . زباناها صغيران دقيقان . ظهرها غصنور الوص . مستدير الطرف للاصف . اداسها خاضعة المغل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الصيف . تسرح في التهار . تساهل بعد ظهورها بثلاثة اسابيع . ترز المكان في نصال الاوراق || المبرقة عند بلوغها الاذراك اتمام تطول نحو ٥ سم . جسمها اسطواني الشكل ، عام الراسب ، قسيب التأثير الشفوية ، تبي اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في الجلالة ضمن صلبة خيارة النشاء المركب من مواد نباتية مسجولة بالاريا .

٢٠١٩٢ - حُورَة صَغِيرَة *

Godetia (S).
Godetia (F). Godetia (E).

جنس نباتات عشبية حولية سريرية مغالية من فصيلة الاسفريات . اوراقها متناوبة بسيطة . ازهارها عنقودية التجميع ، رباعية الفصص والبتلات ، ثمانية الاسدية ، غتلفة الاوالان || انواعها المبرقة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٠١٩٣ - حُورَة صَغِيرَة كَبِيرَة الزهر *

Godetia grandiflora (S).
Godetia à grandes fleurs (F).

نوع من الفوسية . عشبة تزيينية سريرية مغالية هريمية الشكل . سقها موقفة تملو نحو ٤٥ سم . اوراقها سنائية ضيقة . ازهارها سنيلي التجميع . ازهارها كبيرة القدر ، طورها من ٨ الى ١٠ سم . ثوبا الى الحشرة الصفراء المواج ومنها ضروب يبيض . ويرقشها باليليكي || تنويرها صيفي .

٢٠١٩٤ - حُورَة صَغِيرَة مُسْتَحَبَة *

Godetia amena (S). Godetia plaisante (F).

نوع من الفوسية . عشبة تزيينية سريرية مغالية . سقها موقفة تملو من ٤٥ الى ٦٠ سم . اوراقها سنائية النصال . مسنة الحار . ازهارها سنيلي التجميع . ازهارها عديدة الاوالان التي تخلف مع الضروب منها اليكي والاحر الحصري والوردي والابيض والورقوش بالابيضوال || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

۱۹۰۲ - ۲۰۲۰

Goodenia (5).

Goudenia (F). Goodenia (E).

جنس ثباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة النورديات .
أنواعه المعروفة نحو ٧٠ مهدداً إسرائيلياً || جميعها عشبية .
المعمرة منها مخشوشة الساق . أوراقها متمتقة ، مستطيلة .
معظم أنواعها علفية .

۱۹۶۰-۲۰۰۰ء کی دہائی

Goodeniacae (5).

Goodeniaceae (F). Goodeniaceae (E).

مفصلة لتأني من ذوات اللقطين متحدة العلات منخفضة
المضى. اجسها الحارة ١١ ما انزواها فاكتر من
١٥. اعطها بعض الاصطراع الحلة الاسيرة والارنيكية
في نباتها عشية حولة ومحولة لاسيرة. اوراقها
متعالية، بسيطة، انزواها متحدة الرحات. توجها
مزدوجة، خماسية الازواج، مفكها جازلة.
يحبها النمل، عديد البويضات. القدام لبات
مزدوجة، يتكون تحت مسها القائي القص تزايه بلرمي
الشكل اعطها اطار من الزغب الهلي التركيب والشكل
اجسها البون.

٢٠١٧ - ٢٠١٨

Bibos gaurus (S).

Gaur, Boeuf gaur (F). Gaur, Indian bison (E)

نوع من ابقار الوحش ، موطنه يمتد من بورما الى شبه جزيرة ملقة . يعيش في الاحراج الغنية الكثيرة الشب . طوله يراوح بين ٣٠٠ و ٣٢٠ سم . وارتفاعه ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبه الى السمرة العالقة . قوامه يمش . حاروكه مستطيل دقيق بارز . اجله لا يقاسي المدد . راوسه من ٥ افراد ال ٢٥ فرداً .

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م.

Osphronemus olfax (S).

Osphronème de la Sonde, Gourami (F).

فوهائي هو الاسم المألوف. سمكة متفحمة من ثلاثيات
الزوائد البصليات المتفحمة وفضيلة الحساكيات. اصطناعها
المنطق واللباس والاهوار الكبيرة في ماليزيا وجاوا
وسومباوا. جسمها كروي القدر يتراوح بين ٢٠٠ سم.
ورأسها شبه غربي الشكل، فمك الخشن الضخم. زعنفتها
الظهرية كبيرة المنحس، مسطحة الشكل، تمتد إلى
الزوراء. زعنفتها الحوضيات ضيقة تنحصر بمجرى
مضغضفين باطن العائل. الشرجية مسطحة، ثلاثية.
اما الذيلية فهي مربعة. توجد في السمرة الحمراء اللحية
المزاج لمعها في ظهرها تجتمع معتزس أسود. بطنها فضي
اللون مغلف بالاسمر. لحمها فاخر الصنف مرفوف
ذو كثرة الحساك.

۲۰۱۹-۲۰۲۰

Gaura (S).

Gaura, Gaure (F), Gaura (E)

جلس لبيانات صحفية «إقليمية» ، حولية وبحوثية وعمرة ، من
فضلة الاندريات . أنوعها المخرقة ٢٠ . جها
أركية الهـ . مطها بري ومضها ترضي . سها
متنصة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . فروها غمره
جالة . أروها شاقبة : السفل من ردية غمره ،
الوصل الحليمية غمره : أو العليا لسانية التصلال الباقية
الانصار . أروها مجموع من المال الكلفة الانكزار .
أنوعها رامية البليات الانكسارية . استنها لآلية أو
رامية قرزية اللون . تروها غمره
ترض في الأتربة السوسلة الانداسم تحق التفتيل ما



نحوہ



طوری



ظهور فيرجنية



شورلی



ملفوظات



مخبر

القد ، طويلة الزغب ، زرقاء اللون أو بيضاء . يزور
الزنبق ، ويتكاثر بالبذور والعقل . تكثر مشالته في أذار
ونيسان وتنتقل الشتلات مستقرها إلى أواخر أيار فتعبر
بعد قرف ورووس سويها . أما العقل فتعبر في آذار ونيسان .
والنولان يرغب في الأثرية البليانية الجسيمة المعرعة للشمس .
وهو لا يتطلب عناية خاصة وجل ما يجب الانتباه إليه
هو مكافحة الآفات عند ظهوره لانه يتعصن نسج الأوراق
ويؤذي النبات . يكالغ باستعمال مركبات النيكوتين
وتغيرها من الحواشير القمالة .

٢٠٢١٤ - غُولَان طَيَّاسِي (S). *Ageratum conyzoides*

Ageratum fausse-conyze (F).
نوع من الغولان ، وهو عشبة ترابية حولية جادة .
ساقها فراء ، حرمية الهيكل ، ولتهية الجمل . اوراتها
بيضية التصل للمسح الحافة . ازهارها صغيرة القد ، زرقاء
اللون . ازهارها يستمر من حزيران إلى تشرين .

٢٠٢١٥ - غُولَان فِرْدَوْسِي (S). *Ageratum corymbosum*, *A. celestinum*

Ageratum celestinum (F).
نوع من الغولان ، وهو عشبة سريرية ترابية تملحو
٨٠ سم . اوراتها منتنة . فصلها قلبي القاعة ، يغطي
الصنفحة المائلة . ازهارها حليلة البشرة ، زرقاء اللون .
ازهارها يستمر من حزيران إلى اواخر تشرين .

٢٠٢١٦ - غُولَكَا ، وَغُون (S). *Lama vicugna*

Vigogna (F). *Vicuna* (E).
غُولَكَا هو الاسم الشائع في بوليفيا والبيرو . نوع من
اللاقة ، حيوان لين عاش من فصيلة الجمليات . موطنه
جبال بوليفيا والبيرو من ارتفاع ٣٠٠٠ م . فصاعداً ||
جسمها رقيق القوام بطول نحو ٢٠٠ سم . ويرتفع نحو
١٠٠ سم . وبرها فاخر الصنف ، خالي الشن || الاثن
ثلاثة الاخلاط . عضلها يدوم نحو ١٧٠ يوماً . الجاذب
من النولكا يستعمل لدر الحليب ولنقل الاتقال .

٢٠٢١٧ - غُولِيَرِيَّة (S). *Gunnera*

Gunnera (F). *Gunnere* (F).
جنس نباتات عشبية دماحة مسرة دماحة من فصيلة
الغوليريات . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق
الحارة . اوراتها قرصية الانتشاح ، منتنة ، كبيرة القد ،
مفصصة ، قلبية القاعة نصلها بطول من ٣٠٠ إلى ٣٠٠
سم . ازهارها صغيرة القد ، متبيلة التجميع ترتكز على
شراخ يعلو من ٦٠ إلى ٤٠٠ سم || جميع انواعه دماحة
خزيرة النسخ . جلودها واوراتها مضادة للجفاف . تقشورها
صبيبة . صباغها اسود اللون .

٢٠٢١٨ - غُولِيَرِيَّات (S). *Gunneraceae*

Gunneraceae (F). *Gunneraceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين .

٢٠٢١٩ - غِيَاب ، غِيَابِي (F). *Contumace*

Contumacy, *Default* (E).
هي سالة المكلف بالحضور امام المحكمة وقد تخلف اما
جهلاً او عمداً فاقصر في سالة غياب وتسبب عليه غيابياً .

٢٠٢٢٠ - غِيَابَات (F). *Pogonophora*

Pogonophora (E).
الغياطات فئة حيوانات بحرية دودية الشكل كثيرة القوس .

الزقة السوداء . سباله كثيفة مستطيلة سوداء اللون .
مقناده ذريب المقطع المحبب ، واسع الشفق الرصب ، لونه
الى الطلحة تلميحاً مابية حراء . ساقه الى السرة الزيتية
المرج || طيرانه غطيف الحركة ، متثل الشيط ، كبير
التخليق || قوته الثار والبورو وبس الحشرات الكبيرة ||
عنه اخصوس يديره انبا كان بين تخاليف حضور الكهوف
والقارور . الاثني تسع من يبيضن الى اربع يبيضات
تحضنها بمناولة الذكر نحو ١٨ يوماً .

٢٠٢٢١ - غُولِيَرِيَّات (S). *Scatormithidae*

Scatormithidae (F). *Scatormithidae* (E).

فصيلة طير من الجرام مشقرات المناظر . اجناسها وانواعها
الحروقة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكة الوسطى ||
طيرها كبيرة القد تتميز بمناظيرها الفضية الشبه مشورية
الشكل ، وباجنيتها المسطلة || سرسها دجوي يستمر
من القروب الى الشجر . قوتها الثار والبورو || اعرف
انواعها بواشرا النشار .

٢٠٢٢٢ - غُولَب (F). *Amblypyge*, *Phryne*

جنس حناكب ولية من الزوطيات . تتميز بجملها من
مؤخر الجوف وبطنها المركبة من ١١ سكة . اجسامها
صغيرة ، مسطلة ، عادمة الحدية ، تطل نحو ٤٥ م . ||
موطنها يشمل معظم اقطار البلاد الحارة .

٢٠٢٢٨ - غُولَفَت (S). *Helvels phalloides*, *Morchella esculenta*

Helvels phalloides, *Morchella esculenta* (S). *Hel-*
vella, *Morilla*, *M. de moine* (F). *Morrell*, *Bishop's*
mitra mushroom (E). *Spelasma* (D). *Spugna* (F).
جنس فطور مأكلة من فصيلة الغشاريات ورتبة الزوطيات .
انواعه عديدة جميعها صالحة للاكل لكنها تختلف حسن
بعضها بمجدة الطعم وبشكل الحجم .

٢٠٢٢٩ - غُولُط (F). *Benthos*

Benthos (F). *Benthos* (E).
فوط ج افراط . اسم يطلق على الاحياء البحرية المختلفة
الاياد وكل الكائنات الحية الثابتة والمتحركة التي تعيش
في هذا المحيط . فن الكائنات الثابتة تذكر الخليات
والاسفنجيات والفوكيات والعلمليات ... ومن الكائنات
المتحركة فخص بالاكل البهتان والمشتربات والصفيحيات
الخياشيم والمديات والنباتات ...

٢٠٢٣٠ - غُولُطِي (F). *Benthique*

Benthique (F). *Benthic* (E).
لعت تعريفية يطلق على الاحياء البحرية وكل الكائنات
الحية التي تعيش وتتكاثر في هذا المحيط .

٢٠٢٣١ - غُولُور هو البليغ افرنجي .

٢٠٢٣٢ - غُولُ هو النورل ، اطليا .

٢٠٢٣٣ - غُولَان ، اَجِيرَكُوم ، قَتِيَّة

Agerstem (S). *Agérata*, *Agératum*, *Célestine* (F).
Goat weed, *Bastard agrimony*, *Floes flower* (E).
Laberbalzam (D). *Agérata*, *Célestina* (I).
جنس نباتات عشبية حولية او مسرة من سبط البفنجيات
وفصيلة المركبات . انواعه عديدة مسطها بر . سويها
فراء . اوراتها السفل والوسطى متعابله اما العليا فتناقية .
ازهارها شكلوي التجميع ، هامي الارتكاز ، طويل الامة
يدوم من اول الصيف الى اواخر الخريف . ازهارها صغيرة



غشِب



غشبة مرسية (١)



غشبة مضامة (٢)



غشبة مجدة (٣)



غولان



غولان



غشبة



فيل باهت

زبانها مشطيان قصيران. جشها مستطال المخنر. بطنها اسطواني الشكل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في القبار. تماثل بعد ظهورها بمدة وسبعة فراوح من بين الى اربعة ايام. تنجع المكن مباحدا على سوق الثبات وفرويه || قسرة تقول نحو ١٢ م. جسمها اسطواني الشكل، اسر اللون يميلو تنقيط اسود وريشة صفراء. رأسها كسني اللون. رواجبها الصدرية شديدة البنية شديدة القصر عجمية الاطراف. تلحف بطنها باغشية غروية للمادة تملأ شكل القرباب لتصلق بها فئات الصانع والارواق والقشور و طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوما ينتهي ضمن قرباب السرة. الذكر يترك القرباب ويطير اما الانثى للمرأة فلا تخرج القرباب الا عند التماثل ولا تود اليه.

Psychidae (S).

٢٠٢٢٩ - عَنَكة النيات

Psychidae (F). Psychidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حشرقيات الاجنحة. انواعها المروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم. تسرح في القبار. طيراتها خفيفة الحركة، كثير المرقعة والحرم || اجسامها صغيرة. قسيفة. ذكورها جنسة. انثاها مدار. عضيها جرداء. قوتها الاستعمارية مشطية مزدوجة. ملابسها شديدة القصر. مراففها اربعة. حلماتها خير موسمية. بطنها كثيفة الخمل. ورأسها صغيرة. مستديرة الاطراف، قليلة الحرافش البشرة. سوية الاالوان. جرماتها تامة النسو، غنايتها الخلفية ثالثة للنحس أو رواجبها || اساميهج عرواطة انما يلحف بطنها اغشية غرائية الماددة يخرج منها فئات الصانع والارواق وكل ما يلتصق بها || عاداتها طليقة تتصور ضمن غلات السرة || اشهر اجناتها العبدانة والكنكثرة.

٢٠٢٣٠ - عَنَكة المتوسط

Gades mediterraneus (F). Gade mediterranean (E). Mediterranean gades (E).

سكة بحرية يعيش من فصيلة الناصيات ورتبة للسلوات. اصطنها معظم اقالم البحر الايش المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تنجر من الاسماك البنية. لا تقرب من الشطوط والهادج الا في زين التسرة. لمنجها الحيائي كرسومي. اسرناها وافة المدد || جسمها اعليجي الشكل، مستدل التغطيل يطول من ٢٢ الى ٢٧ م. حراشها صغيرة رقيقة. ثوبها الى الريدة الرصاصية القسفية المواج تبق في الظهر وتنبير وتبيش في البطن. زعانفها الى اخضر البشري. خطها الجانبي جاسي الامتداد الاقني || رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخمل. فكها الاعلى يعمل في مقدمه جديتان دقيقتان. واكله الاسفل يعمل ملية واحدة عينها كيرتان بارزتان، ابرجرتان، زعنفتان الظهريه واحدة، مستطيلة، رقيقة المقدم || لها عوصال الصف، مأكول.

Liberalité (F). Liberality (E).

٢٠٢٣١ - عَنَكة

التيقة العلاء بسخاء وبسيرة.

Parthénogenèse (F).

٢٠٢٣٢ - عَنَكة

Parthenogenesis (E).

التيقة وكعى ولادة الطاري، فسح تناسلي تقوم به بعض طاردي الحشرات والطيريات الدنيا في زين قوم من حياتها اذ ان يوفضاتها تتصور وتقتف كال و انما كانت

٢٠٢٣١ - عَنَكة هو غشب القنصين، اعليه.

٢٠٢٣٢ - عَنَكة عَنَقي هو حيد الانبياء، اعليه.

٢٠٢٣٣ - عَنَكة

Scarus stellatus (S).

Scarus stellatus (F).

سكة بحرية من بنات مصفار يقال ان لها يولي في بعض فصل السة وذلك عندما ترى زيمات المرجان. وهي من اسماك المتوسط والخليج.

٢٠٢٣٤ - عَنَكة باهت

Polyptera diluta, Asphidia diluta (S).

Asphidia diluta (F). Polyptera diluta (E).

حشرة من فصيلة الشربقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحارة من الفرق الاوسط والاولد واروبه. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقتها تمش على اوراق السديان || جسمها صغير قسيف يطول نحو ١٢ م. بطنها نحو ٢٢ م. رأسها اسر. زبانها كيرتان. زبانها غشيان مستطيلان. جشها وربطها الى الحطلة الخطية المواج || ورشها الاماميان الى الحطلة الحطية تملؤها جدتان مترسختان بينتان وخسة خطوط متبرجة حطية. ورشها الخلفيان الى الحطلة التبراء البيضاء المواج. اهدابها الى الصبة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في آب. تسرح من القرباب الى فسة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنج المكن مباحدا تحت القشور اوبين شقوق الماء || السرة تطول من ٢٤ الى ٢٧ م. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطال الرأس والسكة الصدرية الاول. ثوبها الى الحطلة السوداء يعلوها خط بني قاطبي اسود وخسة خطوط جانبية، نخيلة، مشرعة، صفراء اللون. رأسها يبيش الشكل، كسني اللون، مدبسا ورواجبها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن صلبة تنجها السرة بين شقوق الماء.

Plute abundantia (F).

Abundant rain (E).

٢٠٢٣٥ - عَنَكة

النيث : المطر الجرد الكثير.

٢٠٢٣٦ - عَنَكة عَنَقي

Orbicula (F). Orbicular (E).

نمت ترمي في يطلق عل ما هو موسمي في جميع اقشار العالم.

٢٠٢٣٧ - عَنَكة

هو ولد الفس وهو اكبر من الحسل.

٢٠٢٣٨ - عَنَكة سوية اللون

Psyche unicolor (S). Psyche unicolore (F).

Psyche unicolor (E).

حشرة من فصيلة البديديات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبه وافريقية الشمالية. فراشها عجيبة تمش على مخزوبها الامدائي. حرجها خاضة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية والحمولة || ذكورها جنسة انثاها مدار. جسم الذكر صغير قسيف يطول نحو ٦ م. بسطه نحو ١٩ م. رأسه الى الخلفي الاسمر. عيناه صغيرتان. زبانه مشطيان مزدوجان. جشته وبطنه الى الخلفي الاسمر المواج. رواشته حطية اللون، صمراء المواج || الاثى ممرعة تقول نحو ٩ م. ثوبها الى الخلفي تملوه ريشة سوداء. رأسها صغير الجرم. عيناه صغيرتان.



فيس المتوسط

Glaucomyidae (S). - غَيْكُفِيَّات ٢٠٢٤٧

Glaucomyidae (S). Glaucomyidae (E).

فصيلة حيوانات مائية بحرية ونهرية من الرغويات صفيحية الخياشيم. أنواعها المعروفة نحو ٢٠٠ يجمعها جنس واحد || أعطائها مصبات أنهر الخند والعين وباليزيا. تعيش منفردة في الأسماك والريال. أجسامها صغيرة. أصدافها مثاقية المصاريح، شبه أحلجية الشكل، عابقة الألوان التي يكثر فيها الأخضر المتفاوت الماهجات || جلستها الوحيدة يدعى الغيشر.

٢٠٢٤٨ - غَيْشُ ، نَقْصُ الْقِيَمَةِ

Moins-value (F). Inferior value (E).

هو انخفاض قيمة الشيء بين زيتين .

Tare (F). Waste, Damage (E). - غَيْشُ ٢٠٢٤٩

خسائر اللوازم من خيل وبقر وغيرها كثيرة أهمها ما يمتري قوائم الخيل وسببه تمدد الفشاء الآسي في المفاصل . وفي حل زيتين :

Tares molles (F). Soft wastas (E). - غَيْشُ رَاحِط ٢٠٢٤٩

تتصلب من تمدد الفشاء الآسي في المفاصل . منها غيـش الحوشب والمرقوب .

Tares dures (F). Harsh wastas (E). - غَيْشُ طَلِيَّة ٢٠٢٤٩

تزيادات أو انتقارات تعود لذات السبب . منها الجرد والخصس والمزلن والمشش .

Molette (F). - غَيْشُ الْحَوْشَب ٢٠٢٥٠

Wind-gall (E).

انتفاخ رخو مفصل أو وري سببه الاجهاد .

Vessigon du genou (F). - غَيْشُ الرُكْبَةِ ٢٠٢٥١

Vessignon of the knee (E).

ورم رخو مفصل أو وري يحصل في بعض أنحاء الركبة .

Vessigon du jarret (F). - غَيْشُ الْعُرْقُوبِ ٢٠٢٥٢

Vessignon of the hough (E).

ورم رخو مفصل أو وري يحصل في بعض أنحاء العرقوب .

Eponge (F). Heel (E). - غَيْشُ الْمِرْقِ ٢٠٢٥٣

هو انتفاخ رأس المرق عند الخيل .

٢٠٢٥٤ - غَيْمَةُ

غابة تكثر فيها الرطوبة أو جداول الماء .

٢٠٢٥٥ - غَيْطُ هو الخغل ، الحلبه .

٢٠٢٥٦ - غَيْطَلُ اطلب هرقلة ناقة .

٢٠٢٥٧ - غَيْطَلَةُ

الغيطلة : البقرة الوحشية . وقيل البقرة مطلقاً تسمى غيطلة في زمن العرب . ج غيطائل .

Bande d'oiseaux (F). - غَيْشُ ٢٠٢٥٨

Flight, Flock (E).

الغيف جماعة الطير . والرف كذالك والسرب أيضاً .

٢٠٢٥٩ - غَيْشُ

Fourré (F). Thick (E).

شكل من أشكال المراج .

٢٠٢٦٠ - غَيْكُف ٢٠٢٦٠

Coléoptile (F). Coleoptile (E). - غَيْكُفُ

خند زبارة بعض بلور الاعشاب .

مركبة || من هذه الحشرات واللغويات تخص بالذكر اللواتر والانيات وبراغيث الماء والآبروت والصفيات .

٢٠٢٢٢ - غَيْرُ جَائِرِ

Illicite (F). ما لا يبيزه القانون .

Illicit, Unlawful (E).

٢٠٢٢٤ - غَيْرُ شَرْعِي

Illegitime (F). ما كانت حالته غير شرعية .

Illegitimate (E).

٢٠٢٢٥ - غَيْرُ قَابِلُ الْإِنْفَاقِ

Main mortable (F). Mort main (E).

هي حالة الاموال الموقوفة التي لا تباع ولا توهب ولا يمكن انتقالها الى الورثة .

٢٠٢٢٦ - غَيْرُ مُتَحَوَّلِ

Inconverti (F). Unconverted (E).

٢٠٢٢٧ - غَيْرُ مُتَسَاوِي الْأَوْرَاقِ ، لَا مُتَسَاوِي

Anisophylle (F). الأوراق

Anisophyllous (E).

٢٠٢٢٨ - غَيْرُ مُتَسَاوِي الْبَتَلَاتِ ، لَا مُتَسَاوِي

Anisopétale (F). البتلات

Anisopetalous (E).

٢٠٢٢٩ - غَيْرُ مُتَشَابِهِ الْأَجْزَاءِ ، لَا مُتَشَابِهِ

Anisomère (F). الأجزاء

Anisomericus (E).

٢٠٢٤٠ - غَيْرُ مُتَسَاوِي

Anisométrique (F).

Anisometric (E).

٢٠٢٤١ - غَيْرُ مُتَعَدِّدِ

Indéfini (F). Indefinite (E).

٢٠٢٤٢ - غَيْرُ مُسْتَعْيِقٍ ، غَيْرُ وَاجِبِ

Indu (F). Undue (E).

هو دفع مبلغ لا يقابله التزام بقده يحل القانون حق استرداده .

٢٠٢٤٣ - غَيْرُ مُتَعَدِّدِ

Indéterminé (F).

Indeterminato (E).

٢٠٢٤٤ - غَيْرُ مُتَهَكِّمٍ ، طَالَعِ

Indigeste (F). Undigested (E).

٢٠٢٤٥ - غَيْمَتَكَ ٢٠٢٤٥

Abrassus globosus (S).

Abrée sphérique (F).

حشرة والجم من سمقات الاجنحة ، دوسيات القرون ، خماسيات الاجزاء . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى

اروبة || جسمها صغير القد ، نصف كروي الشكل ، جوي اللون ، اسفح المواج . قرونها الاستشعارية خماسية

الفصل ، دوسية الأطراف || قوتها كل ما استطاعت

نقصه من اللغويات الصغيرة والديدان .

٢٠٢٤٦ - غَيْشُ ٢٠٢٤٦

Glaucomya (S).

Glaucomya (F). Glaucomya (E).

غيشر هو الاسم الحديث . جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحية الخياشيم لفصيلة الغيشرية . أنواعها

المعروفة نحو ٢٠٠ موطنها اخوار الانهر الحديثة والصينية

والماليزية .. تعيش منفردة في الأسماك . جميعها صغيرة

القد ، تافهة العوم للأماكولة .



غَيْمَتَكَ

٢٠٢٦٧ - **هَيْتَرْدِيَّةُ الشَّاي** *

Guignardia theae (S). Brown blight (E).

فطر مجهري يركب أوراق الشاي فينقذها ، مظهره الخاربي يقع حطية اللون يابسة المحور الاطبل . وهي سريعة الانتشار والاى فدا او ساحتها الملبل الجوية || لم تكافح حتى الآن حيقاً على اوراق الشاي من المواد المعدية .



هينريه الشاي

٢٠٢٦٨ - **هَيْتَرْدِيَّةُ العَرِيشِ** *


Guignardia baccae, *Physalospora baccae*, *P. reniformis*, *Phoma flaccida*, *Ph. reniformis*, *Ph. Cookii*, *Macrophoma flaccida* (S). *Excoriosis de la vigne* (F). فطر مجهري واسع الانتشار يركب الجلفة بالمتعدد . مظهره الخاربي يقع صغيرة ييشية الشكل حطية اللون تنتشر على تقشر الجلفة وجل التنب قرب ادراكه تسبب احمرار البشرة ثم ييبسها || يكافح باستعمال اسد الفوطاير النعالة مل روتين او ثلاث رشات قبل حصرمة التنب .



هينريه العريش

٢٠٢٦٩ - **هَيْتَرْدِيَّةُ بَدُولِيَّةٍ** * ، **بلاكروت الكرمية** ، **هكّن أسود**

Guignardia bidwellii, *Sphaeria bidwellii*, *Physalospora bidwellii*, *Laetitia bidwellii*, *Phoma uvicola*, *Phyllosticta labruscae*, *P. ampelopsidis*, *Naemosporea ampelopsidis* (S). *Black-rot de la vigne*, *Pourriture noire de la vigne* (F). *Black-rot of grapes* (E). فطر مجهري يصيب اوراق الكرمية وناليدها فينقذها ويمتدنا || مظهره الخاربي يقع او يقع بجزوة اللون حطية اللعاج شبه مستديرة الشكل تظهر تصل الاوراق السفل ثم تمتد الى ما عليها وتركب البعائيد قرب حصرمتها فتضبطها وتلويها || تتكاثر في ظروف طيبة معينة تمضدنا الملبل الجوية الملائمة || تكافح مثل اليلديور باستعمال ذات للفوطاير .



هينريه بدولي

٢٠٢٧٠ - **هَيْتَرْدِيَّةُ** حر العظيم ، ذكر التمام .

٢٠٢٧١ - **هَيْتَرْدِيَّةُ** *

Cnemidophorus (S). *Cnemidophorus* (F). *Cnemidophorus* (E).

جنس حيوانات زساعة من الطاء وفضيلة التبيديات . اقوامه المعروفة قليلة العدد اصلاتها بعض مناطق الجنوب الشرقي من امريكا الشمالية || تألف البراري والقميان . تتميز بسرعة الحركة والانتقال . قوتها الحشرات والديدان الطواجا وسيدة الاكوان السوية . تكثر فيها الربة السمراء والسمره .



حيون

Tortue (mille) (F).

Turtle (male) (E).

التيلم : ذكر السلاحف ويدعى الايس واليلم ، ويقال لهاها اللبل .

Nuage (F). *Cloud* (E).

هَيْتَم ، **سحاب** : التيم او السحاب بخار ماء علا في الجو ويتكاثف . ويكون عادة نتيجة التيارات الهوائية الصاعدة من الارض الى طبقات السكاك . وتعتبر اليوم من عوامل المناخ الهامة لانها مصدر الامطار والثلوج وسبب الفسح والتغاضى الحرارة || واليوم عديدة الاشكال ولكل منها اسم يميز خاص يدل على نوعها ويتوسط ارتفاعها التفرقي من سطح الارض . امزفها واشهرها ما يلي :

Altimus

Cumulo-nimbus

Stratus

Cirro-stratus

Cumulus

Cirrus

Cirro-cumulus

Nuage artificiel (F).

Artificial cloud (E).

دخان كثيف يحصل من حرق بعض المواد المعدنية وغيرها يستعمل لمنع جله الريح عن بعض البناكات ، اغصها الاشجار المثمرة .

Nuage artificiel (F).

Artificial cloud (E).

النباه : الشجرة الخضراء الورق اللطيفة الاخصان .

Fourré de bois (F). *Wooded* (E).

هَيْتَمَة : القبة هي الاجبة .

Guignardia (S).

هَيْتَرْدِيَّةُ * : جنس فطور مجهري من السخاميات وفضيلة العشويات تتميز باصابتها البسيطة المستديرة التي تفرز في نسج النبات المنار . نكاتها مديمة النكات ، بوضها شفاف وحيد الخلية || انواعه الاقتصادية الزراعية ثلاثة وهي .



prunier, Tordeuse verte du prunier (F).
Argyroplote pruniana (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الفانلات حرشيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشتها خفيفة .
سرقها خاضعة تركيب اوراق الخوخ والزيتون وفصلتها
وتعيش عليها || جسمها صغير القند بطول من ٧ الى ١٠ م .
يسقطها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . رأسها مستدق الجرم
اسمر اللون . عينها زيتان صغيرتان . زبابها خيطيان .
ملابسها قصيرة . مرشها جذعة . جوشنها وبطنها الى
الكعبة السراء المواج || روشنها الاماميان الى الدبرة
يملؤها تبييض وتوشم اسمر . روشنها الخلفيان الى الريدة
السراء . احداها فحبة || الاثنى امير قدأ من الذكر
واغلف بطناً منه واطول روشناً || لها جيل واحد في الحول .
تسرح من الدروب الى فحمة الجبل ومن القجر الى الشرق ||
الاثنى تلقي المكن ميحادي على الصفحات العليا من نصال
الاوراق . الطور البري ينشر نحو عشرة اسابيع ويتقضي
على اوراق الاشجار التي تقتلها السرعة وتعيش من غصنها
وعلاياها . والسرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٦ م .
جسمها مستدق المقدم والمؤخر ، اخضر اللون ، زيتي
المواج . يملو ثلاثة صفوف قاذبة من التلويح السمر المتحركة
هللبي دقيق || رأسها ودونها الصدرية الى السرة القاذبة .
وراجها الى الخفسار الاضلح || طور الاكمال الذي
يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً يتقضي ضمن صلبة تنسجها
السرقة بين شقوق السواد او تحت القشور الصلبة .

Tortricidae (S). ٢٠٢٧٢ - فانلات ٥
Tortricidae (F). Tortricidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها تمتد نحو ١٥٠٠ جميعها صغيرة القند . رواشتها
حمرية ، قائمة الزوايا الخارجية . قرونها الاستشعارية خيطية
الشكل . اضلاعها ظاهرة . حوتها بارزة . اثوابها
سماكية الالوان المزركشة || يرقاتها قاذبة قاذرة تقضم
البراعم والاوراق والافانن وتقرض الساق والتار والجوهر .

٢٠٢٧٣ - قاذبة الالبيسة ٥

Evetrin hercyniana (S). Tordeuse de l'épicéa (F).
حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند ملطحة اللون
يسقطها تراوح بين ١٠ و ١٢ م . رواشتها مهدبة الختار ،
غراء اللون ، مبيضة بالاسمر || يرقاتها دقيقة الجسم ،
مستطبة اللون ، تركيب يتلقى الالبيسة تتقضي عليها بدم
ان تغلفها بجيرها الحريرية .

٢٠٢٧٤ - قاذبة الاجمار الحرجية ٥

Cacaecia podana (S). Tordeuse des arbres forestiers (F).
حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند مستطبة اللون .
رواشتها مبيجة بالاسمر || يرقاتها تركيب مختلف الاجمار
الحرجية وقد لا تنف من بعض الاجمار المشرقة فتقتل
الاوراق وتفسدها وتقرض البراعم والافانن النامية .

٢٠٢٧٥ - قاذبة الجفانكين
Tordeuse des vergers (F).

فراشة صغيرة تدعى ببرودة ملوانة ، اطلبها .

٢٠٢٧٦ - قاذبة الخوخ الحفسراء ٥
Argyroplote pruniana (S). Argyroplote du



فانلة الاجمار الحرجية



فانلة الخوخ الحفسراء



فانلة الدراق الشرقية

٢٠٢٧٧ - قاذبة الدراقين الشرقية ٥

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse orientale du pacher (F). Oriental fruit-moth (E). Pfirsichtriebböhrer (D).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند ، يسقطها تراوح
من ١٢ الى ١٤ م . روشنها الاماميان الى الكعبة يملوها



فأثلة السرو



فأثلة السنايل



فأثلة السندبان



فأثلة العنب



فأثلة القزفل



فأثلة الكزرة (البقرة)



فأثلة الورد



فأثلة الورديات



فأثلة خضرار

تركب نواحي القزفل فتلحقها وتقضمها وقد لا تنف عن الورد والياباب وغيرها .

٢٠٢٨٣ - فأثلة الكزرة * ، *Sparganothis pilleriana*, *Tortrix pilleriana*, *Aenophthira pilleriana*, *Aenactra pilleriana* (S). Tordeuse de la vigne, *Pyralis de la vigne* (F). *Sparganothis pilleriana* (E). Springwurm, Springwurmwickler, Laubwurm (D).

حشرة من الفأثلات . فراشها حطية اللون مراء الرأس . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها الاماميان الى الصفرة تلوها زرقعة حراء . وراثها الخلفيان الى الصفرة اللحية المولج || وراثها سيد الرووس ، خضر الظهور ، صفر الجوانب المقلقة بالابيض مدبا اغبر اللون . ارجلها سمر || تركب برام الكزرة واورثها تلتف البرام وتقتل الاوراق وتقضمها . وقد تركب بعض النباتات الاخرى كالمران والقدار والصبوح والثلثك . لكنها لا تؤذي ايامها الكزرة .

٢٠٢٨٤ - فأثلة الورد * ، *Tortrix bergmanniana* (S). Tordeuse du rosier (F). Bergmann moth (E).

حشرة من الفأثلات . فراشها حطية اللون ، بسطها تراوح بين ١٢ و ١٥ م . وراثها الى الحارة يعلوها جميع اصفر || وراثها خضرار اللون تركب الورد فتلحق الاوراق وتقضمها مع العروق وتقضم البرام والنواحي .

٢٠٢٨٥ - فأثلة الورديات * ، *Cacaecia rosana* (S). Tordeuse des rosacées, T. du poirier et du pommier (F). Rose twist moth (E). Heckenwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراشها سمر الجسم بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها حطية اللون ، الامامية منها بجلة بثلاثة خطوط حر ممتدة || وراثها الى السرة الخضراء المولج . وهي تقتل اوراق حطب اشجار البقلة الوردية اعصها افتتاح والاباس والسفرجل والخوخ والمشمش والورد ، تلحق بشرة الاوراق وتغلاها وقد تفكك بالبرام وبالبز اللينة .

٢٠٢٨٦ - فأثلة خضرار * ، *Argyroproctus variegans*, *Olethreutes variegans* (S). Tordeuse verte des arbres fruitiers (F). Bud moth (E). Grauer Knapenwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراشها حطية اللون . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها الاماميان الى الصفرة البقية بالازرق . وراثها الخلفيان الى الوردية . اطرافها مهدية فضية || وراثها خضرار اللون تركب الاشجار الممتدة اعصها تتلف فتلحق الاوراق اللينة وتقضي عليها .

٢٠٢٨٧ - فأثلة * ، *Hemerocallis* (S). *Hémérocalle* (F). Yellow day-lily (E). Heile Taglilie (D). Giglio dorato, Bellezza di un giorno (I).

جفت نباتات شتوية جلمورية ممتدة من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرصية الانتساب ، ثنائية الصف ، متعابلة . لصلها شبق الصفحة مستطيلة || انوارها حالية كبيرة القند تركب على سراج قوي نشيط || انيلها حطية جميعا زينة سميكية ترعب في الازرق المحملة الانساج المنزيرة المادة البدالية || اشهرها ما يتبع .

تبيع ابيض . وراثها الخلفيان الى الوردية || لها جيلان في السنة . وراثها صغيرة نحيلة تركب الدواقر وتؤذي على الشكل التالي : ينصر ضرر يقات الجبل الاول بقرض ولحم البرام والافانن البتامة . اما القصر الناعم من رقات الجبل فينصر بقرض النار ومطبا .

٢٠٢٨٨ - فأثلة السرو * ، *Evotria buoliana* (S). Tordeuse des pousset du sapin (F). European pine shoot moth (E). Kiefertriebwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراشها صغيرة القند بسطها تراوح بين ١٧ و ٢٠ م . وراثها الى الحرة المبقجة والبقعة بالفضي ، اهداب اطرافها الخارجية كثيفة التجميع فراء اللون . وراثها مستتقة ، نحيلة ، بقية الثوب تقرض نباتي السرو والصنوبر تمش في داخلها فتسبب تحجيبها وقد تقهوها الى اليابس .

٢٠٢٨٩ - فأثلة السنايل * ، *Cnephias pyrophagana* (S). Tordeuse des épis (F). حشرة من الفأثلات . فراشها صغيرة القند حطية اللون . وراثها الى الصفرة يعلوها توضع اصفر || وراثها خضرار اللون مسددة ، تفلح نحو ١٠ م . تركب سنايل القمح وتقتل على البر .

٢٠٢٩٠ - فأثلة السندبان * ، *Tortrix viridana* (S). Tordeuse du chêne (F). Carnation tortrix (E). Grüner Eichenwickler (D).

حشرة من الفأثلات بسطها فراشها تراوح بين ١٥ و ٢٥ م . وراثها الاماميان الى الخضار القاتح الاصفر المولج وراثها الخلفيان الى الشبة البنداء || وراثها تركب البرام ثم الاوراق فتلحقها وتلتهمها . يكثر وجوها من سبزبان الى آب عبل السندبان والشرم والتبولا والحور الجرجاج .

٢٠٢٩١ - فأثلة العنب * ، *Coccus ambigua*, *Cochylis ambigua* (S). Cochyte de la vigne, Taïgne de la grappe, Ver coquin (F). Grappe berry moths (E). Traubenwickler, Gosseswurm, Heuvurm, Sauerwurm (D).

حشرة من الفأثلات بسطها فراشها تراوح بين ١٤ و ١٦ م وراثها مهدية الخار . لون الامامية منها الى الوردية يعلوها مولج اصفر ويجمع اسود . اما الخلفية فالى الوردية قنصية المولج || وراثها دقيقة ، تنف حطية اللون ثم تلتصق بهد كل انسلخ الى ان تستقر على الاحمر الساكن || لها جيلان في السنة تركب في جيلها الاول اثمار الكزرة قبل تايورها ويده . وتركب في جيلها الثاني سويب العنب في غلظ اوارها فتقرضها وتسببها .

٢٠٢٩٢ - فأثلة القزفل * ، *Tortrix prunabana*, *Cacaecia prunabana* (S). Tordeuse de l'aillet (F). Pink twist moth (E).

حشرة من الفأثلات بسطها فراشها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها خضرار اللون مهدية الخار الخارجي . وراثها الاماميان جمعاها بالاسمر || مكها القزفل شديده السمات تحمض الاثني لطع مستطيلة على السور والاوراق فينف من رقات دقيقة نحيلة نوحا الى الخضرة الاسمر .

Phacel. ٢٠٢٩٧ - فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ الْحَمَامَةِ

الفَاوَرَةُ أو فَاوَرَةُ الْحَمَامَةِ نَجْمٌ فَاوَرٌ مَزْجُوجٌ مِنْ كَوْكَبَةِ الْحَمَامَةِ .

٢٠٢٩٨ - فَاوَرَةُ شَرِيفِيَّةٍ

Zenaidinae orientalis (S). Mélopée orientale (F).
طَائِرٌ مِنَ الْفَاوَرَاتِ جَيْلٌ الشَّكْلِ حَسَنُ الْمَنْجَمِ وَالصَّوْتِ
كَثِيْبَةٌ سَتُ الرُّوْمِ وَبَا كَرِيْمٌ . مَوْطَلَةُ الْمَنْجَمِ وَالرَّاقِصِ وَصَوْرِيَّةُ
وَالْأَنَاصِيْلِ . طَوْلُهُ نَحْوُ ٢٣ سَمٌ . ثَوْبُهُ مَتْرَاكِبُ الْأَلْوَانِ
فِيهِ الْأَصْفَرُ وَالْأَسَدُ وَالْأَخْضَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْبَيْضُجِيُّ وَالْأَخْضَرُ
وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسَدُ وَهُوَ مَطْرُوقُ الْمَنْجَمِ ۥ قُوَّتُهُ الْحَيَوِيَّةُ عَلَى
اِسْتِثْنَائِهَا . يَنْشُئُ فِي الْأَدْغَالِ الْقَلِيلَةِ الْارْتِفَاعِ اِنْتَاهُ تَبْيِضُ
بَيْضَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي السَّنَةِ .

٢٠٢٩٩ - فَاوَرَةُ

ثَبِتَ طَيْبُ الرِّيحِ . قَالَ ابْنُ حَنِيْفَةَ : هُوَ الْمَرْوُ الْعَرَبِيُّ
الْوَرَقُ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ جَانِحَتَانِ وَسَطُهُ كَانَهُ
أَذْنَابُ الثَّعَالِبِ عَلَيْهِمَا نُورٌ أَحْمَرُ طَيْبُ الرِّيحِ . وَقِيلَ هُوَ
رِيْحَانُ الشَّيْخِ ج . فَاوَرَةُ .

Potier (F). Potter (E).

٢٠٣٠٠ - فَاوَرَةُ

هُوَ مِنْ سَنِ الثَّلَاثِينَ وَعَمَلُهُ فَاوَرٌ .

Chamois (F).

٢٠٣٠١ - فَاوَرَةُ

هُوَ الشَّجَرُ جُ فَاوَرُ . وَقِيلَ الْفَاوَرُ مِنَ الْوَيْطِلِ الَّذِي قَدْ
أَسْنَى وَهُوَ يَمْزِلَةُ الْقَنَارِجِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَازِلِ مِنَ الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ .

٢٠٣٠٢ - فَاوَرَةُ هُوَ الشَّاقِلُ ج . فَاوَرُ .

Niveau (F). Level (E).

٢٠٣٠٣ - فَاوَرَةُ

هُوَ الرُّوْمَةُ أَيْ مِيزَانُ الْاِسْتَوَاءِ .

Aulacode (F).

٢٠٣٠٤ - فَاوَرَةُ الْبُيُوتِ

هُوَ الْفَتَايَا ، اَلطَّيْبُ .

Golunda (F).

٢٠٣٠٥ - فَاوَرَةُ الْبَيْتِ

هُوَ الْفَلَنْدَةُ ، اَلطَّيْبُ .

Puteis féclide (F).

٢٠٣٠٦ - فَاوَرَةُ الْخَيْلِ

يَعْرِفُ بِأَيْنِ عَرَبٍ مَشْنُوعٍ ، اَلطَّيْبُ .

Ichneumon

٢٠٣٠٧ - فَاوَرَةُ الْفِرْعَوْنِ

هُوَ النَّمْلَةُ الْمَصْرِيَّةُ ، اَلطَّيْبُ .

٢٠٣٠٨ - فَاوَرَةُ ، فَارَكَةُ الْبَيْتِ

Mus musculus (S). Souris commune, S. domestique, S. ordinaire (F). House mouse (E). Hausmaus (D).
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرٌ الْقَدِّ . مَوْطَلَةُ الْعَالَمِ . ضَرْبُهُ عَدِيدَةٌ
يُوجَدُ مِنْهَا فِي الصَّيْنِ وَبَعْضُهَا نَحْوُ ٣٠ ضَرْبًا ۥ جَسْمُهَا
وَشَيْقُهَا يَطُولُ مِنَ ٨ إِلَى ١٠ سَمٍ . وَذَنُّهَا كَثَلُكَ . ثَوْبُهَا
الْمُشَاعِلُ إِلَى الرِّفْدَةِ الرَّصَاصِيَّةِ يَطْلُوها مَوَاجِدُ أَصْفَرٍ . ظَهْرُهَا
أَحْمَرٌ مِنْ بَلْبِهَا الَّذِي يَمِيلُ إِلَى الصَّفَرِ . أَذْنَابُهَا كَبِيرَتَانِ .
حَرَافَتُهَا ذَنْبُهَا ثَلَاثُ ١٨٠ وَاطِلَاها الْاِتْنِ ١٠ ۥ تَأَلَّفَ
الْبَيْوتُ وَتَمَتَّتْ عَلَى جَمِيعِ الْمَأْكَلِ وَالْحَيَوِيَّةِ .

٢٠٣٠٩ - فَارَكَةُ أَرَبَةِ ، سَقَطِيْمٌ

Mus arianus (S). Souris arienne (F). Arian mouse (E).
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرَةٌ الْقَدِّ مَوْطَلُهَا آسِيَّةُ الْوَسْطَى حَتَّى الرِّقَاقِ .
نَوْجُهَا إِلَى الصَّهْبَةِ السَّمَرَاءِ يَطْلُوها إِلَى الْبَيْضِ الْاَفْهَرِ . طَوْلُهَا

٢٠٢٨٨ - فَائِدَةُ بُرْتَقَالِيَّةٍ

Hemerocallis aurantica (S). Hémérocalle orange (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَائِدَةِ أَوْ رَقَاتِهَا تَطُولُ مِنَ ٣٠ إِلَى ٥٠ سَمٍ . وَتَعْرِضُ
مِنْ ١٢ إِلَى ١٦ سَمٍ . نَاصِلُهَا خَضِرٌ الْوَيْلُ عَلَى صَفْحَتَيْهِ .
شُرَافُهَا الْزَهْرِيُّ يَطُولُ مِنَ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا تَطُولُ
نَحْوُ ٧ سَمٍ . وَهِيَ بُرْتَقَالِيَّةُ الْوَيْلِ حَادِدَةُ الْبَرْقِ ۥ أَزْهَارُهَا
يَسْتَمِرُّ مِنْ عَمُودِ إِلَى الْبَلَوِ .

Hemerocallis flava (S). فَائِدَةُ صَفْرَاءُ

Hémérocalle jaune, La jaune (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَائِدَةِ أَوْ رَقَاتِهَا تَطُولُ مِنَ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَمٍ . وَتَعْرِضُ
مِنْ ١٥ إِلَى ٢٠ سَمٍ . نَاصِلُهَا جَيْلٌ الْخَضِرِ الْزَهْرِيُّ ۥ شُرَافُهَا
يَطُولُ مِنَ ٦٠ إِلَى ١٠٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا تَطُولُ مِنَ ٧ إِلَى ١٠
سَمٍ . وَهِيَ جَيْلَةُ الصَّفَرِ الْكَبِيرَةِ ، فَوَاةُ الْبَرْقِ الْمُسْتَحْبَبِ .
أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ سَازِرَانِ إِلَى تَمُوزَ .

Hemerocallis fulva (S). فَائِدَةُ صَبْغِيَّةٍ

Hémérocalle fulve (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَائِدَةِ أَوْ رَقَاتِهَا تَطُولُ مِنَ ٦٠ إِلَى ٨٠ سَمٍ . وَتَعْرِضُ
نَحْوُ ٢٠ سَمٍ . نَاصِلُهَا يَجْرِي الصَّفَرُ السَّالِقُ ، خَضِرٌ الدَّلْبَا .
شُرَافُهَا يَطُولُ مِنَ ١٠٠ إِلَى ١٢٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا تَطُولُ نَحْوُ
١٠ سَمٍ . وَهِيَ صَفْرَاءُ الْوَيْلِ ، صَنَائِيَةُ الْمَوَاجِدِ ، حَادِدَةُ
الْبَرْقِ . أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ تَمُوزَ إِلَى آبِ .

٢٠٢٩١ - فَائِدَةُ سَبْغِيَّةٍ

Hemerocallis graminea, H. minor (S). Hémérocalle graminée (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَائِدَةِ أَوْ رَقَاتِهَا صَفِيَّةُ الشَّكْلِ تَطُولُ مِنَ ٣٥ إِلَى
٥٠ سَمٍ . وَتَعْرِضُ مِنْ ٥ إِلَى ٨ سَمٍ . نَاصِلُهَا إِلَى الْخَضِرِ
الْبَاهِتِ ۥ شُرَافُهَا يَطُولُ مِنَ ٤٠ إِلَى ٥٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا
تَطُولُ مِنَ ٦ إِلَى ١١ سَمٍ . وَهِيَ خَضِيَّةُ الْوَيْلِ فَوَاةُ الْبَرْقِ
السَّلَ ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَبَارِ إِلَى حَزْرَانِ .

٢٠٢٩٢ - فَائِدَةُ ، فَيْدَكَتِي

Facture (F). Invoice (E).
الْفَاوَرَةُ أَوْ الْبَيَانُ بِالْأَلْمَانِ هِيَ رِيفَةُ حَصَانِيَّةٍ مَسْرُوعَةٍ
فِيهَا بِالْمُفَصَّلِ بَيَانُ الْمِجْمَعَاتِ أَوْ خُطُوبِ الْاِثْمَاءِ مَعَ اَلْمَآخِطِ .

٢٠٢٩٣ - فَائِدَةُ

الْفَائِدَةُ الْحَامِلُ أَوْ الْفَائِدَةُ الْحَامِلُ السَّيْنَةِ .

٢٠٢٩٤ - فَائِدَةُ

Phlox (S). Phlox (F).
جَنَسٌ ثَلَاثَاتُ مَحْصَرَةٍ مِنْ صَفِيَّةِ السَّحَابِيَّاتِ . اَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ
قَلِيلَةٌ ، مِمَّاها الْمَنْجَمُ وَبَلْبُزِيَا . سَقَطِيْمٌ سَرَسَةٌ مُنْتَصِبَةٌ حَادِدَةُ
الْبَرْقِ ، تَطُولُ مِنَ ٨٠ إِلَى ١٢٠ سَمٍ . تَقَطُّعِي بِالْزَهْرِ اَحْمَرِيَّةٍ
الْمُتَجَمِّعِ . أَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ طَوَّلُهَا رَافِعٌ بَيْنَ ١٢ وَ
١٥ سَمٍ . يَتَلَوَّنُ بَيْضُ الصَّفَرَةِ الْخَارِجِيَّةِ حَرَّ الْبَاغِيَّةِ
الَّتِي يَطْلُوها زَاوِيَتَانِ خُتْلَفَتَا الْأَلْوَانِ رَافِعٌ مِنَ الْاَفْهَرِ إِلَى
الْأَصْفَرِ وَالْأَخْضَرِ . أَوْ رَقَاتِهَا فَاوَرَةٌ جَلِيَّةٌ الْاِسْتِثْبَاتِ تَطُولُ
مِنْ ٦٠ إِلَى ٩٠ سَمٍ .

٢٠٢٩٥ - فَائِدَةُ

Fagine (F). Fagine (E).
مَادَّةٌ دَحْنِيَّةٌ تَخْرُجُ بِالْأَطْفَالِ مِنْ ثَمَارِ شَجَرِ الرِّزَانِ .

٢٠٢٩٦ - فَائِدَةُ

هي الْمُنْتَبَذَةُ ، اَلطَّيْبُ .



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ أَرَبَةِ



فأرة الاذغال



قاسيات البطيخ



قاسيات البوصير



قاسيات الشيلم



قاسيات القطن



قاسيات الملقوف

٢٠٣٢٢ - **قاس** Hache (F), Azn (E).
أداة حادة لتصل يقطعن بها القنصل والأشجار والحطب.

٢٠٣٢٤ - **قاس** Hédysaron (F).
هو الأينوسارون ، اطليه .

٢٠٣٢٥ - **قاسخ ، قسطل ، منق** Résolutoire (F), Cancelling, Abrogating (E).

٢٠٣٢٦ - **قاسرى** Bryone (F).
هي القاشراء ، اطلبها .

٢٠٣٢٧ - **قاسى** Sécuriforme (F), Securitiform (E).
تمت تعريفى لوصف به الاشياء التي تشبه القاسى .

٢٠٣٢٨ - **قاسيكه ، قاسيه** Pentatome, Punaise (F), Bug (E).
جلس حشرات من فصيلة القاسيات. انواعه عديدة تتميز بأجسامها المثلثة بمادة حديدية كبريتية الزائفة . ألوانها مزرقرة وبزرقة . ابراسها ثلاثية الشكل . قرونها الاستشعارية لحسية القنصل ، جميعها مقلية تنمى حصاره التباتات التي تركبها || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٠٣٢٩ - **قاسيات البطيخ** * Aspongopus viduus alger (S), Punaise du pache (F).
حشرة من القاسيات جسمها متوسط القند مقلط الشكل عطلون نحو ١٦ سم . ويعرض نحو ٦ فوطا الى الزرقه السراء المولج . قوامها المهادا الى الجولة || تركب اوراق ونواحي البطيخ وسائر النباتات القرمية باقر .

٢٠٣٣٠ - **قاسيات البوصير** * Carpoporis verbesci (S), Punaise des molènes (F).
حشرة من القاسيات طولها يراوح بين ١٢ و ١٤ سم . فوطا الى الحمره الجلولية تعلوها الزغارف والزراراكش السود . ابرسلها سود للفاصل حمر الفشان || اصطنها فسيحة الاربعه تركب البوصير وسائر نباتات الفصيلة الخنازيرية وبعض التباتات الصناعية ومنها تتبع الذي تنمى حصاره اطرافه الخنازيرية وارواقه الخفية .

٢٠٣٣١ - **قاسيات الشيلم** * Aelia scuminata (S), Punaise du seigle (F).
حشرة من القاسيات صغيرة القند مقلطه الجسم طولها يراوح من ٨ الى ٩ سم . ويعرضها م . فوطا خضلى اللون اخضر المولج . ظهرها ثلاثى الخطوط القاطية الصفراء اللون . تركب الشيلم وبعض التباتات البرية .

٢٠٣٣٢ - **قاسيات القطن** * Nezara viridula (S), Nézara verte, Punaise du coton (F).
حشرة من القاسيات جسمها مقلط الشكل اخضر اللون عطلون من ١٢ الى ١٦ سم . ويعرض نحو ٩ سم || اصطنها فسيحة الاربعه تشمل جميع الابدان افارة والمثدلة || تركب القطن واليقظ وبعض التباتات الصناعية كالنخ . تنمى حصاره النواحي والاوراق الخفية .

٢٠٣٣٣ - **قاسيات الملقوف** * Eurydema oleracea, Pentatoma oleracea (S), Pentatome du chou, Punaise du chou (F).
حشرة من القاسيات صغيرة القند مقلطه الجسم طولها يراوح

نحو ١٠ سم . وذنبها ١٤ || تعيش في الحقول وقرب البيوت . قتها جميع المواد العضوية والنباتية .

٢٠٣٣٤ - **قارة الاذغال** * Mus agrarius (S), Souris agrius (F), Agrarius mouse (E).
نوع من الجرذ صغيرة القند موطنها الشرق الاوسط واروپة . نوبها الى الصهبة الصبانية . تبع ظهرها اسود . بطنها وعنواحي جرائزها بيض . طولها نحو ١١ سم . وذنبها ٩ سم . اذناها مستدلتان. حارشت ذنبها تبلغ ١٢ ، اطبعها الاثنى ٨ || تعيش بجماعات كثيرة العدد . تألف الاذغال وجرانها الحقول المزروعة . قتها الحبوب اصعبا الخطة ثم القنصل والجذور والبصل والحشرات والديدان .

٢٠٣٣٥ - **قارة البحر** Rat de mer (F).
هو الراسون ، اطلبه .

٢٠٣٣٦ - **قارة الخرج** Mulot (F).
هي الدئمة ، اطلبها .

٢٠٣٣٧ - **قارة الحصاد** Souris des moissons (F).
هي الزبالة ، اطلبها .

٢٠٣٣٨ - **قارة الصحره** Souris du désert (F).
هي النصار ، اطلبها .

٢٠٣٣٩ - **قارة القبط** في حكر الخقل ، اطلبه .

٢٠٣٤٠ - **قارة تحميط** Spelux
هي الخلد ، اطلبه .

٢٠٣٤١ - **قارو** هو الثور يجر كل شيء متفرد . والشجرة القارة هي المحتبة من ثيرها .

٢٠٣٤٢ - **قاروش** Agé (F), Agé (E).
هو السنن من الجوران . كترك « أنها بقرة لا قاروش ولا بكر » أي لا سنة لا قنية .

٢٠٣٤٣ - **قاروطان** القاروطان كركبان متباينان امام سرور نبات نض .

٢٠٣٤٤ - **قاروط ، عسبط** Gaele (F).
مصاولة تستعمل لفضائل الشجرة .

٢٠٣٤٥ - **قارويات** Muridae (S), Muridae (F), Muridae (E).
فصيلة حيوانات لينة قارضة من مرتبة قرقنات الشوزيب ورتبة القوام . اجناسها ٨٦ وانواعها ٧٢٠ لما عمارتها فتلات الجرذيات والقناديات والفكريات . جميعها حيوانات صغيرة القند ، مدبة الزلقوم ، مستطيلة الذنب || موطنها العالم . تسرح في الليل . تركض على الارض ، تعوم في الماء وتتسلق الاشجار . قتها ما استطاعت اليه ميلا من غطف المواد النباتية والعضوية الحيوانية . قنارها لا يقويه غصبي . انثاها تقف في الامم الوليد من ٢ الى خمس موالات .

٢٠٣٤٦ - **قارو** نمل اسود فيه حرة .

Bryonia cretica (F). - فليسيه إريثريه
هي الخسروس ، أظله .

٧٠٣٤١ - قاشراً بيضاء، كريمة بيضاء، حاليق
الشعر
Bryonia alba (5).

Bryonia blanche, B. monaque (F). **White bryonia** (E).
Gemeine Zaunrübe, Zaunrübe (D). **Bryonia** blanca,
Fescera (I).

نوع من الفانرا العائنة تكثر في الاسراج
والواقع في الجبال العالية في بلاد
البحر. جذعها غليظة مستقيمة
تتمسك في الجلب ويخرج منها
شعيرات كثيرة، منية،
مبهجة وناعمة. وهي سهل شديدة القل
يتمسك في حالات
الاستقامة والصعود في المناس
في التود وفي
الحضار. وقد تارة في ابن
البحار وانه يحق
للشمر من الجلود وأما ثمره
التقوي فلهذه الجلود.

٢٠٣٤٧ - قاضرا حبشية
Bryonia abyssinica (S). *Bryonia d'Abyssinie* (F).
 نوع من قاضرا موطن الحبشة وهو نبات زراعي شائع
 الاستعمال. أوراقه كبيرة الحجم متعاقبة. أزهاره غبراء
 اللون. ثماره عتيبة حامدة النضج. جلده ذو قسوة الشكل،
 جامدة الملمس، تؤكل بعد تقليمها بالماء الساخن وتغييره مرتين
 أو ثلاث مرات.

٢٠٢٤٣ - قاسر أسوداء*، عنب الحية، عنبطة
Bryonia dioica (S). *Bryonia dioica*, Vigne noire,
 Navet du diable (F). White wild vine, Common
 bryony, Snake bryony (E). Rote Zaurube (D). Bar-
 bone, Rapa del diavolo, R. di serpente (I).

نوع من القاشرا ثنائي المسكن يكثر قرب السياجات وفي
المواقع الرطبة أخصها البرية || ثماره غنية سواد اللون
غنية بالمواد الفعالة المرة || جلونه غليظة مبطنة هديدة
المنافع الطبية أخصها ما لها صلة بالصدر كذات الجنب
وما يتبعه .

Bryonia grandiflora (S). قاسية هندية - ٢٠٣٤٤
Bryonia à grandes fleurs (F).
 نوع من القاسية موطنه الهند. وهو نبات حولي زراعي
 يبق. أوراقه كبيرة القد مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ.
 انزاره جميلة الشكل حراء اللون. جنوره دوفضية غزيرة
 المادة القسوية.

۲۰۳۴۵ - فاسفرشین، شش‌بند آره، هزار جشان
Tamus (S). Tamier, Bryone douce, Racine vierge (F).
Black bryony, Ladle's seal, Mandrake (E). Echtes
Schwurz, Schwarzwurzel (D). Tamerro, Radice
vergine, Brionja nera, Cerastola, Vite nera (I).

جنس نباتات عشبية طيبة معمرة من فصيلة الوردية. ارتفاعها قليلة العدد سمها عارضة تقوّل من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها قليلة الشكل مدببة الزام الاخير. ازهارها خضراء اللون. ثمارها حضية للشكل والقذ. جذورها حزائية غليظة سوداء اللون. خصائصها الطبية كخصائص الفلشرا الا انها اضعف منها قليلا. اما الاوراق فتشفي قروح وضمادات وضادها ينقم التواء المصّب.

Tamus cretica (S). فَاثَرْمِين اِكْرِيتِي
Tamier de Crète (F).

نوع من القاشرشين، موطنه جزر البحر المتوسط، يكثر في جزيرة اكرت || اوراقه ثلاثية التفصيص، مستعرضة الفصيص، الحادسين، مستطيلة الفصيص المسطح. نساها لامية

بين ٦ و ٧ م. ثوبها اخضر اللون كثير الزركش الحمرة
في الاثاث والبيش في الكود || تركب معظم البقول
انحصا الملفوف وقد لا تنف عن الكومة .

٢٠٣٤ - قاصيات المنثرف الحمراء*
Eurya ornata, *Pentstemon ornatus* (S).
 فاصيات المنثرف الحمراء (F).
 نبتة من القاصيات، صغيرة الحجم، لها
 أزهار حمراء، تنمو في المناطق الجبلية
 والمرتفعة. (S).
 أزهار حمراء، تنمو في المناطق الجبلية
 والمرتفعة. (S).
 أزهار حمراء، تنمو في المناطق الجبلية
 والمرتفعة. (S).

٢٠٣٥ - **السياء زمرديّة**
Palomena prasina (S). *Palomena verta* (F).
 ششرة من السياء طولا نحو ١٢ سم. ورضها ٧ م. ثوبا.
 الى الضمار الزمردي تعلو نشة ضحلة خفيفة وحتار خري
 راجح رضه بين ٧ و ١٠ م || اصلها تثل جميع
 البلاد المعتدلة الحرارة. تركب معظم نواحي الاجبار باستثناء
 السويريات. وتتركب التبغ وبقية من النباتات الصناعية
 كالنوم والكتان.

٢٠٣٦ - قاسمیان
 هي فصيلة خاسيات الفواصل ، اطلها .

Pentatoma rufipes (S). ♀ قاسية الغلاب ٢٠٣٧
Funaise des bois (F).

حشرة مؤذية من فصيلة القاسيات. جسمها مفلطح ، يتخذ الشكل بطول نحو ١٤ مم. ذواتها أصفر اللون ، كيف التيجير البني الداكن. يقطنها أرق جلعج اللات ، ويوحطها للتصنيع مع الذكرك. سباعية مع الأبدن ، رأسها خرمي. غلظها مشتمل الملك. ميناها صفراء باسعت. زباناها صفراوان ، أسمران ، كقولها قلب العرعر ، مرقن الجاين. مبيجتها طرف الطرف. فطرتها أصفر ، الحرة الحنجر. قراتها شفافة. قراتها ال الحرة القرميدة الباهتة || تركب أوراق الشجر الحرجية باستثناء الصنوبرات || راجعها كرمية

Dermanyusus (S).
 Dermanyasse (F).

جلس قراد من فصيلة الثدييات أنواعه عديدة جميعها عمياء، صغيرة القد، بيضيه الشكل، مبطلة، طولها نحو ملليمتر واحد، أتواها إلى البرودة، ظهورها مزركشة بالأسمر والجذوي، تركب الطير والخفافيش ولا تعف عن الإنسان.

٢٠٣٩ - قَاسِرَا، قَاسِر، قَاسِرَى، قَش
Bryonia (S), Bryone (F), Bryony (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الفرياسيات. أنواعها المبرورة ١٢ جميعها طيبة سبها للمادة والبارشنة. واولها متتابعة كثيرة اللقمة. عليها غرض الصفحة و ارضها كره الراقحة. ازهارها ذو البياض الالام. ثمرها ششوية و منوية و منوية اللقمة سفراء اللون او حراء او سوداء. جوامها تشوشة التركيب، و حشوية اللون او حشوية الشكل. اجسامها اشواشية اقارب بجودته لها الجرب و قد يستعمل استعمالها في ذلك مع استئذان ما فيه من غواص مرة مسهلة يتم فصلها بواسطة الماء. يزورها زيتية و زيتها اسفر اشهر انواعها القاشرا البيضاء.



فاسياء الملفوف الحمراء



فاسياء زمردية



ناشو،



فاشرا سوداء

جالة رضية ، بزورها صغيرة || انزمارها يشتر طوال شهر آب .

٢٠٣٥٥ - فاصولياء ليمّا

Phaseolus lunatus (S). Haricot de Lima (F).
نوع من الفاصوليا الزراعية الممصرة . ضرورها كثيرة العدد .
سوقها حارشة طولها من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها كبيرة
القد وورقها ثاقل اطيحية ، مستطيلة الزايم الاخير الذروب
المذهب . انزمارها صغيرة الحجم ، يفضاء اللون ، خضراء
المواج . عناقيدها الزهرية صغيرة . سفاتها منجلية الشكل
تطول من ٣ الى ٥ سم . بزورها كلوية يراوح طولها من
١٥ الى ٢٥ سم .



فانشرشين مبدول

٢٠٣٥٦ - فاصولياء معروفة

Phaseolus vulgaris (S). Haricot commun (F). French beans, Kidney beans (E). Gartenbohne, Bohnen (D). Fagiolo, Fagiolino (I).
هي الفاصوليا الزراعية الفلانية المشهورة . ضرورها
المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها شائعة الاستعمال منتشرة في معظم
اصقاع العالم || سوقها متباينة القد مختلفة الاشكال تملو
من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها بيضيه متجمعة النصل
المذهب القصصه || انزمارها لينة ابيض اللون ، عناقيدها
كثيرة . سفاتها لاصفوية الشكل تطول من ١٠ الى ٣٠ سم ،
بزورها مختلفة الاشكال والاصجام ، خفية بالمواد الفلانية ،
تركيبها الوعلي يفسل :



فاصولياء امريكية

١٧,٤٥ ٪ من المواد الاوتية .

١٥,٣٩ ٪ من المواد البعنية .

٥٩,٦٩ ٪ من هيدرات الكربون .

اما متوسط ما تشكله القرون الحضر المفعلة الطبخ فهو

١٨,٨٥ ٪ من المواد الاوتية .

٥,٢٠ ٪ من المواد البعنية .

١٤,١٧ ٪ من المواد الاستخلاصية .

٢٠٣٥٧ - فاصولياء مبدولة

Phaseolus (F).
بمارة من فصيلة القرنيات اجناسها وانواعها عديدة معظمها
من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة شهيرة الفاصوليا .



فاصولياء

٢٠٣٥٨ - فاصول ، فاصول ، قيق

Excédent de compte (F). Excess account (E).

Surdent (F). Irregular tooth, *Wolf's tooth*, (in horses) (E).

من زائلة .

Anemophile (F). *Anemophilous* (E).

نمت ترميني يطلق على كل نبات تنثر الرياح طلع ازهاره .

٢٠٣٦١ - فاصول

Fongicide, Anticropogemique (F). Fungicide, Anticropogemique (E).

اسم شامل يطلق على جميع المواد والوسائل المركبة للخصلة

في مكافحة الفطور الفطرية .



فاصولياء معروفة

٢٠٣٦٢ - قاطوس

قال الجاسط والقاطوس مكنة عطية تكسر البطن واللاصون
يعرفونها فينتظون غرق الحيفض ويلعقونها على السية فانها
تهرب و يقال القزوني هذا هو صوت الحيفض .

شديدة الخضار || انزماره صغيرة الحجم فستقية اللون .
ثمارة خصية القد وبشكل لونها الى الاحمر الوردي تملوه
ماجة صفراء . جلده سحالي ، غروي ، اسود اللون ،
جانبه الاياب يتصل بجميع الخصاصم الطية المائدة الى
الفانشرشين المبدول .

٢٠٣٦٧ - فانشرشين مبدول * انبلس مكثية

Tamus communis (S). Tamier commun, Taminier, Tame, Tannu, Herbe aux femmes battues, Sceau de Notre-Dame (F).

نوع من الفانشرشين موطنه حوض البحر المتوسط . ساقه
غبراء تطول نحو ٢٠٠ سم . اوراقه ملينة ويده لولب وهي
قلبية الشكل مدببة الطرف . نصلها خاسي او سباعي
البرق مالى البثرة الخضراء الالام . ثماره خصية القد ،
حمراء اللون . جلده حزائي الشكل ، اسود اللون ، جامد
الهاب ، يستعمل استعمال الفانشر .

٢٠٣٦٨ - فاشين

Synchrone (F). Synchronous (E).

نمت ترميني يطلق على التواتر المتوازي زينا وقبسا .

٢٠٣٦٩ - فاصل

Clôture (F). Enclosure (E).
هو كل ما يفصل ارضين متلاصقتين . لذلك قد يكون
حائطا او سياجا او خندقا ، الخ .

٢٠٣٧٠ - فاصلة ، صلاصية

Mérithalle, Entre-noeud (F). Internode (E).

هي الجزء من الساق النباتية الكائن بين عقدتين متتاليتين .

٢٠٣٧١ - فاصلة ، فصلة

Article
كل جزء من الأجزاء المتعاقبة المتتابعة في الضرب المركب .

٢٠٣٧٢ - فاصولياء ، فاصولياء ، فاصولياء ، حبش

Phaseolus (S). Haricot (F). Kidney-bean (E).

جنس نباتات زراعية حرلية او ممرمة من فصيلة القرنيات
القرشاية . انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصنافها فسيمة الارباع
تشكل جميع المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها غذائي يزرع
لجني ثماره لقرنية الخضراء او لاستثمار حبوبه الجافة .
وبعضها تربي يزرع لجاء زهره او لكثرة وكثافة غفرته
وسرع نمو || سوقها ملففة ، حارشة . اوراقها معققة ،
مركبة ، ثلاثية الورقيات . ازهارها عقيدية . ثمارها
قرنية . بزورها مستطيلة الشكل ، ثنائية الفلق ، عديدة
الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٠٣٧٣ - فاصولياء إسبانية

Phaseolus multiflorus (S). Haricot-fleur, H. d'Espagne (F). Scarlet runner (E).

نوع من الفاصوليا البهرية الزهرية الممصرة . ساقها
حارشة تطول من ٣ الى ٤ أمتار . اوراقها شديدة الخضار .
عناقيدها الزهرية كثيرة العدد والازهار . الزوايا مختلفة
تختلف مع القسور منها الابيض والابيض والبنفسج والبنفسج
الاقوان || انزمارها يشتر من حزيران الى ايلول .

٢٠٣٧٤ - فاصولياء حذونية

Phaseolus caracalla (S). Haricot caracalla, H. limaçon (F).

نوع من الفاصوليا البهرية الزهرية الممصرة . ساقها
حارشة تطول نحو اربعة اذراع . اوراقها كبيرة . وورقها
فستقية اللون . انزمارها عطرية الرائحة ، سحلية الشكل ،
لينة اللون الاصفر المواج . عناقيدها بحسة . سفاتها

٢٠٣٨٩ - **فَالِدَة حَقَّة** (F). Intérêt de droit.

Vested Interest (E). هي التي تحسب اما على اساس القانون او على ما اتفق عليه المتعاقدون.

٢٠٣٩٠ - **فَالِدَة خَاصَّة** (F). Advantage particulier.

Particular advantage (E). هي هي عقد الشركة عناية أحد الشركاء دون الآخرين بنسبة حقوق اوفر من حقوقهم. وقد لا يكون ذلك الا بموافقة الجمعية التأسيسية.

٢٠٣٩١ - **فَالِدَة رِبَوِيَّة** (F). Intérêt usuraire.

Usurious interest (E). هي التي تتجاوز الحد الذي عينه القانون لسر الفائدة.

٢٠٣٩٢ - **فَالِدَة غَيْر مُبَشَّرَة** (F). Advantage indirect.

Indirect advantage (E). هي التبرع بطريقة غير مباشرة. او اخفاء حصة وراء عقد معاوضة. او الاراء من دين. او التنازل عن حق الانتفاع. الخ.

٢٠٣٩٣ - **فَالِدَة قَانُونِيَّة** (F). Intérêt légal.

Legal interest (E). هي التي يحدد القانون سعرها اذا ما فات للمتعاقدون تعيينه في العقد.

٢٠٣٩٤ - **فَالِدَة قَضَائِيَّة** (F). Intérêt judiciaire.

Judiciary interest (E). هي التي تسري منذ اعلان صحيفة الدعوى او اقرار دعي.

٢٠٣٩٥ - **فَالِدَة مُعَدَّة** (F). Intérêt Rise.

Set Interest (E). هي الفائدة الواجب تسديدها حتى لو لم تحقق الشركة اي ربح.

٢٠٣٩٦ - **فَالِدَة مُركَّبَة** (F). Intérêt composé.

Compound interest (E). هي التي تحسب على مبلغ اصلي مضاعف اية فوائد متراكمة.

٢٠٣٩٧ - **فَالِدَة مُتَعَدِّدَة** (F). Intérêt échel.

Due interest (E). هي التي اجل دفعها يتقابلها غير المتسقة.

٢٠٣٩٨ - **فَالِي** (F). Axis (E).

الفالق هو قطب دورة القُراس المحورية وهو الفقرة الثانية من السمت تأتي بعد الفقرة وهي اول فقرة تلي الرأس. ويختلف الفالق عن غيره من الفقرات المتبقية بتمتوه الشمولي الواضح.

٢٠٣٩٩ - **فَابِيَانَه** (F). Fabiana (E).

جنية معمرة، ابيدة، واثنية، لزينة من فصيلة الباذنجانيات. معقودة التبريد على اسم الحاكم ولبيانوه. ساقها صلبة تفلو من متر الى مترين. اوراقها لائقة، بيضيه الشكل، متصبية كالغرايش. ازهارها عمودية الازتكاز، يضاء اللون، قطرها نحو ٤ سم. طولها نحو ٣ سم. تنموها يستمر من ايار الى محرم.

سرقها تعيش على اوراق الستيان || جسمها كبير لينة يطول من ٢٤ الى ٢٦ سم. يسلطها تراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم. رأسها اصفر صفاني المواج. حينها كيرتان. زباناها مشطيان مزويجان عند الذكر، عيطيان عند الانثى. مرقشها مكد الطول. جوشها وبطنها الى الصفرة الخنطية المواج || روشناها الامانيات الى الزينة البنياء تملوها خطوط متزينة بنية وبقعة طرفية صفراء. روشناها السليمان الى البياض الماجي تملوه مابة تينية. تزنيها حنطي. اهدابها تينية || لها جلولان في الخول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تسرح في الليل، تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتحتسج المكان ليلتها على الصفحات الغفل من نصائل الاوراق || السرعة تطول من ٥٢ الى ٥٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الحلب، مستطيل البطن، مدبب الثرج. ثوبها الى الصفار الجليل يطول عند ثلاثي السكم خطوط سود وبقعة حراء وتقط ييش. رأسها مكثي اللون يعلو خط اصفر قاطب ينطق عند الاقنن. منها الى الصفرة السمراء. رواجها سود. هليها كيرتي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي غسن صلبة. تحبكها السرعة في شقوق الماء او تحت القشور.

٢٠٣٨١ - **فَامِنِي** (F). Famenian (E).

نسبة الى منطقة فامن البلجيكية. تمت تعريفها يطلق في الجيولوجية على السات الاعبر اي الاصل من الاراضي الديفونية المائلة الى الحنية الثالثة من الاباج التقدم. جميع متحجرات هذا السات من ضفديات الارجل وفضلة الكجاليات.

٢٠٣٨٢ - **فَانِيَّو** (F). Fongivore (E).

نمت تعريفها يطلق على كل حشرة او دويبة تعيش على للفطور.

٢٠٣٨٣ - **فَانِيْد** (F). Pénide (E).

نوع من سكر اثبات كان يستخرج في الماضي من القرموس وقد بطل استخراجه الآن.

٢٠٣٨٤ - **فَانِيَّوَة** (F). Sambucée (E).

نمت تعريفها يطلق على النباتات التابعة الى فصيلة القويبات او القرية التي منها || وهو سبط من فصيلة القويبات يشبل بعض الاجناس والاناوع.

٢٠٣٨٥ - **فَانِيَّوَة** (F). قسم من الارض بين مرتفعين ج. فوائج.

٢٠٣٨٦ - **فَالِدَة، مُرَدَّة** (F). Intérêt (E).

الفائدة هي المرء اي ربح الاموال المقرضة.

٢٠٣٨٧ - **فَالِدَة اِسْتَفَائِيَّة** (F). Conventional interest (E).

هي الفائدة المشعورة صريحا في عقد الاقراض على ان لا تزيد على ما يحدده القانون.

٢٠٣٨٨ - **فَالِدَة بَسِيْطَة** (F). Simple interest (E).

هي التي تسري على اصل الدين فقط وتقابلها الفائدة المركبة.

فيسر مع التسع ويستقر في نصل الاوراق || مظهره الخارجي ارتقاء في النصل يفتح شوب في الخشب ثم زوال اللون الاخضر من اطراف النصل واستبداله بالاحمر البنفسجي الذي يتحول فيما بعد نحو الاصفر الغليبي وينتهي بالبلون والبياس .



فَسَّة

٢٠٤٣٤ - **فَسِيخِيَّات** (F).
عارة تطور مجهرية من فصيلة الفسيخيات . تشمل عدة اجناس امرها اقتصادياً الاربعة التالية : السهاد ، الشكة ، الفسيخة ، والقنينة .

٢٠٤٣٥ - **فَسِيخِيَّات** (S).
Ampullaridés (F). Ampullaridés (E).

فصيلة من الفسيخيات معديات الازيل امانيات الخياطين المشطية . اجناسها وانواعها متوسطة العدد اصنامها انهر البلاد الحارة وجيراتها وينامها وانصها افريقية || اصنامها متجانسة الاشكال والاحجام ، منها افرونية والكروية والمستديرة والمبطئة || اعرف انواعها واشهرها الفسيخة .



فَسِيخَة

٢٠٤٣٦ - **فَسَة**
لفت نبات يختبئ حبه ويؤكل في الجذب وتكون خبثه غليظة || قليل هو المبيد || قليل هو شجر ينبت في السهول والاكام وله حطب كالمشمس .

٢٠٤٣٧ - **فَسَاة** (S).
Hélogale (F). Hélogale (E).

حيوان لاحس مقترن من فصيلة الزبديات . موطنه بعض مناطق السودان والحيفة . يكثر وجوده قرب بحيرة نيل . ملجته الحلياني جاني ، جاحته تعد من ٣ الى ٦ ازواج || جسمه صغير القد ، بطول نحو ٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . رأسه مخروطي للشكل ، ذلق الخيط . عيناه واذا صغرتان ، مستديرتان . سباله كثيف الحلب الطويل . قوائمه قصيرة خاسية الاصابع . ثوبه الى الرينة السوداء || يعيش في اوسيار يحضرها في التربة . قوة الانواعي والجذران والقرنان والمالجم .



فَسَاة شَاة

٢٠٤٣٨ - **فَسَاة** (F).
Cleistogamie (F). Cleistogamie (E).

الفساة حالة كل نبات لا تنفتح اكام ازهاره بل تتصلب الى اجربة منفصلة تسمى السليل والمقطة .

٢٠٤٣٩ - **فَقَرْجِيل** (S).
Fothergilla (F). Fothergilla (E).

جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة المشتركات . سيقانها منتصبة تملو من متر الى ستة امتار . اوراقها عابدة ، متناقبة ، بسيطة ، كاملة ، ملتوية الاطراف . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٠٤٤٠ - **فَقَرْجِيل مُلَانِي**
Fothergilla involucrata (S).
Fothergilla à involucra (F).

نوع من الفقرجيل . موطنه يمتد من الممت الى ايران . ساقه شائعة ترتفع نحو ستة امتار . اوراقه الحليجية النصال تطول من ١٢ الى ١٨ سم . وتقرض من ٥ الى ٨ سم . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره وريسية ، كثيرة الاعدية

٢٠٤٤١ - **فَسَّة** * ، **بَاسَمِين هِنْدِي**

Plumeria (S). Frangipaner (F). Frangipani, Pogodreze, Temple-tree (E). Jaminzunge (D). Frangipana, Plumeria (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة التفليات . مهدا البلاد الحارة . انواعها نحو ٤٠ مظهرها بري وبعضها تزييني . سيقانها خشنة الخشب . اوراقها متناقبة متفنة . نصلها اعلمليجي الشكل ، جامد المنصف ، عابق الخضار . ازهارها كبيرة القد ، حيلة الشكل منتصبة ، معقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، صطرية الرائحة ، متعددة الالوان ازهارها من الالبيض البلق الى الاحمر القرمزي عصارها سامة يذلل انها تقضي على الثمل .

٢٠٤٤٢ - **فَسُوخ** (F). Claws, Clutches (E).
في الخالب ومنهم من قال برائن الاسد .

٢٠٤٤٣ - **فَسِيخَة**
في اليبيراتوم ، نبات تزييني ، اطله .

٢٠٤٤٤ - **فَسِيخَة** (S).
Ampullaria (F). Ampullaria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الازيل واصلية الفسيخيات . انواعها المعروفة قليلة العدد نحو ١٢ اصنامها انهر وجيراتها فيبلاد الحارة || اصنامها متجانسة الاشكال والاحجام منها الكبيرة والكثيرة ومنها الصغيرة جميعها بطينة غليظة منتظمة الفوهات ، دقيقة الاضباب .

٢٠٤٤٥ - **فَسِيخَة** (S).
Verticillium (S).
جنس ططور مجهرية من الفسيخيات واصلية الرخويات . جرابه الكندي جالس القاعدة ، منتصب القوام ، لاقباسي الشكل . كنانته قائمة ، قاصدية ، عديدة الفروع الهدية للتحاسية الارتكاز || انواعها المؤذية قليلة ، امرها ما يلي :

٢٠٤٤٦ - **فَسِيخَة الرُّبُوقَال**

Verticillium heterochadum (S).
نظر مجهرى ركب ثمار الربوقال الناضجة على الشجرة والخرافطة في اماكن رطبة يفسدونها ويغطونها || مظهرها خارجي بقعة رصاصية اللون تركيب القشرة عند غام اللمرة فضفها . بد ان تقضي على جيوب الكحول والادمان الاثيرة .

٢٠٤٤٧ - **فَسِيخَة الثُّوت**

Verticillium mori (S). Feu volant (F).
نظر مجهرى ركب الثوت في جميع اصفاته من الجذور الى الاوراق . شبيهه سيال شبيه الميوعة يسير في الاوعية ويتغلغل على التسع الحليوية فيطغنها || مظهره الخارجي ذبول فجائي يحل بالاوراق والقوامي فيلويها ويسبب يفساها .

٢٠٤٤٨ - **فَسِيخَة شَالَة**

Verticillium albo-atrum (S). Verticilliosis, Maladie laune (F). Potato wilt (E). Welkekrankheit der Kartoffel (D).

نظر مجهرى عديم الانتشار يسبب عدة نباتات مختلفة انصها الاقران والينانلس والبطاطا والبن والبقنطرة والبرسيم والبنغوين والتبغ والجوز والحوخ والدخيل والزنان والشمندر والشيك والبقطن والقيقب والكشش والبيك والشش والسمان والحوخ وششينة البتار ، الخ . ركب الجذور فيقرح المرادة ويغسل شبيهه على الاوعية



فَسَاة

وتدية غليظة مأكولة إنما يزرع خاصة من أجل خربلاته البغلة المأكولة التي تجنى كاللوبيا الخضراء قبل دخولها في طور الإدراك.

٢٠٤٥٣ - شجل برّي * ، شجيرة

Raphanus raphanistrum (S). Radis sauvage, Ravanelle (F). Wild radish, White charlock (E). Hedrick Reticz, Wilder Reticz (D). Rafano rfanistro, Rafano salvatico (I).

نوع من القليل البري الجليل ينبت في جميع الأربطة والأماكن وهو، إذا كثر في الزروع والخفول، ويكثر من النباتات الضارة الواجب إزالتها، وهو أيضاً من النباتات المرحوة التي تنتشر أثاره.

٢٠٤٥٤ - شجل حار ، شجل أسود

Raphanus niger (S). Radis noir, Rave noire (F). Black radish (E). Schwarzer Reticz (D). Rafanistro negro (I).

نوع من القليل شروبه عديدة بعضها زراعي شائع الاستعمال جالوره غليظة مستطيلة حرة الطعم قشورها أل الجلوة البنفسجية السوداء. وهي مفيدة لآفة الحفر || زيت بزوره يتحل بخلوص زيت القليل نفسه.

٢٠٤٥٥ - شجل زراعي *

Raphanus sativus (S). Radis cultivé (F). Common cultivated radish (E). Garten Reticz, Rettig, Radies (D). Rafano, Ramolaccio, Ravanello (I).

نوع من القليل شروبه كثيرة العدد. جميعها مأكولة الجذور المختلفة الأشكال والأحجام والألوان. وهو من النباتات السريعة النمو، ينبت شروبه تدرك بعدة ثلاثة أسابيع من بزرها || يرغب في الأربطة الباردة، للنبات، القليلة الانتاج || وهو مشهور بمقاومة التآكل. جلوره وإزوائه تقوي المعدة وتكسر البول وتطش لبن المرصعات وتزيد قدره. زيت بزوره يدهي تخمجة وهو ينفع من حصوات المرارة.

٢٠٤٥٦ - شجل ياباني * ، ديكون

Raphanus acanthiformis, R. macropoda (S). Daikons (F). Daikons (E).

نوع من القليل الزراعي المأكول. مهد اليابان. شروبه كثيرة العدد مختلفة الأشكال والأحجام والألوان. تكثر فيها الاستعمال. جلوره ينبت شروبه تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. وزونها يراوح بين ٤ و ١٥ كيلو.

٢٠٤٥٧ - فيجونا *

Feijoa (S). Feijoa (F). Feijoa (E).

شجرة معمرة من فصيلة الآسيات. مهدها ينبت مناطق البرازيل. ساقها غراء فاتح، ترتفع من ٣ إلى ٦ أمتار. أزوارها أبيض، صغيرة القدر، أشبه الشكل، لامة الصفحات العليا، باحة السفلى. أزوارها محورية الإزكانز فردية. فصلها وبثلاثها وأسدتها حراء اللون. عمارها عنية بيضية الشكل، فسنتقية اللون، حافية الب، مأكولة. كسما قريب الشبه بالشيلك (الفريز) || تنموها صفي،

Vacule ٢٠٤٥٨ - فجوة

التنزة في الورقة أي البروتوبلازم.

٢٠٤٥٩ - شجيرة الشط * ، بيناس الشط ، رشاد البحر

Bunias cakilis (S). Bunlade cakilis, Roquettes de mer (F). Common sea

ناتشة، نحو ١٥، طولها خمس أو ست قنابات اعليجية الشكل، باحة الخضراء.

٢٠٤٤١ - قنجيل مفتي الورق *

Fochargilla alnifolia (S). Fochargille à feuilles d'aune (F).

نوع من القنجيل. ينبت بعض مناطق أمريكا الشمالية. ساقه ترتفع من متر إلى مترين. أوراقه قريبة الشبه بأوراق اللث تطول من ٤ إلى ٨ سم. وترقى من ٢ إلى ٥ سم. تصالها كثيفة الزغب على الصفحات العليا، خلية الصفحات السفلى. ساقها الأزهرية تطول نحو ٣ سم. أزهارها يضاء اللون، عطرية البرق، سرعة لا طوق لها.

٢٠٤٤٢ - قنيدكة *

Cleistogame (F). Cleistogamous (E). نمت شمرقي يطلق على الزهرة التي بدلاً من أن يفتح كما للانصبا، يتحول إلى جراب أبيض ملق يضم المليل والمعلقة أحياناً للانصبا.

٢٠٤٤٣ - قنح

Gorge (F). القنح هو حق كاس الزهرة ج. قنح.

٢٠٤٤٤ - قنح

القنح من القنح، ما لم يفتح. القنح كلها فيه من حين قطعها حتى تنضجها.

٢٠٤٤٥ - قنح

Mutation كل تبدل لبياني يحصل في الانتقال الوراثي لصفات نوع أو ضرب من النبات.

٢٠٤٤٦ - قنجر قطبي

Aurore boréale, A. australe (F). Polar lights (E).

٢٠٤٤٧ - قنجر

Noix (F). Walnut (E). القنجر: الجوز الذي يؤكل.

٢٠٤٤٨ - قنجل

Raphanus (S). Radis (F). Radish (E). جنس نباتات عشبية من الهضبات وضلعة الصليبيات أنواعه المروفة ستة منها المناطق المعتدلة، منها البرية والزراعية والحولية والحرولة. جلورها غليظة عديدة الأشكال. ساقها مستقيمة غراء. أزوارها متعاقبة مستطيلة مسنة الحافة. السفلية منها مشبهة التفريص والتشريح. أزوارها صفودية للتجميع منها أو تاجية الإزكانز، صفدية القدر، يضاء اللون أو صفراء أو بنفسجية. عمارها خربيات مستطيلة منقطة. بزورها كروية || أشهر أنواعها ما يتبع.

٢٠٤٤٩ - شجل أسود

هو القليل الحار، الحالب.

٢٠٤٥٠ - شجل الجملان

Slaymbre, Vêlar (F). هو الباردة، الحالب.

٢٠٤٥١ - شجل الليل

هو الحشيان، الحالب.

٢٠٤٥٢ - شجل الهند * ، شجل جوكاء صفري *

Raphanus caudatus (S). Radis serpent, Mougri (F). Snake radish, Mougri (E). نوع من القليل الزراعي البيضي مهد جبارا والهند. أقاليمه يعد من شامل البرس حتى ارتفاع ٥٠٠٠ م || جلوره



قنجيل مفتي الورق




قنجل الحند



قنجل بري



قنجل زراعي



قنجل ياباني



شجيرة الشط

Charbon de bois (F).
Charcoal (E).

الفحم النباتي أو فحم الخشب هو الخشب المحروق بمعدل من الهواء . يتم ذلك بالخشعة .



نخعية مرجانية

Erwinia ardisae

٢٠٤٧٢ - فُحْمَةُ السَّاقِ

وصم بكتيري شديد الانتشار يلحق فُرونيته عسقلية ، الخشب .

Sphacelotheca

٢٠٤٧٣ - فُحْمِيَّةٌ

جنس تطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراعيويات تتميز بخلا حبيباتها العاشر من الألياف البارزة || أنواعه عديدة جميعها مؤذية تصيب النجيليات المشهورة ما يليق .



فصية الدخن

٢٠٤٧٤ - فُحْمِيَّةُ الدَّخَنِ

Sphacelotheca holci-sorghii, S. reiliana, Ustilago holci-sorghii, U. reiliana, Sorosporium reilianum (S).
فطر مجهرى يصيب ازهار اللوز والقمح على اختلاف أنواعهما || مظهره الخارجي كتل غليظة بيضية تنشئ الشكل من زائداته دون أن تقرب من الاغشية الزهرية . صفة البوي سريع الانقلاق . يربطاته من اللون ، كروية الشكل ، خشكة البشرة ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ مم . || يكالغ مكافئة فصية اللوز .

٢٠٤٧٥ - فُحْمِيَّةُ الدُّرَّةِ

Sphacelotheca sorghi, Ustilago sorghi, Sporisorium sorghi (S). Charbon couvert du sorgho (F). Covered smut of sorghum (E).

فطر طفيل مجهرى يصيب المطر والشكل فيزيائياً ويطلب الازهار ويمنها عن العقد || مظهره الخارجي ينثر بويضة لونها الى القلعة ، يبيض القاعدة ، خشية القمة ، لساء البشرة تنطلق من غيرات كروية لونها الى السرة القائمة . يكالغ بتغير البذار بمسحوق كربونات النحاس او سلفات النحاس .

٢٠٤٧٦ - فُحْمِيَّةُ الزَّهْرِ

Sphacelotheca cruenta, Ustilago cruenta (S).

فطر مجهرى يصيب الزهر فيقضي عليه . ينشأ أولاً بصفة البويضة للكلوي الشكل السريع الانقلاق . ثانياً بفروسه النخعية المستطيلة التي تتركب جميع اغشية الزهر مع زائدات وراشات وسالين الشكل . ثالثاً بأزدياته المندمة القائمة على سن البويضات بعد تحويلها الى بؤر بويضة || وهو من الأوصاف المندمة الانتشار كثره اذاً لها تتطلب العديد من العوامل البيئية المؤاتية || يكالغ مكافئة فصية اللوز .

Symptôme (F).

٢٠٤٧٧ - فُحْمٌ ، عَرَضٌ

Symptom (E).

ج فوئمن وأعراض .

٢٠٤٧٨ - فُحْمُومَةٌ

هي الفشران الاسود ، وصم فطري يصيب الكروية .

٢٠٤٧٩ - فُحْجٌ

فحج الاضى : صوباً من فيها وكثيش الاضى صوباً من جلدها .

rocket (E). Echter Meersalz (D). Baccheroni, Ravascello maritimo (I).

نوع من البلياس وهي عشية برية حولية يقال انها طيبة منها دبال الشطوط البحرية والبرية . جنوباً حجازية وتدية . سوقها وفروعها زبد . اورقاتها خلية البشرة . ازهارها صيرة اللد ، يبيض اللين . وهي عشية مرعوية متوسطة المادة اللدائية تنشط الدر .

Spadice (F). Spadix (E).

٢٠٤٨٠ - فُحَالٌ

هو ذكر النخل خاصة ينبغ به حولها . ج . فصاحيل .

Symptomatologie (F).

٢٠٤٨١ - فُحَالَةٌ

Symptomatology (E).

الشفاعة علم يبحث في امراض الامراض .

Tant

٢٠٤٨٢ - فُحْصٌ

Analysa du sol (F).

٢٠٤٨٣ - فُحْصُ التُّرْبَةِ

راجع تحليل التربة .

Fossette (F). Small cavity (E).

٢٠٤٨٤ - فُحْصَةٌ

الفصية نفرة صغيرة تكون في بعض الحبوب والبذور . والنفرة الموجودة عند رباط الاصداف البحرية من فوات المصريين تدعى ايضاً فصية . ج . فماس .

٢٠٤٨٥ - فُحْصِيَّةُ مَرْجَالِيَّةٌ

Embothrium coccineum (S). Embothrie écarlate (F).

جنبة زرقانية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها متصصة فروعها تملأ من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اثمارها حرشية اللحم . اورقاتها بسيطة ، متعاقبة ، متعقبة ، قصيرة الزناد . نصلها اطيالبي الشكل لامع الفصية العليا باحت السفل . ازهارها متفوية التجميع ، ثنائية التزويج ، تاجية الارتكاز ، حواء اللون || ازهارها يشتر من تموز الى آب .

Etalon (F). Stallion (E).

٢٠٤٨٦ - فُحْلٌ

الاكر من كل حيوان . ج . فحول والفحل وفحال وفحالة وفحولة .

Carboniser (F). To carbonize (E).

٢٠٤٨٧ - فُحْمٌ

حول الشيء الى فحم .

Charbon (F). Coal (E).

٢٠٤٨٨ - فُحْمٌ

اسم شامل يطلق على بعض مركبات الكربون غير المتبلور . اشهر انواعه الحجري والنباتي .

٢٠٤٨٩ - فُحْمُ الْعِظَامِ

Noir animal, Charbon d'os (F). Bone-black, Animal charcoal (E).

سماد فسفوري يحصل من حرق العظام بطريقة خاصة .

Houille (F).

٢٠٤٩٠ - فُحْمٌ حَجَرِيٌّ

Coal, Pte-coal (E).

مادة معدنية سوداء اللون تستخرج من الارض تستعمل وقوداً . انواعها متعددة تختلف باختلاف نسبة الكربون التي تحويها .



فصية الزهر

۲۰۴۹۲ - فِدَادُكَة كَالِحَة * *Ula nebulosa* (S).

Chouette nébuleuse (F).
طائر من الفئاد كبير الجفّة طوله نحو ٦٠ سم. موطنه أمريكا الشمالية. يأوى الى الاسراج الكثيفة. يصيد الجرذ والقار والارانب والسنجاب والصفادع والفاقد والاسماك.

۲۰۴۹۴ - فِدَادُكَة
Grenouille (F).
هي الضفدع، اطلقه.

۲۰۴۹۵ - فِدَادُكَاتِيَات
Ululens (F).
عمارة من فصيلة الببويات تشمل ثمانية اجناس: الخيم والخيول والصدى والضوء والفداد والتهام والهرق والهرد.

۲۰۴۹۶ - فِدَاكُر
Concasseur (F). Breaker (E).
۲۰۴۹۷ - فِدَاكُرَة

Pratia (S).
Pratie (F). *Pratie* (E).
جنس نباتات عشبية معمورة من فصيلة الببويات. موطنها متصبية او مستطيلة. اوراقها متعقبة، متمالة. ازهارها عويية الازتكاز، فردية، مستطيلة المالحق، ثمارها عنية متباعدة الخصب يكثر ثمرها الاخر || انواعها المعروفة قليلة البدء، اشهرها التالية.

۲۰۴۹۸ - فِدَاكُرَة ضِعْمَة التسنين

Pratie macron (S). *Pratie à grosses dents* (F).
نوع من الفدانة. ساقها قصيرة متصبية فراء. اوراقها صغيرة مسطوية الشكل، شبه لحمية النصال، غسفة التسنين اختاري. ازهارها حلزونية العرف، قصيرة المالحق، صفراء اللون، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

۲۰۴۹۹ - فِدَاكُرَة قُرْصَة *
Pratie perpusilla (S).
Pratie naia (F).

نوع من الفدانة. ساقها جذعة. اوراقها شديدة الصغر. ازهارها مستطيلة المالحق، صغيرة القد، بيضاء اللون، تخليق التوجبات || تنويرها من حزيران الى تموز.

۲۰۵۰۰ - فِدَاكُرَة حُرْصَة

Pratie angulata (S). *Pratie anguleuse* (F).
نوع من الفدانة. ساقها محرمة فراء تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها متعقبة، بيضية الشكل، نصلها مزرقية البشرة. ازهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون، مرققة بالاجر. ثمارها عنية حراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

۲۰۵۰۱ - فِدَاكُرَة صَدَاكَة *
Pratie repena (S).
Pratie rampante (F).

نوع من الفدانة. ساقها مدادة زائفة. اوراقها مستطيلة الاعتك التي يتجاوز طولها طول النصال، نصلها شبه قلبية الشكل، عادمة التسنين. ازهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون، شديدة بالبنفسجي. ثمارها عنية مرجانية || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

۲۰۵۰۲ - فِدَاكُم
Chausse (F). Filter (E).
مصفاة تمر بها السوائل لتفقي.

۲۰۵۰۳ - فِدَاكُن
Bœufs de travail, Bœufs de labour (F). Oxen (E).
القدان هما الثوران الذان يقدن عليهما. ج. قدن وأندة.

۲۰۴۹۰ - فِدَاكُل
Racour (F). Thorough (E).
نمت تعريف يطلق على الحيوان الذي يطبع في القتل صفاته ذكرا كان او انثى.

۲۰۴۹۱ - فِدَع
Happeau (F). Snare (E).
اداة تصاد بها الطيور والقوام.

۲۰۴۹۲ - فِدَعَار
الطين المطروح. وقبل الطبخ هو عزوف وصلصال.

۲۰۴۹۳ - فِدَعَت
Clarté de la lune (F).
الغيت هو ضوء القمر.

۲۰۴۹۴ - فِدَعْد - فِدَعْد
Cuisse (F). Thigh (E).
عضو من اعضاء الجسم الحيواني. وما فخدان. ج. اخفاذ.

۲۰۴۹۵ - فِدَعْد الدب
نجم من كوكبة الدب الاكبر.

۲۰۴۹۶ - فِدَعْر الثلوج
هي الثيرونوكا. اطلقها.

۲۰۴۹۷ - فِدَاكُم
Volume
الفداء: حجم الشيء.

۲۰۴۹۸ - فِدَاكُم
Oton
الافداء حيوب المصقة لا تزال حسانتها حائلة بها وتكون غالباً صوب نخلة او صفيحة.

۲۰۴۹۹ - فِدَاكُم
Grenier (F). Grenary,
Score-house (E).
هو الإبتار، اطلقه.

۲۰۴۹۰ - فِدَاكُم

Chouettes (F).
Screech-owls, Barn-owls (E).
جنس طيور من الببويات وحارة الفداديات. انواعها عديدة جميعها من الرؤاس الكواسر. كبيرة القد، خفيفة الرأس، عريضة الجسر المستدير، قوية للفسر. القوا الى البصرة الموحشة تعلوها رقعة صغيرة البقية وبعض التباديع. قوته القارتي على اختلاطها والصفادع والظلام ... ين في تجلويث الاشجار القديمة العهد او في الاركار الكبيرة المزروكة. انثاه تبيض مرة واحدة في العام. حضانة تراوح بين ٤ و ٦ بيضات || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

۲۰۴۹۱ - فِدَاكُرَة الشَّرَق *
Ula noctua (S).
Chouette chevêche (F).

طائر من الفداد اصغته فسيحة الاجزاء تمتد من الصين الى اطراف اوروبا ومن حضايا افريقية الشرقية وبرتغيات انبوية الى ايام مراكش الاطلسية || وهو آبد، متوسط القد، طوله نحو ٤٥ سم. يأوى الى الاسراج والخواب. سره يدوم من القس الى الفجر. يصيد الجرذ والقار والظاء والصفادع وجميع انواع الحشرات والبدان.

۲۰۴۹۲ - فِدَاكُرَة الشَّال *
Ula isponica (S).
Chouette lapone (F).

طائر من الفداد كبير الجفّة طوله نحو ٧٠ سم. يأوى الى اسراج البلاد الباردة اخصها الشمالية || وهو بلي الطيران لا يصف من شيء يمكن منه وقد يقتصر السنجاب والفتور.



فِدَاكُرَة الشَّرَق.



فِدَاكُرَة الشَّال



فِدَاكُرَة كَالِحَة

٢٠٥١٤ - قرأ التبت * ، همنين

Equus hemionus (S). *Hémione* (F). *Klang* (E).
نوع من الفراء موطنه التبت ويصنف في ثاني أسية الوسطى .
وهو كبير الجثة يملو نحو ١٢٠ سم . ويطول ٢١٠ سم .
يما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم || رمله يراوح
بين ٨ و ٢٠ .



فرد للساكن

Eques indicus (S). *قرأ الحند ، قو لان* (S).
Onagre de l'Inde, O. de Britson, Koulan, Ghour,
Ghor-Khur (F).
نوع من الفراء موطنه الهند والافغان والباكستان ويران
وهو متوسط القد جسمه حبي الفراء الاسودى الا انه افتح
ثوباً وأعرض ثوباً وأطول أذنأ || عدد رمله يراوح
بين ٨ و ١٥ .

٢٠٥١٦ - قوراك || ما في كوش الحيوان من القورث .

٢٠٥١٧ - قوراج || هو الفرد نبات مقني ، اطلبه .



فراء آسودي

٢٠٥١٨ - قوراج ، قوراك
Cépée (F).
Tuft of shoots (E).
جاء القرواني الي تفرخ حول اربعة الشجرة المغطوة .

٢٠٥١٩ - قوراك || هي العائقة ، اطلبه .

٢٠٥٢٠ - قوراك ، قورور || ولد النسبة والاعز وقبروة .

٢٠٥٢١ - قوروكية *

Ferraria (S).
Ferraria (F). *Tiger flower* (E). *Tigerblume* (D).
Gladitolo indiano (I).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات انواعه قليلة
جميعها زينة. سقفا ظارية . اوراقها لاسعة زاهية الخضار
مشربة اخضر بالاحمر والبي . انماها جميلة الشكل كبيرة
القد نورة ووشحة لكنها سرية القبول اما اسمها فتدغم
وسمها كبيرة ويهدية || يستخرج من دوائها مادة
مضية حريفة تستعمل في الطب || اشهر الوراها ما يلي .

٢٠٥٢٢ - قوروكية سوداك
Ferraria atrata (S).
Ferraria noldica (F).

نوع من القوروكية السوسنية ساقها تملو نحو ١٥ سم .
انماها الى الحيرة الابروانية التبرع للوشحة التبرع للاخضر
والاصفر || انماها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٣ - قوروكية متماوجة

Ferraria undulata (S). *Ferraria undulata* (F).
نوع من القوروكية السوسنية . ساقها تملو من ٢٠ الى ٣٠
سم . انماها الى الخضار الاسمر تملو رقيقة جروية .
بتلاتها مكوية النصل ، منقطعة الاطراف || انماها
يستمر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٤ - قوروكية
Ecrémusse (F). *Separeur* (E).
آلة تفرخ الكتانة من الحليب مع بيد القوة النابضة .

٢٠٥٢٥ - قوروكية ، قوروكية
Equitation (F).
Horsemanship, Riding (E).
هو فن استقاء الخيل .

٢٠٥٢٦ - قوروكية الجور
Prévision du temps (F).
Prevision from time (E).
هو تشخيص الجور .

٢٠٥٢٧ - قوروكية
هو البين المحتدي ، اطلبه .



قوروكية

٢٠٥٠٤ - قورور
Chamois (F).
الفرد والقور هو النملوة . ج قورور وفرد .

٢٠٥٠٥ - قورور
Concasser (F).
To bruise, To crush (E).
قورور الحبيابة : كسرها صغاراً .

٢٠٥٠٦ - قورور
Araignée (F).
هو العنكبوت . ج قورور .

٢٠٥٠٧ - قورور المسكن ، عتكيوت القارول

Tegenaria domestica (S). *Tégénnaire domestique*,
Araignée domestique (F). *House-spider* (E).
نوع من العناكب الساعية المربصة الفانسة ثنائية القروايا
سداسية المشاان ينتمي الى فصيلة العنكبوتات || جسمه
صغير القد بطول نحو ٨ م . عند الذكر ونحو ١٤ م .
عند الانثى . صدره مثل الجرم لونه ال الصفرة الخضراء
المزاج . صبا زهيتان . خضفاه صيرتان ذريتان . تكاه
تقيدان عجمتان . جرماتو نملة كثيفة الحلب . بطة اثير
الكون تملو بعض الزواكش واللفظ || يأن المسكن
والماولة والخراب . تته الحشرات الصغيرة والذباب والحمل .
يربص لها في حبه ويسى اليها ركضاً وقفزاً . حبه كبير
القد ، اقل السطح ، قمي المركز ، يقبه في الزوايا
يلجأ اليه في النهار ويسرح في الليل || ياله الشتوي
يستمر نحو ١٧ اسبوعاً يقفها في مكانة بطولية الشكل
ينسجها في شقوق الخواش او تحت الاغصان ويثا ||
يمش نحو ثلاث سنوات . ملجته الحياتي لا يختلف من
ملجن غيره من العناكب || يعتبر من القوريات النافعة
اللاذنية .

٢٠٥٠٨ - قورور
Araignée (femelle) (F).
Spider (female) (E).
الذئب انثى العناكب (قورور) .

٢٠٥٠٩ - قورور
Distorsion (F). *Distorsion* (E).
الذئب النواء يطرأ على عضو من الجسم او على قسم منه .

٢٠٥١٠ - قورور
قورور القلم : البقل الكثير الماء .

٢٠٥١١ - قورور ، قورور
Niveler (F). *To level* (E).
يسط الارض ويصلاها .

٢٠٥١٢ - قورور ، قورور
Onagre (F). *Onager* (E).
متر من الحمر الوحشية حديثة الانواع تتميز باذنانها النقية
واذنانها الصغيرة وأعرافها القصيرة السبب المنصب
وسوارها القليلة الاستدارة || اصطناعها يصنف في ثاني وجبات
العالم القديم . تميل جمادات . ارباعها لاجسية يراوح
عدد افرادها بين ٥ و ٢٠ رأس الرجل فصل يقوده ويحمي
ال ان ينطلق على امر فيتنسى . اعرف انواعه قورور التبت
واحدة والقور الاسودى .

٢٠٥١٣ - قورور الاسودى * ، قورور الشام

Equus hemippus (S). *Hémippe*, *Onagre de Mésopotamie* (F). *Syrian wild ass* (E).

نوع من الفراء ثوبه انيس اللون موطنه يمتد من جبال ايران
الى العراق لسورية حتى تدمر . وهو متوسط القد يملو نحو
١١٥ سم . ويطول ٢٠٠ سم . يما في ذلك الذنب الذي يبلغ
٤٥ سم . رمله يراوح بين ٥ و ١٢ .

٢٠٥٣٣ - قراغة (F). Butterfly, Moth (E).
اسم شامل يطلق حل جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. وبهم من خصص الاسم بحشرات القمصيلة القراغية دون سواها.

٢٠٥٣٤ - قراغة الحصيد (F).
هي غصية الحصيد، اطليا.

٢٠٥٣٥ - قراغة الحنطة (F).
هي غصية القمح، اطليا.

٢٠٥٣٦ - قراغة الزعرور

هي كرنيبة الزعرور، اطليا.

٢٠٥٣٧ - قراغة السمسم

Antigaster catalanalis (S).
راجح دودة السمسم.

٢٠٥٣٨ - قراغة الصنفايد (F).
هي حلوظ الكربة، اطليا.

٢٠٥٣٩ - قراغة القث (F).
هي كرنيبة القث، اطليا.

٢٠٥٤٠ - قراغة الملفوف (F).
هي كرنيبة الملفوف، اطليا.

٢٠٥٤١ - قراغة جوارك القطن (F).
هي دودة القطن الشوكية، اطليا.

٢٠٥٤٢ - قراشيات (S).

Papilionidae (F). **Papilionidae**, Swallowtails (E).
Ritter (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة، صولجانايات القرون. اجنحتها والاولاهما كثيرة الممد منتشرة في جميع اصقاع العالم.

٢٠٥٤٣ - قراشية (S).
Papilionaceae (F). **Papilionaceae** (E).

سبط من فصيلة القريبات اجنحته نحو ٣٠٠ منها الاثمار الجنبات والمكسقات والاصباب الحولية والمعمرة. معظمها زراعي غذائي او عطري وصناعي.

٢٠٥٤٤ - قراط (S).
Coregonus fera (S).
Féra, Férat, Ferrat (F).

سمكة ثورية من السلموليات. اطليانها بمجرات صوبيرا وايطاليا الشمالية وقد انتشرت تربيتها في الاخوار والاضواض المصنعية المبيعة النور. جسمها بطول نحو ٥٠ سم. ثورجها الى السمرة الحطية الخضراء المولج. يطها الى الثيرة البيضاء. لحمها جيد الصنف مرغوب فيه ككلم القور.

٢٠٥٤٥ - قراغ، قنطرة، قنطرة (F).
Lacuna (F). **Lacuna**, Air-cell (E).

كل فراغ في النسيج النباتية.

٢٠٥٤٦ - قراغ حجووي (F).
Vacuome
هو في النسيج الحية جيوب دقيقة خالية من الهواء.

٢٠٥٤٧ - قراغي (F). **Lacuneae** (E).
نعت ترميضي يطلق على النسيج النباتية التي يتخلل خلاياها فراغات مليئة بالهواء او بغيره من السوائل المختلفة. يقال نسيج قراغي.

٢٠٥٤٨ - قراصيون، بياذ كورود (S).
Marrubium (F). **Marruba** (F). **Horehound** (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة مسرة من فصيلة الشفويات. اناوله عديدة جميعا طرية تتميز برعها الضواغ القريب الشبه من الملك. سيقانها فراء غشوية مزينة. اورقها متعابلة متقابلة بيضا. فصلها كثيرة الفروق، متجمعة الصفحة الحطية البشرة، مسنة الخار. اناولها صغيرة الله، ضمية التجميع. محورية الارتكاز || اعرف اناوله مائل.

٢٠٥٤٩ - قراصيون ابيض، حشيشة الكلب، قلبه، مقل الصنف

Marrubium vulgare (S). **Marrube commun**, M. blanc (F). **Common white horehound** (E). **Marrubium**, **Welsch Androm** (D). **Marrubio comune**, **Marrubio**, **Mentastro**, **Erba apiola**, **Prasline** (I).

نوع من القراصيون وهو ضمية مبلولة تثبت في الاراضي الجور وتل جوانب الطرقات. تطلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقها فراء كثيفة الزغب الابيض. اورقها صغيرة الله، بيضا الشكل، سمكة التصل الحشن. اناولها الى اليافس الاخير || وهو قوي الرائحة المرصية، مر، حريف، لاذع وقايش. يدر البول ويخفف الحرارة وينفي التشنج ويعمل حالات السعال.

٢٠٥٥٠ - قراصيون اسود، بكتوط الارض

Ballota nigra (S). **Ballota fetida**, B. noire, **Marrube noir** (F). **Fetid-horehound**, **Black horehound** (E). **Schwarze Bulke**, **Fenweibel**, **Zahnlos** (D). **Marrubio bastardo**, M. nero, **Ballota fetida** (I).

نبات عشبي طيحي بري من فصيلة الشفويات طري الرائحة القوية، يدر البول ويبرد التورم ويذل الحامض البولي وينفي التشنج || ساقه فراء. اورقها متعابلة، اهليجية، صغيرة الله || فصلها شثن الصفحة، مسن الحافة. اناوله دقيقة مستطيلة ضمية التجميع، محورية الارتكاز لونها الى الجلوة.

٢٠٥٥١ - قراصيون القلب، بكلة الامهات

Leonurus cardiaca (S). **Léonure cardiaire**, **Agripaume**, **Cardiaque** (F). **Common mother-wort** (E). **Echtes Herzgespann** (D). **Cardiaca**, **Leonuro**, **Melissa salvatica** (I).

عشبة برية طيبة مبلولة من فصيلة الشفويات. ساقها تطلو نحو ١٠٠ سم. اورقها متقابلة متعابلة، فصلها مفروض الصفحة شديد الخشار. اناولها صغيرة الله، ضمية التجميع، محورية الارتكاز لونها الى المسرة تملوها رقة بيضاء || كان ولا يزال يستعمل في علاج امراض القلب عند الاطفال وبهم من قال ان مثل نقيه يعني الكلب.

٢٠٥٥٢ - قراصيون مائي

Lycopus (S). **Lycopo**, **Marrube aquatique**, **Pied-de-loup** (F). **Gipsywort**, **Water horehound** (E). **Gemeiner Wolfstrapp** (D). **Lycop**, **Marrubio acquatico**, **Erba sega** (I).

نبات عشبي طيحي بري مسر من فصيلة الشفويات يكثر في المناطق والمواقع الرطبة. ساقه فراء. اورقها متعابلة، لاذعة، سانية؛ فصلها منشاري الخشار، خلي البشرة. اناولها بيضاء اللون، صغيرة الله، ضمية التجميع، محورية الارتكاز || يقال انه يظهر الجرح ويلعنها وهو حريف لاذع يستعمل في التخفيف الاسود.



قراصيون ابيض



قراصيون اسود



قراصيون القلب



قراصيون مائي



قراغ

ايض الحار || ازهاره خيمي الشكل ثلاثي الاكوار
يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٠٥٥٩ - **فريون الالديين *** ، **يتوق هندي**
وكوم هندي

Euphorbia antiquorum (S). Euphorbe des anciens
(F). Ancient milk-wort(E). Wolfsmilch der alten(D).
Euforbio indiano, E. triangolato (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمر كان يستعمل في
الماضي لعدة علاجات امخصوصا الاستسقاء والصلحاح وهو
يستعمل الآن في الطب البشري لانه سهل حثيف لا يتخلو
من السموم القاتلة .

٢٠٥٦٠ - **فريون السباحين**

Euphorbia piscatoria (S). Euphorbe des pêcheurs (F).
نوع من الفريون البري للممر . ساقه فرعاء خفيفة ،
قطرها نحو ٢٠ سم . يصلها ثلاثة اشعار . فريه خرايب
مستطيلة قطرها نحو ١٠ م . اوراقه خفية طويلة نحو ٥ م .
وتعرض ٦ م . لوفا الى الخضار البشري . ازهاره
خيمي المتجمعة ، خاسي او سبالي الاطراف . صانته
قزيرة المادة الجسالية القليلة تستعمل في صيد الاسماك .

٢٠٥٦١ - **فريون السمج *** ، **يتوق السمجور** ،
رصاد

Euphorbia helioscopia (S).
Euphorbe héliscopie, Réveil matin, Herbe aux
verrues (F). Sun spurge, Wort-grass, Wort-
Wort (E). Sonnenwolfsmilch (D). Euforbio mira-
sole, Rogna, Titimalo elioscopio (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمر . يقال
ان ضياء اوراقه او صلاته يقضي على النمل .

٢٠٥٦٢ - **فريون افريقي** ، **فريون لالسي**
الورق ، **يتوق المكسيك**

Euphorbia heterophylla (S). Euphorbe hétérophylle,
Poinsette d'Amérique (F). Mexican fire-plant (E).
Poinsettia (D). Poinsettia d'America (I).

نوع من الفريون المحلي . ساقه منتصبة تنمو من ٣٠ الى
١٠٠ سم . اوراقه معتقة ، السفلى منها بيضية الشكل مدببة
المقصصة ، تصلها مسن الحافة على الصفحة السفلى . اما
الاوراق العليا فانها لا تقياسية الشكل والجمع منها البسيطة
والمقصصة والمقرنة والمقرنة . ازهاره قليلة العدد ، ثنائياتها
حرة التفتح ، ولبنية الانسان لطفلة التجزي ، ازهاره
يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٥٦٣ - **فريون بهي**

هو الاكليل الشوكي ، اطلبه .

٢٠٥٦٤ - **فريون رانج**

Euphorbia fulgens (S).
Euphorbe éclatante (F).

نوع من الفريون البري المعمر . ساقه خشوية نجيلية
تتولى نحو ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، معتقة ، متدلية ،
تصلها خيوط المصقة بطول من ١٠ الى ١٥ سم . ويعرض
نحو ٢ ، ازهاره عذرية الاذنكاز كبيرة اللند البتلية
الشكل ، للمراء اللون || ازهاره يستمر طوال الربيع .

٢٠٥٦٥ - **فراغية *** ، **Vacuisme** (F). **Vacuum** (E).

الفراغية ملحق فلسفي حكمي قديم العهد يقول بان الفراغ
موجود في الطبيعة .

٢٠٥٦٩ - **فراغيب** شجر تميل منه الرجال (السان) .

٢٠٥٧٠ - **فرايموز *** ، **عوسج ايد *** ، **عوسج حوي**

Rubus idaeus (S). Framboisier (F). Red raspberry,
Raspberry-bush (E). Echter Himbeerstrauch (D).
Lampine, Lampona, Rovo idaeo, Mora prugnola (I).
جنية مشمرة من جنس العليق وفضيلة الورديات . ارضها
معمرة . ساقها متعقبة عمولة شائكة . اوراقها مركبة
متعاقبة . وريقاتها لاقامية المدد الذي يراوح من ٢ الى
٥ نصالها بارزة الفروق مسنة الحافة ، مزينة المصقة
السفل . ازهارها متعددية التجمع ، عذرية الاذنكاز ،
مستطيلة المالبق ، يضاء اللون . ثمارها شاميل جزوية
اللون او بنفسجية مائلة . وهي مأكولة مستحبة العلم
تعتبر من المرتبات البليات || زراعتها تقدم في الخبز
نفسه من ١٠ الى ١٢ سنة . تتكاثر بالانلاخ التي تنرس
على ابعاد يولية تراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ سم . وابعاد
مستطلة تراوح بين ١٢٠ و ٢٤٠ سم . وهي رطب في
الارض الحريية القليلة الانساج وفي المواقف الظليلة الرطبة .

٢٠٥٧١ - **فرايموز** ، **مصمكة**

Framboise (F).
Raspberry (E).
ثمرة الفرايموز وهي غنية بالفيتامين هـ ث و لثة غرام من
لبنة المأكلي تحوي من ٢٠ الى ٢٥ مغ . فيتامين هـ ث .

٢٠٥٧٢ - **فراون ***

Fournier (F).
هو الفرار من الطيور الامريكية ، اطلبه .

٢٠٥٧٣ - **فراون**

هو الجير ، اطلبه .

٢٠٥٧٤ - **فراون**

هي الشيلك ، اطلبه .

٢٠٥٧٥ - **فراون**

سبط من فصيلة الورديات يعرف بالشيليكيات .

٢٠٥٧٦ - **فراون**

واحدة الفري اي الباف .

٢٠٥٧٧ - **فريون** ، **يتوق** ، **تاكون** ، **عنجيد**

Euphorbia (S). Euphorbe (F). Spurge, Devil's milk (E).
Wolfsmilch (D). Euforbio, Titimalo (I).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة الفريونيات .
انواعه نحو ١٦٠٠ منها الحولية والمعمرة ومنها الشبية والقيمية
والخشوية والحمية الاوراق كالمسار || اصطناعها البلاد
الحارة . جميعها دامة لبنة المعصرة . معظمها طبي جمالي
المادة || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٠٥٧٨ - **فريون ابيض التحولي**

Euphorbia marginata, E. variegata (S). Euphorbe
marginée (F).
نوع من الفريون الحولي . ساقه متعقبة مزينة تنمو من ٦٠
الى ٩٠ سم . اوراقه الجاهية متعاقبة اما العليا والجمالية
فصلابة وهي لاطقة ، تصلها بيضي الشكل ، مبرج المصقة ،



فرايموز



فريون الاقسين



فريون القمر

٢٠٥٧٧ - قَرْجِي، عَكَلِي، أَصْلِي

Congénital (F). Congenital (E).

نمت تمرقي رادف الصفة الوراثية حسنة كانت او سيئة .

٢٠٥٧٨ - قَرْجَانَكَة، قَطْر الحَقْل

جس فلور بأكله من فصيلة الفاروقينات . اشهر انواعه الفاروق المربي .

٢٠٥٧٩ - قَرْج

ولد الطائر هذا الاصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والاشجار فريضة وجمع القلة افرخ وافرغ والكثرة فراخ .

٢٠٥٨٠ - قَرْج، بِقَيْمَكَة، وَكَزَرَة، وَدَة، هَنْب

Rajet, Rajeton (F). مَوْش .

Young shoot, Sprout, Offshoot (E). الفرخ والنباتة وفكرة والولد والطيب والمرش قضبان تنشا من براعم عرضية على موضع ما من ساق الشجرة ولا سبل الاروية المظوفة .

٢٠٥٨١ - قَرْج * Perca (S). Perche (F). Perch (E).

جس اسمك من فصيلة القرشيات ورثة النظميات الشاكتات الزعانف . انواعه عديدة جميعها من اسماء المياه العذبة تعيش في الانهر والبحيرات والايواض . طولها يراوح بين ٢٥ و ٤٠ سم . ألوانها تتخطف مع فصول السنة ، يكثر فيها اللون الاسفر المنحطب يطوق بتجميع معروض اسم يحزم الطور والايامل وينتهي عند البطن || اعرف انواعه واشهرها :

الفرخ المذول Perca fluviatilis (S). Perche

Commune (F). Common perch, European perch (E).

الفرخ الإيطالي Perca italica (S). Perche d'Italie (F).

الفرخ التركستاني Perca schrencki (S).

Perche du Turkestan (F).

الفرخ الكندي Perca gracilis (S).

Perche du Canada (F).

٢٠٥٨٢ - قَرْج لَيْلِي

Latèn du Nil (F). هو لانس الليل ، اطلبه .

٢٠٥٨٣ - قَرْج البَط

Caneton (F). الذكر من صغير البط .

Duckling, Young duck (E).

٢٠٥٨٤ - قَرْج النَحْل، فَرْج النَحْل

Essaim d'abeilles (F). Bee-swarm (E).

ثول من النحل هجر غايته لتسير غلية جديدة . والفرخ يتألف من ملكة وذكر وماملات .

٢٠٥٨٥ - قَرْجَة البَط

Canette (F). Small duck (E).

الانثى من صغير البط .

٢٠٥٨٦ - قَرْجَة خَصِيَة

Poularde (F). فرخة تخصى وتسمن . وتلقى ايضاً مطبوخة .

Fat pullet (E).

٢٠٥٨٧ - قَرْجَة سُلْطَانِيَة

Poule sultane (F). هي البرهان السلطاني ، اطلبه .

٢٠٥٨٥ - قَرْجِيُون لَسِيْرُس * ، قَرْجِيُون

مَنْصَلَب، حَبَّ الْمَلَكَة

Euphorbia lachryis (S). Euphorbe épurge, Epurge, Catapuce, Catharinece (F). Capen-epurge, Myrde spurge, Wild caper (E). Springwollmilch (D). Catapuzza, Euforbio latrida, Gomitaria (I).

نوع من الفريون وهو نبات ليلى يري حول يكثر في المراتع الرطبة ويصبر من النباتات الضارة || ساقه تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اولاهه متطابقة متصالية رباعية ، نصلها سنانى الشكل وحيد النسل . عادم القرون ، بحري اللون ، يطول من ٦ الى ١٢ سم . ويمرض نحو ٢ سم . انزهاره غشيى الشكل ، رباعي الاطراف الفرقة ، يستمر من حزيران الى تموز .

٢٠٥٦٦ - قَرْجِيُون مَعْرُوفِي * ، شَعْرُوفِي، عَمَقِي

Euphorbia officinarum (S). Euphorbe officinale, E. des apothicaires, E. de juifs (F). Poisonous gum-thistle (E). Gebräuchliche wolfmilch (D). Euforbio officinale, E. del speziale (I).

نوع من الفريون البري الطبي للممر . ساقه منتصب . عراحيبه متصلة تطل نحو ٨ سم . لونها الى الخضار الباهت . حار خلوصها قرني للمادة غير اللون || صغاره غزيرة للمادة الجسالية الثالثة الاستعمال الطبي .

٢٠٥٦٧ - قَرْجِيُون مَدَلِي

Euphorbia pendula (S).

Euphorbe pendante (F). نوع من الفريون السروي للممر . ساقه منتصبه فراء . فروه عراحيب اسطوانية دقيقة اسلية الشكل ، متدلية . نواميلها تطول نحو ٥ سم . اولاهه عراشف لحية مظلة لزوايا ، بحرية الخضار ، متطابقة الاينكار .

٢٠٥٦٨ - قَرْجِيُونِيَّات، بِقَيْمِيَّات

Euphorbiaceae (S). Euphorbiacée (F).

Euphorbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها نحو ٣٥٠٠ تنتمي الى ٢١٠ اجناس . جميعها من النباتات السامة البنية الصارة || اصطناعها البلاد الحارة . معظمها بري وذيبي وبعضها طبي وصناعي .

٢٠٥٦٩ - قَرْث السرجين ما دام في كرش الحيوان .

٢٠٥٧٠ - قَرْج، لَغَر

Vulva (F). Vulva (E).

هو مجسمة الاعضاء التناسلية الخارجية في انثى الحيوان

يشمل الشفرين والثرنية وبالطارة والكنية .

٢٠٥٧١ - قَرْج الْأَرْض

هو سورنجان الجبل ، اطلبه .

٢٠٥٧٢ - فَرْجَك

Compes هو البركار ، اطلبه .

٢٠٥٧٣ - فَرْجَكُورِي

En cercle (F). Az circle (E).

لعت تمرقي توصف به المخلوط الدائرية .

٢٠٥٧٤ - فَرْجَكَة

Orifice (F). اطلب فحة .

٢٠٥٧٥ - قَرْجَكَة

Panage (F). Grooming (E).

تنظيف جلد الحيوان بما عليه من اوساخ والقدار وفير...

٢٠٥٧٦ - فَرْجُون، مَيْحَكَة

Etrille (F). Curry-comb (E).

اداة من حديد تستعمل لتنظيف جلد الحيوان .



فريون ليسرس



فريون مدلي



فرخ

Individualité (F). **فَرْدِيَّة ، شَخْصِيَّة**

Individuality (E).

جَماع الصفات التي يَتميز بها الفرد عن سائر المجموع .

Imparité (F). **فَرْدِيَّة ، وَتَرِيَّة**

Imparity (E).

كون الشيء عَلاً أو فَرْداً .

Troupeau de moutons (F). **فَرْد ، فَرْد**

Flock of sheep (E).

طَبع الفَرَس الكَثير المَند .

Ecrémage (F). Skimming (E). **فَرْد الكَفَاة**

فَرز الكَفَاة من الحَلِيب وقَد يَمَ أما أَلِياً باستِعمال الفَرَاةَ واما طَبيعياً يَترك الحَلِيب بَعض لَوَقت لَظفر الكَفَاة تَفتش .

Graines de coton (F).

Cottonseed (E).

فَرْدُوع

حَب القَطن ؟ الواسِدة فَرُوة .

Interspécifique (F).

Interspecific (E).

فَرْدِي

فَرَس

نَبت رَقيق هو التَقسَاص والبَروق والمَجن .

Jument, Cavale (F). **فَرَس ، حُجُور**

Mare, Brood-mare (E).

أُنثى الحَمار .

Equus caballus (S).

Cheval (F). Horse (E).

فَرَس

الذَكَر والآنثى . ج. افراس . وجماعة الافراس تَدعى اَحليل جَمها حَيول وواحدا خَائل . والذَكَر في اَحليل يَدعى صَسان . ج. اصصة وصَحن والآنثى تَدعى حَجر . ج. حُجور وصُجور و صَجار || وكنية الفَرس اَبَر شَراع وَاَبَر طاب وَاَبَر مَدك وَاَبَر المَشار وَاَبَر النَجي وَاَبَر مَعي . والفَرس حَيوان داجن ووسَطي من فَصيلة الحَلييات ، ضُروب وسَلالات عديدة تَختلف باختلاف اشكالها وشَراطة او ضَمامة اجسامها وسَعة عَظَفا وبَلى نَشاطها الخ . اشهر ضُروب وسَلالاتها ما يَلي :

فَرَس آري ، فَرَس آسِيَّي

Equus caballus aryanus, E. caballus asiaticus (S).

Cheval aryan (F). Aryan horse (E).

ضُرب من الحَيول الآرية او الآسِيَّة . اصَرامه عَديدة اشهرها الرَبي والمَسيحي والقفَغازي .

Pégase (F).

Pegasus, Flying horse (E).

فَرَس أَعْظَم

الفَرس الاَظَم كَوَكية يَحمُوم ضامِلة المَيع لا تَبد كثيراً عن الذَب الاَكثر . مَركَزا بَند كَوَكية ذات الكَرسى || يَحموها النَيرة والخَلفة عَديدة . والوَبر تَسمي النَجم الذي على العَرة « سَرة الفَرس » . ونَسي الآرية أَتَرة أَتَى على المَرع « مَن الفَرس » و« مَنك الفَرس » و« هَت الفَرس » و« جَنام الفَرس » . ولَدي على جَبلته « أَنف الفَرس » . وتَسمي الآنثين المَختَفين « المَرقُوة » والآنثين اللَين في البَطن « النَمام » والكَرب . « والآنثين اللَين على الرَأس « سَعد الهام » . والآنثين اللَين عَلى البَطن « سَعد الهام » . والآنثين المَختَفين بَين اللَين في الصَدر « سَعد البارح » . والآنثين اللَين على الرَكة البَين « سَعد المَطر » .

Percidae (S).

Percidés (F). Percidæ (E).

فَصيلَة اسماك من الفَصيلات الشاكِكات الزَماثف . اجناسها وانواعها عَديدة ، اشهرها الفَرس .

Farad

فَرْد

وحدَة قَياسة كَهربائيَّة .

Individu (F). Individual (E).

كل شيء له وِجود مَستقل وبَشكل نَوعي مَعين وصفات خاصَة تَميزه عن غيره .

فَرْد

الفَرْد نَجم يَتر من كَوَكية جَماع اَنثى . مَركَزه في آتَر المَعتق . وقد سَمي فَرْداً لِانفرادِه عن اَشباهه .

فَرْدُوع

Anaspis (S).

Anaspis (F). Anaspis (E).

جنس حُشرات من فَصيلة الفَرْدِيَّات وَرَبِيَّة عُذَيَّات الاجنَسة . انواعها المَعرُوفة عَديدة مَنتشرة في جَميع مَناطق البلاد الحارة والمَعتدلة الحَارة || اجسامها صَغيرة ، عَظَفا مَعتدلة التَخطيط ، طَولُها من ٣ الى ٥ م . رؤوسها صَغيرة ، قَليلة النُشُور ، عَيونها صَاحبة . تأثيرها وبَلاستها نَظامية . فُرونها الاستِشارية عَظيمة . كَواسِلها مَعتبية الشَكل . اَحادِها مَستطيلة ، لاسَعة . قَواطعها نَشيطة . اَثولها ثَلاثية الَون || الحَشرة الجَملانة واثمة رَمتها اَزار الحَلييات . البَرقَة خَاصلة .

Anaspididae (S).

Anaspididae (F). Anaspididae (E).

فَصيلَة حُشرات من عُذَيَّات الاجنَسة . اجناسها وانواعها المَعرُوفة كَثيرَة البَعد مَنتشرة في مَناطق البلاد المَعتدلة الحَارة || اجسامها صَغيرة اللَون ، مَستطيلة الشَكل ، مَعتدلة التَخطيط ، طَولُها من ٣ الى ٧ م . رؤوسها صَغيرة ، قَليلة البرُوز . عَيونها صَاحبة . تأثيرها وبَلاستها نَظامية . فُرونها الاستِشارية عَظيمة ، مَركَبة من ١١ فَصلة . كَواسِلها نَصف دائَرية الشَكل ، اَحادِها لاسَعة . قَواطعها نَشيطة . اَراسِها رَباعية المَقل في الزَوج الخَلقي ، خَاصِتها في الزَوجين الاَمامي والوَسط . اَثولها مَلوَنة || جَميعها خَاصلة وواشعة . تَعيش خاصَة على اوراق اَزار الحَلييات || اشهر اجناسها الفَرْدُوع .

فَرْدُود

الفَرْدود كَواكب مَستطَلة خَلف اَثرها .

Jardin (F).

فَرْدُوس

هو البَستان ، اَطلَب .

Parasitoidae (S).

Parasitiers (F). Parasitoidae (E).

فَصيلَة من رَبِيَّة الجَواثم تَشمَل طَيور الفَرْدوس .

Haploide (F).

Haploid (E).

فَرْدِي النَظَظ

صَفة الحَبيرات الحَويائية والخلَيايا النَباتية الرَبيدة المَختَظ .



فَرْد

والسنتية بين الكواكب . وهو يبادل المسافة التي يجتازها النور بمدة ٣٢٥٠٠٠٠ سنة .

Perée (F). - **فرسكوس** ٢٠٦٢٥
كوكبة نجوم شمالية المقي تدعى سيوس .

Lieue, Parasange (F). - **فرسج** ٢٠٦٢٦
League, Parasang (E).
الفرسج وحدة قياسية مسافة لدعما كانت تساوي في الماضي نحو ٤٠٠٠ م. وتقادي الآن نحو ٥٢٥٠ م.

Parsec (F). **Parsec (E).** - **فرسج فلكي** ٢٠٦٢٧
الفرسج الفلكي وحدة قياسية اصطلاحية تستعمل لقياس المسافات الفلكية . طولها نحو ٣,٢٥٦ سنة ضوئية .

Actinostemma (S). - **فرسج** ٢٠٦٢٨
Actinostemma (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرصيات . مهدا بعض مناطق الشرق . سوقها عارية ، جملتها مدرة . اوراقها كفية الشكل . ازهارها وريدة المسكن ، المشكة منها متفردة التجميع اما المتبقية لفردية او ضبية التجميع . ثمارها اصوية الشكل ، تافهة الطعم ، تستعمل كحلاوت || لها ثوبان مخروطان .

Actinostemma paniculatum (S). - **فرسج عثكوي** ٢٠٦٢٩
Actinostemma paniculé (F).
نوع من الفرسج . ساقها عارية تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كفية خاسية القصص تطول نحو ١٠ سم وتعرض نحو ٧ سم . ازهارها عثكوي التجميع . ازهارها صفراء اللون . ثمارها اصوية الشكل مالة تطول نحو ٧ سم .

Actinostemma lobatum (S). - **فرسج مخصص** ٢٠٦٣٠
Actinostemma lobé (F).
نوع من الفرسج . ساقها عارية تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كفية ثلاثية او خاسية القصص تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٨ سم . تصالها خلية المروق على الصلصتين . ثمارها اصوية الشكل ، صغيرة القدة ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم .

Pécher (F). - **فرسك** ٢٠٦٣١
هو الفرائس ، الطلحة .

٢٠٦٣٢ - **فرسين**
الفرسين : طرف خف البير والشاء . ج فراسن .

٢٠٦٣٨ - **فرش**
هو الشفنين الصجور ، اطلبة .

٢٠٦٣٩ - **فرش الصبغ**
هو الصبغة الخشة ، اطلبا .

٢٠٦٣٠ - **فرشاج**
الارض الواسعة العريضة وقيل السحاب الذي لا مطر فيه .

Litière (F). - **فرشة** ٢٠٦٣١
Stable-litter, Straw (E).
فراش من حشيش او قش او تبن وغيرها من المواد النباتية يفرش تحت الدواب في الاصطبلات لراحة عليه .

٢٠٦٠٩ - **فرس البحر** * ، **فرس النهر** ، **بريقي**
Hippopotamus (S). **هيموت**
Hippopotame (F). **Hippopotamus (E).**

جنس حيوانات لبونة من ذوات الحوافر عظيمة القدة ، سفينة الجلد ، ليس في جسمها شيء يشبه الفرس . رأسها وقوائمها منتهية الغلظة والكبر . جسمها بالغ النضامة ، عنقها وقوائمها وذنبها قصيرة || مهدا البلاد الانريقية الحارة . تعيش في مياه الأنهار وتل سفانها . قبحا الاعشاب .

٢٠٦١٠ - **فرس السباق الانكليزي**
Pur sang anglais (F). **English blood-horse (E).**
هو الفرسان الانكليزي الاصيل يعتبر اجود سلالات خيول السباق .

٢٠٦١١ - **فرس المغرب**
Cheval berbe (F).
African horse (E).
مصر من الجياد القوية اللينة . مهدا بلاد المغرب . يقال انها سلالات مختلفة نتجت من تصالب الخيول العرب مع خيول المغرب الاصلية وذلك على اثر الفتح العربي .

٢٠٦١٢ - **فرس القوي**
Mante religieuse (F).
هي السروقة ، اطلبا .

٢٠٦١٣ - **فرس السباق الاصيل** ، **فرس السباق الانكليزي**
Pur sang anglais (F). **English blood-horse (E).**

الفرس الانكليزي الاصيل او الخيول او الكرم هو اسبق الخيل كلفة . نشأ من اب عربي وام انكليزية واصبح صرماً صريحاً معروفا له كتب انسابه المفضية وله شهرة عالمية التي تقني عن كل تعريف .

٢٠٦١٤ - **فرس بوني** ، **بوني**
Poney, Ponet (F). **Pony (E).**
نعت تعريفي يطلق على كل جواد صغير القدة خفيف الوزن .

٢٠٦١٥ - **فرس محتاب**
Cheval trotteur (F).
Trotter horse (E).
كل فرس ركض الخيب . والخيول الحيازة سلالات تميزت بهذا النوع من البير السريع الخاص .

٢٠٦١٦ - **فرس صغير**
Petit cheval (F). **Equuleus (E).**

الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية المقي مشهورة باسم قطرة الفرسان ، اطلبا .

٢٠٦١٧ - **فرس عربي اصيل**
Pur sang arabe (F). **Arabian blood-horse (E).**
هو الفرسان العربي الخفيف الكرم وهو اصيل الخيل واجلها واصحها الركوب || سلالاته المشهورة عديدة اشخاصا كحيالات السجور والمقاتليات وام عرب وباشرايات والنباتات والمعتيات وهذه ابيات والمجلف .

٢٠٦١٨ - **فرساج**
الفرساج : الارض العريضة الواسعة . ج فراسج .

٢٠٦١٩ - **فرساج**
Mégaparsec (F). **Megaparsec (E).**
الفرساج وحدة قياسية تستعمل في تحديده الامداد الفضائية



فرس البحر



فرس عربي اصيل

انتار. هيكلها هيكَل الدار. اوراقها مدقة مستطيلة الزناد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٣. نصلها اعلياني الشكل، ذلق الزنم الانخير || ازهارها وردية او غريزة اللون. حناقيها لبدة قريية من الاستدارة. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Noyaux de basamés (F).
Stone of bdellium tree (E).
الفرس : نوى اللؤلؤ .

Mûrier (F).
مور التوت ، اطلبه .

Hakea florida (S). **فِرْضَاخ كَثِير الزَّهَر**
Vaubier multiflore (F).
نوع من الفرضاخ وهو جنبة تزيينية سرورية تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها صغيرة خفيفة . نصلها عديم اللون. مسن الحافة ، مدبب المقصبة || ازهارها صغيرة عطرية القزف ، بيضاء اللون . حناقيها كثيرة المدد ، متوصقة الحجم || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Mûrier (F).
نمت وصني تعرف به الاشكال الشجيرة بشاميل التوت .

Pépin de raisin (F). **فِرْصِيد ، فِرْصِيد**
Grape-stone (E).
الفرمند والفرسيد : حجم المنب والفربيب .

Acineux (F).
Acinose, Acinuous (E).
ما كان شكله شكل الفرصد .

Hakea acicularis (S). **فِرْضَاخ مُهَدَّب**
Vaubier à aiguilles (F).
نوع من الفرضاخ وهو جنبة تزيينية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها خطية خضدة المقصبة السفل ، شاذكة الحافة المدنية || ازهارها خضراء اللون ، عطرية التجميع . ثمارها جرابية عمودية ، ثنائية التلويس الطرفية . ازهارها يستمر من تموز الى آب.

Arbre à pépins (F). **فِرْصِيد يَات**
Stone-trees (E).
هي الاشجار القرصية البذور كالكمرة والشلح والاجاس والفرجل الخ ...

Acinélique (F). Acinetic (E).
نمت ترميني يملك مل كل ما يقف حركة القلب .
النجيتمال الانبواني نبات فرسي .

٢٠٣٩ - **فِرْصُون** الفرس : فَر اللوم ما دام احر .

Imposition
هو اتباع نظام تقني لاجل تقدير الاموال وما يكتبا ان تحصل من الضرائب .

Hakea (S). **فِرْضَاخ**
Vaubier (F).
جنس اشجار وجنات برية وزراعية تزيينية من فصيلة اللبنيات . ازهارها عديدة ، اقلها اقليم الزيتون . سيقانها خضراء . اوراقها متعاقبة ، جلدية النصل . ازهارها صغيرة لثقة ، عطرية التجميع ، بشارنة الاسدية المنحرفة . اشهر ازهارها ما يتبع .

٢٠٦٢ - **فِرْضَاخ صَفْصَافِي لَوْرِي**

Hakea saligna (S). **فِرْضَاخ**
Vaubier à feuilles de saule (F).
نوع من الفرضاخ وهو جنبة تزيينية سرورية تملو من ٢٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها وحيدة النصل ، عديمة اللزق تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ نصلها مائل البصرة ، بحري اللون ، ابري المقصبة || ازهارها خضراء اللون مقنودية التجميع ، صورية الايزكان || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

Hakea suaveolens (S). **فِرْضَاخ عَطِطَر**
Vaubier à odeur suave (F).
نوع من الفرضاخ ، وهو جنبة تزيينية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها خلية اللحاء ، فضية اللون. اوراقها مقنودة ، غطيلة التشرج ، نصلها جامد التجميع ، شاذك الاطراف المدنية || ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة اللث ، فواحة القزف العطري || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٠٦٤ - **فِرْضَاخ خَازِي**

Hakea laurina (S).
Vaubier laurier (F).
نوع من الفرضاخ وهو شجرة تزيينية تملو من ٤ الى ١٥

٢٠٦٥ - **فِرْطُخُ الشَّوْطِي**
Garrus littoralis (S).
Garrye des rivages (F). Garrus (E).

دويية من الفراضح تنتمي الى فصيلة الكرنشيات ورتبة المقربات الكاذبة . جسمها صغير اللد يطول من ٥ الى ٧ م. ثوبها الى الرتبة العلواء . صدولها مزواني الشكل ، مطوية تحطيه احر . مقنباها مستطيلان يمتدبان بمقلطين كلافط المقارب لثوبها الى السرة . يغطي اعلياني الشكل مقطوم الطرف ، عديم اللذب ، واضح التقسيم السعسي . حناها مركبتان ، صغيرتان . جرابها دقيقة ، سميكة الحلب . الذكر اصغر قدماً من الانثى || تألف الشواطئ البحرية . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة والحوام . قمر نحو خمس سنوات || تنشر من الدوييات الثامنة الامازونية .

٢٠٦٤٨ - **فِرْطُم**
الشاة الفارسي اي للسنة وقيل المكسورة القرنين .

Hypothétique (F).
Hypothetic (E). **فِرْطِي**

Gaulage (F). **فِرْطُ** **نَقْش** (E). **Beating** (E).
جني الثار بواسطة القرب بالصا وهي علية وكثر استعمالها في القزف والجزو واللوز . وهي مفرقة لانها تحش وتسلط الثار وتمت الارواق وتكسر الانثان وقد توكزي الاغصان .

Hypermétamorphose (F). **فِرْطُ التَطَوُّر**
Hypermetamorphosis (E).

Biano-estec (F). **فِرْطُ التَقَطُّل**
Thrust (E).
هو قطع الشجر الحربي بارساف .

٢٠٦٥٣ - **فِرْطُوس**
Pénis de l'éléphant et du porc (F). Penis of the elephant and pig (E).
هو تققيب القليل والخزير .



فرع الشواطئ

Phryganidae (S). فَرْطُوسِيَّات * ٢٠٦٦٤

Phryganidés (F). Phryganoides (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوديات الاجنحة. اجناسها واولادها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تعيش قرب مجاري الماء || اجسامها لاقامية الشكل والخصم، تطول من ٢ الى ٦ سم. اولادها مزركفة || اشهر اجناسها الفرفرن.

٢٠٦٦٥ - فَرْقَار

شجر صبور حل النار تصط منه الساس والقصاص.

٢٠٦٦٦ - فَرْقَارَة ، دِيك الرِيح (F). Girouette

هي الدرة جهاز يدل على جهة مهب الريح.

Tussilage (F).

٢٠٦٦٧ - فَرْقَارَة
هي حشيشة السعال، اطليه.

Pourprie (F).

٢٠٦٦٨ - فَرْقَحِين

هو القطة الحقة، اطليه.

٢٠٦٦٩ - فَرْقَح * ، فَرْقَحَة ، حَشِيخَة

Euphorbia papius (S). Euphorbe des vignes, Esule (F). Wild purslane, Purple spurge (E). Gartenwollmilch (D). Euforbio delle vite, Calenzuola piccola, Pepilo (I).

نوع من الفربيون وهو نبات حشيش بري طيب سمر. يرغب في الاراضي الملتصقة وفي الآخرة الرملية. يكثر في الكروم وحول جوانب الطرقات. ساقه فروع تملو من ٥ الى ١٠٠ سم. عصارته لينة، لزجة، يشبه اللبن، حريفة، لاذقة، تستعمل في القضاء على التآكل. اوراقه متناقبة، زخمية الشكل، صغيرة القد، مدببة المقصعة. ازهاره عثكولية التجميع وردية اللون.

Poule d'eau (F).

٢٠٦٧٠ - فَرْفَر

هو برهان فرفور، اطليه.

Guttier (F).

٢٠٦٧١ - فَرْفَرَان

هو الجندم الحدي، اطليه.

٢٠٦٧٢ - فَرْفُور هو الميراء الزياء، اطليه.

٢٠٦٧٣ - فَرْفُورَة * ، فَرْفُورَا (S). Purpura

Pourprie (F). Purpura (E).

جنس اصداف بحرية كثير الانواع جميعها متشابهة الاشكال متباينة الاحجام يستخرج منها الابرون. احطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة يكثر ويوجد في المتوسط.

٢٠٦٧٤ - فَرْفُورَة

سكة بحرية تدعى طرستج اسمر، اطليه.

٢٠٦٧٥ - فَرْق (F). Delta Céphée, Alfirk

Alfirk, Alphirk (E).

الفَرْقُ نجم من كوكبة قيفاوس يدعى ايضاً «دلتا قيفاوس» وهو من النجوم النابضة للاستسفرة البوع. يبدو ان حجمه يفوق حجم الشمس نحو عشرة آلاف مرة.

٢٠٦٧٦ - فَرْقِي * (F). Dichotome

Dichotomous (E).

نمت وصي يستعمل دلالة على القوي المزدوجة والانصاف والاعتدال؛ تقول ساق فرقة وفن فرق.

٢٠٦٥٤ - فَرْطُوسَة ، فَرْطُوسِيَّات (F). Groin

(E). Snout (E). هو عظم الخنزير ويسمى بالفتلية.

٢٠٦٥٥ - فَرْطُوسِيَّات * (S). Sparassie

جنس ضرور من فصيلة القديسيات. انواعه قليلة تتميز بقصر وفلاظة سمها، يشفاها نكبتها القارضة الخدعة التي يبلغ طولها نحو ٤٠ سم. ويصنعها للترابك الموج. لها الى العاين التي تنبئ وبها الى الصفرة، لحسها يضيء القطع خافتة القرب || تركيب جلوح الضنور قشيب عن الحب وانغراف لونه نحو الجوزة المابقة ثم انقراض وانحاضت الحواجز الخلوية التي تنتهي دقيقة كالليبار.

٢٠٦٥٦ - فَرْق (F). Branche

Branch, Bough, Limb (E).

كل ضمن غلط وحل انصافاً حلت اقنأداً.

٢٠٦٥٧ - فَرْق ، عَكَب ، سَكِيل

Descendant (F). Descending (E).

هو كل من ولد من اصل في حبل القنب للنحور. الاولاد هم الفروع والاهاء هم الاصول.

٢٠٦٥٨ - فَرْقَة * ، قَمَلَة الرَأْس

Pediculus capitis (S). Pou de tête (F). Louse (E).

حشرة من الفريجات، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. تركيب قراس. مكها يدعى عشان وهو ابيض اللون تنحه الاثني على الشعر فينتفخ بعد ستة او سبعة ايام. والفرد يعيش نحو ٧ اسابيع ويتفطر نحو ٣٠٠ مكته.

٢٠٦٥٩ - فَرْقُل (F). Hyenon (F). Young hyena (E).

صغير القبع يدعى بهذا؛ والاثني فرملة. ج فرامل وفراصلة.

٢٠٦٦٠ - فَرْقِيَّات (S). Pediculidae

(F). Pediculidés (E).

فصيلة من القشليات، اجناسها واولادها عديدة جميعها صغيرة لينة مغلطلة الجسم المبط، صغيرة الرأس، كبيرة المويينات، ثوبها الى القطعة الباقية || اشهر اجناسها الفرقة والقمة والبطور.

٢٠٦٦١ - فَرْقِ أَوَّل

الفَرْقِ الاول او فَرْقِ الدلو المقدم منزل من منازل القمر الثانية. فَرْقِ اربعة كوكب، اثنتان منها هما الفَرْقِ الاول، واثنان الفَرْقِ الاخر || وقب الفَرْقِ الاول يدعى الصرفة.

٢٠٦٦٢ - فَرْقِ ثَان

الفَرْقِ الثاني او فَرْقِ الدلو المؤخر منزل من منازل القمر الثانية. وما لقطر المؤخر من الدلو || وقب الفَرْقِ الثاني يدعى الدلو.

٢٠٦٦٣ - فَرْغُون * (S). Phryganea

Phrigane, Phrygane (F). Phryganea (E).

جنس حشرات من فصيلة الفرفونيات ورتبة جلوديات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم انحاء البلاد. المعتدلة الحارة والحارة || حشرات الجملانة تعيش على اليابسة. اراسهمها تعيش في الماء لمتلصقة بجلايين متباينة الاشكال مصنوعة بالريال وسحات الاصداف وقعات المواد الحشوية وغيرها.



فرمة



فرفرن



فرقة



فرفورة (صدفة)



فَرْقَى لَوْز

الصفة السفل من بطنها تيرة اللون. فوائدها مستطيلة
الانضاد والفتايب || مرتتها اشباب البراري والحراج .

٢٠٦٨٩ - **قَرْم** ، **قَدْرِعَة**
Hachage (F).
Chopping (E).
هو قلع او تجزئة البلف الطويل او الكثير الحجم قبل
تقديمه الى اللشبة .

٢٠٦٩٠ - **قَرْمَل** ، **كَبَّاحَة** ، **كَبَّاحَة**
Frein (F). Braka (E).
اداة الكبح . اشكالها عديدة وظلقة أما اشدائها واحدة .
ج فرامل .

٢٠٦٩١ - **فُورْمَالْدِهَيْد** ، **فُورْمَالْدِهَيْد**
Formaldéhyde, Aldéhyde formique (F). Formalde-
hyde (E).
اطلب فورميد .

٢٠٦٩٢ - **فُورْمَالِين** ، **فُورْمَالِين**
Formaline (F).
Formalin (E).
اطلب فورمالين .

٢٠٦٩٣ - **فُورْمُول**
Formol
هو الفورمول ، اطلبه .

٢٠٦٩٤ - **فُورْمِيُوم**
Phormium (S). Phormier (F).
جلس نباتات عشوية مسمرة من فصيلة الزنبقيات. انزاعه
قليلة مظهرها بري . اوراقها قرصية الانتشاب ، ثنائية
الترتيب ، مستطيلة الجرم . نصلها خشي الصفعة ، جامد
اللسج البني التركيب . ازهارها كبيرة القند عفوية
التسبيح ترتكز حل شراخ متصب غليظ || احرف انزاعه
واشهرها سالي .

٢٠٦٩٥ - **فُورْمِيُوم كُوك**
Phormium cookianum (S). Phormier de Cook (F).
نوع من الفربيوم الزنبقي . اوراقه تطول من ٦٠ الى
١٠٠ سم . نصلها قندي الشكل ، بارز الحد ، جامد
الصفعة ، اخضر اللون ، احمر الكظر . شراخه يعطر
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ازهارها كبيرة القند متصببة ، لونها
الى الصفرة يعلوها ملوح اخضر || ازهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

٢٠٦٩٦ - **فُورْمِيُوم مُتَصَلِّب** ، **كُتَّان زَيْلَنْدَة**
Phormium tenax (S). Phormier tenax, Lin de la
Nouvelle-Zélande (F). Flax illy, New Zealand flax (E).
Neuseelandflachs, Zäh Flachsille (D). Formio
tigioso, Lino della nuova Zelanda (I).

نوع من الفربيوم الزراعي الصناعي . يزرع لاوراقه
اللينة الشائكة الاستعمال في شئ الصناعات التشيكية .
اوراقه جامدة النصل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
وتنمر من ٤ الى ٦ نصلها اخضر اللون اسمر الملوحي
يعطو حل كامل لسطاها كظن اخر . شراخه الزمري
يعلم من ٣ الى ٤ امتار . ازهارها كبيرة القند متصببة صفراء
اللون او حمره .

٢٠٦٩٧ - **فُورْن**
Four (F).
Oven, Bakehouse, Kiln (E).
بناء خاص يختلف الاشكال والاحجام ويولد البناء والزيد
يستعمل في تدبير الحرارة اللازمة لقلعه بعض الاعمال
الصناعية .

٢٠٦٩٧ - **فُورْقَى** (F). Purgative flux (E).
هو الكتان المسهل .

٢٠٦٩٨ - **فُورْقَى النَحْل** ، **فُورْقَى النَحْل**
Essaim d'abeilles (F). Bee-Swarm (E).
ثول من النحل هجر خليته لتسير عليا جديدة .

٢٠٦٩٩ - **فُورْقَة**
هي الشاة والذئب البعيدة ما بين الطيين .

٢٠٦٩٠ - **فُورْقِد**
الفرد نجم من كوكبة قنذوس قريب من القطب الشمالي
يمتدح به . وما فردان .

٢٠٦٩١ - **فُورْقِد**
الفرد : ولد البقرة وقيل ولد البقرة الوحشية . والفرد
كلك .

٢٠٦٩٢ - **فُورْقِع لَوْز** *
Agrypnus notodonta (S).
فرع لوز هو الاسم المصري لشجرة من الساليوات كبيرة
القد ، طولها نحو ٤٠ م . فويها الى الحظي الاسمر .
زبانها متوسطة الطول ، متشاربة الشكل . ارسافها
خشبية اللعل || رقاها سلكية الجسم ، مستطيلة ، صفراء
اللون ، تعيش في جلود الانيات وقد تركب البطاطا .
اغراضها زينة لا تستعمل المكافحة .

٢٠٦٩٣ - **فُورْقِيَة**
Dichotomie (F). Dichomy (E).
الفريقية ، في علم النبات ، طريقة انقسام جزلي مفرق .
وفي علم الفلك ، حالة القمر عندما يكون نصفه فقط
مضاء .

٢٠٦٩٤ - **فُورْقَة**
الفرق هو المتفرق تشبه من الجسم وما اشبه . يقال لوز
فرق ويجوز فرق ...

٢٠٦٩٥ - **فُورْقَة**
Baobab acuminé (F).
هو البوباب الزلقة ، اطلبه .

٢٠٦٩٦ - **فُورْقُولَة**
Virachola livia (S).
شجرة من الحرف ، ديدانها تركب اقروان . اطلب حرض
الربان .

٢٠٦٩٧ - **فُورْلُوكَة** *
Frolota (S).
Frolota (F). Frolota (E).

جلس حيوانات بحرية من الرغويات مهدبات الاربيل
وضميلة الغريانات . انزاعها المعروفة قليلة المدد متشعبة
في بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة شبه
الطليجية الشوزن ، حلابة المادة ، شفافة ، صامدة
الاصداف ، قليلة النفاخات المبهوسة مع سائر الاشياء في
جراب صغير مركزه تحت البطن .

٢٠٦٩٨ - **فُورْلُوكَة مُرْبِكَة** *
Vertulia quadrata (S).
Vertule carré (F).

شجرة غاصلة من فصيلة الكورسيات ودية عثقات
الاجنحة . جسمها معتدل التطيط ، مربع البطن ، يطلي
نحو ١٢ م . ثوبها الى الحظي المنصب الملوحي . رأسها
شبه مربع الشكل . عظامها مستطيلة . ازهارها ناشز . عيناها
صغيرات ، بارزان . زبانها مستطيلة ، اسودا الطرف .



فُورْدَة



فُورْمِيُوم مُتَصَلِّب

الإرتكاز، سداسية التيلات، لونها ال الحرة النفسجية .
أزهاره يستمر من حزيران ال ايلول .

٢٠٧٢٢ - فُرُوجِيَّة

Poulette (F).

Young hen, Pullet (E).

أنثى الفروج وهي الفتية من النسلج .

٢٠٧١١ - فُرَيْسَعُ الأَرَبِ *

Haemodipus ventricosus (S). Pou du lapin (F).
Louse of rabbit (E)

حشرة صغيرة من القزليات، طولها يراوح من ملليمتر
ال ملليمترين، جسمها اغبر اللون، يبيض الشكل مفلطح.
تركب الارلب وتزيد.

٢٠٧٢٣ - فُرُوعُ هَيْكَلِيَّة

Branches charpentières (F). Carpenter brachs (E).

يسمى من دعاما فروع شجرية . هي القزليات التي
تعمل للاغصان ويتألف منها هيكل الشجرة الرئيسي .

٢٠٧٢٤ - فُرُوع

Orion

الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار او الجوزاء .

٢٠٧١٢ - فُرَيْسَعُ البَقَرِ * ، دَبَا البَقَرِ

Haematopinus erythrocephala (S). Grand pou du
boeuf (F). Big louse of ox (E).

حشرة من القزليات . طولها نحو ٦ سم . جسمها اكعب
البن ، احليجي الشكل عذب الظهر || تركب الابقار
وتؤذيها .

٢٠٧٢٥ - فُرُونِيَّةٌ عُسْقُولِيَّةٌ * ، قَحْمَةُ السَّاقِ

Erwinia arrodense (S). Maladie de la jambe noire (F).
Black leg (E).

وصم تشبه بكتيريته من الكرويات . يترى انواع كثيرة
من النبات اصعبها التبغ واللحوم والجوز والبطاطا الخ ...
تعاود شديد الرفع مع القبح يركب الساق فيسم بعض
اقسامها بعد ان يسبب امرداها وتلفها وقد يمتد ال السنتغ
والجلود فيبدو كيقم مسطيلة متشاببة سواء اللون تحوها
حالات صر تقضي حل اغشية الساق ثم تحجر النسيج وتلتفها.
الجروح والحامض ولا تقتك الا في ظروف متناعية معينة
اغصبا الرطوبية المستمرة وكثرة الفوم او قلة الفصح .
اما انتقاله من القرية ال النبات فيم بواسطة الاوراق
والخيل التي تلامس القرية .

٢٠٧١٣ - فُرَيْسَعُ الجُرَذِ *

Polyptux spinulosa (S). Pou des rats (F). Louse of rats (E).

حشرة صغيرة من القزليات، طولها نحو ١ سم . لونها
ال الرعدة الغبراء || تركب الجرذ والفأر .

٢٠٧١٤ - فُرَيْسَعُ الحَمِيرِ * ، دَبَا الحَمِيرِ

Haematopinus asinus (S). Pou de l'âne (F). Louse of
ass (E).

حشرة صغيرة من القزليات، طولها نحو ٤ سم . جسمها
يبيض الشكل ، غمر اللون || تركب الحمير والبقال
والخيل .

٢٠٧٢٦ - فُرَيْدِي هِي السَّاقِ ، اطليبا .

٢٠٧١٥ - فُرَيْسَعُ الخَنْزِيرِ * ، دَبَا الخَنْزِيرِ

Haematopinus suis (S). Pou du porc (F). Louse of
swine (E).

حشرة صغيرة من القزليات، طولها نحو ٥ سم . جسمها
مبط الشكل ، اغبر اللون ، رأسها عرطوي مستطيل،
قرونها الاستعمارية خاسية العقل . حلها دقيق وصغير .
تركب الخنزير وكؤذيها .

٢٠٧٢٧ - فُرَيْسَعُوه

Achéroline naine (F).

هي القزلة من الاسماك الصغيرة الدقيقة ، اطليبا .

٢٠٧٢٨ - فُرَيْيَلَارِيَا

Fritillaire (F).

هي المرار نبات من الزيليات ، اطليبا .

٢٠٧٢٩ - فُرَيْدِي هِي مَرَجَانِ

Pagellus (S). Pagel, Pagelle, Pageau, Pageul (F).
Bratze, Red porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبريات ودية شالكاك
الزئافن . انزاعه سيدة، اطليبا مياه المناطق الحارة
والمعتدلة . سته منها تعيش في المتوسط . اجسامها احليجية
الشكل طولها يراوح من ٢٠ ال ٧٥ سم . رؤوسها كبيرة
القد . زئافنها الظهريه مسطلة شالكة . انثىها كبيرة
الحسرة المرجانية تزود وتبيض وتبيض البقي والاصفر
والخضلي والاسمر . جبينها مأكلة للذية الطعم . امرها
واشهرها الفريدي الشائع .

٢٠٧١٦ - فُرَيْسَعِيَّات

Haematopinidae (S).

Haematopinidae (F). Haematopinidae (E).

فصيلة حشرات جليدية من القممقيات . اجناسها نحو ٢٠
جميعها صغيرة الجسم ، مفلطحة الشكل ، مبطقة ، كثيرة
الغلب . قرونها الاستعمارية ثلاثية او خلية البطن .
مقايها اوساها حادة وقوية || تركب الحيوانات اللبونة
والقزليات . والحادنة . اشهر اجناسها القزليات وين انولها فرغ
البقر والحامير والافان والخنزير .

٢٠٧١٧ - فُرَيْسَعِيَّة

هو الشفنين المعروف ، اطليبا .

٢٠٧١٨ - فُرُونِيَّة

Vernonia (F).

هي السرفل ، اطليبا .

٢٠٧١٩ - فُرَيْسَعِيَّة

الفريدي ولد البطل . في فراهيد . ومن ثم قال القزاعيد:
صدار الفرم .

٢٠٧٢٠ - فُرُوع ، فُرُوعِيَّة

Fourrure (F). Fur (E).

كل جلد يفرى به . ج . فراه .

٢٠٧٢١ - فُرُوج

Poulet (F). Chicken (E).

القي من الدجاج . ج . فراريج .



فرغ الارلب



فرغ البقر



فرغ الحامير



فرغ الخنزير



فرويلة حشوية



فريدي شائع



فريدي مستج

Physopoda du tabac (F). ٢٠٧٤٣ - **فُوبِدُ التَبَاقِ** *
سحرة من التريسي تركيب اوراقه التبغ تنقطع الخشب
وتقتصر صناعة الخلابا والتبغ الناضج . اغلب فريز التبغ .

Sidérite (F). ٢٠٧٤٤ - **فُورُز**
هو الفخاخ نبات طبي من الشفويات .

Vaseline (F). ٢٠٧٤٥ - **فُولِزِين**
هو الزولين ، اطليا .

٢٠٧٤٦ - **فُوسَاةُ الصُّنُوبَرِ** *
Chlorothroa pinicola (S). **Pussie des pins (F).**
حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيات ، جسمها مفلطح ،
اعليها الشكل ، يطول نحو ١٢ سم . فوبها الى الخضر
الاسمر المواج . يبتلى الى الخضر الاسفر يطول في جانبها
تجميع دقيق اسود || ولها شبه عثري ، قطرم الطوف .
عظمها مثل الطول . صناعا صفراوان . زباناها مستطيلان
اسمران . كوسلها اخضر الخضر الاخضر . حشيتها خضراء
الطوف . ظهرها اريد اللون ، اخضر الخضر . قشرها
شفاف . قوتها الى الخضر اللامس || تركيب اهداب
الصنوبر || راجعها كرية .

Ameérine féde (F). ٢٠٧٤٧ - **فُوسَاةُ الكَلْبِ**
عثة كرية قزاحة تسمى منة ، اطليا .

Putréfaction (F). ٢٠٧٤٨ - **فُوسَاةُ ، فُوسَاةُ**
Putrefaction (E). اضمحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٢٠٧٤٩ - **فُوسَاةُ الكَرَمِ ، فُوسَاةُ الكَرَمِ**
Aubernage, Cabuchage, Court-noué, Roncat (F).
مرض فيزيولوجي يجهول الاسباب يصطبف الكرمه بكامل
اصنافها فزول .

٢٠٧٥٠ - **فُوسْتَقِ** *
Pistacia vers (S). **Pistachier, Pistachier du Levant (F).** **Pistachio tree (E).** **Echte Pistazie, Pistazienbaum (D).** **Pistachio, P. verde (I).**

شجرة زراعية معمرة تعيش من قرنين الى ثلاثة قرون . وهي
من سبط الفستقيات واسيلة الطيحات . صروبها واصرارها
عديدة ، منها حوش البحر المشط ، اشهرها الفستق الحلبي
يختلف اصراعه كالمشوري والمراسي والبائوري والعليسي
ونساب الجمل . ثم الفستق القزبي والمفرقي والصقل
والقريسي والاراني . اقلها واسع الانتشار وهو انسج
من اقليم الزيت لانها تتحمل الصقيع حتى بعض درجيات
تحت الصفر . غير انها تزهق في الموامع النادرة من الرياح
تجود وفي المراض الفرية والقرية الشالية || وهي
تجود في جميع الاراضي الخفيفة القليلة الاندماج ، والراقة
للادة الكلسية ، البادئة الرطوبة المستحكة || تلو
من ٤ الى ٨ امتار وقطر دوحها يراوح بين ٣ و ٧ امتار .
جلوبها متصبة بكتبة تفور في الارض على اعماق عمدة .
ساقها متصبة عقدية فراء . اوراقها مركبة وري . وريقاتها
اعليها اوبضية الشكل . تصلها مستمسك الصدفة
الجامدة الكثيرة الفروق الدقيقة المتزاوية . ازهارها ثنائية
المسكن ، حاددة البتلات ، محورية الارتكاز ، تلتأ على
الفروع الهولة . الذكرية منها قدية التجميع ، خنسية
الاسدية ، اما الانثوية مضغوطة وهي وسيدة المبيض
والغدر . ثمارها زيتونية الشكل تتكون عند اكتمال نفسها

مسرعا قرب الشوط || جسمها اعليها الشكل يطول
نحو ٦٠ سم . فوبها الى الشبة الوردية الغضبية المواج
يطولها في جانبها تسليج اسود والطلل || لحمها جيد
الصنف في الربيع والصيف ، متوسط في الخريف والشتاء .

٢٠٧٧٢ - **فُورِز**
Fraise (F). **Strawberry (E).**
هي ثمرة الشيك وتسمى شيل فريز وشيل شيك .

٢٠٧٧٣ - **فُورِزِكَة** *
Freesia (S). **Frésée (F).**
Freesia (E). **Kaickschwarte (D).** **Freesia (I).**

نبات عطري زينة من فصيلة السوليات . وحده الجلس
والنوع ، عديد الفروب والهمين . اوراقه قرصية الانتشاب ،
سفينة الشكل ، ثنائية الصف . ازهاره بريق الشكل ،
سداسية الاقسام ، صلبة العرف ، منها الابيض والاصفر
والبرتقالي والوردي الخ ... وهي متباينة الارتكاز من
جهة واحدة يصعب تفرع تحمل يطول نحو ٣٠ سم . ثم
يرجع تحت صبه الازهار || ازهاره يستمر طوال
فصل الربيع .

٢٠٧٣٤ - **فُورِزِكَة** *
Farysia (S).
جس طور مجهرية طفيلة من فصيلة الراهويات تنبت
بطولها البسيط التركيب ثم يفيها الضي التجميع
وبوبتها القرية الانقسام وبكثرة || يصيب السمنيات
على اختلاف انواعها النباتية .

٢٠٧٣٥ - **فُورِزِكَة**
Prole (F). **Prey (E).**
كل ما استعمل عليه الحيوان الفاري لفته .

٢٠٧٣٦ - **فُورِزِكَة ، مَكْر**
Acaule (F). **Acaulous, Stemless (E).**
الفريز والمكر هو من النباتات ما ينبت على رجة الارض
ولم يقم على ساق ج . فرائش .

٢٠٧٣٧ - **فُورِزِكَة**
الفريش : القوس يده نتاجها يتسم ليال وهو غير اوقات
الزهر عليها || والفريش ايضا الثور الذي لا سنام له .

٢٠٧٣٨ - **فُورِزِكَة** *
Calocera (S). **Calocère (F).**
جس طور فشاكية من فصيلة البوسيات . الزواة قليلة
العديد كثيرة الانتشار الذي يم مطم شائق اثرة الاوسط
واروية وامريكة الشالية || تعيش على المواد النباتية
والخشبية المتحللة . اظهر انواعها واصرها الفرية القرية .

٢٠٧٣٩ - **فُورِزِكَة لُزْجَة** *
Calocera viscom (S). **Calocère visqueuse (F).**
نوع من الفرية . اطليا اقليم الصنوبر في مطم القطار
الدائم . تعيش على النبات المتطورة المضة || تحتها غشوي
الحسية الجاملة . وتنبها متشعبة ، لزجة ، تلو نحو
٥ سم . لونها الى الاصفر القاري .

٢٠٧٤٠ - **فُورِزِكَة**
Fénugrec (F).
هي الحلية الروية . اطليا .

٢٠٧٤١ - **فُورِز**
هو ولد البقرة الوحشية .

٢٠٧٤٢ - **فُورَاة**
Tigrasse (F). **Tigress (E).**
انثى الجبر وتسمى فورة ويقال اولها القز .



فريزة



فريزة لجة



فستق

من غلاف خارجي مثل الفستق لونه الى الخضرة يملوها
تؤشج ربادي . من غلاف داخل خشبي المادة مؤلف
من مصراعين يتشقان عن صلب أصفر اللون مأكول لمنحه
قشرة رقيقة لونها الى الخضرة || يتكاثر الفستق بالبذر
و بالتطعيم . فالفستقج بالبذر يكون في شتات خاصة
تتركز على طبق من الحصى مهمتها استنفاد الماء . وقد
يم عادة في شهر شباط ويكون ذلك اما نثرًا على كامل
المثلث او عن طريق تناثره في يد الرادس منها عن الأعر
من ٣٠ الى ٣٥ سم . ويبقى الفستق في المثلث من سنتين
الى ثلاث سنوات قبل ان تنقل الى مستقرا || اما الفستق
بالتطعيم فيخرج على الطول اي الفستقج والطول الأخضر
والمصغكاه على مائر اجناس سيد الفستقيات . والطول
يخرج بعد خمس سنوات في حين ان الفستق لا تنضج قبل
تسع او عشر سنوات || وفستقج الفستق تبلغ كلال ثمرها
بسر ٣٠ سنة وتستقر على حالها نحو ١٥٠ سنة قبل ان
تدخل في طور الانحطاط الذي يدوم نحو نصف قرن .



فستق حبيبه

٢٠٧٥٢ - فستق متغاضي * ، حصص بمسكولة

فونكزيرة
Voandzeia subterranea (S). *Voandzeia, Pistache malgache, Pois bambara* (F).
نبات عشبي حولي زراعي وحيد الجنس والنوع من فصيلة
القرنيات القرارية . هذه البذور الافريقية اصيلة . ساقه
معداة . اوراقه مركبة ، مستطيلة الزوائد القدام ، ثلاثية
الورقات الطرفية السانحة المتصال . ازهارها ابوية الارتكاز
تنشق على السوق للمادة وهي صغيرة القند ترتكز
مماثل لبقية النسيج تغطى بالازهار ، بعد تأيرها وتكوين
الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعناق تراوح من ٥ الى
٨ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار وفصلها . اما
الثمار فهي غالبا فردية الحبة وانثاء مزدوجة وهي تحوي
على البوب غزير المواد الغذائية المروية التي تعتبر من اكل
الافلاية التي تنتجها المملكة البانائية || يقطع « بوانام »
وفيره من حلاوة حبوب الفستق المتغاضي انها تحوي العناصر
الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	١٨,٦٨ %
مواد دهنية	١٦,١٤ %
مواد هيدروكربونية	٥٧,٠٧ %

زراعتها لا تختلف عن زراعة الفستق حبيبه وانتاج الثمر
يرواح من ١٥٠ الى ٢٥٠ كيلو من الحبوب المملفة .
اما شتمه فيحصل كلف قليلة اصحابها الاقبال لانه
يكثر الدرع ويشت في المواد الزبدية .

٢٠٧٥٣ - فستق

Pistache (F). Pistachio, Pistachio-nut (E).
ثمره الفستق . لياها جامد المكسر . فستق اللين ، لليد
الطعم الخاص واللذكية المشبعة . متوسط تركيبه العنصري
ما يلي :

مواد آسية	٢٢,٧ %
مواد دهنية	٥١,١ %
حلاوات الكربون	١٣,٠ %

٢٠٧٥٤ - فستقيات (F). Pistacien (E).

سبط من فصيلة البساتيات يشمل ثمانية أنواع منها بعض
مناطق حوض البحر المتوسط . جميعها اشجار وحميرات
برية وزراعية وافرة المادة الزرئية القلوة العرف الثامنة
الاستعمال الصناعي || اشهر انواعها الفستق .

٢٠٧٥٥ - فستقجة

Physostegia (S). Physostégia (F).
جنس نباتات عشبية مسخرة من فصيلة الشفويات . اوراقها
اهليجية او سنائية مسنة الخشن . ازهارها مثل النجم
كازهارها صغيرة وبيدة اللون او بتصبية || انواعها المعروفة
قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٠٧٥١ - فستق عيّد * ، قوئل صوداني

Arachis hypogaea (S). *Arachide, Pistachier de terre, Pois de terre, Cacahouette* (F). *Earth nut, Ground nut, Pea nut* (E). *Echte Erdnuss, Erdmandel* (D). *Arachide, Pistacchio di terra, Mani* (I).

لبات عشبي حولي زراعي سنائي من فصيلة القرنيات .
غروبه واصراعه عديدة تقسم الى قسمين : الافريقية
وهي معداة قليلة الزغب والاسيوية وهي متصببة السوق
زبدية الاصا . جلوره كثيفة متشعبة . سيقه قزاع
متراكبة ، اصلا اسطوانية ، اطرافها مفصلة . اوراقه
متناقية مركبة لاقامية التجميع يكثر فيها العدد الشفي
للمركب من زوجين . وريقاتها يصبية الشكل تصلي
يختلف باختلاف الاصراعه منه مالى الصلصة العليا خلي
السفل كما في الاصراعه الافريقية ومنه مذهب الصلصين
كما في الاصراعه الاسيوية || ازهارها ابوية تنشق عنه
قواعد الفروع بين الاكنتين مهيمنين وهي صغيرة القند صفراء
اللون تتركز على ساقيل لبقية النسيج تنسل بالازهار ،
بعد تأيرها وتكوين الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعناق
تراوح بين ٦ و ١٠ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو
الثمار وفصلها || اما الثمار فثلاثة ، اسطوانية ، عزوزة ،
مقبضة الوسط . طولها يراوح بالاسية الى غروبها بين
٢ و ٤ سم . وهي تحوي على البوب او البوبين في الاصراعه
الافريقية وعلى ثلاثة الايبين في الاصراعه الاسيوية .
اما البوبها فهو غزير المواد الغذائية المروية التي تتركب
من العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	٢١,٨٠ %
مواد دهنية	١٦,٧٥ %
مواد هيدروكربونية	١٧,٦٦ %

زراعتها منتشرة في جميع البلاد الحارة اصحابها البرازيل
والكسبك وبعض مناطق امريكا الشمالية وكندا واليونان
ومصر ولها . وهو مزروع على الشواطئ البانائية السورية
الروية الممتدة من حكار الى اللاذقية || يبيد في جميع
الآربة الزراعية لكاملة التركيب الممكن رجاء . بأصا
يفضل الزبوية المتوسطة او القليلة الاتساع الدنية بالمواد
الضوية ويمتص في الرياس والفسفور || يبلو في
قديم الواحد من ٦ الى ٧ كيلو من الحبوب المملفة او نحو
٣ كيلو من الالوب اي الحب الممد التلاف . وذلك
في اواخر شهر نيسان . فينتش الحب وتظهر براعه به
البذر بثلاثة اسابيع . معتد يشار بالري ويدوم طيه



فستق ملتاني

٢٠٧٠٦ - فُسْتُوجَة صَغِيرَة الزَّهَر *
Physostegia parviflora (S).
Physostégia à petites fleurs (F).
نوع من الفستوجة . ساقها نحيلة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم.
اوراقها لامعة سنائية الشكل . نصالها منشورية الحار .
ساقها الزهرية تطلو نحو ١٠ سم . ازهارها لينة بنفسجية
اللون صغيرة القد . تطلو من ١٠ الى ١٥ سم . لوفا الى
الوردي في تنويرها . يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧٠٧ - فُسْتُوجَة مُسَنَّكَ *
Physostegia denticulata (S).
Physostégia denticulée (F).
نوع من الفستوجة . ساقها قوية مستقلة الصلبة تملو من
٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها اطيحية تطلو نحو ٨ سم .
نصالها غشراء اللون القاتم ، مستنة الحار . ازهارها وردية
اللون ، مستقلة القد ، تطلو نحو ٣ سم . || تنويرها
يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧١٤ - فُسْكَات الكِلْس
Phosphate de chaux, Ph. de calcium (F). Calcium
phosphate (E).
مركب فسفوري يستعمل في تحضير السورفسفات .

٢٠٧١٥ - فُسْكَات الكِلْس الطَّبِيعِي ، فُسْكَات
مُعَدَّنِي
Phosphate de chaux naturel, Ph. minéral (F).
Natural calcium phosphate, Mineral phosphate (E).
مركب فسفوري طبيعي يستعمل اما مباشرة في تسميد
التربة او في تحضير السورفسفات .

٢٠٧١٦ - فُسْكِس
Peribals (S). Périvals (F).
فُسْكِس ج . فسكس جيس حشرات شديدة النتن من فصيلة
الفاشيديات . انواعه عديدة بعضها صغيرة القد ، محببة
الشكل ، مبطقة . طويلا يراوح بين ٧ و ١٠ سم .
مخططة الانواع منها الاخضر الباهت والرمادي والمخضبي
والسج والزركنس . وهي شديدة الافى تركب الاحشاب
البرية والزارعية وسها البقول والنباتات الصناعية كالتمغ
والخرنوب .

٢٠٧٦٧ - فُسْكَة مُنْتَطَلِقَة *
Brachynema cinctum (S). Brachynème caint (F).
حشرة مؤذية من فصيلة الفاشيات . جسمها كثيف
الحمل القصير ، مفلطح ، مبطط ، بطول نحو ١١ سم . ||
لوفا الى الخضار الالسي . رأسها شبه مخروطي . خطها
ستليل الثلث . عينها ناشزتان . زياتها اخضران .
كوسها احر الحار . صفيها مخروطية الشكل ، يضاء
الطرف . ظهورها وردي اللون ، اخضر الخنجر . بطها
الى الخضار الباهت مخططة حار احر . قشرها شفافة .
تفرغها الى الخضار الاسفر الاسمر || تركب جميع انواع
السورفات فتمص عصارة الارواق والتواشي || راحتها
كروية .

٢٠٧٦٨ - فُسْطَقَة
Phosphatage (F).
تسميد التربة بالفوسفات . ومنهم من كتبها فسطقة .

٢٠٧٦٩ - فُسْتُور ، فُسْتُور ، فُسْتُور
Phosphore (F). Phosphorus (E).
جسم بسيط لا يوجد في الطبيعة الا متحدا مع غيره من
الاناسر . وهو اهم الاغذية الباقية بعد الآزوت . يوجد في

٢٠٧٥٨ - فُسْتُولَة *
Fistulana (S).
Fistulana (F). Fistulana (E).
جنس سيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الغليظ
وفسيلة النسيجات || انواعها الغابرة كثيرة البدن بعضها
من متحبرات الطبقة الطباشيرية ، اما الانواع الماصرة
فثلاثة بعضها من دويبات امث الصنينة || تعيش قرب
الشواطئ مدفونة في الرمال المغمورة بالماء . اصداؤها
ابوية طليقة .

٢٠٧٥٩ - فُسْخ
Pourridié, Rocellinia (F).
جنس فطور مجهرية عديدة الانواع (رايح وروانيه) .

٢٠٧٦٠ - فُسْخ ، اِلْعَاء
Réailliation (F).
Cancelling (E).
هو ابطال مفعول عقد باتفاق المتعاقدين .

٢٠٧٦١ - فُسْجَلَة
Echat (F). Shiver, Splinder (E).
هي الملوحة ، قصب يفسخ عن جذع له .

٢٠٧٦٢ - فُسْجِيلَا
Phacidiella (S).
جنس فطور مجهرية يعرف بالريح ، اطلي .

٢٠٧٦٣ - فُسْكَات ، فُسْكَات ، فُسْكَات
Phosphate
ملح يحصل من امتزاج حامض الفسفوريك بالحصى
الفراعد من معدن او ظلت او غيرها كالبيوتاس والكلس
والحديد الخ . وهو من الاسماء الزراعية الجزئية للتع
الي تعد التبايت بمضخ الفسفور . مصادوه عديدة تقسم
الى خمس فئات :

١ - فئة الفوسفات الطبيعي وهي تشمل الابيت والبرال
الفوسفاتية والطباشير الفوسفاتية والفوسفات الحجر
والفسفوريوت ...

٢ - فئة الفوسفات الصنوي وهي تشمل مختلف مساحيق
النظام ورياد النظام .

٣ - فئة الفوسفات المستخرجة من التدين وهي تشمل
التريال اي السكوري حل اختلاف انواعه .

٤ - فئة الفوسفات التي حوالت حكما وكيمياويا وهي
تشمل البازيفسفات والفوسفات الراسب ...



لسعة

في نصل حادٍ الخفسار ثم تصفر وتبيس، فتذبل الأوراق وتعيها وتيت النبات. راجع سرج.

٢٠٧٧٨ - **فُشَيْكَة** *Cisticola ornithina* (F). هي الكروان للبلبل طائر من العنبريات. اعلمه.

٢٠٧٧٩ - **فُشَيْكَة** *Rejston* (F), *Shoot* (E). كل رلة أو قصب ينمو على ارضية تغطي مساح الأبرية. ج. فاشل. والفاسل وفاسل صغار النخل تنمو تنظم قصير نخلة.

٢٠٧٨٠ - **فُشَيْكَة، فُشَيْكَة، فُشَيْكَة** *Physiologie* (F), *Physiology* (E). علم يبحث عن ظواهر الحياة في الأحياء ومن وظائف أعضاء الخلقة.

٢٠٧٨١ - **فُشَيْكَة** *Bryone* (F). هو الفاشرا، اعلمه.

٢٠٧٨٢ - **فُشَاغٌ، فُشَاغٌ** *Smilax* (S). *Salsaparilla*, *Smilax* (F), *Sarsaparilla* (E).

جس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠٠٠ صنفها جنات سريعة، معظمها بري وبضها زراعي. أوراقها أبيض، معققة، متعاقبة، لاتماشية الشكل، كثيفة العروق. أنواعها صغيرة القد ثلاثية أو خماسية البلات. انزعاجها صبراني أو صخوي، التجميع، البطي الايزنكار. ثمارها عتيبة. أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٠٧٨٣ - **فُشَاغٌ أَمْرِيكِيّ** *Salsaparilla d'Amérique*. هو الأرابية الباردة، اعلمه.

٢٠٧٨٤ - **فُشَاغٌ صِينِيّ، فُشَاغٌ صِينِيّ** *Smilax aspera* (S), *Smilax rufa*, *Salsaparilla d'Europe*, *Lisaron épineux* (F), *Prickly ivy*, *Rough bindweed* (E), *Stachwinde* (D), *Smilax*, *Smilacino*, *Rovo cervino* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري المبدول. ساقه ليفية سريعة مضطمة تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه قلبية القامة، نصلها جامد التجميع الأخضر اللامع الشائك الحافة. ثماره خر || أنزهره يستمر من آب إلى تشرين الأول.

٢٠٧٨٥ - **فُشَاغٌ شَائِك** *Smilax bona-nox* (S), *Smilax épineux*, *Salsaparilla bonne-nuit* (F), *Rough bindweed* (E), *Rauhe Stachwinde* (D), *Smilax spinosa* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري والزراعي. ساقه ليفية سريعة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه أعطيلية الشكل. نصلها متفشي الوسط، جامد التجميع، سامي العروق، شائك الحافة || أنزهره يستمر من نيسان إلى تموز.

٢٠٧٨٦ - **فُشَاغٌ صِينِيّ** *Smilax china* (S). *Smilax de Chine*, *Salsaparilla equine*, *Squine* (F), *China smilax*, *Chinese root* (E), *Chinastachwinde*, *Chinaswurzel* (D), *China carnosa*, *Salsaparilla della China*, *icina* (I).

نوع من الفشاغ الزراعي مهدد الهين. جدو وبني الشكل تكتفه بعض المسائل المستطيلة المشراة اللين. ساقه ليفية قليلة الشوك. أوراقه بيضية الشكل، قلبية القامة، مدينة المعققة، نصلها جامد التجميع الأخضر اللامع،

الأبرية الزراعية وفي النجج النباتية والحلويات لاسيا في النظم || والففسور الخرج صلب، شفاف، كوري اللين، كربة الرائحة، نضبط للملحة الباردة القلقة. يتألف في الفلام، يستعمل في الحواء ولا يلوب في الماء. برز (فر) ثقلة النضي ١٨٤٤ وزنه اللدي ٣٠٩٨. ينصر بمزارة ٢٤٢، مع حيث يناع كالزيت ويصل ٢٩٠ مع || ويوجد أيضا الففسور الآخر الذي يحضر من الكوري بالتسجين المائي، وهو آخر اللين عادم المم والرائحة لا يتألف في الفلام ولا يستعمل إلا عند ٢٦٠ مع. يستعمل في عدة صناعات انصها صناعة القباب.

٢٠٧٧٠ - **فُشُورِيّ** *Phosphorus*. نوع من فسلات الكلن الطبي للتصبر للشعبي الطول. يستعمل في تحضير الففسور والبروفانات.

٢٠٧٧١ - **فُشُكُلٌ، فُشُكُلٌ، فُشُكُلٌ** *Dernier* (F), *Loac* (E).

الفرس الذي يبي في الحلية آخر الجبل.

٢٠٧٧٢ - **فُشُكُلٌ** *Plançon*, *Plantard* (F), *Sapling* (E). هو كل قصب كبير من الخور والصفصاف وما شبه شارب وحضر للفرس أن في الهندلة أو في المستقر.

٢٠٧٧٣ - **فُشُكُلٌ** *Bouture* (F), *Slip* (E). هي المقلعة كما أنزمت قبل نقلها وتحضيرها للفرس.

٢٠٧٧٤ - **فُشُكُلٌ** *Phasma* (S).

Phasma (F), *Phasma* (E). جس حشرات من فصيلة الفسيدات. أنواعها المعروفة عديدة أصلها غابات البلاد الاستوائية والحارة || اجناسها أسطوانية ثقبه القصبان طويل من ٦ إلى ٤٠ سم. تعلوها مناس حادة. رؤوسها صغيرة. قربها الاستعمارية دقيقة مستطيلة. اجنتها، عند بعض الأنواع، دقيقة، شائعة مستطيلة الطول، وعند البعض الآخر جداد لا عمل لها. قوائمها مستنة الانخاذ والسفان والارصاع || ألوانها تماثل البيئة وهي غالبا بلون اللتان والقصبان.

٢٠٧٧٥ - **فُشُكُلِيّ** *Phasmidæ* (S). *Phasmidæ* (F), *Phasmidæ* (E).

فصيلة حشرات من مستقيبات الاجنته. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها من أحافير العصر البليستوساني المائل إلى أوائل الإيوج الرابع. اما الحاضر فيها فلا يقل من ٢٠٠ نوع معظمها من حشرات الغابات الاستوائية والحارة || من ميئات حشراتنا انها جنسية الاشكال والاحجام تماثل الموائع التي تقم فيها. بعضها يشبه القصبان والبعض الآخر يشبه الأوراق || أعرف اجناسها وأشهرها القسمة والقليلة.

٢٠٧٧٦ - **فُشُكُلِيّ** *Rachitisme* (F). هي الخرامة، اعلمه.

٢٠٧٧٧ - **فُشُكُلِيّ، فُشُكُلِيّ** *Mosaïque* (F). *Mosaic* (E).

مرض يكبري يصيب بعض النباتات انصها التبغ والبطاطا والخس. يقال انه ينتشر بواسطة بعض أنواع الارق. مظهره الخارجي يقع سريعية الشكل والرتيب، لاقياية المدم، تركب فسج الأوراق فتبدل مظهر اللين



فُشَاغٌ

Stace (F). ٢٠٧٩٥ - **فُشَاغَش** - **فُشَاغَش** (F).
هو الأربيل وأحدته نشفاشة .

٢٠٧٩٦ - **فُشَق** - **فُشَق** (F).
الفسق : تباد ما بين القرنين .

Roncet (F). ٢٠٧٩٧ - **فُشَل الكَرَم** (F).
هو فسالة الكرم ، اطليا .

Synchronisme (F). ٢٠٧٩٨ - **فُشَن** (F).
Synchronism (E).
الشن والإفشان وأسد .

Synchronique (F). ٢٠٧٩٩ - **فُشَنِي** (F).
Synchronistic (E).

Carposcene (S). ٢٠٨٠٠ - **فُشَيْفَات** (F).
Carposcées (F). Carposcées (E).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزقيات . تتميز بأوراقها
المحفولة في الإصان . فصائلها أربع الإردادات
والخشايات والمشفيات والزقيات .

Dicranocère (F). ٢٠٨٠١ - **فُشَيْغ** (F).
Dicranoceros (E).
لعت قمريني يطلق على كل حيوان منشعب القرنين وعلى
كل حشرة منشعبة الزبائن .

Smilacina (S). ٢٠٨٠٢ - **فُشَيْفَة** (F).
Smilacine (F). Smilacina (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزقيات قريبة
الشيء من الفُشَاغ . سيقانها مدادة كاسية . أوراقها متعاقبة
خالية الصفحات السفل . أزهارها عنقودي التجميع
طولي . ثمارها عنية || تزدهن القرنين في معظم الموام
لاتها لا تنضج البرد . تروث في الإترية المعدلة الانساج
الوافرة المواد الغذائية من عضوية وبمعدنية || أنواعها
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

٢٠٨٠٣ - **فُشَيْفَة بَكَلِيَة** (F).
Smilacina oleracea (S). Smilacina légumière (F).
نوع من الفُشَيْفَة . مهدا جبال الهند والأفغان .
ساقها تطول نحو ١٢ سم . أوراقها متصلة البدء ، سنانية
الشكل ، تطول من ١٥ إلى ١٨ سم . أزهارها عنقودي
التجميع . أزهارها وردية اللون ، جلبةلية الشكل . ثمارها
عنينة أرجوانية ملوفا موج ودي || تنويرها يستمر
طوال شهر أيار .

٢٠٨٠٤ - **فُشَيْفَة عُنُقُودِيَة** (F).
Smilacina racemosa (S). Smilacina à grappes (F).
نوع من الفُشَيْفَة . مهدا بعض مناطق أمريكا الشمالية .
ساقها تطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقها سنانية الشكل
تطول من ٨ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٧ سم .
أزهارها عنقودي التجميع ، كثير البدء ، يطول نحو
١٠ سم . أزهارها بياض اللون . ثمارها عنية ، بنسجية ،
حزرة || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٠٨٠٥ - **فُشَيْفَة تَجْمِيَة** (F).
Smilacina stellata (S). Smilacine étoilée (F).
نوع من الفُشَيْفَة . مهدا الشرق الأدنى . ساقها متبادعة
الأوراق ، تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها قليلة البدء ،

عادم الفوك || حسانه مأكولة وهي لا تتحلل من بعض
الناصر الطبية الناقمة .

٢٠٧٩٧ - **فُشَاغ مَحْرُوفِي** * ، **صَبْرِين** (F).
Smilax officinalis (S). Salsepareilla officinale (F).
Sarsaparilla (E). Salsaparilla (D). Salsaparilla offi-
cinalis (I).

نوع من الفُشَاغ الطبي البري والزراعي . حسانه اهليلجية
الشكل ، جوية اللون ، شائكة الاستمال الطبي . ساقه
ليفية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه بيضيه الشكل ،
نصلها جامد النسيج عابن الحفرة اللامعة ، شائك الحافة .

٢٠٧٨٨ - **فُشَة** (F).
Gousse d'anagyre (F).
Shell of bean-traufol (E).
هي حنبلية ألبون تطول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم .
زورها مستديرة ، مفلطحة ، قلبية ، بنسجية اللون ،
جسمانية المادة الخشبية . ج نش .

٢٠٧٨٩ - **فُشَرَا** (F).
Bryone (F).
هي الفاشرا ، اطليا .

٢٠٧٩٠ - **فُشَع** (F).
فُشَع النبات . يست اطراشه . وفُشَع الأذرة : يست اطرافها
فُشَع ثقلها .

٢٠٧٩١ - **فُشَع * ، مِيَالِيَة** (F).
Podocarpus (S). Podocarpus (F). Chinese yew tree (E). Podocarpus,
Steinleib (D). Podocarpus, Lauro del Giapone (I).
جنس أشجار سربية وزينية من فصيلة السنوبريات
الطليسيات . لوانه نحو ٤٠ سم . جميعها من أشجار المناطق
الحارة والمعتدلة . سيقانها مستقيمة تملو ، حسب الأنواع ، من
مترين إلى ٢٥ م . أوراقها متعاقبة ضيقة النصل السلبك .
أزهارها الذكورية قدية الشكل اما الانثوية فسلبية التجميع
وهي عمودية أو طرفية الارتكاز || أغصانها صلبة لا
يتغيرها فساد || أشهر أنواعها ما يلي .

٢٠٧٩٢ - **فُشَع قَلْبِي الرُزَق** (F).
Podocarpus nerifolia (S). Podocarpus à feuilles de
laurier rose (F).
نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية سر روية تملو من ١٥ إلى
٢٠ م . أغصانها غارشة لا متدلية . ثنائيا سبوانية الشكل .
أوراقها مستقيمة الارتكاز ، منجلية الشكل ، تطول
من ١٥ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم .
زورها أرجوانية اللون ، بحرية المراج .

٢٠٧٩٣ - **فُشَع كَبِير الرُزَق** (F).
Podocarpus macrophylla (S). Podocarpus à grandes
feuilles (F).
نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية وزينية جميلة الشكل تملو
من ١٥ إلى ٢٠ م . ثنائيا غارشة ، أغصانها انثوية الارتكاز
متدلية الأطراف . أوراقها جالسة تطول نحو ١٢ سم .
وتعرض نحو ١ سم . زورها سنوبرية الشكل ، جوية
اللون تطول نحو ٢ سم .

٢٠٧٩٤ - **فُشَع نَاجِمِي** (F).
Podocarpus nageia (S).
Podocarpus Negi (F).
نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية سر روية تملو من ١٥
إلى ٢٥ م . أغصانها غارشة متدلية الأطراف . أوراقها
بيضية سنانية تطول نحو ٩ سم وتعرض نحو ٤ . نصلها
أخضر الصفحة العليا ، أصفر السفلى . زورها تكبر
نحو ٢ سم . وهي جوية اللون . بنسجية المراج .



فُشَاغ مَحْرُوفِي



فُشَع

ملونة || معظمها يعيش تحت الحجارة وبعضها في قرى النسل. قوتها المواد العشوية والنباتية المتحللة || أشهر أجناسها الفصصاء.

٢٠٨١٧ - فصصاء ، رطبة ، قصب

Medicago (S), Luzerna, Lupulina (F), Lucerne (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البقوليات. أنواعه عديدة منها البرية والزراعية جميعها مرموقة عطرية. جلودها رتيبة قليلة الانقسام تنور نحو ٢٠٠ سم. موطنها مستنقطة فرساة. اورقها مركبة ثلاثية الوردية ، زنادية الرضلى اي العليا. ازهارها عتودية التجميع فيها الالبض والازرق والبنفسجي. ثمارها حنابل سطولية تلتفت بالزور. يزورها حشرة ، دليقة ، لونها الى الجوزة يطعمها موالج اغصر او اسفر || احرف انواعها واشهرها ما يلي .



فصصاء مزروعة

٢٠٨١٨ - فصصاء برية ، قصب

Medicago ciliaris (S), Luzerna sauvage (F), Sea hedgehog medick (E), Hornigal, Dornenkron (D), Medica salvatica, Trifoglio tarpeterra (I).
نوع من الفصصاء البرية تكثر في المواقع المتفتحة الرطوبة اغصها الجبال. وهي من اسود النباتات المرموقة العطرية. تتميز بكثافة زيتها وبانحداب حار وريقاتها. ازهارها الى الزرة المائلة.

٢٠٨١٩ - فصصاء مزروعة ، فصصاء معروفة ، برسيم حجازي

Medicago sativa (S), Luzerna cultivée, Trèfle de Bourgoine (F), Lucern, Alfalfa, Common medick (E), Luzerna, Blauer Schneckenklee (D), Luzerna, Medica, Marica, Lupinella (I).
هي الفصصاء الزراعية الكثيفة المشهورة بما تحوي من مواد غذائية منبهة (رابع حلف) || فرونها دليقة مستنقطة قليلة الحبل. وريقاتها قليلة الانقسام للبرية. ازهارها بنفسجي اللون || تزرع في جميع البلاد المعتدلة الحارة. تقم في الخوخ الواحد نحو ١٢ سم. ترطب في الارزة العبيقة النور، المعتدلة الانقسام ، اللينة يناسر الكلس والفوسفور والبوتاس. وهي تحشى الارزة الطينية والطبية الجسيمة || تحشى في العام الواحد من اربع الى ثمان مرات. اما سبب هذا التفرقات فيمدد الى الاكتم وبموقع الزراعة واسكانية الري || اما متوسط انتاج الدغم في الحقل الواحد فتراوح بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٠ كيلو حطب اغصر. وادأ قسنا الانتاج بالكاد الجفاف في الحقل يكون متوسط محصول الدغم السنوي من ٧٥٠ الى ١٢٠٠ كيلو.



فصصاء مشجرة

٢٠٨٢٠ - فصصاء مشجرة ، فصصاء

Medicago arborea (S), Luzerna en arbre (F), Tree medick, Moon trefoil (E), Baumartiger Schneckenklee (D), Erbs medica arborescente, Medica citro (I).
نوع من الفصصاء البرية وهي جنبة فرساة تطل من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. وريقاتها بيضية الشكل ، جبلة اغصان البصري. ازهارها متجمعة متحدة العرف الخابت. يقال انها طرية ازهارها تقيد الاساء.



فصصاء

٢٠٨٢١ - فصصاء

٢٠٨٢٢ - فصصاء ، قارة الصحرارة

Mus barbarus (S), Souris de Barbarie, S. du desert (F).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها فصص الصحراء يمد من افريقية الشمالية الى الصحراء وغنية. طولها نحو ١٠ سم.

سنانة الشكل ، لاطئة ، تطل من ٥ الى ١٥ سم. وترس من ٢ الى ٤ سم. ازهارها شكولي التجميع. ازهارها منبسطة البتلات ، نجمة الشكل ، غصراء اللون ، يفس الحفاف. ثمارها عتية شديدة الحمرة القائمة || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٠٨٢٦ - فصصاء

Caeu, Cayeu (F).
من التوية وانواعها.

٢٠٨٢٧ - فصصاء ، قصب

Lobe
كل جزء من الورقة او الزرة بالغ التفرس مستدير.

٢٠٨٢٨ - فصصاء ، فصصاء

هو الاقسن ، اطية.

٢٠٨٢٩ - فصصاء ، فصصاء

Loge pollinique (F).
Pollinic call (E).

غشاء يلف جدرات الطلع في تلك الزرة.

٢٠٨٣٠ - فصصاء ، فصصاء

Lobe parétal (F).
Parietal lobe (E).

٢٠٨٣١ - فصصاء ، فصصاء

Lobe maxillaire (F).
Maxillary lobe (E).

٢٠٨٣٢ - فصصاء

القص حب الزبيب. الواحدة فصصاء.

٢٠٨٣٣ - فصصاء ، فصصاء

Saignée (F), Bleeding (E).
فتح عرق الدم.

٢٠٨٣٤ - فصصاء

Syrinx, Stringe (F), Syrtex (E).
الفصصاء عضو الصوت في الطير. مركزه عند انقسام الشعب الزرئية.

٢٠٨٣٥ - فصصاء

Thoricus (S).
Thoricte (F), Thoricus (E).
جنس حشرات من فصيلة الفصصاءات ورتبة غفجات الاجنحة. انواعه المرموقة قليلة البد منتشرة في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اغصها المعتدلة من لبنان الى اليونان || اجسامها صغيرة ، معتدلة الانحداب ، تطل نحو ٣ م. وروسها غروبية. حوتها بارزة. ثآثيرها وبلاستها نظامية. قوتها الاستثنائية دويبة الاطراف ، جانبية الارتكاز. كواسلها قصرة معدية. الحامدا مائلة ، لاطئة. قوتها لظيفة. ازوارها وسيدة اللون ، تكثر لها الشفحة السوداء فالدبة فالجوزة || تمس تحت الحجارة. مرسحها دجوي. قوتها المواد العشوية والنباتية المتحللة.

٢٠٨٣٦ - فصصاءات

Thoricidae (S).
Thoricidae (F), Thoricidae (E).

فصيلة حشرات من غفديات الاجنحة. اجسامها واقرانها المرموقة قليلة البد ، اصطلها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، معتدلة التطيط ، تطل من ٢ الى ٤ م. وروسها غروبية الشكل. حوتها بارزة. ثآثيرها وبلاستها نظامية. قوتها الاستثنائية دويبة ، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها معدية. الحامدا لاطئة. قوتها لظيفة. ارانها حاسبة القتل. الواجا

Sépale (F). Sepal (E).

٢٠٨٣٣ - فصيلة

ورقة كأس الزهرة . ومنهم من سماها كأسية .

Métacarpe (F).

٢٠٨٣٤ - فصيلة الوُصْع الأوتى

Metacarpi (E).

في فرسغ ، اطليه .

Phasmoptera (S).

٢٠٨٣٥ - فصليات

Phasmoptères (F). Phasmoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح . فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة البلد معظمها كبير القد لاقياشي الشكل والون || وهي تتميز بتأثيرها الصغرة وبسيفانها القصيرة التي لا يمكنها من القفز ، يمكن اناتها كبير الحجم يشبه بر الحنطة .

٢٠٨٣٦ - فصيلة في الفاصوليا ، اطليه .

Cisticola (F).

٢٠٨٣٧ - فصيلة

في الكروان طائر من الخيليات ، اطليه .

٢٠٨٣٨ - فصيص

صوت الجنادب .

Lobula

٢٠٨٣٩ - ثنصيص

٢٠٨٤٠ - فصيصي ، فلبلي

Lobulaire (F). Lobular (E).

ما كان شكله او تفريره يشبه الفص او اللقطة .

Polystigma (S).

٢٠٨٤١ - فصيلة

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات تتميز بوضعية دمالية جامدة القوس الاخر . اصنافها كثيرة . يونها بسيط التركيب ، اهلليجي الشكل ، ثنائي العدد ، تتجمع تكات يوضعية لونها الى السرة الفاتحة || له نوزان مؤذان هما فصيلة الخوخ وفصيلة الوز .

٢٠٨٤٢ - فصيلة الخوخ

Polystigma rubrum, Libertia rubra, Polystigmia rubra (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الخوخ فيذبلها ويؤذي الشجرة . مظهره الخارجي يقع لاقياشي الشكل والحجم تملو نصل الاوراق فتبدو صفراء اللون ثم حراء ينفسجها تحللا خلايا النسيج تنسج ذبل الاوراق وايجالها الباك ثم ازهار الشجرة في تشرن يد ان تقصد عليها دونها الحولية الطبيعية . يكاثف باسعمال سائل بورود المحلول ١ ٪ ثم يؤد المقعد . ومن الانفصل اعادة النسيج مرة ثانية تكون يد الاولى بثلاثة اسابيع .

٢٠٨٤٣ - فصيلة اللوز

Polystigma ochraceum, Polystigmia (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق اللوز وهو شديد الشبه بقصبة الخوخ || مظهره الخارجي يقع لاقياشي تملو نصل الاوراق لونها الى الجؤوة الباقية تنسج خلايا النسيج وتسبب الاحمال الباك الذي يفسد الشجرة يد ان يقصد عليها ازان دونها الحولية || يكاثف كالمخوخ باستعمال سائل بورود المحلول ١ ٪

٢٠٨٤٤ - فصيل

الفصيل : ولد الهيبة اذا فصل عن رضاع امه .

وذئها ١٢ سم . ثوبها الى الصبغة الصنايية ، يملو ظهرها عشرة خطوط سم قاطبة . بطنها وخولقي جرمزها بيض . جرحها سرداب قسيح جديد الانفاق والمناظ تحزن فيه ما تكثره من حيوب وبيجور .

Coprinus (S).

٢٠٨٢٤ - فصيلة

Coprini (F). Coprinus (E).

جنس فطور من فصيلة التاريفقيات . انواعه المعروفة قليلة البلد اصلاتها بعض مناطق الشرق الاوسط واوروية . تعيش في التربة حل الدبال ومل المواد النباتية المنحلة في المراتق المحتلة الرطوية . معظم انواعها سريع الطيب والازوال . بعض انواعها كثيف التجميع ، كشته تمد من ١٥ الى ٢٥ ذوباً ٢٥٠٠ اشهر انواعها الفصيلة القرفة والفصيلة السوداء .

٢٠٨٢٤ - فصيلة سوداء

Coprinus stramentarius (S).

Coprini noir d'encr (F).

نوع من الفصيلة المأكولة . لحيتها متوتجة الصنف . اوسيتها قمية الشكل ، معتدلة الحجم ، سمراء اللون ، يملوها موج اريد اسود . ساقها معتدلة الطول ، ريداء اللون ، يكتنفها طرق غشائي المادة لاقياشي الارتكاز .

٢٠٨٢٥ - فصيلة قرفة

Coprinus comatus (S). Coprinus chevelu (F).

نوع من الفصيلة المأكولة . لحيتها جيدة الصنف في اول مدها ثم ليفة عند الادراك التام . اوسيتها كبيرة القد ، كتفانية الشكل ، لونها الى الريدة المروحة بالاسر المالح . ساقها معتدلة الطول ، طحلاء اللون ، يكتنفها طرق كالسول لاقياشي الارتكاز يكثر ويؤديه في القسم الاصل .

٢٠٨٢٦ - فصيل

نوع من المقرب ويقل ولدا الصغير .

Cresels (S).

٢٠٨٢٧ - فصيلة

Créséls (F). Cresels (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات مجنحات الاريل وفصيلة الثنائيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة بما فيها البحر الابيض المتوسط . جميعها مية تعيش بعيدا عن الشطوط . اسرارها وافرة العدد || اجسامها صغيرة . اريدتها او زعانفها قليلة الانفلاق . اصداها خروزية اللون ، مسقة الاطراف ، شائلة ، سريعة الطيب .

Phosphore (F).

٢٠٨٢٨ - فصفور

هو الفسفور ، اطليه .

٢٠٨٢٩ - فصيلة في الفص ، اطليه .

Sevrer (F). To wean (E).

٢٠٨٣٠ - فصل ، فقم

فصل الحليب من الرضغ .

Saison (F). Saison (E).

٢٠٨٣١ - فصل

الفصل زين من ازمة السنة الاربية وفي الربيع والصيف والخريف والشتاء .

Disjonction (F).

٢٠٨٣٢ - فصل

Severance of causes (E).

هو في قانون المرافعات الفصل بين قضيتين كانتا متصلتين حتى تنظر كل منها حل حدة .



فصيلة سوداء



فصيلة قرفة



فصيل



فصيلة الخوخ



فصيلة اللوز

٢٠٨٥٢ - فضية

Protas (S).
Protée (F). Silver tree (E). Proteusstrauch, Silberbaum (D). Prosea, Legno argentino (I).
جنس نباتات جنبية ممرة من فصيلة النقيبات. أنوارها حليلة مطعها بري وبضها زبريني. أورلقها صغيرة الحجم ، كاملة النصل الفضي ، أنوارها زرقية ، طرفية ، رشح الرقيق بنزارة وفي كبيرة القند ، ارسوانية اللون أو تستقي أو للكية . أحشائها خفيفة نينة تستعمل في عدة صناعات || أشهر أنوارها ما يلي .

٢٠٨٥٣ - فضية بهية

Protas speciosa (S).
Protée superba (F).
نوع من الفضية وهي جنبية زبرينية تملو نحو ٢٠٠ سم . أورلقها متعقة قصيرة الزناد ، نصلها بيضي الشكل يطول من ٨ إلى ١٢ سم || أنوارها زرقية ، ضمية ، كبيرة القند ، يضاء اللون ، حراء الزبر . قناباتها ملعنة الصفحة ، كثيفة الاهاب المزينة ، سود الحنار .

٢٠٨٥٤ - فضية حرسكية

Protas cynaroides (S).
Protée arctichaut (F).
نوع من الفضية وهي بملة زبرينية مبرونية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أورلقها متعقة مستطيلة الزناد ، نصلها بيضي الشكل يطول من ٨ إلى ١٢ سم . سفحت خلية البشرة الفضية || أنوارها زرقية ، ضمية ، حراء اللون أو وردية ، حجمها حجم كوز الأرضي شوكي الكبير القند .

٢٠٨٥٥ - فضية مستطيلة الزرق

Protas longifolia (S). Protée à longues feuilles (F).
نوع من الفضية وهي بملة زبرينية تملو نحو ١٠٠ سم . أورلقها سنانة مستطيلة طويلا يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم . أنوارها بنفسجة عاقبة . قناباتها بحرية الخضار يطولها تشيع لوزق || أنوارها يستمر من أيار إلى آب .

٢٠٨٥٦ - فضية مغشيرة

Protas mellifera (S).
Protée mellifère (F).
نوع من الفضية وهي جنبية زبرينية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أورلقها حليلة تملو من ٨ إلى ١٢ سم . وترفض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها مائل البشرة ، ذلق الزنم الأخير || أنوارها وردية أو يضاء اللون ، كبيرة القند ، غزيرة الرقيق الفشري ، قناباتها دقة الصفحة الداخلية وهي حراء اللون مجتمعة بالاسود || أنوارها يستمر من كانون الثاني إلى نيسان .

٢٠٨٥٧ - فضية

Jus de raisin (F).
Juce de grapes (E).
عصير العنب يتم ويحفظ في القناني المحكمة البسة فلا يفسد .

٢٠٨٥٨ - فطاح

Pollination (F). Pollinastion (E).
الفتح زبن ظهور الطلع وانتشار عتد النبات .

٢٠٨٥٩ - فطاحة

Autogamia (F).
Autogamy (E).
هي الاصحاب الذاتي الذي يرتكز على تأثير ملقة الزهرة من وليع اسيها .

٢٠٨٦٠ - فطارة

Mycétogénase (F).
Mycetogenesis (E).
الانطارة علم يبحث في إثبات الفطور ونوجها .

٢٠٨٥٥ - فصيلة

Famille (F). Family (E).
الفصيلة في تصنيف الاسماء هي جماع اجناس لما صفات مشتركة . أو جماع الاجناس التي تتشابه بخصائص البند المشتركة . وترتيب الفصيلة يأتي بعد الرتبة وقبل الجنس . راجع تصنيف .

٢٠٨٥٦ - فضاء اوسط

Mésosphère (F).
Mesosphere (E).
الفضاء الاوسط أو الوصيلي طبقة من الجو تقع بين الفضاء السديمي والفضاء الشاردي . تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ٣٠ كيلومتر من سطح الأرض ، لما سماكتها تقارب من ٨٠٠ إلى ٨٠٠ كيلومتر ذلك لانها تتغير مع فصول السنة ومع المواقع نظرا لانعدامها المكسي بالعوامل الحركية والحارة وسرعة الصوت .

٢٠٨٥٧ - فضاء سديمي

Stratosphère (F).
Stratosphere (E).
الفضاء السديمي طبقة من الجو تقع بين الفضاء الكوني والفضاء الاوسط . تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ١٢ كيلومتر من سطح الأرض . سماكتها نحو ٢٥٠ كيلومتر . تتميز بكثرة مجاري الهواء وبالحارة القليلة التروقات اذ انها تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ درجة ستيفراد تحت الصفر .

٢٠٨٥٨ - فضاء شاردي

Ionosphere (F).
Ionosphere (E).
الفضاء الشاردي أو الباقلي طبقة من الجو الخارجي تقع بعد الفضاء الاوسط وتمتد عمقا الى حيث تتقطع العوامل الشاردية .

٢٠٨٥٩ - فضاء كوني

Troposphere (F).
Troposphere (E).
الفضاء الكوني أو الجو الارضي طبقة من الجو تغلف الكرة الارضية . تبدأ من سطح الأرض حتى ارتفاع ١٠ و ١٢ كيلومتر . تتميز بكثافة الهواء وبالحنار وباللزاقات المختلفة وبالزوايح والديوم والامطار .

٢٠٨٥٠ - فضة

Argent (F). Silver (E).
معدن ابيض اللون يراى لا يتأثر بالماء ولما . يفوق جميع المعادن في دفع الحرارة والتزود وفي ايسالية الكهرية . رمزها (ف - Ag) وزنها الذري ١٠٧.٨٨ ، ثقلها الذري ١٠٧.٥ ، تنصهر في نحو ١٠٠٠ سع || وهي متوصلة الفوية قابلة للتشديد والطرق والسقل . مرضها الانسان واستخدمها منذ اقدم العصور . توجد في الطبيعة اما شي نقيه بصورة بولورات أو ذرات مختلفة الاحجام مرسوة داخل يند السخور ، أو مزوجة ينتشر مختلفة كالكبريت والزرنيخ والامد والبروم والكلور || ام مصادر استخلاصها في العالم كبريتة الفضة الذي يحوي نحو ٨٦ ٪ من افضة العرف وكلوريد الفضة الذي يحوي نحو ٧٥ ٪

٢٠٨٥١ - فصيات

Protéacées (F). Protéaceae (E).
فصيلة نباتية من نباتيات الفلقة ، عدييات القنعة ، مرتقنات البيض . أنوارها زعاع ١٠٠٠ متنبها البلاد الحارة . فيها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . أورلقها متعاقبة مسننة . أنوارها غشوية زياية الاجزاء ، سلبية أو متفردية التجميع . ثمارها مختلفة الاشكال والاصحاب والخواص بعضها ما كويل .

Cryptogamique (F). **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٧٥
Cryptogamic (E).
نمت تعريفي توصف به الاصنام المتأدية عن الفطور .

Fongiforme, Fongoide (F). **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٧٦
Fungiform, Fungoid (E).
ما كان على شكل الفطر او هيشته .

Champignons (F). **فِطْرِيَّات** ٢٠٨٧٧
Fungus (E).
شعة من النباتات الدنيا تنتمي الى صف المشريات . تشمل اربع رقب وبني الليضيئات والنعاميات والزقيات وانعاميات وفي كل منها مراتب وفصائل واجناس وانواع عديدة .

Baie de myrte (F). **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٧٨
Barry of myrtle (E).
هي حبة الاس . ج. فطس .

Hyménomycètes **فِطْرُوشِيَّاتِيَّة** ٢٠٨٧٩
هي الفشائيات فطور من رتبة النعاميات منها الدنايقرن واجناس اخرى عديدة .

٢٠٨٨٠ فِطْرُوشِيَّة
هي الفشائيات فطيرة فطور من النعاميات .

Adénophore (F). **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٨١
Mushroom, Fungus (E).
هي الاسفورة ، اطليا .

Autogame (F). **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٨٢
Autogamous (E).
نمت تعريفي يوصف به كل نبات اخضابه فطاحة .

Sanderling **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٨٣
هي الدرجة ، اطليا .

٢٠٨٨٤ فِطْرِيَّة
مشر ذوات الخف .

Prion (S). **فِطْرِيَّة** ٢٠٨٨٥
Prion (E).
جنس طير من كليات القدم وقصيلة جليديات الماء .

انواعها المعروفة قليلة العدد . اصلها تحت من بحر القطب الجنوبي الى المحيط الاطلسي حتى تقوم اوروبية || اجسامها مستقلة القد . اجنسها مستقلة ، لاحقة ، ذلقة . اذنها غروبية الشكل تتألف من ١٢ رفة . مثاقدها ضلعية ، مستقلة الطول ، متعقبة البورة ، تعمل سطوح الماكها العليا بعض الطوام || اذنها تغلف مع الاقلاع . اعرف انواعها فطيرة اريال وفطيرة مجدة .

Prion ariel (S). **فِطْرِيَّة اُريال** ٢٠٨٨٦
Prion ariel (F).
نوع من الفطيرة . ثوبها الملوي الى الزرقه الشبه المراج .

صدورها وبطنها واثنين الى الياس الماسجي || اصلها المحيط الاطلسي . يكثر ويوجد في زمن التصادف والخصانة على المجاذب الافريقية والاسبانية .

Prion vittatus (S). **فِطْرِيَّة مُجَدَّة** ٢٠٨٨٧
Prion orné (F).
نوع من الفطيرة . ثوبها الملوي الى الزرقه الزرادية المراج .

يملؤها في جناحها وذنها جميع اسود . صدورها وبطنها الى الياس الاخير || اصلها القطب الجنوبي وجواره .

Sevrage (F). **فِطَام** ٢٠٨٩١
Weaning (E).
انتقال لولاد الحيوانات من دور الرضاعة الى دور الانضواء بغير الحليب .

٢٠٨٩٢ فِطَام
عرض في وسط الرأس .

Polliniser (F). **فِطَام** ٢٠٨٩٣
eo pollinate (E).
فطر ربيع وأبر : نقل شارب الطلع من متك زهرة الى ميسامه او ميسام غيرها من الازهار .

٢٠٨٩٤ فِطَام
قيل الفِطَام " دهر " لم يُفْطَر فيه الناس بعد . وقال ابو حنيفة " هو زين كانت الحيازة فيه رطبة " . الفارق بين المتحدين يفتر جليارات السنين لان الزمن التي كانت الحيازة فيه رطبة يعود الى اوائل الحقبة السحيقة من اباح ما قبل الكمبري . راجع حياة .

٢٠٨٩٥ فِطَام
وضع مصري للدلالة على الوفة .

Chamignon (F). **فِطَر** ٢٠٨٩٦
Mushroom, Fungus (E).
كل نبات من غشيات الريح ينتمي الى شبة الفطريات . ج. فطور .

Ophiobolus (S). **فِطَر الساق** ٢٠٨٩٧
Fungus (E).
فطر مجهرى من افرجات ركب الحصة وغيرها في اسافل سوقها فيصيب لها مرض الساق .

٢٠٨٩٨ فِطَر الصُوقَان
هو الصوقان فطر من السميات ، اطليه .

Acrospore (F). **فِطَر الساق** ٢٠٨٩٩
Acrospore (E).
جنس فطور مجهرية تركب قم التيجليات ، اي اطرافها النامية ، فطينا .

Fistuline (F). **فِطَر الكبد** ٢٠٩٠٠
هو الفطيرة فطر ماكلي من السميات . يعيش على جلدوع بعض الاغبار الخرجية في المواقع القليلة الرطبة . وهو كبير القد ، كبدي الشكل ، حشفي القود ، حابق القاعدة .

٢٠٩٠١ فِطَر المَرَجَان
هو الدبوسية ، اطليا .

٢٠٩٠٢ فِطَر ساق الفَرْع
نوع من فطور الساق يركب سوق التيجليات فطينا .

Ophiobolus graminis (S). **فِطَر ساق الفَرْع** ٢٠٩٠٣
Fungus (E).
نوع من فطور الساق يركب سوق التيجليات فطينا .

Chamignon de Malte (F). **فِطَر مَالِطَة** ٢٠٩٠٤
Fungus (E).
هو الطريث ، اطليه .

٢٠٩٠٥ فِطَر مَرَجَانِي
هو الدبوسية المرجانية ، اطليا .



فطيرة

Vertébrés (F).

٢٠٩١٥ - **فَقَارِيَّات**

هي الفقاريات ، أظلمها .

٢٠٩١٦ - **فَقَاشُ البُنْدُقِي**

Casse-noix vulgaire (F).

طائر يعلى الحساف ، أظلمها .

Bulle (F). Bubble (E).

٢٠٩١٧ - **فَقَاعَة**

Tétrodon (F). Puffier (E).

٢٠٩١٨ - **فَقَاقَة**

هي الفمقة ، سمكة بحرية تكثر في النيل والنيجر . وقيل الفمقة طائر (كلا) .

Eucinetus (S).

٢٠٩١٩ - **فَقَاعِدَة**

Eucinéte (F). Eucinetus (E).

جنس حشرات من فصيلة الفمقيات ورتبة غمدليات الإجنسة . أنواعها المعروفة ١٢ أصلها معظم المناطق الشمالية وجبال المناطق المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، مبطلة ، شبه أحليجية الشكل ، تظل ٣ إلى ٧ م . رؤوسها صغيرة الجرم ، مستعرضة القطن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية عجيبة أو قلابية . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة ، رباعية الاضاديد التحيلة القاطية . قوائمها نشيطة . أظلمها ملونة يكثر فيها البني || الجملانة منها والبرقة تعيش في الجلالة وفي الاشعاب النشرة على المواد النباتية المنحلة .

Eucinetidae (S).

٢٠٩٢٠ - **فَقَاعِيَّات**

Eucinetidés (F). Eucinetidae (E).

فصيلة حشرات من غمدليات الإجنسة . أجسامها وأنواعها المعروفة بمصطبة العدد ، منتشرة في معظم حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، شبه أحليجية الشكل ، مبطلة ، تظل ٣ إلى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القطن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية . الفصل . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة . قوائمها نشيطة . أرساغها خماسية العقلى . أظلمها ملونة || جميعها دامتة تعيش على المواد النباتية المنحلة || أشهر أجناسها الفمقالة .

٢٠٩٢١ - **فَقَح** قح الجرو : فتح صيله .٢٠٩٢٢ - **فَقَح**

قح الشجر : أشقت عيون رقه وبدت أطرافه .

٢٠٩٢٣ - **فَقَحَة**

هي حلقة الدبر .

Cuscuta à odeur suave (F).

٢٠٩٢٤ - **فَقْد**

هو انكشوت اللسر ، أظلمها .

٢٠٩٢٥ - **فَقْد البَصَر** ، **فَقْد كَان البَصَر**

Caligatio

Creuser (F). To hollow (E).

٢٠٩٢٦ - **فَقَر**

قَر الأرض : قهرها . والفقرة : الحفرة . ج قفر .

Anémie (F). Anæmia (E).

٢٠٩٢٧ - **فَقَر الدَّم**

عدم كفاية الدم إما من حيث تركيبه أو من حيث مقداره . أسبابه عديدة أشيعها اللل والنود في المدة أو الاماء .

Epanthe (F). Epanthous (E).

٢٠٩٢٢ - **فَقَار**

نمت تعريفي يطلق على كل ما يعيش طفيلياً على الاثمار .

٢٠٩٢٣ - **فَقَر ، قَعَم**

الفقر والقعم : ازوار الوردة عندما تفتح .

٢٠٩٢٤ - **فَقُو**

هو الياس ، أظلمها .

٢٠٩٢٥ - **فَقْرَة**

هي قرعانة المستحية ، يقال فقرة الطيب .

٢٠٩٢٦ - **فَقَاح**

Inflorescence (F).

قحاح وفمقة كل نبات : زهره .

٢٠٩٢٧ - **فَقَاح**

هو ذرة الربيع ، أظلمها .

٢٠٩٢٨ - **فَقَاح ، فِرْز**

Sideritis (S).

Sideritide, Siderite, Crapaudine (F). Iron wort (E).

Gledkraut (D). Basilica salvatica (I).

وأحدته فقاحة . جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة

الفنويات . مهده المناطق الاسيوية والاروبية المعتدلة

الحارة .

Spondylidae (S).

٢٠٩٢٩ - **فَقَاحِيَّات**

Spondylidés (EF). Spondyliidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الياشج الرباعية ، عاداتها الخاضع . أجسامها وأنواعها عديدة معظمها من المحيط الاراضي الثالثية || انتشارها يعم معظم

بحار العالم أخصها بحار البلاد الحارة || أعرف أجناسها

المعاصرة وأشهرها الفقاحة والفمقينة .

Spondylus (S).

٢٠٩٣٠ - **فَقَاحَة**

Spondyia (F). Spondylus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الياشج الرباعية ، عادات الخاضع . وفصيلة الفقاحات . أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || أسدانها شبه بيضية اللون ، لاستسارية المصاريج الشائكة تملأها زعمات متباينة الاصطالة ، دقيقة الأطراف الدرة || تعيش لاسفة بالصخور المتوسطة التور .

٢٠٩٣١ - **فَقَار الجَوْزَاء**

Baudrier d'orion (F).

فَقَار الجوزاء كواكبها ، وهي الثلاثة المستعرضة للرباسة في وسط الجوزاء . تسحبها العرب النظم وتسميها أيضاً نطاق الجوزاء ومنطقة الجوزاء ويد الجوزاء . وهي مثل في الانتظام والالتزام .

٢٠٩٣٢ - **فَقَار الفُجَاع**

فَقَار الفجاء كواكب .

٢٠٩٣٣ - **فَقَارَة ، فَقْرَة**

Vertèbre (F).

Vertebra (E).

هي الفقرة ، اسطوانة عظمية صغيرة يتألف منها السند الفقري الحيواني .

٢٠٩٣٤ - **فَقَارِيَّ**

Rachidian (F).

Rachidian, Spinal (E).

نمت تعريفي يوصف به ما هو مخصص بسلسلة الفقار .



فَقَاة

٢٠٩٥٨ - **فَلَّ** ، **يَفْلِسُ** **زَيْتُونِي**

Jasminum sambac, Mogorium sambac (S). Jasin sambac, J. d'Arable (F). Arabian jasmine, Double jasmine (E). Arabischer Jasin, Sambac Jasin (D). Mugarino doppio, Gelsomino d'Arabia (I).

يفلس نباتات زيتونية ، سبروتية ، معمرة من سبل الياسمينيات وصيلة الزيتونيات . انواله اربعة جميعها جنات فلهاء صفوة اللد تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كاملة متقابلة بيضية الشكل . فصلها جاسه الصفه ، ملس البثره شديد المطر القويح || اشهر انواله يضاء اللون ، ذكية العرف البطر القويح || اشهر انواله الفل المكسب الذي يتميز بازهاره الكبيرة المتراكبة البلات العديدة المستعرضة . ثم الفل الطويق وهو صغير الازهار ، خالي البلات المندهة || والفل يتكاثر بالتصلب وزرعه لا تصلب حنائه خاصة .

٢٠٩٥٩ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Faille, Barle, Géoclase, Paracasse (F). Fault (E). تصدع في الصخور بسبب انشقاقها .

٢٠٩٦٠ - **فَلَّ** **حَوْصِي**

Fosse d'affondrement (F). Trough fault (E).

٢٠٩٦١ - **فَلَّ** **عَادِي**

Faille normale (F). Normal fault (E).

٢٠٩٦٢ - **فَلَّ** **عَادِي**

Faille béante (F). Open fault (E). تصدع واسع الفج .

٢٠٩٦٣ - **فَلَّ** **مُدَوَّج**

Faille à gradins (F). Step fault (E). تصدع متتابع الشقوق .

٢٠٩٦٤ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي** ، **سَهْب**

Steppe ج. فلوات ريفاني وسهوب . سهول مرمية الاطراف شاسعة المدى صحراوية التبو.

٢٠٩٦٥ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Stéppique (F). Steppical (E). ما هو غصص بالفلاة كالسط والنبت .

٢٠٩٦٦ - **فَلَّ** **عَادِي**

Charrue fossoyeuse, Charrue rigoleuse (F).

٢٠٩٦٧ - **فَلَّ** **عَادِي**

Laboureur, Cultivateur (F). Husbandman, Cultivator (E). من ماث حرت الربة وزرعها .

٢٠٩٦٨ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي** ، **حَرَاث**

Labourage (F). Tillage, Ploughing (E). شق الربة وقلبها بالحرث .

٢٠٩٦٩ - **فَلَّ** **عَادِي**

Phalaris (F). فلوليس هو البشته نبات شبيه علي من التجليات .

٢٠٩٧٠ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي** ، **مُعَدَّ**

Phalaris nouveaux (F). فلوليس مُعَدَّ هو البشته المقدية ، نبات شبيه علي من التجليات .

٢٠٩٧١ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Pallas (F). Pallas (E). اسم علم لسطوري لسيار بين المشتري والمريخ اكتشفه ١٨٠٢ .

٢٠٩٧٢ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Voltmètre (F). Voltmeter (E). مقياس الفلط .

٢٠٩٤٩ - **فَيْعِ الْمَنَاقِعِ**

Géopape, Colombi-Caille (F). طائر من الفقى فضيلة الحاميات طوله نحو ٢٤ سم . صغير المنار ، قصير الجناح المستدير ، مستطيل الاصراف . لونه ثوب الفقع للسمى لكنه مادم الكثرة وعالم من ليفة الحمره . وهو قريب الشبه من السبا في يالفت المنافع والرامي . يفتن الصوصه في الربة بين الاذلال والاحباب الكثيفة .



فَيْعِ الْمَنَاقِعِ

٢٠٩٥٠ - **فَيْعِ الْمَنَاقِعِ** ، **يُفْصَمُ**

Phaps lophote, Colombe polgarde (F). طائر من الفقى فضيلة الحاميات . طوله نحو ٣٣ سم . يتميز بكفة مستطيلة تملو مؤخر الرأس . رأسه وصنقه ومصره وبلته الى الرتبة الرادية . يملو مقدم صدره بقمة حراء كلها صقعة من المم . ظهره زيتوني ، اجنحته الى الخشار النحاسي المؤذن بالايض . منقاره اسود . قوامه حر || يالفت صفاف الانهار والملتحات . قوته الجيوب . يفتن في الاشجار والشجيرات الكثيفة . اناته فيض يفتن .

٢٠٩٥١ - **فَيْعِ الْمَنَاقِعِ** ، **يُفْصَمُ** ، **يُفْصَمُ**

Févilles (S). Févillée, Avila, Noix de serpent (F). Nhandroba (E). جنس نباتات حبيبة عارفة ، ثنائية المسكن من فصيلة الفريجات . انوالها المعروفة سمعة منبتها معظم مناطق البلاد الحارة والاستوائية || سيقانها عارفة خشوية مستطيلة . اوراقها معتقة ، كفة الشكل ، خاسية التفصيص . ازهارها متبدي الصنيع . ازهارها خاسية البلات الصف . ثمارها تلمى جوز الثعبان وهي بطيفية الشكل ، صفرة لثة ، مائلة السطح ، تقلب بطن البور المركزة عل محور الثمرة الثلاثي الاصل . يستخرج من بزورها مادة زيتية لها استعمالها الطبي .



فَيْعِ الْمَنَاقِعِ

٢٠٩٥٢ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Méchoire (F). Jaw (E). احد جزئي الفم حيث فرزت الانسان وما فكان علوي وغلي .

٢٠٩٥٣ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Mandib (F). Maxilla (E). هما في الحشرات فكان عريضان متساويان ، مركزهما في مقلة الرأس بين التآخير ، يحصلان الملاصق الفكية .

٢٠٩٥٤ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

من الانماط الزراعية . واسع تمرية .

٢٠٩٥٥ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي** ، **إِكْبِيل** ، **شَمَكِي**

Couronne bordelaise (F). Corona borealis (E). الفكة او الاكليل النبال كوكبة نجوم شمالية المقي مركزها بين السور والقصبان والجاني . عدد نجومها ثمانية وهي مستديرة الشكل وفي استدارتها ثلثة لذلك يقال لها ايضاً « قسمة السالكين » . ومن نجومها البانية المزدوجة نجم ، من المرتبة الرابعة ، يدعى « ثير الفكة » . ونجم من المرتبة السادسة يدعى « ثير القسمة » .



فَلَّ

٢٠٩٥٦ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Entorse (F). Sprain (E). زوع للمفاصل وريها من مواضعها .

٢٠٩٥٧ - **فَلَّ** ، **فَلَّلَ** ، **فَلَّلِي**

Maxillaire (F). Maxillary (E). ما هو غصص بالفل .



فُلُيوس الإِجاص



فُلُيوس البَيْتَلَا



فُلُيوس الحِلْيَجِي



فُلُيوس نَفْثِي



فُلَيْت



فُلُيوس

Philippinus (S).
Philépitze (F).

مَاطَرٌ وَسِيدٌ الْجَنَسُ وَالنَّوْعُ مِنَ الْجَوَاهِرِ شَرُونَاتُ الْغَائِقِ وَضَيْلَةُ النَّجَاحِيَّاتِ. أَصْلَاهُ بَعْضُ مَنَاطِقِ افْرِيقِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ وَبِزِيرَةِ مَغْشُوكٍ ۥ ثَوْبُهُ إِلَى الشَّعْمَةِ السَّارَةِ. رَأْسُهُ وَزَوْرُهُ وَاحِلٌ صَدْرُهُ إِلَى السَّعْرَةِ الْبَاقِيَةِ. يَلْبَسُهُ رَأْفَتُهُ وَبَاهِرُهُ مَرْقِيَّةٌ ۥ حُمُوهُ الْحَشْرَاتُ الصَّغِيرَةُ وَالنَّمْلُ وَالْبِلُورُ. يَنْشُرُ عَشَهُ فِي الشَّجَرَاتِ الْكَثْفَةِ. الْأَشْيُ خَمْسُنَ نَحْوِ ٥ يَبْغِثُ مِنَ مَرْثِيٍّ إِلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي الْحَبْلِ. الْذَكَرُ يَبْغِثُ لَهَا الْغَنَاءَ.

٢٠٩٨١ - فُلَيْتَان

مَاطَرٌ زَعْمُو أَنَّهُ يَحْدِثُ الْقِرَدَةَ (الْبَان).

Répandre (F).

To divide, To distribute (E).
فُلُجُ الْإَرْضِ الزَّرَاعَةُ : قَسَمَهَا ۥ فُلُجُ الْمَالِ يَبْهِيمُ : قَسَمَهُ بِالْمَتَلَسُّوِي.

Molcé (F). Half (E).

فُلُجُ

فُلُجُ كُلِّ شَيْءٍ : نَصَلُهُ.

Fente branchiale (F).

Branchial fissure (E).

فُلُجُ عَيْنِي

٢٠٩٨٥ - فُلُجَّة

الْقَلْبِيَّةُ : سَاقِيَةُ الزَّرْعِ. ج. فُلُجَان.

Blatomère (F). Blatomera (E).

أَسْمُ لَعْرَيْنِ يَمْلِكُ عَلَى كُلِّ بِلَسْتِيْدَةٍ أَوْ بِيصِيَّةٍ مِنَ الْبُوصِيَّاتِ لَمُتَّاقِيَةٍ تَنْسَكُمُ الْبَيْضَةَ فِي طَوْرِ تَحْوِيلِ الْعِنَارِي الْمَادِي.

Labourer (F).

To plough, To till (E).

فُلُجُ حَرَّتْ

٢٠٩٨٨ - فُلُحُوسُ

الْكَلْبُ الْمَسْنُ وَالْبَدِ أَنْفُسًا.

Hemigalea (S).

Hémigale (F).

جَلَسَ حَيَوَاتِلُ لَاحَةٍ مَفْرُوسَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْفَزِيَادِيَّاتِ. مَوْطِنُهَا مَلَقَّةٌ وَصَوْتُهَا وَبُورْدِيُو. تَأْتِي الْإِحْرَاجُ وَالْقَابَاتِ. سَرَسُهَا دَجْوِي. مَلْبَسُهَا الْحَيَاتِي فَرْدِي لَا يَجْمَعُ إِلَّا فِي زَيْنِ الْوَدَاقِ وَالْكُومِ ۥ أَجْسَامُهَا مُسَطَّلَةٌ الشَّكْلُ ۥ حَيْفَاهُ تَطْلُبُ مِنْ ٨٠ إِلَى ٩٠ سَم. بِمَا لَهُ الْقَنْبُ. دُرُوسُهُ زَائِلَةٌ. إِحْطَامُهَا ذَائِلَةٌ. عَيْنُهَا صَغِيرَةٌ. أَذْنَاهَا دَقِيقَةٌ جَالِسَةٌ. قَوَائِمُهَا صَغِيرَةٌ. أَذْنَاهَا مُسَطَّلَةٌ جَلَّةٌ. وَبَرَاهَا قَصِيرٌ ۥ مَتَوَسِّطُ النَّمْرِ. الْوُجَاهُ إِلَى الشَّهْبَةِ الْقَفَرَاءِ يَمْلُوكُا تَجْمِيعُ مَتَرَفِيٍّ أَسَدٍ أَوْ تَبْجِيحُ كَسَنِيٍّ وَفَكَ الْبَانِيَّةِ إِلَى النَّوْعِ ۥ قَبِيَّتَاهَا مُسْتَطَلَّتٌ إِلَيْهِ سَيْلًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ وَالْإِنْسَانِي وَالزَّرْعِ. نَوَاعِلُهَا الْمَرْوُفَانُ :

٢٠٩٩٠ - فُلُحُوسٌ مُجَدِّعٌ

Hemigalea Hoesi (S). Hémigale de Hoes (E).

سَرَسُهُ جَبَالُ بُولْدِيُو.

٢٠٩٩١ - فُلُحُوسٌ مُجَدِّعٌ

Hemigalea Hardwicki (S). Hémigale zébrée (F).

سَرَسُهُ مَلَقَّةٌ وَصَوْتُهَا وَبُولْدِيُو.

Polycotylédon (F).
Pycotylédon (E).

٢٠٩٧٧ - فُلَيْتَان

مُتَصَدِّقُ الْفُلُحُ.

Astronomie (F). Astronomy (E).

فِي عِلْمِ الْفَلَاحِ ۥ عِلْمُ يَبْغِثُ فِي الْأَجْرَامِ الْبَاهِرَةِ عَلَى اسْتِخْلَافِهَا كَالنَّجْمِ وَالْكَوْكَبِ وَالْمُذْنَبَاتِ الْخَفِ. ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ نَظَرُ دُرَاهِمًا وَإِبَاعِدًا وَرَأْيُهَا الْمَقْدَرَةُ وَالْقَوَائِنُ الَّتِي تَقْسِمُ ظَوَاهِرُهَا الْمُنْظُورَةَ.

Phyllobius (S).

Phyllobie, Coupe-bourgeons (F).

جَلَسَ حَشْرَاتُ نَاهِيَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبُوصِيَّاتِ. أَنْوَالُهُ حَدِيدَةٌ تَرْكِبُ مَعْظَرُ الْإِجَاصِ الْمَشْرُوعِ وَالْمَرْجِيَّةِ. جَمِيعُهَا صَغِيرَةٌ أَثَقْدُ طَوِيلًا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٧ سَم. أَجْسَامُهَا سَهْبِيَّةُ الْتَشَارِ سَهْبِيَّةُ الْمَلْجَةِ. أَمَّا كَمَا غِلَظَةُ الشَّكْلِ قَصِيرَةٌ أَلَدَّ مُسْتَقْبِيَةِ الْإِثْتِشَابِ. يَكْثُرُ وَجْهِيهَا فِي الرَّيْبِ. يَمْرُقَاتُهَا تَنْبِيْشُ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْمَوَادِّ الْمَعْصُومَةِ حَتَّى أَكْثَالُ طَوْرُهَا الْبَرِّي. أَصْرَارُهُ مَحْصُورَةٌ بِمَا تَقْتَرِفُهُ ۥ الْحَشْرَاتُ الْكَامِلَةُ ۥ مِنْ أُنَى فِي قَرْنِ الْبَرَامِ وَأَطْرَافِ الْأَوْدَاقِ.

٢٠٩٧٦ - فُلَيْيُوسُ الْإِجَاصِ

Phyllobius pyri (S). Phyllobie du poirier (F).

Large green weevil, Pear leaf eating weevil (E).
Breiter Birnengrünrüssler, Grünrüssler (D).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَيْيُوسِ. مَرْتَهُ الْأَجْرَامِ الْمَشْرُوعِ أَجْسَامُهَا. طَوِيلُهَا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٥ وَ ٧ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى الْخُضَارِ الْمَلْجَبِ. ظَهْرَانُهُ كَثِيرُ التَّخْطِيطِ. مَدْبَهُ أَمْرُ الْخُضَارِ بِأَمْتِ الْمَلْجَةِ. مَتَكُهُ قَصِيرٌ أَثَقْدُ بَالِغُ التَّخْذِيْدِ. زَبَانُهُ إِلَى الشَّعْرَةِ الْخَطِيَّةِ. يَسْرَحُ فِي الْبَارِ ۥ يَكْثُرُ فِي أَوَّلِ الرَّيْبِ. قُوَّةُ أَطْرَافِ الْأَوْدَاقِ الْفَتِيَّةِ لَا يَبْغِثُ مِنَ الْبَرَامِ.

٢٠٩٧٧ - فُلَيْيُوسُ الْبَيْتَلَا

Phyllobius betulae (S). Phyllobie du bouleau (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَيْيُوسِ. مَرْتَهُ الْأَجْرَامِ الْحَرَجِيَّةِ أَجْسَامُهَا الْبَيْتَلَا. طَوِيلُهَا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٦ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى الْخُضَارِ الْأَلَامِ. ظَهْرَانُهُ مَبْمَرُ السَّهْبِ وَالْمَلْبِ الْمَتَصَبِّ الْفَتِيْق. زَبَانُهُ وَسِيقَانُهُ وَارِسَاهُ إِلَى الصُّلْبِ الْخَطِي. مَتَكُهُ ضَبِيقُ الْهَرَفِ ۥ حَادِمُ التَّخْذِيْدِ ۥ يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَكْثُرُ فِي أَوَّلِ الرَّيْبِ. قُوَّةُ الْأَوْدَاقِ الْفَتِيَّةِ.

٢٠٩٧٨ - فُلَيْيُوسُ الْهَلْبِي

Phyllobius oblongus (S). Phyllobie oblongue (F).

Leaf eating weevil, Brown leaf weevil (E).
Gemeiner Blattwürmer, Schmalbauch, Obstbäume-grünrüssler (D).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَيْيُوسِ مَرْتَهُ الْأَجْرَامِ الْمَشْرُوعِ. طَوِيلُهَا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٦ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى السَّوَادِ الْأَلَامِ. ظَهْرَانُهُ حَسْبُ الْهَلْبِ السَّهْبِ الْفَتِيْق. يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَقْسِمُ الْبَرَامِ وَالْأَوْدَاقِ.

٢٠٩٧٩ - فُلَيْيُوسُ يَفْيِي

Phyllobius argentatus (S). Phyllobie argentée (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَيْيُوسِ مَرْتَهُ الْأَجْرَامِ الْحَرَجِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَالِهَا طَوِيلُهَا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٣ وَ ٥ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى السَّوَادِ الْفَتِيْقِ يَمْلُوكُا مَوَاجِجَ نَفْثِي. زَبَانُهُ وَسِيقَانُهُ وَارِسَاهُ مَحْطَلَةٌ الْوَرْنُ. مَتَكُهُ عَرُوبِي الشَّكْلِ غِلَظَةُ الْفَتِيْقَةِ ۥ يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَكْثُرُ فِي أَوَّلِ الرَّيْبِ. قُوَّةُ الْبَرَامِ وَالْأَوْدَاقِ الْفَتِيَّةِ.

٢١٠٠٥ - **فِلْتِي** (F). Voltaique (F). Voltaique (E).
نمت توصف به الكهرباء. الفلطة المصدر .

٢١٠٠٦ - **فِلْتِيَة** (F). Voltage (F).
هو فرق الجهد بين طرفي السلك الموصل . وهو مقدار
الفلط اللازم لتشغيل آلة ما .

٢١٠٠٧ - **فِلْتَت** (S). Valvata (S). Valvate (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأبريل
وصفيلة الغلفيات. أنشائه المعروفة قليلة المدد منتشرة
في بعض بحار البلاد الباردة || أسداها حلزونة ، مطبقة ،
شبه مستديرة الشكل يكثر فيها اللون الأبيض .

٢١٠٠٨ - **فِلْتِيَّات** (S). Valvatidae (S). Valvatides (F). Valvatides (E).
نفسية حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأبريل
أسمائها الخياشيم . أجناسها وأنواعها المعاصرة المروفة
قليلة المدد منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمنسوبة
نحو الباردة || أسداها متباينة الانكسار يكثر فيها
التخطيط والاستدارة || أعرف أجناسها الفلستنت .

٢١٠٠٩ - **فِيلِل** (S). Piper (S).
Poirier (F). Pepper (E). Pfeffer (D). Pepe (I).
جنس نباتات مختلفة الإحجام معمرة من فصيلة الفلفلليات.
أنواعه نحو ٦٠٠ أصنافها المناطق الحارة من المالين القديم
والجديد . معظمها شجيرات ونباتات برية متسلقة وريشية
زرعي وتربيني . أوراقها مثقبة متناحية ، نصلها جلدي
الصفحة . الثمارها محورية الارتكاز ، قدية التجميع ،
متدلية . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القدد يكثر فيها
اللون الكحلي ثم الجلوي || أشهر أنواعها ما يتبع .

٢١٠١٠ - **فِيلِل أَحْمَر** هو الفليفلة ، أظبا .

٢١٠١١ - **فِيلِل أَسْوَد** ، **فِيلِل عَطِر**
Piper nigrum, P. aromaticum (S). Poirier noir (F).
Black pepper plant (E). Schwarzer Pfeffer, Gemeiner
Pfeffer (D). Pepe nero, P. aromatico, Pevare (I).
نوع من الفلفل وهو شجيرة زراعية متسلقة ، حوائقها غليظة
تنمينا حل الارتقاء والتثبث || ثمارها حارة مشهورة
تستعمل في الطعام .

٢١٠١٢ - **فِيلِل الصكالية** (S). Agnus castus (S).
هو الأذنة والقرصاد وكف مريم ، النج .

٢١٠١٣ - **فِيلِل الماء** ، **زَجَجِيل الكلاب**
Polygonum hydropiper (S). Cusage, Poivre d'eau,
Piment d'eau (F). Water pepper, Lake weed, Biting
persicaria, Cusage (E). Pfeffer-Knöterich (D). Polli-
gono piperino, Pepe d'asino, Polygono acre (I).
نبات عشبي بري من فصيلة البيلطليات . يعيش في
المتنق . ساقه مقعدة . أوراقه وجلودره سريفة الطعم كانت
تستعمل قديماً في الطب .

٢١٠١٤ - **فِيلِل حُلُو** ، **فِيلِل إفرنجي**
Pimenta (S). Pimenta, Piment des anglais, Poivre
de la Jamaïque, Tousse-épice (F). Allspice, Pimento
(E). Pimentbaum, Pimentmyrte (D). Pimento (I).
شجرة برية وزراعية من فصيلة الأسيات . مهدا البلاد

٢٠٩٩٢ - **فِلْدَة** (F). Phyllode (F).
ورقة عرضية ناتجة من شلوة جسوري . ج فلد .

٢٠٩٩٣ - **فِلْدَة سَبَاة** ، **فِلْدَة سِكِر** (F). Feldspath (F). Feldspar (E).
هي صوانات الألبين مع إحدى القواعد القلوية كالبوتاس
والصوديوم والكلس والميزا ... || يكثر وجودها في الصخور
الأصلية والبركانية . وهي تتألف مع الطلق والمرو مواد
الأميل البلورية .

٢٠٩٩٤ - **فِلْدُوس** ، **لِيلْدُوس** (S). Phylloclada (S). Phylloclada (F). Phylloclada (E).
نبلة صغيرة معمرة من فصيلة الخنثليات . مهدا بعض
جبال حوض البحر الأبيض المتوسط . ساقها فرعاء تملأ
من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها كثيرة المدد ، صغيرة القدد ،
تطويل نحو ١٠ م . وتفرس نحو ٢ م . نصلها مائلة ،
خضراء اللون ، مسنة الخمار . أزهارها صوانية التجميع .
أثمارها كبيرة جلجلية الشكل ، مستطيلة المالحق الخلفية
الافتشار . لنوا إلى الزرقاء البفسجية . توتيجاتها خاسية
الاستان . كما يراها خاسية المصارع || تنويرها يستمر
من حزيران إلى آب .

٢٠٩٩٥ - **فِلْز** ، **فِلْز** (F). Métal (F).
هو المعدن ، أظبا .

٢٠٩٩٦ - **فِلْز التوكايس** (F). Bronze de cloche (F). Bell-metal (E).
مزيج من نحاس ووزنك وأحمد وقصدير يستعمل في صناعة
الاجراس والتونائوس .

٢٠٩٩٧ - **فِلْزَات قَلْبِيَة** (F). Métaux alcalins (F). Alkaline metals (E).
٢٠٩٩٨ - **فِلْس** (F). Squamula (F). Squamula (E).
فلس ج فلرس هي الحراشف الصغيرة التي تكشي جلود بعض
الاسماك أو روائن بعض الحشرات .

٢٠٩٩٩ - **فِلْسَا** (S). Vais (S).
نظر تجري من اللبليات يدعى ذلعب ، أظبا .
٢١٠٠٠ - **فِلْسِي** (F). Lapidote (F). Lapidote (E).
نمت تعريفي . وهي يطلق على الاغشية النباتية الحراشفية
البشرة .

٢١٠٠١ - **فِلْسِي** (F). Felsitite (F). Felsitite (E).
نمت تعريفي يطلق على الأثرية والصخور الفلستية التركيب .

٢١٠٠٢ - **فِلْسِيَة** (F). Felsite (F). Felsite (E).
طبقات صخرية ثوارة نحيفة متجانسة لا قياسية السمك .
٢١٠٠٣ - **فِلْسِيَة** ، **فِلْسِي** (F). Felsitite (F). Felsitite (E).
يقال صخور فليسية وربة فلسا .

٢١٠٠٤ - **فِلْط** (F). Volt (F).
هو رعدة هبوط الجهد ، يمر حته بفرق الجهد بين نقطتين
من سلك موصل إذا كان الجهد الذي يؤوله الكولوم بين
هاتين النقطتين يساوي جولاً واحداً . ج فلطام .



فلت



لفل أسود



نفل الماء



نفل حلو



فلك البروج بأقسامه وأرقامه وعلاماته وأسمائه وصوره وشهوره



فلعل عرق الذهب



فلعل كناية



مَلَقُوسِي

الحارة اوراقها معنقة متقابلة كبيرة النصل . ثمارها حصىة
القد والشكل، قروزية اللون، عطرية، يستخرج منها عطر
يحل محل عطر القرفة. اما مسحوقها فيستعمل استعمال
بعض الفواكه في عدة مأكول .

٢١٠١٥ - فينيل رومي هو الفيلفة ، اعلها .

٢١١٦ - فلفل عرق الذهب *

Piper longum (S). Polvriier long (F). Long pepper (E).
Langer Pfeffer (D). Pepe longo, Albero del pepe (I).
نوع من الفلفل وهو شجرة زينة حيلة الشكل .
أوراقها موشية بالأصفر ثمارها مثاقيد مستطيلة مثدية ،
كروية صغيرة أرجوانية اللون ذهبية المالحق .

٢١٠١٧ - لُفْطُ كِتَابَةِ^٥، حَتَّ الْعَمُورِ، كِتَابَةِ

Piper cubeba (S). Polvriier cubèbe, Polvre à queue.
Cubèbe (F). Cubeb pepper (E). Cubebenpfeffer.
Cubebenstrauch (D). Cubeba, Pape a coda (I).
نوع من الفلفل التركي وهو شجرة جميلة الشكل والرائحة.
أزهارها عناقيد مستطيلة مرجانية أو أرجوانية اللون.

Pipersaceae (5). ٢١٠١٨ - الفصليّات

Pipéracées (F). Piperacées (E).
 العائلة نباتية من ذوات الفلقتين عدت الفصائل ،
 موزعات في المناطق الحارة ، تتجمع إلى عشرة أجناس
 معظمها نباتات وأشباه ، أرواقها لاصقة للانقسام بها
 للمقابلة والمتناحية والقصية . أزهارها قدية الشكل ،
 سلبية ، تتجمع في الإكياس ، منها الحرة والناحية والمقابلة
 مع الأرواق . ثمارها حنينة كروية صغيرة القد غلظة
 اللسان

Cotyledon (F), ٢١٠١٩ - فلتية، زُبارة

Cotyledon (E).
صفحة ورقية تلصق جنين البزرة ، راجع زبارة .

Lobe (F). ٢١٠٢٠ - فُلْبَة ، قُلْبَة ، قَمَرٌ

Lobe, Lobus (E).
كل جزء من الورقة أو الزهرة بالغ الضربين مستدير.

٢١٠٢١ - الْقُرْآنُ ، سُورَةُ

Valgus hemipereus (S). Valgus hemipetra (F). مشيرة من مصفوفة الجلياليد ورتبة مفصليات الاجنحة. يشتمل على مناطق الجلياليد الحارة من العالم القديم. جسمها غير اللد يتطوّل حتى 8 م. عند الذكر نحو ١٠ م. ثوبها الالاقى. ثوبها الالاقى السوداء طولها ١٠ م. خفاف فلبية يضاء اللون عند الذكر. ظهرها يلبس عند اقتران الجسم. قصصية الالاقى تنتمي برز مستنطيل يمكن من فتح الحزن حتى في الغيب الالاقى من نسيان الالاقى واخرى حزن. سرورها يشتمل على الزاير. زهرها الزاير الالاقى حزن الالاقى ، يذود الالاقى. تنقب حزنه وتسره الالاقى بانها قلب كاله سلسا في حزن الالاقى. حزن الالاقى حزن.

٢١٠٢١ - لُقْمَى، قَمَى

Lobular (E).

٢١٠٢١ - فَلَكَ ، فَتَكَ الْوُجْهَ

le Zodiaque (F), the Zodiac (E).

[illegible]

٢٤٠٢١ - فُلُكْ اطلب مدار .

Arche (F). ٢١٠٢٥ - فلك

٢١٠٢٦ - فلکونوس*، عیار و ذکمه:

Phyllocactus (S), Phyllocactus (F).
 جنس نباتات لحمية معمرة من الصباريات. أنواعها عديدة
 أصلها البلاد الاستوائية. سيقانها أوراق متجانسة مفصلة
 مغطاة. أزهارها كبيرة القند مسطحة البتلات البيضاء.
 ثمراتها تختلف مع أنواعها منها الأبيض والوردي والابيض
 القرمزي. جميعها حامضة الطعم مأكولة. أشهر أنواعها
 الشوكية:

Ph. à grandes fleurs (F). المكوس كبير الزهر

Ph. crinaté (F). المكوس مطوّص

Ph. anguleux (F). الكوس مسلح

Sidéral (F). Sideral (E): ٢١٠٢١ - فلکی

مت تعريفه يطلق حل مجرى النجوم والكواكب السماوية.
اليوم الفلكي هو دوران الأرض البيني . والسنة الفلكية
هي دوران الأرض السنوي .

Orbital (F). ٢١٠٢ - فلکی، مذکری

Orbital (E):
مت و صفی خاص مدار الکواکب ، ای کوکب کان .

Arctidae (S). ۲۱۰۲ - فُلَكِيَّات ۵

Arcaeidae (F). Arcadae (E).
 صيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الحياشيم.
 اجتماعها وأورفاها المرفوعة صفيحة متشترية في معظم بحار
 العالم ۱۱ أصلها متباينة الاشكال والأحجام والأوان
 مصلاتها صفة. مصاريها لانقافية منها القساوية
 منها المتناقلة. أصلها ماصصة الغالب ۱۱ صفيحة
 كروية ۱۱ اجتماعها واشهرها الفلكية والحويطة
 الفظة

Arca (5). ۲۱۰۳ - فُلُكِيَّة *

Arche (F). Arca, Arc, Ark shall (E).
 يقضى أم الخليل وذلك جنس حيوانية من
 زخريات فصليات الخراف وفضيلة الفاكيت . اوعها
 مرفقة كثيرة العدد ؛ منها من متحجرة الحية
 سيلوية ، أي أنه يعد إلى أقدم التكوين الجيولوجية .
 الأنواع المماثلة لفترة في جميع بلاد العالم انصهر
 تحت اسمها شبه يضيء الشكل أو الهلالية ،
 حدة الجسم أو صغيرة ، حزمة الأصناف الملوحة ||
 لاصقة بالصخور الممتدة للتصمة النور



۴۴

قوائمها خاصة الاصابع ، حادة الاظفار . اصولها ناعمة لينة || انثاها مجهزة بجرباب في اسفل البطن تقبض فيه الرضيع حتى للطماع || اشهر اجناسها الفكتنجير ولبهتوان ولفكتولج والكوذور .

٢١٠٣٨ - **فلتوكه** * (F). Eupleres

فلتوكه هو الاسم للملغاشي . حيوان لين مقترن وسيد الجلس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف للقباهات الساحلية . يسرح في النهار . قوته الحشرات والورديات والديدان || جسمه مستطيل الشكل ، كثيف الفوبر المستطيل الناعم . طوله نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٣ سم . ارتفاعه الى الحاركة لا يتجاوز ١٨ سم . راسه صغير الحجم ، غريب الشكل واخر السبال . عيناه صغيرتان واذاها كذلك . قوائمها خاصة الاصابع الصغيرة النعيلة . غلابة رقيقة عجمية الخراف . ثوبه الى انشفحة السمراء ، صدره وبعده الى الغشية البرتقالية المائج .

٢١٠٣٩ - **فلتيم** * (F). Vagin d'insecte

Vagina of the insect (E). ضوض من شوار اثنى الحشرات وهو القناة التي توصل للفرج بحسب الزكة .

٢١٠٤٠ - **فلو** * (F). Poulain

فلو والفلو والمهر هو ولد الفرس قبل بروز ثنيتيه اثنتين . ج . الفراء .

٢١٠٤١ - **فلوت** * (F). Voluta

الفلوت حيوان بحري من الرخويات يدعى غطوخة ، اطلها .

٢١٠٤٢ - **فلوكة** * (F). Pouliche

الفلوكة والفلوكة هي اثنى الفلر .

٢١٠٤٣ - **فلوتوكه** * (F). Vallota

مشية دوطسية وسيدة الجنس والنوع كيرة المروب من فصيلة الترجسات . مهدا افريقية الجنوبية . دوطسها مستديرة الشكل . اورثها جلدية الانتساب ثنائية التصنيف المتقابل ، نصلها بطول من ٤٠ الى ٨٠ سم . ويعرض نحو ٣ سم . فوه الى الخصار المايق . شرعاعها الزهري اجوف القصبة بطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها متعاقبة الارتكاز ، كيرة الله ، بطول من ٨ الى ١٠ سم . الزواها تختلف باختلاف القشروب منها الاحمر والكروزي والوردي والابيض والموشح . تنورها يستمر من ايار الى آب . ترغب في المواتع الرطبة والممارش الجنوبية . تعيش في المراكب ولا تخفى سوى البرد .

٢١٠٤٤ - **فلوچية** * (F). Fallugia

Fallugia (E). جنبة تزيينية مسمرة من فصيلة الورديات . منبتها بعض اسقاع امريكة الشمالية . ساقها متعصبة لفراء تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . افئادها الحلوية مزينة الاحمر . اورثها متعاقبة صغيرة الحجم ، ثلاثية الفلق . نصلها خضر الصفحات العليا ، يفض السفلى . ازهارها عاجية اللون ممتحة بالوردي ، طهرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٠٣١ - **فلنمكر** * (F). Fulmar

طائر من الرغاء يدعى رغاء الجبلية ، اطله .

٢١٠٣٢ - **فلننجر** * (F). Phalanger

Phalanger (S). Phalanger, Couscous (F). Phalanger, Couscous (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاهيرات . وفصيلة الفلتنجريات . قوائمها المرفوعة اربعة موطنها استراليا وفيها الجديدة . تألف للقباهات الباسقة الانجار . قوتها الاوراق والازهار والثر والسمكسور ويضها والحشرات . تروث في النهار في قن الانجار الرقيقة ويسرح في الليل في طلب القوت وتقتل بين الانجار تحليفا في الفشاء || اجسامها قريبة اليه من السنور . رؤوسها شبه غروطية الشكل . آذانها صغيرة . قوائمها خاصة الاصابع . احشيتها الجناحية تمتد من الزور الى رؤوس الاغذاء . انثاها مستطيلة اعلاخ . اورثها مبطية ومبيلة || انثاها ربابية الاعلاخ .

٢١٠٣٣ - **فلننجر ابلتق** * (F). Phalanger maculatus

Phalanger maculatus (S). Phalanger maculé, Couscous tacheté (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور . موطنه بعض مناطق استراليا ، اعصها الشمالية وجزر فينيان الجديدة واسيون وسيام وبشتا . ثوبه الى الرينة السمراء الملققة بالابيض الابهر . يتنجر بكبر عليه وبصفر اذنيه .

٢١٠٣٤ - **فلننجر السالب** * (F). Phalanger Colobensis

Phalanger Colobensis (S). Phalanger de Célèbes, Couscous de Célèbes (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور . موطنه يمتد من القسم الشرقي الى الجنوبي من جزيرة السالب . ثوبه الى الرينة الشهاب الغشية المائج .

٢١٠٣٥ - **فلننجر دوبي** * (F). Phalanger ursinus

Phalanger ursinus (S). Phalanger ourson, Couscous ourson (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور لكنه مكروم الشكل . موطنه القسم الشمالي من جزيرة السالب . يتنجر بخلافة الرأس الذي يقه رأس السلب . ثوبه الى الرينة السمراء السوية ، بطه الى الثيرة .

٢١٠٣٦ - **فلننجر شرقي** * (F). Phalanger orientalis

Phalanger orientalis (S). Phalanger oriental, Couscous oriental (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور الاجل . موطنه فينيان الجديدة وقسمور واسيون وسيام وسلا وارو... ثوبه الى الرينة السوية يمتد بعض ثني في الظهر . ويتنجر ايضا بكبر العين وبصفر الاذن .

٢١٠٣٧ - **فلننجرية** * (F). Phalangeridae

Phalangeridae (F). Phalangeridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الجرابيات الشاهيرات . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة . معظمها من حيوانات استراليا وبسها من الجزر القريبة منها || تألف للقباهات والارحاج ، تتساق الانجار بصفة ممتعة وبها انواع مجهزة بنشاء جناحي الشكل يمكنها حته انتشاره من الانتقال بين الانجار تحليفا في الفشاء || جميعها رقيقة ثائرة وبسها مباشرة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد . تتنجر بالسطح الاذنايب .



فلنجر



فلنجر

٢١٠٥٤ - **فليرة** * ، **كلبيكار** * Equula (S).
Equule (F). Equula (E).

كلبيكار هو الاسم المحلي. جنس اسماك بحرية من فصيلة الكلبيكات. أنواعها المرفوعة نحو ٢٠ أصنافها المحيط الهندي والبحر الأحمر || أجسامها شبه بيضية الشكل ، مبطلة ، صغيرة القبة أو متوسطة ، تطيل من ١٢ إلى ٢٤ سم. رؤوسها مستدلة الحميم ، ناشرة الأشعاط الثلاثة. أشداقها صغيرة. صفيها كبيرة جاسطة. زعانفها الظهرية والشرجية مسطيلة ، متقابلة يتقدمها بعض المناسخ الحادة. زعانفها الذيلية غارقة || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب لها .

٢١٠٥٥ - **فلوكس** Phlox (F).
هو الشوفاة جنس نباتات زربية ثنائية الاستمالة ، أغلبها .

٢١٠٥٦ - **فلوميس** Phlomis (F).
هو البزارة ، أغلبها .

٢١٠٥٧ - **فلوميس لزقي** Phlomis visqueuse (F).
هو الأذينة ، أغلبها .

٢١٠٥٨ - **فلوميس فلسطيني** Phlomis de Palestine (F).
هو البزارة الفلسطينية ، أغلبها .

٢١٠٥٩ - **فلبة** Marrube blanc (F).
هي القراشيد الأبيض ، أغلبها .

٢١٠٦٠ - **فلبة** Pouifot (F).
هي القوتج البري ، نبات عشبي صخري ، أغلبها .

٢١٠٦١ - **فليجييات** Schizomycos (F).
Schizomycophyta (E).
فئة من النباتات وسيدات الخلية الحضيف تتكاثر بانقسام الخلية إلى خليتين متساويتين .

٢١٠٦٢ - **فليدكة** * Phyllidis (S).
Phyllidie (F). Phyllidis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الأرجل أماميات الخياشيم وفصيلة الفليديات . أنواعها المرفوعة قليلة العدد جميعها من حبل المحيط الهندي والبحر الأحمر تعيش على حضور التوتالي || أصداها اطليجية ، صغيرة القبة ، مسطيلة ، مدنية المقدم والمؤخر ، جلدية القشار الملون البقع بالأسود والأبيض. غشائها كثيرة العدد ، حشائية الارتكاز . لواسها رباعية ، منها زوج علوي شبه انبوي الشكل وزوج سفلي مخروطي مكرز قرب الفم . أذنيها لحية مستدلة الأعطاط الطولي .

٢١٠٦٣ - **فليديات** * Phyllididae (S).
Phyllidies (F). Phyllididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الأرجل أماميات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المرفوعة قليلة العدد أكثرها من متحجرات الأذينة الثابتة . المعاصر منها يعيش على شواطئ بحار البلاد الحارة || أصداها حشائية التركيب والأحجام منها وسيدات المسامير ومنها حديدية ، جميعها تستنشق الماء. غشائها حشائية الارتكاز || أعرف أجناسها المعاصرة القليلة .

٢١٠٤٥ - **فلور** * Phyllirroe (S).
Phyllirrhoë (F). Phyllirroe (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الأرجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الفلوريات . أنواعها المرفوعة قليلة العدد ، أصنافها بعض مناطق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . جميعها مية تسرح في الليل || أجسامها حلالية شفافة مبطلة لا تخلو من المواد النفسورية المضيئة. رؤوسها ثنائية القابس التي تبدو كقرون الثيران .

٢١٠٤٦ - **فلوريات** * Phyllirrhoidae (S).
Phyllirrhoides (F). Phyllirrhoidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الأرجل خلفيات الخياشيم || أنواعها قليلة العدد جميعها جنس واحد الفلور . جميعها مية لا تقرب الشاطئ . تسرح في الليل . أجسامها شفافة تحمل بعض المواد النفسورية المضيئة .

٢١٠٤٧ - **فلوريد** Fluorure (F). Fluoride (E).
ملح الحامض الفلوريدريكي .

٢١٠٤٨ - **فلوريد الباريوم** Fluorure de baryum (F).
Barium fluoride (E).
مركب الفلور مع الباريوم .

٢١٠٤٩ - **فلورين ، فلورور ، فلور** ، **لاصف** Fluor (F). Fluorine (E).
غاز أصفر اللون ، كبريه الرائحة ، شديد التفاعل . ثقله الذري ١٩،٣١ رقه الذري ٩ .

٢١٠٥٠ - **فلوس** * ، **زب الكرم** ، **ستير** Phallus, Ph. impudicus (S). Phallie, Phallus impudique, Satire (F). Phallus, Devil's horn, Steink horn (E).
Gichtschwamm (D). Spugnolo (I).

فطر دعامي من فصيلة الفلوريات شائع الانتشار يوجد في جميع المواقع الرطبة من الأقاليم الحارة والمعتدلة || شكله ما حركه الجسم . مله اسفنجية ، أرسسته مخروطية . لها إلى الخفسار التآلم || يؤكل في أول عهد ، عند انقلاق الكلاف ، قبل استطائه وتصلب خلاياه || أعرف أنواعه الصيني والكليبي .

٢١٠٥١ - **فلوس صيني** Phallus molusini (S).
Phallus de Chine (F).
نوع من الفلوس صين القه والساق ، سنطلي اللون ، أحر الأرسوة النعومة الشكل .

٢١٠٥٢ - **فلوس كنيني** Phallus canis (S).
Phallus de chien (F).
نوع من الفلوس . مله دقيقة ، مسطيلة ، جؤوبية اللون ، سنطلية الملمح . أرسوته حلقة ، بلوطية الشكل ، خرية اللون .

٢١٠٥٣ - **فلوسيات** Phalloaceae (S).
Phalloaceae (F). Phalloaceae (E).

فصيلة الفطور القلوسية من رتبة الدعاميات . أجناسها وأنواعها مديدة يكثر وجودها في المناطق الحارة والاعتدالية. أعرف أجناسها وأشهرها الفلوس ثم الديكوفوره الذي يركب الصان في المواقع الرطبة فيقحم ويؤذنه .



فلور



فلوس



فليرة



فليرة

Tribolites (F).

٢١٠٧٣ - فليبيات

نقطة من القشريات تسمى ثلاثيات الفلين ، أطلها .

Navicella (S).

٢١٠٧٤ - فليكة

Navicella (F). Navicella (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مدمجات الأبراج
وفصيلة المزيقيات . أنواعها المرونة قليلة البدن مواطنها
أنهر المنة || أصدافها كبيرة اللد ، شبه بيضية الشوزن ،
فصيلة التجويف المقعر ، جوفية اللون أو بيضاء ||
أجسامها كبيرة . رؤوسها حلالية الشكل ، ثنائية القواس
للحيزة المستطيلة الجاهزة || جميع أنواعها مأكولة .

Pébrine, Gactine, Echse (F).

٢١٠٧٥ - فليفل

القليل أو مرض الطفيل أو المرض الطفيل أو ندوة دودة
الحرير . مرض طفيلي يصيب دود القز فيفقدونها شهوة
الأكل ويسقطون نحو الموت || مظهره الخارجي نقط سود
مبهمة تركب الجسم من الرأس إلى الخرج || يمتد من
الأمراض المميتة إذا حل بالندى في طورها الثاني . أما إذا
اقتصر على الطور الرابع فأسببه تكون قلبية الأذى وغير
ميتة .

Phyllum (S).

٢١٠٧٦ - فليكة

Phyllite (F). Phyllium (E).

جنس شجرات من مستحبات الأجنة وفصيلة الفسيات .
أنواعها المرونة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد
الحارة والاستوائية من العالم القديم || أجسامها مستطيلة
القد طول من ٥ إلى ١٠ سم . بطونها مبطنة بيضية الشوزن .
رؤوسها مكورة صلبة . قرونها الاستحسان دقيقة
وصغيرة . أجسامها كثيرة الأعصاب الدقيقة ، قصيرة ،
لا تلتصق كمثل البصل . قرونها مستطيلة الطول ، مستعرضة
الانحناء والسيفان فيبدو كأنها جمنة || وهي من الحشرات
التي تهاجم البنية التي تعيش فيها . يرقاتها برتقالية اللون
أو حمراء .

Crinière du lion (F).

٢١٠٧٧ - فليكة

Manc de lion (E).

شعر زهرة الأسد .

Liège, Suber (F).

٢١٠٧٨ - فليفل ، فليفل

Cork, Suber (E).

مادة دسنة ، مطاطة ، خفيفة ، تسمى من لحاء البش اي سديان
ولا تفسدها الرطوبة ، تقطع من لحاء البش اي سديان
القليل .

Bouchon (F). Bush (E).

٢١٠٧٩ - فليكة

هي السادة ، أطلها .

٢١٠٨٠ - فليبي ، بهني

Liègeux, Subéreux (F). Like cork, Suberous (E).

نمت تمرني يطلق على التسج النباتية الفليبية التركيب
أو الشبيهة بالفلين

Phellogène (F) Phellogenetic (E).

٢١٠٨١ - فليبي

نمت تمرني توصف به النباتات التي تلج الفلين .

Subérine (F). Suberin (E).

٢١٠٨٢ - فليبين

المادة البصورية التي يتركب منها الفلين .

Tuff (F). Tuff, Tufa (E).

٢١٠٧٤ - فليس

اسم نبي يطلق على تكوينين مختلفين من طبقات الأرض .
التكوين الرسوبي والتكوين التوفاني .

Tuffeau, Tufeau (F).

٢١٠٧٥ - فليكة

Micaeous chalk (E).

صفائح متفردة بلاتيزية التركيب ميكية تكون مهلة
الحفر لينة المكسر عند استخراجها من الأرض ثم تتصلب
وربما رويداً مع تعرضها للهواء .

Géll (F).

٢١٠٦٦ - فليفل ، صدع

Frost-cleft (E).

نمت حال توصف به الاشياء المفلوكة أو القابلة للانصدام
والقلع من تأثير فصل الصقيع فيها .

Capsicum (S).

٢١٠٦٧ - فليكة

Piment (F). Pepper (E).

جنس نباتات زراعية حولية ومعمرة من فصيلة
الباذنجانيات . منها المناطق الحارة والمعتدلة . أنواعها
قليلة ، فرووها كثيرة البدن . أوراقها بسيطة متعاقبة
أزهارها غشوية بيضاء اللون . ثمارها قرون خضلة الاشكال
والاجسام والالوان . زهورها مستندرة ، مبطنة ، رقيقة ،
منقبضة المنش . || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢١٠٦٨ - فليكة زراعية ، فليفل ، زبي

Fennel Annuum (S).

Piment annuel, Poivre long, P. de Guinée, Poivron,
Corail des jardins, Capsique (F). Capsicum, Red pepper (E). Echo Belaboare (D). Paparone, Pimento (J).
نوع من الفليكة فرووها وأصنافها كثيرة العدد شائعة
الزراعة والاستعمال . جميعها نباتات حولية ومعمرة تزهر
لأزهارها المأكولة الحارة أو غير الحارة .

٢١٠٦٩ - فليكة ليفية

Capsicum frutescens (S). Piment frutescent (F).

نوع من الفليكة الخشوية التي تعيش من ٤ إلى ٦ سنوات.
ساقها فرواه طول من ٩٠ إلى ١٨٠ سم . فرووها دقيقة ،
منسقة مرتفعة الأطراف . أوراقها بيضية الشكل مدببة
الزواج الاخير . نصلها مائل الصفحة الخضراء يطول من
٧ إلى ١٠ سم . ويؤرض من ٥ إلى ٨ سم || ثمارها
بيضية الشكل ، كبيرة اللد تبدو غفراء اللون ثم تتحول
الى الحمرة وتنتشر عليها .

٢١٠٧٠ - فليفل

Schistocarpe (F).

Schistocarpos (E).

نمت تمرني يطلق على كل نبات تتفاد ثماره عند الامداد .

Lobule (F).

٢١٠٧١ - فليكة ، فليبي

Lobule, Lobulus (E).

الفغلة الصغيرة القدر .

Otidæ onetia (S).

٢١٠٧٢ - فليكة

Otidæ oreille de lièvre (F).

فطر من فصيلة المشاريات وروية الزقيات . يكثر وجوده
في الحراج الطيلة اغصانها حراج السديان . يعيش مجتمعات
على الدبال والمواد النباتية المنسقة . مجتمعة تد من زوايج
الى حصة ازواج . سيقانها جيدة . نكاحها مستطيلة الشكل
مفلقة ، جوفاء ، تبدو كأذان القرواع ، لونها الى الصغار
الذهبي ، قرواعها بيض الداغل || تنصير من الثنطور
الكعبة الصنف اللامأكولة .



فليكة زراعية (١)



فليكة زراعية (٢)



فليكة ليفية



فليكة



فليكة



فليكة



فليوت أخضر



فليوت الشاحر



فليوت مغلب



فليوت محرف



فليوت مرن



فليوت بخر



فناء

Flour

٢١٠٩٠ - فليور

هو القلندر أو اللاسف .

Fomalius (F).

٢١٠٩١ - فَمُ الحُوت

Fomalius (E).

فم الحوت نجم نير من كوكبة الحوت الجنوبي . مركزه على النجم . يبعد عن الأرض نحو ٢٤ سنة ضوئية .

Pylorus (F).

٢١٠٩٢ - فَمُ المَعِدَة ، بَوَّاب

Pylorus (E).

Stomatopoda (S).

٢١٠٩٣ - فُصَيَات الأَرَجُل

Stomatopodes (F).

رَبْية حيوانات من القشريات .

Cour de ferme (F).

٢١٠٩٤ - فَنَكَة

Farm-yard (E).

مساحة تحيط بِمَا أبْدية المستغل .

Branchus (F).

٢١٠٩٥ - فَنَاءَة

Forked, Ramifying (E).

فناء وفنائه : شجرة كثيرة الأفران واسعة النمل .

٢١٠٩٦ - فَنَاءَة

بقرة القطيع لا عمل ولا دَرَج فنوات .

٢١٠٩٧ - فَنَاءَة * ، عَنَب العَنَب

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Paris incompleta (S).

Pholiota (S).

٢١٠٨٣ - فُليُوت *

Pholiota (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقنيات . أنواعها المعروفة عديدة أصالتها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر ويوجد في الغابات والمساب والمجال . معظمها يعيش على المواد النباتية المتحللة . تتميز بيوتها الأصفر اللون وبوفرة عدد مجموعاتها || أحرف أنواعه وأهمها النسبة التالية .

٢١٠٨٤ - فُليُوت أسمر *

Pholiota picra (S).

Pholiota brune (F). نوع من الفليوت . يعيش على أرويات المستور . ساه جزلة ، مبطلة ، عوياء ، صلبة ، شبه غضروفية . نكهته قبيحة الشكل ، قطرها نحو ٣ سم . لونها إلى الصفرة الصفراء المالح . يفرغ منها رائحة لا مألوفة || لحيته حاضرة العلم ، كافة الصفات ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٥ - فُليُوت المشاحر *

Pholiota carbonaria (S).

Pholiota des charbonnières (F). نوع من الفليوت . يتكاثر في مواقع المشاحر . مجموعته وثرية العدد الذي يتألف من ٣ أو ٥ أو ٧ وحدات ، ساه دقيقة ، صفراء اللون . نكهته لزجة ، صابغة الشكل ، قطرها نحو ٢ سم . لونها إلى الصفرة الصفراء || لحيته كافة الصفات ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٦ - فُليُوت مُنَكَب *

Pholiota mutabilis (S).

Pholiota changante (F). نوع من الفليوت . يعيش على أرويات المتاحر العرية . مجموعته وثرية العدد تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وحدات ، ساه دقيقة ، عوياء ، مبطلة حتى الزوايا الثالث . نكهته صابغة ، عادمة الرائحة ، قطرها نحو ٢ سم . لونها إلى الصفرة البرتقالية وفي مستحبة الرائحة عند المس || لحيته جيدة الصفات ، مأكلية .

٢١٠٨٧ - فُليُوت مُعَرَّشَف *

Pholiota squarrosa (S).

Pholiota écaillée (F). نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الخشب والستبان . ساه مبطلة محرفة الأطوار حتى أوائل الزوايا الرابع . نكهته مغلية الشكل ، صفراء اللون ، مدروسة والخراف السمر . قطرها نحو ٣ سم . أحرفها إلى الصفراء الأخضر المالح || لحيته كافة الصفات ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٨ - فُليُوت مَرْن *

Pholiota lenta (S).

Pholiota flexible (F). نوع من الفليوت . يعيش على البقال في المواقع الظليلة . ساه معتدلة الجرم والارتفاع ، خيزاء اللون يميلوا زغب أصفر . نكهته صابغة الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها إلى البنية الصفراء . أحرفها إلى الصفراء الباهت || لحيته جيدة الصفات ، مأكلية .

٢١٠٨٩ - فُليُوت خَضر *

Pholiota flammula (S).

Pholiota éclatante (F). نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الصنوبريات . مجموعته وثرية العدد . ساه معتدلة الجرم ، محرفة حتى أواسط الزوايا الرابع . نكهته صابغة الشكل ، صفراء اللون ، خفية المالح ، قطرها نحو ٢ سم . رائحتها رائحة الفت || لحيته كافة الصفات ، غير مرغوب فيها .

كيرتان ، مستديرتان ، حولتا الارزكاز . زعنفتها الظهريّة الاولى ثلاثية الشعب المستطيلة المنحصر الذرية || لحبها حصوص الصف ، مأكلي ، يبيض فصول السنة ، سام في فصل الربيع .

٢١١١٥ - فنكريات

Balisticidae (S).
Balisticidae (F). **Balisticidae (E).**
فضيلة اسماء بحرية من ملحوبات الفنك شاككات الزمانف . اجناسها وانواعها عديدة اطالها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سرسها حشاف المهادج . قوتها الرخويات ونواحي الرجان والمرجان || اجناسها شبه يضيي الشكل ، مبطلة الجرم ، مائدة الاعتاق ، طولها من ٤٠ الى ١٠٠ سم . قشورها مراكب القلوس الحرفية . رؤوسها مسلحة بزنانف مهازية مدنية حادة تمسخر وتقتصب عند الحاجة . استناتها صلبة قوية تمكّنها من سحق صدف الحمار والرخويات ومن هرس نواحي الرجان والمرجان || ألوانها ملونة فيها الأزرق والاصفر والبنيجي والاصفر والبرتقالي والاحمر القويدي والبيي والراسعي والاسود || لحبها جسيمة الصف ، مأكولة في بعض فصول السنة ، سامة في فصل الربيع من اواخر آذار الى اواخر حزيران || أشهر اجناسها الفنكسر أو صر الماء .

٢١١١٦ - فنكس

Phoenix (S).
Phénix (F). **Phoenix (E).**
طائر عراني ورد ذكره في اساطير الاولين . اما اليوم فلام يطلق على ديك من الفروسيات هو الفيك الياباني القويدي التيكس الزواحي الاوان .

٢١١١٧ - فنكل

Funicula (F). **Funicle (E).**
هو من الزباني سوقيها التنيق الذي يحمل في نهايته الصق الصرمان .

٢١١١٨ - فنكلي

Funifère (F). **Funifer (E).**
لمت تعريفي يطلق في علم الاحياء على كل عضو مجهز بزوائله عجيلية الشكل دقيقة شبيهة بالفنكل .

٢١١١٩ - فنك

Fennec (S).
Fennec, Fenec (F). **Fennec (E).**
نوع من الثعالب صغير الجف ، لاهم الور ، وذيق القلوم ، يتميز بكبر اذنيه وبامتداده وشالته ذليه || قوته الصانير والورويات والحشرات والزاسافات واليرابع ... مسرعه من القروب الى الشرق ، ويبر نفق مستطيل ويحد المدخل . اتناه تقبع من ٣ الى ٤ جراه || موطنه فسح الاربياء وشمل القارة الافريقية مع الجزيرة العربية وجزائرها || ضرابه المرفوعة اربعة :

٢١١٢٠ - فنك اعهر

Fennecus pallipes (S).
Fennec pala (F).
غرب من الفنك موطنه افريقية الشرقية والغربية وبلاد التوبه وكردفان . ثوبه دلي اللون ، ظهره احمر المالح ، ذليه اسود الطرف . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . منه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .

٢١١٢١ - فنك البوكادي

Fennecus famelicus (S).
Fennec sabora, Sabora (F). **Sabora fennec (E).**
ضرب من الفنك موطنه التوبه وصاري الجزائر وتونس بصورية والصوم والافغان . ثوبه بلون الزيل الاصفر . ظهره

٢١١٢٠ - فنكاف

Facture (F). **Invoice (E).**
هي الفاتورة أي قائمة الحساب .

٢١١٢١ - فنكده

Vanda (S).
Vanda (F). **Vanda (E).**
جنس نباتات اسمية من السطحيات . انواعها المرفوعة نحو ٣٥ اصلها بلاد الحارة . جميعها يرية وتزيينية . ازهارها كبيرة متباينة الاشكال الجميلة . ألوانها زاهرة زلمية || تزورع في المراكب : تحشى الصنح || أشهر انواعها واعها زرواة الثلاثة التالية :

٢١١٢٢ - فنكده البتغال

Vanda courtes (S).
نوع من الفنكده . مهدا البتغال وقد انتشرت زراعتها في معظم اقطار المسكونة || ازهارها كبيرة جميلة زرواء اللون .

٢١١٢٣ - فنكده التيمور

Vanda insignis (S).
نوع من الفنكده . مهدا بلاد التيمور وقد انتشرت زراعتها في كل مكان || ازهارها متصلة الفنكده ، سطيحة اللون مبيضة بالارزواني .

٢١١٢٤ - فنكده الجزر

Vanda Indeni (S).
نوع من الفنكده . مهدا جزر الزايج ، ازهارها عتقوية التجميع لونا الى الصلار الكبريتي اللامع الجميل .

٢١١٢٥ - فنكده

Ramaria botrytis (S).
Ramaria chou-fleur (F).
فطر من فصيلة الذبويات . اطالها غابات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يمش على المواد النباتية المتسلة . ساقه شديدة القصر متفجرة مع التكملة . نكته تحت لحمي تتكون قشبه فيه مجموعات من المراجين الصغيرة تبدو كزهره الانابيب ظهرا يروج من ١٠ الى ٢٠ سم . لونها الى البيرة الصفراء المالح ، مارجنها الى الصفرة السوداء السقاء || لحبها جميلة الصف ، لذيذة الطعم ، مرغوب فيها .

٢١١٢٦ - فنكده الزهر

Raniflore (F).
لمت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره فنية الانتشار .

٢١١٢٧ - فنطاسيات

Placrythians (F).
هي الحيوانات مجسمة قريه العالم الجديد .

٢١١٢٨ - فنطيسه

Groin (F). **Snout (E).**
هي القروطة والقروطيه أي علم الحزير .

٢١١٢٩ - فنتر المتوسط

Balites capricus (S). **Baliste capricus (F).**
Trigger-fish, Balistes (E).
نوع من الفنك . سمكة بحرية يهوض من فصيلة الفنكيات وربة ملحوبات الفنك شاككات الزمانف . اطالها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . سرسها حشاف المهادج . قوتها القشريات والرخويات ونواحي الرجان والمرجان || جسمها يضيي الشكل ، مبط الجرم ، عديم الفتق ، يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . سرائها جامدة حرة . ثوبها متداخل الالوان يغلب فيه البنيجي المنطاف المايات يملو بتيج ازرقة واجر وقصير اصفر وبرتقالي وكسني ويظوي || رأسها خلروفي الثوزن صغير النظم والقلم والشلق . استناتها قوية ، حادة ، ثنائية الصف . عيناها



فنكده



فنكده



فنر المتوسط

فَنَكِي الْوَن طُولُ مِنْ ١٠ إِلَى ٢٥ س. وَيَمْرُ مِنْ ٨ إِلَى ١٥ س. || شَرَاغِهَا الْزَهْرِي طُولُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٥ س. عَتَقْدِه يَدُ مِنْ ٩ إِلَى ١٥ زَهْرَه طُولُ نَحْو ٤ س. لَوْنُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْتَاصِعُ ، عَرَفُهَا فَوَاحِ الرَّائِحَةُ الْجَمِيلَةُ . اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ مَرُوزِ إِلَى اَيُولِ .



فَنَك زَرْدَه

٢١١٧٩ - **فَنَكْسَ ، هُفْنَه ، هُفْنِين**
Ramilla (F). Twig (E).
هو مَا اسْتَقَمَّ مِنْ قَنَدِيانِ الْاَصْخَافِ بَلَغَ الْحُلُوفُ أَوْ لَمْ يَلْه .

٢١١٨٠ - **فَنَنْغُوس**
Funling (S). Funingo (F).
طَائِرٌ وَحِيدُ الْجِنْسِ وَلَوْنُو مِنْ الْبَاهِمْ وَفَصِيلَةُ الْحَايَاتِ . مَوْطَنُهُ اَفْرِيقِيَّةُ الشَّرْقِيَّةُ وَبِزِيرَةِ مَدَسْكَر . مَلِجَتُهُ الْخِيَالِي جَامِي . سَرِيهْ يَدُ بَعْضِ الْمَنَاتِ || جَسْمُهُ مَتَوَسِّطُ الْقَدِّ بِحُجْمِ الْيَلَمَةِ . رَأْسُهُ صَغِيرٌ . كَشَتُهُ قَصِيرَةٌ . جَنَاحُهُ ذَاتُ الْطَرَفِ . ذَنَبُهُ مَسْتَدَلُّ الطُّولِ ، مَقْطُوعٌ . نَوْبُهُ اَزْرَقٌ وَاحِدٌ مَتَاوَلَتْ الْمَاجَاتِ || قُوَّتُهُ الْبَلَدُورُ وَالْجُورِبُ يَحْبِرُ الْبِلَادَ فِي طَلَبِهَا || الْاَثَرُ تَدْنُّنُ عَشَا فِي الْاَجْمَاعِ الْخَفْلَةُ حُسْنُهَا يَشْتَانُ ، لَتَنْتَابُ عَلِ الرَّغْمِ عَمِ الْمَذْكَرِ .

٢١١٨١ - **فَنُودُ لَمَرِيَّة**
Branches fruitières (F).
Fruit-boughs (E).
هِيَ الْاَصْخَافُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الْفَرَسَ بَدُونِ سَيْطٍ .



فَنَك لَفْطِي

٢١١٨٢ - **فَنُونِيْس**
Aphanomyces (S).
جَنَسٌ طُفُورٌ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْفِيضِيَّاتِ اَنْزِلَاهُ عَدِيدَةٌ تَنْطَلِفُ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ وَالْشَّجَرِهَا وَاعْرَافُهَا مَا يَنْبَغُ .

٢١١٨٣ - **فَنُونِيْس لَائِس**
Aphanomyces Levis, A. cochlioides (S).
نَظَرٌ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْفَنُونِيْسِ يَسَبِّغُ بِزُورِ الشَّوْطَرِ عِنْدَ اَتْنَافِهَا يَفْقِصُ حَلِيهَا رَإْذَا اَصَابَهَا بِدُ الْاِثْنَانِ فِي زَيْنِ الْقَصْرِحِ وَالْاَدْبَاسِ اَوْفَقَ جَا الْاَفْرَادِ الْجَمِيَّةِ . اَمَّا اِذَا اَصَابَ الْاَشْتِوَلُ بِدُ خَبِيْهَا فَهَآ تَقْوِيْمُهُ وَلَكِنْهَا تَكْتَأِي وَيَنْفَلِسُ اَتْنَابِهَا || مَظْهَرُهُ عَلِ الْاَوْرَاقِ اَخْضَرَارٌ زَيْتَوِي الْمَزَاجِ يَمْتَدُّ ذَيْلُ الْتَنْصَلِ فِي الْبَهَارِ وَتَصْلِيهِ فِي الْبَلْبِ . وَهُوَ فِي الْجَلُورِ عِنْدَ قَطْعِهَا عُرُوقٌ سَوْدٌ مَجْمُوعَةٌ || يَكْتَنِجُ بَايْجَنْتَابِ الزَّرَاةِ فِي الْمَوَاقِعِ الْمُرِيْبَةِ وَيَطْوِيهِ الْبَلْبَارُ وَالرَّابِيَةُ .

٢١١٨٤ - **فَنُونِيْس عَتَقْدُورِي**
Aphanomyces Magnuili (S).
نوعٌ مِنَ الْفَنُونِيْسِ يَنْتَلِفُ عَلَى السَّلَاطِينِ الْبَهْرِيَةِ فَيُؤْخِذُهَا وَيَسَبِّغُ هَلَاكَهَا .



فَنُونِيْس لَائِس

٢١١٨٥ - **فَنِيْع**
Flacherie (F). Flaccidity (E).
وَيْدِيٌّ « فَلَاحِرِي » مَرَضٌ مِيْكُرُوِي فَتَلْكَ يَسَبِّبُ دَوْدَ الْقَفْرِ فِي جِهَازِهَا الْخُصْبِيِّ عِنْدَ اَسْلَافِهَا الرَّابِعِ .

٢١١٨٦ - **فَنِيْعِيْدِيْم**
Vanidium (S). Vénidie (F).
جَنَسٌ ثَلَاثَاتُ حَشِيَّةٌ حَوْلِيَّةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَرْكَبَاتِ . اَنْوَالُهُ نَحْو ٢٠ مَحْطُهَا بَرِيٌّ وَيَضِيهَا تَرَبِيصِي . اَوْرَاقُهُ مَتَنَاثِيَةٌ وَبَايَةِ الشَّكْلِ ، مَلْتَوِيَةٌ ؛ نَصْلُهَا كَبِيرٌ اَقَدُّ خَلِي الْبَشَرَةِ . وَرَوَيْتَاهُ الزَّهْرِيَّةُ كَثِيْفَةٌ تَنْجَمُ طَعْرُهَا نَحْو ٦ س. لَسِيْنَاهَا مَسْنَةُ الطَّرْفِ ، بِرَنْقَالَةِ الْوَن . طَلِبَاهَا مَقَرُّ الشَّكْلِ قَنَائِيْتُهُ مَتَنَاثِيَةٌ مَرْمُوسَةٌ ، كَلَالِيَّةٌ أَوْ رُبَاعِيَّةٌ الصَّفُوفُ . اَشْهَرُ اَنْوَالُهُ مَا يَلِي .

إِلَى الْحَمْرَةِ ، يَلْتَمِ إِلَى الْبَيَاضِ . جَسْمُهُ طُولُ نَحْو ٤٨ س. مِنْهُ الذَّنْبُ الَّذِي يَبْلُغُ ٢٢ س.

٢١١٨٧ - **فَنَنْكُ زَرْدَه * زَرْدَه**

Fennecus zarda (S). Fennec zarda, Renard du Sahara (F). Zarda fennec, True fennec, Sahara fox, Fennec of bruce (E).

شَرِبَ مِنَ الْفَنَنْكِ مَوْطَنُهُ الصَّحَارِي الْاَفْرِيقِيَّةُ وَوَادِي الْبَتِلِ وَالنُّوبَةِ وَسَنَارُ وَفَزَّانُ وَالْجَزِيرَةُ حَتَّى سِينَاءَ وَسُورِيَه . وَهُوَ اَصْفَرُ شَرِبُوبِ الْفَنَنْكِ وَاحْسِنُهَا شَكْلُهُ وَاقْرَبُهَا لَقَّة . ثَوْبُهُ بَلُونُ الْبَالِ يَحِيْقُ مَعَ اقْرَابِهِ مِنْ بُنْجِ الْفَهْرِ . جَسْمُهُ طُولُ نَحْو ٤٠ س. مِنْهُ الذَّنْبُ الَّذِي يَبْلُغُ ١٨ س.

٢١١٨٨ - **فَنَنْكُ لَفْطِي * اَصَر**

Fennecus chama (S). Fennec chama, Chama, Asse (F). Caama, Asse (E).
شَرِبَ مِنَ الْفَنَنْكِ مَوْطَنُهُ شَفَاثُ نَهْرِ الْاَوْرَاقِ مِنْ اَفْرِيقِيَّةِ الْاَجْنَرِيَّةِ . جَسْمُهُ طُولُ نَحْو ٦٣ س. مِنْهُ الذَّنْبُ الَّذِي يَبْلُغُ ٣٠ س. ثَوْبُهُ إِلَى الصَّبَةِ الْبَرِيَّةِ الْمَوَاجِ . طَعْرُهُ ضَمِي الْوَن . طَرَفُ خَطْمِهِ ذَنْبُهُ إِلَى السَّرَةِ السَّوْدَاءِ .

٢١١٨٩ - **فَنْكَه * هُفْنَه ، زَنْبَقِي الْفَهْكَر**

Funkia, Hosta (S). Funkie (F). Plantain lily, Japanese day lily (E). Herzillie, Hosta, Tagillie (D). Funkins, Hosta, Giglio plantaggine (I).

جَنَسٌ ثَلَاثَاتُ حَشِيَّةٌ جَمْلُورِيَّةٌ مَعْمَرَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ اَزْنَبِيَّاتِ . اَنْوَالُهُ قَلِيلَةٌ هَذَا الصَّيْنِ وَالْيَابَانَ . سَوْبُهَا شَرَاغِيَّةٌ اَلْتَنْشَابِ اَزْهَارُهَا عَنُقُوْدِيَّةُ التَّجَمُّعِ . اَوْرَاقُهَا مَسْنَقَةٌ قَسْبِيَّةٌ قَاعَلِيَّةٌ اَحْرَفٌ وَأَشْهَرُ اَنْوَالُهُ اَلزَّيْنَبِيَّةُ مَا يَلِي .

٢١١٩٥ - **فَنْكَه سَنَابِيَّة**

Funkia lancifolia, Hosta lancifolia (S). Funkie lancifolia (F).

نوعٌ مِنَ الْفَنَنْكَةِ اَوْرَاقُهَا مَتَنَاثِيَةُ التَّنَصُّلِ حِمْلَةُ اَخْضَارٍ طَوِيلُ الْزَهْرِي يَرْفَعُ مِنْ ٢٠ إِلَى ٢٥ س. عَتَقْدُهُ يَدُ مِنْ ٦ إِلَى ١٠ اَزْهَارُهَا طَوِيلُ نَحْو ٣ س. لَوْنُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْتَاصِعُ . اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ مَرُوزِ إِلَى آبِ .

٢١١٩٦ - **فَنْكَه سَيْبُولَه**

Funkia Sieboldiana, Hosta Sieboldiana (S). Funkie Siebold (F).

نوعٌ مِنَ الْفَنَنْكَةِ اَوْرَاقُهَا بَيْضِيَّةُ الشَّكْلِ ، نَصْلُهَا عَدِيدُ الْعُرُوقِ طُولُ مِنْ ٢٥ إِلَى ٣٠ س. وَيَمْرُ مِنْ ١٧ إِلَى ٢٣ اَلْوَلُ الْزَهْرِي يَرْفَعُ مِنَ ٢٠ إِلَى ٢٥ س. عَتَقْدُهُ يَدُ مِنْ ٦ إِلَى ٣٠ س. عَتَقْدُهُ يَدُ مِنْ ٥ إِلَى ٨ اَزْهَارُهَا طَوِيلُ مِنْ ٥ إِلَى ٧ س. لَوْنُهَا إِلَى الزَّرَقَةِ الْبَغْسَمِيَّةِ الزَّارِيَّةِ . اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ سَازِرَانَ إِلَى آبِ .

٢١١٩٧ - **فَنْكَه قَلْبِيَّة**

Funkia ovata, Hosta cerulea (S). Funkie bleue (F).
نوعٌ مِنَ الْفَنَنْكَةِ اَوْرَاقُهَا قَلْبِيَّةُ الشَّكْلِ ، نَصْلُهَا مَالِسُ الْبَشَرَةِ ، بَارِزُ الْعُرُوقِ ، حِمْلُ اَخْضَارٍ تَعْلُوهُ رَقَشَةٌ بَيْضَاءُ || شَرَاغِهَا الْزَهْرِي يَطْلُو مِنْ ٣٠ إِلَى ٥٠ س. عَتَقْدُهُ يَدُ مِنْ ٦ إِلَى ٩ اَزْهَارُهَا طَوِيلُ مِنْ ٣ إِلَى ٥ س. لَوْنُهَا إِلَى الزَّرَقَةِ الْجَمِيلَةِ . اَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ اَبَارِ إِلَى سَازِرَانَ .

٢١١٩٨ - **فَنْكَه يَابَانِيَّة**

Funkia subcordata, Hosta japonica (S). Funkie du Japon (F).

نوعٌ مِنَ الْفَنَنْكَةِ اَوْرَاقُهَا بَيْضِيَّةُ الشَّكْلِ ، نَصْلُهَا مَالِسُ الْبَشَرَةِ

٢١١٣٧ - قيدوم آذربايجاني الزهره

Vanidium calendulaceum (S). *Vénidie à fleurs de souci* (F).

عشبة حولية سرقية زينة زغبية الساق والفروع تملو نحو ٣٠ سم. فروصها انيقة الاكتشاف. اوراقها مائلة الصفرة العليا الخضراء اللون. اما السفلى زغبية خضرة. ورياسها الزهرية تشبه ورياسات الاذريون. طباها حشلي اللون، لسنتها برتقالية || انزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢١١٣٨ - قيدوم مهدب

Vanidium vyleyi (S). *Vénidie hirsute* (F).

عشبة حولية زينة سرقية زغبية الساق والفروع المتضبة. تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها غبراء اللون متاكبة النصل حل صفحتي || ورياسها الزهرية متضبة اللد، طباها جلوي اللون، لسنتها حشلي لزام الال، ملحية الكاني، والفاث، برتقالية الزام الاخضر || انزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢١١٣٩ - قيقق

القيقق نجم ثير من كوكبة برج الثور.

٢١١٤٠ - قيقق

الفصل الكرم من الابل الذي لا يركب ولا يان.

٢١١٤١ - قيققة

هي القيقلة، اطباها.

Vanilla (F).

Anémophilie (F).

Anemophily, Anemogamy (E).

التهارة التأثير الطبيعي الذي كونه الرياح يتغلها الريح اي جذرات الطلع من الاسدية الذكرية الى المقات الانثوية.

٢١١٤٢ - قهارة

Cynallurus (S). *Guépard* (F).

Cheetah, Chita (E). *Gepard, Jagdeoparden* (D).

الفهد واحد الفهود. جلس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات. انواعه المروفة ثلاثة شكلها بين النمر والكلب: جسم كلب يحمل رأس سنور. مزاجه كزاج النمر وفي طبعه مشابه لطبع الكلب. ومن خلقه انه يأنس لمن يحسن اليه ويكابر الفهود اقبل قتاديب من صفارها. يقال ان اول من اصطاد به كليب بن وائل واول من خله حل اخيل يزيد بن معاوية بن ابي سفيان || ويضرب بالفهد للث في كثرة النوم. وهو احيى اجبة، وشيق القوام، مستطيل الذنب، جسمه يطول من ١٠٠ الى ١٣٦ سم. ويطول من ٦٠ الى ٧٥ سم. اما طول ذنبه فيراوح بين ٥٦ و ٧٦ سم. وهو مرقط الثوب اما رقبته متفرقة لا يتجمع كالحلق كما في النمر وليس لبرائته اكام من بران السنوريات. قوته ما استطاع اليه سبيلا كما الظباء والمها والذئب والمزعى والايابل ويخطف الفيريات. الاثن تقص من ٣ الى ٥ جراء تمطا وترجها بمنزل من الذكر || اما انواعه الثلاثة فهي:

Cynallurus guttatus (S). *قهد ارقط* *

Guépard moucheté (F). *Chita* (E). *Fahhad* (D).

نوع من القهد اصطناعه نسيمة الاوياء تشل الهند والافان وبران وحوش بحر تزون وبلاد البرية وافريقية الشرقية والهندية مع اصغرها الكبرى والسنان || جسمه يطول



قهد ارقط



قهد ارقط



قهد اور



قهدة



قهد سانة

نحو ١٣٥ سم. ويطول ٧٥، اما طول ذنبه فلا يقل عن ٧٥ سم. وهو اجلس واكمل شكله من الاعرف. ثوبه كثيف الور القصير. كبير الرقعة السوداء.

Cynallurus jubatus (S). *قهد اعرف* *

Guépard à crinière (F). *Hunting leopard, Chatah* (E). *Tschitah, Gemähne gepard* (D).

نوع من القهد اصطناعه نسيمة الاوياء تمتد من الهند الى بلاد العرب وافريقية الشرقية والبرية والهندية || جسمه يطول نحو ١٣٠ سم. ويطول ٧٥ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٧٠ وهو رشيق القوام صغير الرأس مستدير. متوسط الاذن اعرف العنق. ثوبه قصير الور، صغير الرقعة.

Cynallurus lanus (S). *قهد اوفر* *

Guépard lanéux (F).

نوع من القهد اصطناعه تشل بلاد افريقية الجنوبية. جسمه يطول نحو ١٠٥ سم. ويطول ٦٠ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٥٥ سم || ثوبه كثيف الور المستطيل، رصقته الى الجوزة السوداء.

Barbus perince (S). *قهدكة*

سمكة نهريه من الشبوطيات تعرف باسم بني دجلة. يكثر وجودها في دجلة والفرات.

Phytonymie (F).

Phytonymy (E).

الفهرسة نباتية مجموعة الانفاث والمصلطحات الخاصة المألدة الى النبات.

Atlas, Vertèbre atlas (F).

the first cervical vertebra (E).

التهقة هي اول فقرة من العنق تلي الرأس. وهي موصل العنق بالرأس او مركب الرأس في العنق.

٢١١٥٠ - قهكة *، قهكة، قهكة

Promecoccephalus (S). *Tétrodon* (F). *Globe fish, Puffer* (E).

جلس اسماك بحرية من فصيلة التهقيات. انواعها عديدة بعضها من اسماك بحار البلاد الحارة. تتميز بقرابة اجسامها المتضخمة التي تبهر كانهما خالية من الرأس.

٢١١٥١ - قهكة سامة

Canthigaster valentini (S). *Tétrodon venimeux* (F).

Venomous Globe-fish (E).

نوع من التهقة. سمكة بحرية يمرض اصطناعها بعض مناطق البحر الاحمر والمحيط الهندي. سطحها الحياتي جماعي، اسرارها كثيرة البدن || جسمها يطول من ٢٤ الى ٣٠ سم. رأسها يبرسي الشكل. صيادها كبرتان، جاحطتان، رطبا الاركاناز. ثوبها الى الطحلة الغضبية المرقطة بالبي ويملوها اربع جذات سود متفرقة، الاول عند عتق الرأس والاخرة عند قاعدة الزعنفة الذيلية || لها سام لا يترك.

Tetrodonidae (S).

Tétrodonotidae (F). *Tetrodonotidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة مسليات الفكوكه حريات الانسان. اجسامها وانواعها كثيرة البدن. اصطناعها بحار البلاد الحارة. حيدنها من الاسماك المتضخمة البرية الاشكال والانواع.

Arnébie (F).

٢١١٥٣ - قهكة

هي الاطن، اطبا.



فوشيا



فوشيا



فوشيا



فوشيا

٢١١٦٥ - فوشيا، فوشيا (F.) Photomètre (F.)

جهاز قياس الضوء.

٢١١٦٦ - فوشيا، فوشيا (F.) Photométrie (F.)

علم يقيس فيزياء الاضوية وشدها ويصلها.

٢١١٦٧ - فوتون، فوتون (F.) Photon (F.)

الفوتون أو الفوتون حزمة من الطاقة الفوتونية في نظرية الكهليتي.

٢١١٦٨ - فوشيا، فوشيا (F.) Photinia (F.)

جنس شجيرات من فصيلة الوردية. انواعها قليلة، أكثرها بري ويغطيها زراعي زينة. || بعضها حالة منتجة.

انواعها مختلفة الاوان الالوان يكثر فيها الازرق.

٢١١٦٩ - فوشيا، فوشيا (F.) Tempe (F.)

هو في الحضارة الجزء الجنوبي الغربي من درع الراس المعروف باليمن. وما فيضان والجبل اقواد.

٢١١٧٠ - فوشيا، فوشيا (F.) Fotin (F.)

هو الصمغ الشائع، اطليه.

٢١١٧١ - فوشيا، فوشيا (F.) Photodius (F.)

جنس طير من الرواس الكواس وفصيلة البويدي.

انواعه المعروفة قليلة العدد اطليا تمتد من الافان الى الهند وسواها || اجسامها صغيرة تطول من ٣٣ الى ٣٧ سم.

وزنها مذكورة. اجسامها لاهة. اوكيا ثنائية اللون.

تتميز بلذات ريشها الشديد النعومة || ملجبات الحياتي.

جامعي. تألف القابات والحراج. قوتها الفئران والزمامات.

والصفاد وكل ما ليس لها.

٢١١٧٢ - فوشيا، فوشيا (F.) Effervescence (F.)

التيان الذي يحصل منه انطلاق الغاز وانفلاصه من السائل الذي كان متحدا به.

٢١١٧٣ - فوشيا، فوشيا (F.) Folsonnement (F.)

ازدياد حجم الكلس والارضية الكلسية بتأثير الماء.

٢١١٧٤ - فوشيا، فوشيا (F.) Fushia (F.)

هو الفوشيا، راجعه.

٢١١٧٥ - فوشيا، فوشيا (F.) Formol (F.)

مطهر قوي يستخدم في تطهير الاماكن الموبوءة وبسكاسة الاغراض الفطرية ويحرق بعض انبثات الزراعية.

٢١١٧٦ - فوشيا، فوشيا (F.) Fusidium (F.)

هو السداع، راجعه.

٢١١٧٧ - فوشيا، فوشيا (F.) Fuchsia (F.)

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الوردية.

انواعها المعروفة نحو ٥٠ اما غرضها زينة ٥٠٠ سقها وفروعها خشبية. اوراقها متعاقبة ثنائية أو ثلاثية.

٢١١٥٤ - فوشيا، فوشيا (F.) Clavagella (F.)

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحية الخياشيم وفصيلة الفوشيات. انواعها المنتشرة المنتشرة توجد في الطبقة البيسانية. انواعها الماصرة قليلة اطليا البحر الابيض المتوسط والمحيط الهادي || اسنانها ثنائية المصارع، شبه انبوية الشكل مستطيلة تنتهي بكمة متقوية.

٢١١٥٥ - فوشيا، فوشيا (F.) Clavagella (F.)

هو نادر الحدائق، اطليه.

٢١١٥٦ - فوشيا، فوشيا (F.) Xylozema (F.)

شجرة برية زينة من فصيلة النضيات. مهدا الصين.

سالتها منتصبة سرسة، اجسامها وانفادها شاككة. اوراقها ابيضاء متعاقبة متعاقبة. نصلها يضي الشكل، مدبب القصة.

جاءد الصفرة، لامع البشرة. ازهارها وريشة الشق صغيرة.

القد، صندف، اللون، فواصة العرف الطري. انزهارها متقوية التجميع عمودي الانتكاز. ثمارها متينة الشكل.

والقد، بتلصقية اللون يملحها موانج اسود. ثمرها يستر.

من آب الى ايلول.

٢١١٥٧ - فوشيا، فوشيا (F.) Mafopiles (F.)

جنس طير من فصيلة الخياشيم. انواعه قليلة منتشرة في

مغربي افريقيا. تتميز برشاتها وارتفاع ارجلها

واستل اجسامها وطول اذنانها || أشهر انواعه القاحلة

الشرقية، اطليا.

٢١١٥٨ - فوشيا، فوشيا (F.) Pivote (F.)

هي الذبح، اطليه.

٢١١٥٩ - فوشيا، فوشيا (F.) Cardiosperma (F.)

هو البكت، اطليه.

٢١١٦٠ - فوشيا، فوشيا (F.) F.O.B. (F.)

خالص الى السفينة. صفة اشتراط تجب على البائع

تسلم المبيع، دون اجرة نقل، على ظهر السفينة للشاحنة.

٢١١٦١ - فوشيا، فوشيا (F.) Rubia tinctoria (F.)

Rubia tinctoria (F.) Garance, Garance tinctoriale (F.)

Madder, Dyer's madder (E.) Firberste, Rote (D.)

Garanza, Rubbia, Robbia dei tintori (I.) نبات جذموري صباغي معمر من فصيلة الفويات.

جذاميره مادة حمراء اللون مستطيلة العنقوش الكيفية

التجميع. ساقه رباعية الاصلع شاككة الحروف، تلوح

نحو ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة، ضيقة، رباعية أو

سداسية التجميع ونصلها سناني الشكل، انزب الصفرة

الصل، مهدب الخاد. ازهاره خالية التركيب لونها

الصفرة يملحها موانج اخضر || جذاميره غنية بالمواد

الخصية الحمراء وهي لا تخلو من النائق الطبية اعصها

در البول.

٢١١٦٢ - فوشيا، فوشيا (F.) Mentha aquatica (F.)

هو نمنع الماء، اطليه.

٢١١٦٣ - فوشيا، فوشيا (F.) Poultice (F.)

هو نمنع الحقل، اطليه.

٢١١٦٤ - فوشيا، فوشيا (F.) Veronique d'eau (F.)

هو فيرونيكا سبق الي، اطليا.

Fuchsiae ٢١١٨٤ - **فوشين**
صياغ آخر يستعمل في تلون الانسجة الضوية لتسكين من درهما المجهرى . وهو يستعمل من تأكيد الانثيين بالنيروبزين .

Foussa (F). ٢١١٨٥ - **فوشة**
الفوشة حيوان لاسم مفترس يسمى صاس ، اطله .

Anarchisme (F). ٢١١٨٦ - **فوشية**
Anarchism (E).
الفوشية ملعب سياسي قوله ابدال اعمال السلطة الحاكمة بالمبادأة القروية .

Virulence (F). ٢١١٨٧ - **فوشة**
Virulence, Malignity (E).
خاصة في بعض الميكروبات تجعلها اذا دخلت جسماً تكررت فيه بسرعة وخلفت الفلزات وبيلة تحدث اوجم الموراث .

Pelticula d'un noyau (F). ٢١١٨٨ - **فوشة**
Peltic of the stone (E).
الفوشة فوش . هي شفاء للتواء .

Nauclea (S), Nauclee (F). ٢١١٨٩ - **فوشل**
Nauclea (E), Morgenstern (D), Nauclea (I).
جنس نباتات برية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ اصلها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية . مظهرها اشجار شائكة السوق والفروع وبهضها جنات مسطلة . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بيضوية الشكل ، لصلها جامد الصلابة ، مائل البشرة كثير المروق . ازهارها ابطية شعاعية ملونة || اشهر انواعها الفوشل الهندي .

Nauclea (S), Nauclee (F). ٢١١٩٠ - **فوشل هندي ، فوشل سرح**
Nauclea inermis (S), Nauclee inermis (F).
نوع من الفوشل وهو جنبة مسطلة سرية تملو من ٣ الى ٥ اسيار . ساقها قليلة الفروع ، سميكة القشور الطيبة النافذة . تستعمل ضد الحميات .

Dividivi (F). ٢١١٩١ - **فوشة**
هي المسمى السابق ، اطله .

Méthanumain (F). ٢١١٩٢ - **فوشل بختري**
نمت تعريفه يطلق على ما هو فوق التفكير البشري وادراكه .

Fucū, Varech ٢١١٩٣ - **فوشس**
هو الفريج جلى نباتات بحرية من فصيلة الفوشيات .

Fucaceae (S). ٢١١٩٤ - **فوشيات**
Fucacées (F), Fucaceae (E).
فصيلة نباتات مائية من رتبة الخفيات السمر . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري المنيث .

Vochysiaceae (S). ٢١١٩٥ - **فوشيات**
Vochysiaceae (F), Vochystaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العائلات . اجناسها وانواعها للمروفة قليلة العدد اصنافها منظم اصقاع امريكة الاستوائية || جميع نباتاتها معمرة ، بعضها شجيرة

التجميع . ازهارها جميلة الشكل ملونة الكزوين ، رباعية الفصل والبيصلات ، ثمانية الاسبعة || ترطب في الاربة المتوسطة الانسجام والربوطة ، الثنية بالمواد الضوية والتماسر اللينة . غير انها تخشى المراض الطليقة الكثيرة الاشخاص || اشهر انواعها ما يتبع .

Fuchsia fulgens (S). ٢١١٧٨ - **فوشيا بهية**
Fuchsia elaeagnae (F).
نوع من الفوشيا وهي جملة زهرة تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مسطحة ساقها وفروعها كثنية . اوراقها غضراء اللون ، بيضية الشكل ، مغزلة الفصل ، تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . وتقرض من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودية التجميع متدلية . كزوها وصلها مستطيلة مرجانية . يتلاتها الى الحفرة الاربوانية الساطعة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

Fuchsia triphylla (S), Fuchsia à feuilles ternées (F). ٢١١٧٩ - **فوشيا ثلاثية الأوراق**
نوع من الفوشيا وهي جملة سرية صغيرة الة تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقها غسبية ، ثلاثية ، حنانية الشكل تملو من ٨ الى ٨ سم . فصلها اخر اللون ، لمع المراج ، خلي المروق . ازهارها عنقودية التجميع متدلية ، لونها الى الحفرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال السنة .

Fuchsia magellanica, F. macrostemma, F. coccinea, F. corallina (S), Fuchsia commun (F), Common fuchsia (E). ٢١١٨٠ - **فوشيا شائكة**
نوع من الفوشيا وهي جملة سرية تملو نحو ١٠٠ سم . فروعها مجلحة حمراء اللون . اوراقها معتقة احليجية . ازهارها متدلية جرسية الشكل . كزوها وصلها اربوانية اللون . يتلاتها الى القرقة البنفسجية التجميع المراج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

Fuchsia corymbiflora (S), Fuchsia an corymb (F). ٢١١٨١ - **فوشيا حليجية**
نوع من الفوشيا وهي جنبة جادسة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . فروعها دقيقة كثنية اللون . اوراقها احليجية ذلقة تملو من ٢٠ الى ٣٢ سم . فصلها خلي البشرة اخر الصلابة . ازهارها كبيرة الة حليجية التجميع . كزوها ويتلاتها الى البياض الاخير ، فصلها اربوانية حاققة المراج . ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

Fuchsia splendens (S). ٢١١٨٢ - **فوشيا لامعة**
Fuchsia brilliant (F).
نوع من الفوشيا وهي جملة سرية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها جزيرية اللون زرجة . اوراقها الى الخضار الزاهي . ازهارها فردية ، ابطية ، مستطيلة المالحق ، متدلية . كزوها وصلها اربوانية اللون . يتلاتها عنقودية . ازهارها يستمر طوال الصيف .

Fuchsia arborescens (S), Fuchsia arborescent (F). ٢١١٨٣ - **فوشيا شجيرة**
نوع من الفوشيا وهي جنبة جادسة فروع مهدا المكسك . تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ، ذلقة الزام الاخير . تملو نحو ٣٠ سم . فصلها خلي البشرة جزوي اللون . ازهارها عنقودية التجميع ، ملونة الازرقة ، متصلة الة ، وردية اللون ، متصبية . ازهارها يستمر من الخريف الى الربيع .



فوشيا بهية



فوشل

حويبه اليابسة متبيرة اللقد عادمة التجلط تحلل بخراس
وبزرات القنول المادي .

Pois d'Inde (F).

٢١٢٠٣ - فَوْمُ هِنْدِي
هو القنول الباتر ، اطبله .



فول (١)

٢١٢٠٤ - فَوْمُ هِنْدِي مُسَهَّل
هو ستر يكتوس اينياس ، اطبله .

٢١٢٠٥ - فَوْمُ

وطائر احمر الرجلين كان رأسه شيب مصعوب ونها ما
يكنن اسود الرأس وصار خلفه اغير ، ابن سيده .

٢١٢٠٦ - فَوْمُ
القنول : طلاء كل شي .



فول (٢)

٢١٢٠٧ - فَوْمُ
هو القنول للزراعي ، اطبله .

٢١٢٠٨ - فَوْمُ كَرِين
مادة قلوية فعالة تستخرج من الشاذرج الغزني .

٢١٢٠٩ - فَوْمُ كَالِه
جنس نباتات عشبية نجسية محولة من فصيلة الاذنيات .

انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها برية . منتجاتها غابات
وجراج وادغال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ||
اوراقها وانواعها صلبة العرف || اعرف انواعها واشهرها
الثلاثة التالية :

٢١٢١٠ - فَوْمُ كَالِه حَرَبِيَّة
Fumana arabica (S).
Fumana arabique (F).

نوع من الفصانة . فرومها متبسة . اوراقها متراكبة ،
تصيرة الاذنيات ، غلبة التصلب المتبسة المنطقة
الرووس . انواعها متبيرة صفراء اللون || تنويرها يربي .

٢١٢١١ - فَوْمُ كَالِه لَوْرِيَّة
Fumana glutinosa (S).
Fumana glutineuse (F).

نوع من الفصانة . فرومها متبسة . اوراقها متراكبة ،
صلابة ، لزجة . نصالها ضيقة ، مستطيلة . انواعها
ال الصغار الباهت . تنويرها دقيقي .

٢١٢١٢ - فَوْمُ كَالِه مَحْبِيَّة
Fumana procumbens (S).
Fumana penchée (F).

نوع من الفصانة . فرومها متبسة . اوراقها متراكبة ،
جلسة ، غلبة . انواعها ابطي الاوتكار . انواعها
متبيرة صفراء اللون . تنويرها صلي .

٢١٢١٣ - فَوْمُ كَالِه
Phoma (S).

جنس فطور مجهرية من الصنبيات . بكتيدات كروية
الشكل او بيضبة مفلطحة تنشا تحت الاذنة ثم ترق الى
السطح . مقة بركر على حليات دقيقة . شغراتها قصيرة ،
بيضاوية مستطيلة ، بسيطة ، شائعة || انواعها عديدة
تركب غلظت اعضاء النبات . اشهرها :

٢١٢١٤ - فَوْمُ كَالِه الْبَطَاخَا
Phoma solanicola (S).

فطر مجهرى يصيب سوق البطاطا وعرقيها ليؤذيها ويؤثر
نوعا || مظهره الخارجي لخب مستطيلة ، ييش او صفر .

والبيض الآخر جنسي . اوراقها كاملة ، متباعدة او
ضمية . انواعها خشوية ، متدعة الاوتامات . ثمارها جرد
مستطيلة تحسن بعض البذور المتدعة الاح .

٢١١٩٦ - فَوْمُ ، بَالْتِي ، بَالْتِي ، جَمِي
Vicia faba, Faba vulgaris (S). Fève (F). Broad bean (E). Buffbohnen (D). Fava (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة البقوليات القرشاية .
هو نوع عديم الفصوب والاصرام فوارقها اعتدلت علو
السوق ولون الانواع وبسج القرون وشكل الحبوب .
والقنول نبات غليظ الجذور المخورة القليلة الانتساب
ساقه متبسة ، مرعبة ، جواء ، مخروطة ، عادمة الفروع
تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متباعدة مركبة . ورقاقها
شحمية الترتيب ، بيضبة النصل البحري اللون . انواعها
كبيرة اللقد ، متعدية التجميع ، ابطي الاوتكار ، بيضاء
اللون او حمراء تملوها وقعة بنفسجية سوداء الموج . ثمار
قرون مفلطحة مستطيلة تلفت الحبوب التي يراوح عددها
بين ٣ و ٨ . وحويبه هذه التي تعتبر من اش وانشط
الماكول الزراعية تحوي نحو ٨١٪ من الوحدات المللكية ،
توريقها :

مواد ازوتية ٢١ و ١٪
مواد دهنية ١٥ و ٤٪
مواد هيدروكربونية ٥٥ و ٢٥٪

والقنول يربى في الارضية المتدعة ويفضل منها الطبيعية
الترابية ثم الطينية الكلسية الرملية ثم الطينية . وهو قليل
المدة والانتاج في اقليم ، يفضل الري الذي يلائم مزاجه
ويضايف انتاجه || حاجته الى الاسمدة المتبسة تقصر
على الحامض السفوري والبياس . لزوم القنول الواحد
يقتدر بنحو ٥٠ كيلو سوبرفوسفات و ٢٥
كيلو كلورير البوتاس لكل دلو التربة وتقدر جيدا .

٢١١٩٧ - فَوْمُ الْخَيْل
Fève de cheval (F).

هو القنول المصري ، اطبله .

٢١١٩٨ - فَوْمُ اِيْنِيَّاس
Strychnos ignator (F).

هو ستر يكتوس اينياس ، اطبله .

٢١١٩٩ - فَوْمُ مَسِيْ
Haricot-cauba (F).

هو القنول المسني ، اطبله .

٢١٢٠٠ - فَوْمُ مَسُوْدَاكِي
Anachide (F).

شائع باسم فسق صبيد ، اطبله .

٢١٢٠١ - فَوْمُ كَلْبَار
Physostigma venenosum (S). Physostigma vénéneux, Fève de Calabar (F). Calabar bean (E). Kalaberböhne (D). Fava del Calabara (I).

نبات عارض مسمر من فصيلة القرنيات . اوراقها متباعدة
انواعها اوسيانية . يزود سامة لكنها لا تملو من اللتلف
الطبية وقد تستعمل في علاجات العين .

٢١٢٠٢ - فَوْمُ مَسِيْ
Vicia faba equina, Faba equina (S). Féverolle, Fève de cheval (F). Horse bean, Tick bean (E). Pferdebohne (D). Fava cavallina, Favetta cavallina (I).

ضرب من القنول زراعت واسعة الانتشار تكثر في مصر
والسودان . ساقه ولوية تعلو نحو ١٠٠ سم . نصل ورقاقها
عابق الخضار . ثماره قرون متبيرة اسطوانية متبسة .



فول كلبار



فول مصري



فوة البطاطا

للمفوف والقنيط واللفت والسلم والخردل || مظهره الخارجي يقع مستعرضة تملأ اطراف التصل. تبدو قمرية اللون ثم حمراء حنطية المواج تقرح التسج المتضاربة وتنفسي عليها || يركب الثبات في مختلف ادوار له يعيش في الثربة || يكافح اولاً باجتناب تكرار زراعة الصليبيات في نفس الموقع. ثانياً يظهر البذار، قبل نثره، بمعدل بيكولوجي اقرب الى المركز ٪.

Phoma linicola (S). * **قُوْمَةُ الْكَتَنِ** *
ظهر مجهري يصيب سوق الكتان فيلوجيا. مظهره الخارجي يقع سفيرة مستطيلة حنطية اللون يركب التسج الساق في زامه الاول من الثربة وصاعداً فتقرح اللحاء والبشرة وتذبل الثبات. يكافح يظهر الثربة والثبات.

Phoma apicola (S). * **قُوْمَةُ الْكَرْسِ** *
Gale du céleri (F).
ظهر مجهري يصيب الكرسي والبقندوس في اجنتها وازداد اوراقها || مظهره الخارجي يقع حنطية تقرح البشرة ورفقها تقسب رخاوة وذبول الاعضاء الموصومة || يكافح يظهر الثربة والبذار.

Phoma citricarpa (S). * **قُوْمِسُ الْجَدُور** *، * **قُثْرُود** *
Hymenochaete noxia, Fomes lamsensis, Fomes noxius (S). Hymenochaete (F).
ظهر من السميات موطنه البلاد الحارة. يركب جلور عدة نباتات انحصار القشقة والبن والشاي والفلن || مظهره الخارجي انكاش فيفاد فذبول في الارواق يعقبها جثم الجسور خيوط ونياس في الانسان والنبات || وهو على الجلود خيوط سفيرة مرساة حنطية اللون تمطق الجلود وقد تغلفها قشطب الجراوة والايال || اما الفطر فهو كثافة من دملة زياء الجسم، شيرانية التكملة المستديرة المتخبط الجفوية اللون || ليس له علاجات شافية سوى الآن.

Phoma lignous, Fomes semitostus, Rigidoporus microporus, Polyporus zonalis (S). Polypore zonale, Maladie des «racines blanches» (F). White rot (E).
ظهر من السميات موطنه البلاد الحارة يركب جلور عدة نباتات انحصار الكاكاو والقشقة واللنا والتفيل. مظهره الخارجي انكاش جزئي يحل بعض اقسام الشجرة يصيب جفاف الارواق والاينات به حجوم التوازي. وهو على الجلود خيوط متوازية جسمية العقد المرسوة كعب السبية. تبدو يضاء اللون ثم تبتية وتنتهي بالوردي. يشبه كيث الحيف يقسم الجراوة فطيطا مع اوبياها لا علاج له، اما اجنتها فهوور وذلك بالانضاد من اربابت الانجار الحمرية القايمة المتروكة في الثربة. او بقتل هذه الاروابات قبل المباشرة بالكرس.

Phoma lavendulae (S).
ظهر مجهري يصيب الخوازي في رقصا الحرة والجندية فيلوجيا || مظهره الخارجي ذبول يحل بالفروع القديمة والجندية سبه انتشار القوس بين الادمة والبشرة التي تسر قفيس || يكتفاته كروية قطرها يراوح بين ٨٠ و ١٥٠ ميكرون. بويقاته اسطوانية قياسها نحو ٢٥ ميكرون || يكالغ يظهر الثربة بالكلس الحراق به اتلاصح مرقق النباتات المصابة.

Phoma insidiaria (S). * **قُوْمَةُ الدَّرَةِ** *
ظهر مجهري يصيب اوراق الدرة فيلوجيا. مظهره الخارجي يقع لاجسية للشكل والحجم يركب نصل الارواق. تبدو حنطية ثم تنسرف الى الربادي به ان يكتفها اطار اصعب مابق || يكتفاته سفيرة قطرها يراوح بين ٧٠ و ٨٠ ميكرون. بويقاته احليلية قياسها ٢٥ ميكرون.

Phoma lingam (S). * **قُوْمَةُ الصَلْبِيَّاتِ** *
ظهر مجهري يصيب نياتات الفصيلة الصليبية انحصار

تركب الساق والمروق تقسب جفاف التسج وانصداع البشرة || يكالغ يظهر الثربة.

Phoma umbilicaris (S). * **قُوْمَةُ التَّفَاحِ** *
ظهر مجهري يصيب ثمار التفاح والاجاص في ابان تمها. مظهره الخارجي بقعة حنطية تركب القشرة عند عاتقها ثم تمتد قليلا به ان تنفث البشرة ويطلع من الشجج رفقها ويصلها || يعتبر من الاوصام الملوثة الانتشار والاذى الي لا تستوجب المكافحة.

Phoma sanguinolenta, Ph. rostrupii (S). * **قُوْمَةُ الْجَزَر** *
ظهر مجهري يصيب الجزر في قرص جنته وقد يمتد الى الارواق || مظهره الخارجي يقع خطوطه اللون تبدو سفيرة ثم تنسرف وتتشابك تقرح الادمة والبشرة وتططها. ينشط في الارربة النهائية الرملية ويلاشي بقدر ما يزداد اتلاصج الثربة.

Phoma citricarpa (S). * **قُوْمَةُ الْحَمْفِيَّاتِ** *
ظهر مجهري يصيب اوراق وثمار الحمفيات. مظهره الخارجي، حل الارواق، يقع سفيرة مستديرة سمراد اللون يركب التصل حل سفدت العليا || وهو على الثمار يقع سفيرة قطرها من ١ الى ٥ مم. تبدو سفيرة ثم تمتد وتتشابك ضلع مساحتها نحو ٢ سم. تكون في اول مهادها قفراء اللون ثم تنسرف نحو المحطي وتنتهي بسلاسر. يكتفاته كروية او سفية للتصيص، حنطية او حمراء اللون، قطرها من ١٠٠ الى ١٢٠ ميكرون. بويقاته احليلية او مريدية الشكل، قياسها نحو ٢٥ ميكرون. يصيب الثمار ويقتصر مدة حططها || يكالغ ينضج الانجار بسائل يورود المحل ٪١ حل ثلاث او اربع مرات، الاول بعد اكبال الانجار ياسبرح والثانية بعد الاول ثلاثة اسابيع والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع والرابعة بعد الثالثة بمسعة اسابيع || ومنهم من استعمل الفوطاير غير المتركزة حل التماس وقد يكونوا مسميين.

Phoma insidiaria (S). * **قُوْمَةُ الْخَرْقَمِي** *
ظهر مجهري يصيب الخوازي في رقصا الحرة والجندية فيلوجيا || مظهره الخارجي ذبول يحل بالفروع القديمة والجندية سبه انتشار القوس بين الادمة والبشرة التي تسر قفيس || يكتفاته كروية قطرها يراوح بين ٨٠ و ١٥٠ ميكرون. بويقاته اسطوانية قياسها نحو ٢٥ ميكرون || يكالغ يظهر الثربة بالكلس الحراق به اتلاصح مرقق النباتات المصابة.

Phoma lingam (S). * **قُوْمَةُ الصَلْبِيَّاتِ** *
ظهر مجهري يصيب نياتات الفصيلة الصليبية انحصار



قوة التفاح



قوة الحمفيات



قوة الدرة



فوس الجلود

موت الصيصان الحديثة التفت. مصادره عديدة أشهرها : زيت رثم الحنطة ، رثم الذروع ، الكبد البقر ، زيت فستق البندق ، زيت القطن ، زيت التفل ، زيت الصويا ، الحنظل ، الرثاء ، القرع ، عضلات البقر ، دهن الخنزير ، زيت الزيتون ، زيت الجوز ، الزبد ، اللبن الكامل .

Vitamines (F).

٢١٢٥٠ - فيتامينات

انظر الجدول في الصفحة المقابلة .

٢١٢٥١ - فيثون زيتي* ، فيثودكتة زيتية* ،

تجار زيتي (Phytodecta olivaceus (F). **فيتودكتة زيتية** (Phytodecta olivacea (F). **فيتودكتة زيتية** (Phytodecta olivacea (F).

حشرة غاضلة من فصيلة التشاريات ورتبة مدمدات الاجنحة. تألف البراري والأحراج اللدغة. غناصها ويرقاتها تعيش على نباتات القرنيات القرعاشية وأصغها الزوال ولقنتول || جسمها صغير اللدغة يطول من ٤ الى ٥ سم. لونها الى الصفار الزيتي الاسمر المالح يطول في الظهور توشيح قائم وخطان اسودان قاطبان . رأسها كبير الجسم . عيناها صغيرتان . زانباها غيطيان . ظهرها مسند الاحديداب . مستدير الطرف اللامع . عجاها متتاها التنشيط الخفيف . أرساها رابعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى الجلي . تسرح في النهار . تساهد بعد ظهورها باربعة أسابيع . تمتع المكان زينا لاهمية الحجم ضمن شفاء غروي المادة يتلصق بضال الاوراق ويشتره البعاء || البرقة تتد بطولها الادراك تمام تطول نحو ٨ سم . جسمها وشي الشكل ، سداسي الرؤوب . لونها الى الصفار القاتم يطول تنشيط اسمر . رأسها وشربها ورواجها الى السمرة || طول الكمال الذي يستمر نحو اربعة أسابيع يتغني في القرية تحت الحجارة ضمن جراب من القراب والمواد النباتية .

٢١٢٥٢ - فيثوتيس الإحاص

Phytopte du poirier . حو غاشية الاجاص ، اطبا .

٢١٢٥٣ - فيثوتيس الكرمة

Phytopte de la vigne . حو غاشية الكرمة ، اطبا .

٢١٢٥٤ - فيثوتومي

Phytotome (F).

جنس طير من الجالوم سيات المناقير وفصيلة القطنجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طير امريكا الجنوبية ا جسمها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقبها قصيرة ، مستعرجة الاشفاق . اولياها متراكبة الالوان الجسيلة . اطراف اجنتها واذاها تنتهي دائما بالاسود الاسف . صفورها ويطونها يعض || ملجها الحياتي . حام . تألف الغابات والاشجار القريبة من مجاري الماء . قوتها البذور والثمار البائعة وبعض الحشرات والديدان .

٢١٢٥٥ - فيثوتومي ، متحاجة

Phytotomie (F). Phytotomy (E).

الفيثوتومي علم يبحث في قريع النبات .

خوخ مجفف ، حبوب القرنيات ، مشج مجفف ، كستله ، بزيلا خضراء ، نياض البيض ، اسبانغ ، ورق النجل ، حبش ، طرخشقون ، حبوب الزروع ، ملفوف ، قرع ، بقونس ، غيض الحليب ، رثم الزروع ، محار .

٢١٢٥٥ - فيتامين ث

Vitamin C (F).

يستر من آليه الفيتامينات وازيها الجسم . نقشه يسبب ضمت الية والصداع وسوء الهضم واين الفاسل وكأكل الانسان والحفر المروف بقاء الاستقريب || مصدوره الرئيسي النبات حيث يكثر في بعض الثمار والاوراق كما هو مين في التصنيف التابع . وقد جاء ترتيب المصادور الواردة بالنسبة الى غناها فالولية للاشي :

اعرف مصادور فيتامين ث || **للمالوية** : ثمره الترسين ، ثمره الزعرور ، ثمره الاكدينا ، بقونس ، قليفه ، ملفوف ، قرع ، حبش ، ورق النجل ، بزيلا خضراء ، برتقال ، ليمون ، كريفروت (ليمون الجنة) ، يوسبي ، اسبانغ ، سلق ، سمه ، كستله ، طرخشقون ، كبد في ، فراسكين ، باذخان ، عتبا ، قوم ، كرات ، بتورده ، كرسل ، بطاطا ، فجل .

٢١٢٤٦ - فيتامين ج

Vitamin G, Vitamin P.P. (F), Vitamin G, (E).

يساهد وينشط جيل الشعيرات القوية فيزبدتها متانة ويحميها من سره الاثران || مصادوره عديدة اصغها الليمون والبرتقال ثم الخوخ والمشمش ثم الاسبانغ والبقونس والحنظل .

٢١٢٤٧ - فيتامين د

Vitamin D (F).

هو ما يعونه فيتامين اشعة الشمس لانه يتكون في الجسم عندما يتعرض لاشعة الشمس وذلك لان الاكستريول الموجود في المادة المعنية التي يفرزها الجسم يتحول بفعل الاشعة وراء البنفسجية الى فيتامين د || وفيتامين د || يؤمن توازن وتثيل الكليوم والفسفور في الدم والنظام خلوه من الجسم يسبب خواية النظام وليها وانقائها وتشرية شكلها ما يؤدي الى الكسح || مصدوره زيت كبد القداس المعروف بزيت السمك .

٢١٢٤٨ - فيتامين ك

Vitamin K (F).

يمتد الزيف ويساهد على تجلط الدم تجلطا طبيعا لذلك فهو من الضروريات لان نقشه في الجسم سيء المواقب . وفيتامين ك || يقسم الى ثلات اشهرها ك || وك ٢ || ومصادور الفيتامين ك || هي الاسبانغ والملفوف ولقنتيط واحشال البحر وهو يستخرج ، للاستهلاك العلاجي ، من دقيق القصة || اما الفيتامين ك ٢ || فيستخرج من دقيق السلك .

٢١٢٤٩ - فيتامين هـ

Vitamin E (F).

هو ما يعونه فيتامين التماسل او الفيتامين المانع العقم وهو المسال الرئيسي في نمو الحجيرات التناسلية وبين الزرم ضروريات التنشور الجنيني ونسجه المولدة || وهو ذو علاقة كبرى بانتاج يعض الهياج لان نقشه في الغذاء يؤدي اولاً الى انقراض عدد البيض . ثانياً الى تدني نسبة الميكوك الصالح للتقيس . ثالثاً الى ارتفاع نسبة التفتل ثم الى



لبن زني

٨٠ م. ثوبها متناخل الا لوان . راسها وصلغوا الى الشقار الحطلي . بطنها الى الياس التي . روثناها الاميان باون صدها يترصتها توضع وتظليل ويكول واحد منها يبيج قضي مستطيل . روثناها الخلفيان باون بطنها . تظهر في لبنان من ايار الى آب . ابيالها الحولية اربعة . روثناها حمة تركب غنفل اوراق التيسات الزرافية والريانية . اغارها قليلة لا تستويب الكامفة .

٢١٢٦٢ - فيثوميترا نحاسية *

Phytometra chalcites, *Plusia chalcites* (S).
Phytometra cuivré (F). *Phytometra chalcites* (E).
حشرة مؤذية من فصيلة الفثوميترا حشرقيات الاجتحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قشياً رقيق الازهار . سرقتها غاشلة تميش على اوراق النباتات البرية اغصانها الباذنجانيات ومنها البتونة || جسمها شبه مدني الشكل بطول نحو ١٥ م . يسقطها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ م . راسها معتدل الجرم ، حطلي الين ، اشقر الموج . مينها زيمتان ، نازشزان زباناها غيطيان . ملابسها صغيرة . مرقتها معتدل اللون . جوشها وبطنها الى الصخرة الحطلية الموج || روثناها الاميان الى الصخرة تملوها زركفة سمراء وبقتجان متلاصفتان نحاسيتان اللون . روثناها الخلفيان الى الصخرة الحطلية السوية . اعلاها الى الحطلي الاكلث || لها ثلاثة ابيال في الحيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان || الطور البرقي في ايلول الاول والثاني يستمر نحو ٣٨ يوم ويستمر في ايلول الثالث نحو ٢٠ اسبوعاً || السرعة شبه اذكارها الكلال الجسوري طول نحو ٤٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، زني اللون . حطلي الموج تملوه ثلاثة غسوط لبيبة قاطبة روثناها جانيهاها جميعها متناخله الاغصان والاغصان . راسها شديد الصخرة . مدنها ورواجيها الى الحطلي الاغصان || طور الكمال الذي يستمر في ايلول الاول والثاني نحو ١٥ يوم ، يستمر في ايلول الثالث نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن سلحة لتسقية السرعة بين قصبان النبات العالي او تحت الاوراق الساقطة التي تلصق التربة .

٢١٢٦٤ - فيثوميترا * فوئوما

Phyteuma (S). *Rapionce*, *Rapuncule* (F). *Rampion* (E). *Lange Tenfelskralle* (D). *Raponzolo* (I).
جنس نباتات حشوية مسمر من فصيلة الجريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقلي وتريسي . جلورها وشية الشكل . اوراقها زرقاء مقلية بسيطة ، القرصية منها مستطيلة الزنزة ، كبيرة التصل اما الجذعية فمضرة . اثارها حامية ، لاقامية التجميع ، يكثر فيها اللون الازرق . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٦٥ - فيثوميترا ديمية الورق

Phyteuma scorzoneraefolium, *Ph. betonicosifolium*, *Ph. Micheli* (S). *Rapionce de Micheli* (F).
نوع من الفثوميترا وهي حشبة بقلية سبريتية تملو من ٤٠ الى ٧٠ م . جلورها ولدي الشكل جامد للمادة الصلبة لماكورة اليضاح اللون . اوراقها القرصية ضيقة التصل ، قلبية القاعدة ، تشبه اوراق الدبع . اثارها ليلكية اللون ، سلبية التجميع ، اسطوانية الترتيب ، ثنائية او ثلاثية السيات .

٢١٢٦٦ - فيثوميترا سلبكية ، عصا يعقوب

Phyteuma spicatum (S). *Rapionce en épi* (F).
نوع من الفثوميترا وهي حشبة بقلية سبريتية عديدة الفروع .

Phytoclea (S). *Phytoclea* (F).
جنس حشرات من فصيلة الفثوميترا انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل والزبان . طول اجسامها يراوح بين ٨ و ١٥ م . اثارها غنثقة الا لوان يكثر فيها الاصفر والاخضر || وهي تميش على ازهار الحشويات دون ان تلتظا . اما روثهاا فتركب السوق وتنسجها عند حمام التربة .

٢١٢٥٧ - فيثوميترا زيجية

Phytologie (F).
Phytology (E).
الفثوميتروية علم يبحث في النبات ، راجع علم النبات .

٢١٢٥٨ - فيثوميترا *

Phytometra, *Plusia* (S).
Phytometra (F).
جنس سفرات فراشية من فصيلة الليات . انواعها عديدة . اجسامها غنثقة القند والا لوان . قرنها الاستحارية غميلة . روثها الامامية زركفة || انثاها اكبر حشياً من ذكورها تمتع مكها افرادياً على نصل الاوراق . روثهاا قليلة تسطر على حقة نباتات بقلية وصناعية وتريانية . بطنها من القراشات القاطعة التي تجوب البلاد في طلب البيت والنبات العالي || ابيالها الحولية عديدة تراوح بين ٣ و ٥ || اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٥٩ - فيثوميترا اختصانيات *

Phytometra pulchrina (S).
نوع من الفثوميترا الالفة . متوسطة القند ، بطنها نحو ٥٠ م . صدها الى الجذوة الزرافية . بطنها الى السرعة الحطلية الصفراء الموج . روثهاا سمر الحنار || تظهر في لبنان من ايار الى حزيران بين آب الى ايلول ، ابيالها الحولية اربعة || روثهاا تركب اوراق نباتات الفصيلة النجالية دون ان توضع بها شديدة الالفة .

٢١٢٦٠ - فيثوميترا المكش *

Phytometra festuca, *Plusia festuca* (S).
نوع من الفثوميترا الالفة . متوسطة القند . بطنها نحو ٤٠ م . ثوبها الى السرعة الحطلية . صدها احق من بطنها . روثناها الاميان يجملها بخطوط عابقة مستطيلة || تظهر في لبنان من حزيران الى ايلول . ابيالها الحولية اربعة . تميش روثهاا على النباتات النجيلية اغصانها المكش والبطوط والسادي .

٢١٢٦١ - فيثوميترا حمام *

Phytometra gamma, *Plusia gamma* (S). *Gamma*, *Nocuelle gamma* (F). *Silver y moth* (E). *Lammasule*, *Ypsioneule* (D).
نوع من الفثوميترا القاطعة . متوسطة القند طولها نحو ١٧ م . وبطنها ٤٠ م . ثوبها الى السرعة البنية . صدها احق من بطنها . روثناها الاميان باون صدها تترصتها غسوط سمر ويوجد على كل واحد منها عند اواخر زامه الثاني ثلاثة فارة يبيض اللون تشبه سرف غا ثلاث اسرف الانجليزية اليونانية || تظهر في لبنان من نيسان الى تشرين . ابيالها الحولية عديدة تراوح بين ٤ و ٥ || روثهاا حمة تشبه دودة غا . تركب اوراق غنفل البقول والنباتات الصناعية والتريانية .

٢١٢٦٢ - فيثوميترا سلبكية *

Phytometra ni, *Plusia ni* (S).
نوع من الفثوميترا القاطعة . كبيرة القند ، بطنها نحو



فيثوميترا



فيثوميترا الخانجات



فيثوميترا المكش



فيثوميترا غا



فيثوميترا مبقجة



فيثوميترا حمام



فيثوميترا

* ٢١٢٧٢ - فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُظْ *

Phytonomus nigristrois (S). *Phytonome à rostre noir* (F).

حشرة صغيرة اللون من فصيلة السويات طولا نحو ٤ مم. لونها إلى الخضار الداكن. غطتها إلى السرة القاتمة. رجليها تركب برام وأزهار واوراق الثاقبات على اختلاف أنواعها خنثوية.



فَيْتُون أَحْمَرُ الذَّنَبِ

* ٢١٢٧٤ - فَيْتُونُمَا الْكَمَل *

Phytonomus zollus, Ph. punctatus (S). *Phytonome du trèfle* (F). *Clover bud weevil*, *Lesser clover leaf weevil* (E). *Schwarzrüsseliger*, *Blattnager*, *Kleeblattnager* (D).

حشرة من فصيلة السويات. طولا براوح من ٧ إلى ١٢ مم. رجليها خضراء اللون يغطيها من الرأس إلى الشرج غط أبيض كالتلج. وهي تركب مع رجليها اوراق النفل لتفسدها وتضع بها الانثى.



فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُظْ

* ٢١٢٧٥ - فَيْتُونِيَات *

Phaetonidae (S).

Phaetonidés, *Phaetonidés* (F) *Phaetonidae* (E).

فصيلة طير من كليات القدم، شملت الكف. مركزها المرمي بين الجبج والتطارين. اصحابها اقربها من الجبج وتقترب ببيضها من القنطارس. طيراتها سفيف مستدل الانفتاح يمد للشرط. قتيها الاصمك تصطادها بالطنس في الماء كما يقلل القاق. انواعها المعروفة اربعة تنتمي الى جنس واحد يدعى فيتون.

* ٢١٢٧٦ - قَيْجَ *

Erection

هو الانتشار.

* ٢١٢٧٧ - قَيْجَرَكَة مَعْتُولَة *

Pygara curtula (S). *Pygare circoncé* (F). *Pygare curtula* (E).

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حوشيات الاجنسة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشتها جارية لونها رقيق الازهار. سرتها قمش على اوراق الخور والصفصاف. جسمها متوسط القد بطول نحو ١٦ مم. سطحها نحو ٣٦ مم. رأسها شهب اللون. منابها صفيرتان. زباناها مشطيان مزدوجتان عند الذكر، عظيمات عند الانثى. جوشها ويطعا الى الشفة. وريشها الاماميان الى الشفة يملو تحفح حنطي وبقية بقية تتألفها اخرى طرفية الى الرتبة القلبية. ريشها الخلفيان الى البياض الشهي المالح. اهدابها تينة. لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتتحرك للكن على الصفصاف السفلى من نعال الوراق. البقرة تطول نحو ٣٤ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، قروي القبول السكية الجانبية. نوبها الى الخطي الاسمر يملو غط نجسي ناطق اسود وشمعة خطوط متفرعة تنتهي بالمطوق حر تزنر النمل. منبها ورواجها الى القطة السراء. لها طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صليبة تحببها للرقعة في شقوق حلاه الخور او الصفصاف.



فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُظْ



فَيْجَرَة مَعْتُولَة

* ٢١٢٧٨ - قَيْجَن *

Rue (F).

هو الذئب، اطلية.

جندرها وشعي الشكل، كبير القد، جامد المادة الصلبة للأكلية البيضاء اللون. ساقها قوية تنصب جواء نمل من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها القرمزية يضيئة الشكل، قليلة القاحلة، كبيرة النصل، مأكولة، طعمها يشبه طعم البندق. اناؤها سلبية التجميع، كبيرة القد. لونها غشيت بخلط الصفروب فيها الاخير والسنتوري والازرق على اختلاف مجاماته. جميعها ثنائية الفلوات.

* ٢١٢٧٩ - فَيْتُونُمَا مَدْوَرَكَة *

Phyteuma orbiculare (S). *Ralponce orbiculaire*

نوع من الفينيه وهي شبيهة برة ورتيانية نمل من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها القرمزية مستطيلة الزناد، يضيئة النصل الدلق الزام الاخير. اناؤها حلقية التجميع، ثلاثية النسا. لونها الى الزرقه الداكنة. اناؤها يستمر من ايار الى تشرين الاول.

* ٢١٢٨٠ - فَيْتُونُمَا وَهَيْمَكَة ، لَفَت بَرَي *

Phyteuma humile (S). *Ralponce naine* (F).

نوع من الفينيه وهي عذبة برة ورتيانية صغيرة القد نمل من ٥ الى ١٥ سم. اوراقها القرمزية صلبة الشكل. اناؤها حلقية التجميع، بنفسجية اللون، حلقية يحمل من ١٢ الى ١٥ زهرة. اناؤها يستمر من تموز الى آب.

* ٢١٢٩١ - فَيْتُونُمَا الْبَهْش *

هي لائمة البهشية، اطلية.

* ٢١٢٩٠ - فَيْتُونُمَا قَرْنَاء *

هي لائمة الكرنيم، اطلية.

* ٢١٢٩١ - فَيْتُون، طَائِرُ الْمَقَالِبِ *

Phaeton (S). *Phaeton*, *Oiseau des tropiques*, *Paille-en-queue* (F). *Phaeton* (E).

جنس طير من فصيلة الفيتونيات. اناؤه المعروفة اربعة. اصحابها مجامح البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متصلة القد. مناقيد جالسة، مسنة الخاطار. اجنتها كبيرة، ذلقة. اناؤها مستطيلة المزال. ارسائها قصيرة. خطاب اصحابها شامل الكفالت. اعراف اناؤه واشهرها الفيتون الاخر الذئب.

* ٢١٢٩٢ - فَيْتُون أَحْمَرُ الذَّنَبِ *

Phaeton rubricauda (S). *Phaeton à queue rouge* (F).

طائر من الفيتون. طوله الكمال نحو ٩٠ سم. منها نحو ٥٠ سم. للزنان. ثوبه متراكب الالوان الهلعة والمرتفعة، فيها الابيض والرودي والمرباني والاخر والاسود. ذنبه احر اللون. منقاد مرباني. حلقه عيشة كستية. رساء واصابه حر. خطابه احر الانتشاب والزاد، اسود اباني. اعطانه تشمل منط مجامح البلاد الاستوائية من المالم القديم. يالفت المواتع الاسفريفة التالية. قوته الاسمك يتغذى عليها. كالشم وينطس في طلبها على غق عدة لقدام. يلدن عشه، غالباً، في اضموس يديره بين الصغور وقد يدن أيضاً في الاشجار القلبية. اثناء قمع يضيء واحدة تحفها بتناوبة للذكر نحو اربعة اسابيع.



فِيرُونِيكَا حَدِيدِيَّة



فِيرُونِيكَا



فِيرُونِيكَا اَثِي



فِيرُونِيكَا بَهْشِيَةِ الْوَرَق



فِيرُونِيكَا حَبِيقُ الْحَمَى

٢١٢٨٨ - فِيرُونُزْ ، فِيرُونُزْج (F). Turquoise (F).
حبر عَيْنِ اَزْرَقُ الْاَيْنِ .

٢١٢٨٩ - فِيرُونُزْ (F). Virus
هو الْفِيرُوسُ ، اَطْلَبْ .

٢١٢٩٠ - فِيرُونِيَّةٖ * ، مِزْلُ *
Férolite, Mésale (F).
سِيلِيكَاتُ مَرْكَبٍ مِنَ الْاَلُومِيْنُومِ وَالْكَلْبُومِ وَالصُّوْدُومِ
وَبَحْرُ ٤٤٪ مِنَ السِّلِيسِ .

٢١٢٩١ - فِيرُونِيَّةٖ * ، نُفَاقُ الْفِيلِ
Feronia (S). Féronie, F. de l'Inde (F). Wood apple,
Elephant apple tree (E). Elephananapsel (D). Feronia,
Pomo d'elefanta (I).

جَنْسُ اشْجَارٍ بَرِيَّةٍ مُشْتَرِكَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَرَقَالِيَّاتِ . الْوَأَعُ
قَلِيلَةٌ الْعِدَدُ حَيْثُهَا شَجَرَاتٌ شَاكِلَةٌ . اَعْطَانَهَا الْهِنْدُ وَبَرْنَدِيبُ
وَالْاَنْدُسُ . شُجَرُهَا كُرُوِيَّةُ الشَّكْلِ حَيْثُهَا حَبْرُ الْبَرَقَالِ .
تَقْشُرُهَا غُلِيظَةٌ لَيْلِيَّةٌ جَامِدَةٌ . لِبَاقُهَا وَرْدِي الْاَبْنُ ، طَعْمُهَا
مُزِجٌ مِنَ الْحَلَاوَةِ وَالْحَمَضَةِ الْحَامِزَةِ .

٢١٢٩٢ - فِيرُونِيكَا (F). Veronica (S). Véronique (F).
جَنْسُ نَهَائِثَاتٍ بَرِيَّةٍ وَتَرْبِيْنِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْخَنَازِيرِيَّاتِ . اَنْوَاعُهَا
عَدِيدَةٌ مِنْهَا الْغَشِيَّةُ الْحَوْلِيَّةُ وَالْمَعْرُومَةُ وَمِنْهَا الْجَنْبَاتُ الْيَفِيَّةُ
وَالْحَشُوبَةُ وَمِنْهَا الْاشْجَارُ الْيَابِغُ قَطْرُهَا نَحْوَ ١٠٠ سم .
اَوْرَاقُهَا وَاقْشَرُهَا لَاقِيَابِيَّةٌ اَشْكَالًا وَالْاَرْتِكَاكُ || اَرْوَفُ
اَنْوَاعُهَا وَاشْجَرُهَا مَا يَلِي .

٢١٢٩٣ - فِيرُونِيكَا اَنْثَى * ، لَيْتَابِيَّةُ حَرْشَفَاءَ
Veronica tauricum, V. chamaedrys (S). Véronique
germandrée, V. femelle, V. bilcardé (F). Germander-
speedwell, Wild germander (E). Gamander-
Ehrenpreis (D). Veronica piccola quercia, V. femina (I).

نَوْعٌ مِنَ الْفِيرُونِيكَا وَهِيَ عَشْبَةٌ تَرْبِيْنِيَّةٌ مَعْرُومَةٌ تَعْلُو ٢٠
اِلَى ٤٠ سم . سَاقُهَا مُنْتَصِبَةٌ . اَوْرَاقُهَا مُتَقَابِلَةٌ ، نَصْلُهَا
مَنْثَلِي الشَّكْلِ ، ضَيْقُ الْفَصْلَةِ الزَّيْبَاءُ . اَنْوَاعُهَا عَقُودِيَّةٌ
التَّجَمُّعُ ، عُمُودِيَّةٌ الْاَرْتِكَاكُ ، رِزْقُ الْاَبْنِ || اَنْوَاعُهَا
يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَانٍ اِلَى تَمُوزَ .

٢١٢٩٤ - فِيرُونِيكَا بَهْشِيَّةُ الْوَرَقِ *
Veronica buxifolia (S). Véronique à feuilles de
buz (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفِيرُونِيكَا وَهِيَ جَنْبَةٌ تَرْبِيْنِيَّةٌ مَعْرُومَةٌ تَعْلُو ١٠٠
اِلَى ٢٠٠ سم . سَاقُهَا مُنْتَصِبَةٌ ، فَرْوُهَا دَقِيقَةٌ جَالِسَةٌ ،
اَنْوَاعُهَا بَهْشِيَّةُ الشَّكْلِ ، نَصْلُهَا جَامِدُ الْفَصْلَةِ الْاَسْمَاءُ .
اَنْوَاعُهَا سَلِيلِيَّةُ التَّجَمُّعُ ، كَاجِيَّةُ الْاَرْتِكَاكُ ، يَضَاءُ الْاَبْنِ
اَوْ رُوْدِيَّةٌ || اَنْوَاعُهَا يَسْتَمِرُّ طَوَالَ السَّيْفِ .

٢١٢٩٥ - فِيرُونِيكَا حَبِيقُ الْحَمَى * ، فُوْتَنْجُ مَعْصَرِي
Veronica anagallis aquatica (S). Véronique d'eau (F).
Water speedwell (E). Wasser Ehrenpreis (D). Veronica
aquaica (I).

نَوْعٌ مِنَ الْفِيرُونِيكَا وَهِيَ عَشْبَةٌ بَرِيَّةٌ طَيِّبَةُ مَعْمُومَةٍ تَعِيشُ
اِلْتِقَامَ رَوْلِ جَوَانِبِ الْاَقْيَةِ وَبَعَارِي الْمَاءِ ، تَعْلُو ١٠
اِلَى ٧٠ سم . اَوْرَاقُهَا مُتَقَابِلَةٌ لَسَنَةٌ ، نَصْلُهَا خَلِي
الْبُشْرَةِ تَسْتَبَاحُ التَّسْنِينَ الْمُسْتَدِيرَّ اَنْوَاعُهَا اِلَى الزَّرْقَةِ
الْقَلْبِيَّةِ .

٢١٢٧٩ - قَيْجَنْ حَلْبِي (F). Rue d'Alep (F).
هو السَّلَابُ السُّورِي ، اَطْلَبْ .

٢١٢٨٠ - قَيْجَنْ لَحْن (F). Rue officinale (F).
هو السَّلَابُ الْاَفْرِزِي ، اَطْلَبْ .

٢١٢٨١ - قَيْجَنْ (F). Rutine (F). Rutin (E).
الْقَيْجَنْجِيْنُ اَوْ الْخَامَقُوسُ الْفَرْجِي ، غُلُوكُزِيْدُ تَرَبِيْ الْاَبْنِ
يُوجَدُ فِي الْقَيْجَنْجِيْنِ اَيِ السَّلَابِ وَفِي حَقَّةِ نَبَاتَاتٍ اُخْرَى
اَخْصَا الْكَبَرُ الْوَالِدِيَّةُ .

٢١٢٨٢ - قَيْدْ (F). Feuilles de safran (F).
هو وَرَقُ الزَّرْعَفَرَانِ .

٢١٢٨٣ - قَيْدْ اَلِيَّة (F).
هِيَ بَنْتُ اَلِيَّةِ الْكُرْدِيَّةِ اَطْلَبْ .

٢١٢٨٤ - قَيْدْ اَلِيَّةُ كَرْدِيَّةِيَّةٌ (F).
Novius cardinal (F).
حَشْرَةٌ تَعْلِي نَفِيرُوسُ كَرْدِيَّةِي ، اَطْلَبْ .

٢١٢٨٥ - قَيْدْ اَلِيَّةُ عَمْدِيَّةٌ * ، بِيَكْرُوَّةُ
عَمْدِيَّةٌ *
Fidonía famula, Bichroma famula (S).
Fidonie servante (F). Bichroma famula (E).

حَشْرَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْاَرِيَّاتِ وَرَبِيَّةٌ حَرْفَلِيَّاتُ الْاَجْنَسَةِ .
مِوْلُهَا يَمْتَدُّ مِنَ الشَّرْقِ الْاَسْفَلِ اِلَى اَرْوَبَةِ الْمَعْتَدَةِ الْحَمَارَةِ .
فَرَاثُهَا وَاشَقَّةُ قُوَّتِهَا مَشَرُّ الْاَزْهَارِ . مَرْوَتُهَا تَعْمِشُ حُلَّ
اَوْرَاقِ الْوَزَالِ وَاقْشَرُهَا || جَسْمُهَا نَحِيْلٌ ضَخِيْفٌ يَطْلُو نَحْوَ
١٠ سم . يَسْبَلُهَا نَحْوَ ٣١ م . رَأْسُهَا اَكْبَبُ الْاَيْنِ اَصْغَبُ
الْمُحَاجِ . عَيْنَاهَا صَغِيرَتَانِ . زَيْبَانُهَا شَطِيحَانِ عَنِ الذِّكْرِ ،
عُطْيَانُهَا عَنِ الْاُنْثَى . جَوْشِنُهَا وَيَسْبَلُهَا اِلَى اَكْبَبَةٍ || وَاشَقَّتُهَا
عَنِ الثَّقْبَيْنِ اِلَى اَكْبَبَةِ الْيَصْفَرَاءِ الْمُرْجِيَّةِ يَطْلُو فِي الزَّوْجِ
الْاَسَاسِيَّ تَلْبِيْجٌ وَتَجَمُّعٌ وَزُرْقَةٌ وَرُزْقَةٌ كَسْتِيَّةُ الْاَبْنِ .
وَيَطْلُو فِي الزَّوْجِ الْاَخْلَافِيَّ شَفْعَةً حَطَلِيَّةً وَشَطْلَانِ مَرْفُوعَانِ
مَقْصُودَانِ كَسْتِيَّةُ الْاَبْنِ . اَهْدَابُهَا اِلَى الْحَشِيَّةِ الْاَشْفَقِ ||
لَهَا جَبَلٌ وَاحِدٌ فِي الْحَوْلِ . تَطْهَرُ الْفَرَاثَةُ اِبَارَةً وَتَبْقَى
حَقُّ اِبَارَتِهَا حَزْرَانٍ . تَسْرَحُ فِي الْبَلْبِ . تَمَاطُلُ بَدَنُهَا
بَسْتَةً اَسْبَاحٍ وَتَقْشُرُ الْمَكْنُ مِيسَادِيًّا حُلَّ الْفَصْلَاتِ السَّلَلِ
مِنْ نَصَالِ الْاَوْرَاقِ || اَلْسَرَقَةُ تَطْلُو نَحْوَ ٢٣ م . جَسْمُهَا
مَرْجِي الشَّكْلِ مُسْتَعْمِلُ الرُّأْسِ وَالْمَقْدَمِ . ثَوْبُهَا يَمَاقِنُ لَيْلِيَّةً
الَّتِي تَعِيشُ فِيهَا وَهِيَ يَبْرُوحُ بَيْنَ الْاَخْضَرِّ وَالْاَسْفَرِّ . رَأْسُهَا
اِلَى السَّمَرَةِ . رَوَاجِيهَا الْبَهْشِيَّةُ الْاَسْفَلِيَّةُ مَاصَّةٌ مَا يَحْمِلُهَا
تَقْشُرُ عَنْ اَلْتَفَاقِ || طَوْرُ الْاِكْمَالِ الَّذِي يَسْتَمِرُّ نَحْوَ
١٥ يَوْمًا يَبْقَى فِي الْجَمَالَةِ اَبْوَيْنَ فُرُوعِ النَّبَاتِ خَسَنٍ
صَلْبَةٍ مُتَبَدِّلَةٍ الْحَلِكِ .

٢١٢٨٦ - قَيْرُوسُ ، قَيْرُوسُ ، قَيْرُوسُ ، مَوْوَسُ
Virus
ج- فَيَاوِسُ وَبِلَوسُ ، هِيَ اَسْوَلُ بَعْضِ الْاِمْرَاسِ اَوْ الْاَوِصَامِ
الْمُزِيْنَةِ الَّتِي لَمْ يَسْكُنْ الْعِلْمُ ، حَقُّ الْاَلَنْ ، مِنْ تَحْمِيدِ
اَشْكَالِهَا اِلَى اَبْسَلَةِ الْمَجْهَرِ الْاَلِكْتُرُونِيِّ . وَهِيَ كَلَنَاتُ
سِيَةِ مِيَكْرُونِيَّةِ الْحَبْرِ اَيِ مَتَابَعَةِ الصَّفَرِ ، عَدِيدَةُ اَلْاَشْكَالِ
الْقَضِيَّةِ ، كَثِيرَةٌ الْاَنْثَى ، مُسْتَصْبِيَّةٌ حُلَّ كُلِّ مَلَاجٍ .

٢١٢٨٧ - قَيْرُوسِيَّةٌ (F).
نَعْتٌ تَعْرِيْفِيٌّ يَلْقَظُ حُلَّ كُلِّ مَا هُوَ مُنَوِّبٌ اِلَى الْفِيرُوسِ .

٢١٣٠٣ - فيرونيكا صغرى * ونبات الجرس

Veronica officinalis (S). *Véronique officinale*, *V. mla*, *Thé d'Europe* (F). Common speedwell, *Medicinal tea speedwell* (E). *Echter Ehrenpreis*, *Speedwell* (D). *Veronica officinale*, *Thé d'Europe*, *Quedernuz* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية برية مصرية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. تألت الإبراج والسيقان القليلة للزهر. أوراقها لينة مستديرة الطرف تستعمل استعمال الشاي وهي حديدية المنافع الصحية، تنقي الصدر والقلب || أنهارها سفلية التجميع || زرقاء اللون. ساقها مغطاة بالحلم، كثيفة الأفرع.

٢١٣٠٤ - فيرونيكا التبغ * ونبات التبغ

Physopis nicotiana (S). *Physopis du tabac* (F). نوع من التريسي، حشرته تملو نحو ٣ م. لها ألسنة البصرة الخشبية السوداء الموح. تركب تضغط الخشب ويقتصد التبغ ويصاير أخلايا يفسد ما يعينه مرض الرق الأبيض || الأكر حامد الأجنبية. البرقة صفراء اللون تملو من ١ إلى ٢ م. راجع تريسي يفرق أيضا.

٢١٣٠٥ - فيرونيكا * ونبات

Physa (S). *Physa* (F). *Physa* (E).

جنس حيوانات مائية من الغرديات مملات الإبريل وبصيلة الفيزيات. أنواعها الممرضة قليلة العدد منتشرة في سائر أنهر العالم وينتقلها وتنتقل النباتات المائية || أصنافها مخزنة، صغيرة، رقيقة، مائة، شائعة، شفافة الجلب. أجسامها أحليجية لينة. رؤوسها واضحة. لوامسها مستطيلة مبطنة. أرجلها وحيدة، مستديرة المقدم، ذلقة المؤخر، حادة السطاح.

٢١٣٠٦ - فيرونيكا * ونبات

Imperméable (F). *Imperméable, Impervious* (E).

أرض خثولة : سريمة السيل إذا أصابها الخث.

٢١٣٠٧ - فيرونيكا * ونبات

Physalus (S). *Physala* (F).

جنس ضفاد من المشيبات وفضيلة الفيزليات. أنواعها المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم مجار العالم || مستمراتها تبدو كشكة من الألياف بفضيلة اللون يتبعها خلاف قابل التمدد، أوسوي الشكل عند الانتفاخ فوق سطح الماء حيث يتوسع مع القوي أبنا يشاه.

٢١٣٠٨ - فيرونيكا * ونبات

Physalides (S). *Physalides* (F). *Physalides* (E).

فضيلة من الضفائيات المشيبات البسوة. أنواعها الممرضة خثة تجتمع إلى جنسين الفيزليات والفيروز.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا * ونبات

Physocarpus (S). *Physocarpus* (F). *Physocarpus* (E).

جنس مميزات ممرضة من فضيلة الورديات. ساقها مستديرة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقها متعاقبة، معققة، عابدة، مفصصة ومنسدة الأطراف. أنهارها حلقة التجميع، مختلفة الألوان || تزود الفيزيين في الخللان. ترطب في الأثرية المتعددة الانتماع، المنسوبة التركيب المنصري، الفلورة المواد الخفائية || أنواعها الممرضة قليلة العدد، أشهرها التالية :

٢١٣١١ - فيرونيكا سرّوية

Veronica cupressoides (S). *Véronique cyprès* (F). نوع من الفيرونيكا وهي جنبة سرّوية ممرضة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها مستديرة. فروعها دقيقة. أوراقها حشرقية تملو نحو ٢ م. أنهارها سفلية التجميع، حادة الإبركاز، صفيرة اللد، ليلكية اللون || أنهارها يستمر طوال الصيف.

٢١٣١٧ - فيرونيكا سبيلية * ونبات

Veronica spicata (S). *Véronique en épi* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجملة تريينية ممرضة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة متعاقبة، نصلها أحليجي الشكل، مسن الحافة، حديد المقعدة. نوبها سفلية التجميع مستطيلة السيلة الوسيلة. أنهارها كبيرة اللد وردية اللون || أنهارها يستمر من سريان إلى آب.

٢١٣١٨ - فيرونيكا سرّوية

Veronica orientalis (S). *Véronique orientale* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية تريينية ممرضة تملو نحو ٢٠ سم. ساقها ملتوية الطرف. أوراقها خفيفة النصل المفروض والمسن. أنهارها ليلكية أو وردية اللون، صفيرة التجميع، عويوة الأبركاز، كزوسها حاشية الفصل. أنهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢١٣١٩ - فيرونيكا صفراء

Veronica lutea (S). *Véronique jaune* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية تريينية ممرضة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها بيضية الشكل. نصلها مسن الحافة ذاتي الزام الأسير. أنهارها صفيرة التجميع، صفراء اللون، مسنخة البلات العليا || أنهارها يستمر من أيار إلى سريان.

٢١٣٠١ - فيرونيكا عيسى القمح * ونبات

Veronica anagallodes (S). *Véronique des sables* (F). *Speedwell* (E). *Ehrenpreis* (D). *Veronica mucronata* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية برية طيبة ممرضة متنبها الأثرية الرملية. ساقها خشوية نحيلة. أوراقها صفيرة التجميع، أحليجية الشكل، زبد النصل. أنهارها صفيرة التجميع، زرقاء اللون، بحرية اللوح.

٢١٣٠١ - فيرونيكا شجرة * ونبات

Veronica incana (S). *Véronique blanchâtre* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجملة تريينية ممرضة تملو من ٢٠ إلى ٧٠ سم. فروعها مريضة اللحاء. أوراقها متعاقبة متعاقبة، نصلها ساني الشكل، مسن الحافة، خلي للشرة حل صفحتها، يبدو كأنه أشجار اللون || أنهارها سفلية التجميع، زرقاء اللون. أنهارها وسيد السيلة يستمر من سريان إلى تموز.

٢١٣٠٢ - فيرونيكا قرد العن * ونبات

Veronica beccabunga (S). *Véronique cressonnée*, *Beccabunga*, *Cressonnière*, *Cresson de cheval* (F). *Brooklime*, *Water pimpernel* (E). *Bachbunge*, *Ehrenpreis* (D). *Baccabunga*, *Veronica cressone* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية برية ممرضة تملو نحو ٢٠ سم. تعيش في المناء وعلى جوانب مجاري الماء. أوراقها صفيرة اللد، بيضية الشكل، نصلها مائل البشرة، شديد الحفر. أنهارها صفيرة اللد ليلكية اللون، سفلية التجميع || أوراقها مأكولة غشراء وبطيرة.



فيرونيكا سفلية



فيرونيكا قرد العين



فيز بود التبغ



فيزة



فيزوس

٢١٣١٠ - فيزوكرب الغلومي الورق

Phyzocarpus opulifolia (S).

Phyzocarpus à feuilles d'obier (F).

نوع من الفيزوكرب . موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية . ساقه تملو من ستر الى ثلاثة امتار . اوراقه ثلاثية او خمسية القصوص ، خلية الصفحات العليا ، مزلاء السفلى . ازهاره على التجميع . ازهاره يضاء اللون او ودية || تنموه يستمر من حزيران الى تموز

Physique (F). Physica (E).

٢١٣١١ - فيزيما

علم الطبيعة او الفيزياء .

Physides (S).

Physidés (F). Physidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات معنيات الارابل ودية الرغويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة متصلة الدم معظمها من مستحشرات الطبقة الجهورية . اما الانواع المعاصرة فنشرة في معظم انهر العالم وبحيراته وسنائه . قوتها النباتات المائية || اصنافها صغيرة ، رقيقة ، لناعية ، شفافة ، حلزونة . شفاء الوب || اعرف اجناسها المعاصرة الفرية .

Biophysique (F).

٢١٣١٢ - فيزيياحية

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة . راجع بيوفيزياء .

Physiologie (F).

٢١٣١٤ - فيزيولوجية

في الفيزيولوجية ، الحلبا .

٢١٣١٥ - فيستولينا * ، فطر الكبد
Fistulina hepatica (S). Fistuline, Fistule hépatique, Foie de bœuf (F).

فطر مأكول من فصيلة السميات يركب جلود بعض الاشجار الحرجية في الموطن الفطرية الرطبة . وهو كبير القد ، كبدى الشكل والحمى ، حشلى اللون ، اسمر القاعدة ، جابك الركيزة المتبقية . اغراس زهيدة لا تستحق الاهتمام .

٢١٣١٦ - فيسجة باهرية

Phycita splendida (S).

Phycita splendide (F). Phycita splendide (E).

حشرة من فصيلة التارايست ودية حشرقيات الاجنحة . موطنها ينتمى من الشرق الاوسط الى معظم مناطق اوروبية المعتدلة الحارة . فرشتها واحة قوتها رقيق الازهار وطلوها . سرلتها قرضابة تموت تحت طلاء الصنوبر وتقلع الشكير قسب سيلان القرائج || جسمها يطول نحو ١٢ م . بسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م . رأسها صغير الجرم والاعلى . عيناها بنية ، ماصتات . زباناها غبيطان . ملابسها دقيقة . مرشفها مستدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني الاكثر المراج || ورشها الاناميان الى السرة الكنتية يطولها تقيح ابيض وزرأكش خفاء . ورشها الخلفيان الى الطلعة يطولها تمشيع كسني يكتشف الاصاب وقاعدة الحنجر الخاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائشة في اواسط نيسان تسرح في الليل وتستن في النهار || الانثى تلقي المكن مباحيا بين شقوق السماء وتحت القشور . البلور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة منه يملونها الادراك تطول نحو ١٥ م . جسمها بين التقسيم السكسي ، بني اللون تملوه



فيزولينا



فيسمة

خسة خطوط جزوية قاطبة . رأسها اسود . مهابا ورواجها الى الخليل || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتقفي ضمن صلبة تسحبها السرقة بين قشور الصنوبر .

Fischeria (S).

Fischérie (F). Fischæria (E).

٢١٣١٧ - فيشركة
جنس حيوانات مائية من الرغويات صفحيات الحياض والارابل ومن فصيلة البيرينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جميع بحيرات واهر افريقية الشمالية || اصنافها صغيرة القد ، شبه قلدوسية الشكل ، متساوية المصاريخ ، لامشادية الاعلى . متاعها ثنائية ، طبقة صغيرة || تعيش في الاسمال . طوبها مأكولة مبتلة الصفت .

Gul (F).

٢١٣١٨ - فيشكة

هي الحدال ، ج . فيائل .

Sporobolus (S). Sporobole (F).

٢١٣١٩ - فيسيم
جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة .

Nemestrina (S).

Némestrina (F). Nemastrina (E).

٢١٣٢٠ - فيسمة
جنس حشرات من فصيلة الفيسميات ودية ذوات الجناحين انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الانريقية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٦ م . رؤوسها مستقيمة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . ملابسها نحيلة . اعطائها شديدة الطول . كواسلها كثيفة الخليل . بطونها بارزة الحيد السكسي . اثوابها مبرقعة . دراشتها شفافة . قوتها نحيلة || جسمها واحة تألفت الغابات والمروج التي تكثر فيها الازهار . يرقاتها واحة او طفيلية . تتطفل على المفصليات .

Nemestrinidae (S).

Némestrinidés (F). Nemastrinidae (E).

٢١٣٢١ - فيسيميات
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تألفت الغابات والمروج في زن الازهار || اجسامها ضخمة ، شبه يفسية الشكل ، تطول من ٧ الى ٣٦ م . رؤوسها مستقيمة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . اعطائها متباينة الجرم منها الصغيرة ومنها الكبيرة المستطيلة . ملابسها نحيلة او خامرة . كواسلها كثيفة الحلب . بطونها بيضاء اسطوانية ، مقنطرة الخيصر . دراشتها شفافة || يرقاتها غامضة ، حديدية الشكل || اشهر اجناسها الفيسمة والولانة .

Plus-value (F).

Increase in value, Increment (E).

٢١٣٢٢ - فيض
هو الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الشيء بين تقديرين يختلف زمانها . وهو ايضا زيادة ما يتصفه الشيء من الثمن يما او تقديراً .

Débordement, Crue (F). Overflowing, Rising (E).

٢١٣٢٣ - فيض ، طفق
هو ازدياد المياه في الانهر وارتفاعها عن مستواها المألوف .

٢١٣٢١ - فَيْصَان

Inondation (F).

Inundation, Flood (E).

غمر المياه الطافية لبلاد أو مكان ما .

٢١٣٢٥ - فَيْصَرَج

Leptodermis (S).

Leptoderme (F).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الفقيويات ، أنوارها للمروقة قليلة . سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ م . فروصها مفصلة متقابلة الإرتكاز . أوراقها أليفة مسطحة متقابلة ، نصلها ساني الشكل خالي البشرة على سطحه . إزهارها الأنبوبية التويج ، رويحية التجميع ، يضاء اللون أو زرقاء أو بنفسجية .

٢١٣٢٦ - فَيْقَنْ ، قَرْقَل

Gloousement (F).

Clucking, Cluck (of hen) (E).

القيق : صوت الدجاج .

٢١٣٢٧ - فَيْقَل * ٥

Figulus (S). Figule (F).

جنس خنافس من ذبذبات الاجنحة صغريات القرن وصيلة المتظويات . أنواعه المروقة نحو ٢٠ اصنافها البلاد الحارة والاعتوائية من العالم القديم || جميعها حرة تعيش في الغابات على الاشجار تنشره الأوراق الى الشقة السهام أو الكهبة السوداء السماء . ريقها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، صلبة ، كستنية اللون . قوتها المواد الخشبية السائرة الى الاكل .

٢١٣٢٨ - فَيْكوريا ريجيا * ٥ ذُرَّة الماء

Victoria regia (S). Victoria (F). Giant water lily (E).

Seekönigin (D). Victoria (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة النيلوفاريات . اصنافها مياه بحيرات البلاد الحارة والاعتوائية || أوراقها مستديرة ، نصلها جلد الصلصة ، صافي الشكل ، مكثف الخلة ، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . وهو يطفو على وجه الماء رباه زناد ليبي التسج اسطواني الشكل يطول من ٤٠٠ الى ٤٠٠ سم . || انهارها كبيرة الحجم ، عديدة البتلات . بتلاتها بنفسجية الفاضة ، قرمزية الزام الاو ، برقالية الثاني ، يبيض الثالث والرابع . ثمارها كروية ضخمة شاذكة . بذورها لشوية مأكولة ولذا يعضها ذرة الماء .

٢١٣٢٩ - فَيْكُس ، فَيْكُون

Ficus

هو البقيع ، اطبله .

٢١٣٣٠ - فَيْكَل

Elephas (S).

Elephant (F). Elephant (E).

ج . انياف وفيلو وفيلة . كنيته ابر الحجاج وابو الحريان وابو غفل وابو كلفوم وابو مزاس . الاقنية فيلة ومعجم كنيته ام شبل || الفيل جنس سبوانات ضخمة لينة من فصيلة الفيليات وربة الخرطوميات || جسمه معتدل الطول مغطى البشانة يرتكز على اربع قوائم خليقة عمودية الشكل . رأسه كبير ضخم . صيانه صغيرتان . اذنان كبيرتان مرسيتان . خرطومه جرم اللد ، بالغ الطول يمتد الى الارض . ناباه مستطيلتان نخيتان مقوستان || والفيل يمشي نحو ١٥٠ سم وهو يبلغ كامل نضجه بمر ٢٥ سنة . محبل الاثني بدم ٢٢ شهراً تنقص في نهاية دخلا واحداً وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قوته اصطناع البلاد الحارة يائف الاحراج والمناطق الرطبة . قوته الاشجار والجبلور والارز لتغلبا بخرطومه ويدخلها الى

فه تفسنها ويطنها || والفيل يسرح في طلب القوت من الساحة الثالثة صياحاً الى الساحة الثالثة ثم يركع على الخفيض كسائر الحيوانات حتى الساحة الثالثة بعد القدر فيقوم ويسرح عن جديد حتى انتصاف الليل حيث يركع من جديد الى الساحة الثالثة صياحاً . وهو يتررب مرتين في اليوم ، الاول عند شروق الشمس والثانية قبل الغيب اما وجبهه البنية من القوت فتراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو || انولاه اثنتان والاخرى .

٢١٣٣١ - فَيْكَل افرقي * ٥

Elephas africanus (S).

Eléphant d'Afrique (F). African elephant (E).

لوح من الفيل موطنه يمتد من غربي وجنوبي الصحراء الكبرى الى بلاد الحبشة . وهو اكبر واخضر حيوان ارضي يعيش الآن . يطول من ٣ الى ٤ امتار . محيط بطنه يراوح بين ٦ و ٧ امتار وطول جمعه مع الخرطوم والذنب يراوح بين ٨ و ١٠ امتار . وزنه يراوح بين ٤٥٠٠ و ٥٥٠٠ كيلو اما ناباه فتران من ٧٠ الى ٩٠ كيلو .

٢١٣٣٢ - فَيْكَل البَحْر

Elephant de mer (F).

هو الفيل ، اطبله .

٢١٣٣٣ - فَيْكَل هندي * ٥

Elephas indicus (S).

Eléphant d'Asie, E.de l'Inde (F). Indian elephant (E).

نوع من الفيل موطنه اسراج الهند والاصام وبناليه والسيام والكوششين وبلق ... وهو حليم الجلة جسمها يطول من ٢٧٠ الى ٣٦٠ سم . طوله يراوح من ٧ الى ٨ امتار بما فيه الخرطوم والذنب . وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو وكل واحدة من نابيه تزن من ٢٠ الى ٤٠ كيلو . والفيل الهندي مشهور بحسن الخلق واتقاس القام . وهو يستخدم في القح الاعمال واستنكها فيقوم بها غير قيام . اما الفيل الايش فهو من ذات النوع انما اصيب بالاحساب اي باندغام المادة اللينة في الجلة .

٢١٣٣٤ - فَيْلادلفُوس

Philadelphus

نبات من السرفسيات يعرف بالسرجة ، اطبله .

٢١٣٣٥ - فَيْلادِيَه

Filare (F).

هي الحداية ، اطبله .

٢١٣٣٦ - فَيْلاريُون

Filarion (F). Filariasis (E).

دريبات تصيب نسيج الانسان والحريان سببا وصول يوريشات الهذاب الى الجسم اما بطريق القم أو عن طريق الجرح وما شابه .

٢١٣٣٧ - فَيْكَلَة البَحْر

هي الفيليات ، اطبله .

٢١٣٣٨ - فَيْكَلَة

Cacon (F).

هي الصلصة ، اطبله .

٢١٣٣٩ - فَيْكَلْجُون

Arum (F).

هو القرياق الايش ، اطبله .

٢١٣٤٠ - فَيْكُور

Phytachora (F).

هي البتيكة ، اطبله .

٢١٣٤١ - فَيْلُو ذُرَّة

Alike des crucifères (F).

هي الكدوش ، اطبله .

٢١٣٤٢ - فَيْلُولُوكَيْت

هو كهدب الزينج ، اطبله .



فيل



فيكتوريا ريجيا



فيل افريقي



فيل هندي

٢١٢٤٨ - فيلوكسيرة الوزال * *Phylus genista* (S).*Phylus des genêts* (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الفصيفيات . جسمها صغير يطول نحو ٥ مم. ثوبها كثيف اللون يطول تمسح أبيض وتتقشر اسمر . رأسها عريض ، صغير غطتها مثل الطول . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان . كسيتان . كسلها عريسي الشكل . حجبها صغيرة . ظهراتها لاحف ، مستطيلة الخنجية الدققة . بطنها ومذنها الى الخلف الاسمر || تألف البراري والمواقع الدققة . يكثر وجودها على الوزال .

٢١٢٤٩ - فيلوكسيرة ، فيلوكسيرة * *Phylloxera* (S).*Phylloxera* (F). *Phylloxera* (E).

جنس حشرات صغيرة القد وبمضها بجهرية من فصيلة الاريقات ورتبة متجانسات الاجنحة || انواعها عديدة جميعها مؤذية انما اضرها واشدها اذى فيلوكسيرة الكرمة .

٢١٢٥٠ - فيلوكسيرة السندبان * *Phylloxera quercus*, *Ph. coccinea* (S).*Phylloxera du chêne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة حمار اللون صغيرة القد تطول نحو ١ مم. تركيب اوراق السندبان كنفونها . مظهرها الخارجي بقع صفر لاقياسية الانتظام تملو نصل الاوراق تذبذبها يرتقي عليها .

٢١٢٥١ - فيلوكسيرة الصنم * *Phylloxera salica* (S).*Phylloxera des saules* (F).

نوع من الفيلوكسيرة صغيرة القد طوله نحو ١ مم. لونها الى السرة تمسح ضمن جوارح شعبة المادة ندية الشكل كاللغز وتكثر عند ابط الانسان والبرام والاوراق . تنصص النسخ من الاربعة الشبكية وتؤدي النبات وتضيقه .

٢١٢٥٢ - فيلوكسيرة الكرمة * *Phylloxera vastatrix*, *Rhizaphis vastatrix*, *Perilymbia vitifolia*, *Pemphigus vitifolii*, *Xerampelus vastator*, *Dactylospora vitifolia* (S).

نوع من الفيلوكسيرة وهي حشرة صغيرة القد ، رباعية الاشكال تتميز بالفوارق التالية : الشكل الاول يشبه الفيلوكسيرة الفصية وهي معارة ، لاشقية ، مستطيلة المنك القالب تعيش على الاوراق || الشكل الثاني يشبه الفيلوكسيرة الجردية وهي معارة ، لاشقية ، مستطيلة المنك القالب تعيش على الجذور || الشكل الثالث يشبه الفيلوكسيرة الخنجة وهي لاشقية مستطيلة المنك القالب تعيش على الارق وفي التربة حتى اسلخها الاخير ثم تخرج وتطير || الشكل الرابع يشبه الفيلوكسيرة الشقية ذات الاعضاء التناسلية الكاملة وهي عارمة الجناح والمنك .

كيفية تطور الحشرة - ينبت بالانثى الحشرة التي تمسح مكة واسعة في ايلول تدمي مكة مكة تنمت في ارجاء . وسكتها هذه اسطوانية الشكل زيتونية اللون ، تكاد لا تكون متظورة ، طولا ٢٥٠ سي. وعرضها ١٢٠ سي. لتلقها من عقبها في اسدى طبقات القشرة تنبت على حافة حتى الربيع حيث يتحول لونها الى الاصفر ثم يعقبه اللثف الذي يتم في نيسان . فالحشرة اذا تقضي الشتاء ككتنه ثم تنبت في الربيع فينجم منها اما الفصية التي تتلاقى الساق والفروع الى ان تستقر على الاوراق او الجردية التي تفور في التربة حتى تسوي الجذور والجذيرات .

٢١٢٤٧ - فيلوكسيرة الادغال * *Philaenus spumarius* (S).*Philaenus des buissons* (F).

حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ١٠ مم. ثوبها غطت السرة السوداء والصفراء || رأسها نصف دائري الشكل ، اصفر اللون . غطتها ثلاثي الاجزاء . عينها كبيرتان . زباناها قصيران . كسلها اصفر اللون ، اسوده في الزايم الاخير . حجبها مزوانية . ظهراتها كامل الخنجية ، لاحف ، اسود اللون ، اصفر الحمار . ريشها عشائيان ، شفافان . بطنها شديد السرة ، اصفر المجد . قوائمها الى السرة || يكثر وجودها في البراري الدققة وعلى السيابات الحية . قريبا نغ الاوراق .



فيلوكسيرة السندبان

٢١٢٤٨ - فيلوكسيرة * *Phyllanthus* (S).*Phyllanthus* (F). *Phyllanthus*, *Tipsey-wood* (E). *Blatzblume* (D). *Flanto* (I).

جنس اشجار وجنبات برية ورتبينة من فصيلة السويديات . لورائها معتقة متعاقبة ، نصلها بيضي الشكل جامد الصلصة . ازهارها صغيرة القد ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، سداسية البتلات ، ثلاثية الفصل والامدية || انولها المعروفة نحو ٤٠٠ جمها استوائية المنبت ، مظهرها بري وبمضها تربين وسنبا انواع طيبة تلعب السيلان وبغيرها تنفر الاصباح لتستعمل في تنويغ السمك لاصطياده .

٢١٢٤٩ - فيلوكسيرة السالك * *Phyllanthus emblica* (S).*Emblie officinale*, *Grane myrobalan*, *Myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano emblica* (I).

شجرة برية من البهيمات قريبة الشبه من الفيلوكسيرة متنبية لئله ، تستعمل في الطب لمعالجة الزنقة .



فيلوكسيرة

٢١٢٤٦ - فيلوكسيرة الكرمة * *Philopotamidae* (S).*Philopotamidae* (F). *Philopotamidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حلوئيات الاجنحة . اجنتها وانولها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة انحصار الجبال حيث الغابات وجدول الماء . اجسامها متباينة الخيزوم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . بسطة اجنتها تقارب من ١٥ الى ٣٦ مم. اجنتها شديدة السرة يطولها تقطيع سلح . جميعها سودة اللون . رؤوسها وصغورها مشاة حلب اصفر . تطير في النهار . طيراتها قصير الشوط ، سريع الحركة || اساريها مفترسة ، طليقة ، تعيش في المياه الجارية . تصنع شبكا قمية الشكل تلتقط فيها فرائدها .

اشهر اجنتها :

الفيلوپاتاموس * *Philopotamus* (S).*Chimarra* (S).

الفيلوكسيرة

٢١٢٤٧ - فيلوكسيرة * *Phyllornis* (S).*Phyllornis* (F).

جنس طير من الجوارح شرويات المتأخرات وفصيلة الكميتيات . انولها المعروفة قليلة العدد اسطوانات تمتد من الخلد الى جزر الزايم || اجسامها تشبه البيليل بهامته وشكله . اثوابها ملونة زاهرة الخضاب || جميعها غريبة ، تألف حياة الاسر وتقتبس الاغان وترددها .



فيلوكسيرة الكرمة



فيلمون

٢١٣٥٤ - فيليمون * Philémon, Phylédon (F).
جنس طير من الجواثم ربيقات المنقاريات وعضلة الفشريات .
أنواعه المعروفة قليلة العدد أحياناً جزر الزانج وسانديب ||
أجسامها مستطيلة الحجم قدما قد الشعرور . رؤوسها
صغيرة . منقارها مقبضة مغطاة القشاعة . أذنابها مستطيلة ،
مقطونة الأطراف . أوتارها متباينة الألوان يسود فيها
الأخضر اللامع أما بطونها فبنية اللون أبيضاء || تدن
في الانحجار الرقيقة . حشمتها من ٤ إلى ٦ يمشات ترزها
وسحها دون الذكر الذي يئذن لها الغناء .

٢١٣٥٥ - فيليوتريكيم Phylloscopus (S).
هو العنينة جنس طيور بحيرية ، أغلبها .

٢١٣٥٦ - فيلقة Gyps de Ruppell (F).
هي القشمار الأرض ، أغلبه .

٢١٣٥٧ - فيلولوجيكا Phénologie (F).
Phenology (E).
هي علم الظواهر ، علم يبحث في الوقت الذي تحصل فيه
دورياً للظواهر الخاصة بالدورة الحياتية النباتية وتأثير
حوائل البيئة في هذه الظواهر أهمها البردة والارتفاع وانحرار
واردك الشر والاحبال .

٢١٣٥٨ - فيلج Vin (vieux) (F).
هو الخمر العتيقة الصافية .

٢١٣٥٩ - فيلم Sigle (F). Sigla, Outline (E).
الفهم الحرف الرئيسي المفتاح المصطلح التعبير عن كلمة .
وهو أيضاً مجموعة من الحرف الأولية تشمل التعبير عن
مجموعة كلمات . ج . فيلم .

٢١٣٦٠ - فيلقة Spizaeus bellioeus (S).
Spizaeus bellioeus, Griffird (F).

طائر من الالاه ينتمي الى عائلة الفيليات وعضلة الصغريات .
أصابعها الحادة الأفريقية أخصها جبال الحبشة . طوله
نحو ١٠٠ سم . وهو لهيف القوام ، منقار الرأس ، قصير
السطح ، مستطيل اللب . ظهره ورأسه الى الكهبة تتخللها
سرة ضمنية . سقاعه الى السرة المنقطة المرقشة يتفرعها
خط أبيض . يملكه ويحولها الى البياض الأزرق المزاج .
ذنبه الى الكهبة الرمادية تتفرع ٦ خطوط عابطة شديدة
السمرة || وهو من الأوابد يعيش ذكراً وإناثاً لا يفرقها
سوى الميت . قوته الغناء والقنوع الطير . يئن ذكره في
قوة الشجرة الرقيقة او في بعض أوقات الصغور النائية
الشابة || أثناء قنوع وقتين مستمرتين قطر الواحدة
بأرواح بين ٨ و ٩ سم . تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع .



كينة

الجلقة - أصغر قدماً من الفصيلة طولها نحو ١٠٠٠ م .
لونها الى الصفار الكبير وهي شديدة الانح . أجيالها
الموسمية تراوح بين ٦ و ٨ ويصلح حشرات الجبل الأخير
بقضي ياله الشري تحت قشور الجذور || صغرها
محسور بلطاف تناسلها لان وخرها الجذريات والجذور ، التي
تميش عليها وفيها ، قد يبلغ بعض الفريوات .

المنجحة - هي من حيث الأصل حشرة فصيلة دخلت
الربة بعد انسلخها الثالث فتحوورت لها بعد انسلخ
تكميلي رابع الى عذراء ثم الى حشرة منجحة طولها نحو ٢
م . أي ٢٠٠٠ م . وهي لا شقة الجلس ، صفراء اللون .
رمانية الإجنحة الشفافة . تقص من ٤ الى ٨ مكناات
مختلفة الاحجام تقعي مكن الصف . الصغرى منها وقد
تطول نحو ٢٦٠ م . تنقف من الذكور . والذكور
تطول نحو ٤٠٠ م . تنقف من الاناث .

الشفقة - هي الكاملة الأعضاء التناسلية تنقف من مكن
الصف المائل الى الحشرة المنجحة . وهي صفراء اللون حادة
الملك والابنحة والاذى . الذكر منها يطول من ٢٦٠ الى
٣٨٠ م . والانثى من ٤٠٠ الى ٤٦٠ م . || سفادها
يبتنى بعد النقف بيوم أو يومين تضع الانثى بعده مكنة
واحدة تعرف بمكنة الشتاء التي جنبها على ذكرها في اول
هذا الجث .

الضمار الحشرة - أضمارها جسمية لانها تميت الكومة بعد
ان تقضي على الجذور والاوراق .

مكافحتها - طرق مكافحتها متعددة منها القنص بالاد نحو
٢٥ يوماً او استعمال الموشير النشيطة القمالة السامة التي
يصطب القيام بها تفكراً لهاظة اكلافها وبا قد تسببه من
عواقب . لذلك يحسن استعمال الصغور على كورة امريكية
بنية وهو ما مكن اربعة من تجديد كرومها بعد ان
نفت عليها الفيلكوسه .

٢١٣٥٣ - فيليكانتيدس Elephantidae (S).
Elephantidae (E).

لفيلة الفيلة من رتبة الخرطوبيات .

أنجزت « المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل. »

في عاريا - لبنان

طباعة الجزء الثاني من « الموسوعة في علوم الطبيعة »

في العام ١٩٨٨

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume II
2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar al-Machreq east
Boite Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boite Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH